

産科探領圖訣

二

ヤ 9  
1138  
2







外科控領圖訣卷二

近江八幡

水原博濟卿著

門人

平安 福井致同英川

全 渡邊義豐三省 全校

○救血暈及崩漏訣

凡産後ノ血暈其因種々アリ、素ヨリ積聚留飲等  
ノ宿癖アル人、臨産腹内空虚スレハ則チ婉シ  
難キナドノ俗説ヲ愚婦媪婆コレヲ信シ、強テ  
粥飯ヲ與ヘ、或ハ神符ノ類ヲ冷水ニテ吞シメ、

産科探領圖

卷二

一

享和元年







又ハ催生ト称スル藥劑ヲ漫ニ多服スルニヨ  
 リ、藥食胃中ニ停蓄シテ、心下硬滿心中懊懷、吞  
 酸噯腐シ、之ニ加フルニ氣血虛ニ乘シ藥食ト  
 相搏テ鬱胃昏悶シテ、終ニ人事ヲ不省ニ至ル  
 ナリ、此症咽喉ヲ探リ畜水ヲ一吐スレハ醒省  
 スル者ナリ、主方ハ半瀉加茯苓、或小半加茯苓  
 吳茱萸、或熊膽姜汁等ノ類ヲ選用ユベシ、又婉  
 後種々意ヲ用ル<sub>ト</sub>多ク、或ハ起步ヲ縱<sub>ホ</sub>ニシ、コ  
 ガ<sub>カ</sub>ニ氣血動搖シテ、瘀血虛ニ乘シテ、心

下ニ上冲シ耳鐘鳴ヲナシ、心下硬滿神昏口噤  
 シ、暈倒シテ人事ヲ省<sub>セ</sub>ザルニ至ル者ナリ、此症  
 急ニ面ニ冷水ヲ吹洒<sub>ク</sub>ギ、心下不容ノ穴ヲ按<sub>ス</sub>テ  
 右ニ側卧ナサシムレバ醒省スルモノナリ、又  
 氣衝ノ脉ヲ力ヲ極強ク之ヲ推ス寸ハ痛ヲ覺  
 ヘテ醒省ス、醒テ後チ聲爽ナル者ハ實暈ノ兆  
 ナリ、若シ聲爽ナラザル者ハ須臾ニシテ復<sub>タ</sub>發  
 ス、心得ベシ、主方聖惠午膝散、或折衝飲、或桂枝  
 茯苓丸加大黃、或獨行散、或熊胆姜汁等選<sub>ヒ</sub>用



ヲベシ、又崩血ニヨリ暈ヲ發スル者アリ此甚  
 ダ難治ノ症ナリ、此症多クハ頭ヲタレ、昏悶煩  
 亂シテ、面色唇口血色無ク、其名ヲ呼レバ蒼レ  
 氏、神思朦々トシテ其聲ニ神無ク、脈沈伏シテ  
 絶セントシテ手足厥冷スル者ナリ、此症煩悶甚ニキ者  
ハ多クハ不治ニ至此ヲ救ノ法先急ニ救崩術  
 ヲ以テ其崩漏ヲ防クベシ、其法第十六圖ノ如  
 ク右ニ側卧ナサシメ、一人ヲシテ心下不容ノ  
ニ按鎮ナサシメ、按者暈ノ醒省スル迄按鎮  
ノ手ヲユルカセニナスベ

得ベラ先一味熊膽、桃花散ヲ冷水ニ調レ服  
 サシメ、產婦ノ鎮帶ヲ小腹ヘ引サゲ、其鎮帶ヘ  
 手又グヒ様ノ綿子ヲ以テ圖ノ如ク引透シ、婦  
 ノ前腹ト後ニ、ワナヲ拵ヘ、陰門ヘ敷テ絮ヲアテ  
 圖ノ如ク犢鼻禪ヤフノ綿子ヲ以テ、前腹ノワ  
 ナヨリ後ノワナヘカケ、又後ヨリ前腹ノワナ  
ヘカケ、數回強ク之ヲ引シメ、以テ崩血ヲ防キ、  
 而後真武加人參、或四逆加人參湯、或甘艸乾姜  
 湯、或家方膠艾烏賊湯加參附、或獨行散、或洎夫



藍ノ類ヲ擇ヒ用ユベシ、若シ胞衣下ラズシテ  
暈ヲ發スル者アリ、胞衣下ラザレバ死ヲ致ス  
ノ俗説ヲ信シ、狐疑憂思シテ終ニ此證ヲ發ス、  
上ノ氣血動搖シテ暈ヲ發スル症ニ照シ、治術  
主方ヲ施シ、暈醒テ後胞衣ヲ下スベシ、胞衣子  
宮ヲ離レ陰門ニ進ミ来ラバコレヲ暫時安住  
シテ急ニ取り下スヘカラス、若シ急ニ下スト  
キハ氣血脱泄シテ崩血ノ禍アラシムヲ恐ル  
ナリ、調血ノ藥ヲ用上須臾アリテコレヲ下

スベシ、必ス倉卒ニナスベカラス、

○救<sub>ニ</sub>婉後寒戰咬牙訣

凡<sub>ニ</sub>婉後卒ニ寒戰咬牙ヲ患フル者アリ、此症マヅ  
急ニ沸湯ヲ<sup>テモクイ</sup>手巾ニ浸シ頭上百會ノ穴ヲ頻リ  
ニ蒸シ温ムベシ、寒戰忽然トシテ止ムモノナ  
リ、<sup>手巾ノアタ、マリ、去ル片</sup>此症瘀血下ル  
少キ者ハ聖惠午膝散、或折衝飲、桂枝茯苓丸加  
大黃ノ類ニ宜シ、惡露下ル<sub>ト</sub>過多、或難產日ヲ  
延キカヲ用ル<sub>ト</sub>甚シクシテ發スル者ハ四逆



加人參、或甘艸、乾姜湯ノ類擇ヒ用ユベシ、寒戰  
 息ンテ後チ、發熱汗出、瘧狀ノ如キモノナリ、此  
 症一二發ノモノハ畏ル、ニタラズト雖、若隨  
 胎後、數日此症ヲ發セバ、變シテ瘧病トナリ、終  
 ニ難治ニ至ルコトアリ、心得アルベシ、  
 上ニモ云、如ク寒戰、血暈、崩漏ノ三症ハ、娩後急  
 卒ノコトナレバ、術ヲ行ハシ前ニ、其テアテノ藥  
 劑并ニ沸湯ヲ設ケ置ベシ、是急ヲ救フノ備ナ  
 必祖畏ニシテ術ヲ施スコト勿レ、慎ムベシ、

○治驗

保壬辰秋七月、新町菓子舖某妻、臨產二日、分娩  
 セズ、努力漸々止ムニヨリ、產婆強テ努力ナサ  
 レムトイヘトモ、氣力竭キ、疲勞ヲ倍スノミ、故  
 ニ余ヲ招テ、治術ヲ請フ、往テ脈ヲ診シ、探官術  
 ヲ以テ胎ヲ候ス、順產破漿シテ、兒頭横骨ニ支  
 ヘテ、不分娩、是ニ由テ尿道ヲ閉塞シテ、小便  
 滴モ通セズ、腹滿甚シク、苦悶、導水術ヲ施シ、小  
 便手ニ隨テ通スルコト夥シ、脈証疲勞ノ兆アリ



真武湯加桂參二貼ヲ與ヘ示シ云後頃來リ分  
 娩セシメシ、希クハ夫迄ニ是藥ヲ用井盡スベ  
 シト云テ忙ギ還リ、ハシテス創意製設セル探領器ヲ携  
 ヘ再ヒ往テ問フ、先ニ與ヘタル藥ヲ飲ミ盡シ  
 タルヤ否ヤ、産婦拜シテ云君ノ手術ニヨリ小  
 水通利ヲ得テ腹内大ニクツロギ既ニ藥ヲ用  
 ヒ盡シタリ、余ガ曰茲ニ考ル術アリ、意ノ如ク  
 應セバ則チ無疵ノ活兒ヲ得セシムベシト云  
 又前刻ヲ煎セシメ乃チ、手術中ノ豫備トナシ

此ツ婦ヲメ法ノ如ク仰卧ナサシメ、左手ノ食  
 中ニ指ヲ陰門ノ下邊ヨリ深ク指ノ及ブホド  
 進メ探領器ヲ指ニ沿ヘ深ク進メ、兒頭ヲ引出  
 サントスレ<sub>レ</sub>、此術未ダ熟セザルガ故ニ甚ダ  
 出難シ、千辛萬苦シテ徐ク分娩ナサシムル  
 ヲ得タリ、出生スルトコロノ兒體無疵ニシテ  
 活氣アリ、面ニ冷水ヲ洒ケバ忽然トシテ發聲  
 ス、惜ヒ裁暫時死セリ、娩後脫花煎加芍藥ヲ用  
 テ日ヲ逐テ全瘉ス、是此術試効ノ權輿也、



池田街采<sup>コ</sup>緞<sup>ヤ</sup>舗某妻、臨産數刻分娩セズ、努力漸々止<sup>ム</sup>、産婆及醫師藥術殆盡キ唯茫然トシテ手ヲ束ヌ、主人、醫師及ヒ産婆ニ議シテ曰、荆婦昨朝ヨリ今ニ分娩スルヲ得ズ、茲ニ人有リ水原氏産科ニ善シト勸<sup>ム</sup>ル者アリ試ニ診ヲ請シ、乃初更ノ頃使ヲ走ラシテ余ガ治ヲ求ム、即時ニ往テ診シ探官術ヲ以テ胎ヲ候フニ順産破漿シテ兒頭横骨ニ支ヘテ分娩セズ、然レ凡脉左結<sup>ル</sup>神有テ未ダ死胎ノ候無シト雖、努力既ニ

トキハ分娩スベキ兆ナシ、今手術ヲ施シ救ハズンバ兒終ニ腹内ニ死シ、若シ遅緩セバ母モ亦危カラシ、然レ凡分娩後ニ變症アラシ計ルベカラズ、親族得心ノ上、ニアラザレバ手術施シ難シト云産婦頻ニ藥ヲ請フ回テ救生飲加附ヲ與フ、病家親族使ヲ走ラシム親族路遠ク来ルヲ遲シ、漸ク未明ニ婦ノ母馳セ来リ態ニ<sup>テ</sup>手術ヲ請フ、乃チ探領術ヲ施シ分娩ナサシム、出ルトコロノ兒死胎ナレ凡無疵ナリ、分娩後



兒枕痛ヲ患フル甚シ、山查子一味濃煎汁砂糖少許ヲ加ヘ服セシム、腹痛減ズレ、氏惡露下ル、少シ、聖惠午膝散加山查子ヲ用テ惡血漸盡、又轉胞ヲ患テ小便不通腹滿甚シ洩閉術ヲ施シ玄英湯ヲ與ヘ調理二十日ニシテ諸症全瘳セリ、

江南街萬屋弥助妻、臨産數刻分娩セズ、余往テ此ヲ候ヌニ兒ノ臀尻及前陰指頭ニ應ヌ、産婦曰要キカナル因縁ニヤ横逆産ヲ患ル、已ニ五

度皆回生術ヲ請テ兒ヲ破裂シ拽出ス、余カ曰坐産ハ産論翼ニモ活胎ノ者千百中僅ニ一二ト云テ甚ダ安産シカタキ者ナリ、然レ凡坐産必ス死胎トカギルベカラズ、是レ分娩シカタキ故ニ終ニ死胎トナル者ナリ、今診視スルニ死胎ノ候無ク、シカモ男子ナリ、余ガ手術ヲ以テ命全キ男子ヲ得セシムベシト、乃チ探領術ヲ施シ意ノ如ク無疵ノ兒ヲ得テ母子俱ニ恙ナク今猶存セリ、



前川屋某妻、臨產二日分娩セス、產婆強テ努力セシムルト累リニスト雖、漸々休ムニヨリ余ヲ延テ治術ヲ請フ、診視スルニ脉沈遲ニシテカ  
 無ク只眠睡ヲ喜ミ手背微冷ス、探官術ヲ以テ胎ヲ候フニ順産兒頭横骨ニ礙リ赤小豆汁ノ如キ瘀血ヲ下シ臭氣尤甚シ、余密カニ主人ニ謂フ産婦甚ダ惡症多ク且ツ死胎ノ候アリ、今手術ヲ施シ分娩ナスト雖、娩後恐クハ危カラ  
 主人曰、荆婦此ノ難産ニカ、リ分娩セズシ

テ斃レバ非命ノ死ニシテ遺憾甚シ、請フ居ノ手術ヲ以テ分娩スルヲ得バ假令娩後變症アリテ死ストモ奚ンゾ恨ニ、於是大劑ノ真武湯ニ廣東人參一錢ヲ加ヘ二貼ヲ與ヘ須臾ニシテ脉症神氣稍復ス、又前方二貼獨參湯一貼ヲ調ヘ置施術中ノ備トナシ、即チ探領術ヲ施シ死胎ヲ引出ス、娩後脱血シテ暈ヲ發ス、救崩術ヲ施シ又一味熊膽及洎夫藍ヲ用テ暈全治ル、膠艾四物湯加參附烏賊骨ヲ頻與テ崩血亦



止ト雖、脉證虚候依然トシテ不復、爾後十全大  
 補湯ニ轉シ調理一月ニシテ平復ス、  
 津田村忠五郎妻、横産手ヲ露シ分娩セス、産婆ノ  
 勸ムルニヨリ一醫生ヲ招キ療セシム、醫生已  
 鐵鉤ヲ用テ兒ノ腕ヲ切斷シ奈何トモナシガ  
 タシ、急ニ余ガ診ヲ促ス、即時ニ往ク醫生余ニ  
 密カニコノ由ヲ告グ、余診視シ退テ謂テ曰脉  
 症甚ダ險惡殆ンド危篤ナリ、今余ガ手術ヲ施  
 分婉ナサシムト雖、婉後危カラシ、親族一等

領承ニアラザレバ術ヲ施シ難シ、主人哀請シ  
 テ曰妾ガ艱苦觀ルニ忍ヒズ、君ノ手術ヲ以テ  
 分娩スルヲ得バ假令死ストモ亦可ナリ、乃  
 チ家製ノ補元湯ヲ頻リニ服セシメ、又獨參湯  
 ヲ調ヘ置キ手術中ノ備トナシ、探頷術ヲ以テ  
 胎ヲ逆ニ推送シテ、死胎ヲ引出シタルニ兒頭  
 無シ按ニ是彼醫生鉤ニテ腕ヲカキ切シト是  
 キ頭頸ヲ俱ニ切斷シタルモノナリ是  
 ニ於テ、兒頭ヲ出サント欲シテ、醫生ニ腹ヲ按  
 シメ術ヲ施サントスレバ血暈ヲ發ス、一味熊



膽及ヒ抽刀散ヲ用テ暈粗<sup>ホ</sup>治スト雖前夜ヨリ  
ノ疲勞アリテ虚候尤甚シ前方ニ人參ヲ倍加  
シテ頻リニ與ヘ脉症精神稍復ルヲ待テ又兒  
頭ヲ出サントスレバ亦暈ヲ發シテ術ヲ施ス  
ト不能コレニヨツテ醫生ト商議シ此症容易  
ニ術ヲ施シ難シ脉症精神復セズレバ終ニ不  
治ニ至ラン歟乃チ此由ヲ産婦及ビ家人等ニ  
言ヒ聞セ前方五貼ヲ與ヘ醫生ト俱ニ家ニ還  
レ醫生再拜頓首シテ曰吾術未熟ニシテ人ヲ

誤ルト是ノ如シ今日先生ノ來會ニアラス  
バ永ク恥辱逃ルベカラズト謝還余翌朝往テ  
診スルニ脉症甚ク平穩ナリ是ニ由テ頸斷用  
器ヲ以テ兒頭ヲ引出シ還元煎ヲ與ヘ飲食日  
ニ進ミ神氣稍快シ産婦腰以下ヲ浴セシ  
乞フ余許サズ婦余ガ言ヲ用ズ自ラ竈ニ煙シ  
テ浴スコレニ由テ瘧病ヲ發ス意ヲ究メテ治  
スレ凡竟ニ黄泉ノ客トナル嗚呼哀哉

某姓五兵衛妻臨産三日分娩セズ余ヲ招テ治ヲ



求ム、往テ診視スルニ脈沈微ニシテ力無ク、兒  
 頭横骨ニ支ヘ尿道閉塞シテ小便些少モ不通  
 腹滿甚シ、乃チ疏水術ヲ施シ、小便手ニ随テ通  
 シ、滿大ニ減ズ、予退テ謂テ曰ク産婦疲勞ノ努  
 力無シ、今速カニ救ハバ母命全カラン、若シ遲  
 緩セバ母子俱ニ危シ、五兵衛曰ク荆婦一昨日  
 ヨリノ困苦着ルニ忍ズ、兒必ズ腹内ニ死セシ、  
 希クハ君ノ手術ヲ以テ兒ヲ破裂シ速ニ分身セ  
 假令娩後ニ斃トモ奚ゾ悔シ、於是家方補元

湯方見附方ヲ頻々ニ與フ、脈症稍神アルヲ覺

フ、乃チ探頷術ヲ施シ兒ヲ拽出ス、兒少シク活

氣アリ、曰テ臍帶ヲ診ス、動脈アリ此時未ダ胞衣ヲ下ザス

冷水ヲ兒面ニ洒キ、又發聲術ヲ施ス、忽然トシ

テ發啼ス、一坐皆愕然トシテ喜悅シ、遽カニ誕

生浴ヲ設ク、五兵衛頓首シ大ニ喜テ曰荆婦痴

兒俱ニ黄泉トナルヲ必定セリ、今君ノ庇蔭ニ

ヨリ借ニ蕪生シ爾モ男子ヲ獲タリ、高恩盡シ

難シト言テ謝ス、



小幡街紙肆某妻、臨產數刻分、婉セズ、黄昏余ニ使  
 ヲ走ラシテ治ヲ請フ、往テ候フニ順産破漿シ  
 テ兒頭横骨ニ礙リ、尿道閉塞シ小水不通腹滿  
 甚シ、導水術ヲ施スト雖努力尚緩漫ニシテ數ナ  
 ラズ、連綿トシテ終ニ深更ニ及、余主人ヲ閑處  
 ニ招キ、産婦分娩スベキ兆ナシ術ヲ施サズニ  
 バ終ニ危篤ニ及シ、然レモ親族得心ニアラザ  
 シバ施術難シ主人親族ト議シテ術以テ治セ  
 ントヲ請フ、婦其事ヲ聞キ自ラ努カシ、婉セシ

ト欲シテ強テカ息ストイヘモ能ワズ、卒ニ發  
 癩暈倒シ手ヲ舉ゲ、足ヲ擲ケ、指ヲ屈シテ數ルガ  
 如ク面ヲ拊、衣ヲ摸リ眉目掣引邪視露睛鼻息齟  
 ナシ、或唇吻顫動發聲叫號咬牙弄舌ス、余手ヲ  
 以テ心下ヲ按スルニ、一物膈間ニ上冲ス、由テ  
 救癩術ヲ施シ、一味熊膽三黃加辰砂湯ヲ頻用  
 テ癩勢徐ク折ク、擣急始テ緩ク、困々然トシテ  
 睡ルガ如ク、須臾ニ醒ム、拊是探頂術ヲ施サン  
 トヲ談スレバ復發癩暈倒ス、前方ヲ用テ醒省ス



手術ヲ施シ分娩セシメントスレバ、産婦子ガ  
 意ニ随ハザルヲイカントモスルヲ能ハズ、主  
 人子ヲ別處ヘ延ヒキ、太クダ慨歎シ、イカンゾレテ  
 婦ノ頷承センヲ謀ル、余頓常一計策ヲ生ス、  
 元來此家一向宗門ニテ、此婦常ニ他カ本願ノ  
 意ヲ會得スルヲ知ル、故ニ余婦ニ問テ曰ハ爾レガ  
 常ニ他カニ任セ未來成佛ノヲヲ聽聞スルヤ  
 否、婦答テ云、妾不肖ナレバ、如来大悲ノ本願他  
 カニ任セ、正定聚ニ入ルヲ領得セリ、又問ハ爾レ

今此艱産ニカ、リ自ラ分娩スルヲ能ス分娩  
 セザレバ終ニ死地ニ墜入ンヲ必定セリ、汝自  
 カヲ以テ未來成佛スルヤ他カヲ以テ成佛ス  
 ル乎、汝今強テ努カレ自ラ分娩セント欲スル  
 ハ是即自カナラン、余ガ手術ヲ以テ分娩スル  
 ハ是他カナリ、汝痛苦ニ逼マリ本ニ聽聞シ心得  
 タル如来大悲ノ本願ヲ忘レタル乎、辨ハ工無キノ  
 甚シト謂ベシ、是ニ於テ産婦歎息シテ曰、嗚呼  
 吾過ヒテリ、女ノアサマレサ痛苦ニセマリ常ノ



想ヲ忘レタリ、今君ノ教化ハ正ク如来大悲ノ  
 侘カニ任スノ教化ニ思ヒ通セリ、希クハ君ノ  
 手術他カニ任セ分婉スルヲ得テ、此苦惱ヲ  
 免レバ死ストモ如来大悲ノ本願也、君ノ教化  
 ハ今世未来ノ化度ナリ、請フ早ク術ヲ用テ吾  
 ヲ救ヒタマヘ南無阿弥陀佛ト云、既癩才廿一  
 ヲテ後探領術ヲ施シ死胎ヲ引出ス、家人一族  
 奇計ナリト稱シテ欣幸ス、婉後恙ナク飲食日  
 ニ進ミ調理二十餘日ニシテ全瘡セリ、



千田村十兵衛妻、横産兒手膊ト臍帶トヲ露シ分  
 婉セズ、余ヲ招テ治術ヲ請フ、之ヲ診視スルニ  
 露ストコロノ臍帶動脈絶シテ應セズ、是未ダ  
 日數ヲ經スト雖、母體ヨリ氣血ヲ運輸スル所  
 ノ道路ヲ兒體ト横骨トニシメ合サレテ臍帶  
 ノ運動ヲ絶ス、是必ス死胎ノ兆ナリ、即チ横産  
 用器ヲ用テ死胎ヲ拽出ス、婉後恙ナク不日ニ平  
 愈ス、



フ往テ診視ス、脈微弱ニシテ沈伏シ、少ク乾嘔  
 アリ、探宮術ヲ以テ胎ヲ候フ、順産破漿シテ兒  
 頭横骨ニ支テ分娩セズ、瘀血下テ臭氣ハナハ  
 ダシ、兒頭尿道ヲ阻閉シ小水通セズ、先ツ導水  
 術ヲ施セバ小便手ニ随テ通、四逆湯加人參半  
 夏ヲ與テ頻リニ服セシメ、探頷術ヲ以テ死胎  
 ヲ引出ス、娩後惡露下ル、少ク腹痛微滿セリ、  
 脫花煎加芍藥山查子ヲ與テ腹痛減ズト雖小  
 水滯、腹滿足脛浮腫、腰股攣急疼痛メ惡露ナ



ホ不下、八疝湯加附子車前子ヲ投シ惡露稍ク  
 盡キ小便快利シ、諸症日ニ減ジ調養半月計ニ  
 シテ全ク瘳ユ、  
 十林寺村某家一婦人、横産手ヲ露シテ分娩セズ、  
 腰腹陣疼ヤク、惟糞門重墜スルメ、催生ノ藥  
 ヲ用テ、醫師及ビ産婆、只腹ヲ隔テ、胎ヲ推シ  
 或腰ヲ抱テ努力セシメ、又腰湯ヲ施シ種々術  
 ヲ行ヘ、氏不分娩、日ヲ延、一終、三日夜ニ至ル、同  
 村市郎兵衛ナル者、余ヲ招テ診セシメ、一ヲ



勸メ使ヲ促シテ急ニ治術ヲ請フ、即時ニ往テ  
 門ニ入レバ惡臭鼻ヲ撲ツ、已ニ產室ニ到レバ  
 戸ヲ閉テ沈香及橘皮薰シ、醫師及產婆偕ニ臭  
 氣ヲ忍テ傍ニ坐ス、產婦高枕側卧シテ自ら臭  
 氣ニ堪ズ、穢菜葉山椒葉ヲ以テ面ヲ覆ヒ臭氣  
 ヲ防キ、只乾嘔シテ止ズ、余先ヅ其室ヲ開豁セ  
 シメ、而後脈ヲ診シ探宮術ヲ以テ胎ヲ候フ、兒  
 腹内ニ死シ豆汁或赤小豆汁ノ如キ瘀血ヲ下  
 ス、余退テ謂テ曰今診視スルニ兒腹内ニ腐爛

產婦疲勞尤甚シ、今手術ヲ以テ分身セシムト  
 雖、娩後ノ變証計リ難シ而レモ、娩シテ生ル者  
 アリ、娩セズシテ活スル者ヲ見ズ、余術ヲ施シ  
 分娩ナサシメバ萬死中幸ヒニ一生ヲ求ムル  
 一アラン、乃チ半附理中湯ヲ與ヘ、橫產用器ヲ以  
 テ死胎ヲ逆ニ推送シ倒産ニ引出シタリ、出ル  
 所ノ兒肚腹膨脹シテ鼓ノ如ク肌膚糜爛シテ  
 皮無キニ似タリ、穢氣一室ニ薰徹シテ臭ニ堪ズ、  
 衆人一時ニ噦吐セントス、頃刻ニシテ胞衣ヲ



下シ、時良ウツリテ産婦惡夢ノ覺ルガ如ク也  
乾嘔既ニ止ミ粥飯味ト常ノ如シ、調理二十日  
餘ニシテ全ク癒ユ、

新街商布某妻、臨産分娩セザルヲ二日夜、衆醫治  
術ヲ盡スト雖産セズ、黄昏余ガ治ヲ求ム、診視  
スルニ順産破漿シテ兒頭横骨ニ礙リ娩セズ  
ト雖死胎ノ候ナシ、而レ氏既ニ日ヲ延クニ由  
リ脉症殆ント疲勞ス、今手術ヲ施サバ母子俱  
ニ命全キヲ得ニ歟、若シ遲緩ニ及バ娩後變

證アラシク計ルベカラズ、主人及ビ産婦手術ヲ  
畏縮シテ余ガ意ニ從ハザルヲ以テ余辭シ去  
ル、次日主人忙テ来、謝シテ曰、荆婦今日ニ至リ  
未ダ分娩セズ益々苦惱ヲ加フ、今ハ母子共ニ命  
ヲ君ニ委任スベシ希ク再ヒ診ヲ乞フト、余  
ガ曰、吁、晚矣、晚矣、今ニ至テ手術ヲ施ス氏勞シ  
テ功ナキノミ、主人哀悔シテ曰、前宵君ノ賢察  
ニ伏セス、今既ニ此ノ如シ吾カ過殊ニ甚シ、然  
レ氏婦ガ苦惱ルニ忍ヒズ、願クハ君ニ頼テ



分娩之艱苦ヲ免レバ、娩後死ストモ何ゾ居ラ  
 恨ニ、於是已<sup>レ</sup>テ得ズ再ヒ往テ診スルニ、虛候  
 前ニ倍ス、乃チ家方ノ補元湯ヲ與フ、產婦曰昨  
 朝ヨリ小水一滴モ通セズ、湯藥已ニ多ク服シ  
 テ腹滿ニ堪ズ、乃チ導水術ヲ施シ小便手ニ隨  
 テ通ズル<sup>ト</sup>過多ナリ、尋<sup>テ</sup>探頭術ヲ施シ分娩  
 スル<sup>ト</sup>得タリ、出ルトコロノ兒微ク活氣存  
 セリ、之ヲ見テ婦及主人前夜余ガ意ニ隨ハザ  
 ルヲ悔テヤ<sup>マ</sup>ズ、是猶賊後ノ弓ノ<sup>ミ</sup>、娩後惡露

下ル<sup>ト</sup>少ク小便不利、腹滿甚シ、桂枝茯苓丸加  
 當歸川芎車前子木通ヲ與ヘ、時々洩閉術ヲ施  
 シ調理一月餘ニシテ常ニ復セリ、  
 扇肆某妻、臨産數刺産セズ、余ヲ招キ診ヲ請フ、順  
 産破漿シ兒頭橫骨ニ支ヘテ分娩セサルモノ  
 ナリ、而メ今既ニ努力休ム安ンゾ分娩センヤ、  
 舉家拜シテ術ヲ施サン<sup>ト</sup>ヲ請フ、便チ探頭術  
 ヲ施シ活兒ヲ引出セリ、衆ノ歡ビ言フベカラ  
 ス、産後母子共ニ康健ナリ、



中村某姓妻、橫產兒手ヲ露ス、産婆コレヲ見テ主  
 人ト高議シ使ヲ促シテ余カ治術ヲ請フ、往テ  
 候フニ兒手ヲ露シ臍ニ至ラザレトモ全ク是  
 レ横産ナリ、今手術ヲ施バ母子俱ニ全カラニ、  
 主人曰既ニ使ヲ奔ラセシヨリ兒ハ<sup>ミモ</sup>廢棄ト心  
 得タリ、今君ノ手術ヲ以テ分娩スルコトヲ得テ、  
 困苦ヲ免レ母命全ク獲<sup>エ</sup>バ<sup>祐</sup>福コレヨリ大ナ  
 ルハナシ、若婉後變症アリテ死ストモ亦是レ  
 天命ナリ何ゾ傷<sup>ム</sup>、是ニ於テ横産用器ヲ以テ

兒ヲ逆ニ推送シ、倒産ニ拽出シ、婉後母子俱ニ  
 恙ナシ、


某氏亦三島妻、妊娠八月子癩ヲ發シ卒倒煩悶シ  
 テ人事ヲ不省、吐舌シテ出血スルコト尤夥シ一  
 醫ヲ招テ治ヲ請フ、曰ク此レ甚タ難治ナリ、賀  
 川氏モ子癩吐舌者必死トセリ、吾レ治術ナシ、  
 水原氏ヲ招テ治ヲ索ムベシト云テ辭シ去ル  
 乃チ余ニ使ヲ奔ラシム、予往テ診視シ探宮シ  
 テ胎ヲ候フ子宮未ダ開ズ、由テ破膜器ヲ用テ



破漿十サレム吐舌口噤レテ湯藥ヲ投ズベキ  
 ナレ救癩術ヲ施スト雖應ニ効ヲ得ズ更ニ一  
 計策ヲ發シ一味瓜蒂散五分ヲ以テ白湯ニ調  
 和シ水<sup>ミツ</sup>統<sup>ナギ</sup>ヲ以テ鼻孔ヨリ吹<sup>キ</sup>内ル意ノ如ク喉  
 ニ下ル<sup>ミツ</sup>ヲ得テ須臾ニシテ蛔虫十餘條ヲ吐  
 ス復タ探宮シテ胎ヲ候ワカノ破膜術ヲ施ス  
 其二回テ子宮少シク開ク<sup>ミツ</sup>ヲ得タリ乃チ探頭  
 術ヲ施シ胎ヲ拽出シテ後癩醒省シ調養二十  
 餘日ニシテ全愈セリ

懷孕七月奇胎圖

菓子屋某婦妊娠七月俄ニ腰腹陣疼努カシテ水血ヲ下スヨリ余ヲ  
 招ク往テ診視スルニ陰戶ヨリ兒ノ腸及ヒ肝胃ヲ露ス由テ探宮スルニ  
 一物指頭ニ應ズ故ニ拘出スレバ白色ニシテ  
 恰モ  
 へラノ  
 如キ物  
 ナリ又  
 探テ視  
 レハ又一物指頭ニアタル拘出スルニ亦白色ニシテ  
 スリコギノ如キ物ヲ出ス次ニ胞衣ヲ下レ且ツ胎ヲ  
 出スニ臍下腐爛スルヲ以テ男女ヲワカタス





胞衣圖



胞衣之形如瓜  
 其外有皮如瓜皮  
 其內有肉如瓜肉  
 其間有血脈如瓜子  
 其色如瓜色  
 其味如瓜味  
 其性如瓜性  
 其用如瓜用  
 其功如瓜功  
 其效如瓜效  
 其驗如瓜驗  
 其理如瓜理  
 其法如瓜法  
 其術如瓜術  
 其道如瓜道  
 其德如瓜德  
 其業如瓜業  
 其行如瓜行  
 其言如瓜言  
 其動如瓜動  
 其靜如瓜靜  
 其生如瓜生  
 其死如瓜死

臍帶





懷孕八月隨胎圖

天保癸巳夏一婦人妊娠八月隨胎セント欲シテ分娩ニサル一五日マムヲ不得シテ余ニ治ヲ乞フ乃チ探領ヲ施シ兒ヲ引出ス兒



腹腐爛シ臍傍破裂シテ


一數ヲ穿テリ故ニコレヲ剖テ

臍ヨリ氣血ヲ胞衣ニウケ

胞衣ヨリシテ兒臍へ氣血ヲ

運輸シ而胎ヲ培養スルノ

道路ヲ視認得タリ





懷孕四月囊兒小產圖

永原街一商賈某妻懷孕四月  
 囊兒ヲ小産ス其大サ圖ノ如シ胞  
 衣尋常滿月ノ者ニ比スレ大ニテ  
 兒甚タ小ナリ白膜中漿水充  
 滿シ膜ヲ隔テ胎ヲ見ルル膣  
 硝子壺中ノ魚ノ如シ膜ヲ剖テ  
 胎ヲミルニ長サ頭頂ヨリ脚端  
 至テ二寸餘首大ニシテ體小也



同剖膜視兒圖


竅開カズ毛髮生セズ眼巨  
 勝子ノ如ニシテ中ニ小白點アリ  
 手ノ長サ六分餘五指ヲ分テリ  
 足ノ長サ七分コレニタ五指ヲ分  
 ツ陰莖粟粒ノ如シ





妊娠五月雙兒隨胎圖

一寡婦妊娠五月密ニ隨胎ノ術ヲ行フ腹痛尤モ劇シ余ガ治ヲ求ム往テ藥ヲ與ヘコレヲ探ルニ陰中挫葉アリ指ヲ以テコレヲ出スレハツヽ井テ漿水下リ頻



ノニ努カシテ雙兒ヲ娩ス一胎ハ大ニシテ一胎ハ少シ小ナリ大ナルハ頭頂ヨリ脚端ニ至テ長サ守小ナルハ三寸五分九竅開カズ毛髮生セス胞衣一ニシテ大ナリ中間膜ヲ隔テ臍帶各生ス





臨月婉奇胎圖

瓦工某妻臨產分娩シガタキニ由リ余ニ治ヲ請フ順産ニシテ  
達シ難シ乃チ探領術ヲ施シ分娩ナサシム出生スル所ノ兒眼  
胞無ク更ニ眼球大ナルヲ猿眼ノ如ク色彩赭黄ナリ其頭頂ニ  
物アリ胞衣ヲカブルニ似タリ



附 嬰兒保護訣

凡初生ノ兒先天ノ遺毒ヲ解スルノ要トス若  
此毒解セザル寸ハ則チ種々ニ變レテ遂ニ終  
身ノ患トナルベキ也、大要ハ紫圓ヲ投シ發テ  
毒根ヲ驅除スベシ、又家ノ勝金湯最モ効ア  
リ、スベテ痘瘡麻疹ノ輕重アルモ、咸此毒ノ多  
少ニヨルモノナリ、凡ソ鶩口瘡ハ初メ舌上或  
ハ齶唇ニ粟粒ノ如キ白疱ヲ生シ、後重クナリ  
テハ米粉ヲ塗リタル如クニナリ、舌強リテ乳



ヲ哺ム<sub>レ</sub>能ハズ<sub>レ</sub>テ、晝夜啼泣スルモノナリ、  
 主方加減清胃散、或涼膈加石膏犀角ヲ用ヒ、氷  
 硼散ヲ舌上ニ塗ルベレ、又丹毒ト稱スルモノ  
 甚急劇ノ症ニシテ、必ズ聲啞スルモノナリ、是  
 症果シテ項背コハバリテ、肩ノツマ<sub>ル</sub>様ニダ  
 リク<sub>ス</sub>ルモノナリ、其處少ク赤黒色ヲ帯グベ  
 シ、俞穴ニ拘ラズ平針ノ類ヲ以テ輕々ニ數十  
 痛刺絡ヲ施シ、煤汁ノ如キ黯黒ノ血多ク出テ  
 其疾愈ユ、其一等劇症ニ至テハ周身定ル處ナ

ク浮越散漫シテ雲ノ如クムラク<sub>ト</sub>見ユル者  
 ナリ、此又俞穴ヲ論セスレテ早ク其處ヲ刺絡  
 シ、飛毒ヲ脱去スベシ、否<sub>ズ</sub>シバ頓ニ死セン<sub>ト</sub>  
 踵ヲ回サ<sub>ル</sub>ベシ、主方黃連解毒加犀角、兼ル  
 ニ紫圓ヲ用ユベシ、又兒ノ臀尻或ハ腋下腐爛  
 スル者、固ヨリ是レ胎毒其處ニ凝著スルナリ、  
 必其部位ニ於テ刺絡シ、毒血ヲ去ベシ、毒血既  
 ニ去テ腐爛自然ニ愈ルモノナリ、又初生ノ兒  
 臍中ヨリ多ク血ノ出ル<sub>ト</sub>有リ、是甚凶惡ノ症



ニシテ動モスレバ難治ニ至ルモノアリ、百藥煎ノ末ヲ貼シテ以テ防禦スベシ、又總身或頭上ニ瘡ヲ發スルノアリ、胎毒肌表ニ發スル也、大ニ吉兆トス、慎テ貼藥ヲ用テ治スヘカラス、若瘡毒内攻セバ間難治ニ至ルノアリ、蓋シ胎毒表ニ發セズシテ内ニ埋伏スル寸ハ、必ズ時時腹痛スル也、コレヲ俗ニ蟲氣ト稱シ、或ハ五疳ト稱ス、此症必ス左ノ臍傍ニ癍塊アルモノナリ、動モスレバ急慢驚風トナリ、或馬脾風トナ

ルベシ、速ニ其毒根ヲ驅除セヨ、若十歳以上ニ至テ、其毒猶サバケカヌル者ハ、漸クニシテ氣鬱ノ症トナリ、總身羸瘦シ疳勞或勞啖ト稱スル症トナリ、終ニ難治ニ至ルモノナリ、十歳未滿ニテ斯毒塊アルヲ識バ、假令其患ルトコロナシト雖、此ヲ除カンヲ要トスベシ、是レ先天ノ遺毒ニシテ即チ瘀血ノ凝結スルナリ、攻撃劑ヲ用テ治ストイヘ厄藥効更ニ無キモノナリ、家方ノ玄機湯方見附錄ヲ荏苒トシテ



一年又二年モ用ユル寸ハ、胎毒自ラ化シテ、總  
 身及ヒ頭部ニ種々ノ瘡ヲ發シ、毒ソレヨリ消  
 散スルコト余ガ經驗ナリ、サテ其毒塊ヲ其儘ニ  
 シ棄置バ小兒ノ頃ハ何事ナクトモ大人トナ  
 リテハ、必ス其毒塊或左或右ノ胸脇ヘサシコ  
 シテ、俗ニ云フ積氣トナリ、其處ニテ膿潰シテ  
 腸癰トナリ、上部ニ蟠結シテ失心狂亂トナリ、  
 肺ニ上迫シテ肺癰トナリ、輕キハ肝積持、重キ  
 ハ癰癩、又喘急、或膈噎、或中風半身不遂、或走馬

牙疳、或齒齦痛、或馬刀瘰癧トナリ、或ハ心下ニ  
 結シ、水ヲ畜ヘテ支飲トナリ、或腰腹ニ蟠結シ  
 テ疝瘕トナリ、痔疾トナリ、陰股ニ發シテ癰瘡  
 トナリ、或ハ足ニ埋伏シテ脚氣トナリ、或ハ臍  
 瘡トナリ、或癰氣ニ觸ル寸ハ蒸氣ト共ニ釀シ  
 テ、便毒魚口下疳、或ハ麻疾トナリ、或總身ニ散  
 漫シテ楊梅瘡、又内ニ蟄伏シテ骨節疼痛トナ  
 ルノ類、是皆外邪ヲ除クノ外、皆此内發病ニシ  
 テ悉ク斯一毒ノ變化ニ曰ルモノナリト知ル



ベシ、是ヲ以テ小兒初生ノ時ニ於テ、勢テ先天  
 固有ノ一毒ノ既ニ肌表ニ見ル者ハ、須ク先ツ  
 其誤スル處ニ於テ數十瘡刺絡シ瘀血ヲ去ル  
 ヲ要トスベシ、若シ初生ニ斯毒未ダ肌表ニ  
 發セズレテ内ニ埋伏スルモノ、如キハ、解毒  
 劑ヲ用テ其瘡毒ヲ却除セヨ、シカラズンバ遂  
 ニ終身ノ患ヲナシ、不起ノ痼疾ヲ生スル基本  
 トナルベキモノナリ、

治驗附

上田村平ハナル者ノ兒、生下十日ニシテ乍チ  
 聲啞シ乳哺セス、平ハ忙テ兒ヲ懷キ來テ治ヲ  
 請フ、診スルニ面色蒼白ニシテ項背ノ四邊隱  
 ヲ然トシテ黯赤色ナリ、余カ曰是レ丹毒ニシ  
 テ最モ急劇ノ症ナリ、即令刺絡シ瘀毒ヲ放散  
 セスンバ死セン、一時ニアリ、平ハ甚ダ刺絡  
 ヲ畏ル、噫良藥苦口忠言逆耳ト令速カニ刺絡  
 セスンバ忽チ死センノ、急ギ趨リテ伴還ル  
 ベシト云、平ハ已テ不得治ヲ請フ、乃チ兒ノ



項背ノ際叢雲ノ如キ處ニ於テ數十痛刺レテ  
 恰モ煤汁ニ似タル黒血ヲ取レバ、欬然トシテ  
 聲ヲ發ス、家方勝金湯兼ルニ紫圓ヲ投ス、翌日  
 来謝シテ曰昨日君ノ救療ニヨリ危急ヲ逃レ  
 タリト、又診視スルニ瘀毒ノ所在少シク下リ  
 テ見ユ、由テ一夕刺絡シ前方ヲ用ユ、其后毒ノ  
 在ル所ヲ逐テ刺絡ヲ施ス、一月餘ニシテ、凝  
 毒悉ク去テ平愈セリ、  
 松前屋某兒、丹毒ヲ患フ、面色黯黒ニシテ、聲啞

シ將ニ死セントス、急ニ刺絡シ瘀血ヲレボリ  
 取テ家方勝金湯回天丸ヲ兼與フ、忽然トシテ  
 蘓生セリ、

賣魚容利三郎兒、生下五六日ニシテ、腋下及臀  
 尻糜爛甚シク、總身渾然トシテ烟霧ノ如シ其  
 毒ノ部位ニ於テ、刺絡ヲ施ス、十日計ニシテ  
 周身血色鮮紅ナリ、後康健ニシテ恙ナシ、

○余嘗テ此遺毒表ニ發シタル症ニ、刺絡ヲ施  
 シ必死ノ兒ヲ救ヒタルヲ數百人ニ逮ヘリ、今



治驗一二月載テ二三子ニ示スノ

產科探頷圖訣卷二終

○余嘗マ此圖志クニ終クニ此圖ニ依ルニ  
胎前產後諸症皆ハ此圖ニ依ルニ  
胎前產後諸症皆ハ此圖ニ依ルニ  
胎前產後諸症皆ハ此圖ニ依ルニ  
胎前產後諸症皆ハ此圖ニ依ルニ  
胎前產後諸症皆ハ此圖ニ依ルニ  
胎前產後諸症皆ハ此圖ニ依ルニ  
胎前產後諸症皆ハ此圖ニ依ルニ  
胎前產後諸症皆ハ此圖ニ依ルニ  
胎前產後諸症皆ハ此圖ニ依ルニ

原

跋

夫業醫者當須安神定志除鄙吝之心發惻隱之心  
以普救含靈之疾苦為心也而精熟方法則不恥為  
醫及此則民賊而已我水原先生夙善產術其性磊  
落不為利回不為義枉若有艱產則不論貧富親踈  
直往救之見彼苦楚若已有之或不如意則激發憤  
厲必反諸己如此二十有餘年有所發明手作三器  
試之於艱產一無所失得之手應之心於是筆三器  
及訣上梓以傳不朽於戲先生之志可謂博大也世



醫得一方一術則死執不放如鄙夫之守錢自秘自  
 珍欲以應無限之病猶張一目之羅以求衆鳥其可  
 得乎今先生得此奇術不敢秘質諸師友傳諸弟子  
 示之於天下使後世免艱產之患先生之舉天下莫  
 不蒙其澤者也然此術有不可以筆舌而傳者庶後  
 之學者當須安神定志以熟此術也

天保乙未七月 駿州田中藩 奥田遜誌

夫胎產者雖乃天然之常理也然苟誤其機則害人

鐵鉤

命也必矣故非洞明其條理者不能任其職矣我水  
 原先生盡心於產術焦思探賾二十有餘年始通天  
 然之常理自作用器屢試之於產難母子俱全矣蓋  
 此術也出於賀川氏之鐵鉤泝為探領睡龍奪珠之  
 妙技矣先生更欲此術之傳於世今茲乙未孟秋手  
 錄圖并訣名曰探領圖訣以示之四方嗚呼偉哉其  
 澤也萬世其免橫夭者知幾許乎冀游此流者常置  
 座右日夜研究朝夕熟練則得洞明其條理而任其  
 職乎余不堪其喜自忘鄙陋以題卷末



天保乙未孟秋日

津國松山保定誌

濟卿先生吾父之執也精產術往在京時過父余每侍茶聞其緒論未幾先生歸故里余悵然者久矣後奉父命訪先生於江之八幡因傍觀施其術皆莫不効先生曾創一器名曰探鑽頃携其器再來京師欲示之同志因有圖訣之著所以為天下後世愚者實深切也雖然器有定形而術無定法語忘敬遺之禍變幻百出不可端倪則必有先生之妙術而知其用

器之活潑余也未弱冠諄二徒聞指誨耳安容議術之果善而今奉事先生于机下後當得進一步敢奉師命記姓名于簡末云謹誌

天保乙未七月言曰巫發渡邊義豐謹誌

二氣妙合以成人其主宰曰造化也固非人力之所得與也婦之有孕即有主宰而存于其間矣若婦而無孕人道或庶乎已傳曰婦無子去良有以也夫滿月分媿無恙天地之常也其於變也有橫有逆術不



得其法則必有坼與副之患也是以先喆之士往往  
焦思以垂訓後世雖然知之難周其術豈遽以為盡  
於斯哉我水原先生從事於斯術二十有餘年矣頗  
有獨得之見凡術之未至者除而改之未備者補而  
足之從而受其業者莫不駭其新奇矣遂為圖及訣  
以示後進古人有言曰圖經也書緯也一經一緯相  
錯而成文圖植物也書動物也一動一植相須而成  
變古之學者有要置圖於左置書於右索象於圖索  
理於書是故有訣無圖則不能活用其器有圖無訣

則何以能知其指歸圖訣相須而明白瞭然矣先生  
之為後進謀也其亦勤矣嗟呼後進之徒能專志致  
心以求其意于圖與訣則起死回生亦何難之有易  
曰精義入神以致用也先生之於業也可謂精義入  
神者矣而施諸向所謂楷者逆者則救之如拾地芥  
耳先生之於術至矣盡矣斯書之行使天下孕者無  
坼副之患則先生之賜後世不亦大乎余不勝欣抃  
同書數言于卷尾時天保六年孟秋念一日也

美濃

塚原厚欽誌



臣聞聖朝設官分職各有司存...  
 臣聞聖朝設官分職各有司存...  
 臣聞聖朝設官分職各有司存...  
 臣聞聖朝設官分職各有司存...  
 臣聞聖朝設官分職各有司存...  
 臣聞聖朝設官分職各有司存...  
 臣聞聖朝設官分職各有司存...  
 臣聞聖朝設官分職各有司存...  
 臣聞聖朝設官分職各有司存...  
 臣聞聖朝設官分職各有司存...

後

夫為國之大者在乎得人...  
 夫為國之大者在乎得人...  
 夫為國之大者在乎得人...  
 夫為國之大者在乎得人...  
 夫為國之大者在乎得人...  
 夫為國之大者在乎得人...  
 夫為國之大者在乎得人...  
 夫為國之大者在乎得人...  
 夫為國之大者在乎得人...  
 夫為國之大者在乎得人...

三才圖會

跋

三才圖會



畫為客為色。強之五年。七少之文。方直  
 授授鼎之。世之。其世之。其世之。其世之。  
 而傳其。其傳其。其傳其。其傳其。其傳其。  
 也。其也。其也。其也。其也。其也。其也。其也。  
 年。其年。其年。其年。其年。其年。其年。其年。  
 長。其長。其長。其長。其長。其長。其長。其長。  
 那。其那。其那。其那。其那。其那。其那。其那。  
 探。其探。其探。其探。其探。其探。其探。其探。

其也。其也。其也。其也。其也。其也。其也。其也。  
 而。其而。其而。其而。其而。其而。其而。其而。  
 曰。其曰。其曰。其曰。其曰。其曰。其曰。其曰。  
 同。其同。其同。其同。其同。其同。其同。其同。  
 其。其其。其其。其其。其其。其其。其其。其其。  
 來。其來。其來。其來。其來。其來。其來。其來。  
 試。其試。其試。其試。其試。其試。其試。其試。  
 不。其不。其不。其不。其不。其不。其不。其不。



意謂此經以不同母所存者其廣此也其如  
法行此法只強教產難之婦能保必死  
之兒也必其以多之當交同之讀為  
類一之以此之不同好也

天保七年丙申秋

備前

弦方推勝歌



水原三折先生著

女科大全驗方醇生菴試驗方 近刻

天保七年丙申夏

皇都

三奈通堀町西

出雲寺文治郎

三奈通高倉西

林喜兵衛

高倉通四奈南

河南四郎兵衛

芝神明前

岡田屋嘉七

江府

加賀屋善藏

浪華

浪華

心齋橋安土町北



定例以終以子同母以存古之原此也其  
法以此而只強教者難之始能原必不  
之也其必其以多之當交同之也其  
類之也其以多之當交同之也其

天保乙未書

備要

弦方推勝歌

東華

心齋藤主理氏

吹貫聖善

三秋

芝軒即前

岡田屋嘉十

天保十平丙申殊

高倉屋四茶南

阿南四郎共齋

皇階

三茶通高倉西

出雲寺文治郎

三茶通高倉西

林喜共齋

女林大全 醇生菴試驗方近刻

天保七年丙申夏

江府

芝神明前

岡田屋嘉七

浪速

心齋橋安土町北

加賀屋善藏

皇都

三茶通高倉西

出雲寺文治郎

林喜兵衛



