





1143

古方治之序

西華書局藏

方技家之祖長沙公者矣  
而中經方和公之子玉石流  
乳漏泄之流止及治方  
急程法必辨之治之始也

西華書局藏

91-1982



日書龍王長沙絕然於世  
持子為也 吾移集陽為也  
寧人不口長沙以在善由東  
海山楊先生此書如云可也  
旨深真方之意皆妙記三抄

一書此在與不此非其書也  
庸云代大西其不傷手刻  
指在解矣家友人在海不西  
犯人也久從東海先生為入室  
弟子也為家古持古方區



可也孰之味其云余孰之  
形也曰政方之味其由矣云  
者之熱淫涼之性則有矣  
酸苦甘之味則有汗也補瀉  
之能也之味其云一按方名

其字之四六國者方之云  
同治之於金樞玉函之云  
如素者注方六一視瞭然不  
多按之冠祥補初學能矣云  
心之觀本為其三彩一



瓶云雷

明和辛卯冬秋

平安堂素靈撰影



古方區別序

醫術之不傳尚矣黃帝與岐伯著  
素靈二經有論而無方皇甫士安  
之甲乙經恃重鍼刺而雜方巢源  
方之病源候論病必有源源必立  
論而無方矣余嘗遊於平安醫官  
山脇東洋先生之門有年于此矣  
先生嘗有言曰素靈二書摭披古



言雜以陰陽道家冒以軒岐者斯  
其重言耳越人長桑君倉公輩僅  
存于子長弄筆已矣誠哉斯言故  
可謂鑿術不傳尚矣至後漢有仲  
景張氏者非競逐榮勢企踵摧豪  
之徒一存心於民生造命耳嘗著  
傷寒論金匱要略論証之詳方劑  
之精汗吐下法煥然如觀火實可

謂傳於鑿術之妙豈不感戴哉而  
傷寒百有七方要畧百五十二方  
其方混淆而倉卒之間難得辨之  
學者恨之故余以國字別之譬諸  
草木區以別矣欲便其觀而以備  
急學者朝暮諷習之則必當起死  
肉骨以為鑿之周鼎云爾

明和辛卯冬十月



西肥本融謹序



*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '融' and '謹']*

古方區別凡例

一諸證有方之證者著之無方之證者除之

一方之首字別以四六國音和

訓從方彙別之方名從漢音

者入國字漢音部從吳音者

入吳音部

仲景之書一傷寒論而已矣



判為要畧者蓋王叔和之所  
為也孫真人王燾所見亦止  
一書而已矣故斯集以傷寒  
論為正以著玉函千金方千  
金翼外臺秘要之異同要畧  
中有傷寒論之方則除之不  
載于方名之數  
一藥品之下省炮炙碎熬破孽

去皮某月某日採之類

本融識





イ

一本作水  
一斗無二  
升  
一本皂莢  
作皂角

古方區別

●以

茵陳蒿湯

茵陳蒿

兩六

梔子

枚十四

大黃

兩二

右三味以水一斗二升先煮茵陳減六升  
內二味煮取三升去滓分三服小使當利  
尿如皂莢汁狀色正赤一宿腹減黃從小  
使去也

西肥本融宗貞輯著

男本彥良子温校

古方區別

古方區別





陽明病發熱汗出者此為熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者此為瘀熱在裏身必發黃者○傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者○穀疸之為病寒熱不食食即頭眩心胸不安久久發黃為穀疸者

一物芡蒂湯

芡蒂二七箇

右剉以水一升煮取五合去滓頓服大陽中暍身熱疼重而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也○芡蒂湯治諸

黃

葶莖湯

葶莖二升

薏苡仁半升

桃仁五十枚

瓜瓣半升

右四味以水一斗先煮葶莖得五升去滓內諸藥煮取二升服一升再服當吐如膿治欬有微熱煩滿胸中甲錯是為肺癰者

己椒藶黃丸

防己 椒目 葶藶

大黃各一兩

右四味末之蜜丸如梧子大先食飲服一丸日三服稍增口中有津液渴者加芒硝

千金中作心

千金湯之上止字

イ



一本茵  
陳湯及  
五苓散  
並主之

半兩

腹滿口舌乾燥此腸間有水氣者

茵陳五苓散

茵陳蒿末

五苓散

右二物先食飲方寸匕日三服

黃疸病者

● 呂

狼牙湯

狼牙  
兩三

右一味以水四升煮取半升以綿纏筋如

繭浸湯瀝陰中日四遍

火陰脈滑而數者陰中即生瘡陰中蝕瘡

爛者狼牙湯洗之

口

古方匯別

三



波

白虎加人參湯

知母兩六

石膏斤一

甘艸兩二

粳米合六

人參兩三

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓温服一升日三服服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者○傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏但熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者○傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者○傷寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白虎湯

五國白虎  
加人參湯  
作白虎湯

渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之  
○渴欲飲水口乾舌燥者○大陽中熱者  
喝是也汗出惡寒身熱而渴者

白散

桔梗分三

巴豆分一

貝母分三

右三味為散內巴豆更於臼中杵之以白飲和服強人半錢七羸者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一杯利過不止進冷粥一杯  
治欬而胸滿振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者○病在陽應

融按為  
肺癰  
外臺米  
粥作粳  
米粥



以汗解之反以冷水濕之其熱被劫不得  
去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴  
者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結  
胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可  
服

半夏瀉心湯

半夏半升

黃芩

乾姜

人參

甘艸

各三兩

黃連

一兩

大棗

十三枚

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取  
三升溫服一升日三服

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而

以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯  
此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱  
汗出而解若心下滿而鞭痛者此為結胸  
也太陷胸湯主之但滿而不痛者此為痞  
柴胡不中與之宜半夏瀉心湯○嘔而腸  
鳴心下痞者

白虎湯

知母

六兩

石膏

一斤

甘艸

二兩

粳米

六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服  
一升日三服



傷寒脉浮滑此以表有熱裏有寒玉函作裏寒者  
白通湯○三陽合病腹滿身重難以轉側  
口不仁面垢讞語遺尿發汗則讞語下之  
則額上生汗手足逆冷若自汗出者○傷  
寒脉滑而厥者裏有熱

半夏散

及湯主之

半夏

桂枝

甘艸

右三味等分各別擣篩已合治之白飲和  
服方寸七日三服若不能散服者以水一  
升煎七沸內散兩方寸七更煮三沸下火  
令小冷少少嚥之半夏有毒不當散服

少陰病咽中痛者

白朮附子湯

白朮

附子

一枚

甘艸

生薑

一兩

大棗

六枚

右五味以水三升煮取一升去滓分温三  
服一服覺身痺半日許再服三服都盡其  
人如冒狀勿怪卽是朮附並走皮中逐水  
氣未得除故耳

礬石湯

凡石

右一味以漿水一斗五升煎三五沸浸腳



治脚氣冲心

八味丸 崔氏

乾地黄 八兩

山茱萸

著蒨 各四兩

桂枝 一兩

澤瀉 茯苓

牡丹皮 各三兩

附子 一兩

右八味末之煉蜜和丸梧子大酒下十五

丸日再服

脚氣上入小腹不仁○虛勞腰痛少腹拘

急小便不利者○夫短氣有微飲當從小

便去之桂苓朮甘湯主之八味丸亦主之

○男子消渴小便反多以飲一斗小便一

斗者○問曰婦人病飲食如故煩熱不得

卧而反倚息者何也師曰此名轉胞不得

溺也以胞系了戾故致此病但利小便則

愈者○男子消渴小便反多以飲一斗小

便一斗腎氣丸主之脉浮小便不利微熱

消渴者宜利小便發汗五苓散主之

麥門冬湯

麥門冬 七升

半夏 一升

人參 二兩

甘草 二兩

粳米 三合

大棗 十二枚

右六味以水一斗二升煮取六升温服一

升日三夜一服



大或作

逆上氣咽喉不利止逆下氣者

半夏麻黃丸

半夏麻黃等分

右二味末之煉蜜和丸小豆大飲服三丸

日三

心下悸者

栝葉湯

栝葉

乾姜

各三兩

艾

把三

右三味以水五升取馬通汁一升合煮取

一升分溫再服

吐血不止者

半夏乾姜散

半夏乾姜等分

右二味杵為散取方寸匕漿水一升半煎

取七合頓服之

乾嘔吐逆吐涎沫者

白頭翁湯

白頭翁

二兩

黃連

黃栢

棗皮

各三兩

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一

升不愈更服一升

熱痢下重者○下利欲飲水者以有熱故

也

排膿散

枳實

十六枚

芍藥

六分

桔梗

二分



右三味杵為散取雞子黃一枚以藥散與雞黃相等揉和合相得飲和服之日一服

排膿湯 甘艸兩二 桔梗兩三 生姜兩一

大棗枚十

右四味以水三升煮取一升溫服五合日再服

白朮散 白朮各二 川芎各二 蜀椒分三

牡蠣分二

右四味杵為散酒服一錢七日三服夜一服但苦痛加芍藥心下毒痛倍加芎藭心

煩吐痛不能食飲加細辛一兩半夏大者二十枚服之後更以醋漿水服之若嘔以醋漿水服之復不解者小麥汁服之已後渴者大麥粥服之病雖愈服之勿置中 妊娠養胎者

白頭翁加甘艸阿膠湯 白頭翁 甘艸

阿膠各二 秦皮 黃連 栝皮各三

右六味以水七升煮取二升半內膠令消盡分溫三服 產後下利虛極者



千金治胸滿心下堅如中帖之肉有之不出吞之不下

半夏厚朴湯

茯苓兩四

生姜兩五

紫蘇兩二

半夏升一

厚朴兩三

右五味以水七升煮取四升分温四服日

三夜一服

婦人咽中如有炙轆者

礬石丸

礬石分三

杏仁分一

右二味末之煉蜜和丸棗核大內藏中劇者再內之

婦人經水閉不利藏堅癖不止中有乾血

下白物者

融按白通加猪膽湯有人尿白通湯當關人尿

白通湯

葱白莖四

乾姜兩一

附子枚一

右三味以水三升煮取一升去滓分温再服

少陰病下利者

白通加猪膽湯

葱白莖四

乾姜兩一

附子枚一

人尿合五

猪膽汁合一

右五味以水三升煮取一升去滓內膽汁

人尿和令相得分温再服若無膽亦可用

少陰病下利脉微者與白通湯利不止厥

逆無脉乾嘔煩者白通加猪膽汁湯主之

玉函作無膽亦可

古方集



一云五味  
以水一斗  
煮米熟  
湯成太  
滓温服  
一升日  
三服

服湯脉暴出者或微續者生  
白虎加桂枝湯

於白虎湯之內加桂枝三兩右剉每五莖  
水一盞半煎至八分太滓温服汗出即愈  
温瘧者其脉如平身無寒但熱骨節疼煩  
時嘔者

百合雞子湯

百合七枚 雞子黃一枚

右先以水洗百合漬一宿當白沫出太其  
水更以泉水二升煎取一升去滓內雞子  
黃攪勻煎五分温服

百合病吐之後者

百合地黃湯

百合七枚 生地黃汁一升

右以水洗百合漬一宿當白沫出太其水  
更以泉水二升煎取一升去滓內地黃汁  
煎取一升五合分温再服中病勿更服大  
便當如漆

百合病不經吐下發汗病形如初者

百合洗方

右以百合一升以水一斗漬之一宿以洗  
身洗已食煮餅勿以鹽豉也



百合病一月不解變成渴者

百合滑石散

百合一兩滑石三兩

右為散飲服方寸七日三服當微利者止

服熱則除

百合病變發熱者

●仁

即理中丸藥味

人參湯

人參 甘艸 乾姜 白朮各三兩

右四味以水八升煮取三升溫服一升日

三服

胸痹心中痞留氣結在胸脅滿脇下逆搶心枳實薤白桂枝湯主之人參湯亦主之



保

防己黃芪湯

防己一兩

甘艸半兩

白朮七錢半

黃芪一分兩

右剉麻豆大每杪五錢匕生姜四片大棗一枚水盞半煎八分去滓溫服良久再服喘者加麻黃半兩胃中不和者加芍藥三分氣上衝者加桂枝三分下有陳寒者加細辛三分服後當如出行皮中從腰下如冰後坐被上又以一被繞腰以下溫令微汗差

木

風濕脉浮身重汗出惡風者○風水脉浮為在表其人或頭汗出表無他病病者但下重從腰以上為和從腰以下當腫及陰難以屈伸者

防己地黃湯

防己一錢

桂枝三錢

防風三錢 甘艸一錢

右四味以酒一盃漬之一宿絞取汁生地黃二斤咬咀蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞地黃汁和分再服病如狂反妄行獨語不休無寒熱其脉浮



者

奔豚湯

甘艸

芎藭

當歸

各二兩

半夏

四兩

生葛

五兩

黃芩

二兩

芍藥

二兩

生姜

四兩

甘李根白皮

一升

右九味以水二斗煮取五升溫服一升日

三夜一服

奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱者

蒲灰散

蒲灰

七分

滑石

二分

右二味杵為散飲服方寸匕日三服

小便不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓

千金蒲灰作蒲黃

戎鹽湯並主之○厥而皮水者

防己茯苓湯

防己

三兩

黃芪

三兩

桂枝

三兩

茯苓

六兩

甘艸

二兩

右五味以水六升煮取二升分溫三服

皮水為病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶

聶動者

牡蠣湯

牡蠣

四兩

麻黃

四兩

甘艸

二兩

蜀漆

三兩

右四味以水八升先煮蜀漆麻黃去沫得六升存諸藥煮取二升溫服一升若吐

木



則勿更服

治牡瘰

牡蠣澤瀉散

牡蠣

澤瀉

蜀漆

葶藶子

商陸根

海藻

枯藁根各等分

右七味異擣下篩為散更於臼中治之白飲和服方寸匕日三服小便利止後服大病差後從腰以下有水氣者

• 土

當歸生姜羊肉湯

當歸

三兩

生姜

五兩

羊肉一斤

右三味以水八升煮取三升溫服七合日三服若寒多者加生姜成一斤痛多而嘔者加橘皮二兩白朮一兩加生姜者亦加水五升煮取三升二合服之  
寒疝腹中痛及脇痛裏急者○產後腹中疼痛當歸生姜羊肉湯主之并治腹中寒疝虛勞不足



當歸芍藥散

當歸 三兩

芍藥 一斤

茯苓 四兩

白朮 四兩

澤瀉 一斤半

芎藭 一斤半

右六味杵為散取方寸匕酒和日三服  
婦人懷娠腹中疝痛者○婦人腹中諸疾  
痛者

當歸貝母苦參丸

當歸 貝母

苦參 各四兩

男子加滑石半兩

右三味末之煉蜜丸如小豆大飲服三丸  
加至十丸  
妊婦小使難飲食如故者

當歸散

當歸

黃芩

芍藥

芎藭 各一斤

白朮 一斤半

右五味杵為散酒飲服方寸匕日再服妊  
娠常服即易產胎無苦疾

婦人妊娠宜常服

土瓜根散

土瓜根

芍藥

桂枝

麝香 各三分

右四味杵為散酒服方寸匕日三服  
帶下經水不利少腹滿痛經一月再見者  
陰癰腫亦主之



當歸四通湯

芍藥三兩 細辛三兩 甘艸三兩 通草各二兩  
大棗二十五枚 法十二枚

右七味以水八升煮取三升太滓溫服一升日三服

手足厥寒脈細欲絕者

當歸四逆加吳茱萸生姜湯

芍藥各三兩 甘艸二兩 通草二兩 當歸  
細辛三兩 生姜半斤 吳茱萸二升  
大棗二十五枚 桂枝三兩

一本作  
水酒各  
四升

右九味以水六升清酒六升和煮取五升太滓溫分五服

若其人內有久寒者

當歸建中湯

芍藥六兩 生姜三兩 甘艸二兩 大棗十三枚  
當歸四兩 桂枝三兩

右六味以水一斗煮取三升分溫三服一日令盡若大虛加飴糖六兩湯成內之於火上煖令飴消若太血過多崩傷內衄不止加地黃六兩阿膠二兩合八味湯成內阿膠若無當歸以芍藥代之若無生姜以

古方編

七



乾姜代之  
 千金內補當歸建中湯治婦人產後虛羸  
 不足腹中刺痛不止吸吸少氣或若少腹  
 中急摩痛引腰背不能食飲產後一月日  
 得服四五劑為善令人強壯

*此方治婦人產後虛羸... 當歸建中湯... 治婦人產後虛羸... 不足腹中刺痛... 中急摩痛... 得服四五劑...*

子

玉函無  
 發汗下  
 之九字  
 玉函無  
 慄山之  
 二字無  
 脈之字  
 下之而  
 解下有  
 汗之宜

●知

調胃承氣湯

大黃四兩

甘艸二兩

芒硝半升

右三味以水三升煮取一升去滓內芒硝  
 更上火微煮令沸少少溫服  
 發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實  
 也當和胃氣○太陽病未解脈陰陽俱停  
 必先振慄汗出而解但陽脈微者先汗出  
 解但陰脈微者下之而解若欲下之○傷  
 寒十三日過經讖語者以有熱也當以湯

行經

散



桂枝湯  
下之宜  
承氣湯

玉函若  
自下利  
作自利

玉函無  
柴胡二  
字

下之若小便利者大便當鞭而反下利脉  
調和者知醫以丸藥下之非其治也若自  
下利者脉當微厥今反和者此為內實也  
○大陽過經十餘日心下溫溫欲吐而胃  
中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩先此時  
自極吐下者與調胃承氣湯若不爾者不  
可與但欲嘔胃中痛微溏者此非柴胡證  
以嘔故知極吐下也○陽明病不吐不下  
心煩者○傷寒吐後腹脹滿者○大陽三  
日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也○傷寒

脉浮自汗出小便利數心煩微惡寒脚攣急  
反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥  
咽中乾煩躁吐逆者作甘艸乾薑湯與之  
以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草  
湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少  
與調胃承氣湯若重發汗復加燒針者四  
逆湯主之

猪苓湯

猪苓

茯苓

澤瀉

阿膠

滑石 各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓

子



內阿膠烱消溫服七合日三服

脈浮發熱渴欲飲水小便不利者○陽明

病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多

胃中燥猪苓湯復利其小使故也○小陰

病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者

猪膽汁導

大猪膽一枚

瀉汁和少許法醋以灌壳道內如一食頃

當大便出宿食惡物甚効

猪膚湯

猪膚一斤

右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜

一升白粉五合熬香和令相得溫分六服

少陰病下利咽痛胃滿心煩者

猪膏髮煎

猪膏斤半

亂髮如雞子大三枚

右二味和膏中煎之髮消藥成分再服病

從小使出諸黃前方主之

胃氣下泄陰吹而正噎此穀氣之實也

猪苓散

猪苓 茯苓

白朮

各等分

右三味杵為散飲服方寸匕日三服

嘔吐而病在隔上後思水者解急與之思

水者

子



蜘蛛散 蜘蛛十四枚 桂枝兩半  
 右二味為散取八分一匕飲和服日再服  
 蜜丸亦可

陰狐疝氣者偏有小大時時上下者

竹葉湯 竹葉一把 葛根兩三 防風

桔梗 桂枝 人參 甘艸各一兩

附子一枚 大棗十五枚 生姜兩五

右十味以水一斗煮取二升半分溫三服  
 溫覆使汗出頸項強用大附子一枚破之  
 如豆入前藥揚去沫嘔者加半夏半升洗

產後中風發熱面正赤喘而頭痛者

竹皮大丸 生竹茹二分 石膏二分

桂枝一分 甘艸七分 白薇一分

右五味末之棗肉和丸彈子大以飲服一  
 丸日三夜二服有熱者倍白薇煩喘者加  
 栝實一分

婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣者

竹葉石膏湯 竹葉二把 石膏一斤

半夏半升 麥門冬一升 人參兩二

甘艸兩二 粳米半升

+



右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米  
煮米熟湯成去米溫服一升日三服  
傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者

●利

理中丸

人參

乾姜

甘艸

白朮

各三兩

右四味擣篩蜜和爲丸如雞子黃許大以  
沸湯數合和一丸研碎溫服之日三服夜  
二服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯  
法以四物依兩數切用水八升煮取三升  
去滓溫服一升日三服若臍上築者腎氣  
動也去朮加桂四兩吐多者去朮加生姜  
三兩下多者還用朮悸者加茯苓二兩渴  
欲得水者加朮足前成四兩半腹中痛者



加人參足前成四兩半寒者加乾姜足前  
成四兩半腹滿者太亦加附子一枚服湯  
後如食頃飲熱粥一升許微自溫勿發揭  
衣被  
大病差後喜唾久不了了胃上有寒當以  
丸藥溫之○霍亂頭痛發熱身疼痛熱多  
欲飲水者五苓散主之寒多不用水者理  
中丸主之

●遠

黃芩湯

黃芩三兩

芍藥

甘艸各二兩

大棗

十二枚

右四味以水一斗煮取三升太滓溫服一  
升日再夜一服

大陽與小陽合病自下利者與黃芩湯若  
嘔者黃芩加半夏生姜湯主之○傷寒脉  
遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脉遲爲  
寒今與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不  
能食今反能食此名除中必死



黃芩加半夏生姜湯

甘艸兩二 大棗枚十二 半夏升半 芍藥兩三  
生薑兩四 黃芩兩三

右六味以水一斗煮取三升去滓溫服一  
升日再夜一服

乾嘔而利者

黃連湯 黃連 甘艸 乾姜 桂枝各兩

人參兩二 半夏升半 大棗枚十二

右七味以水一斗煮取六升去滓溫服一  
升日三夜二

傷寒胃中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔

吐者

黃連阿膠湯 黃連兩四 黃芩兩二

芍藥兩二 雞子黃枚二 阿膠兩三

右五味以水六升先煮三物取二升去滓  
內膠烱盡小冷內雞子黃攪令相得溫服

七合日三服

少陰病得之二三日以上心中煩不得臥  
者

雄黃薰方 雄黃



雄黃之  
下一有  
散字

一方有  
人參

右一味為末筒瓦二枚合之燒向肛熏之  
蝕於肛者雄黃熏之出狐  
惑門  
黃芪桂枝五物湯 黃芪 芍藥

桂枝各三  
兩 生姜六  
兩 大棗十二  
枚  
右五味以水六升煮取二升溫服七合日  
三服

問曰血痺病從何得之師曰夫尊榮人骨  
弱肌膚盛重因疲勞汗出臥不時動搖加  
被微風遂得之但以脉自微澹在寸口關  
上小緊宜鍼引陽氣令脉和緊去則愈○

斗

藥一作  
藥

血痺陰陽但微寸口關上微尺中小緊外  
證身體不仁如風痺狀者

黃芪桂枝酒湯

黃芪五  
兩

芍藥三  
兩

桂枝三  
兩

右三味以苦酒一升水七升相和煮取三  
升溫服一升當心煩服至六七日乃解若  
心煩不止者以苦酒阻故也  
問曰黃汗之為病身體腫發熱汗出而渴  
狀如風水汗沾衣色正黃如藥汁脉自沈  
何從得之師曰以汗出入水中浴水從汗



孔入得之

黃土湯

亦主吐血

甘艸

乾地黄

白朮

附子

阿膠

黃芩

各三兩

竈中黃土半升

右七味以水八升煮取三升分温二服下血先便後血此遠血也

黃芩湯

外臺

黃芩

人參

乾姜

各三兩

桂枝

一兩

大棗

十二枚

半夏

半斤

右六味以水七升煮取三升温分三服乾嘔下利者

黃芪建中湯

於小建中湯內加黃芪

一兩半

餘依上法氣

短胸滿者加生姜腹滿者去棗加茯苓

一兩半

及療肺虛損不足補氣加半夏

三兩

虛勞裏急諸不足者

千金療男女因積冷氣滯或大病後不復

常苦四肢沈重骨肉痠疼吸吸少氣行動

喘乏胃滿氣急腰背強痛心中虛悸咽乾

唇燥面體少色或飲食無味脇助腹脹頭

重不舉多臥少起甚者積年輕者百日漸

致瘦弱五藏氣竭則難可復常六脉俱不

融按補疑痞



足虛寒之氣少腹拘急羸瘠百病名曰黃  
莖建中湯又有人參二兩

王不留行散

王不留行

分十 蒴藿細葉 分十

桑東南根

分十

甘艸

分十

川椒

分三

黃芩

乾姜

芍藥

厚朴

分各二

右九味桑根皮以上三味燒灰存性勿令  
灰過各別杵篩合治之為散服方寸匕小  
瘡即粉之大瘡但服之產後亦可服如風  
寒桑東根勿取之前三物皆陰乾百日  
病金瘡中藏內

溫經湯

吳茱萸

兩三

當歸

芎藭

芍藥

人參

桂枝

阿膠

牡丹皮

生姜

甘艸

各二兩

半夏

升半

麥門冬

升一

右十二味以水一斗煮取三升分溫三服  
問曰婦人年五十所病下利數十日不止  
暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱唇口  
乾燥何也師曰此病屬帶下何以故曾經  
半產瘀血在少腹不去何以知之其證唇  
口乾燥故知之當以溫經湯主之○亦主



婦人少腹寒久不受胎兼治崩中衄血或  
月水來過多及至期不來者

●加

甘艸乾姜湯

甘艸四兩 乾姜二兩

右二味以水三升煮取一升五合去滓分  
溫再服

肺痿吐涎沫而不咳者其人不渴必遺尿  
小便數所以然者以上虛不能制下故也  
此為肺中冷必眩多涎唾甘艸乾姜湯以  
溫之若服湯已渴者屬消渴○傷寒脉浮  
自汗出小便數心煩微惡寒腳攣急反與  
桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中



乾煩躁吐逆者作甘艸乾姜湯與之以復其陽若厥愈足温者更作芍藥甘艸湯與之其脚卽伸若胃氣不和譏語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒針者四逆湯主之

葛根湯

葛根四兩 麻黃二兩 生薑各二兩

桂枝兩 甘艸各二兩 芍藥二兩 大棗十三枚

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二升甘太白沫內諸藥煮取三升去滓温服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法

大陽病項背強几几無汗惡風者○大陽病項背強几几反汗出惡風者○大陽與陽明合病者必自下痢○大陽病無汗而小使反少氣上衝曾口噤不得語欲作剛瘕

葛根加半夏湯

於葛根湯方中加半夏半升煎法同于葛根湯

大陽與陽明合病不下利但嘔者

葛根黃芩黃連湯 葛根半斤 甘艸二兩

一本升作斤



黃芩 黃連 各三兩

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取二升太滓分溫再服

大陽病桂枝證醫反下之利遂不止脉促者表未解也喘而汗出者

乾姜 附子湯 乾姜一兩 附子一枚

右二味以水三升煮取一升太滓頓服

下之後復發汗晝日煩燥不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沈微身無大熱者

乾姜 人參 半夏丸 乾姜 人參 各一兩

半夏 二兩

右三味末之以生姜汁糊為丸如梧子大飲服十丸日三服

妊娠嘔吐不止○發汗後腹脹滿者

甘艸瀉心湯 甘艸四兩 黃芩 乾姜 各三兩

半夏 半升 大棗 十二枚 黃連 一兩

右六味以水一斗煮取六升太滓再煎取三升溫服一升日三服

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行壳不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心

要畧有  
人參三  
兩千金  
外臺同

力

左方區別

三



煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也○狐惑之為病狀如傷寒默默欲眠目不得閉臥起不安蝕於喉為惑蝕於陰為狐不欲飲食惡聞食臭其面目乍赤乍黑乍白蝕於上部則聲喝

甘草附子湯

甘草 兩二

附子 枚二

白朮 兩二

桂枝 兩四

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服

風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者

甘草湯

甘草 兩二

右一味以水三升煮取一升半去滓溫服七合日二服

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差與桔梗湯

甘草乾姜茯苓白朮湯

甘草

白朮

各三兩

乾姜

茯苓

各四兩



千金  
甘遂三枚  
半夏三枚  
水一升煮  
取半升  
芍藥三枚  
甘艸二枚  
指大  
水一升煮  
取半升  
右四味以  
蜜半升  
內二藥汁合得二升半煎取八合頓服之

右四味以水五升煮取三升分溫三服腰  
中即溫  
腎著之病其人身體重腰中冷如坐水中  
形如水狀反不渴小便自利飲食如故病  
屬下焦身勞汗出衣裡冷濕久久得之腰  
以下冷痛腹重如帶五千錢  
甘遂半夏湯  
甘遂三枚  
半夏十二枚  
芍藥五枚  
甘艸一枚  
指大  
右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半  
升和藥汁煎取八合頓服之

病者脈伏其人欲自利利反快雖利心下  
續堅滿此為留飲欲去故也

甘艸麻黃湯  
甘艸兩  
麻黃四兩

右二味以水五升先煮麻黃去上沫內甘  
艸煮取三升溫服一升重覆汗出不汗再  
服慎風寒

裏水越婢如朮湯主之甘艸麻黃湯亦主  
之

訶梨勒散  
訶梨勒十枚  
右一味為散粥飲和頓服

力



古方匯別

氣利

甘艸粉蜜湯

甘艸 兩二

粉 兩一

蜜 兩四

右三味以水三升先煮甘艸取二升去滓內粉蜜攪令和煎如薄粥溫服一升差即止

虺蟲之為病令人吐涎心痛發作有時毒藥不止

乾姜人參半夏丸

乾姜 兩一

人參 兩一

半夏 兩二

右三味末之以生姜汁糊為丸如梧子大

飲服十丸日三服食人口咽如骨

姪娠嘔吐不止 寒本自寒下因熱吐下

甘艸小麥大棗湯

甘艸 兩三

小麥 升一

大棗 枚十

右三味以水六升煮取三升分溫三服亦補脾氣

婦人藏躁喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸

紅藍花酒

紅藍花 兩一

右一味以酒一大升煎減半頓服一半未

力

古方匯別

三三



止再服  
婦人六十二種風及腹中血氣刺痛紅藍  
花酒主之

乾姜黃芩黃連人參湯

黃連 人參

各三兩

右四味以水六升煮取二升去滓分温再服

傷寒四五日腹中痛若轉氣下越少腹者此欲自利也傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐者

成本復吐下之  
作復吐之

● 與

薏苡附子敗醬散 薏苡仁十分 附子二分

敗醬五分

右三味杵為末取方寸匕以水二升煎減

半頓服小便可下

腸癰之為病其身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無積聚身無熱脈數此為腸內有癰膿

薏苡附子散 薏苡仁十五兩 大附子十枚

右二味杵為散服方寸匕日三服

3

古方集

三五







乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之○  
病溢飲者當發其汗大青龍湯主之小青  
龍湯亦主之

大柴胡湯

柴胡半斤

黃芩

芍藥

各三兩

半夏半升

生姜五兩

枳實四枚

大棗十三枚

大黃二兩

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再  
煎溫服一升日三服

太陽病過經十餘日反二三下之後四五  
日柴胡證仍在者先與小柴胡嘔不止心

翼心下  
急下有  
嘔止小  
安玉函  
同  
心中一  
作心下

下急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡湯  
下之則愈○傷寒發熱汗出不解心中痞  
鞭嘔吐而下痢者○按之心下滿痛者此  
為實也當下之○傷寒十餘日熱結在裏  
復往來寒熱者與大柴胡湯但結胃無大  
熱者此為水結在胃脇也但頭微汗出者  
大陷胷湯主之

桃核承氣湯

桃仁五十箇

大黃四兩

桂枝

甘艸

芫硝

各二兩

右五味以水七升煮取二升半去滓內芫

4



硝礬上火微沸下火先食溫服五合日三服當微利

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解其外外解已但少腹急結者乃可攻之

玉函丸作圖

大陷胃丸

杏仁各半

大黃半

葶藶子

芒硝

右四味搗篩二味內杏仁芒硝合研如脂和散取如彈丸一枚別搗甘遂末一錢匕白蜜二合水二升煮取一升溫頓服之一

一本反下之作汗出

宿乃下如不下更服取下為效病發於陽而反下之熱入因作結胃病發於陰而反下之因作痞也所以成結胃者以下之太早故也結胃者頂亦強如柔痙狀下之則和

太陷胃湯

大黃六兩

芒硝一升

甘遂一錢匕

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服太陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱

夕

古方匯別

三七



至其脈沈而  
緊作其  
脈浮緊  
石鞭作  
石堅

動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出  
而反惡寒者表未解也醫反下之動數變  
遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁  
煩心中懊憹陽氣內陷心下因鞭則為結  
胃太陷胃湯主之若不結胃但頭汗出餘  
處無汗劑頸而還小便不利身必發黃○  
傷寒六七日結胃熱實脈沈而緊心下痛  
按之石鞭者○傷寒十餘日熱結在裡復  
往來寒熱者與大柴胡湯但結胃無大熱  
者此為水結在胃脇也但頭微汗出者○

太陽病重發汗而復下之不大便五六七  
日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下  
至小腹鞭滿而痛不可近者○傷寒五六  
日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下  
之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下  
之不為逆必蒸蒸而振卻發熱汗出而解  
若心下滿而鞭痛者此為結胃也大陷胃  
湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中  
與之宜半夏瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

大黃

二兩

黃連

一兩

夕

古方集

三



融按瀉  
心湯有  
黃芩而  
煎法齟  
齟又附  
子瀉心  
湯有黃  
芩疑此  
關黃芩  
歟

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓  
分温再服  
心下痞按之濡其脈關上浮者○傷寒大  
下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不  
可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜  
桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯  
大承氣湯  
芒硝三合  
大黃四兩  
厚朴半斤  
枳實五枚  
右四味以水一斗先煮二物取五升去滓  
內大黃更煮取二升去滓內芒硝更上微

7

火一兩沸分温再服得下餘勿服  
陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重  
短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻  
裏也手足濇然汗出者此大便已鞭也大  
承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未  
解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿  
不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令至  
大泄下○陽明病潮熱大便微鞭者可與  
大承氣湯不鞭者不可與之若不大便六  
七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯

行方

三十九



湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞭後必澹不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞭而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也○傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脈弦者生瀉者或微者但發熱譫語者大承氣湯主之若

四時正氣圖

一服利則止後服○問曰人病有宿食何以別之師曰寸口脈浮而大按之反瀋尺中亦微而瀋故知有宿食○脈數而滑者實此有宿食下之愈○陽明病譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞭耳○汗出譫語者以有燥屎在胃中此為風也須下者過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之愈○二陽併病太陽證罷但發潮熱手足熱熱汗出大便鞭而譫語者下之則

實字下當有也  
字  
下字上  
或右當  
字

古方匯別

四

7



冒一作  
息

愈○陽明病下之心中懊懣而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞭後必澹不可攻之若有燥屎者○病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脈實者宜下之脈浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯○大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也○病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎也○得病二三日脈弱無太陽柴胡

一本受  
食作大  
便

4

證煩躁心下鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不受食但初頭鞭後必澹未定成鞭攻之必澹須小便利屎定鞭乃可攻之宜大承氣湯○傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此為實也急下之○陽明病發熱汗多者急下之○陽明少陽合病必下利其脈不負者為順也負者失也互相剋賊名為負也脈滑而數

白虎湯

聖



者有宿食也當下之○腹滿不減減不足  
言當下之○少陰病得之二三日口燥咽  
乾者急下之○少陰病自利清水色純青  
心下必痛口乾燥者可下之○少陰病六  
七日腹脹不大便者急下之○瘧爲病胃  
滿口禁臥不着席脚攣急必斷齒○脈數  
而滑者實此有宿食下之愈○下利不飲  
食者有宿食也可下之○下利三部脈皆  
平按之心下堅者急下之○下利脈遲而  
滑者實也利未欲止急下之○下利脈反

滑者當有所去下乃愈○下利已差至其  
年月日時復發者以病不盡故也當下之  
○病解能食七八日更發熱者此爲胃實  
○產後七八日無太陽證少腹堅痛此惡  
露不盡大便煩躁發熱切脈微實再倍發  
熱日晡時煩躁者不食食則譫語至夜卽  
愈宜大承氣湯主之熱在裏結在胸臍也  
○發汗不解腹滿痛者急下之

桃花湯

赤石脂

一斤

乾姜

一斤

粳米

一斤

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七



合內赤石脂末方寸七日三服若一服愈  
 餘勿服  
 少陰病二三日至四五日腹痛小便不利  
 下利不止便膿血者○少陰病下利便膿  
 血者

大黃廩虫丸

大黃分十 黃芩兩二

甘艸兩三

桃仁升一

杏仁升一

芍藥兩四

乾漆兩一

蟲虫升一

水蛭枚百

蟻蠶升一

廩虫升半

乾地黄兩十

右十二味末之煉蜜為丸小豆大酒飲服

五丸日三服

五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷  
 飲傷房室傷饑傷勞傷經絡榮衛氣傷內  
 有乾血肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛

澤漆湯

半夏升半

紫參兩五

澤漆升三

生姜

白前兩各五

甘艸

黃芩

人參

桂枝兩各三

右九味咬咀內澤漆汁中煮取五升溫服

五合至夜盡

咳而脈沈者

大建中湯

蜀椒合二

乾姜兩四

人參兩二

又



千金曰冷心方  
胃中大寒痛  
嘔不能飲食  
飲食不化  
食下咽  
自下偏  
從一知面  
下有色  
決夕然  
苦腹中  
寒氣上  
衝皮起  
出見有  
頭足上  
下而痛  
其頭不  
可觸近

右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴  
一升微火煎取一升半分温再服如一炊  
頃可飲粥二升後更服當一日食糜温覆  
之

心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝  
皮起出見有頭足上下痛而不可觸近

大黃附子湯

大黃<sub>兩三</sub> 附子<sub>枚三</sub>

細辛<sub>兩二</sub>

右三味以水五升煮取二升分温三服若  
強人煮取二升半分温三服後如人行四

五里進一服

脇下偏痛發熱其脈緊弦此寒也以温藥  
下之

澤瀉湯

澤瀉<sub>兩五</sub> 白朮<sub>兩二</sub>

右二味以水二升煮取一升分温再服  
心下有支飲其人苦冒眩

大黃滑石湯

大黃 黃蘗 滑石<sub>各四兩</sub>

梔子<sub>枚十五</sub>

右四味以水六升煮取三升去滓內滑石  
更煮取一升頓服

諸本作  
大黃消  
石湯下  
滑字盡  
作消字



千金云  
治胃反  
不受食  
食入即  
多吐外  
甚云治  
嘔心下  
痞鞭者  
外臺治  
吐水

黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此為表  
和裏實當下之

大半夏湯

半夏

二升

人參

三兩

白蜜

一升

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十遍煮取二升半溫服一升餘分再服  
胃反嘔吐者

大黃甘艸湯

大黃

四兩

甘艸

一兩

右二味以水三升煮取一升分溫再服  
食已即吐者

大黃牡丹湯

大黃

四兩

牡丹

一兩

千金方  
作此子  
一升芒  
硝二兩

桃仁

五十

瓜子

半升

芒硝

三合

右五味以水六升煮取一升去滓內芒硝再煎沸頓服之有膿當下如無膿當下血腸癰者小腹腫痞按之即痛如麻小便自調時時發熱自汗出復惡寒其脈遲緊者膿未成可下之當有血脈洪數者膿已成不可下也

大黃甘遂湯

大黃

四兩

甘遂

二兩

阿膠 二兩  
右三味以水三升煮取一升頓服之其血

千金方  
再服  
下無  
血



外科正  
宗瓜子  
作白茶  
外臺有  
異同名  
大黃湯  
或一本  
瓜子有  
瓜葉仁  
考者參

當下

婦人小腹滿如敦狀小便微難而不渴生  
後者此為水與血但結在血室也

大猪膽方

大猪膽一枚瀉汁和少許法醋以灌穀道  
內如一食頃當大便出宿食惡物甚效  
陽明病自汗出若發汗小便自利者此為  
津液內竭雖鞭不可攻之當須自欲大便  
宜蜜煎導而通之若土瓜根及大猪膽汁  
皆可為導

獺肝散

肘後方

獺肝一具炙乾末之水服方寸七日三服  
治冷勞又主鬼疰一門相染

2

古方選

聖



●禮

苓甘五味姜辛湯

茯苓

兩四

甘艸

乾姜

細辛

各三兩

五味

升半

右五味以水八升煮取三升去滓溫服半

升日三服

衝氣即低而反更欬腎滿者用桂苓五味

甘艸湯去桂加乾姜細辛以治其欬滿

苓甘姜味辛夏仁湯

茯苓

兩四

甘艸

兩三

五味

升半

乾姜

細辛

各三兩

半夏

升半

杏仁

升半

右七味以水一斗煮取三升去滓溫服半

升日三服

水太嘔止其人形腫者加杏仁主之其證

應內麻黃以其人遂痺故不內之若逆而

內之者必厥所以然者以其人血虛麻黃

發其陽故也



姚云與  
大續命  
同兼治  
婦人產  
後去血  
者及老  
人小兒

●曾

續命湯

麻黃

桂枝

當歸

人參

石膏

乾姜

甘艸

杏仁

芎藭一兩  
五錢

右九味以水一斗煮取四升當小汗薄覆

脊憑几坐汗出則愈不汗更服無所禁勿

當風并治但伏不得臥欬逆上氣面目浮

腫治中風痺身體不能自收口不能言胃味

不知痛處或拘急不得顛側

太

皂莢丸

皂莢八兩

右一味末之蜜丸梧子大以棗膏和湯服

三九日三夜一服

欬逆上氣時時唾濁但坐不得眠者

走馬湯

巴豆二枚

杏仁二枚

右二味以綿纏槌令碎熱湯二合捻取白

汁飲之當下老小量之

治中惡心痛腹脹大便不通○治飛尸鬼

擊病



津

頭風摩散方

中風歷節病

大附子一枚

鹽等分

右二味為散沫子以方寸匕已摩疾上令

藥力行

通脈四逆湯

甘草二兩

附子一枚

大者

乾姜

三兩強人可四兩

右三味以水三升煮取一升二合去滓分

溫再服其脈即出者愈面色赤者加葱九

莖腹中痛者去蔥加芍藥二兩嘔者加生

薑二兩咽痛者去芍藥加桔梗一兩利止

脈不出者去桔梗加人參二兩病皆與方相應者乃服之

下利清堯裏寒外熱汗出而厥者○少陰

病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲

絕身反不惡寒其人面色赤或腹痛或乾

嘔或咽痛或利止脈不出者

通脈四逆加豬膽湯

甘草二兩

乾姜三兩

附子一枚

豬膽汁半合

右四味以水三升煮取一升二合去滓內

豬膽汁分溫再服其脈即來無豬膽以羊



膽代之  
吐已下斷千金作吐下已斷汗出而厥四肢拘急  
不解脈微欲絕者

此方用... 治... 汗出而厥... 四肢拘急... 脈微欲絕... 此方用... 治... 汗出而厥... 四肢拘急... 脈微欲絕... 此方用... 治... 汗出而厥... 四肢拘急... 脈微欲絕...

●字

烏頭湯

麻黃

芍藥

黃芪

各三兩

甘草三兩

川烏

五枚

以蜜二升煎取一

升即出烏頭

取一

右五味咬咀四味以水三升煮取一升去滓內蜜煎中更煎之服七合不知盡服之  
治腳氣疼痛不可屈伸○治寒疝腹中絞痛賊風入攻五臟拘急不得轉側發作有時使人陰縮手足厥逆

烏頭煎

烏頭大者五枚

右以水三升煮取一升去滓內蜜二升煎

古方

五升



自或作  
弦或作  
緊  
蜜二斤  
一作水  
二升  
融按解  
當作煎

令水氣盡取二升強人服七合弱人服五  
合不差明日更服不可日再服  
腹痛脈弦而緊弦則衛氣不行即惡寒緊  
則不欲食邪正相搏即為寒疝寒疝遠臍  
痛若發則白汗出手足厥冷其脈沈弦者  
烏頭桂枝湯  
烏頭 外莖作烏頭  
大者五枚  
右一味以蜜二斤煎減半去滓以桂枝湯  
五合解之得一升後初服二合不知即服  
三合又不知復加至五合其知者如醉狀  
得吐者為中病

千金無  
抵當二  
字  
一本無  
用後方  
三字有  
烏頭桂  
枝湯主  
之七字

寒疝腹中痛逆冷手足不仁苦身疼痛灸  
刺諸藥不可治抵當用後方  
烏梅丸  
烏梅 三百枚  
黃連 一斤  
當歸 四兩  
附子 六兩  
川椒 四兩  
細辛 六兩  
乾姜 十兩  
桂枝 一人參 黃柏 各六兩  
右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一  
宿去核蒸之五升米下飯熟搗成泥和藥  
令相得內白中與蜜杵五千下丸如梧子  
大先食飲服十九日三服稍加至二十九  
傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無

丑一作  
二

7



暫安時者此為藏厥非虵厥也虵厥者其人當吐虵令病者靜而復時煩者此為藏寒虵上入其膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者虵聞食臭出其人當自吐虵虵厥者烏梅丸主之又主久利

●久

瓜蒂散

瓜蒂

分一

赤小豆

分一

右二味各別搗篩為散已合治之取一棗匕以香豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與瓜蒂散病如桂枝證頭不痛項不強寸脈微浮胃中痞鞭氣上衝喉咽不得息者此為胃有寒也當吐之○病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胃中心下滿而煩飢不能食者病

下一本  
作中



在胃中當須吐之○宿食在上脘當吐之  
苦酒湯 半夏十四枚 雞子一枚

右二味內半夏著苦酒中以雞子壳置刀  
環中安火上令三沸去滓少少含嚥之不  
差更作三劑此血氣寒不四 陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者

栝萸桂枝湯 於桂枝湯之方內加栝萸根二兩一  
太陽病其證備身體強凡凡然脈反沈遲  
此為瘥

滑石代赭湯

百合七枚 滑石三兩

代赭石彈大一枚 如彈丸一作一枚

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其  
水更以泉水二升煮取一升去滓別以泉  
水二升煎滑石代赭取一升去滓後合和  
重煎取一升五合分溫服

百合病下之後者

栝萸牡蠣散 栝萸根 牡蠣各等分

右為細末飲服方寸匕日三服  
百合病渴不差者

古方匯刊



綠曰  
白曰  
醴

括萸薤白白酒湯  
括萸實一枚  
薤白半升

白酒七升

右三味同煮取二升分温再服

胃痺之病喘息欬唾胃脊痛短氣寸口脈

沈而遲關上小緊數者

括萸薤白半夏湯  
括萸實一枚  
薤白三兩

半夏半升

白酒半升

右四味同煮取四升温服一升日三服其

胃痺不得臥心痛徹脊者

括萸瞿麥丸  
括萸根二兩  
茯苓

薯蕷各三兩  
附子一枚  
瞿麥兩

右五味末之煉蜜丸梧子大飲服三丸日

三服不知增至七八丸以小便利腹中温

為知

小便不利者有水氣其人若渴者

滑石白魚散  
滑石  
亂髮  
白魚各二分

右三味杵為散飲服半錢匕日三服

小便不利蒲灰散主之滑石白魚散主之

茯苓戎鹽湯主之

7



也

射干麻黃湯

射干十三枚

麻黃

生薑

各四兩

細辛

紫苑

款冬花

各三兩

五味子

半升

大棗

七枚

半夏

大者洗八枚一云半升

右九味以水一斗二升先煮麻黃兩沸去

上沫內諸藥煮取三升分溫三服

咳而上氣喉中水雞聲者

●末

麻黃湯

麻黃

三兩

桂枝

二兩

甘草

一兩

杏仁七十箇

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上

沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆

取微似汗不須啜粥

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡

風無汗而喘者○太陽與陽明合病喘而

胷滿者不可下○太陽病十日以去脈浮

細而嗜臥者外已解也設胷滿脇痛者與

2



微除作須臾

玉函麻黃湯之下一桂枝湯之五字

小柴胡湯脈但浮者與麻黃湯○太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄必解所以然者陽氣重故也○脈浮者病在表可發汗宜麻黃湯○脈浮而數者可發汗○傷寒脈浮緊不發汗因致衄者○陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈○陽明中風脈浮大而短氣腹都滿脇下及心痛又按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難

有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脈續浮者與小柴胡湯脈但浮無餘證者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者不治

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃 兩四

杏仁 五十

甘草 兩二

石膏 斤半

右四味以水七升煮麻黃減二升去白沫

內諸藥煮取二升去滓溫服一升

發汗後不可更行桂枝湯汗出喘無大熱者○下後不可更行桂枝湯若汗出而喘

成李升下有先

之

古方匯編

卷六



一本一尺作一  
斤一升作一

胃一作  
胃

無大熱者

麻仁丸

麻子仁升二

芍藥

枳實各半

大黃斤一

杏仁升一

厚朴尺一

右六味末之蜜和丸加梧桐子大飲服十

丸日三服漸加以知為度

跌陽脈浮而瀦浮則胃氣強瀦則小使數

浮瀦相搏大便秘則鞭其脾為約者

麻黃連軹赤小豆湯

麻黃各二連軹各二

甘艸

生姜各二

杏仁筒四

赤小豆升一

大棗枚十二

生梓白皮升一

右八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上

沫內諸藥煮取三升去滓分溫三服

傷寒瘵熱在裏身必黃者

麻黃細辛附子湯

麻黃各二細辛各二

附子枚一

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上

沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三

服

火陰病始得之反發熱脈沈者

麻黃附子甘艸湯

麻黃三兩

甘艸二兩



附子一枚

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏證故微發汗也○水之為病其脈沈小屬少陰浮者為風無水虛脹者為氣水發其汗即已脈沈者宜麻黃附子湯浮者宜杏子湯  
麻黃加朮湯

於麻黃湯之內加朮四兩  
濕家身煩疼可與麻黃加朮湯發其汗為宜慎不可以火攻之

麻黃杏仁薏苡甘草湯  
麻黃兩半

甘草兩 薏苡仁兩半 杏仁十箇

右剉麻豆大每服四錢匕水盞半煮八分去滓溫服有微汗避風

病者一身盡疼發熱日晡所劇者名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也

麻黃醇酒湯千金 麻黃兩三



右一味以美清酒五升煮取二升半頓服  
盡冬月用酒春月用水煮之

治黃疸

麻黃升麻湯

麻黃二兩

升麻一分

當歸一分

知母十八銖

黃芩十八銖

萎蕤十八銖

芍藥

天門冬

桂枝

甘艸

石膏

白朮

乾姜各六銖

右十四味以水一斗先煮麻黃一兩沸去  
上沫內諸藥煮取三升去滓分溫三服相

去如炊三斗米頃令盡汗出愈  
傷寒六七日大下後寸脈沈而遲手足厥  
逆下部脈不至喉咽不利唾膿血泄利不  
止者為難治

7



計

桂枝湯

桂枝

芍藥

各三兩

甘草

二兩

生姜

三兩

大棗

十二枚

一本無  
三味字

一本促  
下有促  
字

右五味以水七升微火煮取三升太滓適寒溫服一升服已須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許遍身絜絜微似有汗者益佳不可令如水流離病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小促其間半日許令三服盡若病重者一日

一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麪五辛酒酪臭惡等物太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出畜畜惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者太陽病頭痛發熱汗出惡風者太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法若不上衝者不得與之○太陽病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解者此為壞病桂枝不中與之也



五函故  
之下有  
知字

觀其脈證知犯何逆隨證治之桂枝本為  
解肌若其人脈浮緊發熱汗不出者不可  
與之常須識此勿令誤也○若酒客病不  
可與桂枝湯得之則嘔以酒客不喜甘故  
也○太陽病初服桂枝湯反煩不解者先  
刺風池風府卻與桂枝湯則愈○太陽病  
外證未解脈浮弱者當以汗解○太陽病  
外證未解不可下也下之為逆欲解外者  
○因陽病先發汗不解而復下之脈浮者  
不愈浮為在外而反下之故令不愈今脈

五函病  
常自汗  
出者此  
為榮氣  
不和故  
也營行  
脈中為  
陰主內  
衛行脈  
外為陽  
主外復  
發其汗  
衛和則  
愈宜桂  
枝湯  
玉函與  
之上有  
未可之  
二字清  
反字有  
更字無  
者字可

浮故在外當須解外則愈○病常自汗出  
者此為榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣  
不共榮氣諧和故爾以榮行脈中衛行脈  
外復發其汗榮衛和則愈○病人藏無他  
病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和  
也先其時發汗則愈○傷寒不大便六七  
日頭痛有熱者與承氣湯其小使清者知  
不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必  
衄者○傷寒發汗已解半日許復煩脈浮  
數者可更發汗○陽明病脈遲汗出多微



之下有  
與復之  
二字

惡寒者表未解也可發汗○太陰病脈浮者可發汗○下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯○吐利止而身痛不休者當消息和解其外○病人煩熱汗出則解又如瀉狀日晡所發熱者屬陽明也脈實者宜下之脈浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯○傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大

黃黃連瀉心湯○產後風續之數十日不解頭微痛惡寒時時有熱心下悶乾嘔汗出雖久陽且證續在耳可與陽且湯則桂枝湯之○凡服桂枝湯吐者其後必吐膿血也○傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏救裏後身疼痛清便自調者急當救裏救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯○大陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風者○婦人得平脈陰脈小弱其人渴不食無寒熱名妊娠桂枝湯主

个

古方匯編

卷五



之於法六十日當有此證設有醫治逆者  
卻一月加吐下者則絕之○服桂枝湯大  
汗出脈洪大者與桂枝湯如前法若形似  
瘧一日再發者汗出必解

桂枝去芍藥加附子湯

於桂枝湯方內去芍藥加附子一枚

太陽病下之後脈促胃滿者桂枝去芍藥  
加附子湯主之

桂枝加附子湯

於桂枝湯方內加附子一枚

桂枝去芍藥湯

於桂枝湯方內去芍藥

太陽病下之後脈促胃滿者

桂枝麻黃各半湯

桂枝一兩麻黃六銖芍藥六銖

生薑一兩甘草二兩杏仁四枚大棗四枚

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上  
沫內諸藥煮取一升八合去滓溫服六合

玉函脈  
之字上  
有其字

个



太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者為欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必痒

桂枝二麻黃一湯

桂枝 一兩 十銖

芍藥 一兩 六銖

麻黃 一兩 六銖

生薑 一兩 六銖

杏仁 十六箇

甘草 二兩 二銖

大棗 五枚

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升日二服

服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法若形似瘧一日再發者汗出必解

桂枝二越婢一湯

桂枝 芍藥 麻黃

甘草 各十銖 八銖

大棗 四枚

生薑 一兩 二銖

石膏 二斤 四銖

右七味以水五升煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升  
太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此

个

古方匯編

卷五



無陽也不可發汗

桂枝去桂加茯苓白朮湯

芍藥 白朮

茯苓

生薑

各三兩

甘艸

二兩

大棗

十二枚

右六味以水八升煮取三升去滓溫服一升小便利則愈

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱

無汗心下滿微痛小便利者

桂枝加厚朴杏子湯

於桂枝湯內加

厚朴

二兩

杏仁

五十箇

太陽病下之微喘者表未解故也○喘家

作桂枝湯加厚朴杏子

桂枝加芍藥生姜各一兩人參三兩新加湯

桂枝

二兩

芍藥

四兩

甘艸

二兩

人參

三兩

大棗

十二枚

生薑

四兩

右六味以水一斗二升煮取三升去滓溫

服一升

發汗後身疼痛脈沈遲者

桂枝甘艸湯

桂枝

四兩

甘艸

二兩

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得



按者

桂枝芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

桂枝三兩 甘艸二兩 生薑三兩 大棗三枚

牡蠣五兩 蜀漆三兩 龍骨四兩

右七味以水一斗二升先煮蜀漆減二升

內諸藥煮取三升去滓溫服一升

傷寒脈浮醫以火迫卻之亡陽必驚狂臥

起不安者○火邪者

桂枝甘艸龍骨牡蠣湯 桂枝一兩 甘艸三兩

牡蠣各二兩 龍骨各二兩

一本七味作為末

玉函作右七味

或咀翼以水八

升煮取二升又

一斗二升法水煎取五

一本四味作為末

右四味以水五升煮取二升半去滓溫服

八合日三服

火逆下之因燒針煩躁者

桂枝人參湯 桂枝各四兩 甘艸各四兩

白朮各三兩 人參各三兩 乾薑各三兩

右五味以水九升先煮四味取五升內桂

夏煮取三升去滓溫服一升日再夜一服

太陽病外證未除而數下之遂協熱而利

利下不止心下痞鞭表裏不解者

桂枝去桂加白朮湯 附子三枚 白朮四兩

古方虛則



融按自  
利疑不  
與

生薑三兩 甘艸二兩 大棗十二枚  
右五味以水六升煮取二升去滓分温三服其人如冒狀勿怪此以附子朮併走皮內逐水氣未得除使之耳  
傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而濡者桂枝附子湯主之若其人大便鞭小便自利者桂枝加芍藥湯  
於桂枝湯之方內加芍藥三兩  
傷寒脈浮而緩手足自温者繫在太陰太

融按故  
也下可  
有圈點  
歟

陰當發身黃若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也本太陽病鑿及下之因爾腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝加大黃湯主之  
桂枝加大黃湯  
於桂枝湯之方內加大黃二兩  
證同前  
桂枝加龍骨牡蠣湯 桂枝 芍藥  
生薑各三兩 甘艸二兩 大棗十二枚

古方

古方



一作目  
眶痛

龍骨 牡蠣 各三兩

右七味以水七升煮取三升分温三服

夫失精家小腹弦急陰頭寒目眩髮落脈

極虛乳遲為清穀亡血失精脈得諸乳動

微緊男子失精女子夢交

桂枝去芍藥加皂莢湯

於桂枝湯之方內去芍藥加皂莢二枚

治肺痿吐涎沫

桂枝加桂湯

於桂枝湯之方中加桂二兩

一枚  
兩一作

發汗後燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發貫豚氣從小腹上衝心者灸其核

上各一壯

桂薑枳實湯

桂枝 生姜 各三兩

枳實 五枚

右三味以水六升煮取三升分温三服

心中痞諸逆心懸痛者

桂苓味甘去桂加薑辛夏湯

茯苓 四兩

甘艸 細辛 乾薑 各二兩

半夏 各半升

古方匯編



右六味以水八升煮取三升去滓温服半  
升日三服

欬滿卽止而更復渴衝氣復發者以細辛  
乾薑爲熱藥也服之當遂渴而渴反止者  
爲支飲也支飲者法當冒冒者必嘔嘔者  
復內半夏以去其水

桂枝加黃耆湯

桂枝

芍藥

各三兩

甘草

黃耆

各二兩

生姜

三兩

大棗

十二枚

右六味以水八升煮取三升温服一升須  
臈飲熱稀粥一升餘以助藥力温覆取微

汗若不汗更服

黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節  
食已汗出又身常暮盜汗出者此勞氣也  
若汗出已反發熱者久久其身必甲錯發  
熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒輕  
者久久必身腫卽胸中痛又從腰以上必  
汗出下無汗腰臄弛痛如有物在皮中狀  
劇者不能食身疼重煩燥小便不利爲黃  
汗者○諸病黃家但利其小便假令脈浮  
當以汗解之者



桂姜艸棗黃辛附湯 桂枝 生薑 各三兩

甘艸 麻黃 細辛 各二兩 附子 一枚

大棗 十二枚

右七味以水七升煮麻黃去上沫內諸藥  
煮取二升分溫三服當汗出如虫行皮中  
即愈

水飲下  
脫所作  
三字

氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲者

雞屎白散 雞屎白

右一味為散取方寸匕以水六合和溫服  
轉筋之為病其人臂脚直脈上下行微弦

轉筋入腹者

桂枝茯苓丸 桂枝 茯苓 牡丹皮

桃仁 芍藥 各等分

右五味末之煉蜜和丸如兔屎大每日食  
前服一丸不知加至三丸

婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下  
不止胎動在臍上者為癥痼害妊娠六月  
動者前三月經水利時胎下血者後斷三  
月衄也所以血不止者其癥不去故也當  
下其癥

一本胎  
字下有  
也字  
血一本  
作不血



下瘀血湯

大黃二兩

桃仁二十枚

蟅虫二十枚

右三味末之煉蜜和為四丸以酒一升煎一丸取八合頓服之新血下如豚肝產婦腹痛法當以枳實芍藥散假令不愈者此為腹中有乾血著臍下宜下瘀血湯主之亦主經水不利

桂苓五味甘艸湯

茯苓

桂枝各四兩

甘艸三兩 五味子半升

右四味以水八升煮取三升去滓分溫三

服。

青龍湯下已多唾口燥寸脈沈尺脈微手足厥逆氣從小腹上衝膈咽手足痺其面翕然熱如醉狀因復下流陰股小便難時復胃者與茯苓桂枝五味甘艸湯治其氣衝

桂枝附子湯

桂枝四兩

生姜三兩

附子三枚

甘艸二兩

大棗十二枚

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服一服覺身痺半日許再服三服都盡

个



融按自  
利疑不  
利歟

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自  
轉側不嘔不渴脈浮虛而瀉者桂枝附子  
湯主之若其人大便堅小便自利者桂枝  
大桂加白朮湯主之

桂枝芍藥知母湯

桂枝

芍藥

甘草

麻黃

生薑

白朮

知母

防風

附子

右九味以水七升煮取二升溫服七合日  
三服  
少陰病脈浮而弱弱則血不足浮則為風

風血相搏即疼痛如掣盛人脈滿小短氣  
自汗出歷節疼不可屈伸此皆飲酒汗出  
當風所致諸肢節疼痛身體羸脚腫如  
脫頭眩短氣溫溫欲吐

介



爛與煉同

●不

茯苓桂枝甘艸大棗湯

茯苓半斤

桂枝四兩

甘艸二兩

大棗十五枚

六四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升

內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚

茯苓桂枝白朮甘艸湯

茯苓四兩

甘艸

白朮各二兩

桂枝三兩

右四味以水六升煮取三升去滓分溫三

服

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胃起  
則頭眩暈沈緊發汗則動經身為振振搖  
者○心下有痰飲胃脇支滿目眩者○夫  
短氣有微飲當從小便去之苓桂朮甘湯  
主之八味丸亦主之

茯苓四逆湯

茯苓四兩

人參一兩

附子一枚

甘艸二兩

乾姜半兩

右五味以水五升煮取三升去滓溫服七

合日二服

發汗若下之病仍不解煩躁者

茯苓一兩  
本作六

茯苓二兩  
本作三

奇方選別

三



茯苓甘艸湯

茯苓

桂枝各二兩

甘艸一兩

生薑三兩

右三味以水四升煮取二升去滓分温三

傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者○

傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯苓甘

艸湯卻治其厥不爾水漬入胃必作利也

文蛤散

文蛤

五要畧作四兩

右一味為散以沸湯和一方寸匕服湯用五合

五函肉作皮

五函三物小會湯作白散

病在陽應以汗解之反以冷水濕之若灌

之其熱散卻不得去彌更益煩肉上粟起

意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者

與五苓散寒實結胃無熱證者與三物小

陷胃湯渴欲飲水不止者

附子瀉心湯

大黃二兩

黃連

黃芩各二兩

附子一枚

右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾

絞去滓內附子汁分温再服

心下痞而復惡寒汗出者



附子湯

附子<sub>二枚</sub>

茯苓<sub>三兩</sub>

人參<sub>二兩</sub>

白朮<sub>四兩</sub>

芍藥<sub>三兩</sub>

右五味以水八升煮取三升去滓温服一

日三服

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者

當灸之○婦人懷娠六七月脈弦發熱其

胎愈脹腹痛惡寒者少腹如扇所以然者

子藏開故也當以附子湯温其藏○少陰

病身體痛手足寒骨節痛脈沈者

茯苓杏仁甘草湯

茯苓<sub>三兩</sub>

杏仁<sub>五十箇</sub>

甘草

右三味以水一斗煮取五升温服一升日

三服不差更服

胃痺胃中氣塞短氣茯苓杏仁甘草湯主

之橘枳薑湯亦主之

附子粳米湯

附子<sub>一枚</sub>

半夏<sub>半升</sub>

甘艸<sub>一兩</sub>

大棗<sub>十枚</sub>

粳米<sub>半升</sub>

右五味以水八升煮米熟湯成去滓温服

一升日三服

腹中寒氣雷鳴切痛胃脇逆滿嘔吐者

千金方  
治霍亂  
四逆吐  
火嘔多  
者

古方選

三五



茯苓飲 外臺

茯苓 人參 白朮 各三兩

枳實 二兩

橘皮 二兩

生薑 四兩

右六味以水六升煮取一升八合分温三

服

治心胃中有停痰宿水自吐出水後心胃間虛氣滿不能食消痰氣令能食

茯苓薑味辛夏仁黃湯

茯苓 四兩

甘州 三兩

五味 半升

乾薑

細辛 各三兩

半夏 半升

杏仁 半升

大黃 三兩

右八味以水一斗煮取三升去滓温服半

升日三服

若面熱如醉此為胃熱上衝薰其面加大黃以利之

茯苓澤瀉湯

茯苓 半斤

澤瀉 四兩

甘州

桂枝 各二兩

白朮 三兩

生薑 四兩

右六味以水一斗煮取三升內澤瀉再煮

取二升半温服八合日三服

胃反吐而渴欲飲水者

文蛤湯

文蛤 五兩

麻黃

甘州

生薑 各三兩

石膏 五兩

杏仁 五十箇

外臺治消渴脈絕胃反吐食又有一升

7



大棗 十二枚

右七味以水六升煮取二升温服一升汗出即愈

吐後渴欲飲水而貪飲者文蛤湯主之兼主微風脈緊頭痛

風引湯 大黃 乾姜 龍骨 各四兩

桂枝 三兩 甘草 牡蠣 各二兩 寒水石

滑石 赤石脂 白石脂 紫石英

石膏 各六兩

右十二味杵麤篩以草囊盛之取三指撮

井花水三升煮三沸温服一升

除熱癰癩○寸口脈遲而緩遲則為寒緩則為虛榮緩則為亡血衛緩則為中風邪

氣中經則身痒而癢疹心氣不足邪氣入中則胃滿而短氣○治大人風引少小驚

癰瘕癰日數十發醫所不療除熱方巢氏云脚氣宜風引湯

茯苓戎鹽湯 茯苓 半斤 白朮 二兩

戎鹽 擘九大一枚

右三味先將茯苓白朮煎成入鹽再煎分

7







名曰水逆○本以下之故心下痞與瀉心  
湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者  
○太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出  
復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也  
如其不下者病人不惡寒而渴者此轉屬  
陽明也小便數者大便必鞭不更衣十日  
無所苦也渴欲飲水少少與之但以法救  
之渴者○霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲  
飲水者五苓散主之寒多不用水者理中  
丸主之○假令瘦人臍下有悸吐涎沫而

癩眩此水也○脈浮小便不利微熱消渴  
者宜利小便發汗○渴欲飲水水入則吐  
者名曰水逆○病在陽應以汗解之反以  
冷水瀝之若灌之其熱被劫不得去須臾  
益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文  
蛤散若不差者與五苓散寒實結胃無熱  
證者與三物小陷胃湯白散亦可服○傷  
寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓  
白朮湯主之○男子消渴小便反多以飲  
一斗小便一斗腎氣丸主之脈浮小便不



成本嘔  
字下有  
者字

利微熱消渴者宜利小便發汗

吳茱萸湯

吳茱萸升一

人參兩三

生薑兩六

大棗枚十二

右四味以水七升煮取二升去滓溫服合

日三服

食穀欲嘔屬陽明也吳茱萸湯主之得湯

反劇者屬上焦也○少陰病吐利手足逆

冷煩躁欲飲者○乾嘔吐涎沫頭痛者○

嘔而胃滿者

厚朴生姜半夏甘艸人參湯厚朴

生薑各半

半夏升半

甘艸兩二

人參兩一

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一

升日三服

發汗後腹脹滿者

厚朴麻黃湯

厚朴兩五

麻黃兩四

石膏如雞

杏仁

半夏各半

乾姜

細辛各二

小麥升一

五味子升半

右九味以水一斗二升先煮小麥熟去滓

合諸藥煮取三升溫服一升日三服

丁



欬而脈浮者

厚朴七物湯 厚朴斤半 甘艸 大黃各三兩

大棗十枚 枳實五枚 桂枝二兩 生薑五兩

右七味以水一斗煮取四升溫服八合日三服嘔者加半夏五合下利去大黃寒多者加生薑至半斤

滿腹滿發熱十日脈浮而數飲食如故

厚朴三物湯 厚朴八兩 大黃四兩

枳實五枚

右三味以水一斗二升先煮二味取五升

內大黃煮取三升溫服一升以利為度痛而閉者

厚朴大黃湯 厚朴尺一 大黃六兩

枳實四枚

右三味以水五升煮取二升分溫再服支飲胃滿者

侯氏墨散 菊花四分 白朮十分 細辛

茯苓 牡蠣各三分 桔梗八分 防風十分

人參 礬石各三分 黃芩五分 當歸

乾姜 芎藭 桂枝各三分



右十四味杵為散酒服方寸匕日一服初服二十日溫酒調服禁一切魚肉大蒜常宜冷食六十日止即藥積在腹中不下也熱食即下矣冷食自能助藥力  
治大風四肢煩重心中惡寒不足者外臺  
治風癩

江

越婢加朮湯

麻黃六兩

石膏斤半

生薑三兩

甘草二兩

白朮四兩

大棗十五枚

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫三服惡風加附子一枚炮

治內極熱則身體津脫滕理開汗大泄厲風氣下焦腳弱○裏水越婢加朮主之甘草麻黃湯亦主之○裏水者一身面目黃腫其脈沈小便利故令病水假如小便

內或作肉

工



自利此亡津液故令渴也

越脾加半夏湯

於越脾湯之方內加半夏半升

欬而上氣此為肺脹其人喘目如脫狀脈

浮大者

越脾湯

麻黃

六兩

石膏

半斤

生薑

三兩

大棗

十五枚

甘草

二兩

右五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸

藥煮取三升分溫三服

惡風者加附子一枚風水加水四兩

古今錄驗

風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出  
無大熱者



一本四  
味之下  
有為未  
二字

●天

抵當湯

水蛭

蝨蟲各三  
十箇

桃仁二十  
箇

大黃兩三

右四味以水五升煮取三升去滓温服一  
升

太陽病六七日表證仍在脈微而沈反不  
結胃其人發狂者以熱在下焦小腹當鞭  
滿小便自利者下血乃愈所以然者以太  
陽隨經瘀熱在裏故也○太陽病身黃脈  
沈結小腹鞭小便不利者為無血也小便

自利其人如狂者血證諦○陽明證其人  
喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血  
故令喜忘屎雖鞭大便反易其色必黑者  
○病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數  
者可下之假令已下脈數不解合熱則消  
穀喜飢至六七日不大便者有瘀血○婦  
人經水不利下者

抵當丸

水蛭

蝨蟲二十  
箇

桃仁二十  
箇

大黃兩三

右四味搗分四丸以水一升煮一丸取七

子



合服之時時當下血若不下者更服

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者

為有血也當下之不可餘藥宜抵當丸

天雄散

天雄三兩

白朮八兩

桂枝六兩

龍骨三兩

右四味杵為散酒服半棗七日三服不知

稍增之

葶藶大棗瀉肺湯

葶藶

如彈丸大

大棗

十二枚

右先以水三升煮棗取二升去棗內葶藶

煮取一升頓服

肺癰喘不得臥○肺癰胃滿脹一身面目

浮腫鼻塞涕出不聞香臭酸辛欬逆上

氣喘鳴迫塞者○支飲不得息者

三



●左

柴胡加芒硝湯

柴胡 二兩 十銖

黃芩

人參

生薑

各一兩

半夏

二十銖

大棗

四枚

芒硝

二兩

甘草

一兩

右八味以水四升煮取二升去滓內芒硝更煮微沸分溫再服

傷寒十三日不解胃脘滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之以不得利今反利者知醫以丸藥下之此非其治也潮熱者實也先宜服小柴胡湯以解外

後以柴胡加芒硝湯主之

柴胡加龍骨牡蠣湯

柴胡 四兩

龍骨

黃芩

生薑

鉛丹

人參

桂枝

茯苓

各一兩

半夏

二合

大黃

二兩

牡蠣

一兩

大棗

六枚

右十二味以水八升煮取四升內大黃切如碁子更煮一兩沸去滓溫服一升

傷寒八九日下之胃滿煩驚小便不利識語一身盡重不可轉側者

柴胡桂枝乾姜湯

柴胡 半斤

桂枝

三兩

廿



乾姜二兩 枳實根四兩 黃芩三兩  
牡蠣二兩 甘艸二兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服初服微煩復服汗出便愈

傷寒五六日已發汗而復下之胃脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也

酸棗湯

酸棗仁二升

甘艸一兩

知母

茯苓

川芎

各二兩

淡師有生

右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥煮取三升分溫三服  
虛勞虛煩不得眠

柴胡桂枝湯

柴胡四兩

黃芩

人參

芍藥

桂枝

生薑

各一兩半

甘艸一兩

半夏

二合

大棗

六枚

右九味以水七升煮取三升去滓溫服一升

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者○治心腹卒中痛

廿



一本錢  
字盡作  
分字  
温字上  
一有分  
字  
滿  
痛或作

者

三黃湯

千金

麻黃

五

獨活

四

細辛

黃芪

各二

黃芩

三

右五味以水六升煮取二升温三服一服  
小汗二服大汗心熱加大黃二錢腹痛加  
枳實一枚氣逆加人參三錢悸加牡蠣三  
錢渴加栝蘘根三錢先有寒加附子一枚  
治中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂惡  
寒經日不欲飲食

三物黃芩湯

千金

黃芩

一兩

苦參

二兩

六一作  
八  
温字上  
或有分  
字

乾地黄

四兩

右三味以水六升煮取二升温服一升多  
吐下出

治婦人在草蓐自發露得風四肢苦煩熱  
頭痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者

柴胡去半夏加栝蘘湯

柴胡

八兩

人參

黃芩

甘艸

各三兩

栝蘘根

四兩

生薑

二兩

大棗

十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再  
煎取三升温服一升日二服

廿

古方選別



治瘧病發渴者亦治勞瘧

柴胡桂薑湯

柴胡

桂枝

乾薑

枳實

黃芩

牡蠣

甘草

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再

煎取三升温服一升日三服初服微煩復

服汗出便愈

治瘧寒多微有熱或但寒不熱

三物備急丸

大黃

乾薑

巴豆

右藥各須精新先擣大黃乾薑為末研巴

豆肉中合治一千杵用為散蜜和丸亦佳

蜜器中貯之莫令歇氣

主心腹諸卒暴百病若中惡客忤心腹脹

滿卒痛如錐刺氣急口噤停尸卒死者以

緩水若酒服大豆許三四丸或不下捧頭

起灌令下咽須臾當差如未差更與三丸

當腹中鳴即吐下便差若口噤亦須折齒

灌之

廿

方集

八



● 幾

桔覆湯

亦治血痺

桔梗

一兩

甘艸

二兩

右二味以水三升煮取一升去滓分温再服

欬而胃滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾

腥臭久久吐膿如米粥者或更不可

少陰病二三日咽痛者可與甘艸湯不差

與桔覆湯

枳實薤白桂枝湯

枳實

厚朴

薤白半斤

桂枝一兩

枳實四枚

厚朴四兩

右五味以水五升先煮枳實厚朴取二升

去滓內諸藥煮數沸分温三服

胃痺心中痞留氣結在胃脘滿脇下逆搶

心枳實薤白桂枝湯主之

橘枳姜湯

橘皮

枳實

生薑

右三味以水五升煮取二升分温再服

胃痺胃中氣塞短氣茯苓杏仁甘艸湯主

之橘枳薑湯亦主之

九痛丸

附子

生狼牙

巴豆

人參 木乾姜 吳茱萸

各一兩

肘後千金云治胃痺胃中幅三如滿噎塞習二如痒喉中澀唾燥沫

千

古方

九



腫一作  
衝

當字卡  
一有散  
也二字

右六味末之煉蜜丸如梧子大酒下強人  
服三九日三服弱者二丸

治九種心痛兼治卒中惡腹脹痛口不能  
言又治連年積冷流注心胃痛并冷腫上

氣落馬墜車血疾等皆主之

枳朮湯

枳實七枚

白朮二兩

右二味以水五升煮取三升分溫三服腹

中粟即當

心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作

橘皮湯

橘皮四兩

生薑半斤

一本無  
嘔字  
一本升  
作升

右二味以水七升煮取三升溫服一升下

咽即愈

乾嘔噦苦手足厥者

橘皮竹茹湯

橘皮二斤

竹茹二升

大棗三十枚

生薑半斤

甘草五兩

人參一兩

右六味以水一斗煮取三升溫服一升日

三服

以逆者

芎歸膠艾湯

芎藭

阿膠

甘草

各二兩



一方加  
乾姜一  
兩胡氏  
治婦人  
胞動無  
乾姜

艾葉 當歸 芍藥  
各三兩 各四兩

乾地黄 六兩

右七味以水五升清酒五升合煮取三升  
去滓內膠令消盡温服一升日三服不差  
更作

婦人陷經漏下黑不解

師曰婦人有漏下者有半產後因續下血  
都不絕者有妊娠下血者假令妊娠腹中  
痛為胞阻

葵子茯苓散 葵子 茯苓  
各一斤 各三兩

天

散字下  
脫服字

右二味杵為散飲服方寸匕日三服小便  
利則愈  
妊娠有水氣身重小便不利洒淅惡寒起  
即頭眩

枳實芍藥散 枳實 芍藥  
各等分

右二味杵為散方寸匕日三服并主癰膿  
以麥粥下之

產後腹痛煩滿不得卧

者 桂酒湯 黃芩 芍藥 桂枝  
各三兩 各五兩  
右三味以苦酒一升水七升相和煮取三



天

升温服一升當心煩至六七日乃解若心煩不止者以苦酒阻故也

問曰黃汗之為病身體腫一作重發熱汗出

而渴狀如風水汗沾衣色正黃如藥汁脈

自沈何從得之師曰以汗出入水中浴水

從汗孔入得之

枳實梔子湯

枳實三枚

梔子十四箇

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實梔子煮取二升下豉更煮五六沸去滓

豉

分温再服覆令微似汗若有宿食者內大

黃如博碁子五六枚服之愈

大病差後勞復者



• 美

蜜煎導方

食蜜七

右一味於銅器內微火煎當須凝如飴狀攪之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則鞭以內穀道中以手急抱欲大便時乃去之陽明病自汗出若發汗小便利者此為津液內竭雖鞭不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及大猪膽汁皆可為導

成本及  
字下有  
者字

• 之

芍藥甘艸湯

白芍藥 甘艸

各四兩

右二味以水三升煮取一升五合去滓分溫再服

傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒腳攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘艸乾姜湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸

四逆湯

甘艸

乾姜

一兩

附子

一枚



石三味以水三升煮取一升二合去滓分  
溫再服強人可大附子一枚乾姜三兩  
傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚  
攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便  
厥咽中乾煩躁吐逆者作甘艸乾姜湯與  
之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘  
艸湯與之其脚卽伸若胃氣不和讖語者  
小與調胃承氣湯若重發汗復加燒針者  
○脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者○下  
利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其

表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯○病發  
熱頭痛脈反沈若不差身體疼痛當救其  
裏○自利不渴者屬太陰以其藏有寒故  
也當溫之○大汗出熱不去內拘急四肢  
疼又下利厥逆而惡寒者○嘔而脈弱小  
便復利身有微熱見厥者難治○吐利汗  
出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者○少  
陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不  
能吐始得之手足寒脈弦遲者此胃中實  
不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者



不可吐也當溫之○少陰病脈沈者急溫之○既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者○傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯○大汗若大下利而厥冷者  
芍藥甘草附子湯  
芍藥 甘草 附子 各三兩  
附子 一枚  
右三味以水五升煮取一升五合去滓分

溫三服  
發汗病不解反惡寒者虛故也  
梔子豉湯  
梔子 十四箇 香豉 四合  
右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去滓分爲二服溫進一服得吐者止後服  
發汗後水藥不得入口爲逆若更發汗必吐下不止發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊懣梔子豉湯主之若少氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔

方通別  
九十六



子生姜豉湯主之○發汗若下之而煩熱  
胃中空者○傷寒五六日大下之後身熱  
不去心中結痛者未欲解也○陽明病脈  
浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不  
惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤反  
譫語若加溫針必怵惕煩躁不得眠若下  
之則胃中空虛客氣動膈心中懊懣舌上  
胎者○陽明病下之其外有熱手足溫不  
結胃心中懊懣飢不能食但頭汗出者○  
下利後更煩按之心下濡者為虛煩也

梔子甘艸豉湯  
梔子十四箇 甘艸二兩

香豉四合

右三味以水四升先煮梔子甘艸取二升  
半內豉煮取一升半去滓分二服溫進一  
服得吐者止後服  
發汗後水藥不得入口為逆若更發汗必  
吐下不止發汗吐下後虛煩不得眠若劇  
者必反覆顛倒心中懊懣梔子豉湯主之  
若少氣者梔子甘艸豉湯主之若嘔者梔  
子生姜豉湯主之



古方圖別  
梔子生薑豉湯

梔子十四箇

生薑兩五

香豉四合

右三味以水四升先煮梔子生薑取二升半內豉煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

證同梔子甘艸豉湯

梔子十四箇

厚朴兩四

枳實四枚

右三味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者

十棗湯

芫花

甘遂

大戟

右三味等分各別擣為散以水一升半先煮大棗肥者十枚取八合去滓內藥末強人服一錢匕羸人服半錢溫服之平旦服若下少病不除者明日更服加半錢得快下利後糜粥自養

大陽中風下痢嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表

玉函無汗出不惡寒者



解裏未和也○病懸飲者○飲家其脈弦  
爲有水○夫有支飲家飲煩胃中痛者不  
卒死至一百日一歲

梔子乾薑湯 梔子十四箇 乾薑二兩

右二味以水三升半煮取一升半去滓分

二服溫進一服得吐者止後服

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者

真武湯 茯苓 芍藥 生薑各三兩

白朮二兩 附子一枚

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七

合日三服效者加五味子半升細辛一兩

乾姜一兩若小便利者去茯苓若不利者

去芍藥加乾姜二兩若嘔者去附子加生

姜足前爲半升

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下

悸頭眩身動振振欲擗地者○少陰病

二三日不已至四五日腹痛小便利四

肢沉重疼痛自下利者此爲有水氣其人

或欬或小便利或下利或嘔者

生薑瀉心湯 生薑四兩 甘草 人參各三兩



乾薑兩一 黃芩兩三 半夏升半 黃連兩一

大棗枚十二

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下痢者

赤石脂禹餘糧湯 赤石脂斤一

太禹餘糧斤一

右二味以水六升煮取二升去滓分溫三服

復之下  
一本有  
利之字

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞭服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復不止者當利其小

灸甘草湯 甘草兩四 生薑 桂枝各三

人參 阿膠各二 生地黃斤一

麥門冬升半 麻仁升半 大棗枚三十

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去滓內膠烱消盡溫服一升日三服



傷寒脈結代心動悸者○治虛勞不足汗  
出而悶脈結悸行動如常不出百日危急  
者十一日死○肺痿涎唾多心中温温液  
液者

梔子柏皮湯

肥梔子十五箇

甘艸一兩

黃柏二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分温  
再服

傷寒身黃發熱者

赤小豆當歸散赤小豆三升當歸十兩

皆一本  
作周

右二味杵為散漿水服方寸匕日三服  
病者脈數無熱微煩默默但欲卧汗出初  
得之三、四日目赤如鳩眼七八日目四眦  
黑若能食者膿已成也○下血先血後便  
此近血也

升麻鱉甲湯

升麻二兩

當歸

蜀椒各二兩

甘艸二兩

鱉甲一片  
手指大

雄黃兩半

右六味以水四升煮取一升頓服之老小  
再服取汗  
陰毒之為病面目青身痛如被杖咽喉痛

古方編

臣



五日可治七日不可治升麻鱉甲湯去雄  
黃蜀椒主之陽毒之為病面赤斑斑錦文  
咽喉痛唾膿血五日可治七日不可治  
朮附湯 朮一兩 附子一枚 甘草一兩  
右三味剉每五錢七薑五片棗一枚水盪  
半煎七分去滓溫服

益精氣 治風虛頭重眩苦極不知食味暖肌補中  
赤石脂丸 蜀椒一兩 烏頭一分 附子半兩  
乾薑 赤石脂各一兩

千金不  
足作不  
定

右五味末之蜜丸如梧子大先食服一丸  
日三服

心痛徹脊脊痛徹心者

梔子大黃湯 梔子十四枚 大黃一兩

枳實五枚 豉一升

右四味以水六升煮取二升分溫三服  
酒黃疸心中懊懣或熱痛者

瀉心湯 大黃二兩 黃連 黃芩各一兩

右三味以水三升煮取一升頓服之  
心氣不足吐血衄血○婦人吐涎沫醫反



下之心下即痞當先治其吐涎沫小青龍湯主之涎沫止乃治痞瀉心湯主之○本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散主之

紫參湯

紫參斤半

甘草三兩

右二味以水五升先煮紫參取二升內甘

艸煮取一升半分溫三服

下利肺痛者

生姜甘艸湯

生姜五兩

人參三兩

甘草四兩

大棗十五枚

右四味以水七升煮取三升分溫三服治肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴者

生薑半夏湯

半夏半斤

生薑汁一升

右二味以水三升煮半夏取二升內生薑汁煮取一升半分四服日三夜一嘔止停後服

病人胃中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憤憤然無奈者

蛇床子散

蛇床子仁

右一味末之以白粉少許和令相得如棗



大綿裹內之自然温

温陰中坐藥

四逆加人參湯

於四逆湯之中加人參一兩惡寒脈微而復利利止亡血也

四逆散 甘草 枳實 柴胡 芍藥

石四味各十分搗篩白飲和服方寸匕日三服加減法欬者加五味子乾姜各五分并主下利悸者加桂枝五分小便不利者加茯苓五分腹中痛者加附子一枚泄利

下重者先以水五升煮薤白三升煮取三升去滓以散三方寸匕內湯中煮取一升半分温再服

少陰病四逆其人或欬或悸或小便利或腹中痛或泄利下重者

蜀漆散方 蜀漆 雲母 龍骨各等分

右三味杵為散未發前以漿水服半錢温瘧加蜀漆半分臨發時服一錢匕瘧多寒者名曰牡瘧

錢字下  
一有匕  
字

牡  
或作  
牝



外臺十  
二枚作  
三枚

千金作  
復發發  
則與若  
不愈

●毛

木防己湯

木防己

石膏十二枚  
雞子大

桂枝二兩

人參四兩

右四味以水六升煮取二升分温再服

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑

其脈沈緊得之數十日醫吐下之不愈木

防己湯主之虛者即愈實者三日復發復

與不愈者宜木防己湯去石膏加茯苓芒

硝湯主之

木防己加茯苓芒硝湯

桂枝

各二兩

芒硝

三合

人參

茯苓

各二兩

右五味以水六升煮取二升去滓內芒硝

再微煎分温再服微利則愈

證同前

七

古方圖別

百五



●世

旋復代赭湯

旋復花

人參

生薑五兩

代赭一兩

甘艸三兩

半夏半升

大棗十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取

三升溫服一升日三服

傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者

消礬散

消石 礬石各等分

右二味為末以大麥粥汁和服方寸匕日

三服病隨大小便去小便正黃大便正黑是候也

黃家日晡時發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱急小腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時澹此女勞之病非水也腹滿者難治

旋覆花湯

旋覆花

蔥十四莖

新絳少許

右三味以水三升煮取一升頓服之寸口脈弦而大弦則為減大則為芤減則

七



爲寒托則爲虛寒虛相搏此名曰革婦人  
則半產漏下

肝著其人常欲蹈其胷上先未苦時但欲

飲熱者

小柴胡湯

柴胡半斤 黃芩二兩 人參

甘艸

生薑

各三兩

大棗

十二枚

半夏半斤

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再  
煎取三升溫服一升日三服若胷中煩而  
不嘔者去半夏人參加枳實一枚若渴

去半夏加人參合前成四兩半枳實根四  
兩若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩若脇  
下痞鞭去大棗加牡蠣四兩若心下悸小  
便不利者去黃芩加茯苓四兩若不渴外  
有微熱者去人參加桂枝三兩溫覆微汗  
愈若欬者去人參大棗生薑加五味子半  
升乾姜二兩  
傷寒陽脈瀦陰脈弦法當腹中急痛先與  
小建中湯不差者小柴胡湯主之○本大  
陽病不解轉入小陽者脇下鞭滿乾嘔不



能食往來寒熱尚未吐下脈沈緊者○傷寒五六日中風往來寒熱胃脘若滿嘿嘿不欲飲食心煩喜嘔或胃中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者○太陽病十日以太脈浮細而嗜卧者外已解也設胃滿脇痛者與小柴胡湯脈但浮者與麻黃湯○血弱氣盡滕理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作有時嘿嘿不欲飲食藏府相連其痛必

一本黃  
作難

下邪高痛下故使嘔也小柴胡湯主之服柴胡湯已渴者屬陽明以法治之○得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足溫醫二三下之不能食而脇下滿痛面目及身黃頸項強小便黃者與柴胡湯後必下重本渴飲水而嘔者柴胡湯不中與也食穀者噦○傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者○傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與柴胡湯必蒸



蒸振卻復發熱汗出而解○婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時者○傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便秘脈細者此為陽微結必有表復有裏也脈沈亦在裏也汗出為陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此為半在裏半在外也脈雖沈緊不得為小陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡

湯設不了了者得屎而解○本大陽病不解轉入小陽者脇下鞭滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脈沈緊者○若已吐下發汗溫針讖語柴胡湯證罷此為壞病知犯何逆以法治之○傷寒差以後更發熱小柴胡湯主之脈浮者以汗解之脈沈實者以下解之○陽明病發潮熱大便秘澀小便自可胃脇滿不忤者○陽明病脇下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濇然

七

方脈別

卷九



本文  
作又  
成本目  
悉黃作  
面目悉  
黃

弱字下  
一有嘔  
字

汗出解○陽明中風脈弦浮大而短氣腹  
都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不  
得汗嗜臥一身及目悉黃小使難有潮熱  
時時噦耳前後臃刺之小差外不解病過  
十日脈續浮者○嘔發熱者○諸黃腹痛  
而嘔者宜柴胡湯必小柴胡湯○問曰新產婦  
人有三病一者病瘥二者病鬱冒三者大  
使難何謂也師曰新產血虛多汗出喜中  
風故令病瘥亡血復汗寒多故令鬱冒亡  
津液胃燥故大便難產婦鬱冒其脈微弱

也

不能食大便反堅但頭汗出所以然者血  
虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以  
血虛下厥孤陽上出故頭汗出所以產婦  
喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出  
陰陽乃復大便堅嘔不能食者○婦人在  
草蓐自發露得風四肢苦煩熱頭痛者與  
小柴胡湯頭不痛但煩者三物黃芩湯主  
之○大陽病過經十餘日反二三下之後  
四五日柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔  
不止心下急鬱鬱微煩者為未解也與大

古方選別

五



紫胡下之則愈○傷寒十三日不解胃腸  
滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本紫  
胡證下之而不得利今反利者知醫以丸  
藥下之非其治也潮熱者實也先宜服小  
柴胡湯以解外後以柴胡加芒硝湯主之  
○傷寒五六日嘔而發熱者柴胡證具而  
以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯  
此雖已下之不為逆必蒸蒸而振卻發熱  
汗出而解若心下滿而鞭痛者此為結胃  
也大陷胃湯主之但滿而不痛者此為痞

紫胡不中與之宜半夏瀉心湯

小青龍湯

麻黃

芍藥

細辛

乾姜

甘艸

桂枝

各三兩

五味子

半夏

各半升

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升若渴去半夏加栝蒌根三兩若微利去麻黃加薤花如一雞子若噎者去麻黃加附子一枚若小便利少腹滿者去麻黃加茯苓四兩若喘去麻黃加杏仁半升去皮尖傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬

玉函無  
乾嘔二  
字喘上  
有後字



或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者○傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也○病溢飲者當發其汗大青龍湯主之小青龍湯亦主之○欬逆倚息不得臥者○婦人吐涎沫醫反下之心下即痞當先治其吐涎沫小青龍湯主之涎沫止乃治痞瀉心湯主之

小陷胃湯

黃連

兩一

半夏

升半

枳實

仁一枚

右三味以水六升先煮枳實取三升去滓

內諸藥煮取二升去滓分溫三服  
小結胃病正在心下按之則痛脈浮而滑者○病在陽應以汗解之反以冷水瀉之若灌之其熱被卻不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胃無熱證者與三物小陷胃湯白散亦可服

小建中湯

桂枝

生薑

各三

甘草

兩二

大棗

枚十二

芍藥

兩六

膠飴

升一

右六味以水七升煮三升去滓內飴更上

宋版六  
作八二  
作三



微火消解温服一升日三服

傷寒陽脈瀦陰脈弦法當腹中急痛先與

小建中湯不差者小柴胡湯主之○虛勞

裏急悸衄腹中痛夢失精四肢痠痛手足

煩熱咽乾口燥者○婦人腹中痛者○男

子黃小便自利當與虛勞小建中湯○傷

寒二三日心中悸而煩者

小承氣湯

大黃

兩四

厚朴

兩二

枳實

枚三

右三味以水四升煮取一升二合去滓分

温二服初服湯當更衣不爾者盡飲之若

更衣者勿服之

陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重

短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻

裏也手足濇然汗出者此大便已鞭也大

承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未

解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿

不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令至

大泄下○陽明病潮熱大便微鞭者可與

大承氣湯不鞭者不可與之若不大便六

七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯

也



湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞭後必澹不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞭而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也○陽明病讞語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉氣者更服一升若不轉氣者勿更與之明日又不大便脈反微濡者裏虛也為難治不可更與承氣湯也○陽明病其人多汗

一本無後字

一本不受食之下有大便三字

以津液外出胃中燥大便必鞭鞭則讞語小承氣湯主之若一服讞語止者更莫復服○太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便因鞭者與小承氣湯和之愈○得病二三日脈弱無大陽柴胡證煩躁心下鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不受食但初頭鞭後必澹未定成鞭攻之必澹須小便利屎定鞭乃可攻之宜大承氣湯○下

也

古方匯別

百五



利讞語者有燥屎也○大復不通數噦讞語者○傷寒不大復六七日頭痛有熱者與承氣湯其小復清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯

小青龍加石膏湯

於小青龍湯之中加石膏二兩

肺脹欬而上氣煩燥而喘脈浮者心下有水者

小半夏湯

半夏

升一

生姜

升半

右二味以水七升煮取一升半分溫再服

千金本  
渴作不  
渴欲解  
下有本  
渴二字

嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下有支飲故也○黃疸病小復色不變欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必噦噦者○諸嘔吐穀不得下者

小半夏加茯苓湯

半夏

升一

生薑

升半

茯苓

兩三

右三味水七升煮取一升五合分溫再服卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者○先渴後嘔為水停心下此屬飲家者

赤丸方

茯苓

半夏

各四兩

烏頭

兩二

七



千金細  
辛作人  
參

右四味末之內真朱為色煉蜜丸如麻子  
大先食酒飲下三丸日再夜一服不知稍  
增之以知為度  
寒氣厥逆者

燒  
禪散

婦人中禪近隱處取燒作灰

石一味水服方寸匕日三服小便即利陰  
頭微腫此為愈矣婦人病取男子禪燒服  
傷寒陰陽易之為病其人身體重少氣少

細辛  
兩一



腹裏急或引陰中拘攣熱上衝曾頭重不  
欲舉眼中生花膝脛拘急者

明和九年壬辰三月

京都書林

山本長兵衛

林 權兵衛



