校正增圖醫學入門

埽葉山房石印

ヤ 9
1145
5

傷寒序

欲識傷寒之義者。先正傷寒之名。百問云。冬曰傷寒。春曰温病。夏曰熱病。通而言之。爲傷寒者何哉。蓋邪之所湊。其氣必虛。冬月陽氣不密。以致寒邪觸犯。其即發而爲病者。名曰傷寒。其不即發。至春感温氣而發者。名曰温病。至夏感熱氣而發者。名曰熱病。温熱雖發於春夏。而其受病之因。隔冬寒毒藏於肌骨。而自裏發之。故通而言之。爲傷寒也。仲景傷寒立論。萬世典也。河間温暑補方。三時用耳。至於傳經直中。分別陰陽雜症。乃丹溪之獨見。傷寒大義如此。然西北風高。傷寒者多。東南地煖。内傷者多。是以東垣又作内外傷論以辨之。傷寒之書。至此可謂全且備矣。奈何今之醫者。或讀傷寒一二。而不理會雜病内傷。或竊内傷雜病一二。而不理會傷寒。主傷寒者。專一發散。主内傷者。專一温補。内外莫辨。殺人慣矣。陶節菴曰。醫者不可一日不讀傷寒。以活心源。愚謂讀傷寒而不讀三子之書。亦不足以活心源。噫。三世四家之書。缺一不可。

萬歷丙子初夏序

91-1992

編註醫學入門外集卷之四

病機　外感（温暑　傷寒）

河間劉先生温暑纂要

諸風掉眩乃肝木。（掉搖也眩昏亂旋運也由風木旺甚生火風火屬陽陽主乎動兩動相摶為之旋轉）痛痒瘡瘍心火屬。（人近火氣者微熱則痒熱甚則痛附近則灼而為瘡皆火之用也痒者美疾也故火旺於夏而萬物番美或云痛為實痒為虛非謂虛為寒也正謂熱之微甚也痒得爬而解者爬令皮膚辛辣而屬金化辛能散故也瘡瘍屬熱而出濃水猶肉果熱極則腐潰而為水反兼水之化也）濕腫滿本脾土經。（濕地之體也土濕過極則痞塞腫滿物濕亦然故長夏屬土則庶物隆茂也）氣膹鬱痿肺金伏。（膹謂膹滿也鬱謂奔迫也痿謂手足痿弱無力以運動也大抵肺主氣病則其氣膹滿奔迫不能上升至於手足痿弱不能運動由肺金本燥燥之為病血衰不能榮養百骸故指得血而能攝足得血而能步秋金旺則霧氣蒙鬱而草木萎落病之象也萎猶萎也）寒之收引腎水鄉。（收斂引急寒之用也故冬寒則拘縮矣）五運主病樞要目。

諸暴強直。支病裏急。筋縮緛戾。本足肝膽二經。厥陰風木之氣。（暴卒也強直堅勁也支痛支持也謂筋固支持筋縮不柔而痛也緛縮也戾乖戾也謂筋縮裏急乖戾失常而病也然燥金勁切本病反兼金化由亢則害承乃制也況風能勝濕而為燥也風病勢甚而成筋緩者燥之甚也故甚者皆兼於燥也）

諸病喘嘔及吐酸。暴注下迫轉筋難。小便渾濁血溢泄。瘤氣結核瘍疹斑。癰疽吐下霍亂症。膹鬱腫脹鼻塞乾。鼽衄淋秘身發熱。惡寒戰慄驚惑間。笑悲譫妄衄衊污。腹脹鼓之有聲和。少陰君火手二經。真心小腸氣之過。（喘火氣甚則氣盛而息粗也嘔胃膈熱甚火炎之象也吐酸木味為酸如飲食熱則易於酸矣暴注卒瀉火性速故也下迫裏急後重也火燥能令下焦急迫也轉筋熱燥令筋而自轉也小便渾濁寒則水清熱則水濁溢血出於上竅泄血出於下竅瘤氣赤瘤丹熛熱氣勝也結核熱氣鬱結瘍有頭小瘡也疹浮小癮疹也癰淺而大疽深而惡吐下霍亂熱甚氣則傳化失常或下水穀不及變化膹胸膈憤悶或引背痛也鬱熱極則腠理鬱結而氣道不通也腫脹陽熱太甚則腫滿膹脹鼻塞寒主收斂故陽氣不通鼽鼻出清涕衄鼻出血淋熱客膀胱秘大便澁滯熱能耗液故也發熱惡寒邪在表也戰慄

（火熱過極、反兼水化、恐則傷腎、水衰故也、驚心卒動而不寧、或昏惑而志不一、笑火盛、喜發悲、火盛凌金、金不受制、故發悲、譫多言也、心熱神亂則言妄出、妄狂妄也、心熱神昏、則目有所見、衊汚鼻出紫黑血也、）

（腹脹鼓熱甚則氣盛脹滿如鼓、）

痓與強直積飲滯。霍亂中滿諸隔痞。體重吐下胕腫痿。肉如泥之按不起。太陰濕土足二經。脾與從中胃之氣。（痓、痙也、強直、謂強項也、太陽經中濕、令人項強、有剛柔之分、積飲、留飲也、痞、否也、謂氣不升降也、隔、阻滯也、腸胃濕甚則傳化失常、中滿、濕則令人中焦滿也、吐下霍亂、謂腸胃濕飲相兼故也、體重、清陽為天、濁陰為地、濕土為病、體重宜也、胕腫、濕勝於下也、肉如泥、按之不起、濕勝於身也、）

諸熱瞀瘛筋惕惕。悸動搐搦瘈瘲極。暴瘖冒昧躁擾狂。罵詈驚駭氣上逆。胕腫疼酸嚏嘔瘡。喉痺耳鳴聾欲閉。嘔涌溢食下不能。目昧不明瞤瘛翳。或禁慄之如喪神。暴病暴死暴注利。少陽相火手二經。心胞絡與三焦氣。（瞀、神昏而氣濁也、瘛、熱令肌肉跳動、暴瘖、卒瘂也、火盛尅金、不能發聲、冒昧、昏憒也、躁擾、熱盛於外、手足不寧也、狂、謂乖越禮法而失常也、或登高棄衣、熱極故也、罵詈、言之惡也、心火熱極則發惡言也、驚駭、君火化同、氣逆衝上、火氣炎也、胕腫、熱勝於內也、疼酸、火盛制金、不能平木、嚏、鼻中因痒而嚏作聲、人以紙撚擾鼻而嚏作、擾動屬火、鼻屬肺金故也、喉痺、熱客上焦、耳鳴、熱衝聽戶、聾、水衰火盛、氣道閉塞、嘔涌不下、熱盛火炎之象、目昧、熱極則昏、瞤瘛、肉跳也、禁、冷也、慄、戰慄也、如喪神守、火極而似水化也、暴病死、火性速也、）

諸澀枯涸閉乾勁。揭皴起陽明之燥金。肺與大腸氣。（澀、遍身澀不滑澤也、枯、不榮生也、涸、不通流也、乾、不滋潤也、勁、不柔和也、皴揭、皮膚開裂、皆血液病耳、）

上下水液出清冷。癥瘕㿗疝堅痞病。腹滿急痛利白清。食已不饑吐利腥。屈伸不便與厥逆。厥逆禁固太陽經。腎與膀胱為寒水。陰陽標本六氣裏。（上下水出清冷、寒則水自澄清、癥、氣聚之積、或聚或散、無有常處也、瘕、血結之塊、蓋由久於月水沉滯、久而成瘕也、亦有熱者、當以標本明之、㿗疝、足厥陰受寒、則陰腫也、堅痞、腹滿急痛、如水寒則冰硬如地、下利清白、水寒則清淨明白、食已不饑、胃寒則不能消穀、吐利腥穢、水甚不能制火、肺金自盛、故水腥也、屈伸不便、厥逆禁固、謂手足踡攣而冷、）

一十八劑（輕調緩淡、清暑濕、解和平火、奪寒并補甘溫澀、與榮隨症選用、真有古人不傳之妙、乃補仲景之遺亡也、非不遵桂枝麻黃之謂也、一說清平之世、同水化也、雖辛熱之藥、不生他症、擾攘之世、同火化也、若用辛熱之藥、則發黃出斑、變壞之病作矣、蓋人內火既動、外火又侵、所以辛熱發汗、不如辛溫、辛溫又不如辛涼藥也、）

（輕劑）防風通聖散（合益元散、名雙解散、在表當汗者俱宜連進數服、必愈、不解者病已傳變、）

（解劑）小柴胡湯（半表半裏者用、或合涼膈、）

（寒劑）大承氣湯（裏太熱者用、表裏大熱、合大柴胡湯、裏熱甚、表熱漸微者、合解毒湯、）

（吐）瓜蒂散（胸膈喘嘔、陽脈緊甚者用、）

（暑劑）白虎湯（中暑自汗者用、半表半裏者用、或加蒼朮發汗、熱不解、脈尚浮者用解之、或裏熱內盛、陽厥極、皆因失下而成此症、但進涼膈天水、合而為一、調合陰陽、洗滌臟腑、則其他症自不生矣、）

（火劑）黃連解毒湯

（濕劑）三花神祐丸

（補劑）防風當歸飲

（榮劑）四物湯

（溫劑）理中湯

（結胸）大小陷胸湯丸

（心煩不眠）梔豉湯

（煩渴）涼膈散（合去桂五苓散、益元散、）

（清劑）涼膈散（汗吐下後、無異症者用、下早遂成結胸、虛痞、或合天水、或小柴胡、）

（緩劑）大柴胡湯（裏微熱者用、或合解毒湯、）

（調劑）調胃承氣湯（裏熱無脹滿者用、）

（甘劑）天水益元散（傷寒餘熱、以此調之、）

（淡劑）五苓散（中暑白虎解後、多服、或合天水、）

（奪劑）三黃丸

（平劑）四君子湯

（澀劑）胃風湯

（和劑）平胃散

（發斑）涼膈散（加當歸、胸緊加枳殼桔梗、）

（發黃）茵陳湯（調五苓散、）

（痓）承氣湯（合解毒、譫語發黃者並用、○已上一十八劑、二十四方、四十四味、藥品調）

（治温暑初症雜症餘症及雜症痰火濕熱曲盡其妙男婦俱同）

温暑終

仲景張先生傷寒纂要（詳傷寒論百問百症歌活人書活人大全及今陶氏六書王氏家寶與各名家惟陸氏傷寒未覩其書）

嘗聞病皆起於傷寒○治莫精於仲景○一百一十三方○如水有源○（不過汗吐下滲和解温補總方以變化之也）三百九十七法○如夜有領○（不過陰陽表裏虛實而已）惜乎全書亡而後並支離○記性拙而聊從簡省○姑以六經言之○

太陽則頭痛身熱脊強○（此太陽正病也以後凡言太陽症即頭痛身熱脊強也凡言表症者亦即太陽症也各經倣此陽從下起三陽之長曰太陽脉尺寸俱浮浮緊傷寒浮緩傷風太陽受病皆一二日發以其脉上連風府故頭項背腰脊強頭者諸陽之會氣病則麻血病則痛身熱者寒客皮毛欝閉其陽而後發熱陽雖人身正氣欝則為邪為熱熱雖甚不死蓋傷寒始於寒而終成於熱也惟不發熱而但惡寒者邪發於陰也或熱多寒少或不大便而泉清頻數或熱結膀胱溺澁或汗多溺難或汗後不解或汗漏不止或過經不解或蓄血發黃或喘或嘔皆太陽所主）

陽明則目痛鼻乾不眠○（陽為明夾於二陽之中陽氣盛極故曰陽明脉尺寸俱長長而微洪經病長而沉數腑病太陽脉靜則不傳如脉數急欲吐者此寒邪變熱傳於陽明當二三日發以其經中客邪故目痛鼻乾身熱者陽明主肌肉邪甚則身前皆熱不眠者煩盛津乾胃氣不和也太陽未罷者發熱惡寒太陽已罷者不惡寒而反惡熱煩渴作嘔津乾便難或即狂言謂之正陽明少陽陽明腸痛不大便而嘔或瘀血發黃或下血譫語或胸煩懊憹皆此經所主然亦有裏寒下利或寒氣結積而為痼瘕者不可不知）

少陽耳聾脇痛○寒熱嘔而口為之苦○（少初也陽氣初嫩亞於陽明故曰少陽脉尺寸俱弦弦而滑數者陽極發厥弦而和者病欲散少陽受病當三四日發以其脉循脇絡於耳故風熱上壅不利則耳聾脇痛寒熱往來不食嘔而口苦乾目眩若不嘔吐而能食者為三陰不受邪也若身無大熱燥悶者陽去入陰無疑矣似瘧婦人血結皆此經所主）

太陰腹滿自利○尺寸沉而津不到咽○（陰從天降首曰太陰在陽為表在陰為裏邪在表則見陽脉邪在裏則見陰脉故尺寸俱沉沉實有力當下沉細無力當温太陰受病當四五日發以其脉布胃中絡於咽喉故腹滿或痛而嗌喉下乾燥或大便不通小便如常或自利手足温而渴者為傳經腑熱或自利不渴手足冷者為直中陰症或因內傷飲食冷氣入脾必腹痛胸膈不快然太陰乃三陽之終三陰之始陽經表症未盡宜汗半表裏胸滿多痰宜吐傳經裏熱宜下直中陰經宜温調脾勝邪正在此關）

少陰舌乾口燥○（次於太陰故曰少陰脉尺寸俱沉沉實有力當下沉微無力當温少陰受病當五六日發以其脉起於足心貫腎絡於肺繫故舌乾口燥而渴或自利清水心痛腹脹或大便閉難不欲厚衣者皆熱入裏之深也若厥逆畏寒欲吐不吐腹痛自利小便白色或乾嘔亡陽咽痛脉微欲寐者乃陰毒入臟之深也或下利體痛咳嘔者水氣也或飯食入口則吐脉弦遲厥逆心下實者不可下者宜吐之或脉沉發熱者汗之蓋有初得病直攻少陰不先自太陽傳次而入也）

厥陰煩滿囊拳○（厥陰者陰盡則變而厥逆生蓋傳經至此已盡無復可傳再傳則逆於手經矣脉尺寸俱沉沉實有力當下沉實無力當温浮緩者病自愈厥陰受病當六七日發以其脉循陰器絡於肝故唇青舌卷或煩滿者胸中氣滿急也或囊拳者陰囊縮也在女子則陰戶急痛引小腹此經傳厥陰風熱毒深於內也肝木殺熱尅脾脾受賊邪五臟六腑皆困榮衛不通耳聾囊縮而厥水漿不入不知人則死速下以救五死一生或下利譫語者內有燥屎也仍宜下之或嘔而發熱者和之或發熱惡寒如瘧囊不縮脉微浮微緩胃之脉脾氣既全不受賊邪榮衛將復水升火降寒熱作而大病解矣或下利腹脹身痛者當先救表而後温裏若下利清穀大汗出而厥四肢痛小便拘急或乾嘔吐沫或氣衝心痛發熱消渴吐蛔皆厥陰寒症也宜温之已上正文六言乃萬病之祖非得之內經不能六言包括無遺如此凡言六經所見之症即此三陽三陰經症也雜病亦然）

經絡難拘日數○（經云一日足太陽膀胱之經二日足陽明胃之經三日足少陽膽之經四日足太陰脾之經五日足少陰腎之經六日足厥陰肝之經又云傷寒不加異氣不傳經者七日足太陽病衰手太陽受之頭痛少愈八日足陽明病衰手陽明受之身熱小歇九日足少陽病衰手少陽受之耳目微聞十日足太陰病衰手太陰受之腹減如故則思飲食十一日足少陰病衰手少陰受之渴止舌乾已而嚏十二日足厥陰病衰手厥陰受之囊縱少腹微下大氣乃止病再傳六經有自安者活人云一二日可發表而散三四日宜和解而痊五六日不解便實方可議下此皆論其常耳解惑篇云病人有虛實邪氣有遲速豈可拘於日數日雖多尚有表症而脉浮數猶當發汗日雖少已有裏症而脉沉細即當下之但隨症虛實與脉而汗下之陶節菴云但見太陽症即用麻桂汗太陽見少陰症即用四逆温少陰見陽明症即用承氣下陽明見真寒症直入陰經即救真寒此最活法有循次傳者天運主氣者初氣厥陰風木二氣少陽相火三氣少陰君火四氣太陰濕土五氣陽明燥金六氣太陽寒水人生順受其氣病則逆其氣而傳變自下而上自內而外究其所以然者陽主動而位外陰主靜而位內人身膀胱氣血之會自頭背至足無所不主故風寒每先犯之其次胃氣流行無息自鼻腹至足皆其所主故太陽行督而交

（任必及於陽明也又其次少陽清氣主行榮衛脇肋身側皆其所主故胃邪必移於膽部此三陽皆身之外而動者故為表至於太陰人身五臟脾為死陰至靜不動其所消食者全賴胃氣升降故自少陽脇肋下肚腹宜乎先入太陰也其次腎主受米穀之精而至靜惟子時濁氣一動而已故自中腹移至臍腹必及於腎也又其次肝惟主藏血藏血而極其凝靜者故入裏之深至於小腹而下行已極乃復上行於手經此天然之序不可亂者如此若夫太陽自傳於太陰作渴溺澁因誤滲也太陽併傳陽明者當用麻黃而反用葛根以引之也太陽越經傳少陽者當用麻黃而反用柴胡以引之也太陽傳少陽者當用桂麻而反下以陷之也太陽傳太陰者當用桂枝而反下以入之也此醫之誤而亂其傳之序也又有太陽即傳厥陰頭項痛甚二經脈絡相接同督脈而上行也有太陽傷風以致陰血自燥熱蓄膀胱逆傳小腸與心謂之寃熱有風寒自背入者直中太陽少陽自面而入者直中陽明有首尾只在太陽經而不傳諸經者有間傳一二經者有不傳而罷者有不罷再傳者有不自陽經直中陰經者此邪無定體不可拘於日數也活人云六氣之邪乘虛之經得之）

標本須明後先。（標者稍末本者根本以主言之各經絡為標各腑臟為本如太陽經為標膀胱為本餘倣此以客邪言之先受病為本次受病為標標本相傳治其急者請詳言之太陽膀胱為本故頭痛脊強小腸為標與心為表裏故發熱冬月麻黃桂枝餘月九味羌活湯陽明大腸為標與肺為表裏故微惡寒發熱為經病葛根解肌湯渴而有汗不解者白虎湯胃為本目痛鼻乾潮汗閉澀滿渴狂譫為腑病調胃承氣湯少陽三焦相火為本遊行一身故微熱膽為標耳聾脇痛寒熱嘔而口苦緣三焦無形膽無出入之路故從中治標本俱小柴胡湯太陰肺為標咽乾身目黃脾為本腹滿痛謂之腑熱咽乾腹滿手足溫者桂枝加大黃湯或大柴胡湯身目黃者茵陳湯腹滿者瓜蒂散如自利不渴或嘔吐者屬臟病理中湯丸少陰心為本故舌乾口燥或遶臍硬痛或心下硬痛或下利純清水或譫語便閉小承氣湯腎為標面寒如刀刮唇青不渴吐利胸腹絞痛四肢厥逆指甲黑踡臥身如被杖苦姜附湯厥陰心胞絡為標故舌卷厥逆冷過肘膝吐利嘔逆不渴小腹絞痛者為寒三味參萸湯四順湯肝為本主男子囊縮女人陰挺乳縮或手足乍冷乍溫大便實消渴煩滿者屬熱大承氣湯似瘧不嘔二便自調者必自愈不愈脈遲有汗者小建中湯脈濇無汗者桂麻各半湯其囊乳縮症寒症亦有之此萬法之祖也學者於此而一悟焉則病機到手矣自非仲景玉函內秘其孰能與於斯乎此後汗吐下溫和解諸方不甚詳載止言宜汗宜吐宜下宜利悟之）

寒傷榮而風傷衛太陽為之首爾。（榮行脈中在血脈其病深衛行脈外在皮膚其病淺榮血陰也陰主閉藏故寒喜傷榮而無汗衛氣陽也陽主開泄故風喜傷衛而有汗然豈獨太陽為榮衛之會而有風寒之別乎陽明善饑為傷風不食為傷寒少陽耳聾胸滿而煩為傷風口苦咽乾目眩為傷寒三陰傷風但四肢煩疼耳太陽為之先者傷寒因腎水虧損至春木無生意故發為溫病至夏絕生化之原發為熱病所以太陽少陰二經受病最多最先）

經可解而腑可下。陽明為之主焉（表多裏少為在經宜清肌解表裏多表少為在腑宜和肌通裏蓋陽明標雖主肌而其本則胃也然豈獨陽明為十二經之長而有經腑之異乎仲景曰三陽受病未入於腑可汗而已三陰受病已入於腑可下而已則三陰有在經者仍宜微汗之蓋榮衛屬太陽主皮毛胃腑屬陽明主皮膚之下肌肉之上及腸胃也胸脇屬少陽主血榮百節流行三部臟屬三陰主筋骨併兩足故太陽為陽症之表胃為陽症之裏若但以臟腑而分表裏則腑為表臟為裏若合榮衛臟腑而分表裏則表者榮衛之所行裏者胃腑之所主而臟則又深於裏但病入胃則亦不更傳不可不知）

少陽原從乎中治。禁汗禁下。（少陽居太陽陽明之中半表半裏禁汗恐犯太陽禁下恐犯陽明禁滲恐生發之氣陷入陰中只宜和之以小柴胡湯犯三禁則變不可勝他如太陽經禁下與滲犯之則動血熱入裏而難解陽明經禁汗與滲犯之則竭津血蓄下而如狂益津液者連鬚葱白湯是也又下症中治見合病）

三陰利用乎變法有中有傳。（三陰最不可執有宜下者有宜溫者自三陽氣分傳入三陰謂之傳經陰症傳非傳人脾腎肝也乃入三陰血分胃與大小腸之府也故仲景謂已入於府可下者是也若不自陽經傳來直中三陰之經初起厥逆腹痛自利不渴太陰自受寒也上症加之嘔吐少陰自受寒也又加之小便府利厥陰自受寒也熱藥溫之猶恐或遲陰陽一差生死立判雖然傳經直中先賢發之盡矣然豈無傳變者乎假如傳經之際輕生者或被生冷或犯房慾或粗工猛施汗下真氣衰弱陽症變為陰症如俗所謂陽症歸陰仍宜直中寒症治法故內經止言傳變而不言直中者蓋言變則包直中今局方言傳陰傳陽則不是當言傳陽變陰庶乎傳陰為裏熱直中與變為裏寒臨症參脈直中三陽傳經三陽病在於表脈浮長亟傳經三陰病在於裏脈沉數實直中三陰病在於經脈沉微緩此表裏虛實大分非專以陽為熱陰為寒也）

謂傷足而不傷手則可。以陽為足之所司。（手之六經主於春夏足太陽少陽正司冬令觸冒之者則二經受病其次則少陽厥陰繼冬而司春令至春分後方行溫令故風寒亦能傷之足陽明與冬本無與然寄旺四季寒熱溫涼之氣皆能傷之況表邪傳裏必歸脾胃而為燥糞用湯藥下之而胃和矣）

謂傳足而不傳手不可。蓋熱為手之所寃。（人身之氣每日周行三百六十五骨節以應周天三百六十五度血亦隨氣運行腠理以為一身動靜云為之主所以一脈愆

和百脉皆病況風寒中人先入榮衛晝夜循環無所不至豈間斷於手經哉七日不愈而再傳者乃足經移熱傳於手經如冤家之相擾也雖然手冤亦推本言耳上古只分三陰三陽而不分手足其意甚深況手足三陽同手走頭至足手足三陰同足走胸腹與手豈有經絡同而受病又有不同者哉即如喘咳發熱分明手太陰太陽病也狂言譫語分明手少陰病也胸滿乾嘔耳聾分明手厥陰少陽病也認真五臟六腑俱有表裏二症蓋人之情慾天之淫邪自然不齊故病多標本兼見假令脉弦面青目痛筋急善怒心下滿者兼肝有風也脉洪而赤口乾善笑身熱者兼心有熱也脉緩面黃身重肢疼嗜臥者兼脾有濕也脉澀面白帶憂喘嗽下衄者兼肺有燥也脉微面黑善恐耳閉氣逆而泄兼腎有寒也凡邪出於外則為腑為表入於內則為臟為裏不拘何臟何腑表症必同歸於太陽裏症必同歸於陽明噫法無定用病有定體如此則百病機關一悟可了又何疑於手經之不受病耶

右一段論六經正病

表可汗而裏可下。表症屬太陽凡見頭痛發熱惡寒清便自調腰項脊強脉浮緊者即是表症不拘日數多少便宜解表不宜下滲有汗為表虛宜解肌無汗為表實宜發汗但發汗亦有輕重不同古謂春夏宜汗者借天時而喻陽邪在外也其實春月陽氣尚微秋月陽氣欲斂俱不可大汗夏月天氣熱玄府開不必大汗冬月陽氣伏藏感冒輕者尤不宜汗惟傷寒重者時令嚴慄皮毛堅緻非大汗無由得散不得已而從權也至於陰症但厥無汗者妄汗動經則死或有表邪身熱微汗以散之可也。裏症始焉脉浮而大今則沉而數始焉惺而靜今則躁而動始焉頭痛發熱惡寒今則不惡寒反惡熱煩燥倍加胸連臍腹滿痛腋下掌心自汗濈濈以致胃乾糞燥大便不通小便赤澀口渴發狂譫語揭衣擲被揚手擲足六脉有力即是傳經熱症又謂陽盛誤汗即死或有初病即見此症者不拘日數多少便宜通利失下則血氣不通而發厥矣抑又有說焉純乎表而裏無一毫病者當解表時勿攻裏純乎裏而表無一毫病者當攻裏時勿解表如表裏俱見或表多裏少表急裏緩則先治其表而後攻其裏或裏多表少裏急表緩則先攻其裏而後救其表也又表虛裏實則藥宜辛涼裏虛表實則藥宜辛熱皆以裏為主內氣正而後可以治表雖莫急於內表亦不可緩也表裏虛實而醫之大分明矣

表裏半者宜吐與和。凡病或渴或不渴或胸中煩或不煩或嘔不嘔或腹脇痛不痛或咳或心下悸或小便不利或有為之症少陽所主也邪在表則多寒邪在裏則多熱邪在半表裏則寒熱往來邪在表則心腹不滿邪在裏則心腹脹滿邪在半表裏則胸脇滿邪在表則呻吟不安邪在裏則狂言亂語邪在半表裏則欲言不言邪在表則小便清而易邪在裏則小便濁而難邪在半表裏或利或不利邪在表則不煩不渴不嘔邪在裏則煩滿而渴故或煩或嘔者邪在表方傳裏也若見耳聾脇痛寒熱嘔而口苦胸脇緊滿脉見弦數者即是半表半裏脉大胸滿多痰者或挾宿食可吐百問云氣浮上部塡塞心胸頭痛名逆此吐症也內經云其高者因而越之脉雖大無猶疑者不可吐只當和解古謂春宜吐者順陽氣發生於上也秋冬宜下者順陽氣收斂於內也此亦道其常耳有病皆當從權

陽可寒而陰可熱。槩言之三陽經病即陽症手之三陽從頭走足故頭疼身熱云云三陰經病即陰症足之三陰從足走腹故腹痛自利云云然陰陽俱有表裏二症陽症表裏同歸於熱而已陰症表裏似陽入裏則有傳經直中之殊大抵陽症之表發熱惡寒清便自調面光聲亮鼻息往來如常手足溫陽症之裏唇焦舌燥爪甲紅活身輕易於轉側煩渴揭衣揚手擲足大便或閉或難小便或赤或澀脉浮洪數宜汗吐下利四法以治之陰症之表無熱惡寒面慘聲短鼻息往來氣冷手足厥逆陰症之裏唇紫舌卷爪甲青黑身重難於轉側不渴引衣臥多蜷足大便泄利小便清白脉細沉微每與陽症相反蓋陽症自下而上故初起有頭疼陰症則無頭疼也陽症自外傳入故鬱而為熱陰症則無身熱而反厥冷也陽症搖手擲足陰症則臥多蜷足陽症內熱而渴陰症則不渴陽症二便閉陰症二便清且利也惟有腹痛與嘔陰陽二症俱有然陰脉沉微凡言陽症多得之風寒暑濕邪生於太陽也凡言陰症多得之飲食起居喜怒邪生於少陰也故云傷寒挾內傷者十居八九此陰陽正病也

陰陽極者從治非訛。陽邪不深不能至於厥逆陰邪不甚不能至於煩躁此水極似火火極似水謂之反化亢極則害之義也陽症潮汗秘赤滿渴狂譫甚則斑血喘急然熱極忽然熱伏於內故身寒四肢厥逆狀若陰症但身雖冷而不欲近衣神雖昏而氣色光潤脉必沉滑而有力此陽極似陰也宜大柴胡湯下之或白虎湯竹葉石羔湯陰症厥冷吐利不渴靜蜷甚則咽痛鄭聲然寒極忽然火浮於外發躁擾亂狀若陽症然身雖煩燥而引衣自蓋口雖煩渴而飲水不下脉必沉細無力此陰極似陽也宜通脉四逆湯從治者反攻也熱藥冷飲冷藥熱飲或熱藥為君而佐以涼藥或冷藥為君而佐以熱劑亦非判然如庸醫之差訛也皆有熱病服熱藥而愈者必先服寒藥過多寒病服寒藥而愈者必先服熱藥過多故耳若夫以寒治熱以熱治寒此為逆治逆治者正治也正治之法人孰不知之乎

表裏俱熱不可犯上犯下。傷寒頭痛寒熱表也口失滋味腹中不和或閉或泄裏也若四五日後以至過經十三日既無表症又無裏症身微熱者虛熱耳小柴胡湯和之不可汗吐以犯上焦清氣不可大下以但下焦胃氣身熱目中不了了睛不和大便難者乃可大柴胡小承氣下之設或已下而脉數消穀善饑六七日不大便者瘀血症也

表裏俱有察其孰少孰多。表裏俱見必分多少治之脉浮而大為表煩渴尿赤為裏五苓散主之頭痛身熱便閉為裏水便清利為表桂枝湯主之心滿不食便閉為裏惡寒頭汗為表小柴胡湯主之太陽病因下早而脇熱下利心痞鞕者謂之表裏不解桂枝人參湯太陽病因下早而腹痛有積者謂之太陽太陰又謂之裏傳表桂枝加芍藥湯甚者加大黃太陽病下早利不止脉促喘而汗出表未解也葛根芩連湯脉弦胸滿者梔豉湯吐之通治表多裏少者白虎湯或合小柴胡湯裏多表少者五苓散或合小柴胡湯表裏俱急者防風通聖散大柴胡湯

當汗而下則為瘀血懊憹痞氣結胸之患。（太陽症脈浮緊者宜汗而汗之不解者再與汗之若失其汗則寒邪傳經當看傳過何經變出何病若應汗而反下滲表邪乘虛內陷則熱蓄於裏變為瘀血懊憹痞氣結胸等症）

當下而汗則為悸惕亡陽譫語厥竭之病。（裏症具而脈沉實者宜下若下後熱不退脈未和者猶當量虛實再下若失下則邪無從出又或應下而反汗之則津液內竭變為動悸等症）

不可汗諸虛咽瘡。淋血壞症。動氣與風溫風濕脈遲。（可汗者脈症全在表也然太早太過則津液竭而變生焉有不可汗者諸虛損咽乾口燥咽痛瘡瘍淋瀝經水適至諸血失注沫咳嗽壞症胸中上下左右動氣風溫風濕瘟脈遲微濇者或厥而脈緊者俱宜和解不宜汗若強發之病微者難瘥劇者言亂目眩而死）

不可下諸虛咽腫。嘔厥結胸。動氣與脈浮脈虛帶表。（可下者脈症全在裏也然太早太過則水穀脫而變生焉有不可下者諸虛咽腫嘔吐厥逆結胸不轉失氣臍中左右上下動氣脈浮細虛微濇帶表惡寒等症下之則危隨宜以溫熱藥救之）

陰虛挾火而脈數。不可灸之者消。（陰陽二毒及少陰症吐利及口和皆惡寒脈微濇屬陽虛者宜灸陰虛挾火脈微數者不宜灸蓋外火能助內火火炎則下體必重痺骨焦自消或因此遺精潮咳見紅皆火氣之所使也活人云凡灸後燒針後症與火邪發狂者同小柴胡加龍骨牡蠣治之）

膈寒肢冷而脈微。不可吐之者夭。（膈上寒飲乾嘔少陰病也四肢冷胃虧也脈微下虛也誤吐內傾損傷元氣逆致不救者有之若應吐而反溫之則毒氣欝結於胃而為發狂等症）

急下以救水存液之機甚微。（傷寒熱氣入臟流於少陰之經咽路焦口燥渴腎水乾也熱病熱不已目睛不和亦腎水乾也皆急下以救腎水陽明發熱汗多或已汗不解腹滿痛及狂譫不大便者皆急下以存胃液傷寒脈弦而遲弦為寒遲為臟脈大而緊大為陽緊為寒俱謂之陽中伏陰急下以分陰陽又下利三部脈平心下鞕者內實也下利脈遲而滑或浮大按之反濇惡食者皆胃有宿食也但宿食忌巴霜只宜大黃湯滌）

急溫以和陽止嘔之功非小。（脈沉厥冷膈上寒飲乾嘔或時頭痛皆寒氣上攻也急溫之三味參萸湯內寒已極厥逆吐利不渴靜蜷陽和之氣欲絕六脈若有若無急溫之四逆湯

凡言急者病勢已篤將有變革非若他病可以緩也他如太陽汗出不止汗後惡風汗後煩燥心悸身痛皆宜急用附子加以桂枝芍藥之類三陽脈遲腹痛建中湯當先施也但一服中病即止傷寒之藥皆然）

過經不解汗下從輕。（傷寒六日傳經一遍七日當解再傳至於十三日以上不愈謂之過經汗下失宜以致邪氣留連不已神昏譫語胸滿潮渴隨其表裏症見而調之或從輕再汗再下如脈亂發躁尺寸陷者危如脈緩安睡邪未淨者正未復耳參胡芍藥湯調之有大便下利而脈和者如醫以丸藥下之停留餘熱凡過經氣虛或加異氣宜與壞症參看）

尺遲暫補何忌。（凡尺寸遲弱血少也不問風寒初症雜症俱忌汗吐下宜先以小建中湯或黃芪建中湯救脈如素實者小柴胡湯亦好俟脈不遲方可施治）

發表攻裏溫裏之方。扶陽助陰抑陰之義。（此陰陽指表裏言病者為虛不病者為實表病裏和則邪出於外而為陽虛陰盛故發表不遠熱而用辛甘之劑所以扶陽也裏病表和則邪入於內而為陰虛陽盛故攻裏不遠寒而用酸苦之藥所以扶陰也若陰經自受寒邪則為藏病投陰陽氣將脫急宜辛熱回陽抑陰或曰桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛乃亡實實虛虛損不足而益有餘醫殺之耳此汗下之機樞）

法以得中為貴。不及愈於太過。（法謂汗吐下溫解五法各有不同汗有大汗發表微汗解肌後別輕重下有急下少與微和滲利以分清濁溫有兼補者吐有宣湧探引或只寬利而不敢吐者和解則一而已或曰傷寒無補法熱氣得補復盛更復下之是重困也惟虛煩裏寒陰症不在此例得中者五法洞中懸劇太過者粗工猛進不及者中工縱緩從輕凡傷寒汗下藥一服中病即止不必盡劑與雜病不同傷寒不過汗吐下三症若用之得當有何傳變全在醫者精明審處之耳）

症有似是而非。不知盍可不治。（傷寒題目未定之時不知有無風濕勞役痰食等項相兼似是而非最宜詳辨故不知者盍可不治班固有言曰有病不治得中醫倘一藥之誤悔將噬臍噫古以醫藥救夭札今以醫藥治其生治生可也而誤人於死豈不與謀刼者同哉慎之慎之）

右一段論表裏陰陽汗吐下溫解五法

傷寒惡寒無汗而手足微冷。（霜降後春分前人有衝斥道途履霜踏冰冒犯寒氣即發為病名曰傷寒必先惡寒頭痛甚鼻無涕其聲前輕後重口中和雖不食亦不惡食手足不熱病深重者必身痛發熱冬月麻黃湯輕淺者陶氏麻黃湯虛者人參順氣散三時羌活冲和湯小柴胡湯通用麻黃杏仁飲此專辨無汗為傷寒蓋風暑濕皆有汗惟寒泣血無汗至於初症傳變雜症俱詳後段）

傷風惡風自汗。而手足微煩。傷風初症。惟頭痛口和。不惡食。與傷寒同。緣寒乃陰邪。風乃陽邪。所以傷寒鬱而後能發熱。傷風即能發熱。傷寒手足微厥。傷風手足背皆熱。傷寒鼻無涕。傷風鼻流涕。其聲如自甕中出。傷寒面慘身痛。傷風面光身重。傷寒無汗惡寒。不惡風。傷風有汗惡風。不惡寒。甚者自汗出不止。洒洒惡風。復嗇嗇惡寒。冬月桂枝湯。自汗小便數者芍藥甘草湯。自汗小便利。脚踡急者桂枝湯加參附。輕者柴胡桂枝湯。自汗渴而小便難者。邪漸傳裏。五苓散。自汗不渴者。邪在表。茯苓桂甘湯。三時防風冲和湯。柴胡桂枝湯。或敗毒散去茯苓。鼻塞通關散。通用柴胡半夏湯。古立六經傷風。方見後桂枝湯下。但三陰藥皆辛熱。似非傷寒家法。仲景治傷寒傷風表症。分有汗無汗。裏症同於和解通利。更無分別。今詳桂附入肋。恐亦風邪直傷陰分。其人素虛。或房室後傷風則可。若槩作表藥。誤人多矣。蓋傷風發表。辛熱不如辛溫。辛溫不如辛涼也。或疑六淫。仲景獨詳於風寒。而畧於暑濕。且不及燥火何也。蓋暑火同氣。燥濕同源。風寒傳變六經。暑濕性偏。着人五臟。壯者氣行則已。怯者乃着為病。故耳。前所謂嗇嗇不足也。洒洒洒淅也。皆惡風之貌。

治表裏急。治裏表急。陰同於陽為兩感。兩感者。半入於陽。半入於陰。陰陽兩感。臟腑俱病。一日太陽與少陰俱病。頭痛為太陽邪盛於表。口乾而渴為少陰邪盛於裏。二日陽明與太陰俱病。身熱譫語為陽明邪盛於表。不欲食腹滿為太陰邪盛於裏。三日少陽與厥陰俱病。耳聾為少陽邪盛於表。囊縮而厥為厥陰邪盛於裏也。五臟六腑俱病。欲治表而裏急。欲治裏而表急。必死之症。但稟氣實而感邪淺者。或挾異氣。或挾風濕之類。猶可救療。所以仲景有治有先後發表攻裏之說。法當審其表裏緩急虛實何如。如表裏俱急者。大羌活湯主之。如陽症陽經先受病。身體痛而不下利者。為表急。先以葛根麻黃發表。後以調胃承氣攻裏。如陰症陰經先受病。身體痛而下利不止者。為裏急。先用四逆救裏。後以桂枝救表。陰陽未分者。陶氏冲和湯探之。古法一日太陽少陰。五苓散主之。頭痛加羌活防風。口渴加黃柏知母。二日陽明太陰。大柴胡湯。三日少陽厥陰。危甚大承氣湯加川芎柴胡主之。活人不分陰陽。專用四逆桂枝。先輩皆以為謬。大抵兩感脉從陽可治。從陰難治。

傷風見寒。傷寒見風。脉不合症而相反。先傷寒而後傷風者。症傷寒也。而見傷風之脉。先傷風而後傷寒者。症傷風也。而見傷寒之脉。此乃榮衛俱實。故無汗而煩燥。大青龍湯。不煩燥者。桂麻各半湯。通用大羌活湯。九味羌活湯加人參大棗。或神朮散。香蘇散。

三陽合病。有自利而汗下。審在經入府。或一陽先病。二陽隨病。或二陽同病。或三陽同病。不傳者。謂之合病。○自利者。下利溏泄。三陽合病。寒邪甚而裏氣不和也。氣行下則利。氣逆上則嘔。太陽合陽明。自利惡寒者。升麻葛根湯。惡熱者。白虎湯。太陽合少陽。自利者。黃芩湯。嘔者並加半夏生姜。陽明合少陽。自利。敢重小柴胡合升麻葛根湯。○有宜下者。本太陽病因汗下滲亡津液。胃府燥實。轉屬陽明。謂之太陽陽明。脾約丸潤之。本少陽病。因汗滲熱入胃府。大便燥者。大柴胡微下之。本陽明經病。熱盛傳入胃府。謂之正陽陽明。乃本經自病也。宜調胃承氣湯。從中治之。蓋太陽少氣。少陽少血。惟陽明居二陽之中。氣血俱多。所以從中治。陽明而不敢犯太陽少陽也。又三陽合病。面垢腹脹痛。身重難轉側。譫語遺溺。口燥不仁。大便難者。白虎加參湯主之。不可汗下。亦中治法也。○有宜汗者。表症頭疼惡寒未除。為太陽尚未過經。尤宜發汗。如太陽陽明。喘而胸滿者。麻黃湯。太陽少陽。麻黃湯合小柴胡湯。通用九味羌活湯。加石膏知母枳殼。蓋在經則汗。過經則下也。

三陽併病。可汗而攻。通必傳胃歸根。併者。催併逼迫之意。始初二陽合病。後一陽氣盛。一陽氣衰。併歸一經獨重。初症亦不解罷。陽明併太陽者。太陽症未解。陽明症又至。麻黃湯合升麻葛根湯。如太陽症重。加太陽經藥。陽明症重。加陽明經藥。後倣此。少陽併太陽者。太陽症未解。少陽症又至。麻黃湯合小柴胡湯。頭痛項強眩冒。如結胸狀者。亦宜通用九味羌活湯。少陽併陽明者。為木尅土。難治。小柴胡湯合升麻葛根湯。柴胡升麻湯救之。是併病在表者。皆可汗。若太陽症罷。乃入胃府者。謂之傳經。非併也。宜量體攻下。舊云三陰無合併。三陽無三陰。亦有自相合併者。但非兩感。必無陰經與陽經合併之理。

但聞疫癘能傳染。疫疾如有鬼癘相似。故曰疫癘。又曰時氣。春應煖而反清。夏應熱而反涼。秋應涼而反大熱。冬應寒而反大溫。非其時而有其氣。凡感之者。即發頭疼身痛寒熱。一方長幼病皆相似。治與傷寒微異者。春清責肝。升麻葛根湯。夏熱責心。二香散。調中湯。秋濕責肺。白虎加蒼湯。茵陳五苓散。冬寒責腎。萎蕤湯。甘桔湯。土旺四季。隨經取之。治與傷寒同者。表症敗毒散。半表裏小柴胡湯。裏症大柴胡湯。挾內傷者。宜補宜散宜降。人中黃丸是也。經曰。疹氣不拘於診。更當於運氣求之。凡入疫家。用麻油服之。或紙撚蘸麻油并雄黃硃砂末。探入耳鼻內。最能辟穢毒之氣。遍滿鄉村。善用如意丹亦妙。

豈知正氣亦多愆。經曰。春氣溫和。夏氣暑熱。秋氣清涼。冬氣冷冽。似傷寒為毒者。以其最成殺厲之氣也。其有傷於四氣。留在何經。而發何病。大槩春傷於風。夏必飧泄。夏傷於暑。秋必痎瘧。秋傷於濕。冬必咳嗽。冬傷於寒。春必痎瘧。痎者二日一發。瘧者一日一發。秋傷於濕。不即發者。及冬風寒相搏。痰涎生而為咳嗽。冬傷於寒。不即發者。及春溫氣相搏。變為溫病。是四時正氣。亦能愆和。如此皆因發動之時。逆推致病之源。非受傷之時。預擬今日之病。故有久而消散。不成病者。豈可執一論哉。但稍覺氣淫於內。心腹不快者。不換金正氣散加減。以正胃氣。

春變為溫。夏變為熱。溫病者。春分病有太陽病。發熱咳嗽。身痛口渴。不惡寒。其脉弦數不緊。右手反盛於左手。蓋拂熱在內故也。或散在諸經。各取其經而取之。熱病即與溫病同。但發在夏至後。脉洪數。熱渴更甚耳。雖因冬時受寒。伏於肌骨。然人身隨天氣化。春分則寒變為溫。夏至則寒變為熱。所以傷寒惡寒而不渴。溫熱不惡寒而渴。不惡寒則病非外來。渴則自內達表。熱鬱腠理。不得外泄。乃

復還裏。終是裏多表少。間有惡寒者。乃冒非時暴寒。或溫暑將發。又受暴寒。非冬症之甚也。法當治裏熱為主。而解肌次之。亦有專治裏而表自解者。誤下猶可。誤汗則變為嘔噦狂斑而死。蓋溫熱在經而不在表。安可例用傷寒汗法。惟兼暴寒者。乃可表裏雙解。亦不敢用冬月辛溫之藥。○春溫表症。天溫升麻葛根湯。天寒柴胡桂枝湯。太陽合少陽敗毒散合小柴胡。太陽合陽明敗毒散合升麻葛根湯。陽明合少陽升麻葛根湯合小柴胡湯。半表裏小柴胡症。裏大柴胡。重者一時表裏俱發。防風通聖散。表裏俱熱。大便自利者。柴苓湯加山梔木通。虛煩竹葉石羔湯。變雜症悉同傷寒。○夏熱表症。太陽九味羌活湯。汗後煩渴脉洪大。背惡寒者。白虎加參湯。益元散。裏症大柴胡。重者一時表裏盛發。雙解散。熱病脉細無力。足冷。已得汗而躁盛者。此陰脉之極也。必死。詳溫暑門

晚發疑為秋病。質諸高明。（先輩云。清明至夏至前太陽病者。謂之晚發。比之溫病稍輕。蓋以感之輕者發之早。感之重者發之遲。從立秋至霜降。有患太陽症者。亦名溫病。治法同溫熱但加燥劑於解肌藥中。裏症一同傷寒。但既以三月至夏至為晚發。春分前又為正傷寒。不知春溫在於何月。更考三月至夏至前名為春溫。則晚發當屬於秋矣。立秋前後病者。因濕熱而發。處暑後病者。因燥熱而發。庶乎四時六氣備而不混。而治之各隨其時耳。大槩表症九味羌活湯。梔子升麻湯。裏症大柴胡湯加生地。或導滯通幽湯。變雜症者。隨宜施治。）

冬溫總是時行。加乎調變。（冬有非時之煖。名曰冬溫。與春秋暴寒暴溫。總謂之時行氣。與傷寒相似。但脉不浮耳。治法大同春溫表症。姜蘇湯。九味羌活湯。入裏加大黃。重者雙解散。輕者加減調中湯）

靜而得之為中暑。動而得之為中暍。（暑暍皆自汗煩渴。脉虛面垢昏倦。靜而熱傷心脾為中暑。與夏熱病相似。但熱病脉洪緊。中暑脉細數而沉。動而熱傷太陽為中暍。脉浮似夏傷風。但汗出惡風。身熱而不渴者。傷風也。汗出惡寒。身熱而渴者。中暍也。加之身痛且重者。必夏月傷冷。或澡浴水行皮中所致。○中暍心腹疼痛。霍亂吐瀉轉筋。甚則發厥昏悶。香茹散。痰逆惡心惡寒者橘皮竹茹湯。汗多渴而不惡寒者。竹葉石羔湯。暑濕相搏。身痛頭痛。煩渴惡心。尿赤者。五苓散。濕盛胸滿者。瓜蒂散吐之。若小便已洒然毛聳。口開前版齒燥黑。肢厥。小勞身即熱者。表裏俱病也。白虎加參湯。有濕者。白虎加蒼湯和之。切忌汗下針灸。汗則惡寒。下則內虛變淋。灸則動火發熱。○中暑發熱煩躁口渴者。小柴胡湯加香茹。瀉利口渴者。香茹散合四苓散。元氣素弱脉虛身倦者。清暑益氣湯。昏憒不甦者。蔥餅熨臍）

暴寒寒疫與伏藏已變之寒。自是情違。（春分至秋分。暴寒曰寒疫。非冬月傷寒比也。三月四月或有暴寒陽氣尚弱。為寒所折。病熱猶輕。五月六月。陽氣已盛。為寒所折。病熱則重。七月八月。陽氣已衰。為寒所折。病熱亦微。傷之者。其病與溫暑相似。而治則殊者。蓋溫暑伏寒。自內而發。寒疫自外而入。宜調中湯為主。隨時氣候寒熱輕重。而以辛涼辛溫之藥加減。蓋折者折抑陽氣鬱而為熱也。感之輕而陽氣不為所折。未至發熱者。當於感冒藥中求之。）

暴溫溫疫與過經不除之溫。皆難發汗。（春三四月間。暴熱傷之者。亦名溫病傷寒。汗下過經不解者。亦名溫病。但當隨各經見症治之。皆不宜汗下。暴溫梔子升麻湯。九味羌活湯。過經和解散。參胡芍藥湯。）

風溫喘渴多睡。四肢不收苦癱。（太陽病發汗則身涼。如發汗身猶灼熱者。乃風溫也。當春溫氣大行。又感風邪所致。惟風傷衛。四肢緩縱不收若癱瘓。然惟溫傷氣。氣昏而鼻息不利。語言蹇澀。身熱自汗多眠。治在心火肝木二經。忌汗下針。誤汗則身必灼熱。甚則煩渴譫黃。下則遺溺針則耳聾。惟清解肌表為佳。宜萎如湯。敗毒散。或小柴胡加桂枝。微汗之。渴甚者。瓜蔞根湯。痰喘者。金沸草散加杏仁細辛五味子。誤汗防己黃芪湯救之。譫語獨語及直視遺尿者難治。）

濕溫胸滿妄言。兩脛逆冷如雪。（夏月先傷濕而後傷暑。名曰濕溫。濕與熱搏。兩脛逆冷。甚則遍身亦冷。胸滿頭痛。壯熱自汗。若再發汗。令人嘔聾。身變青色。不語。名曰重暍。必死。治在心火脾土。茯苓白朮湯。濕勝滿澀便利者。五苓散。除濕湯。臟滑者。朮附湯。暑勝壯熱二便澀者。香茹散。六和湯。便閉渴譫。白虎加蒼湯。）

風濕頭汗。身重而大便難。（先傷濕而後傷風。風先上受。濕先下受。風濕相搏。風在外而濕在內。大汗則其氣暴而內邪不能出。故風去而濕在。濕流入裏則病重。微汗則其氣緩而內外之邪俱去。或濕症去而頭症未去者。不久自解。寒邪身痛。麻杏薏甘湯。體痛發熱。小便不利。麻黃湯加蒼朮。肩背脊腰強痛者。羌活勝濕湯。腫痛微喘。杏仁湯。汗多。漢防己湯。虛者身重難以轉側。桂枝湯加白朮身重昏迷。自汗失音。下利不禁者。白通湯加白朮甘草。身病小便不利者。甘草附子湯。身重走痛者。小續命湯去麻黃附子。熱而重痛煩渴者。敗毒散去柴胡人參。加瓜蔞根。小便自利。及下利不止者死）

寒濕頭汗身痛而大便泄。（傷寒無汗。寒濕相搏而有汗。不能遍身。惟在頭耳。身背強者。表不利也。症與風濕相似。滲濕湯主之。帶表五積交加散。裏寒理中湯加附子。寒多浮腫。朮附湯妙）

中濕二便乖。而黃熏於肌膚。（濕即水也。東南窊下。風雨襲虛。山澤蒸氣。人多中濕。濕在經則日晡發熱鼻塞。在關節則一身盡痛。在臟腑則清濁混而大便濡泄。小便反澀。腹或脹滿。濕熱搏則遍身黃如熏色。輕者面目微黃而已。誤下則為喘噦。誤汗則發痓而死。惟利小便為佳。五苓散除濕湯主之。小便不利。大便反快者。甘草附子湯。二便利不發黃者。朮附湯。身痛鼻塞者。黃芪建中湯。中

（氣堅滿癃閉者枳朮湯加葶藶發黃見後）

濕痺三氣合。而痛歷乎關節。（痺者痛也太陽病脉沉而細關節煩疼皮膚麻木自汗者防己黃芪湯無汗者五積交加散主之然濕氣四時有之兼風兼熱兼寒者隨症加減濕病古云三種實亦五種）

寒濕重感成痓痙。發時可驚。（太陽病純傷風純傷寒則不發痓惟先傷風而後又感寒或先傷風而後又感濕過汗俱能發痓重發太陽汗大發濕家汗皆能發痓外症寒熱類傷寒但脉沉遲弦細搖頭露眼口噤手足搐搦頭項背反張如發癇終日不醒為異風性勁為剛痓因重感寒或冷故無汗宜葛根湯加羌獨活防風濕性緩為柔痓因先傷風故有汗宜桂枝湯加天花粉葛根其或痰塞氣盛則南星半夏白茯以消痰枳實陳皮紫蘇以順氣痰消氣順然後分剛柔治之通用小續命湯有熱去附子自汗去麻黃剛痓二三日仰而壯熱胸滿如結胸狀便閉腳踡臥不着席者大承氣湯下之輕者敗毒散小柴胡湯柔痓二三日不瘥汗多厥冷筋脉拘急者附子防風湯時發時止危者附朮散又有剛柔不分之痓身熱譫語似剛微厥便滑似柔宜小續命湯加生附子有汗下後乍靜乍燥偏左眼左手足牽搐者少陽痓也小柴胡加防風又血虛之人及產後傷風過汗破傷風症發痓俱不可純作風治四物湯加防風或八物湯去茯苓加黃芪羌活防風救之凡痓脉如雨濺散出指外者立死又戴眼反折瘈瘲汗出如珠或反張離席一掌許小兒離席二指許者皆死風熱痰火虛痓見雜病）

寒氣重感變溫瘧。發久則截。（傷寒汗吐下後餘熱未淨重感於寒而變瘧或過經舊熱未解新感六淫之氣而變瘧皆曰溫瘧者但先熱後寒故也寒多熱少或單寒者太陽邪變也柴胡桂羌湯熱多寒少或單熱骨節煩疼者陽明邪變也白虎湯加桂寒熱相等或先熱者少陽邪變也小柴胡湯渴者去半夏加天花粉知母寒熱大作戰慄汗出不散者太陽陽明合病也桂枝石羔湯服此後瘧愈甚者三陽合病也恐傳入陰經急用桂枝黃芩湯如傳入陰分從卯至午發而嘔吐大便閉者大柴胡湯下之從午至酉發而腹滿便閉者大承氣湯下之從酉至寅發而欲狂喜忘便黑者桃仁承氣湯微利之不敢下者梔子升麻湯傷寒與雜病瘧不同在此間有挾痰與食積嘔吐不食者二陳湯對金飲子尿澀煩渴或因瘴氣不伏水土者五苓二散俱加黃芩柴胡此等瘧與雜病無大異日久勢發稍緩則截之痰飲在上脘欲吐不吐者瓜蒂赤小豆雄黃等分為末水調五分服之以吐為度或祛邪丸亦好久不愈者勝金丹老瘧丸以消之）

霧露中於下焦。名曰渾。霧露中於上焦。名曰潔。（陰脉緊者霧露濁邪中於下焦少陰之分故曰渾因表虛裏微遂使邪中於陰為慄令人足脛逆冷便溺妄出或腹痛下利宜理中湯四逆湯熱藥以散其邪○陽脉緊或帶澀者霧露清邪中於上焦太陽之分故曰潔令人發熱頭痛項強頸攣腰痛脛痠宜九味羌活湯加藁本或惡寒欲吐者藿香正氣散五積散仍量加藁本○陰陽脉俱緊者上下二焦俱中邪也必吐利後脉不緊手足溫則愈若吐利後脉遲不食者脾胃虛而內停水飲也若脉陰陽俱緊口中氣出唇口乾燥踡臥足冷鼻涕出舌上胎滑勿妄治也又有陽病上行極而下陰病下行極而上上下必於中焦於是三焦溷亂內外氣塞以致上為口糜溫噯下為小便黃大便血凝如豬肝熱氣勝而脾胃不運榮衛凝滯則生瘡癰虛寒甚者脾胃獨弱下焦不約清便下重臍築厥痛而死蓋臍為生氣之源築痛生氣已絕）

水症多嘔咳而頭汗。惟在表也。則身熱而心胸怔悸。惟在裏也。則身涼而腸腹堅滿。（水陰也寒也或因飲食生冷或因洗浴過度內熱者得之即自消內寒者得之即自停蓄傷寒表熱與水氣相合者發熱怔忡乾嘔喘嗽小腹滿小便不利小青龍湯半表裏症但頭汗出身無大熱心下滿揉之汩汩有聲者謂之水結胸小半夏湯甚者大陷胸丸下之或傷寒厥而心下悸乾嘔飫逆者茯苓桂甘湯赤茯苓湯裏寒與水氣相合者四肢疼痛腹痛嘔泄小便不利玄武湯甚則成癖脇鞭者十棗湯表裏俱見渴欲飲水水入即吐者名曰水逆五苓散滲之若病在陽宜汗而反以水噀面閉熱內上粟起欲飲水而不渴者單用文蛤為末沸湯調服方寸匕流入皮膚浮腫者牡蠣澤瀉湯五苓散防己黃芪湯朮附湯選用）

黃疸俱口渴而頭汗。蓄熱發者。則溺澀而大腹膨脹。蓄血發者。則溺清而小腹急結。（經曰濕熱相交民病癉癉即黃單陽而無陰也傷寒發黃雖不二皆因內熱而誤用溫藥或被火攻太甚或失汗下與滲以致陽明經中無熱而見真色於肌膚謂之瘀熱發黃頭汗作渴小便不利色黃而明茵陳湯茵陳三物湯陶氏茵陳湯有濕熱鬱而發黃者身痛發熱色黃而晦茵陳五苓散有寒濕發黃者太陽病寒濕在裏發汗過則寒去而濕在麻黃連軺赤小豆湯身痛鼻塞者急用後瓜蒂搐鼻法內服茵陳五苓散頭痛甚者神朮散加茵陳有中濕發黃者一身盡痛誤汗則眼目俱黃茵陳五苓散梔子柏皮湯防己黃芪湯身體煩疼者麻黃湯加蒼朮有傷風發黃者鼻乾腹痛潮熱咳嗽小柴胡加茵陳如喘加茯苓甚者用大柴胡加之往來寒熱者小柴胡加山梔茵陳有內傷中寒發黃者脾胃素虛或傷冷物停滯不散或嘔逆腹滿或大便自利理中湯加茵陳枳實青皮腹脹食不敢飽欲作穀疸者五苓散加茵陳有陰症發黃者四肢逆冷脉沉或陰盛發躁四逆湯加茵陳有結胸發黃者心胸滿鞕按之痛不可近大陷胸湯加茵陳有痞氣發黃者心下滿鞕按之不痛半夏瀉心湯加茵陳痞結消則黃自愈大抵發黃與治濕相似輕則滲利和解重則大下水利黃自退矣非但寸口無脉鼻氣冷為不治形變烟薰黑色搖頭直視環口黧黑柔汗發黃脾臟氣絕也凡初發黃先以口含水用瓜蒂末一字搐入鼻中吐出黃水內服茵陳五苓散或酒蒸黃連丸外用生姜

（同茵陳搗爛遍身擦之○諸發黃皆小便不利惟瘀血發黃小便自利且瘀血與瘀熱外症俱頭汗作渴脉浮數但熱結下焦則熱耗津液而小便不利血結下焦則熱但耗血而不耗津液故小便自利治詳後瘀血）

右一段論正傷寒名義（曰傷寒曰傷風曰傷風見寒曰傷寒見風曰合病曰并病曰兩感曰中霧露曰中暑暍曰熱病曰晚發曰痓痙五種濕病風濕濕溫寒濕中濕濕痺五種溫病春溫風溫溫疫溫瘧溫毒發斑附水症黃症乃傷寒之大關鍵也故并提之共二十四種濕溫居半可見濕熱為病最多）

虛煩頭身不痛。無寒而脉鮮緊。（虛煩諸者七情人慾以致腎水虛而心火煩燥或雜病後餘熱未淨而煩或勞役氣衰火旺而煩或陰虛相火動而煩有類傷寒初症外亦發熱但頭身不痛脉不緊數為異雖陰虛亦惡寒而不甚脉亦能數而無力大槩病後虛羸少氣煩燥欲嘔者竹葉石羔湯輕者小柴胡湯痰逆惡心者橘皮竹茹湯陰症內寒外熱肢節痛口不煩而虛者陰旦湯服涼藥後脉愈大而無力熱愈甚而燥渴者單人參湯或人參黃芪煎湯下五苓散勞役氣虛者補中益氣湯陰虛者四物湯加知母黃柏脾胃弱者三白湯驚悸痰盛者溫膽湯心神不安者硃砂安神丸婦人新產後血虛煩者四物湯加人參淡竹葉麥門冬甘草表虛忌汗裏虛忌下但宜平和之劑調理千金云虛煩不可太攻熱去則寒起若用傷寒汗下重劑而治虛煩重則津竭而死輕則內消盜汗變為癆瘵傷寒有未經汗吐下而煩者胸滯膈實煩熱有已經汗吐下而煩者胸滿煩燥懊憹見各條）

痰症頭項不痛。寒熱而寸多浮。（痰者津液所化風傷肺濕傷脾凝濁而生外症頭項皆和惟寒熱類傷寒耳初起便胸膈滿悶氣上衝咽寸浮為異有熱者參蘇飲金沸草散柴胡半夏湯無熱者二陳湯溫膽湯通用導痰湯有痰結胸者鶴頂丹枳梗二陳湯有痰上攻非次頭疼者瓜蒂散吐之）

食積心腹滿悶。（外症頭痛發熱惡寒全類傷寒惟身不痛心腹飽悶噯噫嘔逆右脉弦盛為異耳百症云頭痛而惡心身不痛者食積也頭痛而身亦痛者傷寒也食在上脘胸滿惡心欲吐實者瓜蒂散吐之食在中脘痞脹欲嘔有熱者二陳湯加黃連生姜烏梅或陶氏平胃散腹痛欲瀉者胃苓湯寒者治中湯心腹滿痛不大便者大柴胡湯下之○又有夾食傷寒謂之大陰積症表症藿香正氣散或五積散去當歸麻黃加人參蘇葉有表復有裏者桂枝加大黃湯表症已罷但裏實滿者小承氣湯凡傷寒下後六七日不大便煩熱腹滿而痛胃中有宿食故也若中寒夾食即見吐利厥逆霍亂等症急用理中湯加枳實或四逆湯救之凡夾食脾胃已傷不可輕易汗下）

脚氣膝脛軟柔。（脚曰氣者風寒暑濕四氣蒸於足循經入臟之深而發則以漸非若四氣中人雖淺而弱也外症全類傷寒且有六經傳變一如太陽頭疼身熱云云直至厥陰煩滿囊拳又有合併二病但初起脚膝軟弱頑痺轉筋赤腫為異耳如太陽症見外踝循京骨至小指外側背痛者隨四氣偏勝發散麻黃湯加防風羌活細辛葛根白朮茯苓防己或敗毒散合檳蘇散陽明症見髀膝外廉下入中指內痛者隨四氣偏勝微利大柴胡湯加羌活細辛杏仁或升麻葛根湯合檳蘇散少陽症見諸足指節痛者宜和解小柴胡湯去參加防風葛根細辛白朮茯苓麥門冬乾姜小草三陽合病拘攣便閉者合前三方加減而服名左經湯或專入足太陰經症見股膝內廉足大指端內側痛或浮腫者苦桂附湯加防己白朮茯苓少陰經症見足小指下連足心廉股內痛衝胸不食面黑溺澀小腹不仁者難治八味丸淑之厥陰經症見足大指連內廉膝腹脹痛脚攣乾嘔者養真丹如足三陰攣痺緩弱上攻胸脇肩背下注脚膝足心熱者檳腿丸要之風多入肝病筋走注脉浮無汗小續命湯加獨活風毒腫毒排風湯檳榔散筋急掣痛乳香定痛散濕多入脾病內重着行起忽倒或腫除濕湯痰多者用此湯吞青州白丸子暑多入心病氣喘悶煩躁所患必熱敗毒散加大黃寒多入腎病骨攣急掣病所患必冷五積散越婢湯加木瓜通用千金續命湯流氣飲子烏藥順氣散煩燥者單竹瀝飲之便閉者三和散脾約丸毒氣衝心作痛者蘇子降氣湯下養正丹或吳萸煎湯刺入姜汁救之死在旦夕尋常春夏檳蘇散加川楝子熱腫赤者敗毒散加木瓜蒼朮秋冬五積散加木瓜檳榔牛膝吳萸最忌補湯淋洗草藥攤罨其症有因於氣因於飲食及丹石者不可不知）

瘀血昏忘如狂。胸脇小腹不快。（血乃人身河渠貴流通而不貴凝滯或當汗不汗津液內滲或不當汗而汗津液內竭或利小便過多以致血熱化為惡瘀又或其人素有跌撲悶剉善思善忘過食煎炒以致血熱瘀滯蓄於上焦則衄血善忘甚則昏迷良久乃甦或胸脇腹皆滿痛譫語昏憒謂之血結胸症蓄於中焦則頭汗作渴發黃蓄於下焦則如狂便黑小腹急結按之則痛其脉必沉濇外症寒熱全類傷寒太陽症則如狂陽明症則善忘少陽症則寒熱似瘧大槩治上犀角地黃湯治中桃仁承氣湯治下抵當湯丸然必症重脉數方可抵當攻之症輕脉微通用犀角地黃湯加青皮苓連大黃或小柴胡湯加桃仁生地兼梔子茵陳一切血症皆此治法不易傷寒有用承氣大下不解反便堅善食者瘀血也凡病日輕夜重便是瘀血所以打撲傷損症亦類傷寒）

瘡毒飲食如舊。掀發腫痛可求。（凡患癰疽發背疔瘡一切無名腫毒初起寒熱全類傷寒但傷寒不食瘡毒飲食如常且身有紅腫掀痛處可驗不可妄施汗下宜外科法治之○俗呼流注傷寒流者行也注者住也血氣流行遇寒邪則凝澀結如堆核大者如拳小者如李初起寒熱全類傷寒未潰者宜敗毒散合涼膈散加金銀花已潰者托裏散不可作正傷寒治之○俗呼赤膈傷寒胸膈赤腫疼痛寒熱類傷寒非正傷寒也宜荊防敗毒散合小陷胸湯裏實者防風通聖散）

痘疹尻足當時冷○（凡幼稺及年長之人忽類傷寒症如未患痘疹尻足中指皆冷宜從痘症初熱條治之）

勞發痰火待日過○（素有痰火畧有勞動便發寒熱全類傷寒輕者將息週日自愈重者頸腋膊胯之間遂結核腫硬或消下次遇勞又發治宜八物二陳湯加降火和解之藥）

外感疎泄勿甚○（舊謂傷為中感冒為傷今悉分之正恐人以傷寒重劑而治感冒輕病變生異症蓋感寒雖亦惡寒面慘其頭疼發熱不如傷寒之甚脈多沉遲感風雖亦惡風鼻塞其發熱等症亦不如傷風之甚脈多浮數大槩未發熱者感寒香蘇散感風蘇葛湯古蒼荊散已發熱者九味羌活湯之類熱服肌體微潤即愈尋常體薄多痰之人只於原服藥中加生姜陳皮或寒用二陳湯風用三白湯）

（加減詳見雜病）

內傷補益兼投○（外感挾內傷者素冒風寒未發加之飲食勞倦觸動外症全類傷寒但左手人迎及關脈大於右手氣口一二倍此外感重而內傷輕也治以九味羌活湯去蒼朮生地用白朮隨六經見症加減如內傷脾胃外感寒邪者藿香正氣散人參養胃湯如內傷飲食外感風寒者平胃散加黃連枳實便閉加桃仁大黃如內傷生冷外感風寒者五積散○內傷挾外感者先因飲食勞役過度身痛腰腿酸軟而其體已解你又感冒風寒外症全類傷寒但右手氣口及關脈大於左手人迎一二倍此內傷重而外感輕也治以補中益氣湯或調中益氣湯隨六經見症加減誤作傷寒大發其汗者死○內傷房室又感風者玉屏風散或加桂枝白芍內傷房室又感寒者川芎湯風寒兩感者玉屏風散合川芎湯體薄者通用十全大補湯少加防風羌活細辛白芷肢冷者加姜附陰虛者八物湯加陳皮炒乾姜不可誤用風寒燥藥愈虧腎水○內傷虛損四肢無力發熱亦類傷寒但必兼盜汗遺精白濁為異內傷衛虛惡風榮虛惡寒亦類傷寒但必密室則不惡也內傷陰虛火動惡寒非寒惡熱非熱但體清瘦脈無力為異內傷大渴體熱脈洪大似陽明中熱白虎症但脈無力耳內傷長夏困倦似外感濕熱或發熱頭疼似溫暑病已上俱宜補中益氣湯或四物湯四君子湯加減詳內外傷辨及雜病各條○解㑊出內經解者肌肉解散㑊者筋不束骨其症似寒非寒似熱非熱四肢骨節解散怠惰煩疼飲食不美或因傷酒或中濕或感冒風寒或房事過多或婦人經水不調似砂病而實非砂也治宜通其氣血疎其腠理以內傷兼外感藥調之輕者從俗刮砂刺十指及委中血砂症類傷寒見雜病蠱瘴）

右一段論類傷寒名義○（舊以痰飲虛煩脚氣食積瘡毒瘀血勞發痘疹八症大類傷寒新增感冒勞傷共成十症要之百病皆類傷寒不可不知）

正類傷寒如斯○傳變傷寒何謂○嘗聞傳陽則潮（熱）（自）汗（便）閉（溺）澁○（腹）滿（口）渴（發）狂譫○（語）甚則（發）斑（嘔）血喘急○

能升牆屋○變陰則厥冷吐利不渴靜踡○甚則咽痛鄭聲○欲坐井地○請以初症言之○

頭痛三陽所主○而濕痰鼻塞胸煩○（太陽表症頭痛自顛頂連兩額太陽穴者分有汗無汗治之若頭痛如破者急用連鬚葱白湯姑止之陽明表症額痛連鼻目齒葛根葱白湯葱豉湯陽明裏症晡熱汗多頭痛者調胃承氣湯陽明症汗多煩渴脈洪頭痛者白虎湯加白芷少陽症頭角痛連耳往來寒熱者小柴胡○濕家鼻塞聲重頭痛者令病人先噙水一口勿嚥次將瓜蒂散一字入鼻內搐出黃水為度○痰涎頭痛難當胸膈煩滿欲吐寒熱者瓜蒂散吐之凡頭痛連腦痛甚手足俱寒者治之）

顛痛厥陰所司○而脾腎從足至頸○（三陰無頭痛太陰少陰脈至頸胸而還惟厥陰上系與督脈會於巔頂下頄顴連目出額必兼乾嘔吐沫却無身熱亦與陽症不同三味參萸湯主之輕者小建中湯若厥陰得浮脈則陰病見陽易愈若脈沉痛入泥丸手足冷爪甲青者謂之真頭痛有上症而連齒痛者屬少陰厥症俱不治然風溫在少陰濕溫在太陰而反頭痛至陰毒及太陽少陰兩感亦有頭痛不與陰症無頭疼相反耶然少陰雖有反熱而無頭疼厥陰雖有頭疼而無身熱且頭疼終不如陽經之甚若身熱頭疼兩全者則屬陽症）

項強連背邪初臨○（項硬而不能左右回顧太陽初症表實無汗葛根湯表虛有汗桂枝湯加葛根若誤下邪氣乘虛入裏反結胸而項強又不解謂之結胸項強大陷胸湯丸兼理中丸或四逆湯服之所以陰毒初病亦有項強俱以熱藥治之正陽散附子湯是也）

項強連脇邪亦猛○（項強連脇下滿者小柴胡湯又有風濕項強痓病項強見本條）

頭眩有風有虛○（未經汗下而眩者邪漸入裏表虛故也頭目俱眩者太陽併少陽傷風也時時目眩口苦者少陽風邪盛也俱小柴胡湯主之頭眩善食不惡寒者陽明風邪也茯苓桂甘湯已經汗下而眩者裏虛也汗漏不止心悸身搖暢瞤或發熱者玄武湯虛煩頭眩心下痞滿腹痛氣上衝咽身戰筋惕成痿者茯苓桂朮甘草湯經曰下虛則厥上虛則眩所以婦人經水適來易病真元虛散昏令頭眩間有痰火上衝者輕則起方昏眩重則臥亦旋轉危哉）

鬱冒不仁不省○（鬱乃氣不舒冒乃神不清俗謂之昏迷也經曰諸虛乘寒則為厥鬱冒不仁言寒氣乘虛中人如物蒙罩其首恍惚不省人事比之眩昏更重太陽少陽病頭痛眩冒時加結胸痞硬者人參三白湯加川芎天麻吐下虛煩氣衝眩冒身搖者茯苓桂朮甘草湯少陰症脈沉遲面微赤身微熱下利清穀者必鬱冒汗出理中四逆湯甘草乾姜湯選用血虛者人參養榮湯加天麻如下利止頭）

眩時時自冒者難治太陽病下之不愈因復發汗表裏俱虛其人必冒汗自出則表和而愈又痰飲鬱冒厥逆者三生飲感濕頭重眩暈者芎朮除眩湯又有頭重二症太陽不能舉者宜發散易病不能舉者宜補真元婦人新產血虛挾寒必冒見產後

身惡寒有熱無熱陰陽斑。惡寒非寒熱之寒身雖寒熱亦欲近衣卻不可過覆及近火氣則寒熱相搏寒不可過經曰發熱惡寒者發於太陽也乃陽症之表惡寒無熱惡寒者發於太陰也乃陰症之裏惡寒在陽則脈浮數宜發汗在陰則脈沉細宜溫中或下症悉具但有一毫惡寒者為表邪未盡須先解表候不惡寒乃可攻下時時嗇嗇惡之甚者屬太陽乍止乍惡之微者屬少陽陽明不惡寒反惡熱惟太陽合病在表則亦惡寒若少陰症惡寒而踡脈沉細無頭疼無項強厥冷自利煩躁脈不至者死

背惡寒口和口燥虛實井井。風寒客於表分當一身盡寒今但背惡寒者何也蓋背為陽腹為陰又以背為五臟所系是以背惡寒也寒邪在裏不能消耗津液故口中和此屬少陰宜附子湯熱邪陷內消耗津液故口中乾燥全無滋味此屬陽明併三陽合病但宜白虎湯中暑及暑月傷冷陰氣乘陽亦有背惡寒者

惡風可解而漏汗溺澁當溫。惡風者或當風或用扇則怯風吹居密室則不惡也且三陰無惡風症悉屬陽經無汗者當發其汗有汗者當解其肌若裏症甚而惡風未罷者尤當先解其表而後攻其裏也桂枝湯加葛根主之汗漏不止及溺澁四肢拘急難以屈伸者宜桂枝附子湯凡汗不止者必惡風煩燥不得臥先服防术牡蠣湯次服小建中湯惡風項強脇滿手足溫而渴者小柴胡湯汗吐下後惡風大渴者白虎加參湯惡風壯熱者參蘇飲防風沖和湯風濕相搏惡風身疼小便不利者甘草附子湯身重惡風者防己黃芪湯

發潮可通而氣逆脈虛忌冷。似潮水之有信一日一發謂之潮必日晡而作者陽明旺於未申故耳宜諸承氣湯選用或大柴胡湯有不可下者脈浮於弦嘔噦飽逆氣逆上微溏惡寒發熱非日晡所發是謂其熱不潮或潮於寅卯者屬少陽潮於巳午者屬太陽為邪未入胃俱宜小柴胡和之又日晡發熱脈虛者亦不可下宜桂枝湯微汗之若結胸潮熱脈浮者屬太陽大陷胸湯陽明傷風腹滿身黃者麻黃連軺赤小豆湯冬陽明潮熱黃芩湯吐下後不解如見鬼狀循衣摸床微喘直視脈濇者死

似瘧作止有時太陽陽明厥陰。似瘧非瘧作止有時或日再發或二三日一發非似潮單潮而無寒亦非若寒熱往來之無定也太陽症二三日似瘧寒多脈浮洪者桂枝湯或桂枝二麻黃一湯陽明症似瘧汗出日晡發熱脈浮者桂枝湯脈實者承氣湯熱入血室似瘧小柴胡主之厥陰症似瘧一日二三發脈浮緩者為裏和自汗而愈凡感冒之人忽覺毛寒股慄筋節樓攣百體皷撼嘔不欲食其寒不可禦未幾復轉而發熱者皆似瘧狀不必脈弦隨所見症與脈而以小柴胡湯和解此即溫瘧也

熱多寒少三症弱脈脈遲同等。一症脈弱者亡陽也不可正汗及吐下桂枝二越婢一湯以微汗之一症脈遲者血少也先以黃芪建中湯養血俟脈不遲乃以小柴胡湯和之一症脈陰陽同等微浮微緩不嘔清便自調此不待藥汗而自愈也若面赤身痒脈濇者桂麻各半湯必待微汗而後愈通用柴陳湯熱多加川芎前胡寒多加川芎草菓若寒多熱少不煩燥而脈浮緩者乃傷寒見傷風脈也或面色不澤兩手無脈者乃麻黃附子細辛湯症也

往來寒熱正是半表半裏之情。經曰陰氣上入陽中則惡寒陽氣下陷陰中則發熱此陰陽相乘之病也若太下陰微發熱大汗陽微惡寒乃醫之誤也大要陽不足則陰邪出於表而於陽爭則陰反勝而為寒陰不足則陽氣入於裏而與陰爭則陽反勝而為熱若邪入而正氣不與之爭則但熱而無寒矣陽不足則先寒陰不足則先熱表邪多則寒多裏邪多則熱多半表半裏寒熱相等乍往乍來而間作也若不嘔清便脈浮者猶當解表口渴尿赤脈實者大柴胡湯心煩喜嘔胸脇滿而不欲食者小柴胡湯熱多者加柴胡寒多者加桂枝汗下後柴胡症不除者柴胡桂姜湯寒熱往來脇滿小便不利嘔渴頭汗多最宜如寒熱勢盛當遲一二日少定方可圖之所謂其盛者可待衰而已若寒熱勢定或早移於晏晏移於早邪無可容之地病將解矣○夫病機言搏者舊有痎瘧相火之類偶然新氣加之則搏動而發此理易明言爭者乃彼此相搏相鬪久而後可和解之謂不過邪正氣相引結而未遽散非實有所爭競也血氣勝者雖風寒之邪乘間而入終不能動其真氣而與之鬪惟血氣弱者則邪入必鬪鬪則便有勝負須正氣復而後邪可退也若邪愈盛而正氣負非藥餌大扶持之必不可救此爭與搏之義也至於頭面上病皆百邪上攻胸膈間病皆百邪上衝腸胃間病皆百邪下流而傳入不然則血氣失升降之常或陽當升而不升陰當降而不降精宜升而不升氣宜降而不降血宜順而不順火宜靜而不靜識病機括盡於此矣

表裏寒熱譬如冬至夏至之景。陶氏以皮膚即骨髓之上骨髓即皮膚之下前人錯誤而分表裏但以冬至陽生則地中熱而外寒漸極夏至陰生則地中冷而外熱漸極推之則誠有表熱裏寒表寒裏熱之理且如病人身熱似火而外欲得衣微厥下利脈沉而遲分明裏寒表熱所謂熱在皮膚寒在骨髓也活人先以陰旦湯退寒次服小柴胡湯加桂清表所以少陰反熱一症裏寒表熱手足厥而下利清穀者四逆湯主之如病人身冷似水而外不欲近衣口燥舌乾脈沉而滑分明表寒裏熱所謂熱在骨髓寒在皮膚也活人先以陽旦湯合白虎湯除熱次服桂麻各半湯和表所以少陰傳經熱症惡寒而踡時時自煩不欲厚衣者大柴胡湯下之此仲景餘議當的從之

翕翕發熱於表則二。蒸蒸發熱於裏則一。

（表熱若鳥合羽所覆有汗發散無汗解肌二者之分裏熱若火薰蒸自內達表惟下之一法而已半表裏熱者表邪將罷裏未作實輕於純在表純在裏之熱也宜和解之要之不渴小便清者為表渴而小便黃者為裏或渴或不渴半表裏也然三陽經又有陰陽表裏之分蓋太陽以皮膚為表以膀胱為裏熱在皮膚頭疼項強為表麻黃湯桂枝湯九味羌活湯熱在膀胱口渴尿赤為裏五苓散陽明以肌肉之間為表肌肉之下為近裏以胃府之內為全入重熱在表則目痛不眠葛根解肌湯熱近於裏則口渴背寒白虎加參湯熱入裏則自汗狂譫調胃承氣湯少陽以胸脅之間為半表半裏表多小柴胡湯裏多熱盛者黃芩湯已上發熱太陽惡寒陽明自汗少陽多嘔皆三陽症也太陰厥陰不發熱惟少陰有反熱二症一脈沉發熱表鬱重者麻黃附子細辛湯輕者麻黃附子甘草湯一脈不出重寒外熱者白通湯和之脈陰陽俱虛熱不止及汗下後復發熱脈躁疾下利不止者死）

煩躁以躁之煩漸而分陰陽。

（煩乃心中懊憹欲吐之貌躁則手掉足動起臥不安心熱則煩腎熱則躁煩為輕躁為重先煩而漸躁者為陽症分表裏汗吐下治之不煩而便發躁者為陰症宜溫中或經吐下而不解煩躁者亦宜溫之大緊中關脈浮大身熱而渴者多太陽陽明病治以寒涼尺寸脈沉微厥而利者多屬少陰病治以溫熱百問云惟躁有陰陽二症太陽症煩躁宜汗陽明症煩躁宜下若陰症發躁宜溫之是也故有曰煩躁與虛煩少異煩躁晝日不得眠夜反安靜身無大熱陽虛也虛煩不得眠而無間斷故為表熱宜梔豉湯吐之丹溪又云煩主氣躁主血肺主皮毛氣熱則煩腎主津液血熱則躁故用梔子以治肺豆豉以潤腎但肺熱非心火乘之乎凡煩躁見吐利厥逆無脈及結胸者死古方黃連雞子湯甘草乾姜湯芍藥甘草湯選用）

煩熱以膈之軟滿而辨虛實。

（心煩作渴欲嘔身熱睡臥不寧與發熱均屬表熱但煩熱無時休息非發熱時發時止凡煩熱未經汗吐下邪熱傳裏而作如未作膈實心中欲吐不吐鬱悶之狀者為虛但當和解或微汗而已經云病人煩熱汗出則解是也若心中驟滿而煩者為實則有吐下之異賦云微煩為陽之相勝言當分表裏而治之也又云煩極而反發厥者乃陰所致言熱極則反與陰盛發燥一同必以四逆理中湯治之宜與動悸條參看）

自汗不特傷風也併少陰反症而有九。

（曰傷風衛虛而汗自出必兼惡風寒也曰風溫風傷衛而傷風氣也曰濕溫濕熱蒸而汗自出也曰中暑熱傷氣也曰霍亂吐利而陽氣大泄於外也曰柔痓原因傷風也曰胃不和言臟無他病但將發熱而汗自出乃風邪在衛宜微汗以散之曰亡陽太陽發汗過多也曰陽明自汗不惡風寒反惡熱而熱逼汗自出也汗甚津液內枯不可下者蜜導法惟三陰本無汗而少陰有反有汗三症亦曰亡陽其一自汗咽痛甘桔湯其二自汗厥冷四逆湯其三自汗嘔吐甘草乾薑湯凡汗不止者先服防木牡蠣湯次服小建中湯如汗出如油不流者死）

無汗不特傷寒也併陽明反症而有七。

（曰太陽傷寒曰太陰病曰少陰病曰厥陰病曰冬陽明曰剛痓曰陰陽易皆寒泣血陰主收斂意也但陽明病當有汗今反無汗其症有三惡寒脈浮而喘者表有邪也宜麻黃湯升麻葛根湯微汗之若無汗小便不利心中懊憹者必欲發黃宜茵陳湯小便利吐而咳手足厥若頭痛鼻乾者小建中湯）

亡陽少血躁極痰癖不得汗須巧攻。

（太陽惡寒當脈浮而緊今反脈浮而遲者遲為亡陽不能作汗其身必痒桂麻各半湯凡傷寒當汗與麻黃湯二三劑而汗不得者死熱病脈躁盛而不得汗者亢陽之極也不治陽明身熱宜有汗今反無汗身痒如蟲行皮中者久虛故也黃芪建中湯或术附湯寒熱厥症忽兩手或一手無脈是為重陰如欲兩汗熱必戢然大汗而解其或投藥無汗而脈又不至者死雖然血虛中乾不能作汗痰飲癥癖又每隔汗而不能出血虛養血痰癖閉闔行氣以汗之最為活法有服藥不得汗者當用蒸汗法通用陶氏再造散加減）

寒入少陽冬病陽明睡中汗且盜出。

（盜汗者邪方入裏尚連於表睡則氣行於裏而表不緻故汗出醒則氣周於表而汗復止膽有熱也小柴胡湯冬陽明脈浮緊者必有潮熱盜汗宜黃芩湯柴胡桂枝湯脈浮大欲眠目合則汗者小柴胡湯）

陽上蒸而頭額汗表實內枯症最多。

（諸陽上循於頭裏虛表實腠理緻密則熱氣不得發越於遍身乃上蒸於頭面汗出既多則五內自枯惟裏虛忌下惟內枯忌汗屬半表裏者小柴胡湯主之汗下後胸滿心煩嘔渴表未解者小柴胡湯去半夏加桂枝栝蔞仁虛煩者梔豉湯微吐之陽明熱入血室燥糞譫語者俟其過經權以小承氣湯微利之黃症水症瘀血風濕寒濕頭汗見各條凡頭汗小便不利內外關格者為陽脫及誤下溫家頭汗而喘或小便不利大便自利者亦為陽脫二者皆不治）

氣旁達而手足汗便難軟利法已畢。

（津液自胃府旁達於外則手足自汗有熱聚胃府通而出之者必有譫語燥糞陽明府也大便已鞕者有柴胡湯或大承氣湯大便不鞕而軟者小柴胡湯凡傷寒欲下而小便少手足心併腋下不滋潤者不可攻也有寒聚胃府大便初鞕後溏或水穀不分手足濈然汗出者不可下少與理中湯或豬苓湯如寒甚不食小便不利者此欲作痼瘕也宜理中兼散氣之藥治之）

下後熱只陰弱而邪陷於心者則痛。

（大下傷血傷血陰弱脈濇而發熱蓋陰虛則脈濇血虛寒極則發熱古方學慈苦酒湯酸苦湧泄之義也凡下後不可遽補身熱心中結痛者梔豉湯微汗之或醫以丸藥下之致留餘熱未淨者梔子乾姜湯胸滿未消腹痛未止脈尚數實者積垢未淨也小承氣湯體薄者黃芩湯小柴胡湯益元散調之仲景云下後熱不退因汗下失宜如八日）

（已上大發熱者難治。經云：陽微惡寒，陰微發熱，寒多易愈，熱多難愈。）

汗後熱多陽虛而邪入於裏者為實。（大汗傷氣，陽微發熱，悸眩身瞤，脈弱或兼惡寒，陰陽俱虛者，玄武湯主之。發汗後表症未退者，宜再汗之。若身涼半日許，而見半表裏症者，宜和之。若汗後日晡如瘧，脈沉實便閉，裏症已具者，大柴胡湯下之。若但熱而嘔逆，心痞自利者，大柴胡湯去大黃調之。虛煩者，竹葉石羔湯。凡大汗後熱不退，脈靜者生，脈盛躁疾者，此名陰陽交，必死。解惑論云：汗後寒熱交作，當看脈尚浮數洪大，猶當微表其汗。醫者見已經汗後，不敢再表，邪氣無由發泄，誤矣。發汗後止惡寒，虛也；發汗後止發熱，實也。惡寒用溫藥，發熱用涼藥，無不愈者。）

虛者汗下之後惡寒愈增。（汗後亡陽惡寒者，表虛也，芍藥附子甘草湯；下焦惡寒者，裏虛也，四逆湯。其有表邪未盡，必兼發熱者，柴胡加桂湯。又有裏實熱伏於內，陽微於外而惡寒，便堅者，亦必兼熱，尤宜下之。百問云：汗後惡寒人必虛，下後發熱人必實，是也。汗下後厥陰症，大汗出，煩躁體疼，拘急厥逆者，陰陽俱虛也，宜四逆湯以補陽，加人參茯苓以益陰。汗下後脈微惡寒者，小柴胡湯去苓加芍藥。有頭汗者，柴胡加桂湯。汗下後尺寸俱微，陰陽表裏俱虛者，小建中湯。噫！傷寒以真氣為主，陽病宜下，真氣弱者下之多脫；陰病宜溫，真氣弱者客熱便生。非藥無力，本主無力也。惟寡慾真氣完者易於用藥。誤下氣脫，昏倦不食不渴者，來復丹、靈砂丹暫服之。）

熱者吐下之後消渴可必。（凡吐下後邪熱不客于上焦為虛煩，而乃客於中焦為消渴者，白虎加參湯。心下痞者，先解其表，後清其裏。汗後渴者，少與水以和胃則愈。傷寒汗吐下後，邪氣乘虛而內客，或壅塞而未盡，皆當量虛實而調治之。）

咳嗽有寒熱水氣之多端。（咳嗽多屬肺金，傷寒言太陽病者何也？肺為五臟華蓋，內通膀胱，外主皮毛，為氣之主。氣逆而不下則咳，風寒乘之氣冷則滯，熱邪乘之氣燥則鬱，水飲乘之與氣相搏。寒熱水氣皆能生痰，又咳之所從始也。以風寒言之，太陽症身熱嘔吐者，麻黃杏仁飲；咳嗽者，三物湯。少陽症寒熱胸滿或挾瀉者，小柴胡去參棗加五味子乾薑。少陰症厥逆腹痛下利者，四逆湯加五味子乾薑。少陰咳而嘔渴，心煩不得眠，下利者，豬苓湯。春冬傷風寒，夏秋傷濕冷，鼻塞喉鳴，氣不得下而咳者，橘皮竹茹湯。以熱咳言之，金沸草散、柴胡半夏湯、瀉白散；或咳膿血者，小柴胡加黃芩黑豆。咳嗽身熱，臟腹滿痛者，大柴胡湯下之。中滿而嘔者，大半夏湯。解利以後胃寒不食者，理中湯、六君子湯，俱加五味子細辛。痰氣盛者，大橘皮湯。素有痰火者，當於芩連二陳湯中消息。又水咳有三症：青龍湯治太陽之表水有寒，十棗湯治太陽之裏水有癖，玄武湯治陰症之裏水有寒。凡咳而小便利者忌汗。久而入臟成癆，膏之上肓之下者不治。）

體痛有陰陽血風之纖悉。（風寒入肌，血脈凝滯，所以身痛。太陽身痛，拘急而已，脈浮緊便青，宜分有汗無汗治之。少陽身痛，必脇硬嘔渴，小柴加瓜湯和之。汗後身痛不休，脈沉遲者，桂枝加參湯。又有痛無常處，按之不可得，短氣脈濇者，宜再汗之。太陽病七八日，脈細惡寒，陰陽俱虛者，不可發汗吐下，宜小柴胡湯。誤汗令人耳聾。素有熱者，黃芪建中湯；素無熱者，芍藥附甘湯。厥陰少陰身痛下利，煩滿脈沉緊者，先溫以四逆湯、玄武湯，後發以桂枝湯。血虛勞倦身痛者，補中益氣湯、黃芪建中湯。風邪在陽明，不榮於表，一身重痛者，葛根湯。陰毒身痛如杖，瘀血身痛，發黃中濕痛難轉側，風濕一身盡痛，見各條。瘡家誤汗身痛必發痓，葛根湯或桂枝湯以救之。）

渴有汗多自利水入即吐名逆症。（熱在表則不渴，熱入裏則熱耗津液而作渴，或汗吐下過多，耗奪津液而渴。然有渴必有煩者，腎主水，熱深則水竭而渴，肝木挾心火以生煩。故厥陰六七日，飲水多而小便少者，謂之消渴。渴欲飲水為欲愈者，傳經已盡也。脈浮而渴屬太陽，有汗而渴屬陽明，自利而渴屬少陰，至於厥陰則熱之極矣。太陽病汗後脈洪者，白虎湯；無汗而渴者，小柴加瓜湯。陽明病汗少溺澁者，五苓散；汗多而渴者，竹葉石羔湯。少陰病下利，咳嘔心煩不眠者，豬苓湯；下利飲水有熱者，白頭翁湯；小便清白虛寒者，甘草乾姜湯。厥陰消渴，不食，食則吐蛔者，烏梅丸。汗吐下津枯者，白虎加參湯。陽毒消渴倍常者，陷胸湯、黑奴丸。中暑者，酒蒸黃連丸。凡飲水安睡者，實熱也。飲水少項即吐者，火邪蝦渴耳。凡渴不可恣飲，須少與之，以潤胃氣，恐變水結。一種水逆症，渴欲飲水，水入即吐者，五苓散。又發汗動右氣，肺傷亦飲水即吐者，亦宜。若先嘔後渴者，為欲解，當少與之水；先渴後嘔者，為水停，赤茯苓湯。有風溫、發黃渴症，見各條。）

漱因經熱裏寒水入不嚥多血疾。（經熱則口燥煩而欲水漱，裏寒則水入而不敢嚥。陽明症漱水不嚥，身熱或微惡寒，熱在經而不在裏，必逼血上行為衄血，黃芩湯。瘀血症漱水不嚥，外無寒熱，喜怒如狂，犀角地黃湯。少陰症脈沉厥冷，煩躁或乾嘔無脈，好漱水不嚥者，四逆湯、白通湯主之。蛔厥症煩躁吐蛔，好水浸舌而不欲嚥者，理中湯加烏梅。）

右一段論傷寒初症，未有不自頭疼項強身痛發熱惡寒有汗無汗，或咳嗽或渴而始者，故提之於此。過七日不愈者，皆雜症也。

怫鬱因汗失宜便堅為實噦為虛。（面者陽明所主，陰盛者面赤而黯，陽盛者面赤而光。表症汗出未徹，以致邪熱怫抑鬱結，故頭面紅赤，甚則蒸於肌膚。汗出未透身痒者，桂麻各半湯；惡寒熱者，葛根湯；汗太過發黃者，茵陳湯；驚惕者，火邪湯。大便難者，裏已實也，大柴胡湯。下後噦者，胃虛也，桂枝參苓湯。）

戴陽浮火所衝。陰症（下利厥逆）熱微陽熱甚。（百問云病人身微熱面赤脉反沉而遲者陰症也身微熱者裏寒也面戴陽者面雖赤而不紅活乃下虛也醫者不察脉以虛陽上高熱躁誤為實熱下之又用涼藥則氣消而成大病矣仲景理中四逆附氏益元湯主之若陽症面赤脉洪大腹滿潮熱大便不通者大柴承氣主之）

目盲鼻鳴而嘔衄者。熱摶之重。（難經曰脫陰目盲言精血脫而不上榮於目故目盲不了了或無所見也傷寒發煩目盲甚者必衄空用血為熱氣所摶妄行於上而為衄得衄則熱隨血散而解與麻黃湯或麻黃升麻湯九味羌活湯蓋傷寒衄為積熱在表用麻黃羌活者非治衄也以解太陽經之邪耳此與太陽病其人適失血及下利宜桂枝湯法同但衄家最忌發汗邪輕者犀角地黃湯又目近鼻為內眥屬太陽近眉尾屬少陽當面屬陽明赤脉從上下者太陽病從下上者陽明病從外走內者少陽病熱則目赤風則目眩寒則目疼又狐惑目不能閉陰症眼睛痛陰陽易病眼中生花○鼻者呼吸清氣之路上竅於肺下通膀胱風寒壅則鼻鳴而必乾嘔太陽病桂枝湯太陽陽明合病鼻乾肌熱者葛根湯）

叉手冒心而聾耳者。陽脫之凶。（難經曰脫陽者見鬼無陽氣而見幽陰之鬼傷寒汗過亡陽其人必叉手自冒心胸而聾耳者何也蓋耳屬腎陽氣盛則上通而聰陽氣虛則下脫而聾仲景云少陰受病胸脇滿而耳聾者是也宜芍藥附甘湯黃芪建中湯救之心悸欲得按者桂枝甘草湯撮空神昏者陶氏升陽散火湯若初症手少陽風病厥而聾者耳中煇煇焞焞小柴胡湯最忌吐下以致驚狂手太陽熱厥聾者耳中塞滿加之熱壅出血出膿則成停耳濕溫厥陰耳聾見前又有風邪入腎耳中卒痛外症寒熱不急治則發強如痙俗名黃耳傷寒不可作正傷寒治之內服小續命湯敗毒散外用虎耳草擣汁滴入耳中上症頭汗如珠不流者陽脫而死）

四肢冒末由熱而溫而冷逆。知是傳經之厥。（傷寒邪在三陽則四肢熱半表半裏及太陰則邪漸入內則四肢溫傳至少陰厥陰則邪入深而陷伏於內則四肢厥冷然先由熱而後厥者傳經熱厥也輕則四逆散白虎湯竹葉石羔湯重則大柴承氣下之若邪乍結胸中心煩不食而厥者瓜蒂散吐之百問云熱厥與冷厥不同熱厥者微厥却發熱若冷厥則不發熱四肢逆冷脉沉細大小便滑泄惡寒指甲青色又有失下血不通四肢便厥醫者不識疑是陰厥復進四逆湯之類禍如反掌大抵熱厥脉沉伏而滑頭上有汗手掌溫指稍亦溫便宜下此仲景之妙旨也）

一舌心苗由白而黃而燥黑。失其本體之紅。（舌為心苗腎主津液無病則舌紅而潤偶見紅星點者將欲發黃如丹田邪熱則心苗枯槁生胎如白胎然是以邪在表則無胎邪初傳裏則胎白而滑胃寒客熱懊憹者梔豉湯吐之陽明症脇硬不大便而嘔舌胎白者亦不可攻小柴胡和之如惡寒欲嘔痰者小柴胡加乾姜白胎滑而下利者為臟結不治○熱漸入深則胎白而澀熱深入胃則胎黃或肥光或尖白根黃者表多裏少也俱白虎加參湯主之○手足腋下汗出譫語便閉胎紫蒂黑或生芒刺虫碎燥裂者承氣湯下之但舌黑亦有數種有四邊紅而中灰黑成路者失下也有黑圈者過經未解也有舌見黃而中有黑至尖或黑亂點者熱毒深也有弦紅心黑或白胎中見黑點者表未解也有根黑尖黃脉滑者可下脉浮者可汗有尖黑而有亂紋脉滑實者急下之脉數無力者必發渴而死凡舌黑不論多少俱係危症惟冷而滑如淡黑然者乃無根虛火可以化痰降火藥治之○陰症胎白腹痛自利者理中湯中濕濕痺舌上如胎非真胎也丹田有熱胃中有寒五苓散）

無寒熱而唇焦者。多因血瘀。（不發寒熱胸滿唇焦漱水不入咽者必衄血也小腹滿小便利大便黑者血瘀於下也）

無色澤而唇青者。必是寒中。（陰症胸脇滿面色及唇皆無色澤手足冷者理中湯若唇青有瘡則為狐惑）

口乾口燥口涎豈無異。（口乾者邪熱聚胃消耗津液故也有汗後口乾者五苓散加知母黃栢有陽明口乾熱甚口禁背微惡寒者白虎加參湯少陽症口乾者小柴胡湯瘀血症口乾漱水不欲嚥者桃仁承氣湯○口燥亦因脾胃有熱津液涸少陽明口燥咽乾皆惡寒煩渴者白虎加參湯少陽口苦咽乾小柴胡湯雙解散少陰口燥舌乾者承氣湯口燥咽乾默默不欲言者宜以狐惑治之凡口乾燥忌汗汗之重亡津液○口涎有陽明熱盛者則涎熱少陰寒症則涎冷）

氣逆氣喘氣短大相同。（氣逆者氣自腹中時時上衝也太陽無汗陽明胸滿者汗之太陽下之早表邪乘虛傳裏裏本虛者受邪不逆裏本實者不肯受邪則氣逆上衝邪仍在表當復汗之厥陰客熱氣上衝心此熱在裏而氣上也下之胸滿實者吐之汗下後氣逆眩暈者茯苓桂朮甘草湯有病後虛羸少氣欲吐氣逆者有動氣發汗氣逆者○氣喘惟有太陽陽明二症太陽症無汗而喘宜汗陽明症汗多而喘宜下太陽陽明合病胸滿而喘惡寒者亦只宜汗而不宜下也故曰微喘緣表之未解喘滿不惡寒者當下而痊又有汗後停水喘者有汗下後喘者有陰症喘息甚急者返陰丹脉伏者加味生脉散如脉伏汗出髮潤者肺絕不治○氣短者呼吸不相接續似喘而不擡肩似呻吟而無痛也經曰微虛相摶則為短氣短氣不足以息者實少氣不足以息者危有結胸者有停水怔忡者有風濕相摶者有素弱及下後脉微氣虛甚者大抵心腹脹滿者為實為邪在裏心胸濡滿者為虛為邪在表氣喘氣逆亦然）

濕嘔乾嘔宜察胃肝病症。（濕嘔有物有聲食已則嘔乾嘔空嘔無物總屬陽明氣血俱病故嘔比吐為重也熱嘔口苦煩渴脉數手心身熱寒嘔頭痛胸滿厥冷吐沫脉遲吐嘰餇飯皆

（然○濕嘔表邪傳裏裏氣上逆故半表裏症多嘔也三陽發熱者俱小柴胡加生姜主之胸滿日晡潮甚加芒硝嘔不止便閉者大柴胡湯嘔多雖有陽明症胃薄不可下者甘桔湯煩渴者先嘔後渴為欲愈猪苓湯先渴後嘔為停水赤茯苓湯飲水即嘔者五苓散虛煩渴者竹葉石羔湯加姜汁或梔豉湯上熱下寒嘔者黃連湯胃寒下利厥冷不渴者理中湯去朮加姜汁或正氣湯加姜汁少陰三症膈上寒飲嘔吐涎沫或吐利而渴者四逆湯加生姜脉沉或咳或悸挾水氣者玄武湯去附子加姜汁手足寒心中溫溫欲吐不吐憒憒無奈何者生姜汁半夏湯經汗下虛者乾姜芩連人參湯汗後水藥及穀食不下者危小半夏湯救之又有溫毒嘔者心悶發與水症嘔者先嘔怔忡嘔膿血者腥臊氣逆上衝嘔盡自愈○乾嘔胃熱與穀氣相併上薰心下痞塞故嘔則無所出食則不能納黃連解毒湯有太陽無汗乾嘔者風邪上壅也桂枝湯有太陽陽明合病不可利而但嘔或乾嘔者裏實氣逆上而不下也葛根湯胃寒津枯乾嘔渴者理中湯少陰三症乾嘔下利脉微者白通湯裏寒外熱脉微欲絶者通脉四逆湯利不止煩躁厥逆無脉者白通加猪膽汁湯厥陰頭痛乾嘔吐痰或自利厥冷煩躁者三味參萸湯胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦憒憒無奈何者生姜汁半夏湯大小橘皮湯）

吐腥吐酸總因胃府熱寒。（吐有物無聲食入即吐丹溪以屬太陽血病然胃寒主之吐利腥臊者為寒酸臭者為熱治與嘔噦一同凡嘔吐脚軟痛者脚氣也嘔吐脉弱小便自利身微熱而厥者虛極難治）

噦餲相因水寒相搏。（噦即乾嘔聲更重且長耳餲乃胸間氣寒不通胃脉浮則為餲滑則為噦皆因胃氣本虛汗下太過或復飲冷水寒相搏胃虛氣逆而上理中湯加肉桂丁香以散寒下氣茯苓半夏以消水噦不止者橘皮乾姜湯橘皮竹茹湯間有熱邪壅鬱上下之氣不得通者俱小柴胡加生姜和之熱甚便難者小承氣下之便軟者諸瀉心湯選用溫病發寒飲冷作噦者升麻葛根湯加茅花凡嘔噦必用半夏散結氣也用竹茹溢胃解煩也用生姜散逆氣也嘔噦餲皆是氣逆故姜為嘔家聖藥熱者烏梅代之）

餩逆亦有陰陽兩端。（舊以為欬嗽之欬俗又以為口吃之吃虞花溪考韻書餩與餲通乃氣逆上之名又有以餩逆為噦者噦出聲然後吸餩逆入聲逆盡然後呼出入呼吸不同兼嘔噦者本於胃餩逆本於肺穀入於胃胃氣上注於肺故寒氣與新穀氣相忤逆而復於胃故噫噫有聲所以丹溪力辯乃相火自臍下逆上衝胸交於厥陰水少相搏而作聲也○陽症發熱口苦胸滿脉弦數小柴胡湯加竹茹小便閉加茯苓或猪苓湯大便閉者調胃承氣湯少陰症失下腹滿便閉或純下清水餩逆者小承氣湯陽明身熱口渴腹滿煩躁脉洪數餩逆者火衝肺也甘草瀉心湯○陰症便軟胃寒或因吐下虛極惡寒脉細者橘皮乾姜湯內寒厥冷者羌活附子湯丁香柿蒂散調蘇合香丸胃寒飲水相搏者小青龍湯去麻黃加附子手足厥冷者小橘皮湯胸滿虛煩者大橘皮湯凡餩逆藥中俱宜陳皮竹茹姜汁）

（此症有欲作正汗陰陽升降而然者即愈又有食積而致者小便閉澁及痰火上衝者腹滿不得小便及脉見沉微散者死已止嘔噦餩逆大同承氣表裏俱有此五症）

衄血熱迫於鼻動經則為厥竭不治。（經絡中熱盛逼血從鼻出者為衄多屬太陽名曰陽血點滴不成流者表猶未解當用辛涼之藥解表九味羌活湯加赤芍或升麻葛根湯加黃芩或麻黃升麻湯雙解散渴者五苓散煩者竹葉石羔湯以散經中之邪仲景云傷寒脉浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之是也如無表症衄血成流及因汗而得衄或下又見血者不治自愈不止者犀角地黃湯陶氏生地芩連湯黃芩湯茅花湯外用冷水浸紙貼太陽穴紙熱又換或用百草霜胎髮燒灰吹入鼻中九竅出血亦然凡衄不宜即止恐餘血入胃着於上焦為血結胸症一直中少陰症熱行於裏先熱後厥無汗亦陰症似陽也醫不能識強發其汗必動其經外則筋惕肉瞤內則伏熱逼衄從耳目而出或從口鼻而出名曰陰血是為下厥上竭不治但厥為下厥血出於上為上竭輕者黃芩湯加生地之類或當歸四逆湯黑錫丹救之動經與鼻衄微有不同如此）

吐血熱積於中併牙乃是腎胃相殘。（汗乃心液熱則變紅而逆出上竅陽邪失汗以致熱毒入臟化為瘀血從口吐出多屬陽明凡見目紅骨熱神昏狂譫胸腹急滿皆血症也熱淺者犀角地黃湯加黃芩山梔茅根藕節或小柴胡湯黃連柏皮湯熱深者桃仁承氣湯三黃湯抵當湯丸陽毒者升麻湯作渴者五苓散恐水入復吐故也或竹葉石羔湯皆加川芎調血炒山梔降火危哉又有陰症吐血脉遲腹痛厥逆嘔吐紫黑色者難治姑以理中湯甘桔湯加生姜汁半夏湯救之又牙床屬胃牙齒屬腎如陽明傳入少陰二經相併血出於牙縫如吐者人多不覺其為牙血以涼水漱血則止少頃又來者是外用綠袍散內服解毒湯合犀角地黃湯或生地芩連湯下之輕者清胃降火而已）

漏汗驚狂痺痺總是火邪逆。（火邪者或不當汗而用火取汗或汗不得而用火劫奪以致火氣薰蒸精神昏憒肢體不寧體虛者漏汗不止真陽脫亡凡汗不得者謂之亡陽汗多不止者亦謂之亡陽如心痞胸煩面青膚潤者難治色黃手足溫者可治因太陽症者桂枝湯加附子或汗下後見吐逆者亦宜因少陰症者四逆湯或便清乾嘔者甘草乾姜湯咽痛者猪膚甘桔湯如少陰餩逆譫語被火小便難者必滋其津液竹葉石羔湯去半夏加生地或時倏然而起惕然而驚起臥不安若狂者救逆湯煩躁遺精者桂甘龍骨牡蠣湯體實者雖不至亡陽然內火外火相併熱發於外則身必發齊熱搏於內則小便必難驚狂譫語煩躁不已或一身盡痛甚則手掉足動循衣摸床者死如小便利者可治通用柴胡龍骨牡蠣湯火邪湯或下清血或因燥唾血者犀角地黃湯發黃痺者茵陳湯若太陽症宜汗而反用火灸者其邪無從而出病當腰下重痺麻杏薏甘湯散之）

譫語鄭聲虛實。全憑水道看。

譫者妄也。或閉目言平生常事。或開目言人所未見事。或獨語。或睡中呢喃。或呻吟不已。甚則狂言惡罵。俱謂之譫語。皆因胃熱乘心。或脈來洪數。二便多閉。外見陽症。有陽明汗多譫語。少陰自利譫語者。內有燥屎也。調胃承氣湯下之。半表裏。默默不欲語。及已得汗而身和。亡陽譫語者。柴胡桂枝湯調之。已下胸煩身重不可轉側譫語者。柴胡龍骨牡蠣湯。錯語獨語呻吟者。解毒湯。導瀉心湯。或白虎湯和之。又有汗多譫語者。風也。俟過經乃可下。瘥後譫語者。邪留心胞也。知母麻黃湯。如氣逆下利厥冷而脈又沉細者死。身熱脈大。聲清氣朗。目光面潤者生。瘥血亡陽久病濕溫熱入血室火邪譫語見各條。○鄭者重也。言語重復不已。聲音糢糊。有如鄭衛不正之音。皆因汗下後及風溫發汗過多。以致表虛裏竭。精氣奪而神昏舌短。故脈息沉微。二便多利。外見陰症。白通湯救之。或單人參湯亦可。故曰。譫語實則可下。虛不可為。實者胃實有燥屎也。虛者胃虛腸自利也。全憑水道斷之。

咽痛有熱無熱。腎伏暴寒下必利。

太陰絡咽。少陰絡喉。熱邪乘之。乃生咽痛。若汗下過多。虛而生熱。亦能咽痛。有少陰身熱腹痛脈沉咽痛。或下食嘔吐者。黃連龍骨湯。少陰客熱咽痛者。單甘草湯。寒熱相搏及亡陽咽痛者。豬膚湯。甘桔湯。二便難者。甘桔湯加玄參枳殼。順導黑臭之物。續以甘草生姜煎湯頻與之。以解其毒。或陶氏芩連消毒飲。陽毒發斑吐血咽痛者。玄參升麻湯。陽厥宜下。反發汗則口瘡赤爛。內服升麻六物湯。外用蜜漬黃柏汁含之。咽喉閉塞者。烏角湯。聲音不出者。雞殼苦酒湯。有少陰咽痛無熱。下利四肢厥冷者。甘桔湯。厥冷吐利脈沉者。豬膚湯。厥冷下利不止者。四順湯丸。或通脈四逆湯加桔梗。不可汗下。有汗者。藁本末撲之。又有腎傷寒一症。乃非時暴寒伏於腎經。初起頭痛腰痛咽痛。次即下利。脈微弱者。先用半桂湯。次用四逆湯主之。傷寒六七日大下後。脈遲不至。咽痛吐膿血。厥冷利不止者死。麻黃升麻湯救之。

臟結有痞無痞。臍痛引陰生必難。

臟結與結胸相似。皆下後邪氣入裏。與陽相結。結在胸者為結胸。與陰相結。結在臟者為臟結。惟其陰結。故臟結無陽症。不往來寒熱。或但寒而不熱。其人反靜。飲食如常。時時下利。舌上白胎。脇肋臍腹引入陰筋俱痛者。丹田有熱。胸中有寒。所以難治。又病人脇下素有痞氣。再加傷寒邪氣與宿食相合。使真臟之氣閉結而不通。亦名臟結。不問有痞無痞。慎不可下。邪未全成熱。猶在表。止宜小柴胡加生姜以和表。灸關元穴以回陽而解陰氣之結。危哉。

結胸下早而緊痛。大小寒熱宜細辨。

傷寒太陽症下之早。而表邪乘虛客於上焦少陽之分。名曰結胸。當心緊痛而煩。水漿不入。但能仰而不能俛。甚表邪又不散。故項強如柔痓狀。有大結胸者。不按而痛。胸連臍腹痛硬。手不可近。不大便。日晡熱潮。大陷胸湯丸。有小結胸者。按之方痛。只心下硬。小陷胸湯。有寒實結胸者。身不熱。口不渴。但心中脹硬而痛。枳實理中丸。五積散。甚者三物白散。有熱實結胸者。心下滿硬。懊憹煩燥而渴。柴胡湯。甚者大陷胸湯。有水結胸。血結胸。陰毒陽毒結胸見各條。結胸脈浮大者不可下。下之即死。結胸症具而煩燥者死。結胸見陰脈陰症及喘急飽逆者亦死。若未經下而胸滿者。乃半表裏吐症。不可誤作結胸。

痞氣下早而虛滿。硬濡噦利更易安。

傷寒半表症下早。而邪入於中焦太陰之分。而成痞氣。按之濡而不痛。比之結胸更輕。有胸滿而硬。嘔吐下利者。裏實有水也。大柴胡湯。心痞引脇下痛乾嘔者。十棗湯。汗出惡寒者。附子瀉心湯。有胸滿而濡。脇肋脹滿者。虛邪氣聚耳。小柴胡湯加乾姜牡蠣各一錢。胃虛氣逆者。半夏瀉心湯。有心痞噦噫者。胃不和也。汗出脇有水聲雷鳴者。生姜瀉心湯。心痞噦噫不止者。旋覆代赭石湯。有下利者。裏虛也。穀不化腹鳴者。甘草瀉心湯。或已數下。表邪入裏于於腸胃。遂成下利而心下痞硬者。謂之表裏不解。桂枝人參湯。下利不止者。赤石脂禹餘粮湯。又結胸痞氣。關脉皆沉。如關浮惡熱心痞者。乃汗熱非痞也。三黃瀉心湯。心痞而口渴溺澁。服瀉心湯不效者。乃停水非熱痞也。五苓散。凡痞氣服諸瀉心湯而熱不除者。亦須大陷胸湯丸下之。但結胸與痞雖宜下。如脉浮惡寒有表者。須柴胡桂枝湯。或柴陷湯解表。必表症悉罷。關尺沉滑緊實者。方可下之。下後病猶不退者。乃下虛氣逆上攻。枳實理中丸和其胃氣。初起未成痞結之際。虛者亦宜枳實理中丸。實者枳梗湯。檳榔湯疎氣。然後隨症用藥。胃冷厥逆者。俱下理中四逆和胃。待日久邪不退。而後議下。是結胸痞氣始末用藥俱同。但中間用藥畧有輕重之殊耳。不識前輩分陰陽二症。謂何陶氏又以傷風為陽。傷寒為陰。王氏又以痞氣乃陰症。有表者皆於理未協。要之皆傳經陽症。但下後胃寒。而用藥有宜溫者。若邪盛胃實。方可寒涼下之。二症皆然。且考傷寒論正文云。太陽少陽併病。而反下之成結胸。心下痞硬。入裏則為痞氣。初未嘗分陰陽也。設有陰症誤下不死。而結胸痞氣者。亦當以陰毒結胸法治。安敢又用二黃瀉心等劑耶。以此論之。謂陰陽二症俱有結胸痞氣則可。謂陽症為結胸。陰症為痞氣則不可。又用寒涼藥治陰症。尤不可。知者裁之。○又心下妨悶。不滿不硬者。謂之支結。表未解者。柴胡桂枝湯。胸脇滿而微結者。小柴胡加乾姜牡蠣各一錢。表裏俱不解者。桂枝人參湯。

客熱懊憹時發躁。

懊憹心中不自如也。比燥更甚。表症誤下。陽氣內陷。心下固硬者。則為結胸。胃氣空虛。客熱在膈。短氣煩燥微疼。則為懊憹。將成結胸者。宜大小陷胸湯。但懊憹煩不得眠。飢不得食。頭汗出而不結胸者。梔豉湯。腹脹坐臥不安者。梔子厚樸湯。渴者。白虎湯。陽明症下後懊憹者。內有燥糞。猶宜承氣湯下之。懊憹小便難者。必發黃。茵陳湯。

內虛動悸必生煩。

悸動也。心膈間客邪乘之。築築然觸動。如人將捕。即怔忡意也。有水停心下。頭眩身搖。厥而悸者。滲其水而悸厥自定。有神氣素虛。心中空耗。不能自持者。有汗下後內虛而悸者。比之素虛者尤甚。須先定其氣。而後治其悸。大約先煩後悸者為虛。小建中湯。玄武湯。脈代者。炙甘草湯。入酒少許。汗後胃眩者。桂枝甘草湯。先悸後煩者為熱。小柴胡湯。喜嘔譫語大便難者。小柴胡湯加

大黃或加芒硝少許譫語小便不利者柴胡龍骨牡蠣湯小便赤者五苓散

胸滿多帶表肌症。胸滿者未經下而胸膈氣塞滿悶非心下痞氣亦非結胸也蓋外邪自皮毛傳入胸中少陽所屬半表裏症也柴梗湯主之譫語身痛者柴胡龍骨牡蠣湯有痰氣逆上搶心者梔豉湯或加甘草生姜誤下脉促者桂枝湯去芍藥喘者麻杏甘石湯胃虛者半夏瀉心湯滿硬便閉屬臟者方可議下尋常胸膈不利多挾痰氣食積者柴陳湯枳梗湯調之

脇滿半居表裏間。脇滿非腹中滿也乃脇肋下脹滿半表半裏之間多耳聾沉嘔寒熱往來默默不欲食少陽所主小柴胡湯和之如太陽未罷項強者小柴胡加乾葛陽明便閉舌胎者柴梗湯挾痰熱者柴梗半夏湯有水症及臟結脇滿者見各條

腹脹裏有邪。陽閉潮而陰利厥。腹脹裏未淨。吐下實而汗後虛。傷寒外邪自表分皮膚肌肉而入於胸膈筋力為半表裏直至傳入胃府乃為入裏是腹脹雖屬太陰而裏症尚淺未全入府猶宜和之惟腹滿硬不減咽乾口燥便閉者乃陽邪入裏方可下之若腹滿濡時減吐利厥冷者乃裏寒陰症速宜溫之○又汗後滿者外已解而裏亦不實乃脾胃津液不足氣澁不通壅而為滿宜厚朴半夏甘參湯以溫散之吐下後滿者表邪未淨乘虛入裏以致上下氣不通和宜大柴胡湯加厚朴量下之或梔子厚朴湯量吐之合病脹者身重痛口頑麻白虎湯加減通用柴梗湯柴梗半夏湯凡脹滿忌用白朮閉氣如腹脹喘而不尿脉濇者死

腹痛熱閉冷利皆邪入裏相搏。寒熱邪氣入裏與正氣相搏則腹痛陽症不可按揉大便閉者為熱表症誤下表裏俱病者桂枝加芍藥湯甚者加大黃半表裏症者小柴胡湯去芩加白芍表裏俱熱者大柴胡湯遶臍腹痛滿實手不可近而便閉者內有燥屎也大承氣湯經曰痛隨利減是也熱厥泄瀉者四逆散上熱下寒欲吐者黃連湯虛煩者梔豉湯加厚朴枳實○陰症可按與揉痛無休息腸鳴而大便利者為冷太陰理中湯黃芪建中湯少陰四逆湯玄武湯厥陰正陽散當歸四逆湯太陰連小腹痛甚自利不止者難治又大腹屬太陰臍腹屬少陰臍下屬厥陰多有挾食積與痰火者

臍滿熱瘀冷結有物非氣為辜。心胸與大腹滿者皆外邪傳入惟小腹脹滿者非血瘀便是溺澁血結膀胱者小便自利熱結膀胱者小便自澁又有冷結膀胱小便赤澁但手足厥而胸不滿為異宜外灸關元穴內服玄武湯

妄施三法動積氣奔豚上衝尤甚。其人先有五積在臍中或臍上下左右復因傷寒邪氣衝動新邪與舊積相搏而痛或醫人不識病者原有痞積妄施汗吐下發動其積氣築築然跳動名曰動氣動右肺氣則咽乾鼻燥衄渴欲飲即吐水動左肺氣則筋惕肉瞤身熱欲踡動上心氣則掌熱作渴氣上衝心動下腎氣則心煩骨痛食則嘔吐或下利清穀大槩虛者適用理中湯去白朮加肉桂頭眩惕瞤汗多者防朮牡蠣湯小建中湯腹滿身微熱欲踡者甘草乾姜湯心煩骨痛吐食者大橘皮湯熱者通用柴胡桂枝湯煩渴者竹葉石羔湯衄血煩渴者五苓散心痞下利清穀者甘草瀉心湯氣上衝心者李根湯五積惟臍下奔豚衝心最甚多因汗下心虛而腎氣乘虛上衝有若江流洊浪然桂枝湯加桂一倍若不上衝者不可妄與臍下動甚頭眩身振者茯苓桂甘大棗湯吐後去棗加白朮蓋白朮閉氣止可暫用惟桂瀉奔豚苓伐腎邪奔豚妙藥也

邪犯三焦成霍亂吐利不發則難。三焦水穀道路邪在上焦吐而不利邪在下焦利而不吐邪在中焦上吐下利病因飲食不節清濁相干陰陽乖隔輕者止曰吐利重者煇燿撩亂乃曰霍亂外症必發熱惡寒頭疼身痛本傷寒病也因邪入脾胃故發為吐利然中焦為寒熱之半邪偏高居陽分者則多熱而渴五苓散分利之邪偏下居陰分者則多寒不渴理中湯分利之風寒濕勝者藿香正氣散除濕湯五積散穿合暑勝大渴者二香黃連散益元散柴苓湯選用傷食甚者平胃散治中湯主之轉筋者氣不和也俱加木瓜或單用雞屎白暑妙為末溫湯化下方七凡霍亂多責於熱故夏秋為盛或熱伏於內手足如冰六脉沉伏食即飯逆此火氣上奔而然不可誤為陰症必吐利小便亦自利而大汗出下利清穀寒熱四肢拘急厥逆脉微欲絕乃為陰症四逆湯或加吳萸生姜救之少陰吐利煩燥欲死者三味參萸湯吐利止自汗厥逆不渴脉微欲絕者通脉四逆湯加猪膽汁吐利止身痛不休者桂枝加參湯吐利止發熱者隨症微汗之吐利亡津而渴者竹葉石羔湯白虎加參湯吐利不止者靈砂丹木香乾姜煎湯下凡霍亂不可遽與米飲粥飯等食以助邪氣必所傷物盡然後淺食少少養之傷寒心痞發熱吐利者大柴胡症也不可誤為霍亂○乾霍亂者氣痞於中欲吐不得吐欲泄不得泄所傷之物壅閉正氣關格陰陽煩燥喘脹者必死急以鹽湯一盞入童便姜汁頓服探吐令透未吐再服外用鹽炒吳萸熨臍下即以理中湯加陳皮調之或藿香正氣散加官桂倍枳殼茯苓木瓜合蘇合香丸如發熱頭腹痛者桂枝加大黃湯

大便閉本裏熱而帶表屬陰未可攻下。論云陽結能食不大便者即裏熱症言陽氣固結於腸胃蓋病邪在表則大便如常邪傳入腸胃之裏謂之正陽明病潮汗譫滿渴狂譫尺脉實者諸承氣湯選用如脉浮帶嘔舌上白胎者知邪未全入府猶屬半裏所謂嘔家雖有陽明症不可攻舌上白胎未可攻者是也宜與小柴胡湯和其榮衛通其津液得微汗而自解然有數日不大便而妨悶甚者雖尚有些表症亦當與大柴胡湯或小承氣湯微潤之又陽明症汗多小便利而大便硬或發汗利小便多而大便硬者皆津液內竭宜蜜導之大便硬小便數者乃為脾約宜麻子仁丸大便

（堅小便少者未可攻津液未充候其小便自如乃可攻也當問病人一日小便幾行若如常當知氣已下行大便不久自出要知古人審用轉藥若欲行大承氣湯當先一日用小承氣湯候其腹中轉失氣轉氣者腹中響而放屁知其有燥糞臭者有宿食宜攻之若不轉失氣者必先硬後溏勿攻之金匱云六七日無所苦不可攻下之早熱氣乘虛入胃重者必死又便閉屢下不通者須吐以提之◎陰結脉沉遲不渴不食身重如石且冷大便硬而艱難非燥糞也乃陰寒固結於胃血氣凝滯而閉塞也宜四物湯附子湯或金液丹古半硫丸五積散如之又不大便而脉反微濇者裏虛甚也急以黃芪建中湯救之又有食滯脾及血燥而不大便者當於雜病傷食及燥門求之）

小便閉本不熱而亡津屬陰難以滲疏（傷寒邪在表則小便利入裏下焦有熱引飲過多小腹脹硬小便閉者脉浮五苓散脉沉猪苓湯大便乍難乍易而小便不利者內有燥屎大承氣湯若陽明汗多或發汗胃中津乾不利者切忌滲待其津液還而自通可也汗下後發熱項強頭項心痛無汗小便不利者三白姜棗湯半表症小柴胡湯去苓加茯苓譫語身重者柴胡龍骨牡蠣湯少陰脉沉小便不利者玄武湯或四逆湯加茯苓少陰腹滿痛便膿血小便不利者桃花湯又陰毒下利小便不利囊縮小腹痛欲死者急與返魂丹姚藥服之若用寒涼之藥陰氣伏蓄小腹有至死者或見小便不利以炒鹽熨臍下陰氣不散被熱物熨之冷氣衝心亦有致死者凡小便閉而厥逆頭汗出者陽脫關格不治水症黃症風溫小便不利見前）

水難陰虛而陽邪湊襲○（小便難者出不快也經曰陽入陰分則膀胱熱而小便難惟陰分虛而陽熱乘之不可強利必小便黃赤者乃可萬全木通湯利之如太陽汗不止者桂枝湯加附子陽明傷風嗜臥自黃者小柴胡湯加茯苓）

水利偏前而後更乾枯○（傷寒內熱則小便閉今反利者膀胱主津液而偏滲於前宜乎後便乾枯有瘀血症小腹硬滿其人如狂者抵當湯有少陰症厥逆脉沉者四逆湯或玄武湯去茯苓有陽明症自汗小便利而大便雖硬者不可攻宜蜜導法或猪膽汁灌之有停水心悸者茯苓桂甘湯）

膀胱移熱○小便雖濁而不痛（裏和則小便清裏熱則小便濁膀胱移熱於小腸則尿血與赤濁相似導赤散或玄胡索散朴硝二味等分水煎服或加川芎滲利之劑尤妙此亦瘀血中之一症也）

腎虛協熱小便雖數而無餘○（惟虛則小便頻數惟熱則小便澁滯而不快有宜溫者太陽自汗小便數者雖有表症不可桂枝重亡津液誤服厥者陽不足也甘草乾姜湯心煩脚攣者血不足也芍藥甘草湯有宜下者譫語自汗小便數者調胃承氣湯少與之汗吐下後小便數大便硬者大柴胡湯陽明汗多小便數大便硬者胃強脾約乃約束津液不行宜脾約丸餘滲遺溺見後危症）

協熱自利而渴曰腸垢○（腸間津汁垢膩）熱甚純下清泉○

協寒自利不渴曰鴨溏○（清白如鴨屎狀）濕毒有如豆汁○（陽症自利溏泄身熱臍下亦熱作渴尿赤後重泄下黃赤故曰腸垢陰症自利太陰手足溫少陰厥陰手足厥冷臍下亦冷不渴利下清白故曰鴨溏熱因表邪入裏挾風則所下必暴寒乃直中或經大法熱宜和解或攻泄或利小便寒宜溫中或固下焦俱不宜發汗令胃氣虛而脹滿作但自利舊分陽症陰症又分協熱協寒而治法相同然陽症自利亦必裏氣虛而表熱乘之乃能自利雖太陽初症下利亦然與表邪傳裏協熱下利無異至於陰即協寒其症尤顯所以云陽症下利誤溫則發黃斑出而死此等支離去處每為合一庶不惑人大槩裏氣協熱下利黃赤者黃芩湯最妙帶表口渴下利者柴苓湯少陰熱症渴而下利者白虎湯少陰熱症咳而嘔渴心煩不得眠而下利者猪苓湯熱甚口燥心痛下利純清水者大承氣湯潮熱譫語脉滑有宿食者大柴胡湯或陶氏黃龍湯下利脉和者內實下利脉滑或浮大按之反濇不飲食者有宿食並宜下之又太陽和傷風下利不惡寒頭痛乾嘔心痞腹痛者桂枝湯加芫花或十棗湯胃不和腸鳴下利者生姜瀉心湯小便澁大便利者赤石脂丸下利頻而溺如常者自止橘皮竹茹湯調之合病自利及心痞下利見各條◎裏氣協寒下利清白太陰不渴者理中湯四逆湯寒毒入胃者四逆湯加韭白少陰自利虛渴脉微者白通湯厥逆無脉者白通加猪膽汁湯通脉四逆湯少陰下利咽痛者甘桔湯厥陰下利先厥而後發熱者下利必自止若再厥者必復利也小建中湯當歸四逆湯利不止者赤石脂禹餘粮湯又下利身痛者先以四逆湯救裏利止但身痛者急服桂枝湯救表凡下利譫語直視乃厥躁不得眠汗不止無脉及自利不禁身熱脉實者皆死◎濕毒下利膿血腹滿腸內刮痛如魚腦爛桃或如黑豆汁者除濕湯猪苓湯地榆散濕挾熱者敗毒散黃芩湯白頭翁湯如無濕但熱毒日晡壯熱腹痛便下膿血稠粘者黃連阿膠湯濕挾風者胃風湯加木香濕挾寒者不換金正氣散加乾姜木香又陽症便膿血者亦名協熱腸垢當清其腸犀角地黃湯陽明熱入血室下血者小柴胡湯加生地枳殼山梔少陰下利膿血者亦謂之挾寒鴨溏當固下焦桃花散赤石脂丸）

壯而熱○止其利斷下之生也不長○（少壯人實熱下利不宜止澁止之則加熱悶而死名曰壯熱斷下）

厥而利反能食○除中之死也可立○（邪在表則能食邪在裏則不能食表裏之間者欲食而不能食今傷寒厥深下利脉遲當不能食而反能食者名曰除中中之胃氣既除豈可再復）

風漏手足攣搐○陽虧四肢拘急○（四肢諸陽之本，腰背太陽之絡。因發汗腠理空疎，蓋覆不週，將息未久，以致風邪復入筋骨之間，攣搐有妨行持，牛蒡根湯主之。如脚攣齒嚙者，風熱也，承氣湯下之。○拘急者，手足不能自如，屈伸不便，踡臥惡風之貌。發汗亡陽而有此症，汗多小便難者，桂枝湯加附子。吐下後厥逆拘急，下四逆湯。心煩足攣屬血虛者，芍藥甘草湯。陰陽易病，亦有手足搐搦如風狀者，古爪竹湯。）

太陽腰痛頂連尻○陽明不可回顧，少陽如針刺○（太陽症分有汗無汗。傷寒，人參順氣散；傷風，敗毒散，或通氣防風湯。粗人刺委中血甚妙。太陽合陽明，葛根湯。少陽，柴胡桂枝湯。與頭痛參看。）

少陰腰痛背及脊○太陰遺溺（腰下如橫木，甚則遺溺。）厥陰張弓○（厥陰風熱，故腰強急如弓。三通用五積散加杜仲、附子，或加茯苓、黃芪建中湯、當歸四逆湯。中尚當於雜病腰痛參看。）

陽氣虛而筋惕肉瞤○（陽氣者，精則養神，柔則養筋。汗下後津液耗竭，陽氣太虛，內筋失養，故惕然而跳，瞤然而動，久則成痿。治宜溫經養榮益胃，玄武湯是也。羸甚去芍藥，熱者去附子，或陶氏溫經益元湯亦好。汗下後頭眩身搖者，茯苓桂朮甘草湯。心下痞滿者，暫與枳梗湯加茯苓。汗下後表裏俱虛，又素虛之人微發其汗，膚瞤肉戰，喘促，汗出如油者死。動氣在左，發汗有此症者亦危。）

風熱極而瘈短瘲長○（俗云搐也。瘈則筋脈急而縮短，瘲則筋脈緩而弛長，急緩之間，筋脈牽引，伸縮不定，狀如風癎可畏。多因汗下脾土受傷，木旺風熱熾盛，故手足動搖搐搦。必平木降火，以柴胡、山梔滌熱，防風、羌活祛風，兼佐和血化痰之藥治之，與痓大同。如聖餅子、引風湯、陶氏如聖飲選用。結胸失下有此症者，大承氣湯。風溫被火瘈瘲，萎蕤湯、火邪湯。經曰：太陽終者，戴眼反折，瘈瘲，汗出不流者死。）

邪氣勝則心寒而慄也屬陰，正氣勝則身振而戰也屬陽○（戰者身振而動，慄者心戰而惕。邪氣外與正爭，正氣勝則戰；邪氣內與正爭，邪氣勝則慄。戰則病欲愈，慄則病欲甚。戰屬陽，故一戰搖之間而真陽鼓動，大汗以解，不必藥也。慄屬陰，陰無勝陽之理，故恐懼不戰而承乎陽，於是陽反為陰所制，心寒足踡，鼓頷厥冷，便溺妄出，不知人事，純乎陰而陽敗，遂成寒症。宜理中、四逆，甚則養正丹，併灸關元穴。若復躁極而不得臥者不治。若原係傳經熱症，目燥咬牙，雖厥冷有時溫和，脈大而數，表症慄者，羌活沖和湯；裏症慄者，大柴胡湯。）

蚘厥却緣多饑蟲攻咽及攻胃○（蚘即蛔也。謂之厥者，痞屬厥陰，又手足厥逆義也。其人素有食蛔，或因病過饑，蟲逆上咽膈而出；妄發其汗，以致胃冷，長蟲上攻咽膈；胃氣困乏，雖飢不能食，食即吐蛔者，蟲聞食臭氣而出也。外症乍靜乍煩者，蟲或上或止也。又或下利臟寒，則蛔亦上入於膈。然上焦熱而中下焦寒，故雖煩熱消渴便硬，不可遽投涼藥，當先以烏梅丸、理中湯安蛔，然後隨症調之。或煩熱不退者，小柴胡湯；或熱甚昏譫，腹脹便閉，或蛔不得安，從大便而出者，大柴胡湯。）

狐惑蓋緣失汗蟲食臟及食肛○（此亦蟲症也。如狐聽冰，猶豫不決之義。初起狀如傷寒，或因傷寒變成。其候四肢沉重，欲食惡聞食氣，欲眠目不能閉，舌白齒晦，面目色變無常。蟲食下部為狐，下唇有瘡，其咽乾；蟲食其喉為惑，上唇有瘡，其聲啞，殺人甚急。皆因汗下失宜，邪熱入腹，以致飲食少而腸胃虛，虛甚則三蟲乘而食人五臟。食上部者，三黃瀉心湯主之；食下部者，苦參煎湯淹洗之；食肛門外者，用生艾汁調雄黃末燒烟薰之。通用黃連犀角湯。治䘌，桃仁湯、金液丹、雄黃銳散。又濕䘌蟲症，與狐惑症同，但專食其臟為異耳。）

陰陽發斑總是火，誰知溫毒陽毒○（傷寒陽症發斑，謂之陽毒；春溫發斑，謂之溫毒；夏熱發斑，謂之熱毒；時行與暴溫發斑，謂之時毒。名雖不同，同歸於熱。或因當汗不汗，及已汗而熱氣不散，表虛裏實而發者；或因當下不下，熱蓄於胃而發者；或因下早，熱邪乘虛入胃，傷血不散而發者；或因誤服溫藥，胃熱焦爛而發者。然皆心火入肺，故見紅點於皮毛之間，輕如疹子蚊迹，只在手足，先紅後黃；重如錦紋，發在胸腹，先紅後赤。切忌發汗，重令門泄，甚則皮膚斑爛。陽毒具而紅潤稀疏，起發五六日即愈；若陰脈見而黑斑稠密，成片身涼，六七日死；先紅後黯如果實者亦死。○陽毒舌焦鼻煤發斑者，陽毒升麻湯、白虎加參湯。熱甚者，三黃石羔湯、三黃瀉心湯、陶氏消斑青黛飲選用。有斑瘡如豌豆者，黃連一物湯水煎濃汁服，或青黛一物湯。熱病發斑與陽毒同。○溫毒因冬煖感濕氣，至春風氣相搏，發為癮疹多痒。初起，升麻葛根湯加玄參，或敗毒散加紫草、赤芍。日久發渴，腹滿便硬者，調胃承氣湯加黃連、赤芍、生地、牡丹皮。已經發汗而毒不解者，黑膏主之。○熱病發斑，時行發斑，身如火色者，大青四物湯、猪膽雞子湯。○發斑雜症：咽痛，玄參升麻湯，或紫雪。熱之餘逆下利者，黃連橘皮湯。心煩嘔吐者，葛根橘皮湯。血熱內結者，小柴胡湯、犀角地黃湯。斑盛破爛者，芒硝猪膽汁法。凡汗下不解，足冷耳聾，煩悶咳嘔，便是發斑之候，宜化斑消斑之藥以防之。諸斑藥皆通用，惟溫毒挾風稍殊耳。○陰症亦有發斑者，乃相火乘肺，故但出於胸背，手足稀少，脈沉，身無大熱為異。宜理中湯，或加附子、玄參。）

血溺如狂有是症，爭似發狂凶狂○（有陰盛發燥，欲坐井地如狂者；有火邪驚惕不安如狂者。然血溺如狂有三症，與陽毒如狂相似，故舉言之。○如狂屬瘀血者，脈沉實，多漱水不嚥。有無表症，但血蓄下焦，小便自利如狂者；有無表裏症，脈數善饑，不大便如狂者；有太陽初症，熱結下焦如狂者。血自下者即愈。如外未解者，桂枝湯、陶氏桂苓飲；外已解，但小腹急結者，桃仁承氣湯挾血。）

傳心脾者當歸活血湯有太陰身黃溺澀如狂者五苓散此皆如狂但睡中忽欲起行錯言妄語猶知諫阻尚可制禦非若發狂擊凶莫能禦也發狂者熱毒在胃併入於心遂使神昏不定言動急速妄辯妄笑甚則登高而歌棄衣而走踰垣上屋不饑不卧皆因汗下失宜陽氣亢極陰氣暴虛非大吐下不止傷寒四五日身熱煩躁不得汗發狂者表裏俱熱三黃石羔湯雙解湯傷寒六七日壯熱胸滿便閉脈實數發狂者大承氣湯加黃連陽毒暴盛發狂多乾嘔面赤發斑咽痛下利黃赤壯熱而不得汗者葶藶苦酒湯咽痛吐膿血者陽毒升麻湯潮熱甚者梔子仁湯潮熱大便閉者升麻葛根湯加大黃或三黃湯發斑不可下者草龍膽一味水煎服狂走者瓜蒂散吐痰時行熱毒發狂者黑奴丸通用水漬法火劫法王氏玄明粉凡發狂見陽症陽脈者順見陰症陰脈及舌卷囊縮者即死

多眠陰盛○而晝寢不厭○（傷寒邪傳陰則多眠昏昏閉目者陰主闔也默默不欲言者陰主靜也有太陽症外已解而神將復者設若胸滿脇痛鼻乾得汗者小柴胡湯脈浮羗活冲和湯冬）月麻黃湯有陽明熱伏於裏而嗜卧者小柴胡湯少陰脈沉細自利欲吐而渴多眠者四逆湯加人參茯苓以益陰回陽或熱病得汗後脈沉細身冷初覺安靜漸次昏沉喜卧不省亦急與四逆湯令四肢溫不爾有熟睡而死者合病目合則汗出風溫常不了了狐惑精神恍惚治見各條惟汗下後酣睡者為正氣已復不必藥也

不眠陽盛○而夜卧不遑○（或終夜煩擾或晝夜惺惺不眠未經汗下而不眠屬陽明初症者葛根解肌湯在裏屬心神不清者大承氣湯已經汗下不眠津液乾熱盛陰虛胃不和也太陽發）汗過多躁不得眠欲飲水者即愈若脈浮而渴小便難者五苓散汗吐下後懊憹不眠者梔豉湯晝夜不眠者酸棗仁湯錯語乾嘔不眠者解毒湯譫語小便淋澀煩躁少睡者白虎湯加山梔挾瘀血者犀角地黃湯少陰下利而渴或因下後不得睡者猪苓湯少陰二三日心煩不眠者黃連雞子湯下後陽虛脈沉無表症夜靜晝煩不得眠者宜古姜附湯或四逆湯加茯苓汗多者小建中湯傷寒瘥後不眠者陰氣未復也梔子烏梅湯或溫膽湯加竹茹虛者十味溫膽湯精神恍惚者朱雀丸古法不眠者單熟酸棗散多眠者單生酸棗散亦好

常病常法易知○變病變法難詳○

右一段論傷寒雜症從面至足及眠○逐一詳審○以便問症云○

陰症微甚○分於便閉便通○（三陰經血分自受寒謂之陰症有微甚不同微者寒邪自背俞漸入少陰故表鬱亦能發熱但終不如陽症熱甚亦或頭疼但肢厥脈沉為異古法麻黃附子）細辛湯麻黃附子甘草湯附子細辛湯通用辛黃三白湯微而腹痛手足清冷便閉者桂枝加芍藥湯甘草乾姜湯理中丸有表復有裏者人參三白湯或附子細辛湯加大黃甚者不自表分漸入或上從鼻入

或下從足入卒中陰經初起無頭疼身熱但惡寒厥冷或胸腹滿痛嘔利間有熱者虛陽之氣外浮耳太陰腹痛自利附子理中湯痛甚理中湯合小建中湯溺澀理中合五苓散少陰口和背惡寒身痛虛渴或發熱脈沉下利者名夾陰傷寒附子湯少陰下利清穀或咽痛厥微者四逆湯利不止脈欲絕者白通湯無脈者白通加猪膽汁湯厥陰下利小腹痛或消渴吐蛔者當歸四逆湯凡陰症唇青舌黑或白胎或卷強者用生姜頻擦唇口擦後黑轉為紅乃吉

陰症常變○察其有力無力○（厥冷吐利不渴靜踡此陰症之常也若發熱面赤煩躁飲冷脈大撫衣去被此陰症之變也若認作陽症投涼必死須察脈有力無力如重按無力或全無者）便是伏陰急與五積散通解表裏之寒甚加姜附如果有力乃陽症似陰也不可不辨陰症無脈者姜汁半盞服之或春四順丸又病人有痛處當知痛甚者脈必伏如無痛症用此法脈不來者死如原無正脈須覆手取之乃陰陽錯亂也宜和合陰陽

陰厥不熱○便厥而下利淒清○（陰厥者未厥前無頭疼無身熱吐利不渴靜踡等症乃陰邪獨勝而然手足盡冷乃厥陰所生陰陽之氣不相接逆而然非比傳經四逆之漸冷也太陰）厥手足指頭微冷者理中湯少陰厥脛寒足冷甚則手至臂足至膝者四逆湯通脈四逆湯厥陰厥一身盡冷者當歸四逆湯厥逆煩躁者不治百問云冷厥初得病四肢逆冷脈沉細卧多攣足或惡寒指甲青色或自引衣覆身或下利清穀或清便自調小便數外症惺惺此厥冷也四逆湯三味參萸湯選用凡滿熱多厥少者易愈厥多熱少者難已又有血厥四物湯氣厥四君子湯暑厥白虎湯水厥心下怔忡茯苓桂甘湯尸厥即中惡冒犯不正之氣而然木香勻氣散合平胃散或追魂湯然厥見前

陽厥微厥○便熱而下利黃赤○（陽逆者未厥前有頭疼有身熱潮汗閉澀滿渴狂譫症具陽邪深入陷伏於內而後發厥微厥半日間却又發熱熱氣下行則腹痛下利後重稠粘黃赤）必見膿血若不便血熱氣上行則必喉痺又熱厥傳經七日不退者其後必便膿血若陰厥腹痛下利清白不渴以陰之尤的詳前熱厥

暈厥挾痰與伏火○（暈者昏暈傷寒乃熱結胸滿痰盛口閉不省人事先用絹帕裹指牙齦上頻頻擦之候牙寬却用大承氣下之）

臟厥發躁無休息○（發熱七八日脈微膚冷而躁或吐或瀉無時暫安者此乃厥陰真臟氣盡故曰臟厥仲景無治法四逆湯冷飲救之又少陰厥而吐利發躁者亦不治三味參萸湯救之）

陰毒冷汗甲青○而六脈沉細○身痛若鞭○（三陰病深必變為陰毒有初生遽然而成者有誤服寒藥或吐下後變而成者蓋以房勞損腎生冷傷脾內已伏陰外又感寒致之）

（內外皆陰陽氣暴絕故耳外症比常陰症厥冷吐利不渴靜踡甚則咽痛鄭聲加以頭痛頭汗眼睛內痛不欲見光面唇指甲青黑手背冷汗心下結硬臍腹築痛身如鞭朴外腎氷冷或便膿血診其脉附骨取之則有按之則無宜甘草湯正陽散或玄武湯加人參選用陽氣復而大汗解矣陽氣乍復或生煩躁者返陰丹復陽丹金液丹不可涼藥並加生姜良姜要藥也外借火氣但不可太近叔仲詩云陰毒傷寒身體重背强眼痛不堪任小腹痛急目青黑毒氣衝心轉不禁四肢厥冷惟思吐下利咽疼脉細沉若能速灸臍輪下六日看過見喜深葱熨法見結胸以手足和為吉如手足指冷甲下肉黑者死）

陽毒無汗眼紅而遍身斑紋胸緊若石。（三陽病深必變為陽毒有初病遽然而成者有經吐下變而成者多因酒麪金石僭燥腸胃極熱所致又或症屬陽明誤服溫藥助熱為邪勾外皆熱陰氣暴絕故耳外症比常陽症潮汗閉澁滿渴狂譫甚則發斑喘急加以吐血咽腫兩眼如火六脉洪大促數宜黑奴丸白虎湯三黃湯生地芩連湯陽毒升麻湯咽痛及赤斑者青黛一物每用二錢井水調服或活龍散尤妙陰氣復而大汗解矣外用冷水蘸紙搭胸熱又易之詩云陽毒健亂四肢煩面赤生花點斑狂言妄語如神鬼下利黃赤病不安汗出遍身應大瘥魚目開張命欲翻有藥不辜但與服能過七日漸能安又陰陽二毒伏逆變為結胸有自利者有大便閉用藥而不得利者宜結胸條灸臍法以利之陽毒內服活龍散陰毒內服破結丹庶幾陰毒得泄則陽氣復陽毒得泄則陰氣復陰陽升降榮衛流行自然大汗即解矣若心下已結延至五日間斷不可活）

陽盛拒陰。大熱症也。脉數而身反盡寒。

陰盛拒陽。大虛症也。身熱而脉不鼓擊。（此言陰陽隔絕必死之症不特極與毒而已病人身寒厥冷其脉滑數按之鼓擊於指下者非真寒也此名盛陽拒陰宜三黃巨勝湯身熱脉數按之不鼓擊或身冷而欲坐井中欲漱水而不入口者非真熱也此名陰盛拒陽宜霹靂散）

取症而不取脉。可汗可下。（脉浮可下以熱入府而不大便借使大便不難其敢下之乎脉沉可汗以熱在表故也故用溫藥微汗借使身不發熱其敢汗之乎）

憑脉而不憑症。似陽似陰。（常法清高貴客脉症兩憑勞苦粗人多憑外症又有信一二分症者又有信一二分脉者須要臨時叅酌傷寒陽症似陰陰症似陽全憑脉斷）

太陽症裏虛而脉沉。補中宜發。（太陽症發熱頭疼脉宜浮而反沉者裏虛氣衰也急宜固裏使正氣內強逼邪自出四逆湯中用姜附補中兼發散也假如裏不寒則脉必浮乃麻黃常症耳）

少陰症表鬱而反熱。發中宜補。（少陰症當脉沉無頭疼無發熱今反發熱者寒邪在表鬱閉為熱耳然終無大熱或下利手足冷為異耳用麻黃以發表間之熱附以溫少陰之經加細辛為劑汗之重者去細辛加甘草為汗劑之輕者若使寒邪入裏則外必無熱是四逆症也噫太陽少陰脉沉發熱同而受病與藥別也微哉彼如少陰心煩不得眠或咽瘡聲不出或咳而嘔渴或口燥咽乾腹脹不大便數症皆熱也豈可槩以溫藥治之耶）

脉伏而必有邪汗。當攻尚非真氣之脫亡。（一手無脉謂之單伏兩手無脉謂之雙伏雜病得之則危傷寒表症脉伏因寒邪鬱閉其脉冬月麻黃湯三時羌活冲和湯以汗之不可誤為陽得陰脉如裏症脉伏因熱邪陷結而不流通宜和解俟病稍減而脉至乃敢審症輕重下之）

脉無而將欲正汗。勿攻譬如久旱之甘雨。（傷寒病六七日來別無刑尅症忽昏昧不省脉靜或無此欲作正汗如久旱將雨之吉兆喘促無脉者加味生脉散中暑脉無者白虎加參湯陰躁無脉者回陽返本湯下利脉不至者白通加猪膽汁湯或因汗下太過無脉者亦必有正汗急用四逆湯溫之脉結者炙甘草湯熱厥煩渴無脉者解毒湯合小柴胡調之寒厥鬱閉其脉兩手俱無亦是好汗相逼汗出自愈麻黃附子細辛湯或麻黃附子甘草湯加人參五味子以回陽助汗諸症服藥仍前無汗脉不至者皆死汗出脉續出則愈）

或先溫而後一汗分身輕。（厥陰下利腹滿身疼先溫裏以四逆湯後發表以桂枝湯）

或先解而後一攻分便愈。（太陽症如狂者表邪未解熱結膀胱猶采與人不相當譫語煩躁先以桂枝湯解其外後以桃仁承氣攻其裏小便不利者五苓散滲之）

有表症而反不可汗者。焉必其表之將入於裏。（表症悉具本可汗也而發渴脉浮表將入裏未可汗也誤汗者玄武湯救之）

有裏症而反不可攻者。焉必其裏之未全於府。（裏症悉具本可下也若惡寒脉不實裏猶帶表未可下也誤下者理中湯丸救之）

利半表而溫半裏。（半表裏極難治有言身前後者有言身上下者有言太陽陽明之間者小柴胡解少陽之半表裏也身後為太陽身前為陽明少陽居中或從前或從後寒熱莫定此以身之前後而言也五苓散分利膀胱之半表裏也膀胱寒水近陽明燥金水多則寒燥多則熱故亦往來寒熱也此以太陽陽明之間而言也理中湯治吐瀉不定上下之半表裏也以身之上中下而言）

汗三陰而下三陽。（此皆變法也三陰不當發汗常也然太陰脉浮桂枝湯厥陰脉浮弦為欲愈桂麻各半湯以助其勢耳少陰反發熱脉沉麻黃附子細辛湯汗之微熱無厥逆諸裏症者麻黃

（附子甘草湯微汗之是三陰未入於臟者皆可汗之太陽忌下常也有曾汗吐下而小便數大便閉者太陽陽明宜大承氣少陽陽明小承氣正陽陽明調胃承氣是三陽已入於臟者皆可下之胃與大小腸為三陽臟乃藏物之臟也）

顛倒六經非真見不敢。（脉絡貫通故也百症云均一頭痛身熱也內實不大便者宜下外實小便清者宜汗盡皆不拘常法如此非真見能如是乎）

反覆汗下有神手何妨。（以表裏邪未淨也）

右一段論傳陽變陰之極變病變法推究融會以盡其妙。

戰汗已占病可解。（戰者邪正相爭也有戰而汗解者太陽也脉必浮緊而芤浮為在表芤為正陽虛故與邪戰而後解也有不戰而汗解者陽明也脉必浮數不芤浮為表不芤為正氣不虛故不戰而汗解也有不戰不汗而解者少陽也雖有寒熱表邪寸關尺大小浮沉遲數同等而無偏勝不日陰陽和平而自解矣又柴胡症誤以藥下而柴胡症仍在不為逆更與小柴胡服之必蒸蒸汗出而解日中得病者夜半解夜半得病者日中解凡身寒鼓頷戰慄急與姜朱湯熱飲以助其陽老人虛弱發戰而汗不行隨即昏悶者不治又渴甚飲過者黑奴症也亦汗出而解）

發痒誰識疾將移。（發痒乃陽氣初回之象非風非血燥也）

瘥後昏沉非怪魅。（瘥後半月十日昏沉少神錯語妄言或無寒熱或寒熱似瘧或朝夕潮熱皆由汗出未徹毒流心胞絡間知母麻黃湯主之無表邪者陶氏導赤各半湯極妙大病後喜唾痰者理中湯胃熱虛煩而嘔者竹葉石羔湯加姜汁從腰以下有水腫者牡蠣澤瀉湯手足攣搐者牛蒡根湯遺精者桂枝龍骨牡蠣湯加鹿茸一錢或十味溫膽湯瘥後不愈參苓白朮散枳朮丸瘥後狂言益元散加辰砂瘥後失神及乾嘔柴胡百合湯瘥後血逆當歸活血湯瘥後腰痛獨活寄生湯瘥後聲沉補中益氣湯瘥後體瘦肌熱或咳嗽者用柴胡二錢甘草五分水煎服瘥後陰虛盜汗補陰丸瘥後瘧疾等症俱照常治法輕者稍穀節慾慎動自愈）

遺毒不散發瘡痍。（凡傷寒三日後脉數而熱不罷者此為熱氣有餘必發瘡癰或汗出不徹項後耳傍連頰腮有結核硬腫者謂之發頤或下之不盡熱氣流於大腸或肛門并小腹腫痛謂之臟毒或瘥後項下頸邊生風堆數枚不紅不痛如瘰癧之狀或瘥後發疹者俱宜清熱涼血消毒去風外科法治之）

勞復食復飲酒復者熱甚。（復者其病如初也傷寒新瘥津液未復血氣尚虛或梳洗太早言動思為太過則成勞復蓋勞則生熱熱氣乘虛還入經絡未免再復治宜清熱解勞小柴胡湯麥門冬湯和之熱氣浮者梔豉枳實湯鼠屎豉湯表症多者柴胡桂枝湯汗之裏症多者大柴胡湯下之○傷寒新瘥胃氣尚弱若恣飲食不能尅化濁穢臟腑依前發熱若用調和脾胃藥胃熱轉增大凡傷寒無和胃之理治須清熱消食輕者胸中微滿謂之遺熱損穀自愈重者胸高喘滿腹脹必須吐下梔豉枳黃湯主之煩熱甚者竹葉石羔湯胸痞者生薑瀉心湯○飲酒復者其熱尤甚蓋酒性至熱必煩燥乾嘔舌胎妄語不寐者解毒湯或草龍胆一味水煎服汗出自解凡復症先病七日出汗而解今復舉亦必七日而解先病十四日出汗而解今復舉亦必十四日而解雖三四次服舉亦必三四次戰汗而解但勞復症久不愈恐成癆瘵）

陰易陽易陰陽交者命危。（男子新瘥婦人與之交而反得病曰陽易婦人新瘥男子與之交而反得病曰陰易言陰陽感動其毒着人如換易也其病狀身熱衝胸頭重不能舉眼內生花乃所易之毒上衝也四肢拘急小腹腰膝皆痛陰腫手足攣蜷陰氣已極如縮人腹痛引陰中吐舌數寸而脉離經者即死縱不死百節解散經脉緩弱氣血骨髓空竭恍惚呼吸氣力轉少不能着床起居仰人牽引歲月仲景有燒裩散赤衣散猳鼠糞湯可救其失囊縮腹引陰痛欲絕者單青竹皮水煎服之陰火上衝面赤如烘熱心胸煩悶者八物湯竹皮逍遙散四肢拘急不仁者當歸白朮湯或單乾姜四兩水煎溫服汗出手足自伸挾痰惡寒嘔逆者橘皮竹茹湯○有不因易而病自復者名曰女勞復症治亦相同但多增寒發熱用猳鼠糞竹皮燒裩之類虛弱者兼用人參逍遙散小腹急痛厥冷者當歸四逆湯加吳萸附子論云餘勞尚可女勞即死○陰陽交者凡發汗後脉躁疾不為汗衰狂言不能食謂之陰陽交言交合陰陽之氣為邪所傷不可分別此死症也）

一病百合經絡將何以識。（病後未甚平復失於調理餘症在陽醫反下之以攻陰餘症在陰醫反汗之以攻陽以此百脉一宗各不得解無復經絡傳次似寒又無寒似熱又無熱欲食不能食欲臥不能臥欲行不能行有時又或強健但能睡臥不能行口作苦味藥入即吐有如邪祟治以百合為主以其能和百脉也分汗吐下後加減及陶氏柴胡百合湯渴者瓜蔞牡蠣湯又百合洗法洗後炙食將養勿用鹽豉頭痛者六十日愈不痛者四十日愈頭眩者二十日愈）

遍身不仁針火頑然無知。（不仁者頑麻不知痛痒汗下氣血俱虛不能週流一身或為寒襲經絡凝滯經曰少陰脉不至腎氣微精血少寒氣上奔血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁是為尸厥甘草乾姜湯桂枝湯加芍藥乾姜補中益氣湯驂龍升麻湯桂枝各半湯選用此不仁與前鬱冒不仁同）

四盤壞症犯何逆。（傷寒病邪未退，或重感寒，變為溫瘧；或重感風，變為風溫；或再感濕熱，變為溫毒；或重感疫氣，變為溫疫。又太陽病三日，已汗吐下及溫針不解者，此為壞病。言正氣已虛，而邪氣留滯，及過經不解，瘥後虛羸少氣，皆名壞症。疾候變易不常，必視其犯何逆以治之。表症多者，知母麻黃湯；半表者，小柴胡湯、溫膽湯；餘熱不解者，參胡芍藥湯；大渴者，黑奴丸；虛煩者，竹葉石羔湯。諸藥不效者，鱉甲散。）

五臟死候巧莫施。（水漿不入，汗如油，形體不仁，喘不休，命絕也。汗出髮潤，肺先絕也。形如烟薰，直視搖頭，心絕也。唇吻反青，肝絕也。環口黧黑，柔汗發黃，脾絕也。溲便遺失，狂言直視，腎絕也。陽氣前絕，陰氣後竭，其人死，身色必青；陰氣前絕，陽氣後竭，其人死，身色必赤。）

循衣摸牀泉清知熱在胃。（傷寒循衣摸床，兩手撮空，直視，常向壁臥，頭不安枕，脉溢。循衣縫者死，脉弦者生。諸敗症皆然。此症發熱譫語，大承氣湯下之。如發黃溺利者，津液未竭，猶可救療。若溺溢者難治。）

搖頭直視風痓非絕於心。（陽脉不和，則頭為之搖。有心絕者，搖頭直視，形如烟薰，即死。有痓病風盛則搖者，小續命湯加減。有裏痛而搖者，言者為虛，不言者為實，如聖餅子、芎朮湯、芎辛湯、二陳湯選用。臟腑精華皆注於目，直視者反目倒竄，眼睛上𦡝，死症也。惟無表裏症，目中不了了，睛不和者，乃內熱神昏，非直視也。又衂血發汗則直視，血虛發汗亦直視。脉弦者可救，若脉溢狂言譫語，喘滿直視必死。）

口張目陷不複肢冷臍硬難禁。

腎氣下脫遺尿。（小便自遺，惡症也。陽邪神昏自遺而猶知者，清熱可愈。合病遺尿，白虎湯；裏熱，承氣湯；淋血，桃仁承氣湯。陰邪氣脫自遺若不知者，溫補救其萬一。餘熱氣虛有火者，補中益氣湯加知母、黃柏、五味子、麥門冬。下虛者，四逆湯加益智仁。囊縮者，三味參萸湯加附子，大劑急救之。狂言直視冷汗遺尿者，腎絕即死。風溫直視遺尿亦死。）

心竅有毒失音。（肺主聲，被火傷而瘖瘂。有少陰病咽喉生瘡而不能言者，雞壳苦酒湯。厥陰囊縮不能言者，小承氣湯。有狐惑症聲嗄不能言者，有痓病不能言者，有風濕下利不語者，有中暑失音，有痰血迷心失音者，各宜分治。須調導二便，以通心竅為先，通用通關散吹鼻。）

智圓行方竊唐進士之正學。好生起死慕秦越人之慈心。（唐時醫道大衰，孫思邈因醫而貶為技流，朱子惜之，故小學引其言曰：智欲圓而行欲方，膽欲大而心欲小。此真醫學之秘訣也。世有善記誦古今醫籍而治人無効者，非失之心粗而膽小耳。果欲遂吾好生之心，以濟疲癃殘疾，如扁鵲有起死之功，當先理孫真人之學問云。）

婦人傷寒與男無異經來經斷名曰熱入血室。（仲景傷寒不分男女，但婦人以血為主，血室即冲脉血海也。如傷寒發熱，經水適來，晝則明了，夜則譫語，如見鬼狀。經行盡則熱隨血散，不治自愈。如經盡熱退，身凉胸滿如結胸，或譫語者，乃邪氣結於胸脇，按之痛者，亦謂之血結胸，宜海蛤散、桂枝紅花湯。○婦人傷寒，寒熱似瘧，經水適斷者，亦名熱入血室，其血必結而不行，小柴胡湯，或黃龍湯加牡丹皮、桃仁。婦人此症最多，切忌汗下。若見喜忘如狂，腹滿泉清，當以淋血法治之，又不可拘於不下也。然男女均有此血海，在男子血室得熱則必妄行，多為下血譫語，頭汗見陽明症為異耳。男子由陽明而傷，婦人隨經而入。）

產前產後謂之法無犯胃。（產前安胎，產後補血為主。古云：無犯胃氣及上中焦。犯胃氣者，謂攻下也；犯上焦者，謂發汗也；犯中焦者，謂取吐也。不可發汗吐下，但當和解。胎前丸藥必加白朮、黃芩，安胎為主。孕常外感，小柴胡去半夏加白朮，合四物湯，或合四君子湯，最能保胎除熱。如傷寒太陽症見，九味羌活湯合四物湯；陽明症見，升麻葛根湯；少陽症見，小柴胡湯；太陰症見，平胃散加白朮、枳實；熱者，大柴胡湯加厚朴、當歸；少陰症見，人參三白湯加當歸；熱者，涼膈散；厥陰症見，理中湯；熱者，六一順氣湯。已上俱宜合四物湯服之。其餘變症，照依古法。表症具者，芎蘇散、古苓朮湯、前胡七物湯、黃龍湯；傷暑者，柴胡石羔湯；嘔逆不食胎動者，麥門冬湯；嘔吐不食心煩者，蘆根湯；發熱煩悶者，生葛根一味水煎服；發後者，梔子大青湯、升麻六物湯；發狂者，秦艽散；時氣大熱恐胎墮者，用伏龍肝末水調塗臍下，乾則再塗，病瘥乃止。如胎已死者，蔥豉湯、蔥白一物湯。○產後傷寒發熱，宜四物湯倍芎歸加軟柴胡、炒乾姜入湯佐之。如惡寒未去者，柴胡破瘀湯。凡藥必加四物湯為主，乃養血之源也。六經見症同胎前用藥。外感四氣，咳嗽惡阻，旋覆花湯；面赤發喘，竹葉石羔湯。更參婦人門。）

浮沉升降順天時。（天地陰陽之氣鼓擊而生春夏秋冬。冬至一陽上升，夏至一陰下降，二至則氣同，二分則氣異。陰陽相錯，而人病由生。此事難知云：春不服白虎，為瀉金也；秋不服柴胡，為瀉木也。以此推之，春甘，夏辛，秋酸，冬苦，四季宜鹹。）

南北東西隨水土。（東南山谷地氣濕熱，病多自汗；西北高燥地氣寒涼，病多無汗；中原土欝，病多彭脹。飲食居處各各不同，故麻黃、桂枝自西北二方居人，四時服之無不應驗。自江淮間惟冬

（凡春可行之。）潛心之下。真有易道存焉。（六經名義。有八卦之理。此事難知。以六十四卦配合日用。至於朝大黃暮附子。朝附子暮大黃。變易之義也。麻黃桂枝瓜蒂等方。卦象辭例也。泥象執方。不知易也。）反掌之間。似乎兵法寓矣。（東垣曰。用藥如用兵。機無輕發。此事難知云。治法如孫子用兵。若在山谷則塞淵泉。在水陸則把渡口。在平田廣野。當青野千里。塞淵泉者。刺俞穴。把渡口者。奪病發時前。青野千里者。如肌瘦羸。宜廣服大藥以養正。又曰。補益者守也。汗吐下者攻也。調利者廣畧而決勝也。）

由丹溪而入長沙。秋江澄澈。涉河間而步東垣。春山紅紫。（仲景傷寒。專為霜降至春分即病者設。河間補溫暑一法。丹溪分別時令直中。東垣力辨內傷外感。四公前後發明。經旨透徹。真如春山千紅萬紫。無所不備。惟識之則存乎人耳。議者謂陰症雜病。乃後人增入論中。又謂溫暑亦無陰症。皆道其常而不知其變耳。）噫。學未究乎張劉朱李。且勿議乎叔和。無已。勉之勉之。醫囊無底。

右一段論瘧症危症死症及婦人傷寒。

傷寒用藥賦

太陽無汗寒傷榮。臘月麻黃（湯）為最。太陽有汗風傷衛。臘月桂枝（湯）可先。易老沖和（湯即九味羌活湯。）治風寒而發於三季。陶氏沖和（湯）分陰陽以救乎雙傳。（此方以兩感必死。但陽先受病多者。以此湯探之。中病即愈。如不愈者。看表裏陰陽多少用藥。是以用九味羌活湯去蒼朮。加柴胡乾葛石羔黑豆。皆三陽經藥也。）陽明之本宜解肌。審葛根白虎於寒熱。（傷風有汗。表虛者桂枝湯。傷寒無汗。表實者葛根湯。不惡寒反惡熱。二便不閉者白虎湯。）陽明之標須承氣。評痞滿燥實於便堅。（痞滿燥實俱全者大承氣湯。有痞滿而無燥實者小承氣湯。有燥實而無痞滿者調胃承氣湯。）大柴胡（湯）行陽明帶表之秘。小柴胡（湯）擅少陽和解之權。有痰妨胸滿。瓜蒂（散）梔豉（湯）緩緩飲。無頭痛身熱。附子乾姜熟熟煎。（姜附湯。乾姜一兩。生附一枚。水三盞。煎至一盞去查。頓服。治直中陰經真寒症。如厥逆脈不至。加甘草一錢。）理中（湯下）建中（湯）。治太陰（直中）臟寒之不足。桂黃桂苓。祛太陰（傳經）腑熱之不平。（桂枝加大黃湯。桂枝三錢。芍藥四錢。甘草二錢半。大黃二錢。姜五片。棗二枚。水煎溫服。治太陰傳經熱症。腹滿而痛。咽乾而渴。手足溫。脈沉有力。本方陶氏加枳殼柴胡。臨服入檳榔水三匙。如腹滿不惡寒而喘。去甘草。加大腹皮。◎桂枝加芍藥湯。桂枝三錢。芍藥四錢。甘草一錢。姜四片。棗一枚。水煎溫服。治太陰腹滿痛甚。或太陽病下之。轉屬太陰。自利者亦宜。◎陶氏桂苓飲。五苓散。）少陰熱症。小承氣（湯）反之。四逆倍甘草。拒陽可愈。（四逆湯）厥陰熱症。大承氣（湯）反之。四逆用當歸。似瘧自痊。（當歸四逆湯。）此雖六經之正治。實具百病之真詮。表裏陰陽通治。（凡言表症。分有汗無汗。俱於前正方內隨經選用。凡言裏症。分傳經直中。俱於前正方內選用。凡言陰症。俱於前溫中熱藥內選用。凡言陽症。俱於前通裏寒藥內選用。是數方可以代百方。雖曰仲景方法猶有遺失之恨。據愚見於此推類而通於雜病。則方法亦無以加矣。）汗吐下溫兼全。（凡言宜汗。即前正方中或發表或解肌之劑選用。凡言宜吐。即前正方中或探吐或湧宣之劑選用。凡言宜下。即前正方中潤下湧泄之劑選用。凡言宜溫。即前正方中臟寒亡陽之劑選用。是數法者。可以兼百法。貴乎用之當耳。誤用麻黃。令人亡陽。汗出不止。將病人頭髮水浸。外用糯米粉并龍骨牡蠣末撲之。誤用硝黃。令人不禁。用理中湯加炒糯米烏梅壁土止之。誤用姜附。令人失血發斑。用雜蔔汁或子搗汁。或泥漿汁再入黃連甘草犀角。可解其毒。不然身有紅處。乃血欲從各竅出也。）抑又聞風寒總曰汗病。麻桂不可亂嘗。（不論傷風傷寒。皆以得汗則散。但有大汗解肌之不可亂耳。）無汗服桂枝。而嘔吐失血下利者變用。（傷寒無汗。或酒客誤服桂枝湯而嘔吐者。必吐膿血為肺痿症。又有其病當汗而適值失血及下利者。不可與麻黃湯。宜小劑桂枝湯。頻頻啜之。體潤自然和解。）有汗服麻黃。而煩躁寒熱似瘧者相當。（傷風服桂枝湯不解。寒熱似瘧。日再發者。乃邪客榮衛。宜桂枝二麻黃一湯。若非此症。誤服麻黃者。必煩躁衄血。衄血與上肺痿二症。照依雜症。以清血涼血之劑。畧加和表之藥。如犀角地黃湯。黃芩湯加柴胡是也。）傷寒輕者麻黃杏仁飲。（麻黃桔梗前胡黃芩陳皮半夏各一錢。杏仁細辛各八分。防風七分。甘草四分。姜三片。水煎溫服。治太陽發熱惡寒。頭痛無汗。脈浮緊而咳嗽。如夏月去麻黃加蘇葉。自汗去麻黃加桂枝芍藥。表熱換柴胡。口渴加天花粉。胸滿加枳殼。喘嗽加瓜蔞仁。）傷風輕者柴胡半夏湯。（柴胡半夏各一錢半。黃芩白朮陳皮麥門冬各一錢。甘草五分。姜三片。棗二枚。水煎溫服。治傷風發熱惡寒頭痛無

上海埽葉山房校印

汗而咳嗽或協熱自利兼治一切疫症狀似傷寒如小便不利加茯苓冬月無汗加麻黃三時無汗加蘇葉冬月有汗加桂枝三時有汗加防風咽痛加桔梗喘嗽去白朮加杏仁桑白皮酒熱加黃連食積加山查神麴痰伏脇下作痛加白芥子痰盛喉中如牽鋸加竹瀝姜汁痰稠如膠加金沸草前胡胸膈痞悶加枳殼**大羗活**湯**主治陰陽兩感**防風羗活獨活防己黃芩黃連蒼朮白朮甘草細辛各三分知母川芎地黃各一錢水煎熱服未解再服三四劑病愈則止治發熱惡寒無汗或止汗頭痛項强或傷寒見風脈傷風見寒脈兼解利兩感傷寒此方治陰陽已分陽症多者宜服陶氏冲和湯為陰陽未分者設**大青龍**湯**善解風寒兩傷**麻黃三錢桂枝二錢杏仁一錢半石羔四錢甘草一錢姜三片棗二枚水煎温服方意以寒宜甘發麻杏石甘棗之甘以散榮中之寒風宜辛散桂枝生姜之辛以散衛中之風辛甘相合乃能發散榮衛風寒風傷則衛實寒傷則榮實榮衛俱實太陽症具無汗而煩躁者宜服若脉微有汗榮衛俱虛者誤服則厥逆筋惕肉瞤而亡**合病嘔而不利葛根加以半夏**葛根加半夏湯葛根三錢麻黃二錢桂枝一錢半夏芍藥各一錢甘草八分姜三片棗二枚水煎服治太陽陽明合病裏氣逆上但嘔而不下利者與葛根湯以散其邪加半夏以下逆氣**合病利而不嘔黃芩加以半姜**黃芩半夏生姜湯黃芩三錢芍藥生姜各二錢半夏一錢甘草五分姜五片棗二枚水煎温服治太陽少陽合病自利而嘔或腸垢協熱自利非汗下所宜故用此和解以下胃之逆氣**太陽併病陽明兮麻葛硝黃看罷未**太陽症未罷無汗者葛根湯有汗者去麻黃太陽症已罷陽明症見者調胃承氣湯**太陽併病少陽者麻桂柴胡要酌量**無汗者小柴胡合麻黃湯有汗者柴胡桂枝湯三時與輕者小柴胡湯為主仍以羗活防風代麻桂可也**春夏秋冬疫癘升麻人黃如意**升麻葛根湯方意以四氣不和鬱毒為疫故用升麻葛根甘草以解百毒芍藥以和中用消疫毒更妙於敗毒散人中黃丸大黃黃連黃芩人參桔梗蒼朮防風滑石香附人中黃各等分為末神麴糊丸梧桐子大每七十丸氣虛四君子湯下血虛四物湯下痰多二陳湯下熱者加童便如無人中黃用糞缸岸代之或硃砂雄黃為衣亦好如意丹川烏八錢檳榔人參柴胡吴茰川椒白姜白茯苓黃連紫菀厚朴肉桂當歸桔梗皂角石菖蒲各五錢巴豆二錢半擇吉日於不聞雞犬處靜室誠心修合各取淨末煉蜜為丸梧子大硃砂為衣每三丸或五丸七丸專治瘟疫及一切鬼祟伏尸傳瘵顛狂失心山嵐瘴氣棗湯或白湯下風疫及宿患大風身體頑麻不知痛痒眼淚不下睡臥不安而如虫行日久鬚眉痒脫唇爛齒焦偏頭痛紫癜瘡癬左癱右瘓鶴膝風痰一切風疾荊芥煎湯下寒疫及小腸氣痛小茴煎湯或吴茰煎湯下暑疫及五淋燈芯煎湯下熱甚大黃煎湯下燥疫生地或麻子仁煎湯下或冷水下溫疫及水腫車前子或木通煎湯下十種水氣甘遂大戟煎湯下瘦蠱甘遂煎湯下膀胱疝氣腫痛蘿蔔煎湯下五般痔白礬湯下五癇乳香湯下腎臟積咬齒唾涎腰疼鹽湯下五瘧桃枝煎湯下失心中邪柳枝桃枝湯下陰陽二毒傷風咳嗽薄荷煎湯下五疳八痢腸風臟毒陳米煎湯下諸般

咳嗽姜湯下小兒十二驚風薄荷煎湯下丹瘤癰疽瘰癧瘡痍涎喘消渴大小腸閉或泄或利酒毒便紅喉痺重腮誤吞銅鐵金石藥毒不服水土温湯下痢疾紅甚黃連煎湯下婦人血海久冷帶下赤白難為生育及諸般血氣艾湯下此方通治山鄉素不服藥之人存乎善用耳**風寒暑濕邪從藿香正氣預防**不換金正氣散厚朴陳皮藿香半夏蒼朮各一錢甘草五分姜三片棗二枚水煎温服治四時感冒傷寒時氣瘟疫山嵐瘴氣但覺四肢拘急心腹滿悶飲食不化或有吐利惡寒等症却未發熱者宜此先正胃氣以預防之兼治霍亂吐瀉下痢赤白不服水土等症如感冒更加頭痛發熱胸滿者藿香正氣散如前症更加身痛者人參敗毒散九味羗活湯藿香正氣散藿香紫蘇白芷大腹皮茯苓各六分厚朴白朮陳皮桔梗半夏麯各四分甘草二分姜棗煎服治內傷脾胃外感寒邪寒熱拘急頭痛嘔逆胸中滿悶與夫傷冷傷食傷濕中暑霍亂山嵐瘴氣不服水土寒熱如瘧并宜增損用之非正傷寒之藥若病在太陽頭痛發熱骨節痛者此方絕無相干誤服反虛正氣逆其經絡凡氣虛及夾陰傷寒俱不可用**春溫通聖雙解**防風通聖散防風川芎當歸赤芍大黃麻黃薄荷連翹芒硝各二分半石羔黃芩桔梗各五分滑石一錢半甘草一錢荊芥白朮山梔各一分半姜三片水煎温服治春夏温熱狀如傷寒表裏俱見者兼治內科一切風寒燥熱及飲酒中風或便閉或飧泄或風熱上壅不言等症雜科耳目口鼻唇舌咽喉風熱風痰等症外科癰疽瘡癩發斑打撲跌傷等症小兒驚癇積熱諸風潮搐痘出不快等症婦人諸疾合四物湯一料凡屬風熱之疾無所不治如自利去硝黃自汗去麻黃名通聖散雙解散即防風通聖散合益元散等分姜葱豆豉煎服欲吐則探吐欲下則下欲汗則汗故名雙解散治風寒暑濕饑飽勞役內外諸邪所傷以致氣血怫鬱變成積熱發為汗病往來寒熱癇痓驚悸等症小兒瘡疹尤妙如自利去硝黃自汗去麻黃**夏益元單方**益元散又名六一散取天一生水地六成之義也滑石六兩甘草一兩為末每三錢入蜜少許沸湯調服孕婦慣半產者忌服如傷寒身熱不解加蒼朮末三錢葱豉湯調連進數服汗出為度又汗吐下後餘熱以此解之甚妙虛煩不臥加辰砂少許身熱霍亂嘔吐轉筋者先於地坑傾新水一桶在內攪勻澄清謂之地漿水另取井水一碗入油一匙浮於水面將此藥撒上油花上其藥自沉碗底去清水用前地漿水調服名油墜散一切風熱上壅咽喉不利加青黛薄荷少許蜜丸噙化一切寒症瀉利嘔吐反胃加乾姜五錢名温六丸中寒甚者再加硫黃少許用生姜汁浸炊餅丸又能伐肝邪一切暑症作温新汲水下感田禾燒氣作渴用帶泥稻稈煎湯下一切濕熱腸癖泄瀉其滑石用牡丹皮煮過加紅麯五錢名清六丸用陳米飯丸每五七十丸白湯下如產後腹痛自利用補脾補血藥下或加五靈脂一兩能行血止痢瀉甚加肉豆蔻少許一切痰熱吐逆反胃驚癇顛狂熱毒瘧痢腹痛加黃丹少許姜汁蒸餅為丸服如温暑輕者通用九味羗活湯加減入裏加大黃**梔子升麻**湯**合秋令之晚發**生地甘寒三錢山梔苦寒升麻甘苦寒柴胡苦寒各一錢石羔甘寒二錢姜三片水煎温服治晚發傷寒太陽症具不可大汗宜此清肌解熱兼治温熱及虛煩不止自汗加桂枝無汗加蘇葉乾葛虛煩加知母

上海埽葉山房校印

（麥門冬湯加天花粉咳嗽加杏仁此方潤燥深合愚意以秋為晚者經曰燥淫於內治以苦温佐以甘辛正此方之謂也他如張子和六神通解散用蒼朮石羔滑石黃芩麻黃甘草姜葱煎服雖以三月為晚發亦不甚宜或疑冬傷於寒春必病温晚發乃温病之遲者夏傷於暑秋必痎瘧豈可以秋病為晚發耶殊不知瘧有一日一發或熱多寒少者其邪淺夏傷於暑而然也有三日一發或寒多熱少者其邪深結成瘧母非偏冬寒邪鬱伏後再感暑而後發動若本夏所感之邪安能遂成痞塊耶所以秋病多於四時者此也推之痢疸亦然）白芍生地○斂冬月之經陽○（加減調中湯白芍一錢半茯苓白朮各八分麥門冬四分生地五分陳皮三分桔梗烏梅甘草各二分水煎温服治冬温及春月暴煖煩燥眠食不安或瘀脫欬作傷風狀者如體盛加黃芩有痰加貝母）中暑中暍○白虎或加參朮○（白虎加參湯石膏五錢知母人參各二錢甘草五分粳米一大撮水煎温服虛煩不止加麥門冬尤妙治動中暍傷氣身熱脈洪或遲煩渴口燥小便已洒然毛聳口開前版齒燥黑兼治發斑欬又名化斑湯○白虎加蒼湯石羔四錢知母三錢蒼朮二錢甘草五分粳米一大撮水煎温服自汗不止加桂枝尤妙治靜中暑傷濕惡寒脈沉汗出身熱妄言名濕温兼治疫癘及秋感熱）暴寒暴温○調中（湯）或去大黃○（葛根黃芩芍藥藁本白朮桔梗茯苓甘草各五分水煎温服治夏秋暴寒疫癘折於盛熱熱結於四肢則壯熱頭疼及肚腹不和等症如暴温肌熱煩渴加麥門冬如暴寒傷胃表裏邪盛或便閉或協熱下利血水脈數及年久臟毒下血不止者俱加大黃七錢下之移時再服得利壯熱自止）風温汗渴○萎蕤兼以瓜蔞○（萎蕤湯萎蕤二錢半石羔三錢葛根二錢羌活白微杏仁青木香川芎甘草各一錢麻黃一錢二分水煎温服治風温喘急頭痛身熱多睡語言蹇溢自汗四肢不收甚者如癇內煩燥擾冬温春温亦宜如汗後身猶熱加黃芩知母赤芍汗多去麻黃加桂枝防風氣弱加人參有痰目睛不了者加南星渴甚加天花粉肝火熱加龍胆草○瓜蔞根湯石羔三錢瓜蔞根葛根各二錢人參防風各一錢甘草五分水煎温服治風温渴甚身熱汗出）濕温汗多○茯苓和以桂朮○（茯苓白朮湯茯苓乾姜各一錢白朮一錢半桂枝七分甘草五分水煎温服方意以濕温寒熱頭目疼痛胸滿妄言多汗兩脛逆冷者皆因暑浴及坐石眠地為濕氣所傷復感暑搏而為病是以藥品盡皆治濕而非治暑也所以名家亦有未詳此意而不敢用故以白虎湯加蒼朮官桂其意更明然二方亦皆難用輕者但以二香等湯去暑除温等物去濕）風濕腫痛○勝濕表以麻杏四般○（羌活勝濕湯羌活獨活各一錢藁本防風甘草各五分蔓荊子川芎各二分水煎温服治脊痛項強腰似折項似拔此足太陽經氣不通行肩背痛不可回顧此手太陽經氣鬱不行如身重腰沉沉然者乃經中有濕熱也加附子黃柏蒼朮○麻杏薏甘湯麻黃薏苡仁各二錢杏仁甘草各一錢水煎服取微汗治肢體酸疼不能轉側額上微汗不欲去衣或身微腫大便難小便利熱至日晡加劇脈浮虛而濇甚者加川烏為引有汗加白朮輕者只以九味羌活湯諸濕有表者俱宜○杏仁湯桂枝二錢天門冬麻黃芍藥杏仁各一錢姜五片水煎温服治風温身痛惡風微腫）寒濕

腫痛滲濕○（湯）表以加交五積○（五積交加散即五積散合人參敗毒散治寒濕身體重痛腰脚痠疼如寒勝者只用生料五積散甚者加附子夏月去乾姜肉桂加黃連如天時暄熱或春分後雖無汗亦去麻黃換紫蘇葉如肚腹脹滿不快或便閉去參加山查神麯枳實如潮熱或肌熱加柴胡乾葛）中濕朮附甘附○諸濕便溺皆調○（小便自利輕者除濕湯重者朮附湯白朮三錢附子二錢甘草一錢姜三片棗二枚水煎温服治中濕一身盡痛發熱身黃多煩脈浮而緩○小便不利大便反快輕者五苓散重者甘草附子湯甘草附子白朮各二錢桂枝四錢水煎温服得微汗即解方意以風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇或風勝則衛虛汗出短氣惡風不欲去衣濕勝則小便不利或身微腫是以用桂枝甘草之辛甘而散風邪以固衛附子白朮之辛甘而解濕氣以利經如汗出身腫加防風動氣溺不利加茯苓）濕痺防己漢己○諸濕汗乳皆塞○（防己黃芪湯防己黃芪各二錢白朮一錢半甘草七分姜棗煎服治諸風諸濕脈浮身重自汗及誤汗汗出不止如胸膈不和加芍藥氣上衝加桂枝有寒加細辛風多走注加麻黃薏苡烏頭熱多赤腫加黃芩寒多掣痛加官桂羌附濕多重着加茯苓蒼朮乾姜中氣堅滿痞閉加陳皮紫蘇枳殼甚者加葶藶○漢防己湯防己二錢半黃芪一錢半白朮二錢甘草一錢姜煎服即防己黃芪湯但汗多者用此等分）附防附朮痓柔而厥者宜○（附子防風湯白朮茯苓乾姜附子防風川芎桂心柴胡甘草各七分五味子九粒姜三片煎服治傷寒柔痓閉目合面手足厥逆筋脈拘急汗出不止如汗不出者去防風姜桂止用三分加麻黃五分○附朮散附子白朮各一錢獨活五分川芎三分桂心二分棗二枚水煎温服治傷寒柔痓手足逆冷筋脈拘急汗出不止時發時止不食下利者難治如輕者剛柔通用九味羌活湯加減）桂石桂苓瘧熱而重者速○（桂枝石羔湯桂枝一錢石羔知母各三錢黃芩二錢水煎温服治太陽陽明合病間日作瘧熱多寒少○桂枝黃芩湯知母人參黃芩半夏各八分柴胡一錢石羔二錢桂枝五分甘草四分姜煎温服治太陽陽明少陽合病瘧疾寒熱極甚二方以桂枝湯料治太陽白虎治陽明柴胡治少陽意甚明顯挾痰合二陳湯食積合平胃散溺澁合五苓散便閉合大柴胡無汗加乾葛蒼朮有汗加黃芪白朮夜發加桃仁白芍日久加常山檳榔吐之治瘧之法盡矣）水乘表而發咳青龍小劑○（小青龍湯桂枝麻黃芍藥乾姜各二錢細辛一錢半夏一錢半五味子甘草各五分水煎温服治傷寒表不解因心下有水飲與寒相搏氣逆乾嘔發熱而咳或喘或噎或渴或大便利或小便不利腸痛腹滿等症蓋寒邪在表宜桂麻甘草辛甘以散之水停心下而不行則腎燥宜姜半細辛之辛行水氣而潤腎咳逆而喘肺氣逆也宜芍藥五味之酸以收肺氣經曰腎苦燥急食辛以潤之肺欲收急食酸以收之此方發汗所以散邪水收斂所以固真水水氣內漬傳變不一故有或為之症宜隨症加減以解化之如微利去麻黃加芫花以下利渴者去半夏加瓜蔞仁以生津噎者去麻黃加附子以温散水寒小便不利小腹滿去麻黃加茯苓所以行下焦蓄水喘者去麻黃加杏仁以下氣凡服此湯者裏氣温水欲散也宜再服之或疑小青龍與小柴胡症皆嘔而

（發熱表裏之病大槩彷彿何二方寒熱不同蓋傷寒熱未盛而飲水停蓄非青龍姜桂不能解散傷寒邪熱傳半表裏非小柴柴苓無以清解此二方症治同而用藥殊也）水入陰而下利玄武神方〇（玄武湯白朮一錢白茯白芍附子各三錢姜五片水煎温服治傷寒四五日腹痛小便不利大便自利四肢重痛或發熱或溺利或嘔或咳兼治汗後仍熱心悸頭眩及陰症身痛脉沉汗過筋惕肉瞤此由渴後飲水停留中脘所致方意以腎主水腎病則不能制水是以用姜附芍藥之辛酸以温腎散濕茯苓白朮之甘平以益脾逐水經曰寒淫所勝治以辛熱濕淫所勝左以酸平是也如小便利則無伏水去茯苓大便利去芍藥加乾姜以散寒咳加五味子以散逆氣水寒相搏而咳加細辛乾姜以散之嘔者去附子恐補氣也倍生姜以散逆氣）茵陳大黃調五苓〇頭汗出而欲疸〇（茵陳湯茵陳蒿一兩大黃六錢山梔十枚水二盞慢火熬至一盞温服以利為度甚者再服當下如爛魚膿血惡物小便下如金色皂角等汁或見熱症但頭汗出將欲發黃者用此一劑分作四服入五苓散三錢調下治黃之法無踰於此方意以陽明裏熱已極煩渴引飲以致濕與熱搏如得遍身汗出則濕熱發越於外而不能發黃也今但頭汗出劑頸而還二便不利渴且不止則瘀熱鬱內腹作脹滿而黃疸必矣是以用茵陳山梔之苦寒以除胃燥大黃之苦寒以下胃熱一切疫癘疸瘧雜病發黃等症及傷寒因火逼取汗不出反致邪熱怫鬱於內上攻頭面紅赤蒸於肌膚發黃並宜〇茵陳五苓散茵陳一兩五苓散五錢為末每二錢米飲下或煎亦可治同上〇陶氏茵陳湯大黃茵陳山梔厚朴枳實黃芩甘草姜一片燈心一握水煎熱服治同上如大便利去大黃厚朴加大腹皮以小便清利為度）茵陳梔子皆三物〇大便利而發黃〇（茵陳三物湯茵陳三錢山梔黃連各二錢水煎温服治同上〇梔子柏皮湯山梔四枚黃柏四錢甘草二錢半水煎服治濕家發黃及傷寒發黃但大便不利者茵陳湯二便不利者茵陳湯調五苓散大便利小便不利者茵陳五苓散茵陳三物湯梔子柏皮湯正所謂小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以收之）虛煩竹葉石羔〇既濟三白稱奇〇（竹葉石羔湯石羔五錢人參二錢麥門冬一錢半半夏一錢甘草七分淡竹葉十四片粳米一大撮水煎入姜汁二匙調服治傷寒解後餘熱未淨津液不足虛羸少氣氣逆欲吐及陽明汗多而渴衄血渴欲飲水水入即吐并產後下後虛煩汗多等症經曰辛甘發散而除熱竹葉石羔甘草之甘辛以發散除熱甘緩脾而益氣門冬參朮之甘以補不足辛者散也半夏之辛以散逆氣如氣弱大渴倍人參汗多加黃芪陰虛夜煩加知柏生地芍藥嘔吐去石羔加陳皮茯苓痰加貝母泄加白朮澤瀉又本方去參石半夏名麥門冬湯治勞復發熱〇既濟湯即竹葉石羔湯去石羔加附子二錢治虛煩上盛下虛煩燥自利手足冷〇三白湯白芍白朮白茯苓各一錢甘草五分水煎温服治虛煩或泄或渴實調理內傷外感之奇方也）脚氣檳榔越婢續命千金難贖（檳榔散橘葉杉木各一握童便酒各半盞煎數沸去查入檳榔末二錢調服治脚氣風腫痛〇越婢湯石羔三錢白朮三兩附子一錢半麻黃二錢甘草一錢二分姜棗煎服治風痺脚弱方意以脾為女卑臟主行津液是湯所以名越婢者以能發越脾氣通行津液也〇千金續命湯防風芍藥白朮各一錢川芎防己桂枝麻黃羌活各八分蒼朮一錢半甘草五分姜二片棗二枚燈心甘草水煎入姜汁二匙調服治脚氣外症全類傷寒但初起脚膝屈弱軟痛加之嘔吐喘急宜此救之如暑中三陽所患必熱脉洪數者去桂麻加芩連柴胡黃柏寒中三陰所患必冷脉遲澁者加附子起於濕者則行起忽倒足脛或腫膝或枯細加木瓜檳榔牛膝起於風者則脉浮弦無汗加獨活氣虛加人參便閉去麻黃白朮加大黃）導痰醫痰〇陶氏加以芩連參朮梗瓜蔞〇（陶氏導痰湯茯苓南星枳實各八分半夏一錢陳皮黃芩白朮黃連瓜蔞仁各五分桔梗四分人參三分甘草二分姜三片棗二枚水煎臨服入竹瀝姜汁調下年力壯盛者先吐去痰次服此藥治內傷七情痰迷心竅神不守舍神出舍空則痰生以致增寒壯熱頭痛昏迷上氣喘急口出涎沫等症如鬼祟痰症類傷寒者亦宜〇鶴頂丹白礬一兩心紅五錢或黃丹亦好為末每以一匕入磁器內溶化乘熱撚丸龍眼核大薄荷煎湯化下治結胸胸膈滿痛及痰症發熱或咽喉如拽鋸者）平胃消食〇陶氏加以菓連枳朮姜查麥麯〇（陶氏平胃散蒼朮一錢厚朴陳皮白朮各七分甘草乾姜山查神麯各二分草菓三分黃連枳實各四分姜三片水煎臨服入木香磨汁調下治食積類傷寒如腹痛加桃仁痛甚大便實熱去查麯菓姜加大黃下之如心中兀兀欲吐不吐無奈者用滚鹽湯調皂莢末五分探吐）瘀血在上〇犀角地黃（湯）加減〇（犀角牡丹皮各一錢白芍二錢半生地三錢一方有當歸一錢半水煎温服治傷寒汗下不解鬱於經絡或為吐衄不盡餘血停瘀以致脉微發黃便黑煩躁發狂漱水不嚥等症如表熱加柴胡黃芩鼻衄加山梔內熱甚加黃連腹脹或痛瘀血未下加桃仁紅花大黃小腹急痛加青皮本方陶氏加甘草桔梗陳皮紅花當歸姜三片煎臨服入藕節搗汁三匙調下治同上）瘀血在裏〇桃仁承氣抵當〇（桃仁承氣湯大黃四錢桃仁三錢桂枝芒硝各二錢甘草一錢水煎温服血盡為度未盡再服方意以太陽經也膀胱府也太陽經熱不解則入府而結於膀胱令人如狂熱逼血自下者愈若熱搏血蓄下焦令人小腹急結便黑溺澁脉沉有力為一切瘀血結胸譫語漱水等症宜此湯攻盡黑物則愈若外症未解當先解其外而後攻其裏經曰從外之內而盛於內者先調其外而後調其內此之謂也故用桃仁之甘緩小腹急結桂枝之辛散下焦蓄血硝黃之寒折膀胱之熱本方陶氏加芍藥柴胡青皮當歸枳實姜三片煎臨熟入蘇木汁三匙調服治同上〇抵當湯蝱虫水蛭桃仁各十枚大黃三錢病甚人壯者五錢水煎温服未下再服方意以太陽經病六七日邪當傳裏為熱結胸症今表症仍在脈沉而熱不結胸反結於下焦令人如狂小腹硬滿小便不利者乃熱蓄津液不通也小便利者乃熱不蓄津液而蓄血也蓋鹹走血苦勝血故用蝱蛭之鹹苦以除蓄血甘緩結苦泄熱故用桃黃之甘苦以下結熱亦治一切瘀血結胸譫語漱水等症〇抵當丸水蛭桃仁各七箇蝱虫八個大黃一兩為末蜜調分作四丸每一丸用水煎化温服未下再服治蓄血在下無身熱便黑喜忘如狂等症但小腹滿而溺利者宜此丸緩以下之）感寒香蘇五積（散）養胃大温（香蘇散香附紫蘇各二錢陳皮一錢甘草五分姜葱

煎服取汗治四時感寒頭疼發熱惡寒如頭痛甚加川芎白芷無汗加麻黃○人參養胃湯蒼朮一錢陳皮厚朴半夏各七分半茯苓藿香各五分甘草一分烏梅一箇人參草果各四分姜三片棗二枚煎熱服取汗有汗溫服治外感風寒內傷生冷憎寒壯熱頭目昏疼肢體拘急不問風寒二症及夾食停痰皆効兼治飲食傷脾或外感傷寒溼氣發為痰瘧及山嵐瘴疫尤妙如虛寒加附子肉桂

冒風參蘇十神敗毒更速○參蘇飲人參紫蘇前胡半夏乾葛茯苓木香各七分半陳皮桔梗枳殼各五分姜三片棗二枚水煎服治外感風邪頭疼發熱咳嗽聲重涕唾稠粘內因七情痰塞壅胸潮熱等症如肺熱去參加白朮黃芩肺燥去橘半加瓜蔞杏仁本方去木香加川芎紫蘇名十味芎蘇散治四時感冒頭疼寒熱○十神湯紫蘇香附陳皮甘草乾葛赤芍升麻白芷川芎麻黃各五分姜蔥煎熱服治風寒兩感及時行溫疫頭疼寒熱無汗等症此方去芎芷麻黃名蘇葛湯內乾葛專解陽明瘟疫風邪若太陽傷寒發熱用之是引賊入陽明多發斑疹今世槩用誤哉○人參敗毒散羌活獨活柴胡前胡枳殼桔梗川芎赤茯人參各三分甘草一分半姜三片煎溫服或加薄荷少許治傷寒發熱頭疼睛痛項強肢體煩疼傷風咳嗽鼻塞聲重及時行瘟疫瘴氣風濕風痰肢昏嘔噦等症如三陽經腳氣赤腫加大黃蒼朮皮膚疹痒加蟬退如心經蘊熱口乾舌燥加黃芩

二陳四物痰火消○二陳湯合四物湯氣虛加參朮火盛加芩連麥門冬

補中益氣勞傷服○加味補中益氣湯外感見太陽症加羌活藁本桂枝陽明症加葛根升麻少陽症加黃芩半夏倍柴胡太陰症加枳實厚朴少陰症加生甘草桔梗厥陰症加川芎變症發斑加葛根玄參倍升麻○陶氏補中益氣湯人參黃芪當歸生地川芎柴胡陳皮甘草細辛羌活防風白朮各五分姜三片棗二枚蔥二莖水煎溫服治勞力內傷氣血外感風寒頭疼身熱惡寒微渴自汗身腿酸軟無力如元氣不足者加升麻少許以升之喘嗽加杏仁汗不止去細辛加芍藥胸中煩熱加山梔竹茹乾嘔加姜汁炒半夏胸中飽悶去生地甘草芪朮加枳殼桔梗痰盛去防風細辛加瓜蔞貝母腹痛去芪朮加芍藥乾姜因血鬱內傷有痛處或大便黑去姜防芪朮細辛加桃仁紅花甚者加大黃下盡瘀血自愈愈後去大黃調理日久下症具者亦量加酒製大黃體厚者大柴胡下之丹溪治一人舊有下痳瘡忽頭疼發熱惡寒以小柴胡湯加龍膽草胡黃連熱服而安又一人因忍饑霜中涉水患惡寒吐血以小建中湯去芍藥加陳皮半夏煎服而安二方可為內傷挾外感者式

蔥頭麻葛頭痛甚於搥鑽○連鬚蔥白湯生姜一兩蔥十四莖共搗破水煎服治太陽已汗未汗頭痛如鑽破或合麻黃湯尤妙○蔥豉湯蔥白七莖豆豉一合麻黃三錢葛根一錢半姜五片煎服如行五里許再進一服良久吃蔥豉粥取汗治太陽陽明頭疼無汗如太陽發熱惡寒無汗剛痙加芍藥三錢名麻黃葛根湯○葛根蔥白湯葛根芍藥知母各一錢半川芎生姜各三錢蔥三莖煎服治陽明頭目痛鼻乾無汗

桂枝柴葛項強難於回顧○太陽無汗項強葛根湯有汗桂枝湯加葛根少陽小柴胡湯

頭眩身振茯苓桂甘桂朮和陽茯苓桂甘湯茯苓二錢桂枝二錢甘草一錢姜三片水煎溫服治陽明症但頭眩不惡寒能食而咳兼治水氣在半表乘於心胸怔忡悸惕乾嘔自汗不渴方意以茯苓甘草之甘益津而和衛桂枝生姜之辛助陽而解表○茯苓桂甘大棗湯茯苓六錢半甘草二錢二分桂枝四分大棗五枚先取水六七碗置大盆內以杓揚之上有水珠數千顆相逐取用之名甘爛水用二盞先煎茯苓減半入諸藥煎至八分溫服治汗後臍下悸動欲作奔豚者○茯苓桂朮甘草湯茯苓四錢桂枝三錢白朮二錢甘草一錢水煎溫服治汗吐下後裏虛氣逆上衝心腹痞滿或痛起則頭眩脈沉緊為在裏則不宜汗汗則外動經絡損傷陽氣陽虛則不能主持諸脈身體振搖筋脈惕瞤久則成痿宜此湯以和經益陽故陽氣不足者補之以甘茯朮甘草之甘以生津液而益陽也裏氣逆者散之以辛桂枝之辛以行陽而散逆氣也

鬱冒神昏人參三白三生醒冒○人參三白湯人參白朮白芍白茯各一錢半柴胡三錢川芎一錢天麻五分水煎溫服治太陽病誤下誤汗表裏俱虛以致鬱冒胃家得汗自愈若不得汗而不解者宜此主之如下虛脈微弱者合三生飲以溫腎固其本也經曰滋苗者必固其根伐下也必枯其土是也

背惡寒而三陽虎湯少陰附湯○傷寒六七日身無大熱口燥煩心煩背惡寒者此屬陽明宜白虎加參湯○傷寒二三日口中和背惡寒者此屬少陰宜附子湯附子人參各二錢茯苓芍藥各三錢白朮四錢水煎溫服兼治少陰心痛肢冷骨節煩疼方意以附子之辛以散寒參朮茯苓之甘以補陽芍藥之酸以補陰所以然者偏陰偏陽則為病火欲實水當平之不欲偏勝也

身惡寒而陽經柴桂陰經芪桂○陽經柴胡桂枝湯柴胡一錢桂枝黃芩人參芍藥半夏各一錢甘草五分姜三片棗二枚水煎服治少陽病頭額痛項強脇痛胸滿發熱惡寒乍往乍來及自汗亡陽譫語作渴兼治風溫汗後身熱及動氣等症或小柴胡湯桂枝湯麻黃湯選用○陰經直中者黃芪建中湯四逆湯小建中湯選用

惡風漏汗朮附加入桂枝○桂枝附子湯桂枝附子各三錢芍藥二錢甘草一錢姜五片棗二枚水煎溫服治太陽病發汗遂漏汗不止惡風溺難四肢拘急難以屈伸兼治傷寒八九日風濕相搏身體煩疼不能轉側不嘔不渴脈浮虛濇方意以過汗則陽虛不固汗出多則津液亡而小便難四肢諸陽之本液脫者骨屬屈伸不利是以用桂枝甘草辛甘以溫經附子辛熱姜棗辛甘通津液以和表也如裏寒去芍藥小便利去桂枝加白朮

發潮欲疸麻軺兼以赤豆○麻黃連軺赤小豆湯連軺即連翹根麻黃各二錢生梓白皮三錢赤小豆半合甘草一錢杏仁七箇姜三片棗二枚潦水煎溫服或加山梔茵陳黃柏尤妙治陽明身熱發黃方意以麻杏甘草姜棗之甘辛微發其汗而散表分之寒濕連軺梓皮之苦寒以除內熱赤豆之甘平以散在表之濕熱煎用潦水者取其味薄而不助濕也如天氣暄熱或有汗去麻黃加柴胡內熱盛加黃芩黃連大便實加枳殼大黃口渴加天花粉

似瘧面赤身痒桂二麻一各半○桂枝二麻黃一湯桂枝芍藥各二錢麻黃一錢二分甘草一錢杏仁八分姜五片棗三枚水煎溫服治太陽病服桂枝湯後似瘧熱多寒少者乃邪客榮衛也脈必洪大用此發汗必解○桂麻各半湯麻黃一錢半桂枝芍藥杏仁各一錢甘草七分姜三片棗二枚煎服治傷寒六七日發熱惡寒舌不短囊不縮脈浮緩便清為不傳

（陰經欲愈此厥陰似瘧也如不愈者宜此又太陽病日久似瘧寒熱或熱多寒少其人不嘔大小便調裏和欲愈若裏虛脉微表虛惡寒表裏俱虛面色青白今面反赤色者表未解也其身必痒宜此湯微發其汗以除表邪）似瘧熱多寒少桂二越一合湊。（桂枝二越婢一湯桂枝麻黃芍藥各一錢石羔二錢甘草三分姜三片棗二枚水煎溫服治脉弱亡陽熱多寒少）柴桂柴姜往來寒熱極驗。（柴胡加桂湯柴胡三錢黃芩桂枝各二錢半夏一錢甘草四分姜三片棗二枚水煎溫服治半表裏症盜汗身熱不欲去衣及不滿不硬但心下妨悶謂之支結百症云若有頭痛惡寒者小柴胡加桂值千金。柴胡桂姜湯柴胡三錢桂枝牡蠣各一錢半天花粉黃芩各二錢乾姜一錢甘草八分水煎服方意以傷寒五六日已經汗下則邪當解今胷滿微結心煩寒熱往來邪在半表半裏凡小便不利而渴者必嘔今便利渴而不嘔者裏無熱也傷寒汗出則和今但頭汗出而他處無者津液不足而陽虛也是以用柴胡之苦以解傳表之邪桂甘之辛甘以散在表之邪牡蠣之鹹以消胷脇之滿炮姜之辛以收陽虛之汗天花粉之苦以生津液）陰旦陽旦表裏寒熱堪誇。（陰旦湯黃芩乾姜各三錢芍藥甘草各二錢桂枝二錢棗二枚水煎溫服治陰症身大熱欲近衣肢節痛口不燥而虛煩者此為內寒外熱也。陽旦湯桂枝芍藥各三錢黃芩二錢甘草一錢姜三片棗二枚水煎溫服治裏熱表寒如夏至後更加知母石羔或升麻不然恐有發黃斑出之變）反發熱麻附甘辛有趣（麻黃附子甘草湯麻黃附子細辛湯）真裏寒白通。（湯）葱附無差（葱白四莖生附子一枚乾姜一兩水煎溫服治少陰客寒不能制水脉微自利不止方意以葱白之辛通陽氣姜附之辛散陰寒經云腎苦燥急食辛以潤之是也）煩躁厥逆自利或無汗而不眠兮黃連鷄子（湯）攪勻（黃連一錢半黃芩阿膠芍藥各一錢水二盞煎至一盞去查乘熱入阿膠令溶化少溫入鷄子半枚攪勻溫服脉經曰風傷陽寒傷陰少陰受病得之二三日已上寒極變熱為陽入陰也脉沉無大熱心中煩躁不臥厥逆自利不得汗方意以陽有餘以苦除之芩連之苦以除熱陰不足以甘補之鷄子阿膠之甘以補血酸收也瀉也芍藥之酸收陰氣而瀉邪熱所謂宜瀉必以苦宜補必以甘此方兼之）煩躁厥逆欲吐或瀉難而脚踡兮乾姜甘芍簡易。（甘草乾姜湯甘草四錢乾姜二錢水煎服。芍藥甘草湯白芍甘草各三錢水煎溫服方意以傷寒脉浮自汗小便數而微惡寒者陽氣不足也心煩足踡者陰氣不足也陰陽俱虛若誤用桂枝發表則便厥咽乾煩燥吐逆是以先宜甘草乾姜辛甘發散以復陽氣而厥愈足溫心煩者更作芍藥甘草酸甘相合以補陰血其脚脛自伸）諸汗不止者防朮牡蠣湯。外用米粉撲乾。（防朮牡蠣湯防風白朮牡蠣各等分為末每一錢米飲或酒下日三服汗止服小建中湯治煩燥惡風不得卧汗出不止及火邪汗多煩躁者尤妙。撲汗法白朮藁本川芎白芷各二錢半為末入米粉一兩半和勻以絹袋盛貯週身撲之治汗出多不得止）取汗不得者。陶氏再造散。外用麩糠鋪地。（陶氏再造散人參黃芪桂

枝甘草附子細辛羌活防風川芎煨生姜夏月加黃芩石羔棗二枚煎再加炒芍藥一撮煎三沸溫服治亡陽症陽虛不能作汗誤用重湯火刼取汗者死。蒸汗法先須燒地令熱以水酒之取蠶砂栢葉桃葉糠麩皆鋪燒地上令側掌許然後鋪席令病人當臥其地以被覆之移時汗出週身至足心用藁本末撲之上床而睡此法取汗雖易百問載范雲用之後二年卒死）夜睡盜汗小柴去半滋陰乎。（傷寒盜汗責表熱雜病責陰虛古法柴胡加桂湯主之王氏以小柴胡去半夏加當歸生地芍藥麥冬知母黃柏酸棗仁亦好）冬病陽明黃芩等芍蜜導茸（盜汗本屬少陽半表裏病冬月陽明症潮熱發作有時脉但浮者為有風宜有汗而天寒無汗夜睡必有盜汗黃芩湯主之黃芩三錢芍藥二錢甘草五分棗二枚煎服有嘔者去棗加生姜半夏以下逆氣此方本治太陽少陽合病自利兼治一切失血經曰虛而不實者以苦堅之以酸收之是用芩芍之苦酸以堅斂腸胃之氣弱而不足者以甘補之甘草大棗之甘以補固腸胃之弱。蜜導法用白蜜半盞於銅勺內微火熬令滴水不散入皂角末二錢攪勻捻成小棗大長寸兩頭銳蘸香油推入穀道中大便即急而去如不通再易一條外以布掩肛門須忍住蜜待糞至方解開布治陽明自汗弱利不可攻）小柴加瓜（湯）汗後嘔而渴煩（即小柴胡湯去半夏倍人參加瓜蔞根）大柴去黃汗後嘔而自利（大柴胡湯去大黃）下後熱葶藶苦酒（湯）清肌。（生艾汁一合無生艾以乾艾水浸擣汁葶藶五錢苦酒五合煎至三合分三次服治大下後傷陰血脉濇發熱不休兼治發狂煩燥面赤咽痛）下後寒芍藥附子補髓。（芍藥附子甘草湯三味各三錢水煎溫服方意以傷寒汗下後則解今反惡寒者下過傷榮也或攝空耳聾者汗過亡陽也是以用芍藥之酸斂津液而益榮附子辛熱固陽氣而補胃甘草調和辛酸以安正氣）風熱咳嗽金沸草散能除。（旋覆花四分荊芥八分麻黃前胡各六分甘草赤芍半夏各二分姜三片棗一枚水煎用細絹濾過免毛射肺咳嗽不已治肺受風寒頭項強急肢體煩疼寒熱往來頭目昏痛咳嗽聲重涕唾稠粘胸膈痞悶喘滿及時行寒疫壯熱惡風又治一切風熱及風痰壅盛痰涎不利等症如諸風及大腑風秘左脇刺痛加枳殼風熱臟腑煩躁氣壅腹痛大便閉加硝黃薄荷姙婦傷寒頭痛壯熱心煩加參朮黃芩石羔熱嗽加葶藶兜鈴薄荷桑白皮烏梅喉中焦燥加朴硝牙疼熱煎灌漱）汗後身痛桂枝加參（湯）作主。（桂枝芍藥各三錢人參二錢甘草一錢姜三片棗二枚水煎溫服治汗後及霍亂後身痛脉沉）黑奴丸渴比常而倍加。（黃芩釜底煤芒硝竈突墨梁上塵小麥奴麻黃大黃各等分為末蜜丸彈子大每一丸新汲水化服須臾發寒汗出而瘥未汗再服須見微利如不大渴不可輕用治陽毒發斑煩躁大渴倍常脉洪大數實）猪苓湯渴後嘔而不止。怫鬱汗下胃虛桂枝參苓。（桂枝參苓湯桂枝芍藥各三錢人參茯苓各二錢甘草一錢姜棗煎溫服治汗吐下後胃虛而噦怫鬱面赤）戴陽陰火躁悶益元附草。（陶氏益元湯甘草二錢附子炮乾姜人參各一錢五味子廿粒麥門冬黃連知母各七分

（艾三分葱三莖姜一片棗二枚水煎臨熟入童便三匙頓冷服治無頭疼有身熱躁悶面赤飲水不得入口乃氣弱無根虛火泛上名曰戴陽症是以用附子之鹹補腎姜葱之辛潤腎甘草參麥甘以緩之五味酸以收之連艾知母苦以發之經曰火淫於內治以鹹冷佐以苦辛以甘緩之以酸收之以苦發之降之是也）

麻黃升麻（湯）目盲鼻衄收功○（麻黃升麻芍藥黃芩石羔茯苓甘草各等分水煎熱服微汗治傷寒太陽不解血隨氣壅鼻衄俗謂紅汗一方加桂枝歸尾天門冬知母萎蕤白朮乾姜治傷寒六七日邪傳厥陰大下後寸脈沉遲尺脈不至咽喉不和唾吐膿血手足厥逆泄不止者難治方意以大熱之氣寒以收之甚熱之氣汗以發之是用麻黃升麻之甘以發浮熱當歸桂姜之辛以散寒知母黃芩之苦以涼心去熱茯苓白朮之甘以緩脾生津芍藥之酸以收逆氣萎蕤門冬石羔甘草之甘以潤肺除熱）

升陽散火○叉手冒心是寶○（陶氏升陽散火湯人參當歸柴胡芍藥黃芩甘草白朮麥門冬陳皮茯神各等分姜三片棗一枚入熱金同煎服治撮空症乃肝熱乘肺元氣虛弱不能主持以致譫語神昏不省人事溺利者可治不利者死如有痰加姜汁半夏便燥譫渴加大黃泄漏加升麻炒白朮）

柴芍枳甘○何憂熱厥似陰○（四逆散甘草枳實柴胡芍藥各一錢為末每二錢米飲下方意以邪漸入深則手足漸冷是以用枳實之苦佐甘草以瀉裏熱芍藥之酸以收陰氣柴胡之苦以發表熱經曰熱淫於內以酸收之以苦發之是也如咳者肺寒氣逆下利者肺與大腸為表裏加五味子以收逆氣乾姜以散肺寒悸者氣塞而不能通行心下築築然悸動加桂枝以通陽氣小便不利加茯苓以淡滲之裏虛腹痛加附子以補虛泄利後重下焦氣滯也加韭白以泄氣滯凡腎病體有熱者皆可服之）

青布生姜○可洗舌胎裂稿○（擦舌法凡胎白而滑者用生姜蘸蜜擦之○胎黃赤燥澁者用真青布裹指蘸冷水頻頻擦之熱輕者其胎易脫重者擦而難脫必大下津液還而胎退若下後依然唇口燥極身發大熱胎結不減或黑者死）

口燥內亡津液○挾火滋陰養榮○（滋陰養榮湯當歸二錢人參生地各一錢半麥門冬芍藥知母黃柏各一錢五味子十四粒甘草四分水煎溫服治汗下過多內亡津液或病後水虧火炎口乾咽燥）

氣喘腹有濡滿○屬陰化痰生脉○（汗下後氣虛痰壅者二陳湯加姜汁竹瀝凡喘多痰皆宜○氣虛者加味生脉散五味子三錢人參麥門冬杏仁陳皮各二錢姜五片棗二枚水煎溫服治手足厥冷脉伏喘促者危殆以此救之○氣虛甚者單人參湯人參五錢甚者一兩水一盞半煎至半盞服之喘定者生不定者死治元氣素虛傷寒汗下後氣短氣喘日反脉微精神困怠如血虛加當歸脉不至加麥門冬五味子手足厥逆加乾姜冷甚加附子兼瀉加白朮）

汗後喘微者○桂杏麻石要叮嚀（桂枝加朴杏湯治太陽病汗下後微喘者此表未解也宜桂枝湯以散風邪加厚朴一錢半杏仁一錢以降氣○麻杏石甘湯麻黃三錢杏仁一錢半甘草一錢石羔五錢水煎溫服治汗下後汗出而喘身無大熱者方意以汗出而喘有大熱者裏熱盛也無大熱者表邪甚也宜此湯以散其邪或疑汗下後同劑者蓋汗下雖不同而邪在表則一也凡汗吐下後治法相同經所謂若汗若吐若下者是矣）

下後喘逆者○葛根芩連（湯）宜選擇○（葛根三錢黃芩黃連各二錢甘草一錢姜三片棗二枚水煎溫服治太陽桂枝症誤下自利不止脉促喘而汗出方意以誤下則腸胃虛而為熱所乘遂協熱自利不止脉促者為陽盛知表未解也若脉微邪在裏也凡病自汗出而促者乃邪氣外甚所致因喘而汗出者乃裏熱氣逆所致故用葛根甘草之甘以散表邪芩連之苦以除裏熱）

汗下虛噦○姜芩連參○橘皮竹茹最靈○（乾姜芩連人參湯乾姜黃芩黃連人參各三錢水煎溫服治傷寒食入即吐謂之寒格及曾經汗下關遲胃虛冷嘔吐方意以生姜之甘辛以補正氣芩連之苦以通寒邪內格○橘皮竹茹湯人參三錢陳皮五錢甘草一錢竹茹一團姜五片水煎溫服治四時傷風寒冷濕鼻塞喉鳴上氣不得下而咳嗽）

陰症飽逆○羌活丁茴○橘皮乾姜任責○（羌活附子湯羌活一錢炮附子半枚茴香丁香乾姜各一錢半水煎入鹽一撮熱服治陰症內寒厥而嘔逆○橘皮乾姜湯陳皮二錢通草乾姜各一錢人參一錢半水煎服治傷寒初病但惡寒不發熱口中和脉微細而飽逆者此寒邪客中焦而氣不得伸也或加半夏生姜丁香柿蒂尤妙）

大橘小橘○嘔吐煩冷分嘗○（大橘皮湯陳皮甘草各二錢人參五錢姜七片水煎服治嘔噦胸滿虛煩不安○小橘皮湯陳皮五錢生姜一兩水煎溫服治嘔噦手足厥冷）

大半小半○飽餉痰飲不食○（大半夏湯半夏茯苓生姜各二錢半臨卧水煎服治傷寒痰症及惡心頭暈如痰熱加甘草胃不和加陳皮○小半夏湯半夏五錢生姜一兩水煎溫服治飽逆穀氣入口即吐及發汗後水藥不下）

水不入而噦姜汁○更煎半夏以寬胸○（生姜汁半夏湯半夏五錢水一盞半煎至半盞入生姜汁半盞調勻稍溫緩緩服之凡嘔吐藥忌頓服治胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦憒憒無奈何者）

渴後嘔而已○柴胡須赤茯苓以快膈○（赤茯苓湯赤茯苓五錢陳皮人參各二錢白朮川芎半夏各一錢水煎入姜汁一匙調服治飲水過多水停心下痞滿頭痛頭汗為水結胸或先渴後嘔或厥陰消渴氣上衝或汗下後身體振搖筋惕肉瞤）

衄血生地芩連○或茅花湯而單煎○（陶氏生地芩連湯生地黃黃芩黃連山梔川芎芍藥柴胡桔梗甘草犀角棗一枚水煎臨熟入茅根或藕節絞汁磨京墨調服治鼻衄成流一切去血過多譫語失神撮空閉目不知人事○生地芩連湯生地川芎當歸各七分赤芍山梔黃芩黃連各三分防風二分水煎徐徐呷之脉實者加大黃下之治婦人血風症因崩大脫血或前後去血及男子去血過多因而涸燥其熱未除循衣摸床撮空閉目不省人事揚手擲足錯語失神脉浮弦而虛內有燥熱之極氣粗鼻乾上下通燥危症凡氣分燥閉者用大承氣湯血分燥閉者宜此湯以降血中之火○茅花湯單茅花一大把無花用根洗淨搗碎水煎濃汁服之或用藕節同煎尤妙治衄血不止）

吐血黃連栢皮○或綠袍散以外塞○（黃連栢皮湯黃連黃栢黃芩各二錢水煎臨熟入阿膠一錢半煮沸溫服治熱毒吐血○綠袍散黃栢薄荷芒硝青黛各等分為末入冰片少許掺上牙床即止治齒縫出血）

救火逆驚狂身痛柴胡龍蠣鉛丹○

（救逆湯桂枝蜀漆各三錢甘草二錢牡蠣四錢龍骨二錢半姜五片棗三枚水二盞先煎蜀漆十餘沸入諸藥煎至八分服方意以汗出亡陽則心虛神浮驚狂與桂枝湯以解未盡之表邪芍藥益陰非亡陽所宜故去之火邪錯逆加蜀漆之辛以散之神氣脫亡加龍蠣之澁以收神固陽本草云澁可去脫是也○桂甘龍骨牡蠣湯桂枝一錢半甘草牡蠣龍骨各一錢水煎服治一切火逆及誤下裏虛又加溫針致生煩躁驚狂遺精等症是用桂甘之辛甘以散經中之火邪龍蠣之澁以收浮越之正氣○柴胡龍骨牡蠣湯柴胡三錢黃芩人參龍骨牡蠣茯苓桂枝鉛丹半夏各一錢半姜五片棗二枚水二盞煎至一盞入大黃三錢再煎二三沸溫服方意以傷寒八九日邪氣將復傳陽經誤下虛其裏而熱不解以致胸滿煩驚譫語小便不利皆心胃熱而津液不行故也又一身重痛不可轉側者陽氣內行而不營於表也宜小柴胡以除胃滿加龍蠣鉛丹以歛神氣茯苓以行津液利便大黃以除胃熱桂枝以行陽氣而解身重錯雜之邪）止譫語錯亂呻吟梔子芩連黃栢（黃連解毒湯黃連黃芩黃栢山梔各二錢半水煎溫服治傷寒汗後或因飲酒復劇苦悶乾嘔口燥呻吟錯語煩躁不得睡臥兼治胃熱吐血一切熱毒臟毒等症）咽痛猪膚甘桔而半桂可起伏寒（猪膚湯猪膚一兩水一盞煎至五分入白蜜一合白粉半合熬香熟和勻相得服之治陽經傳入少陰客熱下利咽痛胸滿及脉陰陽俱緊主無汗而有汗曰亡陽法當咽痛此屬少陰方意以猪水畜其氣入腎是以猪膚能解少陰客熱加白蜜以潤燥除煩白粉以益氣斷利○單甘草湯甘草一錢水一盞半煎至一盞日進三服治陽邪傳少陰寒熱咽痛如寒熱相搏咽動加桔梗五錢名甘桔湯方意以甘草甘平以除熱桔梗辛溫以散寒甘桔相合以調寒熱而和少陰之氣也○半桂湯半夏桂枝甘草各一錢姜五片水一盞半煎至七分徐徐嚥之治少陰客寒下利脉微弱而咽痛是以用半夏桂枝辛以散寒甘草之甘以緩正氣）喉塞龍骨烏扇而雞壳能開音啞（黃連龍骨湯黃連三錢龍骨一錢七分黃芩芍藥各二錢水煎溫服治少陰腹痛脉沉細有熱而咽痛○烏扇湯射干猪脂各四兩同煎去查取半雞子黃大綿裹納喉中徐徐嚥下凡咽中閉塞不可下者宜用○雞壳苦酒湯半夏十四枚用雞子留白去黃以苦酒同入雞壳內置刀環中安火上煮三沸去查少少含嚥作三次服治熱傷於絡則經絡乾燥使咽中生瘡不能言語聲不出者是以用半夏之辛以發聲音雞子之甘以緩咽痛苦酒之酸以歛咽瘡）升麻六物（湯）誤汗咽痛及口牙（升麻山梔各一錢半大青杏仁黃芩玄參各一錢蔥三莖水煎治陽厥應下反汗必咽痛口瘡牙腫）芩連消毒（飲）時行咽腫并頭額（黃芩黃連柴胡甘草桔梗川芎荊芥防風羌活枳壳連翹射干白芷姜三片煎入牛蒡子一撮再煎一沸入竹瀝姜汁調服治天行大頭病發熱惡寒頭項咽喉腫痛脉洪取作痰火治凡服宜先加大黃利去一二次服去大黃加人參當歸調理）結胸熱而有渴大小陷胸十棗湯（大陷胸湯大黃三錢半病重壯人五錢用水一盞煎至七分入芒硝二錢再煎一二沸去查入甘遂末一分和勻溫服若腹中不動再進一服治傷寒表未解醫反下之膈內拒痛手不可近短氣心煩懊憹心下鞕大便閉苦燥而渴熱實脉沉而緊兼治身無大熱有水結在胸脇間者方意以大黃苦以蕩滌芒硝鹹以軟堅甘遂通水可以直遂其氣而透胸膈之結也但此藥大峻不可輕用如不得已即用大陷胸湯○大陷胸丸大黃三錢杏仁葶藶各一錢芒硝二錢半甘遂一分人弱者半分為末蜜丸彈子大每一丸用水一盞煎至六分溫服至一宿未動再進一丸以利為度治熱實結胸項強如柔痓狀用此下之則和方意以硝黃鹹苦以下熱葶藶苦甘以瀉滿甘遂取其直達白蜜取其潤利皆以下瀉滿實物也○小陷胸湯黃連三錢半夏一錢瓜蔞仁二錢姜三片水煎溫服利黃涎沫即安一方加枳壳桔梗黃芩治結胸病正在心按之則痛其脉浮滑方意以半夏之辛以散結氣黃連之苦以瀉滿實瓜蔞之苦以寬中潤下○十棗湯芫花甘遂大戟各等分為末用大棗十枚水一盞煎至半盞去棗調末五分怯弱者減半服服後大便利下水以粥補之治太陽傷風下利嘔逆漐漐汗出發作有時頭痛心下痞硬滿引脇下疼乾嘔短氣不惡寒及裏水身涼者宜服方意以下利嘔逆為裏受邪可下汗出不惡寒發作有時為表已解可攻頭痛脇疼心痞乾嘔短氣邪熱內蓄而有伏飲是裏未和也是以用芫花之辛以散飲戟甘之苦以瀉水大棗之甘益土以勝水）結胸寒而不煩枳實理中三物白（枳實理中丸人參白朮茯苓各一兩甘草乾姜各七錢半枳實六錢黃芩二錢半蜜丸彈子大每一丸沸湯化下治太陰病誤下寒實結胸及傷寒諸吐利後胸痞欲絕高起而痛手不可近如渴加天花粉汗利不止加牡蠣○三物白散貝母桔梗各三錢巴豆一錢為末每五分弱者減半白湯調服病在膈上必吐膈下必利若不吐利進熱粥半盞助之若吐利過進冷粥半盞止之治寒實結胸無熱症）三黃附子瀉心下痞鞕虛凝（三黃瀉心湯大黃三錢黃芩黃連各一錢半用麻沸湯一盞浸之以物蓋定候一飯久稍冷去查頓溫服沸湯漬藥者取其氣薄而泄虛熱也治心下痞硬內實熱盛而不大便關脉浮者可服惡寒勿服○附子瀉心湯用附子半枚水一盞煎至半盞去查剌入三黃瀉心湯內和勻分二次溫服治心下痞硬惡寒汗出）半甘生姜瀉心下痞軟氣逆（半夏瀉心湯半夏二錢五分甘草三錢黃芩乾姜人參各三錢黃連一錢姜三片棗二枚水煎溫服治心下痞滿軟而不痛○甘草瀉心湯即半夏瀉心湯再加甘草一錢人參一錢半治傷寒傷風醫反下之下利日數十行穀不化腹中鳴心下痞硬乾嘔心煩若再下之痞氣益甚此虛氣上逆也○生姜瀉心湯生姜半夏各二錢人參乾姜各一錢半黃連甘草各一錢黃芩五分棗二枚水煎溫服治汗出解後胃中不和心下痞噫氣食臭或脇下有水氣腹中雷鳴泄瀉已上瀉心湯皆三黃瀉心湯為主大黃芩連之苦寒以瀉心下之痞然痞為虛熱有惡寒汗出者陽氣外散也加附子以固陽胃為陽氣之根汗出亡津胃虛氣逆痞而乾噫食臭不能消穀或挾水雷鳴下利者土弱不能勝水也加生姜以益胃之陽氣下利不止穀不化乾嘔痞益甚者胃虛氣上逆也加甘草以補胃之陰氣）痞而滑利禹餘粮（赤石脂禹餘粮湯三味各二錢水煎溫服治心下痞硬服瀉心湯利不止及傷寒下利不止服理中湯益甚者此乃下焦不約故水穀不分是以用石脂之澁以收斂之禹餘之重以鎮固之本草云澁可去

（脫重可去怯是也若服此不止當利小便兼治汗家重發汗心神恍惚小便已陰中疼）痞而乾噫代赭石○（旋覆代赭石湯旋覆花三錢人參半夏甘草各二錢代赭石一錢姜五片棗二枚水煎溫服治汗吐下後心下痞硬胃弱虛氣上逆乾噫或吐方意以旋覆之鹹而軟痞硬代赭之重而鎮虛逆生姜半夏之辛以散痞氣參草大棗之甘以補胃弱）

柴陷桂參痞結疎表且和中○（柴陷湯即小柴胡湯合小陷胸湯治結胸痞氣初起有表及水結痰結熱結等症○桂枝人參湯人參白朮乾姜各一錢甘草桂枝各二錢水煎溫服治太陽症未罷數下之遂成脇熱下利而心下痞硬表裏不解者方意以表邪未解而裏氣又虛故加桂枝於理中湯內也）

檳榔枳梗痞結調氣先開鬲○（檳榔湯檳榔枳殼各等分黃連少許水煎溫服治結胸痞氣未成宜先服此調氣○桔梗湯枳殼桔梗甘草各等分水煎溫服治結胸痞氣及胸滿不利煩悶欲死不論寒熱通用如有痰合二陳湯名枳梗二陳湯表熱或寒熱往來加柴胡黃芩內熱加黃連痰喘加瓜蔞仁口燥去半夏加天花粉）

結胸危甚灸以巴連○（灸結胸法用巴豆十粒研爛入黃連末一錢又研勻捻作餅子納臍中艾炷如手指大灸之輕者一炷重者不過再灸候腹中微熱取下惡物立効灸畢以溫水柏手洗淨不然生瘡治結胸症危甚手不可按二便閉澁或連日不通但口中微氣或嘔吐不止諸藥不効）

痞結罨熨姜葱裹以絹帛○（罨結胸法用初出亮黃毛雞子一隻生姜四兩共搗爛炒微溫攤在胸中結實之處如盤大外以箬葉絹帛縛之候半日許覺胸中熱燥解去更用熱手揉之不拘早晚必當先用○熨結胸法用葱白十莖生姜一兩共搗碎作餅炙熱貼臍中以熨斗貯火按餅上熨之半時許待熱氣入內覺響即住復用枳實理中加附子或五積散之類服之治陰症冷結手足厥逆幷熨陰毒以汗出為度置三五餅易之○罨痞氣法蘿蔔子二合生姜二兩葱白七莖橘葉一握白麪半合共搗勻炒畧溫罨痞滿之處外用箬葉絹帛縛之候半日許胸中煩熱即解去拭淨復以熱手揉之不拘寒熱虛實遲早並用○熨痞氣法用橘葉一大握麥麩半升同炒熱以皮紙襯絹包之乘熱熨痞滿之處冷則再炒熨至病人覺快方止凡痞氣初起便宜用之）

梔朴治懊憹煩脹厚朴宜生○（梔子厚朴湯山梔一錢半厚朴三錢枳實二錢水煎溫服得吐即止治傷寒下後心煩腹滿坐臥不安方意以山梔之苦以吐虛煩枳朴之苦以泄腹滿無腹滿者梔豉湯妙）

桂甘除動悸脈代甘草用炙○（桂枝甘草湯桂枝三錢三分甘草二錢二分水煎溫服治過汗心悸欲按甚則身振振欲擗地如脈代結者宜炙甘草湯）

胸滿虛而有嘔梔豉甘草生姜○（梔豉甘草湯山梔四枚豆豉五錢甘草二錢水煎溫服治胸滿少氣熱傷氣也故加甘草於梔豉湯中以補氣○梔豉生姜湯梔子四枚豆豉五錢生姜一兩水煎溫服治胃滿作嘔熱摶而氣逆也故加生姜於梔豉湯中以散逆氣）

脇滿熱而有痰柴梗青皮杏核（柴梗湯即小柴胡湯去人參合桔梗湯治胸脇痞滿或痛○柴梗半夏湯柴胡二錢黃芩半夏枳殼桔梗瓜蔞仁各一錢青皮杏仁各八分甘草四分水煎溫服治發熱咳嗽胸滿兩脇刺痛者此邪熱挾痰攻注

也如口燥渴去半夏痰在脇下加白芥子或竹瀝姜汁亦妙柴陳湯即小柴胡湯合二陳湯治痰氣胸脇不利及痰瘧等症）○

腹痛下寒黃連乾姜性捷○（黃連湯黃連二錢乾姜桂枝各一錢人參一錢半半夏一錢二分甘草五分姜三片棗二枚水煎溫服治胸中有熱胃中有邪氣腹痛欲嘔吐者上熱下寒也方意以陽不得降而胸熱欲嘔陰不得升而下寒腹痛是以用黃連之苦以降陽姜桂半夏之辛以升陰參草大棗之甘以益胃）

腹脹汗後厚朴半夏功殊○（厚朴半夏甘參湯厚朴三錢半夏二錢人參一錢甘草五分姜三片水煎溫服治汗後腹脹滿而痛方意以厚朴之苦瀉腹滿參草之甘益脾胃半夏生姜之辛散滯氣○桔梗半夏湯陳皮三味各等分姜煎溫服治陰陽氣不和而腹脹胸滿）

動氣衝心八味李根湯妙○（當歸芍藥茯苓黃芩各二錢桂枝三錢甘草半夏各一錢甘李根白皮一兩水煎溫服治動氣在上發汗則氣上衝心不得息）

霍亂多暑二香黃連散除○（藿香厚朴半夏茯苓陳皮扁豆香茹各一錢黃連澤瀉各八分甘草三分水煎入姜汁一匙溫服嘔多者倍入尤妙治伏暑霍亂暴作煩亂躁悶或肚腹疼痛冷汗自出尺脈沉手足冷不宜熱藥）

大便燥而丸麻子○（麻子仁丸又名脾約丸大黃枳殼厚朴芍藥各五錢杏仁二錢麻仁三錢為末蜜丸菉豆大每卅丸溫湯下未利再服得快方止治小便數大便難名為脾約宜此通腸潤燥方意以麻子杏仁之甘以緩脾而潤燥津液不足以酸收之芍藥之酸以斂液腸燥胃強以苦泄之枳朴大黃之苦下燥結而泄胃強也兼治年老怯弱之人血燥風秘津液少大便堅及脚氣大便燥）

小便澁而對滑瞿○（萬全木通散木通滑石赤茯車前葉各一兩瞿麥五錢為末每四錢水一盞煎至半盞溫服治陰虛為陽所湊膀胱中有積熱也故小便難而黃）

白通調冷利無脈煩躁加猪膽○（白通加猪膽汁湯附子一枚乾姜三錢葱白三莖水煎去查入童便二盞猪膽汁一枚調服治少陰厥冷下利乾嘔脈不至而煩躁服此湯脈暴出者死微出者生方意以腎主水客寒犯腎不能制水故厥逆下利是用葱白之辛以通腎之陽氣姜附之辛以散陰寒加童便胆汁者內經所謂調寒熱之逆冷熱並行不然熱物冷服下咽之後冷體既消熱性便發則病性不違而氣亦從可以去拒格之寒也）

白頭疏熱利純下清水索黃龍○（白頭翁湯白頭翁黃柏秦皮黃連各一錢水煎溫服治協熱下利後重而渴方意以腎欲堅急食苦以堅之利則下焦虛是以純苦之劑堅之○陶氏黃龍湯大黃三錢芒硝一錢半枳實厚朴各一錢甘草人參當歸各五分年老氣血虛者去芒硝姜三片棗二枚桔梗二分水煎一沸熱服治熱邪傳裏胃中燥糞結實心下硬痛純下清水多是日逐自飲藥水下利非外寒也宜急下之身有熱者宜用此湯身無熱者六一順氣湯）

桃花散○石脂丸○邪入經而膿（膿為陳積）結塊○（桃花散赤石脂五錢半生半炒乾姜二錢糯米一合水煎去查入生石脂末一半調服治少陰下利膿血腹痛小便不利下利不止脈沉血寒凝滯下必紫黑成塊或雜膿血方意以石脂澁腸胃乾姜散寒糯米補氣下焦裏寒不約者宜○赤石脂丸赤石脂乾姜各一兩黃連當歸各二兩為末蜜丸梧子大每卅丸米飲下治

（小便澁大便利）阿膠湯地榆散毒入臟而血（血為新積）流長（黃連阿膠湯山梔黃柏四味各二錢水煎溫服治傷寒熱毒攻胃流入大腸所下必紅赤成流如腹痛加芍藥血虛加芎歸血不止加地榆夾膿有食積加山查神麯○地榆散地榆犀角黃連茜根黃芩各五錢山梔二錢半為末每五錢入韭白五寸水煎溫服治傷寒熱毒不解蹺即壯熱腹痛腰疼下利膿血）手足搐搦○通末牛蒡○（牛蒡根湯牛蒡根一兩南星麻黃牛膝各六錢入酒一盞同於石器內搗細另於黃土地坑以炭火燒令通赤去火掃淨投藥於坑內再用炭火燒令黑色取出為末每一錢溫酒調服治發汗失宜風邪乘虛逆入經絡故手足攣搐筋脉拘急）四肢拘急○易用瓜蔞（瓜竹湯瓜蔞根五錢竹茹二錢半水煎溫服一方加韭根五錢甘姜二錢半臨熟入鼠糞末一字調服治熱上衝胸煩悶手足搐搦如風狀及瘥後勞復陰陽易病卵腫疼痛手足不能動者）溫經益元○惕瞤自愈（陶氏溫經益元湯熟地人參白朮黃芪甘草芍藥當歸生地白茯陳皮肉桂附子姜三片棗一枚糯米一撮水煎溫服治汗後大虛頭眩振振欲擗地并筋惕肉瞤及發汗太多衛虛亡陽汗出不止或下後利不止身疼等症如飽悶去地黃加枳殼瘦人去芍藥有熱去附子泄利去歸地加炒白朮升麻陳壁土炒加姜汁製半夏渴加天花粉汗後惡風寒屬表虛去桂附生地加桂枝飴糖）引風如聖瘈瘲可瘳○（引風湯大黃乾姜龍骨各四兩桂枝三兩甘草牡蠣各二兩凝水石滑石赤石脂白石脂紫石英石羔各六兩為粗末以葦布盛之每取三指撮水煎三沸服治風溫妄以火熏發黃甚則狀如驚癇時發瘈瘲○如聖餅子防風天麻半夏各五錢南星乾姜川烏各一兩川芎甘草各二兩一方有細辛三錢為末蒸餅丸芡實大捻作餅子日乾每五餅同荊芥三五穗細嚼茶酒任下如傷寒得汗尚餘頭痛者姜葱煎湯下兼治男婦氣逆上盛下虛痰飲及風寒伏留陽經偏正頭疼痛連腦巔吐逆惡心目眩耳聾常服清頭目消風痰煖胃氣○陶氏如聖飲羌活防風川芎白芷柴胡芍藥甘草當歸烏藥半夏黃芩姜二片水煎臨熟入竹瀝姜汁調服兼治痓症如柔痓加白朮桂枝剛痓加麻黃蒼朮口噤咬牙大便實者加大黃利之）安蛔理中去甘草烏梅丸子頻入口（安蛔理中湯人參白朮乾姜茯苓各一錢半烏梅三箇水煎溫服治蛔厥如大便閉加大黃入蜜以利之口渴加瓜蔞根○烏梅丸烏梅十個乾姜一錢黃連一錢半細辛附子桂枝人參黃柏各六分當歸川椒各四分為末用醋半盞浸烏梅蒸爛去核和諸藥搗丸梧子大每十丸米飲下日三服病甚者多服取效為度忌生冷滑物治臟寒蛔厥得食即嘔乍靜乍煩兼止久利方意以烏梅之酸而斂肺氣人參之甘以緩脾氣當歸椒細桂枝之辛以潤內寒姜附之辛熱以勝內寒連柏之苦以安蛔凡蟲症忌用甘草蓋蟲聞甘則起聞酸則止聞苦則定聞辣則頭伏而下）治䘌桃仁與犀角雄黃銳散納肛頭（治䘌桃仁湯桃仁槐子艾葉各二錢半棗七枚水一盞煎至半盞濾清溫服治狐惑唇上生瘡聲啞○黃連犀角湯黃連一錢半犀角二錢烏梅三箇木香一分煎服同上治狐惑咽乾唇焦口燥熱盛○雄黃銳散雄黃青葙子苦參黃連各二錢半桃仁一錢為末生艾搗汁和如小指尖大綿裹納下部肛門內治狐惑症䘌食上下者並宜）消斑青黛紫雪豬膽雞子仍斂肌○（陶氏消斑青黛飲黃連甘草石羔知母柴胡玄參生地山梔犀角青黛人參大便實者去參加大黃姜一片棗二枚水煎臨熟入苦酒一匙調服治熱毒發斑等症○紫雪升麻六錢黃金十兩寒水石石羔各四兩八錢犀角羚羊角各一兩玄參一兩六錢沉香木香丁香各五錢甘草八錢水五盞先煮黃金至三盞入諸藥再煎至一盞去查入芒硝三兩二錢慢火煎以柳木攪不停手候欲凝入磁盆中更下硃砂麝香末各三分急攪令勻候冷凝結成雪每一錢細細嚥之治發斑咽痛及暑中三陽脚氣煩躁○豬膽雞子湯豬胆汁二合雞子一枚苦酒三合和勻壯人煎三沸盡服羸人煎六七沸緩服汗出即愈治傷寒五六日斑出）赤斑黑膏黃連葛根橘皮兼止嘔○（黑膏生地二兩六錢半淡豆豉一兩六錢半豬脂十兩和勻露一宿煎之令三分減一濾去查入雄黃末五分麝香末一分攪勻分作三服白湯化下毒從皮膚中出則愈未效再服忌蕪荑治溫毒發斑嘔逆○黃連橘皮湯黃連二錢麻黃葛根各一錢半橘皮杏仁枳實厚朴各一錢甘草七分水煎溫服治溫毒發斑皮膚癮疹及唇口下部生瘡飽逆悶亂下利嘔吐清沾如病熱沉重晝夜呻吟不安或咽痛者去麻黃加玄參升麻○葛根橘皮湯葛根橘皮杏仁知母麻黃黃芩甘草水煎溫服治溫毒發斑心煩）大青四物○湯治斑火紅○（大青一兩阿膠二錢甘草一錢香豉一合水煎溫服治壯熱煩躁大渴脉洪盛遍身斑出如火色）芒硝三錢○塗斑爛臭（芒硝豬胆汁法芒硝三錢為末豬胆汁調塗瘡上候乾即痂落無瘢仍研末摻之此病溺澀有血及瘡黑靨不出膿者死）如狂○活血當歸桂苓飲子也相應○（陶氏當歸活血湯當歸赤芍甘草紅花桂心乾姜枳殼生地黃人參柴胡桃仁姜一片煎入酒三匙調服三帖後去桃姜紅花加白朮茯苓治無頭疼無惡風但身熱發渴溺利便黑口出無倫不可誤為熱症乃瘀血內傳心脾二經使人昏迷沉重如見祟症名挾血○陶氏桂苓飲豬苓澤瀉桂枝甘草白朮黃柏知母山梔蘇葉姜三片煎再加滑石末一錢煎三沸服取微汗為効治初得病無熱狂言煩躁不安精采不與人相當誤為發狂下者死殊不知熱結膀胱名曰如狂症血自下者愈不愈者宜此古方用桂枝湯）發狂三黃石羔梔子玄明皆攵○（三黃石羔湯黃芩黃連黃柏山梔各二錢麻黃一錢半自汗者去之石羔五錢香豉三錢水煎溫服得汗即瘥未効再服治傷寒身熱煩躁不得汗脉洪大四五日便發狂者表裏俱熱也○梔子仁湯山梔赤芍大青知母各二錢升麻黃芩石羔杏仁各二錢柴胡一錢半甘草五分香豉百粒姜三片水煎分二服治發斑煩躁面赤咽痛潮熱百節疼痛○王氏玄明粉玄明粉二錢寒水石黃連各一錢半珍珠辰砂各二錢為末雞子清一枚白蜜一匙新汲水調服治發狂神効○水漬法用青布五六尺疊摺以新汲水浸之稍擰乾搭於病人胸上須臾蒸熱再浸再搭良久狂定方可診脉下藥治大熱狂叫奔走不能制伏○火劫法用炭火一盆置病人之前將醋一碗急沃火內使烟氣衝入鼻孔內須臾自定或用涼水噀面亦可）梔子烏梅湯瘥後不睡即安（○梔子黃芩甘草各一錢柴胡二錢烏梅一箇姜

（三片淡竹葉十四片豆豉一錢半水煎溫服治傷寒瘥後不眠者此熱氣與陽并陰氣未復故也）酸棗仁湯晝夜不眠堪救。（酸棗仁人參各一錢半石羔二錢半茯苓知母甘草各一錢桂心五分姜三片臨臥水煎溫服治汗吐下後晝夜不眠）陰症輕者三白辛黃以疎表。（辛黃三白湯人參白朮白芍各一錢白茯當歸五分細辛麻黃各二分姜三片棗一枚水煎溫服治陰症傷寒在表如脈沉發熱口和加附子五臟見症加藥同麻黃湯見後）陰症重者四順通脈以濟危。（四順湯丸人參白朮乾姜各二錢甘草三錢水煎或蜜丸服治身無熱脈沉苦煩默默不欲見光腹痛下利或無脈可診未辨陰陽姑與服之若是陽厥便當見出熱症若是陰厥則無有熱矣通脈四逆湯附子五錢乾姜二錢半甘草二錢葱白三莖面赤者七莖水煎溫服治少陰症下利清穀微熱厥逆反不惡寒面赤脈微欲絕或咽痛乾嘔腹痛自利不止如腹痛去葱加芍藥以利氣嘔加姜汁以散之利止脈不出加人參以補血咽痛加桔梗以散結○茯苓四逆湯茯苓乾姜甘草各一錢附子人參各三錢水煎溫服治發汗復下後不解脈沉而微細煩躁者陰陽俱虛也方意以四逆湯以復陽加人參茯苓以益陰）陽毒升麻玄參狂斑頓愈。（陽毒升麻湯升麻射干人參各一錢黃芩二錢犀角一錢半甘草七分水煎溫服取汗治陽毒發斑頭項背痛躁悶不安狂走妄罵下利咽喉腫痛口吐膿血○玄參升麻湯甘草三味各三錢水煎溫服治發斑煩躁譫語咽喉閉塞腫痛）陰毒正陽甘草厥痛立移。（正陽散附子一兩良姜甘草五錢皂莢一挺射香二分為末每二錢水煎入蜜熱服治陰毒額汗頭痛面青舌黑口張出氣煩渴心下硬滿肢厥身冷多睡陰毒甘草湯甘草升麻當歸桂枝各一錢雄黃川椒各一錢半鱉甲三錢水煎溫服良久再服毒當從汗出未汗再服治陰毒畏寒身體重痛腹疼背強咽痛嘔逆恍惚失驚氣短神昏爪甲青黑手足冷汗頭面烘熱等症）破結瀉毒活龍散用蜜調下。（破結丹辰砂青礞石葶藶肉豆蔻木香官桂牽牛黑附子巴豆各五錢輕粉半分射香五分金箔五片為末用米醋半盞入辰砂附子牽牛三味熬成膏次入餘藥和丸皂子大輕粉為衣每二丸蜜湯下治陰陽伏逆變為結胸五六日大便結攻之不可達之不及以此主之○活龍散活地龍四條洗淨研爛入姜汁少許蜜一匙薄荷汁少許新汲水調服徐徐灌之漸次涼快若熱熾者加片腦少許未効再服自然汗出而解治陽毒累經汗下不通結胸硬痛或稍通而復再結喘促熱燥狂亂）返陽止躁復陽丹宜酒投之。（返陽丹硫黃五兩硝石太陰玄精石各二兩乾姜附子桂心各五錢為末用鉄銚先鋪玄精次鋪硝石各一半中間鋪硫黃末又將硝石玄精餘末蓋上以小盞合著用炭三斤燒令得所勿令烟出急取瓦盆合着地上四面灰蓋勿令烟出候冷取出入餘藥同為末糊丸梧子大每卅丸艾湯頓下汗出為度治陰毒心煩頭痛肢冷面青腹脹脈伏及氣虛陽脫無脈不省人事傷寒冷厥○復陽丹蓽澄茄木香乾蝎附子硫黃吳茰各五錢乾姜一錢為末酒糊丸梧子大每卅丸姜湯下復以熱酒投之取汗治傷寒面青肢冷心腹脹脈沉細）陽盛拒陰。（陶氏）三黃巨勝湯可劫。（即前三黃石羔湯去麻黃

豆豉加芒硝大黃姜一片棗二枚水煎臨熟入泥漿清水二匙調服治陽毒發斑狂亂妄言大渴叫喊目赤脈數大便燥實上氣喘急舌卷囊縮難治姑以此湯劫之）陰躁回陽百問霹靂散尤奇。（陶氏回陽返本湯熟附子乾姜甘草人參麥門冬五味子臘茶陳皮如面戴陽者加葱白草莖黃連少許青泥漿二盞煎臨熟入蜜五匙頓冷服之取汗為効治陰盛格陽陰極發躁微渴面赤欲坐井地脈無力欲絕○百問方硫黃五錢艾湯調服即時安坐良久睡起汗出而愈治傷寒身冷脈微手足厥而躁○又方附子五錢生姜三錢糯米一撮水一大盞煎至六分溫服取汗切不可與冷水飲之如發汗併查服之甚効治陰毒傷寒煩躁渴悶○霹靂散附子一枚炮過取出用冷灰培半時切半枚入真臘茶一錢水一盞煎六分去查入熟蜜半匙調勻頓冷服之須臾躁止得睡汗出乃瘥治陰盛格陽身冷反躁欲投井中肢體沉重唇青面黑渴欲水復吐大便自利黑水六脈沉細而疾或無）瘥後水腫牡蠣澤瀉（湯）以利便。（牡蠣澤瀉瓜蔞根蜀漆葶藶商陸海藻各等分為末每方寸匕白湯調服小便得利即止治大病瘥後從腰以下水腫方意以牡蠣澤瀉海藻之鹹以瀉水氣漆葶瓜商之辛酸苦以導湿腫）瘥後神昏（陶氏）導赤各半（湯）以醒迷。（黃芩黃連甘草犀角麥門冬滑石山梔茯苓知母人參姜棗煎加燈心一握煎沸熱服治傷寒後心下不硬腹中不滿二便如常身無寒熱漸變神昏不語或睡中獨語目赤唇焦舌乾不飲水稀粥與之則嚥不與則不思形如醉人乃熱傳手少陰心也心火上逼肺所以神昏名越經症）易病燒裩赤衣與鼠糞虛弱乎當歸白朮。（燒裩散取近陰處裩襠一塊方圓四五寸男用女裩女用男裩燒存性溫水調服方寸匕日三服一方如手足指爪廿片燒灰男女互用米飲下小便即利陰頭微腫則愈○赤衣散取室女月經布近陰處者燒灰白湯調下或入湯藥調服尤妙男女俱宜○猳鼠糞湯韭白一把雄鼠糞十四枚水煎溫服微汗未汗再服治男子陰易小腹連腰胯急痛○當歸白朮湯當歸附子各二錢生姜一錢白朮桂枝甘草人參黃芪芍藥各五分水三盞煎至一盞溫服食頃再進一服微汗便瘥治男女病未平復因犯房事則小腹急痛兼腰胯四肢不能舉任身無熱者）復症梔豉枳黃與鼠屎逍遙乎人參竹皮。（梔豉枳實湯山梔枳實各一錢香豉五錢水煎服微汗治勞復發熱方意以熱聚於上以苦吐之熱散於表以苦發之經曰火淫所勝苦以發之是也○梔豉枳黃湯山梔枳殼柴胡各一錢香豉五錢大黃三錢人壯備堅者五錢水煎溫服治食復發熱如內熱加黃芩腹脹加厚朴傷肉加山查傷麪飯加神麯○鼠屎豉湯鼠糞七枚枳殼一枚山梔七個豆豉卅粒葱白甘莖水煎溫服治勞復發熱○人參逍遙散人參當歸各二錢柴胡一錢半白朮白芍白茯各一錢水煎溫服治女勞復虛弱者如心煩口乾加麥門冬五味子陰虛火動精泄加知母黃栢牡蠣心下痞滿加黃連枳實不眠加竹茹煎服○竹皮逍遙散青竹皮卵縮腹痛者倍之人參知母黃連甘草滑石生地韭白柴胡犀角姜三片棗二枚煎臨服入燒裩襠末一錢半調服微汗未汗再服得小便利陰頭腫即愈治勞復及易病）百合分汗吐下。陶氏柴胡兼用。（汗後百合知母

（湯百合七枚知母一兩先以水洗百合清一宿去白沫另以水二盞煎至一盞去查又以知母水二盞煎至一盞去查二汁和勻再煎至一盞半分二次温服○吐後百合雞子湯百合七枚製法如前煎汁一盞入雞子黄一枚攪勻温服○下後百合滑赭湯百合七枚製煎法如前另用泉水二盞煎滑石一兩代赭石一兩至一盞方入百合汁内再煎至一盞温服○不經汗吐下者百合地黄湯百合七枚製煎法如前更用生地二兩搗汁一盞和百合汁再煎至一盞温服大便當下如漆中病即止○變成渴者百合洗法百合一升以水十盞清一宿通身洗之洗已淡食將息弗與鹽豉○渴而不瘥者瓜蔞牡蠣散瓜蔞根牡蠣各等分為末每二錢白湯調日三服○變成發熱不休者百合滑石散百合炙一兩滑石三兩為末每三錢白湯下○陶氏柴胡百合湯柴胡人參黄芩甘草知母百合生地陳皮姜三片棗一枚入醋炙鱉甲煎温服治瘥後昏沉發熱渴而錯語失神及百合勞復等症如渴加天花粉胸煩加山梔頭痛加羗活川芎嘔吐加姜汁製半夏胸中飽悶加枳梗食復加枳實黄連大便實加大黄虛煩加竹茹竹葉瘥後乾嘔錯語失神呻吟睡卧不安加黄連犀角咳喘加杏仁百合麻黄驚惕為血少加當歸茯神遠志虛汗加黄芪脾倦加白朮腹中雷鳴加煨生姜勞復時熱不除加葶藶烏梅生艾汁）不仁因汗過多○驟龍升麻湯獨宜○（升麻秦艽連翹芍藥防風薏苡仁枳殼各一錢木香五分姜五片水煎温服治傷寒肌肉頑麻不仁不痛不痒）壞症表以知母麻黄○而參胡芍藥清肌熱（知母麻黄湯知母三錢麻黄甘草芍藥黄芩各一錢桂枝五分水煎温服微汗即愈治汗吐下過針不解及小柴症罷而熱尚在者亦為壞症大率以表症多者宜用○參胡芍藥湯人參柴胡芍藥黄芩知母麥門冬各一錢生地一錢半枳殼八分甘草三分姜三片水煎温服治傷寒十四日外餘熱未除脉息未緩大便不快小便黄赤或渴或煩不能安睡不思飲食此邪氣未淨正氣未復當量其虛實以調之如胸滿腹脹便硬去參加厚朴倍枳殼小便頻數加茯苓澤瀉嘔加竹茹血弱加當歸虛煩加竹葉粳米二便自利胸腹不飽形羸脉弱去枳殼倍人參不睡加炒酸棗仁茯神宿糞未淨腹滿或疼便硬不通量加大黄）壞久則鱉甲犀角而參胡温膽止痰涎○（鱉甲散鱉甲犀角前胡生地黄芩各一錢枳殼八分烏梅二個水煎温服治壞症諸藥不効○温胆湯半夏枳實各一錢陳皮一錢茯苓五分半甘草四分竹茹一團姜七片棗一枚水煎熱服治傷寒瘥後一切虛煩不眠氣脉不和心胆虛怯及食復勞役病症如初如頭眩身搖加白朮咽痛加桔梗百般加減由人○參胡温胆湯陳皮半夏茯苓枳實人參各一錢竹茹香附麥門冬柴胡桔梗各八分甘草三分姜三片棗二枚水煎温服治心胆虛怯觸事易驚夢寐不安氣鬱生痰變生諸症或短氣悸乏或復自汗四肢浮腫飲食無味煩躁不安）婦人熱入血室桂紅海蛤堪調和○（桂枝紅花湯桂枝芍藥甘草各一錢半紅花一錢姜四片棗二枚水煎温服汗出而解治傷寒發熱惡寒四肢拘急口燥舌乾經脉凝滯不得往來○海蛤散海蛤粉滑石甘草各二兩芒硝一兩為末每二錢雞子清調下治傷寒血結胷痛不可近服此小腸利而膻中血自散矣）寒犯產家黄龍增損可通用○（黄龍湯柴胡黄芩人參各二錢甘草一錢水煎服治胎前產後及經水適來適斷傷風傷寒表症半表裏症及汗後瘥後勞復餘熱氣虛合四君子湯血虛合古芎歸湯表邪將欲傳裏幾至動胎者加阿膠倍參朮）產前表以前胡芎蘇○入裏柴殼罩胎兒○（前胡七物湯前胡黄芩山梔知母各一錢石膏大青各二錢竹茹一錢用葱白煎服治孕婦傷寒頭疼肚熱肢節煩疼○芎蘇散川芎陳皮芍藥白朮各八分蘇葉六分乾葛五分黄芩柴胡麥門冬各一錢甘草三分姜葱煎服治孕婦傷寒寒熱頭疼身痛項背強加減由人如傷風咳嗽寒熱痰喘不卧以參蘇飲去參加芩朮瓜姜杏仁最妙○柴胡枳殼湯柴胡一錢半枳殼黄芩山梔知母麥門冬乾葛各一錢大青生地石羔各二錢升麻八分甘草四分水煎温服治孕婦傷寒邪傳於裏口渴煩熱腹滿便閉譫語或發斑晝夜不安大便閉甚量加大黄○柴胡石羔湯柴胡二錢石羔四錢甘草一錢姜煎服治孕婦傷暑惡寒頭痛壯熱躁悶四肢煩疼背項拘急口乾舌燥如氣虛加人參○秦艽散秦艽柴胡石羔前胡赤茯苓甘草犀角升麻乾葛黄芩各等分竹茹減半姜煎入姜汁調服治孕婦時氣五六日不得汗口渴狂言嘔逆○蘆根湯蘆根二錢麥門冬一錢半人參乾葛知母各一錢竹茹一彈丸葱白煎服治孕婦熱病頭疼壯熱嘔吐食不下心煩○梔子大青湯梔子大青黄芩各一錢半升麻一錢杏仁八分葱白煎服治孕婦傷寒發斑變黑成尿血○蘇木湯蘇木赤芍陳皮黄芩黄連各一錢甘草四分水煎服取汗治孕婦傷寒或中時行疫癘漸漸作寒慄而悸○罩胎散嫩捲荷葉一兩焙蛤粉五錢為末每二錢蜜水調服治孕婦傷寒大熱悶亂燥渴或發痘疹恐傷胎臟）產後表以柴胡防歸近裏旋竹破瘀壅○（柴胡防歸湯柴胡人參各一錢當歸三錢川芎一錢半半夏陳皮防風各八分甘草五分姜棗煎服治產後發熱不因難產傷力及亡血過多惡露未盡無子蒸乳四症果係外感風寒表症脉實挾食積瘀血量體加減○旋覆花湯旋覆花赤芍前胡半夏茯苓麻黄杏仁各一錢五味子十四粒甘草五分姜煎服治產後傷風寒暑咳喘痰盛坐卧不安○竹葉防風湯淡竹葉廿四片防風人參桂枝桔梗前胡陳皮茯苓各一錢姜棗煎服治產後傷風發熱頭疼面赤氣喘○柴胡破瘀湯柴胡黄芩半夏甘草赤芍當歸生地各等分五靈脂桃仁各減半姜煎服治蓄血症及熱入血室如大便閉加大黄一片然非瘀血症不可輕用）汗下暫爾從權（孕婦傷寒雖冬月忌用麻桂硝黄表急芎蘇葱白錄散厚朴枳實消導萬不得已暫用汗下即宜古芩朮湯加阿膠人參安之百問云婦人大病藥有序產前安胎產後補然後用藥療傷寒病稍退時藥即去又云氣口緊盛下為宜人迎緊盛汗為宜左手關脉若浮緊當救血室和榮衛只宜發汗不宜下汗則液通病去矣但傷寒藥者不必盡劑與雜病不同）和補與男和共○（婦人傷寒傳經直中及諸類症雜病與男子相同但產前陰症只宜理中湯加芎歸暫用不可用烏附犯胎其餘和解之劑量病多服以平為期）抑論辛甘需棗氣分假之以發散○（桂枝姜附甘草之類能復陽氣凡傷寒發散藥多用棗煎者以其能和藥也惟中滿嘔吐者不宜）酸苦忌姜血分賴之以湧泄○（芍藥苦酒葶藶青黛苦參之類）

（能補陰血斂津益榮故不用姜）山梔無豉吐不宣。麻黃無葱汗不發。大黃非枳實不通。附子無姜不熱。竹瀝非姜汁何以行經。蜜導非皂角何以通結。利藥不嫌生。尤便於清肌。補湯須用熟。最宜於養血。主乎病者先煎。病在下者早嚥。（詳見二卷本草）呼。與其方多而効少。莫若方少而意深。疾各有因。通於彼者塞於此。（即如傷寒初症。其人素有食積痰火。及素虛素實。或酒後房室後。或惱怒後。名各不同。如此豈可執一試効之方。而均治彼此之疾乎。）藥不可執。宜於古者泥於今。（古人治病之方雖存。而其受病之因。豈能知其悉乎。況古今風氣不同。人情亦異。即如男女之慾。古人二三十歲而後動。今纔十四五而真元已漏矣。若謂無古今之異。則是三代之禮。至今可盡行矣。其不可改者。表裏虛實之法。寒熱溫涼之性耳。許氏謂讀仲景書。須守仲景法。得仲景心。不泥仲景方者是也。陶氏所立三十六方。以於傷寒加一疣贅。然古法已湮。亦正欠此一番活動。故備載之。）症自我識。方自我立。草木鳥獸資於學。（固有讀醫書而不知醫者。未有不讀醫書而知醫者也。）神明變化存乎心。（四大家之書既理會。又能通於儒而後可以神明變化。故曰不知易者不可以言醫。）

汗吐下滲和解溫補總方

陽症

大汗（寒氣入人肌膚。久則侵骨。頭痛如劈。身熱如火。浮熱甚者。俱宜午時前發汗。午後陰分不宜。故曰汗不太早。汗不厭早。緊急不拘晨夜。以衣被覆手裏足。向火服藥。緩緩得汗。令手足出遍為佳。如難汗。將查再服。或汗後不解。又可再汗。若急汗如水淋漓。則病邪不除。而真陽脫亡。丸散亦可發汗。不如湯藥為驗。）

麻黃湯（治太陽症。頭疼發熱。惡寒。脊強身痛。無汗。脉浮緊而喘。又治太陽八九日不解。以此發汗。必衄乃解。及不得汗發衄。又治太陽陽明合病。喘而胸滿。腹不滿。邪在表分。不可下者。又治陽明脉浮無汗而喘。凡脉但浮無餘症者。皆宜服。）

麻黃（三錢）桂枝（二錢）杏仁（十粒）甘草（六分。姜三片。葱二莖。水煎熱服取汗。凡發汗藥。一服中病即止。不必盡劑。如感寒深重。服湯不得汗。宜再服之。半日連進二三劑。而汗不出者死。方意以寒傷榮。則榮盛而衛虛。榮脉中寒邪盛。則血脉滯而頭項背腰強痛。是用桂杏之辛甘以散之。衛虛則惡寒無汗。氣逆而喘。宜麻黃甘草之甘。以大發之。充其衛分之陽。或疑無汗用桂枝者。蓋榮行脉

中。并衛氣而犯之。經曰。寒淫於內。治以甘熱。佐以苦辛。又曰辛甘發散為陽。凡寒淫者皆此例也。）

陶氏麻黃湯（即前方如升麻川芎白芷防風羌活藁本。姜葱豆豉煎熱服。治法同上。如本經寒熱頭痛無汗而喘。去升麻加葛根。本經寒熱身痛。去杏仁加蒼术芍藥。本經寒熱身痒面赤。不得小汗者。去杏仁升麻加柴胡芍藥。本經寒熱頭痛。胸中飽悶。加枳殼桔梗。凡陶氏方原無等分。以意酌量可也。◎活人大全云太陽症脉浮無汗。當以急汗麻黃湯主之。肝之表見症者加防風羌活。心之表見症者。加黃芩石羔。脾之表見症者。加防已白术。肺之表見症者。加桂枝生姜。腎之表見症者。加熟附子生姜。）

追魂湯（治卒厥暴死。及客忤鬼擊飛尸。奄忽氣絕口噤。麻黃三錢。杏仁廿五粒。甘草二錢。水煎漱口灌服。若更不下。分病人髮左右。提搦肩引之。藥下漸甦。一方有桂枝二錢。服後身和汗出則愈。若入臟唇青身冷即死。）

五拗湯（治感冒風邪寒冷。鼻塞聲重。語音不出。咳嗽多痰。胸滿短氣喘急。麻黃杏仁甘草各一錢。姜三片。水煎溫服。得汗為度。如胸緊加枳實。有痰加半夏。頭痛加石羔細茶。）

五拗湯（即前方加荊芥桔梗等分。治咽喉甚者。臨服入芒硝少許。一方去荊芥桔梗。川枳實半夏。）

麻黃附子細辛湯（麻黃細辛各二錢。熟附半枚。寒甚者一枚。姜五片。棗二枚。水煎溫服取汗。至足乃愈。如嘔吐去細辛。倍生姜。方意以傷寒無熱惡寒者陰經病。今少陰病始得之。當無熱而反發熱。但頭不痛為異者。乃邪在表也。脉雖沉。以始得邪氣未深。尤當溫劑發汗以散之。是用附子細辛之辛。以溫少陰之經。麻黃之甘。以散少陰之寒。經曰。寒淫於內。治以甘熱。佐以苦辛。以辛潤之是也。凡房慾後傷寒者多患此症。◎活人大全云少陰症脉沉欲寐。始得之發熱肢厥無汗。為表病裏和。當以此湯緩以汗之。隨各藏見症加藥同麻黃湯。治少陰外竄前症內見。二便閉澁。或瀉赤水。謂之有表復有裏。宜本方去麻黃。名附子細辛湯。隨各臟見症加藥。同麻黃湯。但更加大黃以微利之。）

麻黃附子甘草湯（治少陰病得之二三日。發熱脉沉細。邪猶在表。無吐利厥逆諸裏症。宜此湯微汗以緩散之。即前方去細辛加甘草二錢煎服。◎凡方以麻黃為主者。皆自麻黃湯而變之也。）

解肌（微汗也。風傷衛。衛強則榮弱。故以補榮。不可大汗傷血。須半空心時。密室加衣靜坐。宜熱服藥。得粘汗即止。）

桂枝湯（治太陽傷風。衛實榮虛。自汗頭痛。鼻鳴項強。乾嘔嗇惡寒。灑灑惡風。翕翕發熱。或熱多寒少。面色光而不慘。煩躁身痛。手足不冷。脉浮緩。寸大尺弱者宜之。無汗溺數。手足冷不惡寒者忌用。夏月

（誤服麻桂必發黃發斑狂悶而死）

桂枝（三錢）**白芍**（三錢）**甘草**（一錢薑三片棗二枚水煎熱服微汗方意以風傷衛則衛盛而榮虛衛脉外風邪盛則發熱自汗氣逆鼻鳴乾嘔宜桂姜之辛以散之榮虛宜惡寒而又惡風者因自汗腠理疎也宜芍藥之酸以斂之衛盛榮虛則爭為寒熱故用甘棗之甘以和之經曰風淫所勝平以辛涼佐以苦甘以辛散之以酸收之以甘緩之是也或問傷寒論云陽虛陰盛汗之則愈下之則死又云桂枝下咽陽盛則斃桂枝包麻黃而言然則桂枝亦發汗藥乎蓋表陽虛而後風邪得以乘之客於榮衛之中榮衛亦屬皮毛表分也非辛散之不得愈且桂枝雖能止汗亦能和血而令汗自出也對肉桂而言實為發汗對麻黃而言則為止汗要之麻桂皆表藥也一則大汗一則解肌但有汗不得用麻黃無汗不得用桂枝實仲景格言也）

陶氏桂枝湯（即前方加防風川芎羌活藁本姜棗煎臨熱入飴糖二匙溫服治法同前如汗多加白朮汗不止加黃芪喘加柴胡杏仁胸中飽悶加枳梗○活人大全云太陽表症外見復有裏症便閉溺澁腹痛或瀉赤水謂之有表復有裏桂枝湯主之隨各臟見症加藥同麻黃湯但更加大黃以微利之）

附六經傷風方（太陽桂枝湯少陽柴胡桂枝湯太陰桂枝加芍藥湯）

杏子湯（治足陽明傷風惡食口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒自汗嗜臥身重溺難潮熱而噦脉浮弦數桂枝芍藥甘草細辛乾姜大黃各六分杏仁半夏五味子各七分茯苓八分水煎溫服）

九味桂附湯（治足少陰傷風胸滿心煩咽痛自汗腰連脛骨酸痛嘔吐涎沫頭痛脉沉而弦桂枝芍藥甘草乾姜生附茯苓桃仁各五分水煎溫服如咽痛加桔梗二分半）

八物散（治足厥陰傷風惡風而倦自汗小腹急痛寒熱如瘧骨節煩疼脉尺寸俱微而遲桂枝當歸川芎柴胡防風各三分芍藥一錢半甘草茯苓各五分姜五片棗二枚水煎溫服方論見傷風條下）

葛根湯（治太陽陽明無汗惡風發熱惡寒頭痛項背腰強目痛鼻乾不眠肢體拘急骨節煩痛脇滿悶不問一切傷寒溫病時行寒疫等症兼治剛柔二痓）

葛根（三錢）**麻黃**（二錢）**芍藥**（一錢半）**桂枝**（一錢）**甘草**（八分姜三片棗二枚水煎溫服取汗本草云輕可去實故加麻葛二味之輕於桂枝湯中以去表實甚有意味麻黃治太陽葛根治陽明所謂治陽明而不可棄太陽是也）

葛根解肌湯（即葛根湯加黃芩二錢治同上兼治春疫發熱而渴不惡寒）

西村正衛圖書

陶氏解肌湯（即葛根解肌湯去麻桂加柴胡羌活白芷桔梗石羔升麻姜煎服治陽明病將傳少陽等症如無汗惡寒甚者去芩加麻黃夏秋換蘇葉）

升麻葛根湯（治四時傷寒時行瘟疫表症或已汗吐下表症未解熱深毒甚發為斑疹春溫尤妙兼治小兒瘡疹欲發未發及解傷酒發熱口瘡咽痛葛根一錢半升麻芍藥甘草各一錢水煎溫服以病去身清涼為度如表熱加柴胡內熱加黃芩有吐血衄血或斑血赤加生地牡丹皮熱甚加山梔黃連或加連翹天花粉尤妙大便硬加枳殼大黃以利之頭痛加川芎身痛加羌活胸膈痞悶加枳梗咳嗽加杏仁有痰加半夏發斑加玄參如老人去芍藥加柴胡茯苓人參）

柴胡升麻湯（治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體痛鼻塞咽乾痰盛咳嗽涕唾稠粘葛根芍藥柴胡前胡荊芥石羔各一錢桑白皮黃芩各六分升麻五分姜二片豆豉十粒水煎溫服○凡方以桂枝芍藥為主者皆自桂枝湯而變之也）

九味羌活湯（不問傷風傷寒寒熱頭項脊腰四肢強痛并四時感冒疫癘晚發等症雜病亦可通治此方不犯三陽經禁解利神方）

羌活（一錢半治太陽肢節痛為君大無不通小無不入如關節痛甚及無汗者倍之）**防風**（一錢半治少陽一身盡痛隨佐使而引之如有汗者倍防風減羌活）**蒼朮**（一錢二分雄壯上行大能除濕使和氣不傳太陰如有汗者換白朮）**川芎**（一錢三分治厥陰頭痛在腦）**白芷**（一錢二分治陽明頭痛在額）**細辛**（三分治少陰苦頭痛或連齒）**黃芩**（一錢二分治太陰肺熱在胸）**生地**（一錢二分治少陰心熱有熱者可用無熱者去之）**甘草**（五分能緩裏和中述各藥主治使用者詳之生姜三片大棗二枚葱白二莖水煎熱服取汗如無汗用熱粥以助之此方發春夏秋三時表症代桂枝麻黃青龍各半四方蓋三時暄熱傷寒則不敢用冬月麻黃而發表故代以羌活蒼朮傷風則不敢用冬月桂枝而實表故代以防風白朮芎芷辛發表以代杏仁地黃救血以代芍藥加黃芩以順天時也○加減法太陽症加羌活藁本陽明症加升麻葛根白芷少陽症加柴胡黃芩半夏太陰症加蒼朮厚朴枳實少陰症加桔梗知母黃柏厥陰症加川芎柴胡如夏月加石羔知母服此湯後不作汗加蘇葉惡風自汗加桂枝夏月去桂加芍藥汗後不解加大黃嘔逆加姜汁有痰去地黃加半夏肌熱加柴胡葛根喘而惡寒身熱加杏仁生地虛煩加知母麥門冬竹茹胸中飽悶加枳殼桔梗中風行經加附子便閉加大黃中風兼五痺等症各隨十二經內外上下寒熱溫涼四時六氣加減補瀉用之煉蜜為丸尤妙）

羌活冲和湯（治傷寒無汗脉浮緊羌活蒼朮各一錢半防風黃芩川芎白芷生地甘草各一錢細辛五分水煎熱服取汗如渴加知母石羔濕上司天倍蒼朮久雨亦加）

防風沖和湯（治傷風有汗脉浮緩防風白朮生地各一錢半羌活黄芩白芷甘草各一錢川芎五分水煎温服汗未止加黄芪芍藥仍未止用柴胡桂枝湯）

川芎湯（治犯房室感寒頭痛發熱惡寒無汗脉浮緊川芎白朮羌活各等分水煎熱服）

吐

（凡胸中痰實熱鬱或寒結胷中鬱而痛不能食欲使人按之而反有涎唾或下利寸口脉滑或宿食在上或客氣胸中脉結心下煩滿而不能食者並宜吐之一服中病即止不可過也凡吐時先以布緊腰腹於無風處空心或半空心時得天氣清朗爲妙如風痰急病及傷食者不拘以吐爲度如不吐含沙糖一塊下藥涎出不損人此皆自吐之法不用手探但藥但湯皆可吐）

（雖雜病但宜升提其氣便吐通用防風山梔川芎桔梗蘆人參蘆茶芽生姜韭汁之類加入二陳湯中吐之妙）

瓜蒂散（治寒邪不在表亦不在裏而在胸中半表之分故病如桂枝但頭不疼項不強寸脉微浮或大胸中痞鞕痰涎壅盛氣上衝咽不得息或懊憹煩躁不得眠不經汗下謂之實煩宜用如諸亡血及諸虛家不可用）

瓜蒂赤小豆（各等分爲末用豆豉煎湯調服或以鹽湯一二碗頓服服後宜臥片時欲吐且忍之良久用指探之隨吐得快乃止如不吐飲熱湯一碗以助藥力如服藥過多者飲水解之未吐次日又服之）

梔豉湯（治太陰病在胸膈脉大多痰及汗吐下後虛煩發躁不得眠甚則反覆顛倒心中懊憹及身熱不去心中結痛或按之軟者又治陽明症下後外有熱手足溫不結胸心中懊憹飢不能食但頭汗等症）

山梔（四枚）**豆豉**（六錢水煎服得吐即止經曰酸苦湧泄太陰其高者越之胸中痞鞕越以瓜豉之苦在上者湧之痰涎壅盛湧以赤豆之酸但瓜蒂性猛不如梔豉湯更妙梔豉之苦寒更入酸虀水少許以吐胸中之邪如表熱加柴胡痞滿加黄連傷食加山查神麴便閉加大黄但病人微溏者不可服裏虛而寒在下也經云先泄而後生他病者治其本急且調之後乃治其他治痰火於此而悟其神乎◎凡方以梔子爲主者皆自梔豉湯而變也）

下

（凡下積聚顛狂須五鼓或平旦空心服藥傷寒潮熱不納飲食者巳時以後尤好故曰下無大晚下無厭飽雜病皆同如不可通用蜜導法凡下藥用湯勝丸水淨萬物故也一服中病即止不必盡劑通三五次後以稀粥止之）

大承氣湯（治陽明病脉實身重汗出不惡寒譫語煩躁五六日不大便臍腹脹滿硬痛煩渴而喘手足心并腋下濈濈汗出少陰口燥咽乾晡熱自汗當消穀引飲令反不能食者內必有燥屎若能食者但便硬耳又脉滑而數者有宿食凡病大熱大實大滿者宜）

大黄厚朴芒硝枳實（各二錢半水一盞先煎枳朴減三分下大黄煎二三沸去查下芒硝煎一二沸温服得利即止未利再服其大黄須用酒煨若生用峻下則必爲邪熱於至高之分是以愈後多患頭目等疾◎活人大全云裏症脉沉宜急下者大承氣湯主之肝之裏見症者加柴胡黄芩心之裏見症者加黄連麥門冬脾之裏見症者加白芍生地肺之裏見症者加黄芩石羔腎之裏見症者加知母黄柏）

小承氣湯（治裏症已見三四臍腹脹滿而不甚堅硬或胸滿潮熱不惡寒狂言而喘視其病之小熱小實小滿者宜大黄五錢厚朴枳實各二錢煎服同前得利即止○活人大全云裏症脉浮宜緩下者小承氣湯主之肝之裏見症者加柴胡連翹心之裏見症者加赤茯木通脾之裏見症者加葛根炒山梔肺之裏見症者加連翹黄芩腎之裏見症者加滑石黄柏）

調胃承氣湯（治傷寒二三日不解蒸蒸熱而不滿腹如仰瓦腹中轉失氣必有燥屎及太陽邪熱入於陽明裏之裏故不惡寒反惡熱大便硬小便赤譫語而嘔日晡潮熱狂斑煩亂脉來洪實者宜大黄四錢芒硝一錢甘草一錢煎服同前如發狂走罵者陰不足也再加當歸經曰微者逆之順者從之是也◎方意承者順也本草云通可去滯瀉可去壅塞而不利閉而不通可以湯滌使正氣得以順暢是以承氣名之經曰燥淫所勝以苦下之熱淫所勝治以鹹寒又曰燥淫於內治以苦溫是以三承氣湯宜分三焦受病而用之若三焦傷者痞滿燥實堅俱全是以大承氣湯用大黄枳實之苦泄滿實以滌熱厚朴之苦溫消痞下氣芒硝之鹹寒潤燥軟堅上焦傷者有痞滿實而無燥堅是以小承氣湯用枳朴除痞滿大黄泄實熱不用芒硝因不甚燥恐傷下焦血分真陰謂不伐其根也中焦傷者無痞滿而有燥實堅是以調胃承氣湯用甘草和中芒硝潤燥大黄泄實不用枳朴恐傷上焦虛無之氣）

三一承氣湯（治傷寒雜病內外所傷一切風熱風痰濕熱燥熱入裏之深大小便閉或產難死胎不下小兒斑疹黑陷等症即大承氣湯加甘草五錢生姜三片又能治肝經玉莖中痛故曰肝苦急急食甘以緩之故加甘草以調其中河間得之於仲景也）

陶氏六一順氣湯（治傷寒熱邪傳裏大便結實口燥咽乾怕熱譫語揭衣狂妄揚手擲足斑黃陽厥潮熱自汗胸腹滿硬遶臍疼痛等症足以代大小調胃三一承氣大柴胡大陷胸等湯之神方也大黃枳實厚朴芒硝柴胡黃芩芍藥甘草煎法如前臨熟入鐵銹水三匙調服立效取鐵性沉重最能墜熱開結故也○凡大柴胡湯脾約丸生地芩連湯之類皆自承氣而變之也）

滲（傷寒表症忌滲惟熱近裏未可通利者宜）

猪苓湯（治陽明病上焦熱脉浮發熱中焦熱渴欲飲水下焦熱小便不利三焦俱熱宜使熱邪從小便出兼治少陰挾熱下利咳而嘔渴心煩不得眠先嘔後渴頭痛身痛胃躁及秋疫發黃等症惟汗多而渴者不可服）

猪苓茯苓阿膠滑石澤瀉（各一錢水煎去查臨熟入阿膠煎烊溫服方意以茯苓之甘以行小便澤瀉之鹹以瀉伏水滑石阿膠之滑以利水道）

五苓散（治太陽病初無熱但狂言煩躁不安精采與人不相當及汗後胃中乾燥不得眠尿赤微煩作渴惟三焦微煩邪猶在表惟渴則入裏熱為成實不能消水停蓄不散或傷寒下早心下痞滿不痛或太陽少陽同病及中暍霍亂煩躁中濕關節疼痛濕痺小便不利大便反快等症）

猪苓茯苓白朮澤瀉（各一錢半）**肉桂**（五分為末每二錢白湯調服生津液和表裏如無熱煩躁狂言者服後以指探吐方意以傷寒發熱而煩六七日不解脉浮者邪在表也或汗後亡津胃乾煩躁不眠不能食但渴欲飲水者邪在裏也然上焦虛躁或飲水不散而反吐出為水逆症或飲水雖多而小便不利者皆裏熱未實不能化水故耳是以用白朮茯苓猪苓之甘潤虛躁而利津液澤瀉之鹹以瀉伏水內桂之辛甘以和肌表經曰甘甚反淡甘緩而淡滲淡味滲泄為陽鹹味湧泄為陰辛甘發散為陽是也○〔加減法〕陽症去桂熱服冷汗出即愈陰症加附子溫熱病加甘草瘀熱發黃加茵陳頭目痛加川芎蔥白咳嗽加五味子熱吐加半夏熱瀉合小柴胡湯加黃連狂言亂語加辰砂小便閉加瞿麥滑石大便難加黃芩嗽後加桔梗水氣加葶藶發虛熱加參芪麥門冬以分陰陽腹痛加木香氣塊加三稜莪朮鼻衄加茅花尿血加山梔身痛加蒼朮煩躁去桂加人參心煩不眠加阿膠）

陶氏五苓散（即〔五苓散〕用桂枝加甘草滑石山梔燈心臨熟入鹽一字調服如中濕身目黃加茵陳水結胸加燈心木通○凡導赤入正散之類皆自此二方而變化之也）

和解（和其內熱解其外邪傷寒方之王道也）

小柴胡湯（又名〔三禁湯〕禁發汗利大小便者宜此本治少陽半表裏症頭痛項強耳前後腫或聾筋脉拘急身疼脇痛寒熱往來或嘔或渴或咳或悸胸脇痞滿煩悶硬痛或汗下前後不解及瘟疫兩感太陽陽明初症不敢汗吐與下過經不解熱入血室等症雜病蒸然肌膚羸瘦為用最多但其間有五症尤為的當傷寒五六日胸滿口煩喜嘔身熱心中咳逆不欲食或嘔或不嘔者一可服若口渴欲飲水者不可服寒熱往來而心悸者二可服脇下滿硬而痛耳聾胸痞小便不利或渴或不渴者三可服發潮熱者四可服瘥後發熱者五可服要知無熱症者不可服為藥性頗寒耳）

柴胡（三錢）**黃芩**（二錢）**人參**（一錢）**半夏**（一錢）**甘草**（四分薑三片棗二枚水煎去查澄清溫服則能入膽此方內有柴胡半夏能利能汗以解半表裏之邪然本氣分藥也而血病每用之者以柴芩專能調血故也況傷寒日稍久不解者熱必傷血故表惡寒發熱而裏未實者加桂以溫血表熱汗裏又燥渴糞硬者加大黃以清血胷中煩而不嘔去半夏人參加爪蔞仁渴者去半夏加人參爪蔞根腹痛去芩加芍藥脇下痞悶去棗加牡蠣枳實脇痛加青皮末經下而心中飽悶加枳梗心悸小便不利去芩加茯苓不渴外有微熱去參加桂咳嗽去參棗加五味子炮乾姜嘔加姜汁竹茹虛煩加竹葉粳米鼻衄加生地茅花痰盛或喘加桑白皮烏梅熱盛錯語不眠加山梔黃連黃柏少陽陽明合病口燥目疼加芍藥乾姜壞症加鱉甲過經不解晡熱已而微利加芒硝自汗惡熱譫語煩渴去半夏合〔白虎湯〕自汗惡風腹痛或寒多熱少脉弱去芩合〔桂枝湯〕血虛發夜熱合〔四物湯〕去芎加麥門冬舌乾口燥去半夏加天花粉或貝母齒燥無津液加石羔脉弦虛無力先因房勞夢遺感寒或病後血氣未固以致咳嗽吐痰晝輕夜重發熱不止合〔四物湯〕去芎加麥門冬知母黃柏脉弦虛無力或浮散發熱煩燥口渴不飲水此為虛熱去半夏黃芩合生脉散熱入血室小腹痛晝明夜昏妄見或寒熱不定似瘧合〔四物湯〕加牡丹皮男子熱入血室加生地婦人熱入血室加當歸紅花）

陶氏小柴胡湯（即〔小柴胡湯〕加陳皮芍藥川芎臨熟入生艾汁三匙調服治法加減亦同）

和解散（尋常感冒用此等分柴胡二錢黃芩人參半夏甘草各一錢姜三片棗二枚水煎服如嘔逆倍生姜加陳皮頭痛加羌活防風寒熱間作加桂枝中暑發熱頭痛加黃連春溫時行加生地升麻溫瘧加常山檳榔）

火邪湯（即〔小柴胡湯〕加黑豆一撮煎服治火邪諸症）

大柴胡湯（專治少陽病或因發汗利小便轉屬陽明此為少陽陽明蓋少陽變症陽明故以小柴變為大柴熱治裏症內熱目不了了睛不和口渴煩躁黃斑狂妄譫語大便堅閉小便赤澀繞臍刺痛）

脉洪數沉實身熱不惡寒反惡熱及老人素虛或過經不解熱未除或下後仍發潮熱或腹中餘垢欠淨胸中脹滿而潮者最穩若身體疼痛是表未解不可服之柴胡三錢黃芩芍藥枳殼各一錢半夏一錢半大黃三錢壯實者倍之怯弱者減之姜三片棗二枚水煎臨熟入大黃煎二三沸溫服取通快則止未利再服經曰熱淫於內以苦發之柴芩之苦以發傳經之熱裏不足者以甘緩之參草之甘以緩中和之氣邪半入裏則裏氣逆而嘔半夏之辛以散之邪半在表則榮衛爭為寒熱姜棗之辛甘以和之此小柴胡治半表裏症也經曰酸苦涌泄為陰是以大柴胡湯用枳芍之酸大黃之苦以泄上滿除中熱去參草之甘者恐補中也仍用柴芩半夏姜棗者邪未全入於裏也○加減法昏亂譫語加黃連山梔痞滿加枳梗厚朴舌胎黃赤口燥渴飲水加瓜蔞仁夏月熱病煩躁脉洪大加知母麥門冬石羔（發斑加生地牡丹皮玄參發黃加茵陳黃柏鼻衄加犀角大便不通加芒硝）

白虎湯（白虎西方之神應秋而歸於肺故夏近秋令中暑煩渴妙藥主治傷寒汗後脉洪大而渴中外俱熱未全入裏宜此和解或吐下後邪未除熱結在裏心胸煩渴甚欲飲水自汗不惡寒反惡熱大便不閉及三陽合病頭痛面垢譫語遺尿身重難以轉側一切時風瘟疫雜病胃熱咳嗽發斑及小兒瘡疱癮疹伏熱等症）

知母（二錢）**石羔**（五錢熱甚七錢）**甘草**（六錢）**粳米**（小半合水煎溫服方意以脉浮為在表兼滑為在裏表有熱裏有寒宜知母石羔之苦甘以解內外之邪熱熱則傷氣宜粳米甘草之甘緩以益氣經曰熱淫所勝佐以苦寒是也或問白虎性寒熱病裏處誤服多成結胸夏月陰虛體薄忌之百問云太陽病汗後脉洪大者宜此云裏寒者傷寒邪未入府言寒已入府言熱非寒冷之寒與承苐散客寒上焦例同如虛煩甚加麥門冬裏熱大渴煩躁表熱微惡寒脉浮並加人參尺寸俱長而疾自汗大出身表如水乃陽明傳少陰宜加桂枝虛煩譫語小便溺澁起臥不安加山梔）

陶氏白虎湯（即白虎湯加人參麥門冬五味子山梔姜棗竹葉煎服治法同上如心煩加竹茹大渴心煩背惡寒去山梔加天花粉○凡黃芩湯解毒湯麥門冬湯一切平和清解之劑皆自此三方而變化之也○抑論無汗煩躁而脉浮緊者可服青龍無汗喜渴而脉單浮者勿投白虎陽明自汗引飲則五苓散未可輕進太陽自汗溺數則桂枝湯不可妄與其故何哉蓋人身以氣液為主在外則為正汗以養皮毛而不燥在內則為津液以和胃口而不渴在下則為小便而不澁是以三者恒宜相固而不相傷也小便數則津下脫矣豈宜桂枝重發其汗陽明汗多津外泄矣豈宜五苓復內慘其小便白虎之名義甚可畏者性甚寒涼無汗脉浮表未全解猶宜柴胡解肌之藥豈可純以裏寒藥治之耶無汗而不煩躁者麻黃湯有汗而煩躁者桂枝湯惟無汗而煩躁者而後可青龍湯以加石羔性緩對麻黃而言故有是善名也噫用之當者朝大黃暮附子不為悖也用之不當小柴雖稍平和亦貽害也用藥者可不知古人立方之意乎）

陰症

溫補（溫其中補其虛主體虛裏寒及汗吐下後暴虛寒者用之中病即止）

理中湯（治太陽腹痛自利不渴脉沉無力手足或溫或冷及蛔厥霍亂等症）

人參白朮乾姜（各二錢）**甘草**（一錢半水煎溫服如作丸以前三味俱用五錢甘草三錢為末蜜丸彈子大每一丸白湯化下大便溢者用丸利者用湯方意以乾姜之辛溫胃散寒參朮甘草之甘緩脾氣調中經曰脾欲緩急食甘以緩之又曰寒淫於內平以辛熱是也如寒甚腹痛拘急四肢逆冷加附子臍下動氣欲作奔豚去朮加肉桂吐多去朮加生姜下多還用朮悸者加茯苓渴者倍白朮腹痛裏虛倍人參寒者倍乾姜胃虛則氣壅腹滿去朮加附子嘔吐不止減甘草加姜汁吐蛔去甘草加烏梅飽逆加丁香柿蒂噦逆加木香霍亂轉筋加石羔寒濕發黃加茵陳脾弱泄不止溺不利倍參朮合五苓散內虛腹痛合小建中湯）

陶氏理中湯（即前方加肉桂陳皮茯苓姜棗煎臨服入炒陳壁土一匙以助胃氣治法同上如厥陰消渴氣上衝心饑不欲食食即吐蛔腹痛便實加大黃蜜少許利之腹濡滿時減者去甘草嘔吐加半夏姜汁倦臥沉重利不止及利後身體痛加附子自利腹痛加木香磨姜汁）

治中湯（治太陰傷寒手足溫自利不渴咽乾腹滿痞悶時痛脉沉細及食積頭痛發熱惡寒身體不痛等症即理中湯加青皮陳皮等分水煎服）

小建中湯（治傷寒陽脉嗇陰脉弦法當腹中急痛有汗及少陰惡寒手足踡而溫凡傷寒初起及過經當汗吐下尺脉遲者宜先服此又治傷寒二三日心悸而煩及諸汗不止等症）

白芍（五錢）**肉桂**（三錢）**甘草**（二錢）**飴糖**（半盞姜五片棗四枚水煎去查入飴糖洋化溫服如便溏或嘔者去飴糖經曰建中者建脾也脾欲緩急食甘以緩之飴棗甘草之甘以緩中辛潤散也榮衛不足潤而散之桂枝生姜之辛以行榮衛酸收泄也正氣虛弱收而行之芍藥之酸以收正氣悸者氣虛也煩者血虛也以氣血內虛與中建中湯先建其裏）

玄武湯（見賦三白湯人參三白湯辛黃三白湯凡方中以三白為主者皆自此方而變化之也）

四逆湯（治直中陰症初病無頭疼無身熱無渴怕寒振慄踡臥沉重欲寐脉來沉遲無力或無及太陰腹痛自利不渴手足厥冷指甲唇青嘔吐涎沫或少陰下利清穀或咳或悸裏寒外熱脉微欲絕發）

（躁身反不惡寒面赤腹痛或乾嘔咽痛或嘔吐餛逆或利止脈不出者此爲陰甚於內格陽於外不相通也急宜此湯散陰通陽又傷寒表症誤下自利不止或表症未除而下利不止急宜此湯救裏凡三陰脈遲身痛並用陰毒要藥也）

乾姜（五錢）附子（生二錢半）甘草（一兩水煎溫服方意以甘草姜附相合辛甘大熱之劑散陰復陽經曰寒淫於內治以甘熱又曰寒淫所勝平以辛熱是也如利止脈不出加人參無脈加猪胆汁面赤加連鬚葱白腹痛加芍藥陰毒心硬肢冷加麝香皂莢少許）

陶氏四逆湯（即四逆湯加人參白朮茯苓陳皮半夏肉桂五味子姜煎臨熟入麝三釐調服中病手足溫和即止治法同上如嘔吐涎沫或小腹痛加鹽炒吳茱萸嘔吐不止加姜汁瀉不止加升麻黃芪咽痛加桔梗）

當歸四逆湯（治厥陰病氣弱手足厥逆小腹疼痛或嘔噦或囊縮血虛則脈細欲絕亦陰毒要藥也當歸芍藥各二錢肉桂一錢半細辛通草甘草各一錢姜五片棗二枚水煎溫服經曰脈者血之府也諸血皆屬於心通脈者必先補心益血苦先入心當歸之苦以助心血心苦緩急食甘以緩之通草甘草之甘以緩陰血如素有寒氣加吳茱萸倍生姜寒甚加附子脈不至加人參）

三味參萸湯（治厥陰病乾嘔吐涎頭痛甚極及少陰吐利手足逆冷煩躁欲死陽明食穀欲吐得湯反劇屬上焦寒等症尤妙吳茱萸三錢人參二錢生姜四錢棗二枚水煎溫服經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛吳茱萸生姜之辛以溫胃人參大棗之甘以煖脾如陰逆厥冷唇青面黑舌卷卵縮加附子細辛◎十全大補湯十四味建中湯一切峻補之劑皆自理中建中四逆等湯而變化之也）

炙甘草湯（治傷寒脈代結心動悸）

甘草（三錢）人參（二錢二分）生地 桂枝 麻仁 麥門冬（各三錢半）阿膠（二錢姜三片棗二枚酒七分水一盞三分煎至三分服方意以脈代結者血氣虛弱不能相續也心動悸者真氣虛也是用參草大棗之甘以補不足桂姜之辛以益正氣本草云補可去弱是也麻仁阿膠生地門冬之甘以潤經益血復脈通心經曰津耗散則爲枯五臟痿當榮衛涸溫劑所以潤之也○單甘草湯滋陰降火湯補陰丸生脈散補中益氣湯一切滋補之劑皆自此方而變化之也）

東垣李先生內傷纂要

內傷（饑飽勞役飲食積聚）

內外傷辨

人身以胃氣爲主凡言陽氣元氣穀氣榮氣清氣衛氣春升之氣皆胃氣之別名耳脾胃一傷中氣不足穀氣不能上行以滋養心肺乃下流而乘肝腎（痿厥氣逆之漸也）腎受脾濕閉塞其下致腎間陰火上衝心肺心肺者天之氣是無形之氣受病故飲食勞役失節爲內傷不足之症肝腎者地之氣是有形之質受病故風寒邪侵筋骨（風傷肝筋寒傷腎骨）爲外傷有餘之症（經曰天之邪氣感則害人五臟水穀寒熱感則害人六腑又曰犯賊風虛邪者陽受之飲食不節起居不時者陰受之陽受之則入六腑陰受之則入五臟兩說是反而實不反也蓋內外之傷臟腑皆嘗受之但隨其所從所發之處而爲病耳經曰東風入肝西風入肺南心北腎西南則舍于脾觀此則天之邪氣固傷五臟矣然虛邪中人從皮膚而入絡脈而經而輸伏衝之脈以致於腸胃又曰東北風傷人內舍於大腸西北舍於小腸東南舍於胃則天之邪氣又豈不傷六腑乎經曰飲食自倍腸胃乃傷則水穀寒熱固傷六腑矣又曰形寒飲食傷肺飲食勞倦傷脾亦未嘗不傷五臟也至於地濕亦未必專害脾肉筋脈而不能害臟腑邪氣水穀亦未必專害臟腑而不能害皮肉筋脈也但以邪氣無形臟主藏精氣故以類相從而多傷臟水穀有形腑主傳化物故因其所由而多傷腑濕氣浸潤其性緩慢故從下而上從淺而深而多傷於皮肉筋脈耳孰謂濕氣全無及於臟腑之理哉觀此則知傷寒溫暑內傷雜病陰陽虛實之理一而已矣仲景東垣丹溪河間又豈有優劣哉）有餘者瀉不足者補補瀉一差生死立判其所以疑而似者爲百病皆起於惡寒惡風發熱頭疼等症（雜病亦有六經所見之症外科亦然所以世俗混而無別）其最易辨者傷寒惡寒猛火不除內傷惡寒（元氣下流心肺無所稟受皮膚間無陽以護但見風寒便惡非常常有之無間斷也）稍就溫煖即止傷風惡風不耐一切風寒內傷惡風偏惡些小賊風（避居密室則不惡矣）外傷惡熱無有休歇日晡轉劇直待汗下方退內傷發熱亦似傷寒及中暍之症但煩躁時止時作或自袒裸亦便清涼（凡體弱食少過勞及常齋胃薄之人因勞役得疾皆與陽明中暍相似誤服白虎必死但中暍日晡熱甚或作譫語內傷日晡病減爲陽明氣旺故耳）外傷筋骨疼痛

不自支持使着床枕內傷倦怠有似傷寒及中濕之症但四肢不收無力嗜臥而已間有脾為熱乘則骨消筋緩亦非得病即顯是症內傷寒熱間作而不齊（或因口吸風寒之氣鬱其陰火使咽膈不通其吸入之氣欲入也為膈上衝脈之火所拒使陰氣不得入其胸中之氣為外風寒所遏而不得伸令人口開眼瞪極則聲發於內氣不能上升塞於咽中而氣欲絕又或因嘁因嘔因吐而燥熱發必有所因方有此症其表虛惡風寒之症復見矣表虛之弱為心火所乘燥發須臾而過其表虛無陽不任風寒復見矣是表虛無陽常常有之其燥熱則間而有此二者不齊燥作寒已寒作燥已非如外傷之寒熱齊作無有間斷也）外傷寒熱齊作而不間內傷頭痛時止時作外傷頭痛非發散直傳入裏方罷然豈特初症似太陽可辨哉內傷則元氣不足神思昏怠語言倦懶先重而後輕外傷則邪氣有餘神思猛壯語言強健先輕而後重內傷則手心熱而手背不熱外傷則手背熱而手心不熱內傷邪在血脉中有餘則不渴（間有渴者心火尅肺乃傷之重者也）外傷邪氣傳裏則大渴內傷症顯在口雖食亦不知味多唾涎沫鼻息不調或有清涕外傷症顯在鼻傷寒鼻塞傷風流涕雖不能食而亦知味內傷氣口脉大外傷人迎浮緊（外感風寒則人迎脉緩或緊而大於氣口一倍或兩三倍內傷飲食則氣口脉大於人迎一倍傷之重者過在少陰則兩倍太陰則三倍此內傷飲食之脉若勞役過甚心脉變見於氣口是心火刑肺其肝木挾心火之勢亦來薄肺故氣口脉急大而數時一代而澁也澁者肺之本脉代者元氣不相接脾胃不及之脉洪大而數者心脉刑肺也急者肝木挾心火而反尅肺金也若不甚勞役惟右關脉數而獨大於五脉數中顯緩時一代也如飲食不節寒暑失所則先右關胃脉損弱甚則隱而不見惟內顯脾脉之大數微緩時一代也宿食不消則獨右關脉沉而滑）若顯內症多者則是內傷重而外感輕宜以補養為先若顯外症多者則是外感重而內傷輕宜以發散為急此醫之大關鍵也奈何業者不學妄行凡病莫分內外專以發散為先實實虛虛可勝嘆哉

內傷辨（新纂）

內傷勞倦飲食之症固與風寒暑濕之病不同矣然勞倦傷與飲食傷又豈無可辨者哉以勞倦言之經云陰虛生內熱又云有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通胃氣熱薰胸中故內熱此內傷之原也然人身陰陽有以表裏言者有以上下之分言者有以升降呼吸之氣言者此所謂陰虛之陰（蓋勞過則氣化為火水穀之味因而少入是故陽愈盛陰愈衰也）蓋指身中之陰氣與水穀之味耳（夫勞倦飲食損傷氣分既有陰氣陽氣之分則思慮色慾損傷血分又豈無有陰血陽血之異乎以此見血陰氣陽者分陰分陽之義也氣血各自有陰陽者陰陽互為其根之理也大法陽氣虛者宜桂附兼參附峻補陰氣虛者參朮甘草緩而益之陰分血虛者生地玄參龜板知母黃柏補之陽分血虛者茯苓參歸遠志之類補之論至於此東垣丹溪之功大矣哉）或以下焦陰分為言或以腎水真陰為言皆非也夫有所勞倦者過動屬火也形氣衰少者壯火食氣也穀氣不盛者勞傷元氣則少食而氣衰也上焦不行者清陽不升也下脘不通者濁陰不降也夫胃受水穀惟陽升陰降而後變化出入以滋榮一身今胃不善納而氣衰少則清無升濁無降矣故曰上焦不行下脘不通然非謂絕不行不通也但比之平人則謂之不行不通耳上不行下不通則鬱矣鬱則少火皆成壯火而胃居上焦下脘兩者之間故胃氣熱熱則上炎故薰胸中而為內熱也（內傷始病熱中未傳寒中陰盛生寒中多因調治差誤或妄下之所致遇寒則四肢厥冷心胃絞痛冷汗自出乃胃之脾胃虛也宜辛熱溫藥理中下二焦）勞則氣耗氣短喘且汗出內外皆越故氣耗矣氣耗則火旺火旺則乘其脾土脾主四肢煩熱無力懶於言語動作喘之表熱或表虛惡寒心煩不眠（勞役初病少食小便赤黃大便或閉或結或虛坐只見些小白膿時有下氣或泄白或黃如糜苦心下痞塞或加胃脘當心而痛如刀割之狀有時上支兩脇痛必脇下相火上行使陽明經氣逆胸中甚則高喘但病每互出不併作與外感異耳）宜安心靜養（心之意即真主意慮不窒則脾榮矣）以甘寒瀉其熱火以酸味收其散氣以甘溫補其中經言勞者溫之損者益之是也（平人脉大為勞脉極虛亦為勞夫勞之為病其脉浮大手足煩熱春夏劇秋冬差脉

（大者熱邪也極虛者氣損也春夏劇者時助邪也秋冬差者時勝邪也以建中補中治之亦溫之之意也經曰溫能除大熱是也）雖然勞倦亦有二焉勞力純乎傷氣而無汗者補中益氣之旨也（夫脾胃虛者因飲食勞倦心火亢甚而乘其土位其次肺氣受邪須用黃芪最多人參甘草次之脾胃一虛肺氣先絕故用黃芪以益皮毛而閉腠理不令自汗上喘氣短損其元氣人參以補之心火乘脾炙甘草之甘溫以瀉火熱而補脾胃中元氣若脾胃急痛腹中急縮者宜多用之經曰急者緩之白朮苦甘溫除胃中熱利腰臍間血胃中清氣在下升麻柴胡以引之引黃芪甘草甘溫之氣味上升能補衛氣之散解而實其表也又緩帶脈之縮急二味苦平味之薄者陰中之陽引清氣上升也氣亂於胸中為清濁相干用陳皮以理之又能助陽氣之升以散滯氣助諸甘辛為用也脾胃氣虛不能升浮為陰傷其生發之氣榮血大虧營氣不榮陰火熾盛是血中伏火日漸煎熬氣血日減心主血血減則心無所養致使心亂而煩病名曰悗悗者心惑而煩悶不安也故加辛甘微溫之劑生陽氣陽旺則能生陰血更以當歸和之傷之重者一日連進二服得陰陽和而汗自出病可已矣然非發散之謂也）勞心兼傷乎血而有汗者黃芪建中之義也心力俱勞氣血俱傷者雙和散之所由名也（凡諸益氣湯保元湯之類皆自補中建中而推之也凡歸脾湯養心湯及節齋新立二方之類皆自雙和而推之也）又房勞傷腎症與勞倦相似均一（內傷發熱症也勞倦因陽氣之下陷宜補其氣以升提之房勞因陽火之上升宜滋其陰以降下之一升一降迥然不同矣詳發熱）七情動氣脈與飲食無二（蓋飲食七情俱能閉塞三焦薰蒸肺胃清道肺為氣主由是而失其宣化之常所以氣口獨緊且盛其症嘔泄痞滿腹痛亦太相似但傷食惡食七情雖作飽亦不惡食臨時消息問察）俱不可不細辨之茲述其畧尚當於各類融會而貫通之可也以飲食傷者言之經云因而大飲則氣逆因而飽食筋脈橫解則腸澼為痔蓋飲者無形之氣傷之則宜發汗利小便使上下分消其濕解酲湯五苓散之類是也（酒之氣味俱陽若以大熱大寒之藥下之是無形之氣受傷而反下有形陰血致損真水陽毒太旺愈增陰火衝上元氣消亡七神何依雖不即死而虛損之病成矣所以酒疸不許下下之久久成黑疸蓋以此也）食者有形之物傷之則宜損其穀其次莫若消導丁香爛飯丸枳朮丸之類主之稍重則攻化三稜消積丸木香見晛丸之類主之尤重者則或吐或下瓜蒂散備急丸類之主之此大法也條分縷析其間有大饑傷飽而無停滯者或飲食不調之後加之勞力或勞力過度之後繼以不調皆謂之不足而當補益者也有自己喜食或與人鬬食而停滯者此為有餘而當消導者也又有傷生冷硬物者有傷辛辣熱物者或熱物多而寒物少或寒物多而熱物少或先食熱物而後食冷物以致前食熱物亦不消化所傷之不同如此安可以執一乎況人之氣稟盛衰每每相反有物滯氣傷必補益消導兼下者有物暫滯而氣不甚傷宜消導獨行不須補益者有既停滯而復自化不須消導但當補益或亦不須補益者潔古東垣枳朮丸之類雖曰消導固有補益之意存乎其間（方以白朮甘苦溫甘溫補脾之元氣苦味除胃中之濕熱利腰臍間血故先補脾胃之弱過於枳實尅化之藥一倍枳實味苦寒泄心下之痞悶消化胃中所傷此藥下胃其所傷不能即去須待一兩時辰許則消化是先補其虛而後化其所傷則不峻利矣荷葉中空象震者動也人感之生足少陽甲膽者風也生化萬物之根蒂也內經云立端於始序則不愆人之飲食入胃營氣上行即少陽甲膽之氣也其手少陽三焦經之司胃氣穀氣元氣甲膽上升之氣一也荷葉空青而象風木食藥感此氣之化胃氣何由不上升乎更以燒飯和藥與白朮協力滋養令胃厚再不至內傷若傷熱用丁香巴豆熱藥傷冷用大黃牽牛寒藥不但遺留藥毒重瀉元氣又且飲食傷中焦而反瀉三焦清氣暗損人壽不得終其天年但人不自覺耳）其他如木香分氣丸導氣枳實丸大枳殼丸之類雖無補益然施之於物暫滯氣不甚傷者豈不可哉但不宜視為通行之藥耳且所滯之物非枳朮丸之力所能去者亦安可泥於消導而弗之變乎故備急丸瓜蒂散等之推逐者亦未嘗委之而弗用也故善用兵者攻亦當守守亦當不善者則宜攻而守宜守而攻其敗也非兵之罪用兵者之罪耳觀乎此則知消導補益推逐之理矣吁均一內傷也勞倦不足一而已矣飲食有餘不足之分焉誤用補益則甘溫助濕生痰變生嘔瀉脹滿危症誤用推逐重傷元氣脫下而死利害匪輕如此故妄綴之為內傷辨

脾胃虛實傳變論

經曰胃大腸小腸三焦膀胱五者天氣之所生也其氣象天故瀉而不藏九竅者五臟之所主然必得胃氣乃能通利胃氣一虛口目耳鼻俱為之病其身熱頭痛耳鳴目睭沉重為熱所傷元氣故也陽氣最惡煩勞順之則固惟脾胃和則穀氣上升為春夏令行而人壽脾胃不和則穀氣下流為收藏令行而人夭凡十一臟皆取決於膽膽氣升則餘臟從之膽氣不升則飧泄腸澼天食人以五氣地食人以五味味藏於胃以養五氣氣或乖錯形何以存故諸病從脾胃而生明矣姑以勝衰者言之胃中元氣盛則能食不傷過時不饑脾胃俱旺則能食而肥脾胃俱虛則不能食而瘦或少食而肥雖肥而四肢不舉蓋脾實而邪氣盛也又有善食而瘦者胃伏火邪於氣分則能食脾虛則肌肉削故面熱者胃病也胃病則脾無所稟受故亦從而病焉脾病則下流乘腎（土尅水）令人骨髓空虛之力足不能履地是陰氣重疊陰盛陽虛汗之則愈下之則死然非正發汗也用辛甘之藥滋胃當升當浮使生長之氣旺以助陽耳夫胃病其脈緩脾病其脈遲若火乘土位其脈洪緩更有身熱心中不快之症此陽氣衰弱當從升降浮沉補益法中用藥（詳後用藥法象蓋治病不達升降浮沉之理雖愈亦幸耳昔有病脾胃久衰視聽半失淫雨陰寒踰月不止泄利體重肢節痛大便泄下小便閉若用滲淡之劑病雖即已降之又降是益其陰而重竭其陽精神愈短故必用升陽藥以羌活獨活柴胡升麻各一錢防風甘草五分水煎稍熱服陽氣升騰而疾去矣又有脾胃虛損目疾時作身面目睛俱黃小便或黃或白大便不調食少氣短怠惰醫以瀉肝散下數行而前疾愈甚適當暑雨素有黃症所以增劇也因立清神益氣湯治之茯苓升麻各二分澤瀉蒼朮防風各三分生姜四分此數藥能走經除濕熱而不守故不瀉本臟肺與脾胃本中氣之虛弱青皮一分生甘草白芍白朮各二分人參五分此數藥能守本而不走經不走經者不滋經絡中之邪守者能補臟之元氣黃柏一分麥門冬人參各二分五味子三分此藥去時令浮熱濕熱水煎空心熱服而愈舉此二者以為症佐）如脈緩病怠惰嗜臥四肢不收或大便泄瀉此濕勝也從平胃散若脈弦氣弱自汗四肢發熱泄瀉

毛枯髮落從黃芪建中湯（苟脈緩而用建中脈弦而用平胃則誤矣）脈虛血弱摘四物湯一二味脈弱氣短摘四君子湯一二味或小便赤黃從五苓散去桂摘一二味俱以本症中加之如妨悶此非腹脹乃散而不收可加芍藥收之中焦用芍藥則脾中升陽使肝膽之邪不敢犯如腹中窄狹及縮急者去之及諸溢酸藥亦不可用腹痛者加甘草白芍稼穡作甘甘者己也曲直作酸酸者甲也甲己化土此仲景之妙也五苓散治渴而小便不利無惡寒者不可用桂不渴而小便自利妄見妄聞乃瘀血症用炒黃柏知母心臟熱而竅不利者導赤散或虛坐而大便不得者皆血虛也血虛則裏急或血氣虛弱而目睛痛者皆加當歸身調理脾胃於此五藥中加減無不應驗然終不能使人完復（內傷以脾胃虛敗為甚酒色次之凡虛損脾胃盛者易復脾胃弱者只可半愈故農樵終歲勞苦而不成傷能納能化脾胃盛耳）後或有因而再至者亦由督任衝三脈（陰火）為邪胃氣虛弱之所致也法須依症加減如執方療病非素問之旨也經云至而不至是為不及所勝妄行所生受病所不勝乘之也至而不至者謂從後來者為虛邪心與小腸乘脾胃也脈見浮大而弦病或四肢煩躁口苦舌乾咽乾蓋心主火小腸主熱火熱乘土濕熱相合故煩燥悶亂四肢脾胃之末也火乘之故發熱飲食勞役所傷以致脾胃虛弱乃血所生病主口中津液不行故口乾咽乾也（心之神乃真氣之別名令七神離形而脈中惟有火矣善治斯疾惟使心無凝滯人或逢喜事或天氣暄和或食滋味或服前見可愛事則慧然無病矣蓋胃中元氣得舒伸故也）忌用五苓散（亡津液）宜補其母於心與小腸中以補脾胃之根蒂甘溫（白朮）為主苦寒（黃連）為使酸味（芍藥）為之臣佐以其心苦緩急食酸以收之（此治心火不能生土是為不及）火旺則肺金受邪金虛則以酸補之次以甘溫甘寒（芩連知柏生地之類）之劑於脾胃中瀉心火之亢盛是治其本也（火盛乘脾亦為不及心火者陰火也起於下焦其緣系於心心不主）

（令相火代之相火下焦包絡之火元氣之賊也火與元氣不兩立一勝則一負如脉見洪大而煩渴氣喘是火大旺而氣大衰也陰火說自東垣乃發素問之未發者也）所勝妄行者言心火旺能令母實母者肝木也木旺則挾火而妄行故脾胃先受之或身體沉重走注脇痛蓋濕熱相搏風熱鬱不得伸附着於有形也或多怒者風熱下陷於地中也或目病内障肝主血開竅於目也或妄見妄聞起妄心夜夢亡人或寒熱往來或四肢滿閉或淋溲便難轉筋皆肝木火盛而為邪也或生痿或生痺或生厥或中風或生惡瘡或作腎痿或上熱下寒皆風熱不得升長而水火過於有形中也（宜柴胡為君防風赤芍甘草桂枝為臣猪苓澤瀉茯苓蒼朮知母黄柏滑石石羔羌活獨活川芎細辛蔓荆子為佐升麻為使經云惟有陽明厥陰不從標本從乎中中乃不定之辭非中外之中也蓋厥陰為十二經之領袖主生化陰陽足陽明為十二經之海主經營氣血諸經皆禀之言陽明厥陰與何經相併而為病酌中以用藥所以言此者發明脾胃之病不可一劑而推欲人知百病皆由脾胃而生也釐毫之差災病立生假如時在長夏於長夏之令中立方謂正當主氣衰而客氣旺之時也後之處方者當從此法如時令藥如長夏則補脾胃瀉陰火升陽湯是也大抵此法此藥欲令陽氣升浮耳大禁滲泄滋陰之味亦有從權而用黄柏知母為督任衝三脉盛也）所生受病者由土弱不能生金反受水火之邪而清肅之氣傷或胸滿少氣短氣氣上精神少而怠惰慘慘常不樂皆陽氣不足而陰有餘也或咳嗽寒熱者濕熱乘其内也（脾不尅化鬱而為痰變生嗽喘眩暈等症治宜人參為君白朮芍藥為佐橘皮青皮以破滯氣桑白皮甘草木香檳榔五味子為佐桂枝桔梗為引用）所不勝乘之者水乘木之妄行而反來侮土故腎入心為汗入肝為泣入脾為涎入肺為痰為嗽為涕為嚏為水出鼻自入則為弱多為惡寒也（治宜乾姜為君白朮附子肉桂為臣茯苓猪苓澤瀉為佐使）一說下元土盛尅水致督任衝三脉盛火旺煎熬令水沸騰而乘脾肺故痰唾出於口也下行為陰汗為外腎冷為足不任地為腰脊背膝腳下隱痛或水附木勢而上為眼澁為眵為冷淚此皆肺金之虛而寡於畏也夫脾胃不足皆為血病故九竅不通諸陽氣根於陰血陰受火邪則陰盛陰盛則土乘陽分而陽道不行無生發升騰之氣也夫陽氣走空竅者也陰氣附形質者也如陰氣附於土陽氣升於天則各安其分也今所立方中有辛甘溫藥者非獨用也復有甘苦大寒之劑亦非獨用也以火酒二製為之使引苦甘寒藥至頂而復入於腎肝之下此所謂升降浮沉之道自偶而奇奇而至偶者也（陽分奇陰分偶瀉陰火以諸風藥升發陽氣以滋肝胆之用是令陽氣生上出於陰分末用辛甘溫藥接其升藥使不發散於陽分而令走于九竅也◎升降浮沉說天以陽生陰長地以陽殺陰藏天氣旺於寅寅者引也立春少陽之氣始於泉下引陰升而在天草木甲坼立夏少陰火熾草木盛茂此謂天以陽生陰長經言歲半以前天氣主之在乎升浮也地氣旺於申立秋太陰之氣始得大伸自天而下降徹地則品物咸殞立冬少陰之氣伏於泉下水冰地坼此所謂地以陽殺陰藏經言歲半以後地氣主之在乎降沉也春溫夏暑秋涼冬冷正氣之序升已而降降已而升如環無端運化萬物故曰履端於始序則不愆人之呼吸升降象天地飲食入胃氣先歸脾肺上行春夏之令以滋養周身乃清氣為天者也升已而下輸膀胱行秋冬之令為傳化糟粕乃濁陰為地者也損傷脾胃真氣下溜或下泄而久不能升是有秋冬而無春夏百病皆起又有久升而不降者亦病焉於此求之則履端之義明矣）經云食入於胃散精於肝淫氣於筋食入於胃濁氣歸心淫精於脉脉氣流經經氣歸於肺肺朝百脉輸於皮毛毛脉合精行氣於腑且飲食入胃先行陽道而陽氣升浮也浮者陽氣散滿皮毛升者充塞頭頂則九竅自利也若飲食不節損其胃氣不能克化散於肝歸於心益於肺食入則昏冒欲臥得臥則食在一邊氣暫得舒是知升發之氣不行者此也經云飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺病人飲入胃遽覺至臍下便欲小便由精氣不輸於脾不歸於肺則心火上攻使口燥咽乾是陰氣太盛其理甚易知也況脾胃病則當臍有動氣按之牢若痛有是者乃脾胃虛無是則非也亦可作辨明矣

内傷饑飽勞倦總方

補益

補中益氣湯（治形神勞役飲食失節虛損身熱而煩脉大而虛頭痛或惡寒而渴自汗無力氣高而喘兼治婦人室女經候不調血脫益氣之大法也）

黃芪（一錢勞役甚者加五分）**人參**（久嗽肺有火者去之）**甘草**（各一錢三味除肌熱燥熱聖藥）**當歸**（和血）**白朮**（助脾）**陳皮**（導氣又能同諸甘藥益元氣獨用瀉脾）**柴胡**（引少陽清氣左升大除勞熱）**升麻**（引胃氣右升而復其本位同柴胡須用酒各炒三遍如咳嗽及有汗者用蜜炒斂而降之五件各五分虛甚升麻只用一分汗多者全去之參芪朮有用至一兩一服者甘草有用二三錢一服者水煎巳未午初時溫服傷之重者連進二服如得微汗即愈忌多言勞役靜養一二時辰久方進羹膳以助之常服去升麻加黃柏三分以滋腎水紅花三分入心養血多用破血）

加味黃芪湯（又名保元湯治陽虛背惡寒即前方去升柴陳歸加肉桂甚者加附子）

升陽順氣湯（治春月口淡無味夏月雖熱猶寒饑飽失當以致腹脇滿悶短氣喜怒不節以致憂思氣結恐懼氣下等症即補中益氣湯去白朮加黃柏草豆蔻神麯半夏）

黃芪人參湯（治夏天氣熱精神不足兩脚痿軟煩熱嘔噦自汗頭痛痰嗽心脇腹痛胸中閉塞小便頻數大便難而閉結皆熱傷肺之所致也宜常服之即補中益氣湯去柴胡加蒼朮神麯五味子黃柏）

清暑益氣湯（治長夏濕熱蒸人四肢困倦精神少懶於動作胸滿氣促支節痛或氣高而喘身熱而煩心下膨悶小便黃而數大便溏而頻或利或渴不思飲食自汗體重等症即補中益氣湯去柴胡用黃芪一錢止汗除熱人參五分當歸甘草各三分補中益氣蒼朮一錢白朮澤瀉各五分滲利除濕升麻一錢乾葛二分善解肌熱又以風勝濕也濕勝則食不消而作痞滿故炒神麯五分青皮二分陳皮五分以消食快氣腎惡燥故以黃柏三分借甘味瀉熱補水虛者滋其化源以五味子九粒麥門冬三分救暑傷肺金中暍忌汗下溫針）

升陽補胃湯（治長夏濕熱陽明少陽下血即補中益氣湯去陳皮加桂芍羌防乾葛獨活生地牡丹皮）

升陽益胃湯（治秋燥令行濕熱少退體重節痛口乾舌乾飲食無味大便不調小便頻數食不消兼見肺病洒淅惡寒慘慘不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也黃芪二錢人參甘草各一錢白朮三分陳皮四分柴胡三分加羌活獨活防風各五分以秋旺故用辛溫瀉之白茯澤瀉各三分渴者勿用半夏一錢黃連一分白芍五分姜棗煎服後如小便罷而病加劇去茯苓澤瀉何故秋旺反用參朮芍藥之類補之脾胃虛則肺俱受邪故因時而補易為力也若喜食不可飽食恐胃再傷忌不可淡食以損藥力宜安靜少役形體使胃與藥得轉運升發胃氣稍強少食果物以助之經云五穀為養五果為助者也）

神聖復氣湯（治氣乘冬足太陽寒氣足少陰腎水子能令母實手太陰肺實反來侮土火木受邪腰背胸膈閉塞疼痛善嚏口中涎目中泣鼻流濁涕不止或息肉不聞香臭欬嗽痰沫上熱如火下寒如水頭作陣痛目中流火視物䀮䀮耳鳴耳聾頭併口臭或惡風寒喜日陽夜臥不安常覺痰塞咽膈不通口失味兩脇縮急而痛牙齒動搖不能嚼物陰汗前陰冷行步欹側起居艱難掌中寒風痺麻木小便數而晝多夜頻欠氣短氣作渴少陰不足以息遺失無度婦人白帶陰戶中痛牽心而痛面如病色食少大便不調煩心霍亂逆氣裏急而腹皮色白後出餘氣復不能努或腸鳴膝下筋急肩髀大痛此皆寒水水復火土之讐也乾姜炮三分半夏六分柴胡一錢藁本八分防風人參郁李仁各五分升麻七分附子二分當歸六分羌活一錢甘草八分白葵花五朵去心水五鍾煎至二鍾入黃芪草豆蔻各一錢陳皮五分再煎至一鍾入黃連黃柏酒洗枳殼生地各三分已上四味先一日水浸又以細辛二分川芎蔓荊子各三分先一日用水半鍾分作二處浸此三味并黃柏等煎正藥作一鍾不去查入此浸藥再煎至一大鍾去查空心稍熱服又治咬頰咬舌咬唇舌強等症宜食肉汁不宜食肉不助經絡中火邪也大抵腎與膀胱經中有寒元氣不足者皆宜服之神効於月生月滿時隔三五日一服如急病不拘時分）

沉香溫胃丸（治中焦氣弱脾胃受寒飲食不美氣不調和臟腑積冷心腹疼痛大便滑泄腹中雷鳴霍亂吐瀉手足厥冷大便利無度又治下焦陽虛臍腹冷痛一切寒中及療傷寒陰濕形氣沉困自汗等症沉香甘草良姜當歸吳茰人參木香茯苓白朮芍藥各五錢附子巴戟乾姜茴香各一兩官桂七錢丁香二錢為末醋糊丸梧子大每五十丸空心熱米飲下忌一切生冷物）

調理

參朮調中湯（瀉熱補氣止嗽定喘和脾胃進飲食即補中益氣湯去當歸升柴用黃芪四分人參甘草各三分陳皮二分白朮加桑白皮各五分瀉肺定喘五味子廿粒收耗散之氣以止嗽地骨皮二分善解肌熱茯苓三分以降肺火麥門冬二分以降肺氣青皮一分散胸中滯氣）

調中益氣湯（治脉弦洪緩而沉按之中得一澁其症四肢滿悶肢節煩疼難以屈伸身體沉重煩心不安忽肥忽瘦四肢懶倦口失滋味大小便清利而數或上飲下便或大便澁滯不行一日二日一見夏月飧泄米穀不化或便後見血見白膿胸滿短氣咽膈不通安卧嗜睡無力不思飲食即補中益氣湯去朮歸用黃茋一錢人參甘草五分升麻柴胡橘皮各二分加蒼朮四分木香一分水煎熱服）

節齋補氣方（人遇勞倦辛苦用力過多即服一二服免生內傷發熱之病黃茋錢半人參白朮陳皮麥門冬各一錢茯神八分甘草七分五味子廿粒姜棗煎服勞倦甚加熟附子四五分）

節齋補血方（人遇勞心思慮傷損精神心虛氣短驚悸煩熱宜服人參一錢二分五味子十五粒當歸麥門冬白芍茯神酸棗仁生地各一錢山梔甘草陳皮各五分川芎四分空心姜棗煎服）

雙和散（治心力俱勞氣血俱傷或房室之後勞役或勞役之後犯房大病後虛勞氣乏等症黃茋川芎當歸熟地各一錢官桂甘草各七分半白芍二錢半姜棗煎服以此調治但陰虛火動者宜善加減）

（又黃茋當歸二味亦名補血湯善治內傷發熱人參養榮湯黃茋建中湯八物湯平胃散五苓散皆調理間用之劑也）

硃砂安神丸（治勞神過度以致心神煩亂怔忡兀兀欲吐氣亂而熱似懊憹狀或服升補藥後氣浮心亂以此鎮固之則愈方見六卷）

升散（外熱）

升陽散火湯（治男婦四肢發熱肌熱筋痺熱骨髓中熱如燎捫之烙手夫四肢屬脾脾者土也熱伏地中此病多因血虛而得或胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土火鬱則發之此藥乃胃膽脾肺膀胱經藥也升麻葛根獨活羌活白芍人參各五分防風二分半柴胡八分炙甘草三分生甘草二分水煎服）

升陽湯（治一日大便三四次溏而不多有時泄瀉腹中鳴小便黃柴胡益智仁當歸陳皮各三分升麻六分甘草二錢黃茋三錢紅花少許水煎熱服）

火鬱湯（治手足心發熱升麻葛根柴胡白芍各錢半防風甘草各一錢葱白煎服）

瀉陰火升陽湯（治肌熱煩熱面赤少食喘嗽痰盛右關脉緩弱或弦或浮數羌活甘草黃茋蒼朮各一錢升麻八分柴胡錢半人參黃芩各七分黃連酒炒石羔各五分深秋勿用水煎服按此發脾胃火邪之劑又心膽肝肺膀胱藥也瀉陰火升發陽氣榮養氣血者也）

分消（內濕）

升陽除濕湯（治脾胃虛弱不思飲食腹鳴腹痛泄瀉無度小便黃四肢困弱升麻柴胡防風神麯澤瀉茯苓各五分蒼朮一錢陳皮甘草麥芽各三分姜棗煎服如胃寒腸鳴加益智仁半夏非腸鳴不得用）

升陽除濕防風湯（治大便閉塞或裏急後重數至圊而不能便或有白膿或血慎勿利之利之則反鬱結而不通以此舉其陽則陰氣自降矣如脾濕下流肝腎而成泄痢者宜此補之升之舉之不可疎下若脉實腹脹閉塞不通從權以苦多甘少之藥泄之蒼朮四兩防風二錢白朮白茯白芍各一錢用水二鍾半先煎蒼朮至二鍾入諸藥再煎至一鍾空心熱服）

婦人

升陽燥濕湯（治白帶下陰戶痛控心急痛身黃皮緩身重如山陰中如水防風良薑乾姜郁李仁甘草各一錢柴胡一錢三分陳皮黃芩各五分白葵花七朵分作二貼水煎服）

升陽調經湯（治飲食勞倦暴崩不止或下水漿怠惰嗜臥四肢困倦及夏月帶下脫漏等症獨活五分蔓荊子七分當歸防風甘草升麻藁本各一錢柴胡羌活蒼朮黃茋各錢半空心水煎服以飲壓之）

升陽舉經湯（治經水不止如右尺按之空虛是氣血俱脫大寒之症雖輕手其脉數疾舉之弦緊或澁此是陽脫陰火亦亡或見熱症於口鼻眼或渴此皆陰燥陽欲先去也此方切補命門之下脫也肉桂盛夏勿用白芍紅花各五分細辛六分人參熟地川芎各一錢獨活黑附子甘草各錢半羌活藁本防風各二錢白朮當歸黃茋柴胡各三錢桃仁十枚分作四貼空心水煎服）

益胃升陽湯（治婦人經候不調或血脫或脉弱食少水泄日二三行即補中益氣湯加神麯錢半黃芩五分腹痛加芍藥此方氣血之藥血脫益氣之要法也）

升陽和中湯（治閉目則渾身麻木晝減夜甚覺而閉目則麻漸退乃陽衰陰旺非有風邪法當補肺瀉陰火與濕通行經脉調和陰陽此藥主之生甘草去腎熱閉黃柏白茯澤瀉俱除濕導火升麻行陽助經柴胡各一分半橘皮當歸白朮各二分白芍人參各三分佛耳草炙甘草各四分黃茋五分食遠水煎熱服）

小兒

保元湯（治慢驚風令脾土實而木不敢犯又為痘疹始終必用之藥也黃茋錢半人參一錢甘草五分水煎服加減見小兒）

外科

補中益氣湯（乃癰疽托裏排膿扶脾胃之聖藥也加減由人）

內傷耳鳴目黃頰頷腫頸肩臑肘臂外後廉痛面赤脉洪大者以羌活一錢防風藁本各七分甘草五分通其經血加黃芩黃連各三分消其腫人參五分黃芪七分益元氣而瀉火邪另作一服與之嗌痛頷腫脉洪大面赤加黃芩○內傷發斑者因胃氣虛甚是火遊行於外亦痰熱所致火則補而降之熱則微汗以散之切不可下恐生危症

右補中益氣一方六經見症詳傷寒百病相兼見雜病春夏秋冬無不可通男女內外無所不治升而浮之羌獨葛防不為發散降而沈之朮香檳榔猪澤知柏不為踈滲熱之乾姜肉桂甚則附子寒之芩連滑石甚則大黃學者於此而一悟焉則處方用藥非惟善於加減變化而無疑滯亂雜之弊亦且闗鍵可觀而有洞中隙竅之妙然後謂之依東垣用藥亦即謂之効仲景處方蓋能依東垣則仲景在其中矣能効仲景則東垣亦在其中矣二公方藥俱自湯液而來理意同而品殊多寡病不同耳且清暑益氣仲景法也朌與東垣相似尤為証驗以後雜病方中有言百般加減由人即此類是也其餘如頭痛加芎芷活套則不甚録即頭痛太陽川芎陽明白芷豈可槩加芎芷哉諸益氣皆自補中而變或以補中益氣為主而加散邪之藥或以辛涼解散之藥為君而以參朮等藥為臣皆因時令主客互為勝衰內外感傷各有輕重而加減出入之也其實通治飲食勞役或無力動作懶於言語或飯後反倦或當春日淡或遇夏惡寒或值秋熱令稍退肺病洒淅慘慘不樂或饑常如飽或便後見些膿血無非脾濕下流以致內熱變生諸病但初病熱中則可用之若未傳寒中則不可用也蓋甘酸適足以益其病耳加黃芪人參甘草芍藥五味子之類是也以此見諸升益之劑難用尤甚於桂枝麻黃湯也飲食湯（成積聚者消導推逐尤宜慎重）

內傷飲食積滯方（見雜症傷食積聚○補中益氣湯加減見雜症藥賦）

卷四終