

校正增圖醫學入門

埴葉山房石印

ヤ 9

1145

6



補註醫學入門外集卷之五

丹溪朱先生雜病纂要 詳格致餘論局方發揮丹溪心法纂要日用醫按及今附餘併

雜病提綱 外感 風 寒 暑 濕 燥 火 內傷 脾胃 氣 血 痰 鬱 積 熱 諸 虛 痼 冷

外感

風 頭眩 頭痛 面風 痺風 耳 鼻 口舌 牙齒 痛風 痺風 斑疹 遊風

中風卒倒分真似 為風為百病長善行數變為卒中昏倒為窺視喝僻為搖擗反張或為寒中或為熱中或

則接緩扶寒則拘攣扶濕則腫滿有真中者有兼中似中者陽病身熱陰病身涼烏附行經不可驟用

口眼喎斜語話難 大艾三五壯外反緩正氣反急牽引口眼喎僻或左或右急搦人中拔頂髮灸耳垂珠粟米

去內用正舌藥白附子姜蠶全蝎等分為末酒調服二錢○不語有數端有風中心脾者資壽解毒湯有

風中心經者小續命湯去桂附加葛蒲有痰塞心竅者導痰湯加葛蒲人參竹茹或苓連有舌本強硬語

言不正者用蝎稍二錢半從苓一兩薄荷二兩為末酒調服二錢或擦牙尤妙又有風 痰塞喉中聲噤

熱壅者有血虛氣虛者有腎虛及老人忽言不出者十全大補湯去桂加葛蒲遠志 痰塞喉中聲噤

同上卒倒歪斜不語名風癱身軟有汗者生汗不出者十全大補湯去桂加葛蒲遠志 痰塞喉中聲噤

偏枯言不變智不亂病 四肢癱 此名風痺智亂不能言者難治其症身軀無痛緩則四肢不舉急則一身

在膚凌之間溫取汗 四肢癱 皆仰或左癱右瘓或一臂不隨時後轉移一臂驅風化痰調氣養血為玉

換骨丹黑虎丹神仙飛步丹有脾實者膏梁之疾非肝腎虛痿 又有五痺類風狀見 四症 偏枯痺風全無

莫浪猜 中暑中寒中濕痰厥氣厥食厥熱厥虛暈等症皆卒倒不語但風必有歪斜搐搦之症為異雖內

者大省風湯加人參末藥等分煎服得汗即愈或四肢無恙口喝語 西北高真中宜分治東南地兼

溢者古防風湯入麝一厘調服或自醒能言能食惟身體不遂者地仙丹 西北高真中宜分治東南地兼



中似審實虛主火間王氣垣或王濕丹內傷兼中似中盡相須三子所主雖殊而實同也

也氣衰賊和容易襲傷元氣壯盛理緻密和不能入惟中年氣血始衰腰膝空疎加以七情勞傷飲食不

病也有醉後當風頭面多汗善渴者名曰漏風宜黃芪六一湯加參朮壯蠟乾葛有房勞中風下體多汗

日內風十全大補湯加附子防風如入風府曰腦風入係頭曰目風在膝理為洩風與漏風同但身盡汗

耳久則為陽風食後曰胃風又名夾食中風久則為下血有傷食變為暴厥亦類中風但停食則胸中滿

悶須探吐及理脾胃有酒濕病亦類中風當分清以瀉濕毒有內傷熱症似中風者有難病虛症似中風

者均不可火動氣中無涎汚感氣脈沉身涼無痰涎為異耳如思慮內脫憂愁肢廢悲哀筋攣過喜皮稿

以風治不可火動氣中無涎汚感氣脈沉身涼無痰涎為異耳如思慮內脫憂愁肢廢悲哀筋攣過喜皮稿

鬱昏倒筋骨不用久則癱瘓忌服風藥宜香正真中中腑着四肢脈手足拘攣或中身前身後身側可治

氣散合星香散虛者八味順氣散實者四七湯真中中腑着四肢脈手足拘攣或中身前身後身側可治

湯或排風湯風從汗散通因通用是也如脈浮不語者用中臟閉塞九數多昏危可治如入臟深者心絕

口閉肝絕眼閉脾絕手散肺絕痰如拽錐腎絕遺尿或大瀉下血吐者皆死宜三化湯深者心絕

制火煩熱愈甚候熱中血脈也則歪口眼或近於腑內亦有六經形症則從小續命湯加減微利

退汗止小便自利中血脈也則歪口眼或近於腑內亦有六經形症則從小續命湯加減微利

經亦要知內無便溺外無形症從中治分經加減或天麻丸於熱熱勝則風動宜養血以勝燥大秦羌湯

微利愈風湯加大黃中腑雖宜汗多則亡陽中臟雖宜下多則愈風湯如欲微汗愈風湯加麻黃欲

亡陰若臟腑兼見者或先汗而後利或表裏兼攻者防風通聖散口不能言肢不持手足不能運動乃

也左為死血經絡滯與少血主四物湯少加防風羌活花疫與氣虛身右居則痰火流注於左而為癱瘓氣虛

久則痰火鬱結難治痛者為實先以二陳省風之類治痰後以附子行經瘦人大動加黃柏氣虛者四君子湯

血虛者四物湯俱薑汁炒過加竹瀝羌活肥人濕痰少加附子行經瘦人大動加黃柏氣虛者四君子湯

治右痰痰或者二陳湯如薑汁竹瀝能食者換荆瀝此丹溪雜病通法也通治北開關化涎沫開關散

嗽自開痰甚者宜量虛實吐之虛者稀涎散微吐出冷涎實者用水蒂炒黃末五分或一字至五分擦牙

氣安神定志之藥吐清見傷寒但中風大吐涎出久則手足骨節皆枯不能轉動清利以藥壓下再歸骨

節可也小兒順氣活血風自祛真氣漸復痰飲漸消或尚有風邪未退羌活愈風湯調之實者川芎茶調

散虛者萬寶回春湯未可全以風治也抑論舊以西北風高真中宜分臟腑經絡調治東南地濕兼中似

中宜分氣血虛實痰火多少調治真中兼中南北互有且治臟腑者不可不分氣血之虛實乎治氣血者

又可不可分臟腑經絡之邪多少乎大抵外感重而內傷輕者先須分表裏祛風為主次用氣若覺廣頑

肌蠕動順氣散手足麻木肌肉蠕動如有虫行心抑憤亂宜烏藥預防之法亦堪推禦風丹五參散史國

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

冒風惡風多屬肺肺主皮毛通肺最易感冒新咳惡風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參蘇飲寒

醫學入門

卷五

寒

上海掃葉山房校印

胃湯夏秋暴寒折於裏者調中湯微下之凡帶漏道精疲瘧疾痲脚內傷補益加平溫內傷勞役感寒
氣腰膝冷虛勞陰痿諸痛皆寒所為也挾風眩暈不仁挾濕四肢腫痛內傷補益加平溫內傷勞役感寒
湯加姜附如內傷生冷感寒腹痛脈脫三建湯煉臍法
如內傷房室感寒厥冷四逆湯脈脫三建湯煉臍法

暑病

暑熱汗渴審實虛暑病身熱自汗口渴面垢而巳餘症皆後傳變或兼內傷必先問其人素虛胃弱陰陽
或大病後暑熱自汗口渴面垢而巳餘症皆後傳變或兼內傷必先問其人素虛胃弱陰陽

經絡最難拘靜居高堂大履得病似熱症屬心脾經者名中暑陰症動作田野道路得病似傷風症屬肺
自口鼻牙頰達手心主胞絡以火從大故古法暑選取冷水灌流勿入肝則眩中傷傷風伏深分

輕重中暑歸心脾昏卒倒傷暑肉分喘咳痰壅入腎則消渴非專心主而無傳入也中傷傷風伏深分
等症但暑病多無身痛間有痛者或為濕淫水濕相搏耳暑風暑厥又何如即暑暈症但以手足搐搦

傷寒熱厥義同首連香散暑風乃勞役內動五臟之火與外火交熾則金衰木旺生風香散如羌活
或六和湯合消風散香散暑風乃勞役內動五臟之火與外火交熾則金衰木旺生風香散如羌活

難治急扶陰涼處不可取濕冷地搦道熱生風者六和湯合香散若途卒倒湯藥不便恐氣脫
熱湯或童便送下外用布蘸熱湯熨氣海立醒後尤不可飲冷水以入尿於其中待求生或蒜嚼爛以

昏驚悸妄言用益元散量加砂末調服有汗加黃芪因酒引暑入腹尿血者去桂加黃連或神
暑毒疫火室塞胸中量體虛實吐之火鬱發之義也如痰喘氣急痞塞入藥不得者急煎六和湯調

二釐服○絞腸痧腹痛不可忍或連心連腹痛轉之地手足亦有冷者乃腸絞縮在腹須臾能死急用熱湯
調鹽一兩灌入即安或再用陳艾陳樟木陳壁祛暑和中利濕消其難症自除兼以消導汗多者忌利濕

土各等分水煎連進三四服刺血法見急救祛暑和中利濕消其難症自除兼以消導汗多者忌利濕
香茹散黃連解毒湯清肺生脈散白虎湯加參柴寒熱不定小柴胡湯寒鬱其暑煩反治避暑食涼外

○和散大小調中湯茹苓湯杞葉散胃苓湯桂苓甘露飲六和湯寒鬱其暑煩反治避暑食涼外
暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

暑氣內傷冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽

砂仁或大順龍或二氣丹冷水下丹丸皆治因暑傷冷內傷滋補免清癯者一以滋補為主慎用大熱大
非溫散治暑之謂也誤服發黃發斑者血悶亂而死
或為丸中賜暫加香茹扁豆陰虛者滋陰降火湯腎氣丸
三伏灸蒸尤可畏大熱傷氣養生家謂此時
至秋方凝甚預防不獨羨香如時常禦暑體實者香茹散益元散虛者忌用蓋皮虛者不必因暑勞後反
則化水而死預防不獨羨香如時常禦暑體實者香茹散益元散虛者忌用蓋皮虛者不必因暑勞後反
去升柴加黃柏芍藥五味子麥門冬有痰加半夏夏末夏初頭痛較食少體熱名注夏病宜補中益氣湯
也如氣衰精神不足煩渴懶食者生脈散誘行丸通用謝傳萬病無憂散

濕氣覺來分內外風寒暑濕傷人便覺濕氣薰襲人多不覺有自外入者長夏鬱熱山澤蒸氣冒雨行濕
內濕東南內外又分上下中濕在上宜微汗在中初入身沉重多困倦或肢節痛或一身盡痛甚則濕聚
人多外濕內外又分上下中濕在上宜微汗在中初入身沉重多困倦或肢節痛或一身盡痛甚則濕聚

上黃喘咳茯苓首如蒙首位高氣清濕蒸則如有着脾腫脹滿或臍下大便泄亦附湯三白着腎脚腰
小便濃生湯當歸枯痛湯腎着湯青娥丸治外微汗通經絡散汗防已黃芪湯或羌活湯濕湯無汗者五
丹治內滲便利為妙工尊應利水行氣為君而以參朮茯苓為佐或以二朮為君而以利水藥為佐濕
鬱肢脹或通身浮腫者皆自內而出四氣相兼兼感濕熱其除濕湯兼風合桂枝湯或古防風湯散毒散
也量虛實利之不敢利者退黃丸妙四氣相兼兼感濕熱其除濕湯兼風合桂枝湯或古防風湯散毒散
大抵百病兼風則必惡風有汗眩暈兼寒則必惡寒無汗或攣痛兼暑則必面垢煩渴兼濕則必腫滿沉
倦四氣互相兼併惟寒濕濕熱為病濕熱尤多以尿赤有渴為濕熱多黑瘦膏粱之人以便清不渴為寒
濕多肥白淡食之人昔有專用五積清熱燥濕兼補中火動肺金受傷則木旺侵脾令飲食不化鬱為痰
治寒濕防風通聖散治濕熱宜哉清熱燥濕兼補中火動肺金受傷則木旺侵脾令飲食不化鬱為痰
積甚則腹脹浮腫實者下之虛者補脾利濕消導兼通用燥脾并升散燥脾板木丸大安丸單蒼朮
以清熱清燥湯是也濕勝筋痿熱勝筋縮者尤效通內外燥脾并升散燥脾板木丸大安丸單蒼朮
或平胃散加桑白皮為主濕在上焦加羌活蒼朮微汗有熱加黃芩中焦濕加蒼朮滑石瘦人多熱加芩芍沉因加參朮
下焦濕加升麻防風升提熱加防己黃柏龍胆草肥人多濕加蒼朮滑石瘦人多熱加芩芍沉因加參朮

上海埠葉山房校印

又四製蒼柏 實者大便方可攻 元氣實而濕熱甚者導

燥消渴

燥有內外屬陽明 大便不利時值陽明燥令久晴不雨黃埃蔽空令人狂惑皮膚乾枯起內因七情火燥或

助火邪消 總求金被火相刑 六氣風熱火屬陽實燥屬陰但燥雖屬陰秋陰而反同風熱火化蓋火或則

滿不食或善饑而瘦或傷精變為水腫腹脹入肺則毛焦乾疥癩鬱咳入腎則津液竭而煩渴及骨蒸

秘結總皆肺金所主 敏勁渴秘雖風熱表裏俱宜潤衛榮 表病皮膚皴揭四物湯去川芎合生脈散如

大黃桃仁或為丸服大便偏秘者導滯通幽湯小便偏秘者導氣除燥湯陰虛火燥者曰虛燥單黃柏

補陰丸腎氣丸勞後氣虛燥者補中益氣湯通幽湯小便偏秘者導氣除燥湯陰虛火燥者曰虛燥單黃柏

則血溢而氣液為之凝滯潤則益旺而氣液為之流通由內神茂而後外色澤矣蒸積液固能生氣積氣

火因內外分虛實

火因內外分虛實 外因和鬱經絡積熱臟腑此為有餘之火內因飲食情慾氣虛似火此為有餘火性暴無

常主病多 火病死人甚暴變化無常一動便傷元氣偏勝移害他經內經病機十九條而屬火者五劉河

分消陰伏火故曰諸病尋痰火疫火生異症 實火渴閉熱無間 實火內外皆熱口渴無何

間虛火潮熱不渴瀉實補虛升且降 瀉實火因外感邪鬱在表者九味羌活湯半表裏小柴胡湯入裏大承氣湯

狂者黑奴丸 虛人氣虛火盛因勞傷胃無力身熱宜保元湯補中益氣湯加芍藥黃柏或四君子湯

水受傷主之 血虛火動因傷色慾命門脈脫為陽衰之病宜以辛熱溫養其火則熱自退附子理中湯

瀉四物湯加白馬膠骨膠降陰火以代苓連或人中黃亦好外用附子末津調塗足心亦有濕熱鬱者○飲

瀉陰火升陽湯 七情五志火起宜隨各經調之脾土四股熱如燎以升散之劑發之升陽散火湯火鬱湯

瀉心湯黃芩丸單苦參丸房勞火起於腎則骨蒸潮熱大補陰丸滋腎丸單黃柏丸心火輕則煩熱痛痒單

瀉者從其性而升之君火正治可以濕伏可以水滅可以直折相火反治不可以水濕折惟從其性而伏

之即如實火發狂宜三黃硝黃正治虛火發狂宜五仁惟火有二心為君火一身之主腎為相火遊行於身

酒炒過或兼溫散甘緩又有 君相民皆靜且和 五行惟火有二心為君火一身之主腎為相火遊行於身

天賦不可無者若五志之火則由於人是內傷火多外 感火少噫火不妄動動由於心靜之一字其心中之水乎

內傷

調理脾胃 傷食 積聚 痞塊 蟲瘕

調理脾胃濕熱 脾性濕主乎血陰也胃火化主乎氣陽也大濕則氣滯大乾則血燥濕熱調停則能食

食而瘦由是脾胃不和交相為病胃變為寒脾變為熱大藥以脈浮緩而遲或帶緊為 且按心口疼不疼

寒濕脈浮緩而實或細而數為燥熱又肥人多濕瘦人多熱更參以飲食厚薄可也 且按心口疼不疼

勞傷手按心口刺痛 食傷初寒久則熱 勞倦初熱久寒生 勞傷初起宜甘溫補中久變寒中宜辛

熱宜辛甘 熱病胸火痰 暈吐 痲 便閉濕病腫脹瀉難停 清補清熱與燥濕 傷元氣不足宜補益食

飲食俱傷補益清導兼行其中或兼清熱或兼燥濕痰○補劑補中益氣湯主之消導停食枳椏二陳湯

加山查麥芽枳朮丸停飲胃苓湯加半夏化痰丸○清熱小調中湯橘皮竹茹湯凝神散三黃枳朮丸保

和丸○燥濕二陳湯六君子
湯理中湯生胃丹單蒼朮膏
瀉黃散清胃散調胃承氣湯
九附子理中湯丸補真丸脈
自甚也
平胃散

氣氣刺痛

諸氣皆因火作孽
濁火○蠶蠶蒸津液成痰痰鬱成積初起宜四七湯七氣湯辛溫消散稍久宜二陳湯加芥連山柅或當歸
龍蒼丸木香檳榔丸辛涼以折之最忌辛香助火耗氣之劑雖木香亦好上升必佐以知母黃柏丹溪云
上井之氣自肝而出中挾相火也間傷生冷與寒熱
其熱為甚自覺其冷非真冷也
過飢胃脘痛者四君子湯加木香○挾寒則脘理密而氣斂於中五積散人參四逆湯挾風分心氣飲挾
風寒犯腦羌活附子湯挾寒濕五苓散五苓散能升降諸氣通利三焦非特分利而已凡此熱劑明知口傷
冷物身受寒氣而後取用亦變法也高陽生專謂冷生氣者泥矣○挾暑
熱則脘理開而汗泄於外黃連香茹散加藜根或清暑益氣湯加木香
心氣散不飲過則健忘歸脾湯思傷腎精怯不壯過則下焦脹滿三和散補中益氣湯驚傷膽神亂不定
過則怔忡失志妙香散十味溫膽湯此三者皆令元氣耗散多見不足之症又勞則喘息汗出亦令氣散
尤宜怒憂悲思慮逸靜滯結憂傷肝氣上逆過則嘔吐枳椇二陳湯結珠正氣天香湯熱者柴陳
補益怒憂悲思慮逸靜滯結憂傷肝氣上逆過則嘔吐枳椇二陳湯結珠正氣天香湯熱者柴陳
五膈寬中散悲傷心胞及肺系其氣急過則為狂者枳椇散升陽順氣湯分氣紫蘇飲噎膈者暫用
熱清氣湯溫膽湯木香化滯湯木香枳椇丸此四者皆令氣鬱結多見有餘之症又逸則氣滯亦令氣
結輕者行動即愈結為積聚散虛中
重者橘皮一物湯結為積聚散虛中
宜調中益氣湯人參養榮湯自汗喘急者養正丹谷云氣無補法不思氣虛不運抑着為病不補氣何由
行且如喘嗽氣鳴以枳椇蘇桂調其氣以星半細辛茹其痰而終不下降者氣之所藏無以收也必
經口結者行之散者益之是也走注眩暈吞酸噎膈素無積者濁氣入榮衛則攻刺肩背四肢有積者濁氣

痺泄瀉心腹絞痛流氣飲子主之或木香勻氣胸痞痺腫二便難
散梔美飲古芩連丸梔美丸清膈養沙丸選用
秘傳降氣湯燥者麻子仁丸熱者小承氣湯如壯盛人兼血兼痰宜審別
氣閉胸滿百藥不効者五香連翹湯小便閉者五苓散
復元通氣散○痰壅則氣逆順氣導痰治分痰積少與多降火清心尤妙訣
湯蘇子降氣湯其者稀涎散微吐之
起五味之偏無日不積此丹溪河間力主為火也雖然七情總發於一心七氣總歸於一氣氣陽也動則
為火故以降火化痰消積分治量其所稟厚薄而加減之大槩氣虛四君子湯氣實古烏附湯為主大多
合黃連解毒湯加知母枳椇多合二陳湯積多合平胃散痛加玄胡索青皮
我求寒加官桂吳萸便閉加木香檳榔男子血虛及婦人胎產氣疾合四物湯

血吐血

便血 嘔血 咳唾咯

諸血先須分各經逆則上行順下行
陽虛陰虛經妄行火載則上升挾濕則下行是以上溢清道從鼻而出為衄留滯濁道從胃脘而出為
咳唾參入腸間從下諸而出為血痢結於腸胃則成積而為血瘕分經言之嘔吐胃也咳唾肺也痰帶
血脾也咯血系腎也溺血小腸膀胱也下血大腸也牙宣胃或腎虛炎也又血從汗孔出者謂之肌
血從舌出者謂之舌衄心與肝也從委中穴出者謂之腦血腎與膀胱也大便逆汗孔出者謂之肌
有潮夜反重
則滑氣寒則凝故涼血必先清氣知血出某經即用其經清氣之藥氣涼則血自歸隊若有痰血凝滯又
當先去痰而後調氣則其血立止或元氣本虛又因生冷勞役損胃失血者却宜溫補斂而後降之切忌清
涼反致停痰胸
膈不斂量之
外感積痰宜涼
暑毒攻心嘔血者枳椇散去丁香活湯麻黃升麻湯○暑熱通下血色紅者胃風湯當歸和血散○時毒身
熱吐膿者陽毒升麻湯○積熱因飲酒炙燻蓄熱三焦者黃連解毒湯黃連枳殼二味湯龍腦內傷滋陰
蘇丸四生丸大金丸槐角丸○痰血因打撲損傷痰聚胸膈者犀角地黃湯桃仁承氣湯內傷滋陰
補火自平
治宜開痰行氣二陳湯加酒紅花升麻歸身黃連虛者加參朮及附子一片熱者加山柅壯丹

氣血 上海葉山房校印

皮苗草生地木香氣急者加瓜蒌仁桔梗勞心無汗者茯苓補心湯有汗者歸脾湯素鬱者清肝解鬱湯
 氣壅者蘇子降氣湯如失血後被七情四物湯加木香檀榔陰虛者去木槿加玄參黃柏枳殼○內傷飲
 食生冷滯胃清道氣濁血亂者理中湯加乾葛川芎治血虛者參湯或四君子湯加蒲黃人乳蘆節傷力
 者四君子湯加乾葛川芎○內傷勞傷氣虛火盛者單人參湯或四君子湯加蒲黃人乳蘆節傷力
 吐血者猪肝蘆白芨末食或花藥石散內傷氣散汗出者單人參湯或四君子湯加蒲黃人乳蘆節傷力
 燒灰倉之腫血十全大補湯○內傷思慮色慾血衰火燥者滋陰降火湯加味道散散節香散或男胎氣
 九 吁嗟男女血為疾人知百病生於氣而不知血為百病之胎也凡寒熱踈擊痺痛癢疹癩疥好忘好狂
 加涼血心加黃連小腸山梔仁木通肺加枯芩大腸實芩肝加條芩膽加黃連腎加黃柏脾加白芍胃加
 加大黃三焦地骨皮心胞絡壯丹皮清氣心與胞絡加麥門冬肺加枳殼肝加青皮脾加胡脾加白芍胃加
 石羔乾葛大腸三焦加連翹小腸赤茯苓膀胱滑石琥珀加血加紅花桃仁韭汁童便以行之血來暴者
 加薄荷玄參以散之血不止者加蒲黃京墨茅根久不止者加升麻引血歸經血止後加炒黑乾姜引血
 還元血虛加龜板保全脾胃可長生血病每以胃藥收功胃氣一復其血自止他如嘔吐後發熱及傷
 板血燥加人乳

痰喘

膈噎 嘈雜 惡心 嘔吐 狂逆 咽嗝 怔忡 健忘

痰分新久內外和色青乃津血所成隨氣升降氣血調和則流行不聚內外感傷則壅逆為患新而輕者形
 但痰症初起頭痛發熱類外感表症入則潮熱夜重者黃濁稠粘凝結略之難出漸成惡味酸腥腥腥苦
 注股節疼痛類風症但痰症胸滿食減肌色如故脈滑不勻不定為異耳

知痰病尤多生於脾多四肢倦怠或腹痛腫脹泄瀉名曰痰痰若因飲食積滯痰遂成窠囊痞塊又名食痰
 留於胃脘多嘔吐吞酸嘈雜上衝頭面烘熱名曰痰痰若因飲食積滯痰遂成窠囊痞塊又名食痰
 迷於心多怔忡顛狂夢寐奇怪名曰痰痰若因飲食積滯痰遂成窠囊痞塊又名食痰

右癱麻木膝跛奇症名曰風痰聚於腎多足膝酸軟腰背強痛肢節冷痺骨痛名曰寒痰又名虛痰凡
 身習習如蟲行或身中結核不紅不腫或頸項結核似瘰癧或走馬喉痺或胸腹間如有二氣交紐吐
 冷涎綠水黑汁或大小便膿或關格不通以至癆瘵疔毒婦人經閉小兒驚搐皆須先去痰痰後從調理
 他如關家胸骨撲傷刺痛不已散血之劑因功續以風青寒黑濕色白風痰外感賊邪或腎枯木動或內
 自己小便飲之須使吐痰其痛立止百病兼痰如此風青寒黑濕色白

龍虎丹風熱小省風湯搜風化痰丸回神丹竹瀝膏○寒痰因形寒飲冷色深青黑如灰善唾或喘輕者
 五積散藿香正氣散重者溫中化痰丸古半硫丸○濕痰或外感濕滯或停飲不散色白喘急者十絳湯
 心痛者單半夏丸或神市丸濕熱色黃者熱黃其則帶紅紫則帶血或紫清氣化痰丸煎服大金丸滾
 中和丸清膈蒼沙丸在裏者青礞石丸

痰火鬱稠粘氣如絮○痰因飲食不節過厚火蒸津液成痰稠濁二陳湯加芥連山梔或抑上丸潤下丸
 火清金潤肺緩以治之節齋化痰丸謝傳清金丸單貝母丸震天膏○氣痰七情鬱成咯之不食痞酒癖
 出賦之不下形如破絮或如梅核四七湯久者換蘇子加黃芩山梔海石三仙丸十金指迷丸

脇痛加食痰因飲食不化結成痞塊積半枳朮丸煎服痰癆急者瓜蒌實丸山查麥芽煎湯下陰虛者黃白
 中湯香附丸痰飲有五因只一汗吐下溫用莫差府從食脫自肺竅嗽出涎伏脾元自口角流出飲生胃
 養青黛丸

水及茶酒停蓄不散耳加外和生冷七情相傳成痰即酒痰久而濕勝者與傷寒水症大同脈多弦滑或
 伏脈下皮如灰黑○痰飲水停腸胃腹響輾轉有聲令人暴肥暴瘦懸飲水流在脇咳唾則痛懸懸思水
 溢飲水流四肢身體重痛支飲水停膈上飽逆倚息短氣留飲水停心下背冷如手掌大或短氣而渴四
 肢歷節疼痛脇痛引缺盆咳嗽轉甚伏飲水停膈滿嘔吐喘咳痰熱惡寒腰背痛淚出或身惕矚仲景治
 諸飲在皮裏膜外表分者大小青龍湯汗之在胸膈者瓜蒌散吐之在四肢經絡脇助者五苓散分利之
 在腸胃裏分者十棗湯下之此皆治標之霸道也從輕汗以參蘇飲吐之在四肢經絡脇助者五苓散分利之
 五飲湯下劑開結枳朮丸中間問以半夏湯古葶藶散枳朮丸

溫中化痰丸清氣化痰丸半夏溫肺湯隨虛實加減不必太泥 常法順氣與分導 古法順氣為先分導
 氣動者曰痰氣順氣化痰丸因火動者曰痰火清熱導痰湯因濕動者曰濕痰導痰湯主之通用二陳湯
 能使大便潤而小便長尤為分導要藥風加南星皂角白附子竹瀝寒倍半夏加姜附姜汁火加石羔青
 黛濕加蒼朮白朮燥加瓜蒌杏仁老鬱痰加海石芒硝瓜蒌食積如山查神曲麥芽停水加橘榔痰在脇
 下加白芥子以行之痰在四肢加竹瀝痰在經絡用此探吐痰在皮裏膜外加白芥子竹瀝姜汁氣實用
 刺墜下溫中潤肺家痰原於腎動於脾客於肺水升火降脾胃調和痰從何生○陽虛腎寒不能收攝和
 厥者蘇子降氣湯三生飲古疏永丹○脾虛不能運化者宜補中燥濕六君子湯加竹瀝姜汁帶傷脾
 失升降者補中益氣湯加半夏竹瀝姜汁○氣血虧乏痰客中焦閉塞清道者仍宜溫中燥脾二陳湯氣
 虛合四君子湯血虛合四物湯○陰虛腎火炎上肺燥者二陳湯合四物湯去川芎半夏加貝母冬
 瓜薤仁桔梗潤而降之或腎氣丸三一腎氣丸語云痰無補法且老痰凝滯膠固非暫用溫藥引導必有

拒格之患風寒疫氣內鬱不用溫散亦何以開結滯此皆難拘於無補也凡疫喘聲高脈散汗出如油身水冷者死

鬱與氣類參看寒鬱如心脾腹痛火鬱如腸痛

六鬱仍分疫火積

不得變化故法以順氣為先降火化痰消積分多少治與諸氣大同凡病當先尋六鬱與疫火有則急治於此無則依雜症治久則升散三焦通鬱本病久不解因服藥生病者俱宜升提如鬱在中焦以蒼朮川芎開提其氣以升之如食在氣上提其氣則食亦自消痰鬱火和在下二便下利者二陳湯加升麻柴胡川芎防風以升發之熱鬱升陽散火鬱火鬱湯主之當看發在何經加各經火藥氣痰滿胸血能食丹溪治病氣用四君子湯血用四物湯痰用二陳湯時以六鬱又五鬱治法見第七卷氣痰滿胸血能食湯料參之此雜病治法總要也氣鬱胸滿胸膈沉滯如木香檳榔烏藥蒼朮川芎倍香附砂仁痰鬱胸動則喘急起臥急憤寸脈沉滑加南星香食脹濕痛熱目蒙二陳湯為主食鬱噎酸惡食黃疸鼓脹痞塊氣口緊盛如山查神翻麥芽傷冷食鬱胃脘痛加草豆乾姜濕鬱週身關節走痛首如物蒙足重亦然遇陰寒便發脈沉濡加白朮倍蒼朮熱鬱目蒙口乾舌燥小便淋瀝脈沉數加黃連倍山柘連翹六鬱不言風寒者風寒鬱則脫營惡者眼食廢內生令人飲食無味神倦為熱故也但諸鬱挾風加防風苦參挾寒加吳茱萸香附紫蘇脫營惡者眼食廢內生令人飲食無味神倦肌瘦名曰脫營或因臥如感而裏坐亦喜向暗處婦人經有鬱結少男子小便澀滯皆憂思氣結治宜溫膽湯或二陳湯加參朮紅花疫火甚者以有志養陰神自充利之士有下化水穀滋沛身中陰氣自生如失名或藥吐之下後用越鞠丸調理有志養陰神自充利之士有下化水穀滋沛身中陰氣自生如失名上焦不行下脘不通而腎熱熱中則內熱宜養陰降火三白湯加陳皮蒼朮川芎山柘香附枳殼甘草煎熟入姜汁少許熱服以散其鬱加當歸黃柏沙參或玄參以養其陰瘦如其心夏加麥門冬冬加補骨脂蓋當歸隨參補血白芍隨二朮除鬱因食於物鬱過陽氣於脾土中多因血虛而得之故用炒黑山柘解五臟結蓋少陰血若不早治復忽酒色癆瘵之由也

積熱

積熱三焦審實虛口乾煩渴大便窒

實熱因口乾服金石煖夜臥熱炕或火烘衣被久則溫積熱毒在上焦則咽乾口燥而具舌糜唇瘡在中焦則胸滿乾嘔作渴在臟腑則

大小便閉法當清心解毒上熱涼膈散中熱調胃承氣湯下熱入正散三焦俱熱三黃湯大金丸○虛熱因消燥腎水相火炎上口渴煩燥精神短少心悸自汗懶於動作夜臥睡語法當降火滋水三補丸主潤之而已實分氣血清各經血氣分實熱洗心散甘露飲澤瀉湯○心熱單瀉心湯肝熱瀉青丸脾熱瀉黃散肺熱瀉白散腎熱滋腎丸小腸熱瀉赤散胃熱瀉胃湯大腸熱瀉白湯膀胱熱加味石莖湯然諸熱皆屬於心熱其則能傷陰宜珠砂安神丸以清鎮之虛炎升降與滋益氣分虛蓮子飲甚者龍腦蘇丸久者宜升陽以散之小柴胡湯合四君子湯升陽益胃湯補中益氣湯或疑補中益氣何以治熱孰不知熱因熱用溫能除熱之理蓋大熱在上大寒必伏於內溫能退寒以助地氣地氣者在人乃胃之生氣使真氣旺而邪熱自退○血分虛熱四物湯加芍藥山柘或為丸服久則滋陰以降之春茂枝羸湯或古歸芪湯滋陰降火湯蒸熱者加味逍遙散散九○氣血俱虛熱升陽滋陰兼用十全大補湯人參養榮湯俱加知母黃柏然虛風疫濕熱常相兼變症多端難執一治風熱或熱甚生風者治其熱而風自消凡頭目腫痛眩暈眼目昏赤耳聾鼻塞口燥舌乾牙宣牙腫斑疹之類皆風熱炎上之所為也初起上攻者川芎茶調散至寶丹四神丹上清丸久而下注血衰者腎氣丸如知母黃柏或當歸龍薈丸四生散心疫熱者因疫生熱或因濕生熱或因熱生熱凡因痛喉閉膈噎痞脹狂驚悸怔忡健忘之類皆疫火滯中之所為也地調中湯大調中湯○濕熱者因濕生熱或因熱生熱凡見瀉下痢水腫鼓脹黃疸遺精白濁痺痛腰痛脚氣之類濕熱中湯○濕熱者因濕生熱或因熱生熱凡見瀉下痢水腫鼓脹黃疸代之中焦黃連虛者白朮茯苓葛根代之下焦草龍胆防己黃柏虛者肥人蒼朮南星滑石瘦人牛膝檳榔桃仁紅花經曰治病必求其本此

諸虛

惡寒 自汗 盜汗 痿 癆瘵 求嗣 養老

諸虛專要辨陰陽血陰而氣陽也。有暴虛而無傷損者易復。有虛而虧損者亦可補益。惟久虛而傷壞者。有火多汗。又形肥而面浮。白者陽虛。形瘦而面蒼黑者陰虛。食少神昏。精不藏。腰背胸脇筋骨痛。潮汗。痰嗽是其常。此虛症也。但外因新損。容易復。於心則血脈虛少。不榮臟腑。婦人月水不通。三損於胃。則飲食不為肌膚。治宜辛甘。若淡過於胃。則不可治。矣。感熱久則損陰。自上而下。一損於腎。則骨痿不能起。於淋者。死。二損於肝。則筋緩不能自收。持三損於脾。則飲食不能消。尅治宜酸。苦。若鹹過於脾。則不可治。矣。

又不內外因驚而奪精汗出於心則損脈疾走恐懼汗出於肝則損筋體勞苦汗出於脾則損肉飲食飽其汗出於胃則損腸持重遠行汗出於腎則損骨治宜酸苦若辛散於心則不可治矣抑論心肺損而色憊汗多者為陽虛肝損而形瘦汗多者為陰虛經云損其肺者益其氣損其心者補其精是以古方肺損症見四君子湯心損症見四物湯其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精是以古方肺損症見四君子湯心損症見四物湯物湯心損症見四君子湯其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精是以古方肺損症見四君子湯心損症見四物湯者又甘草湯湯氣虛有汗朝熱者補中益氣湯氣虛無汗潮熱者人參湯湯氣虛有汗朝熱者補中益氣湯氣虛無汗潮熱者人參湯湯氣虛有汗朝熱者補中益氣湯氣虛無汗潮熱者人參湯病後食減盜汗者參苓白朮散加黃芪當歸 勞慾久虛成內傷 虛內傷五勞七傷六極七傷積虛成損損成傷經年不愈者謂之久虛而面無血色驚悸遺盜汗極則心痛咽腫汗勞盡力謀慮則筋骨拘攣極則頭目昏眩脾勞意外過思則脹滿少食極則吐瀉肉削四肢倦怠關節痛背痛強痛肺勞預事而憂則氣乏心腹冷胸背痛極則毛焦津枯咳嗽開熱腎勞持志節則腰骨痛道精白濁極則面垢脊痛此五勞應乎五極者也若原因肺虛以致臟虛臟腑俱虛視聽已衰行步不正名曰精極令人精濁莖弱核小故又曰六極極即傷也七傷者推原勞極之由久視傷血久臥傷氣久坐傷肉久立傷骨久行傷筋房勞思慮傷心腎則陰虛勞傷後飽傷胃則陽氣虛此傷症之至要也 陰虛四物湯二宜丸腎氣丸火動外潮者四物湯加知母黃柏或滋陰降火湯九加味道遠散補陰丸火燥甚者大補湯二宜丸腎氣丸火動外潮者四物湯加知母黃柏中寒身冷者鹿茸大補湯從從散補丸火燥甚者大補湯二宜丸腎氣丸火動外潮者四物湯加知母黃柏固真飲子或丸人參養榮湯或十全大補湯加從從散補丸火燥甚者大補湯二宜丸腎氣丸火動外潮者四物湯加知母黃柏及煎丸蒼朮膏白朮膏參苓造化糖丸和養肺虛單人參膏單調和心腎養脾胃 不論陰陽損傷皆因水暢水升則精神充滿或心腎俱虛或心脾俱虛或心肝俱虛或肺腎俱虛或五臟俱虛但有寒者死隱凡虛皆主兼補脾胃則飲食進而精神氣血自生 調和心腎虛中有熱者古菴心腎丸虛中有寒者究源心腎丸不受峻補者歸茸丸瑞蓮丸冷補丸兼補 扶熱與氣細酌量 虛者下虛也熱者上熱也又言虛實者正脾胃二神交濟丹還少丹天真丸返本丸 氣虛和氣實也心勞和熱則口舌生瘡舌赤舌燥脾熱赤赤陰瘡耳鳴溺閉三白湯主之心熱加黃連木通麥門冬生地肝熱則氣喘面腫口燥咽乾腎勞赤芍脾熱加山施石斛升麻肺熱加知母桑白皮秦艽葶藶熱加玄參赤茯苓前子生地更參積熱門虛炎治法 扶氣者交感丹古菴云心腎主血心惡熱而腎惡燥則清熱潤燥之藥是補心腎而瀉脾脾

也肺脾主氣肺惡寒而脾惡濕則溫寒燥濕之藥是補肺脾而瀉心腎也局方藥用辛香燥劑以能健脾胃進食其陰血消而心腎損以致虛極火炎面紅發喘痰多身熱如火鐵腫泄脈脈不食者死隱凡虛皆陰血陰氣虛也若真陽虛亦不可治從來養性延年藥只是中和功更長 溫藥峻補之謂也精不足者補之以氣溫存以養使氣自充非然之味非膏粱之謂也令人無病貪補而致病者有之有病會補而不依症用藥反增瘕火者有之非惟不足卻病延年亦非養性之道且少年慾火正熾尤宜戒補中年以後必資藥餌扶持者亦須量體虛從從治不可青効目前反致奇疾大藥腎虛者瓊玉膏還元秋石丸延年益壽不老丹耳日衰者還元丹四聖不老丹松柏膏腎虛無火者何首烏丸卻老烏鬚健陽丹腎虛有火者八仙丹壽丹羸瘦者大造丸紫河車丹血疾者女貞丹柏葉煎相脂丸秤金丹風疾胃火者松脂丸松梅丸風疾無火者仙人飯瘵丸瀉益者茯苓煎氣弱者單人參膏血燥者單天門冬膏地黃膏脾虛者白朮膏脾腎俱虛者加味蒼朮膏此皆養性延年之藥亦必因病選用

沉寒痼冷

沉痼大補 氣血 脾胃 人身真陽耗散脾胃虛弱加以食咳生冷嗜慾過度以致臟腑停寒不聚謂之沉寒若原只因生冷傷脾者四桂散附子理中湯補真丸專補脾胃可也又有陰虛內熱因傷冷藥及將息失宜變成寒中全以養脾為主只宜理中湯二神交濟丹去白芍或四物湯去芍藥合理中湯 男精女帶吐瀉 或暴下或久瀉或吐瀉俱發宜古半附湯附子理中湯沉香腦寒肢冷心腹痛 腦髓寒者四肢冷者古姜附湯古桂附湯氣虛冷汗出者古參附湯古芪附湯血虛冷者古茸附湯 剛劑慢投恐腎通身冷昏暈者三建湯順元散心腹絞痛甚者極附丸復陽丹扶外感者正氣補虛湯 剛劑慢投恐腎衰 金液丹黑錫丹養氣丹返陰丹盡皆金石慢劑陰臟性急者禁服 取陰取陽無過治 王水此語亦吾師以三建湯治心經之元陽虛者責其無火也大補陰丸治腎經之真陰虛者責其無水也蓋人之所藉以生者陰陽之氣耳不善調攝偏寒偏熱病未至甚治之不難若夫積熱始而涼和次而寒取寒取不愈則因熱而從之不愈則投窮矣由是辛熱比年而弗止殊不知以寒治熱而熱不衰者由於真水之不足也熱而從之從之不愈則投窮矣由是辛熱比年而弗止殊不知以寒治熱而熱不衰者由於真水之不足也熱而從之從之不愈則投窮矣由是辛熱比年而弗止殊不知以寒治熱而熱不愈者由於真水之不足也熱而從之從之不愈則投窮矣由是辛熱比年而弗止殊不知以寒治熱而熱不愈者由於真水之不足也

足以勝腎水之有餘也。火之原者陽氣之根水之主者陰氣之根。非謂火為心而涼為肝水為腎而主為肺也。此太僕達至理之妙也。又積熱用苦寒藥必姜汁酒製。沉寒用熱藥如附子必用童便蜜製。蓋寒因熱用熱因寒用恐相違逆故也。

右雜病提綱 雜病者或兼外感風寒暑濕燥火之氣或按內傷宿食氣血痰鬱虛實之情外感驟則為四中內傷久則為沉痾所以提之於前以見其為百病大綱其餘症皆由此變出醫能知此門戶又能知從頭至足問症之法第一辨其為內傷耶為外感耶外感手皆熱而口能知味內傷手心熱而口不知味外感傷風惡風面光有汗傷寒惡寒面慘無汗傷暑惡熱煩渴面垢傷濕惡濕重着面黃內傷勞役傷氣則惡勞而心口不痛飲食傷脾則惡食而心胃刺痛若夫色慾傷腎則愈好色而骨蒸口多嗜味陰虛火動故也七情思慮傷心與脾則益善思而恍惚不寐憂怒傷肺與肝則愈動氣而痞滿眩嘔口仍失味諸氣拂鬱故也一切血症日輕夜重一切痰症食少肌色如故一切火症性急潮熱一切水症脇硬心下怔忡至於辨症虛實俱以似傷寒陽症者為熱且積也似傷寒陰症者為虛且寒也又辨其內外有無相兼多實或不內不外而為本經自病男子必審房勞女人先問經孕與所處順逆及曾服某藥然後証之以脈萬無一失噫機括熟而門類顯者惟不脈而藥可以廣及然亦難乎其人之妙悟也病家一時緊急尋醫辨正且將此提綱理會亦不致差門戶以後分類有言外因風寒暑濕內因七情痰血疫火食積而不詳言其症者正以括之於此也以意會之醫門斯可入矣

雜病分類

風類

頭眩

頭眩欲倒瘦肥或云眩暈或云眩冒眩言其黑暈言其轉冒言其昏一也虛者內外之和乘虛又長而謂風勝則地動火得風則焰旋是也治宜以痰為主兼補氣降火瘦人多腎水虧少相火上炎而眩暈所而昏暗屋旋飛耳聾屋如旋轉甚則卒倒不省人事乃肝所主也招搖不定如立舟車之上起則欲倒昏而與之并為余上屬於腦後出於項中故邪中於項因達其身之虛弱老年陽隔越內傷勞役氣虛不能補中益氣湯色慾傷腎氣逆不能歸元四君子湯加天麻防風或十全大補湯腎氣丸加鹿茸○血虛因產後金瘡反吐衄亡血脈浮越古芍歸湯加妙乾姜瘀血滯胸加童便○老年每早起眩暈須臾自定藥金石助火香竈散氣多致飛越之亢豈能鎮其不歸之氣耶火痰暈其氣痛眉火動其痰眩甚者二法火盛壯實屬陽明者單大黃酒炒為末茶清下或古剉黃湯加防風等分屬太陽少陽者酒苳苳苳等分為末茶清下虛火半夏白朮天麻湯○七情膩氣不平涎迷心竅眩暈眉稜骨痛眼不可開者七氣湯玉液湯風則項強寒拘痛石羔散虛者山茱萸散或四物湯加秦羌羌活通單白芷丸又大風頭眩手補虛散風則項強寒拘痛石羔散虛者山茱萸散或四物湯加秦羌羌活通單白芷丸又大風頭眩手無汗四肢拘急筋掣頭掣痛五積散喜熱手按者附子理中湯三五七散暑煩渴今濕重垂暑脈虛煩如散或二陳湯加黃連山梔川芎○濕脈細頭重吐逆外邪和解毒清痰火內虛本固標自移凡肝脈溢大痛咳嗽病之標也經日治病必求其本○通用二陳湯七情加丁香砂仁白朮風痰加天麻白附子荆芥防風寒痰加乾姜良姜熱痰合解毒湯濕痰合芍辛湯停水心悸合五苓散酒食傷加乾生薑胸中宿痰眼溢手麻痺髮脫健忘春用本方探吐後宜服清上辛涼之藥調之氣虛倍參芪血虛倍芎歸痰感加竹瀝姜汁火盛加童便如眩暈氣上衝胸戰者只宜茯苓桂朮甘草湯加減○凡眩暈言亂汗多下利時時自冒者虛極不治

頭痛

厥頭痛將內外分。真頭痛引腦筋泥丸盡痛手足冷至節者死厥者逆也。外感寒熱表家論。外感頭痛必輕重表解。○風症芎藭香蘇散消風散風熱川芎石羔散風寒三五七散風寒入腦連齒痛者芎辛湯或羌活黑附湯去附柏加桂枝腦風項背怯寒腦戶極冷者用麻黃細辛全蠍薑香各五分為末煎芎煎酒或茶下。○寒症連髮葱白湯葛根湯古防風湯加酒蒼朮蒼耳子細辛為末茶清入姜汁少許調服熱者酒芎末湯濕熱心煩痛起耳中古防風湯加酒蒼朮蒼耳子細辛為末茶清入姜汁少許調服熱者酒芎末湯芎末湯濕熱心煩痛起耳中古防風湯加酒蒼朮蒼耳子細辛為末茶清入姜汁少許調服熱者酒芎末湯芎末湯濕熱心煩痛起耳中古防風湯加酒蒼朮蒼耳子細辛為末茶清入姜汁少許調服熱者酒芎末湯

頭風項強分偏正。素有痰者或掃沐取涼及醉飽仰臥賊風入腦入項入耳入鼻自頸項已上耳目口鼻聲或日痛或眉稜上下掣痛或鼻中聞香極臭或口呵欠而作眩冒之狀甚則項強硬身體拘急宜川芎茶調散或祛風通氣散主之。此正頭風也。○偏左痛者多血虛或有火或風熱偏右痛者多氣

頭風 附眉稜骨痛

情嘔 腎虛下虛上或顛頂痛不可忍脈象之則強按之則堅宜玉真丸。○七情氣厥心腹痰火食積皆同因痰厥頭眩眼黑言亂惡心眼閉眩冷宜半夏白朮天麻湯導痰湯如芎辛三生丸。○痰飲滯痛者神芎丸有伏痰者瓜蒂散吐之。○積聚痛者大黃備急丸。○凡頭痛數日不食百藥不効者二氣丹無熱者黑錫丹常服點頭散斷根。○尋常頭目不清似痛非痛參蘇飲主之以熱者徹清膏芎連煎湯調下沐浴後者單丸白芷

虛或鬱滯或痰或風濕要知止痛常兼濕兼熱陰煖定。○風濕腫痛連肩背或暈陰雨則甚者羌活勝濕湯兼左右病和凡頭痛久則為風也。○濕痰痛密多右邊。○風熱頭痛重火過熱則發消風散倍劑防熱甚二陳湯加荊防薄荷使閉更加大黃微。○風熱頭痛重火過熱則發消風散倍劑防熱甚利之熱微二陳湯加酒芎防風芎芷。○風熱頭痛重火過熱則發消風散倍劑防熱甚

病 血虛者朝輕夕重古芎歸湯或四物湯加荊防白芷薄荷。○若氣虛者朝重夕輕二陳湯加荊防薄荷使閉更加大黃微。○風熱頭痛重火過熱則發消風散倍劑防熱甚必欲細辛或消風百解散防風通聖散。○有三陽熱鬱頭痛不敢見光喜置冰於頂者宜辛涼汗吐下三石羔細辛或消風百解散防風通聖散。○有三陽熱鬱頭痛不敢見光喜置冰於頂者宜辛涼汗吐下三法併行乃愈。又有偏痛年久便燥日赤眩暈者乃肺乘肝氣鬱血壅而致。不妨外感相兼併。素患頭風因惡寒頭面多汗宜分偏正專治頭風而外感自能如頭風發方愈而後外感自汗者眉稜痛或羞明無加味烏荊丸因七情發多吐逆寒熱者參蘇飲主之無寒熱者二陳湯加烏藥川芎眉稜痛或羞明無

非痰與風熱甚 風痰眉心痛者二陳湯吞青州白丸子眉稜痛連目不可開畫靜夜劇身重者導痰湯星○風熱眉稜骨痛甚者古防風湯加酒黃芩風虛加川烏草烏細辛或全棗丹血虛挾風羞明眉稜痛甚者生熟地黃丸或四物湯加羌防氣虛挾風安神湯。○通用謝傳點眼丹搐鼻藥

面風

面腫虛食熱不食 面腫乃食後冒風所致能食者風虛面麻木牙關急搐升麻胃風湯不頰腮同此分虛者升麻黃連連翹仍以能食為風虛不食為風熱防風通聖散內傷氣促者升麻順氣湯

是胃家疾 凡風客皮膚瘰癧積膿腫則面黧黯脾肺風濕搏熱生瘡紅紫或腫者俱宜金沸草散倍黃芩或湯洗之如生五色瘡只用鹽湯綿浸搭瘡上日五六易如生粉刺搗皂絲子汁塗之

內服 瘰癧皮散○面皮裏痛者用何首烏為末姜汁調敷以常蓋定灸熱鞋底慰之

眼

眼病須先分表裏

外因風中腦戶濕清頭上熱過冷灌睛中或久處烟火或食後向火或醉後失枕血滯

八廓亦此理

行生起之理八廓不必深泥蓋設七十二証今纂註於內更不重復便見

五輪白肺烏珠

肝白屬肺氣之精曰氣輪氣症七情氣滯則血凝紅膜薄如傘紙日久變成白膜者難治

初起在睛為表當除風散熱久則入臟為裏當養血安神然內因初即入裏外因久亦帶表悟之

甚疼痛堅硬乃肝壅瘀血也宜加味刺黃湯又臉內生如雞冠肉或青或黑阻礙睛痛乃脾風熱也須

若先去熱則難去。膠淡熱而交流兩臉赤者屬肝熱之甚或衝風波出由熱甚而水化制之也又肺受風寒遇風冷則流淚尤甚者白蠟蠶散風淚不止食後吞當歸龍薈丸數粒。目昏者熱鬱也甚則平白日無所見故傷寒病熱極則目盲而不識人目微昏者至近則轉難辨物或如隔簾視或視如蠅翅或見黑花皆目之玄府閉塞而致榮衛精神不能升降故也若患風疹者必多眼暗攻其風則暗自去。抑論脾家受毒則眼赤腫神勞則眼赤痛心熱則血灌瞳人傷風則淚亦出。裏虛昏昧最羞明肝上虛屬虛煩則眼亦昏勞力則眼赤亦生瘡乃風熱侵肺黃乃酒傷於脾最宜活變。裏虛昏昧最羞明肝上虛屬頭暈目眩耳聾下虛屬腎虛必眼花睛痛耳鳴。昏花者傷內障黑花瞳散香。內障昏蒙外無翳膜因腦氣昏暗者傷血熱症亦有羞明怕日但內虛全不散近陽光。內障黑花瞳散香。脂下凝烏珠轉白或如金色或菜豆色或如雲烟或見五色治比外障更難如腦脂凝結腫人反背者不治。黑近視陰虛遠視陽花者腎虛也五色花為腎虛客熱青花胆虛紅花火盛。散香者瞳人散大視物昏冥。近視陰虛遠視陽能近視不能遠視者看一或二屬肝腎虛宜氣丸地芝丸。淚冷睛疼多縹紗有肝虛客熱迎風冷淚者或加降火之劑。能遠視不能近視者屬心虛宜定心丸。淚冷睛疼多縹紗有肝虛客熱迎風冷淚者無火者滋腎丸。外因風熱濕痰。外因風熱則胞白兩眼拘急牽引啞斜痺而青淚肝風毒菊散散選用。○無火者滋腎丸。外因風熱則胞白兩眼拘急牽引啞斜痺而青淚肝風毒菊散散選用。○

熱則珠突胞腫紅刺痛洗肝散洗心散選睛散通肝散瀉肝散散決明散散終羊角散蔓荆散加味刺黃散瀉青丸涼膽丸墜翳丸選用。○濕則食減身倦也氣冒明如雲霧掩日或忽然不見或畧見不明宜鹽朮散單蒼朮膏濕熱甚者神考丸。○暴寒則目瞶不明皆熱所為也人參散毒散散茨者升麻葛。內傷氣血精根湯歷考眼科無寒而有虛豈寒則目瞶不明皆熱所為也人參散毒散散茨者升麻葛。內傷氣血精神少。內傷七情氣壅騰腦胞腫而軟酸澀微赤木香流氣散。○因怒者當歸龍薈丸。○內傷飲食勞倦損陷胃氣火盛血脈沸騰益氣聰明湯磁砂丸還睛丸氣弱甚者單人參膏補中益氣湯如脾胃熱兼有宿食者秦光火黃赤未連砂糖調服之脾胃濕傷內外障者椒目丸鹽朮散傷熱濕胃氣汚濁血死目盲者蘇木煎湯調人參末連砂糖調服之脾胃濕傷內外障者椒目丸鹽朮散傷熱濕胃氣汚濁血死目盲氣虛者補腎丸腎精虛者益陰腎氣丸肝血虛者養肝丸生熟地黃丸肝腎虛者駐景丸。○抑論五臟六腑精華皆稟於脾注於目故理脾胃則氣上升而神清也。又肝之系雖總。風熱兼虛亦有之。熱久復為風於目而照徹光彩實腎精心神所主故補精氣安神者乃治眼之本也。風熱兼虛亦有之。熱久復為風中不赤而弦赤且爛若風熱赤并則內外浮赤而痒甚大藥表病肥人多風熱仿風黃芩瀉火為君黃連當歸養血為臣柴胡升麻白芷消腫止痛為使白睛紅者加白豆蔻少許瘦人血虛宜四物龍膽湯或加羌活蔓荆荆芥玄參山梔仁菊花為佐。○裏虛肥人多風虛者仿風一字散四生散補肝散還睛丸瘴人血虛挾風者通血丸明目地黃丸滋陰地黃丸。○通用羊肝丸久甚者退翳丸活命羊肝丸。

古人只消一火字了。眼不過虛實而已。白輪變赤火乘肺也。肉輪赤腫火乘脾也。黑珠五色花翳腎之火。陰藥中加知母黃柏以降火黑睛有翳者倍之。蓋散有餘之火在於破氣降不足之火在於養陰。陽衰以消陰翳養陽是也。今人不分陰陽專以龍黃柏或菊睛丸經曰壯水之源以鎮陽光滋陰是也。壯火之主腦辛香石藥搽點而不知辛散損明悲夫。外治點洗要手巧。凡暴赤腫血壅氣凝者一時連點三五次水洗之生有雲膜方可用點若無翳膜縱久但可洗之却忌過用涼藥冷水血開化為水至於針刀火烙古人忌用惟太陽經熱生偷針症可刺去血如爛翳用茵草根燒灰燈心草蘸點之須臾大痛以百節草刮去他如金針撥轉瞳人等法另是一家傳授。

耳

耳聾虛熱分新舊。新聾多熱少陽陽明火多故也。宜散風熱開痰鬱之劑。舊聾多虛腎常不足故也。宜滋補兼通竅之劑。脈症以腎為主。遲濡為虛浮動為火。浮大為風沉澹為氣。數實為熱。則氣閉漸聾眼中流火宜二陳湯加黃柏木通扁蓄瞿麥因酒者通聖散加南星枳壳大黃或淡痰丸。○風聲因風邪入耳必內作痒或兼頭痛風熱或因鬱者防風通聖散先將大黃酒煨又酒炒三透後入諸藥。○氣響因腦氣厥逆上壅入耳堵塞不通必兼眩暈實人因怒者當歸龍薈丸。○濕聲因雨水浸漬必內腫痛涼腦散加羌活防風俱用酒炒或五苓散加陳皮枳壳紫蘇生薑濕痰神芎丸。○熱聲因水浸漬必內腫痛。○虛人因思者妙香散憂滯者流氣散子加苜蓿上或下虛者秘傳降氣湯加苜蓿。○虛勞精氣脫難救。○久瀉或大病後風邪乘虛入耳與氣相搏嘈嘈而鳴或時時眼見黑花陰虛者四物湯加知柏苜蓿遠志或腎氣丸。○益氣湯加苜蓿子黃柏相陽虛者八味丸。○益腎散磁石湯。○勞聾昏暗睛瞳瘦痒之九。○因勞力脫氣者補中益氣湯加苜蓿子黃柏相陽虛者八味丸。○益腎散磁石湯。○勞聾昏暗睛瞳瘦痒之九。○因勞力脫氣者養生地知母或通聖散痰火鳴甚當歸龍薈丸。○挾濕神芎丸。○或青木香。○停膿痰皆風熱湊。○停耳原有山液風九腎虛微鳴滋腎丸。○氣虛四君子湯。○下血虛四物湯。○下陰虛虎潛丸。○停膿痰皆風熱湊。○停耳原有山液風。

耳

耳

聾者外用生豬脂地龍錫煤等分羌汁和丸棗核大綿裹入耳令潤挑去重者內服柴胡聰耳湯○膿耳
 風熱上壅流膿外用枯礬五分陳皮胭脂俱燒灰各二分磨五釐為末吹耳重者內服屏角散○耳疼
 如蟲走者風熱乾痛者風熱或虛火有血水者風濕外用蛇退燒存性為末吹入湯大要調氣與開
 或枯礬末亦可疼其用吳黃烏頭共六黃搗爛禽足掌心重者內服東垣鼠粘子湯
 水窠耳而能聞聲者水生於金也肺王氣一身之氣貫於耳故能聽聲凡治諸聾必先調氣開鬱間用
 石羊腎丸開竅蓋聾皆痰火鬱結非磁石鎮墜烏桂椒辛苦散流通則老疫鬱火何由而開然亦劫
 劑也愈後以通外治暴聾亦可透暴聾用甘遂為丸塞耳內服單甘草湯稍久用松香五錢溶化入巴豆
 聖散和之可也外治暴聾亦可透暴聾用甘遂為丸塞耳內服單甘草湯稍久用松香五錢溶化入巴豆
 用椒攪核燒灰油調搽加爛貝母末乾擦○百蟲入耳用清油灌入口吸氣久自出如蟻蚋入耳用信花
 雄黃各一錢為末先用一字點耳中次用貓屎灌之取貓屎以生薑擦牙自出又方用琴弦一段將絃頭
 畧軟一分蘸黏膠入耳粘出凡臥不宜厚被覆塞
 耳氣久則不通故養生者常摩耳廓以防聾也

鼻

鼻塞須知問久新 鼻塞於肺而能知香臭者心也人身水升火降榮衛調和則鼻司呼吸往來不息而已
 宜以風寒治之九味羌活湯參蘇飲消風百解散久則暑感風寒鼻塞等症便發乃肺伏火邪鬱其則
 喜熱惡寒故暑感冒而內火便發宜清金降火兼通氣之劑涼膈散加荊芥白芷或川連石菖散又有不
 必外感四時鼻塞乾燥不聞香臭宜清金降火消痰之藥清氣化痰丸上清丸古方鼻塞甚者禦寒湯澄
 加丸不知香臭者通氣湯內有硬物者單南星飲貼顯華餅餅外用石菖蒲皂角等分為末綿包塞鼻仰
 臥片時虛寒 久成甄血淵流津 鼻乃清氣出入之道清氣者胃中生發之氣也鼻塞久則氣壅不轉熱鬱
 辛白芷防風羌活桂枝等分羌黃入薄荷少許久不止者芷黃散去薄荷加荊芥黃芩神麩南星半夏等
 分食後煎服外用細辛膏○淵者鼻流濁涕熱盛金沸草散倍黃芩入鳳凰衣一枚燒存性調服肺風消
 連散如髮灰肺火流涕咳吐血枯梗湯人參平肺散○膽移熱於腦流涕濁臭防風通聖散加薄荷黃
 吹鼻中倘有血出如山柘亦不妨○蚘者鼻流血清血鼻淵久則必衄防風散主之詳後衄血傷酒鼻腫傷
 熱痛鼻腫準頭紅也其則紫黑因飲酒血熱入肺復被風寒鬱久則必衄防風散主之詳後衄血傷酒鼻腫傷
 熱俱宜四物二陳湯去半夏加紅花黃芩水煎入酒少許調五靈脂末服氣虛加黃芪常宜服單山

柘丸或黃連阿膠丸間用升麻和氣飲吞瀉青丸以除病根外用黃連末天芩藤燒灰桐油調敷或流粉
 散○鼻痛因風和入鼻並正氣相搏鼻道不通故痛蒼香正氣散祛風通氣散有痰火衝肺者鼻痛隱痛
 一陳湯加黃芩山 鼻瘡鼻痔執因 風散食後服忌煎炒熱物外用辛夷為末入腦麝少許綿裹塞
 柘棍梗麥門冬 鼻痔肺氣執極日久凝濁結成瘰癧肉如黍黍塞鼻其者又名鼻齕宜防風通聖散加三稜海藻末
 調服外用辛夷為君細辛杏仁少許為末和羊脂豬脂熬膏候冷入雄黃白礬輕粉麝香少許為丸綿裹
 塞鼻數日即脫甚者加磁砂少許或水磨散亦妙又食積熱痰生痔者單蒼 疎風降火真要法 風寒外感
 耳丸內服外敷最消食積或用白礬二錢細辛一錢白芷五分為末塞鼻 疎風降火真要法 風寒外感
 之風熱有自內鬱者或外感久則鬱而為熱或內因 久宜養血補腎真 凡鼻涕流膿久其不愈者非心
 飲食不節過燥肝熱生風亦鼻塞流涕宜降火清金 久宜養血補腎真 凡鼻涕流膿久其不愈者非心
 自降補腎則水升而金自清雖鼻痔久亦宜又鼻塞久不愈者必內傷
 肺胃清氣不能上升非外感也宜補中益氣湯以和之此皆治本之論

口舌唇

口病有熱亦有虛 心主舌脾主唇口然 心勞味厚病根 林心貴安靜七情煩擾過度則心火炎熾加之飲
 膏心勞味厚者氣出腥臭唾涕稠粘口乾舌燥瀉白散加桔梗 熱極偏勝口糜爛 熱其心火熾加之飲
 知母麥門冬黃芩五味子瘦熱淺者薄荷煎深者五福化毒丹 熱極偏勝口糜爛 熱其心火熾加之飲
 扁散黃連阿膠丸肝熱口酸而苦小柴胡湯加龍膽草青皮甘草甚者當歸龍薈丸謀慮不決膽虛口苦
 人參遠志茯苓甘草為君柴胡龍膽草為使甚者腎氣丸脾熱口甘或臭瀉黃散四順清涼飲甘露飲三
 黃丸肺熱口辛甘桔湯瀉白散腎熱口鹹滋腎丸然肝移於脾則口亦苦木乘脾則口亦酸胃熱或淡或
 甘腎化火則苦而甘要之熱勝則苦寒勝則鹹宿食則酸煩燥則溢虛則淡痘則甘勞傷傷肺則口臭○
 口糜勝熱移熱小腸瀉虛虛熱口瘡糜爛者柴胡地骨皮等分水煎服甚者加硝黃心胃壅熱水
 穀不化者導赤散合四苓散如熱盛併大便不通臍痛喘急口瘡潰爛者瀉白湯血熱者雞蘇丸中虛炎
 上亦難哺 口瘡久不愈服涼藥反甚者乃虛炎上攻中焦不足理中湯甚者加附子下虛者蘇秘
 傳降氣湯吞黑錫丹二十九陰虛者四物湯加知母或補陰丸年久不愈者黑參丸 外治仍
 分瘡赤白 口中瘡赤者心熱用枯礬末搽之或噙良久水嗽又噙○口中瘡白者肺熱用玄胡索一錢黃柏黃連各五分青黛陀僧各一
 錢為末頻搽之或單文蛤末亦好夏月西瓜水徐徐飲之○虛炎口瘡者甘草乾姜和勻細嚼噙之○上
 熱下寒者黃連乾姜等分噙且服之○口疳瘡用山柘去仁填白礬入柳葉火中燻為末吹入口中○

口吻生瘡自爛者檳榔燒灰入輕粉少許乾搽○小兒口瘡不食以猴或治之必死用白礬煎湯浸脚半日頭寬更以黃柏姜蠶為末敷之○口瘡瘡痛用巴豆半枚生研和米飯一豆大杵和貼印堂對眉間約半刻許覺紅就去不可
穢氣含香暫除 虛火鬱熱蘊於胸中乃作口臭因與前同外泡起小兒減半用之

舌病內外因可詳 心之本脈繫於舌根脾之絡繫於舌兩傍肝脈循陰器絡於舌本外因強短內腫長外感風寒傳經者則舌胎自白而黃而黑者死卒中者則舌強而短舌卷不言者死大舉風用小續命湯寒用理中湯熱用甘桔湯加防風枳殼黃芩風寒濕舌強者用白礬肉桂末等分安舌下或四卷一葉正舌藥○內因七情氣鬱腫滿不得息者金沸草散久不愈者黑參丸外因用古霜鹽散因怒者單絳粉塗之○舌腫滿口氣不得吐者名木舌用陳茶陳白梅入巴豆七枚同搗成膏湯荷水調服口中得下咽片時即下一二行以粥補任如生瘡連腫者立參升麻湯○舌腫滿口不能聲飲食不通者名重舌用蒲黃頻刷舌上自退如不能消即黃連煎時時呷之以瀉心火○舌腫如豬胞者以針刺舌上下兩傍大脈血出即消切勿刺中脈令血不止誤刺以火燒銅筋絡之血再不止者死或醋調錫煤敷舌上下兩傍大脈數須臾自消不食者亦死○舌腫舌下有蟲如蝮蟻以蠶頭小自尾可燒鐵烙烙舌頭上即消○舌長過寸者單腎虛火淡黑一二點宜以生薑蜜水洗

裂作瘡 心熱生瘡破裂單黃連煎湯服脾熱舌胎乾澀如雪薄肺痰脹或短甘露飲

唇屬脾家病幾般風潤 動寒收縮熱裂乾血虛無色氣瘡腫爾唇不食瘡應難 齒唇緊小不能開合飲食

皮燒反猪脂調搽仍將青皮灰末每一錢酒調服之○又方用亂髮蜂房六畜毛燒灰

牙齒 牙齒屬腎胃大腸止而不動喜寒飲而惡熱飲手陽明大腸絡脈入齒下縫動而不靜喜熱飲而惡寒飲

腎虛滋陰腸胃涼 多因飲食色慾過度以致濕熱上攻口湧酸水則牙床不清而為腫為痛或出血或生

熱也宜涼藥瀉火祛風清胃散 開口便知風與熱 吸風則痛甚獨活散消風散○風熱因外風與內熱

相搏齒腫痛加之膿汁具者犀角升麻湯或用石羔一兩火散酒洋防風荆芥細辛白芷各五分為末

隨時水煎一二服其功○風冷入於齒齦不腫不蛀日漸動搖者溫風散○熱牙因腸胃積熱開口臭穢

難近者敗毒散加荆芥升麻石羔或調胃承氣湯蜜丸服如腸胃素積濕熱偶被風寒冷飲鬱於齒間作

痛者當歸龍胆散○虛熱攻衝齦肉腫痛口舌生瘡宜柴胡地骨皮等分薄荷減半水煎熱漱冷吐或服

之亦好○歷年齒痛黑爛脫落心口吸涼稍止者乃膏粱濕熱之火也調胃

承氣湯加黃連下之或用升麻白芷防風荆芥薄荷甘草等分水煎服

客寒犯腦痛難當 寒氣犯腦

襲腦頂筋痛動搖肉脫 或因風熱上攻頭面搏血令齒間血瘀不消

者白芷湯羌活黑附湯 挾毒疫鑽擊血 疫熱毒氣攻注齒痛者外症咳嗽二陳湯加細辛枳殼姜棗烏

因風熱上攻頭面搏血令齒間血瘀不消 齒刺擊痛甘露飲加升麻或犀角地黃湯 齦有黑點被蟲傷 凡飲食不能潔齒臭腐之氣淹漬日久兼之

餘至如疔毒皆其種類必殺 牙宣之因只有二 物湯加升麻或牡丹皮知母黃柏陰虛氣鬱者四物湯加

虫而後痛止神功丸取牙虫 香附側柏葉牛膝外敷綠袍散或香鹽散常擦變骨蝕風出

血附側柏葉牛膝外敷綠袍散或香鹽散常擦變骨蝕風出 走馬疳參小兒方

本因濕熱標被風冷所鬱故內服辛涼以治其本外宜辛溫以治其標通用擦牙方謝傳

失笑散腎風胃熱方風虫牙疼方延平方劫痛方烏鬚固齒方消齒壅法取牙不犯手方擦牙先須擦牙

床 凡遇日月蝕未平時勿進飲食多患齒疾養生 家晨興叩齒永無齒疾已上五岳并咽喉謂之雜科

痛風

痛風歷節分怯勇 形怯瘦者多內因血虛有水形肥勇者多外因風濕主痰以其循

極火腫多風濕熱痰火雖內因六慾七情或病後亡津血熱已自沸騰亦必累感外邪而後發動骨節痛

痠久則手足蹠學風濕雖外因涉冷坐濕當風取涼亦必血熱而後凝滯汚濁所以作痛甚則身腫

痠痠火風濕全者 詳分上下血週身 傷寒週身節痛乃風寒侵入肌骨雜病週身痛者乃風痰壅滯二陳

古龍虎丹主之 烏頭湯微汗之虛者地仙丹詳中風門○上體痛者宜怯風熱散痰二陳湯主之痰熱客太陽頭項強動

則微痛者加酒芍羌活紅花濕痰鑽往肢節痛者加二朮威靈仙乾姜黃柏羌活白芍結陽肢腫者倍加

黃芩濕痰橫行手臂痛加南星蒼朮酒芍香附威靈仙骨重難舉者加二朮羌活桂枝威靈仙黃芩臂軟

附各五錢白芥子凌膏花各一錢半為末酒糊丸四物湯加甘草陳皮煎湯下背脊痛者用龜板一兩側柏葉香
湯合蘇子降氣湯○下體痛者宜流濕行氣四物湯主之陰虛腎冷痛者加桃仁牛膝陳皮甘草煎湯調劑
許有痰合二陳湯加澤瀉前胡木香為引痛甚加乳香沒藥熱者加大承氣湯下之兩腿痛者加牛膝陳
皮吞加味三妙丸兩腿痛者素虛性急或痢後血流經絡作痛者加桃仁牛膝陳皮甘草煎湯調劑
行散如兩腿間忽一二點痛入骨不可忍者用芫花根為末醋調敷痛處以怕緊丸產後有此疾者亦宜
兩足痛者當歸拈痛湯○凡痛風丸散佐使在上加羌活威靈仙在下加牛膝防己木通黃柏在手臂加
桂枝引至痛處如遍身風毒腫痛共一種痛風百節酸疼無定處久則變成風毒腫痛入骨髓不其處虎
痛者則問所起處如遍身風毒腫痛共一種痛風百節酸疼無定處久則變成風毒腫痛入骨髓不其處虎
赤芍湯濕痛如脫風汗黃散外因濕症腫滿身痛如脫者除濕湯寒濕者附子六物湯捉虎丸濕熱者五苓
主之濕痛如脫風汗黃散外因濕症腫滿身痛如脫者除濕湯寒濕者附子六物湯捉虎丸濕熱者五苓
星木香檳榔蒼朮黃柏防己○濕氣背僂腰足攣成廢者用甘遂一錢為末入猪膏內煨食之上吐下瀉
○風症黃汗出面微紅掣痛熱者防風通聖散或小續命湯去附子加羌活黃芩蒼朮鹿角膠散獨活
寄生湯上體金棗湯下體換腿丸○風中肩背太陽氣鬱不可回顧或肺氣鬱熱小便數而欠伸宜通氣
防風湯羌活勝濕湯○風濕相搏痛者甜瓜子九龍飛步丹龍虎丹活絡丹乳香黑虎丹活血應痛丸
○風濕毒生瘡者單蒼耳加羌活防風十分之二為末蜜丸空心茶酒飲下○風寒濕熱成痺腎散加當歸
物湯料各五錢防風羌活各三錢川烏一錢半為末蜜丸空心茶酒飲下○風寒濕熱成痺腎散加當歸
熱腫痛行步艱難者二妙蒼柏丸暑熱煩疼寒掣骨痛赤芍或復元通聖散○結陽肢腫熱毒流注大便
閉者犀角湯○寒症肢節掣痛小筋急痺者五積散合順元散七情刺痛食停痰○內因七情肢節胸脇刺
加麝一釐鶴膝痛者五積散加松香杉節骨痛者虎骨散○痛初必眩暈自汗二陳
陳湯加香附枳殼木香如腰背氣動發痛者枳殼散流氣飲子俱加葱白煎服後少時如思慮心痛從
背起至胸脇者用人參四分木通二分煎湯吞當歸龍薈丸○飲食積痛風初起必胃滿嘔吐二陳湯加高
藥枳殼或單蒼耳丸因食厚味積痰脾胃解樞左右發痛一點延及膝肘腫大惡寒夜劇者潛行散為主
加甘草稍蒼朮犀角川芎陳皮牛膝木通白芍入姜汁煎服病稍減去犀角加牛膝龜板歸身尾冬月加
桂夏加黃芩又有過身遊走痒痛狀如虫啣過痒而進飲食則虫亦屢試其間屢不致頻頻啣也宜麝香
丸○留飲四肢節氣短脈沉久則令人骨節蹉跌恐為癩癩宜導痰湯加減痰飲者古半稍丸氣短倦
急者六君子湯加南星○酒濕痛者用黃柏威靈仙各五分血氣虛勞不榮養關秦光有火者調潛行
蒼朮二錢陳皮白芍各一錢甘草二分羌活二分水煎服

散有瘀血者加大黃桃仁紅花微利之性急發熱者加酒芍黃柏枳殼節腫痛脈溢者加桃仁歷年不愈者
信如木通出汗或發紅丹即愈若不愈者痛風丸二妙蒼柏散三妙丸○氣虛歷節痛如槌斝者四君子
湯加桂附白芍○血氣俱虛痰火者八物湯加羌活防風黃柏治外流濕與疎風得者從起與傷寒相
龜板○勞傷者趁痛散血風丸劫勞散陰虛者虎潛丸補陰丸治外流濕與疎風得者從起與傷寒相
似宜分表裏治之表症丸味羌活湯氣虛表實骨節痛者六一散加香附黃芩水煎或姜汁糊丸服○震
乾酒常服微醉○通用調內活血和氣爾屬內因者宜消痰血養新血兼理痰火則血自活氣自和痛
亡血產後病此者俱不宜純用風藥燥血

痺風 附麻木

五痺皮脉肌筋骨 痺者氣閉塞不通流也或痛痺或麻痺或手足緩弱與痿相類但痿屬內因血虛火盛
痿又痺為中風之一但純乎中風則陽受之痺兼風寒濕三氣侵人而成然外邪非氣血虛則不入此所以痺久亦能成
痿之所以為病更重觀宋明醫錢仲陽自恙周痺偏廢不能全愈可見 上多風濕下寒濕 經言春為筋痺
為肌肉痺秋為皮痺冬為骨痺言皮脉肌筋骨各以時而又風寒濕之邪也大槩風濕多侵乎上骨背麻
木手腕硬痛寒濕多侵乎下脚腿水重若上下俱得身如板挾脚如石墜俱分風寒濕多侵乎上骨背麻
走不定寒多掣痛週身拘急手足冷痺與痛風無異濕多浮腫重着一處不移○風多高藥順氣散三痺
湯越婢湯單麻黃丸○寒多五積散加天麻附子或蠲痺湯寒濕五積交加散○濕多川芎花蒼湯當歸
拈痛湯防己黃芪湯羌活勝濕湯續斷丸○又熱痺或濕生熱或風寒鬱熱身上如鼠走唇口反縱肌肉變色宜用升
七散或舒經湯附子理中湯○又熱痺或濕生熱或風寒鬱熱身上如鼠走唇口反縱肌肉變色宜用升
麻湯○風寒濕熱痺炒蒼柏散皮頑脉瀆症多煩肌肉不仁筋骨屈風寒濕三邪交侵在皮則頑不自
等分加虎膠骨防風減半水煎服皮頑脉瀆症多煩肌肉不仁筋骨屈風寒濕三邪交侵在皮則頑不自
症氣喘煩滿在脉則血滯六脉瀆而不伸應于肝其症夜卧多驚溺澀小腹痛在骨則重不能舉尻以代踵
乎脾其症急情嘔吐在筋則屈而不伸應于肝其症夜卧多驚溺澀小腹痛在骨則重不能舉尻以代踵
者難以代頭應于腎其症心腹脹滿初久皮膚血脈邪輕易治留連筋骨久而不痛不仁 祛邪後分氣血痰
初起強硬作痛者宜疎風散痰沉重者宜流濕行氣久病須分氣血虛實痰多者治之○氣虛痺者關
節不充一身如從水中出陽虛陰盛也四君子湯加肉桂生附或川附丸○血虛痺者皮膚不仁濟生防

風湯或黃芪建中湯去饒加桂枝... 眩暈濟生茯苓湯或二陳湯加竹瀝... 湯擦瘡法 補早及令經絡鬱... 寒濕三氣乘之麻木併作者有氣血俱虛... 凝滯血脈不貫謂之不仁或兼虛火則肌肉... 不行也宜先汗後補量滋湯... 虛者補中益氣湯去當歸陳皮加五味子... 防風天麻○十指麻木胃有濕痰死血者... 痠痛右口角併眼牽引側視者表有風也... 木等症慎疾者須戒魚腥蠶蟹酒醋肉屬... 多下必遺瀕上必痞悶先用二陳湯加芍... 藥黃連降火但可量喫若厚味過

斑疹

附赤白遊風

斑疹屬火有二因 斑屬三焦無根之火... 以清其火體壯者 斑勢披發如錦紋... 藥多發表藥少○外感者敗毒散加紫草... 甚者黑丸斑爛者黑膏○內傷發斑輕如... 宜調中益氣湯黃芪建中湯○內傷發熱... 傷於外感者調中 疹隱皮痒無腫痛... 發在傷寒最重即溫毒也升麻葛根... 湯加牛蒡子荆芥防風或鼠粘湯 出如... 冷氣折之稍緩則消醒散裏虛者理中湯... 多因浴後感風與汗出解衣而得宜消風... 加官桂暑加黃芩柴胡濕加蒼朮茯苓如... 肢體不仁者黃

連橋皮湯通身多痛極者古苦皂丸又有... 五色因血感熱毒著於命門被風毒遂動... 湯暑月人參羌活湯熱加黃芪參冷加黃... 凡斑疹赤色身熱自胸腹散四肢者吉黑... 肢入腹者死舊分癰疹斑疹各類合以具... 赤白遊風屬肝火 面皮頸項身體皮肉變... 者道迷散加山梔或腎氣丸○白屬氣熱... 防風如風像風毒者胡麻散單蒼耳丸單... 用祛風平苦之劑則肝血愈燥 虛痒不... 風火愈熾元氣愈虛變為難治 止血難... 屑痒者單苦參丸或薄荷蠅退等分為末... 服○已上斑癰丹疹癩癧大同小異諸方... 通用

寒類 嗽嗽 嗽嗽須分痰與聲 痰聲俱有肺脾經... 稠聲且重虛者聲利痰亦清 氣必先審... 則鼻塞聲重口乾喉痒語未竟而咳參蘇... 咳風入肺竅者宜熏之○寒乘肺咳則胃... 有寒熱者小柴胡湯又有一種遇寒則咳... 陳皮紫蘇木通黃芩如風寒鬱熱夜咳者... 辰砂見血者枇杷葉散○濕乘肺咳則身... 稟春氣上升潤肺抑肝夏火上炎清金降... 情火咳聲多痰少五更咳多者食積濕熱... 火單石羔丸加知母貝母便閉喘渴痰稠... 者涼膈散敗毒散古苓半丸下半午咳多... 者陰虛四物湯合

醫學入門 卷五 斑疹 嗽嗽 上海掃葉山房校印

二陳湯加知母黃柏麥門冬順而下之如陰虛火燥寒熱盜汗遺精見血者四物湯加竹瀝或滋陰降火湯加味二母丸黃昏咳多者火浮於肺潤肺丸以飲之不可純用涼藥通用二陳湯去半夏加貝母瓜蒌

青黛山梔黃芩桑白皮○鬱咳即火咳久者乾咳無痰乃腎水焦枯和火獨炎於肺瀉白散加苦梗為君以開之久者訶黎丸虛者腎氣丸不得志者霞天膏如肺燥皮枯瘡痒便閉者活血潤燥生津飲○勞咳五勞虛咳也疲極傷肝咳而左脇疼引小腹者二陳湯加芍藥芍藥清肺飲房勞傷腎咳而腰背痛寒熱者建中湯益氣湯神傷心咳而咽乾咯血者劫勞散夢授天王補心丹勞傷脾咳而氣短無力者調中益氣湯補中益氣湯神傷心咳而咽乾咯血者劫勞散夢授天王補心丹勞傷脾咳而氣短無力者調中益氣湯
○七情臟氣不平則咳久不已則入于肺怒傷肝咳或三補丸如知母貝母傷酒食積者香附瓜蒌青黛丸食積因食積生痰痰氣衝胃腹滿者二陳湯加厚朴山查麥芽傷生冷以致肺胃不清暖酸吐瀉惡風寒者五積散理中湯異攻散傷前炒熱物者葶藶散或三補丸如知母貝母傷酒食積者香附瓜蒌青黛丸
小腸則咳與氣俱失思傷脾咳右脇引肩背痛甚則不可動入胃則嘔吐苦汁喜傷心咳心痛咽腫入血入大腸則遺糞恐傷腎咳唾涎腰背引痛入膀胱則遺尿入三焦則腹滿不欲食始則關于肺終則聚於胃故也宜二陳湯加瓜蒌仁薤白子加味瀉白散參蘇飲四七湯蘇子降氣湯團參飲子古橘甘散古橘姜丸加減
三奇湯選用痰咳胸滿水咳悸痰咳痰出胸膈多滿經曰秋傷於濕冬必咳嗽濕在心謂之熱痰濕肺則必作咳宜干縷湯墜痰丸半瓜丸選用痰鬱肺經咳則涎多或結胃者二陳湯加枳梗瓜蒌黃芩貝母甚者鶴頂丹痰積流入肺脘久咳不得睡者兜鈴丸痰因火動者二陳湯加芥連或清氣化痰丸痰因宿食者化痰丸痰因酒濕者蜂姜丸全因酒者水連丸如痰甚能食便閉者小承氣湯下之不能食便閉者厚朴湯或滾痰丸疎導之○水咳因飲茶水停蓄為涎上湧身熱胃滿怔忡者小承氣湯下之不能食便閉者文武湯結胃者小半夏湯大便閉者十
痰血礙氣脹且腥痰血咳則喉間常有腥氣輕者瀉白散加生地藥湯小便澀者五苓散詳傷寒水症
為丸服或因打損勞傷傷肺遇風寒則咳或見血紫黑色者四物湯去芍加枳梗重者桃仁大黃姜汁心肺間瘀血即止後服人參養榮湯調理○肺脹滿即痰與瘀血礙氣所以動則喘急或左或右眠一逆轉不入三白湯加澤瀉桔梗五倍子若因火傷極無水以升而脹者必乾咳無痰有痰者飲水則有收斂降火治分新久求其本脾新咳有痰者外感隨時解散無痰者便是火熱只宜清之久咳有痰者燥之其間有七情氣逆者則以枳殼香附順氣為先停水宿食者則以南星檳榔分導為要氣虛者補之欬之尚不治本而浪用兜鈴粟殼瀉劑反致纏綿肺為嬌臟易寒易熱雖人參平藥惟氣虛最宜若肺

霍亂

霍亂暑濕乾三種一種暑霍亂即濕霍亂但此疾夏秋惟甚繼寒凡亦多由伏暑故名病本中焦濕熱變標因外感四氣或日間感熱夜間受冷或內素鬱熱外又感寒一時陰陽錯亂然病本因飲食失節或醉酒糞生冷以致濕熱內甚中焦脾土失運當升不升當降不降是以上吐下瀉脈多伏絕又有挾七情鬱氣痰涎聚隔痞塞不通者外見痰心腹卒痛或熱寒則吐瀉俱作輕則吐瀉而已凡吐瀉時切不可與喘眩暈亦必由傷飲食為之根也
設食雖米湯一呷下咽立死必熱吐瀉盡過半日饑甚方可痰喘煩渴却可惡
漸食稀粥○偏陽分則多熱而渴偏陰分則多寒而不渴痰喘煩渴却可惡
君子湯桂苓甘露散大渴大燥大轉筋者養大腸以養宗筋暴瀉津液驟亡小筋汗遺尿者死回生散養正丹救之轉筋者養大腸以養宗筋暴瀉津液驟亡小筋
足厥冷若欲絕者倉卒之際宜以益填臍中灼艾不計壯數雖已死而胸中有暖氣者立甦急用茱萸散花或蒼朮南星水蘇葉服再研生蒜塗腳掌心雖昏危入腸者亦効如血熱轉筋不已者四物湯加黃芩散挽其陰女子以手牽乳近兩邊如舌卷囊縮轉筋入腸者死分利升降消食元
四時通用藿香正氣散為散風寒濕之要藥寒月厥冷脈沉不渴者五積散理中湯古姜附湯暑月煩渴者黃連香茹散冷服宜合五苓散以分消上下或更合益元散降火尤妙此皆分利法也又當引清氣上并使濁氣自下吐瀉未徹者宜用二陳湯加芍藥赤芍防風探吐以提其氣如吐瀉不止宜所服藥中加木瓜檳榔以降其氣又有可下者但不可純用涼藥挾七情者七氣湯古參芩湯傷飲食者紅丸子保和丸俱姜湯送下通用四君子湯有汗加桂枝無汗加麻黃吐利轉筋腹痛者木尅土也平胃散加木瓜或小建中湯加柴胡木瓜四肢厥冷脈微緩屬厥陰者小建中湯加當歸附子

心痛

霍亂 心痛

霍亂 心痛

霍亂 心痛

霍亂 心痛

霍亂 心痛

厥心痛先問久新。真心痛因內外邪犯心君一日即死厥心痛因內外邪犯心之胞絡或他臟邪犯心之

傷冷鬱遏元陽宜草豆蔻丸雞舌香散溫散之或神保丸溫利之稍久寒鬱為痛甚發厥有二因寒厥外

熱或因七情者始終是火此古方多以苦寒瀉火為主辛熱行氣為向導也。痛甚發厥有二因寒厥外

客背之血脈背俞與心引痛暴發手足厥逆冷汗甲青似傷寒陰厥古姜附湯三味玄胡散○熱痛內因

酒食積熱痰鬱發厥手足離冷而身熱甚則煩躁吐逆額汗古玄金散三味川練散○甚苦散○熱痛內因

湯下之後服七情怔忡蟲不定。九種情痛蟲痛求去痛症痛散四七湯小蘇丸○熱者連附六一湯重則兩目

赤黃手足青至節即真痛不治。蟲痛濕熱生蛆攻心痛痰火來去注昏神。來去痛肺鬱痰火鬱心則發

發難當痛定能食則臨沐靈榴散烏梅丸化蟲丸選用。痰火來去注昏神。來去痛肺鬱痰火鬱心則發

螺壳丸痰火墜痰丸。症痛卒感惡汗尸症素虛者腎經陰氣上攻神昏卒倒蘇合香丸痛引背僵者

沉香降氣湯或五苓散倍桂非汁為丸小苗煎湯下素實者腎火上攻小承氣湯癆瘵尸症者紫河車丹

胃脘脾痛傷飲食腹脹便閉嘔頻頻。胃脘脾痛傷飲食腹脹便閉嘔頻頻。胃脘脾痛傷飲食腹脹便閉嘔頻頻

感脾胃痛因傷飲食胃痛善噎兩脇咽膈不利脾痛舌強喜嘔腹脹二便不通古方實痛以黃連治心山

梔治胃虛痛以參歸小蘇治心丁砂豆蔻治胃亦未當混大柴傷水飲聚涎心痛如刺者溫膽湯加白朮

傷食生冷遇熱食暫散者香蘇散如生薑蒲半夏枳壳或人參養胃湯如玉桂吳萸或木香化滯湯感

應丸凡心痛數日不食無妨痛止恣食即發。胃火施姜飲胃寒烏藥沉香湯上熱下寒者古柘附湯○

脾痛海石散古二胡散風冷抽刀散諸散燒脾散二妙香良散濕者小胃丹嘔五膈寬中散腹脹厚

朴溫中湯連腸痛復元通氣散痰滯便閉順氣導痰湯氣聚便閉三和散四磨湯小便閉通靈散又有心

脾俱痛者。外感三般風冷熱連腸腰背少舒伸。風因肝和乘心痛則兩脇引小腹陰股桂枝湯加附子便

或河魏種氣丸。冷因形寒飲冷肝腎氣乘心痛則心懸若鐵腰痛下重泄痢五積散便閉加大黃或

肺寒乘心痛則短氣季筋空痛者流氣散子益煎散或脾寒乘心痛則腹脹便難者薑香正氣散痰濕者

除濕湯。熱因心胞絡暑毒乘心痛微背俞掌熱黃連香薷散如藜藜或氣血虛勞按則止。虛痛按之暫

單黃連丸。凡諸經心痛引背多屬風冷諸腑心痛難難以俛仰嘔瀉多屬熱。氣血虛勞按則止。虛痛按之暫

或誤服攻耗心氣藥多者酸棗仁湯歸脾湯心無血輔者四物湯去地黃加乾姜。大實胸高痰喘。實痛

心氣不足者六君子湯加肉桂氣血俱虛者古歸亦散扶枝火食積者二六丸。大實胸高痰喘。實痛

痰熱頑痰或因惱怒而發者柘黃丸木香檳榔煎湯下或香陵丸大實痛因怒後飲食卒痛注悶心膈高

起手不可按便閉者大陷胸湯或煮黃丸下之後服古薑蒼湯以去餘邪。痰血痛飲湯水熱下作能乃

素食熱物血元胃脘桃仁承氣湯輕者四物湯加桃仁紅花或玄胡索丸失笑散○婦人瘀血入心脾痛

甚者五積散加三棱莪朮行末盡血衝心痛加桃仁紅花經行已住作痛者艾氣湯加當歸產後痛者

桂心湯。化皮消積氣已降。凡痛皆皮粘胃通用二陳湯風寒初起無汗加麻黃有汗加桂枝裏寒加草豆

木槿湯。化皮消積氣已降。凡痛皆皮粘胃通用二陳湯風寒初起無汗加麻黃有汗加桂枝裏寒加草豆

氣虛加參朮血虛加當歸犬虛厥逆加姜附肝火加青黛青皮黃連飲加白螺壳滑石南星食積加砂

仁香附瘀血加韭汁結核蟲痛加若棟根頭赤香檳榔急痛加胡椒畧用斑茅妙過痛不可忍加細茶乳

香或石礮丸痛攻走腰背發厥嘔吐諸藥不。却痛丸丹可入唇。寒者九痛丸卻痛散熱者散痛丸通靈散

如聖代針散。如聖代針散。如聖代針散。如聖代針散。如聖代針散。如聖代針散。如聖代針散。如聖代針散

腹中窄狹。腹中窄狹。腹中窄狹。腹中窄狹。腹中窄狹。腹中窄狹。腹中窄狹。腹中窄狹。腹中窄狹

腹痛大小分陰陽。大腹痛多食積外邪膈腹痛多積熱痰火小腹痛多痰血及痰與濕瀝下平大痛人

症腹中覺熱甚則大便閉。中惡客忤不治。陰症滿腹牽痛自利或嘔喜按少食綿綿不減宜溫之○陽

脹滿怕按時痛時止宜下之。寒痛綿綿熱不常。謂寒氣入經客於衛分則血溢急痛按之熱則止寒氣客

於榮分則氣鬱滿痛甚怕按寒氣客腸胃募原血絡急引皮痛按之則氣血散而痛止寒氣客使脊背俞

之脈則深按之不能及也寒氣客關元則氣逆喘寒氣客厥陰絡則脇肋與小腹或陰股引痛寒氣客

小腸募原之間則血氣凝聚成積寒氣客小腸不聚則腹痛而泄寒氣客胃則腹痛而嘔寒氣客五臟則

痛死復生治傷寒腹痛詳三卷四十三葉○尋常外感胃寒症卒痛吐利俱酸喜熱物者五積散加吳

黃木瓜煨葱或薑香正氣散加木香少許風症桂枝湯加芍藥或胃風湯加木香暑症香如散加生薑陳

壁土紅蓼木瓜或五苓散濕症除濕湯或香蘇散加蒼朮枳壳○積熱時痛時止痛處亦熱手不可近便

閉喜冷宜四順清涼飲大承。食積有形便後減。食積結腸胃作痛得大便後則減者宜平胃散加消導

氣湯三黃丸老人麻子仁丸。食積有形便後減。食積結腸胃作痛得大便後則減者宜平胃散加消導

急丸神保丸如意丹下之。又有食。濕痰溺溢火鳴腸。濕痰阻滯氣道必小便不利或二便俱不利宜芍木

填胸滿心胃作痛者宜大吐之。濕痰溺溢火鳴腸。濕痰阻滯氣道必小便不利或二便俱不利宜芍木

痛乃火破水欲降相擊腸鳴者二陳湯加苓連山柘如怒火攻衝胸膈無定處時者更加香附芍藥青

皮又有真結腸鳴作痛不大便者大黃備急丸之類通之如臘寒冷結腸鳴者宜分三陰以溫藥治之

蟲痛吐水定能食。蟲痛吐水定能食。蟲痛吐水定能食。蟲痛吐水定能食。蟲痛吐水定能食。蟲痛吐水定能食

有時不比諸痛停聚不散烏梅丸化蟲丸七情氣痛痞胸堂。七情痛心膈痞悶或攻注

上海書業山房校印

氣散木香化滯湯實中虛全不思飲食。中虛脾弱隱隱冷痛全不思食者人參養胃湯加瘀血痛必着一
 者三和散分心氣飲。肉桂吳茱萸木香素氣虛按痰者六君子湯加蒼朮黃加桃仁大黃
 方。瘀血痛有常處或憂思逆鬱跌撲傷瘀或婦人經來產後惡露不盡而凝四物湯去地黃加桃仁大黃
 紅花○又血虛鬱火燥結阻氣不運而痛者四物湯倍芍藥加炒乾姜○凡痛多屬血溢通用芍藥甘
 草湯為主惡寒而痛屬脾腎加肉桂惡熱而痛屬脾胃加黃芩脈緩傷水加桂枝脈溢傷血加當歸肺逆
 傷寒加乾姜臍下痛加熟地惟氣分諸痛不宜芍藥酸收宜木香檀柳青皮陳皮香附辛散之○劫痛手
 拈初起虛溫實蕩。虛宜辛溫消散燒脾散蠶豆散丁香香脾積丸果係沉寒痼冷小腹下痛酒煮當歸丸
 散。初起虛溫實蕩。經曰結者散之是也○實宜辛寒推蕩經曰通因通用痛隨利減是也方與積熱痛
 同久則升消理胃房。腹屬坤久病宜和脾胃如脾弦急木冠土也小建中湯加當歸取芍藥味酸於土中
 自利半穀不化者平胃散加肉桂吳茱萸取蒼朮苦辛瀉濕土為君胃氣下陷者加升麻柴胡蒼朮以升之
 有積者如山查麥芽枳實黃連木香以消之上熱下寒升降失常腹痛嘔吐者黃連湯主之○疝痛引牽
 九疝痛拘急積聚痛有形可按腸癰痛臍生瘡。腹中窄狹性偏躁無非痰火善為斂。腹中自覺窄狹神昏
 小便如淋脈孔砂症痛甚嘔吐脈沉治見各條。腹中窄狹性偏躁無非痰火善為斂。腹中自覺窄狹神昏
 於心脾以致升降失常肥人多濕痰宜二陳湯加蒼朮燥濕香附行氣瘦人多火宜二陳湯加黃連清
 熱蒼朮流濕心神不敏者俱加遠志麥門冬酸棗仁血氣虛者六君子湯加芍藥歸養血流濕自汗早復

暑類

瘧疾先要陰陽定。陽為外感邪氣其間陽為風暑有汗陰為寒濕無汗陰為內傷正氣虛其間陽為氣虛
 陰氣虛虛陽為升發在春夏陰為降發在秋冬陽為腑邪注與榮衛並行一日一發陰
 為臟邪深積連募原不能與正氣并行故間日蓄積乃發或三四日一發又則必有瘧母陽為日發和淺
 榮衛畫行背與春故也陰為夜發和深榮衛夜行胸與腹故也又有二日連發作一日者及日夜各一發
 均乃氣血俱受病也陽為子時至巳陰為午時至亥如發寅外而退於申未或發未申而退於子丑皆謂
 之陰陽不分須隨症用藥趨早或移時分定陰陽然後陽瘧截住陰瘧升散今俗以似瘧誤治變成濕瘧
 為分陰陽誤矣殊不知瘧有凌瘧之狀在傷寒久則為壞陽熱陰寒如期應。陽和與榮爭而和火發於外
 症在內傷久則為瘧瘵豈美疾哉凡陽瘧易治陰瘧難愈。陽熱陰寒如期應。陽和與榮爭而和火發於外
 退於內則為寒瘧虛則先寒瘧虛則先寒瘧虛則先寒瘧虛則先寒瘧虛則先寒瘧虛則先寒瘧虛則先寒瘧
 積於內則為寒瘧虛則先寒瘧虛則先寒瘧虛則先寒瘧虛則先寒瘧虛則先寒瘧虛則先寒瘧

先寒後熱陰陽寒熱。寒瘧太陽熱陽明。寒瘧腰背項俱痛屬太陽寒多熱少汗出難已者柴胡加桂湯
 明而瘧治知本矣。寒瘧太陽熱陽明。寒瘧腰背項俱痛屬太陽寒多熱少汗出難已者柴胡加桂湯
 多寒少煩病尿赤者柴苓湯暑月黃連香茹散熱傷。風瘧少陽寒熱。風瘧口苦嘔吐惡心舌痛屬少陽
 氣分單熱而渴者白虎加參湯或黃芩湯加桂枝少許。風瘧少陽寒熱。風瘧口苦嘔吐惡心舌痛屬少陽
 脈抽搖者烏藥順氣散加柴胡黃芩身疼者敗毒散咳嗽者參蘇飲。少陰四正厥四旁。少陰瘧發于子午
 ○已上三陽氣分受病發在處暑前者俱謂之暴瘧乃傷之淺者。少陰四正厥四旁。少陰瘧發于子午
 乾口燥嘔吐欲閉戶痛輕者小柴胡湯倍半夏夏重者合四物湯○厥陰瘧發于寅申巳。太陰辰戌丑未病
 亥四旁之日小腹痛引陰如淋輕者小建中湯重者四物湯加玄胡索金鈴子附子。太陰辰戌丑未病
 太陰瘧腹滿自利善嘔嘔已乃衰輕者異攻散重者理中湯如濕偏陰分單寒氣虛作泄者古棗附湯附
 子理中湯身重腹脹者五苓散亦附湯浮腫退黃丸○已上三陰血分受病發在處暑後者俱謂之溫瘧
 乃隔冬感濕氣藏於腎與骨髓至夏秋重。瘧瘵山嵐疫一方。瘧瘵山嵐疫毒令人迷因發狂或啞乍寒乍
 感新邪觸發自臟而達之腑乃傷之重者。瘧瘵山嵐疫一方。瘧瘵山嵐疫毒令人迷因發狂或啞乍寒乍
 土者人參養胃湯○疫瘧一方長幼相似須參運氣寒熱。鬼瘧卒感異常性。鬼瘧因卒感尸疰客忤寒熱
 用藥大藥不換金正氣散五積交加散如減如意丹最妙。鬼瘧卒感異常性。鬼瘧因卒感尸疰客忤寒熱
 動異常宜辟邪丹雄麻丹或用燒。詳分寒熱汗且和。外感寒多非草菓厚朴不能溫散熱多非柴胡黃芩
 人場土為丸塞男左女右耳中。詳分寒熱汗且和。外感寒多非草菓厚朴不能溫散熱多非柴胡黃芩
 陰瘧無汗須加柴胡升麻川芎。或吐或下須體感。陽瘧初起痰在上者祛邪丸然亦三五發後移時乃可
 有汗須加白朮烏梅以和之。或吐或下須體感。陽瘧初起痰在上者祛邪丸然亦三五發後移時乃可
 者宜下以截之暑瘧黃連香茹散加大黃青皮烏梅煎服寒瘧二陳湯加青皮良姜煎吞神保丸五粒瘧
 熱胸滿便閉者大柴胡湯瘀血發狂好忘者桃仁承氣湯虛閉麻子仁丸俱清晨一服取下惡水即止
 內傷蓋養惟七情。內傷瘧皆不食惟七情善食多汗五臟之氣不和暑被。勞瘧微虛損症。勞瘧微虛損惡
 有熱熱中有寒最難調理或半月十日小勞復來經久不痊者芩歸蠶甲散主之熱多者生犀散有瘧者
 驚甲丸○氣虛汗多無力飲食不進者六君子湯因勞役昏倦少食者補中益氣湯加黃芩半夏○血虛
 夜發者小柴胡湯合四物湯加升麻紅花知母黃柏水煎露服趨早不愈用勝金丹截之有瘧者陰瘧丸
 如陰虛火動午後寒熱至晚微汗乃解似瘧非瘧也宜加味逍遙散加地骨皮若誤用瘧藥必死○氣血
 俱虛弱頭食少或遺精咳嗽者人參養胃湯加地骨皮烏梅麥門冬或什厥不省。疫瘧嘔沫多昏迷。疫瘧
 者十全大補湯加柴胡黃芩陽虛去柴芩加附子吞黑錫具有瘧者橘皮煎丸。疫瘧嘔沫多昏迷。疫瘧
 內傷鬱聚成瘧多頭暈肉跳吐食嘔沫甚則昏迷卒倒宜柴陳湯加草葉嘔吐者二陳湯。食瘧腹脹寒
 倍白豆蔻流行三焦嘔瘧自止氣虛嘔者單人參湯或用常山炒過久不止者薑黃飲截之食瘧腹脹寒

上海掃葉山房校印

熱併食癰因飲食積成痰火寒已復熱熱已復寒寒熱交併苦飢不食食則吐痰胸滿腹脹者二陳湯合
九子腹脹因濕痰或平胃散俱加枳實白朮山查神效青皮寒熱者清脾飲寒多者人參養胃湯腹痛者紅
久不愈者用辰砂阿魏等分糊丸皂子大每丸一丸人參煎湯下截之清痰飲汗補胃脾瘧無痰不成內傷
濕痰為主內傷瘧皆汗多陽瘧飲以參朮黃芪陰瘧飲以歸地知柏芍藥大抵有汗要止汗以補其利水
虛無汗要發汗以散其邪稍久者一補一發丹久虛瘧中益氣湯加山查麥芽扶脾自止極忌吐瀉利水
消痰瘧母淨者非常年不瘧謂之老瘧必有痰水痰血結成痞塊藏於腹脇作脹且痛乃瘧母也雖內虛
暫用芫花丸仍須以補脾化痰湯藥有時瘧後痢相兼或瘧後痢後瘧或瘧併作俱以茶苓湯六和
連木香當歸砂仁或益氣湯總要祛邪與扶正外感汗吐下解祛邪為主內傷飲補養正為主內外相兼又當參
四散飲補中益氣湯總要祛邪與扶正外感汗吐下解祛邪為主內傷飲補養正為主內外相兼又當參
傷食丹漢主於痰其實因夏傷暑秋感風濕濕七情飲食鬱痰而後發雖三因雜至獨亂氣血然始於暑
成於痰故捷徑以祛暑消痰為要○通用二陳湯外感無汗去茯苓加柴胡稍川芎葛根蒼朮太陽加羌
活防風藜蘆本陽明加葛根升麻白芷少陽加柴胡黃芩青皮少陰加芍藥歸黃連黃芩太陰加二朮柴胡此
三味瘧家必用厥陰加桂枝姜附湯加知母麥門冬大便閉加大黃桃仁小便赤加澤瀉山梔瘧瘧加檀
榔截瘧加常山檳榔貝母內傷無汗加柴胡川芎氣虛合四君子湯血虛合四物湯汗多加黃芪食少加
山查麥芽勞瘧加地骨皮鱉甲七情加紫蘇香附痰加南星姜汁食積加莢朮久瘧倍參朮寒甚加桂附
草葉夜瘧加升麻柴胡以提之停水倍半夏
瘧血加桃仁紅花○吐瀉不食腫脹者不治

痢

痢馮色症分熱寒身熱口渴溺澀大便急痛色赤者為熱身涼不渴溺清大便順利色白者為寒但痢因
熱可總因濕火氣血滯血因火動濕多成瀉火傷氣分則氣鬱自大腸滯下為白火傷血分則血瘀從小
解氣鬱而為火之實者有外感寒濕內傷生冷硬物積滯或房慾損傷精血而為火之虛者皆令腸胃粘
滯久積成毒經曰飲食不節起居不時者陰受之則入五臟閉塞下為瀉泄腸澀言濕火滯於腸中故名
也法當利下耳表症頭夜或渴嘔正氣散○煩渴多暑如苓湯六一散梅蜜飲虛者錢氏白朮散○嘔
吐有寒熱者屬半表柴苓湯頑痰在膈者苓連二陳湯加防風桔梗蘆探吐胃火衝上者清六九毒滯上
攻者平胃散加黃連木香檳榔○虛嘔食少者四君子湯加陳皮厚朴麥門冬竹茹或溫六九日久陰虛
者八物湯合二陳湯加枳殼○嘔吐全不食者謂之噤口胃火甚也大虛大熱香連九加蓮肉各一半為
末米飲下又人參四錢姜炒黃連二錢濃煎終日細細呷之如吐再服但一呷下咽便開有毒熏心肺者
敗毒散加蓮肉陳米或單蓮肉留心為末每二錢陳皮煎湯下外用大田螺二箇入麝少許搗
碎敷臍中以太乙膏貼之引熱下行間有過服利藥及脾胃虛者參苓白朮散去山藥加葛蒲裏急腹痛
後重墜火性急連傳下或化或不化食物積滯欲出而氣反滯住所以欲便不便腹痛窘迫拘急大腸重
血則便膿自愈行氣則後重自除間有虛火者參朮歸芍補之寒凝者乾姜肉桂溫熱赤紫黑寒白清偏
之及素有積聚偶因一臟之氣發動干犯腸胃成利者須察何臟相乘以平治之熱赤紫黑寒白清偏
純赤見暑症輕者黃芩湯重者導清湯日久黃連阿膠湯○熱積紫黑色者瘧血也腹痛後重異常桃仁
承氣湯下之或因誤濕以為瘧血者犀角地黃湯加黃連大黃或如味清六九日久地榆散單苦參丸黃
連阿膠丸要知諸痢皆血瘧惟黑為痢甚耳○寒痢白如鴨澹腸鳴痛墜不其不換金正氣散加烏梅陳
菜或熟料五積散散冷便清古姜附湯理中湯日久黃連補腸湯○冷熱不調赤白各半古姜墨丸或作
結作瀉似痛非濕如豆汁風青是濕痢腹脹身重不如豆汁或赤黑混濁危症也當歸和血散升陽除濕
痛古黃連丸濕如豆汁風青是濕痢腹脹身重不如豆汁或赤黑混濁危症也當歸和血散升陽除濕
青或純下清水古蒼朮湯神朮散青色帶白者風寒五積散帶紅胃風湯青綠紅色屬風火濕及五色俱
下者乃脾胃食積及四氣相併而作古黃連丸救之○已上外感痢疾如一方長幼相似者名曰疫痢散
毒散加陳皮或姜茶煎七情癖勃食積黃氣痢去如蟹渤拘急獨甚流氣飲子古黃連丸六磨湯熱者解
以酒之更參運氣調治切酒食積或黃或赤通玄二八丹傷酒甚酒蒸黃連丸傷水腹脹痛惡食者保和丸急痛神蘇丸小
便閉者五苓散久不止者氣痢丸○積痢色黃或如魚腸發腹脹痛惡食者保和丸急痛神蘇丸小
滑脫多因虛虛痢因倦穀食難化腹微痛或大痛並無旁青○血虛淡紅通玄二八丹日久四物湯加升
不減虛坐勞青及久不愈者皆陰血虛也胃風湯去桂加熟地主之○氣虛色白如鼻涕凍膠四君子湯
理中湯俱加木香肉桂厚朴茯苓散風邪分水道開胃脫日久者補中益氣湯甚厥逆脈微者四順散
榆檉白皮氣分真人養臟湯大斷下丸靈砂蒼朮地唯有休息最難禁休息氣血虛者八物湯加陳
皮阿膠苓連少許或十全大補湯脾胃虛者補中益氣湯參苓白朮散腎虛者四神丸赤石脂丸有誤服
滋藥餘毒不散者古苓朮散神效丸六神丸有積者通玄二八丹積消毒散脾胃已和氣血將復然後用

吐有寒熱者屬半表柴苓湯頑痰在膈者苓連二陳湯加防風桔梗蘆探吐胃火衝上者清六九毒滯上
攻者平胃散加黃連木香檳榔○虛嘔食少者四君子湯加陳皮厚朴麥門冬竹茹或溫六九日久陰虛
者八物湯合二陳湯加枳殼○嘔吐全不食者謂之噤口胃火甚也大虛大熱香連九加蓮肉各一半為
末米飲下又人參四錢姜炒黃連二錢濃煎終日細細呷之如吐再服但一呷下咽便開有毒熏心肺者
敗毒散加蓮肉陳米或單蓮肉留心為末每二錢陳皮煎湯下外用大田螺二箇入麝少許搗
碎敷臍中以太乙膏貼之引熱下行間有過服利藥及脾胃虛者參苓白朮散去山藥加葛蒲裏急腹痛
後重墜火性急連傳下或化或不化食物積滯欲出而氣反滯住所以欲便不便腹痛窘迫拘急大腸重
血則便膿自愈行氣則後重自除間有虛火者參朮歸芍補之寒凝者乾姜肉桂溫熱赤紫黑寒白清偏
之及素有積聚偶因一臟之氣發動干犯腸胃成利者須察何臟相乘以平治之熱赤紫黑寒白清偏
純赤見暑症輕者黃芩湯重者導清湯日久黃連阿膠湯○熱積紫黑色者瘧血也腹痛後重異常桃仁
承氣湯下之或因誤濕以為瘧血者犀角地黃湯加黃連大黃或如味清六九日久地榆散單苦參丸黃
連阿膠丸要知諸痢皆血瘧惟黑為痢甚耳○寒痢白如鴨澹腸鳴痛墜不其不換金正氣散加烏梅陳
菜或熟料五積散散冷便清古姜附湯理中湯日久黃連補腸湯○冷熱不調赤白各半古姜墨丸或作
結作瀉似痛非濕如豆汁風青是濕痢腹脹身重不如豆汁或赤黑混濁危症也當歸和血散升陽除濕
痛古黃連丸濕如豆汁風青是濕痢腹脹身重不如豆汁或赤黑混濁危症也當歸和血散升陽除濕
青或純下清水古蒼朮湯神朮散青色帶白者風寒五積散帶紅胃風湯青綠紅色屬風火濕及五色俱
下者乃脾胃食積及四氣相併而作古黃連丸救之○已上外感痢疾如一方長幼相似者名曰疫痢散
毒散加陳皮或姜茶煎七情癖勃食積黃氣痢去如蟹渤拘急獨甚流氣飲子古黃連丸六磨湯熱者解
以酒之更參運氣調治切酒食積或黃或赤通玄二八丹傷酒甚酒蒸黃連丸傷水腹脹痛惡食者保和丸急痛神蘇丸小
便閉者五苓散久不止者氣痢丸○積痢色黃或如魚腸發腹脹痛惡食者保和丸急痛神蘇丸小
滑脫多因虛虛痢因倦穀食難化腹微痛或大痛並無旁青○血虛淡紅通玄二八丹日久四物湯加升
不減虛坐勞青及久不愈者皆陰血虛也胃風湯去桂加熟地主之○氣虛色白如鼻涕凍膠四君子湯
理中湯俱加木香肉桂厚朴茯苓散風邪分水道開胃脫日久者補中益氣湯甚厥逆脈微者四順散
榆檉白皮氣分真人養臟湯大斷下丸靈砂蒼朮地唯有休息最難禁休息氣血虛者八物湯加陳
皮阿膠苓連少許或十全大補湯脾胃虛者補中益氣湯參苓白朮散腎虛者四神丸赤石脂丸有誤服
滋藥餘毒不散者古苓朮散神效丸六神丸有積者通玄二八丹積消毒散脾胃已和氣血將復然後用

其來暴速稠粘五苓散去桂加黃連芍藥或黃芩湯加木通六一散兼嘔者加姜汁又火性急或米穀不化者姜汁炒黃連為丸服虛火氣虛不能必別水穀者衛生湯陰虛火動不能凝聚者三白湯飲之久者

升陰 虛瀉厥汗面多青 糲米為末沙糖湯調服次者枳實加升麻白芍或平胃蘇肚丸有停蓄飲食數日乃瀉腹脹者名瀉瀉枳亦九沒石子丸煩渴或兼嘔者錢氏白朮散參苓白朮散食少腸鳴四肢困倦者

升陰 虛瀉厥汗面多青 糲米為末沙糖湯調服次者枳實加升麻白芍或平胃蘇肚丸有停蓄飲食數日乃瀉腹脹者名瀉瀉枳亦九沒石子丸煩渴或兼嘔者錢氏白朮散參苓白朮散食少腸鳴四肢困倦者

吞酸 吞酸吐酸皆濕熱 經云諸嘔吐皆屬於熱又云少陽之勝嘔酸蓋酸者肝味火盛制金不能平木則肝木

酸水吐出吞酸乃濕熱伏於脾胃略不得上嚥不得下宿食鬱遏而作其大要初起宜反折素有濕熱因因治一也惟濕多則吞而便利熱多則吐而便閉東垣言寒者論其標耳大要初起宜反折素有濕熱因因治一也惟濕多則吞而便利熱多則吐而便閉東垣言寒者論其標耳大要初起宜反折素有濕熱因

黃疸

黃疸須知有濕乾 黃疸如會蠶五疸同歸濕熱蓋濕熱蒸血熱土色上行面目延及爪甲身體黃疸黃疸相似但濕病在表一身不痛渴多喘滿治之難凡疸以十八日為期十日以外入腹喘滿渴多面黑者死要

針刺犯之流水而死。通二陳湯去甘草加蒼朮白朮為君佐以豬苓澤瀉山梔消濕熱麥門冬黃芩...

鼓脹

鼓脹虛軟實則堅。鼓脹中空外堅有似於鼓又曰蠱者若蠱侵蝕之義虛脹陰寒為邪吐利不食時脹時...

多寒濕瘦人。都緣脾濕少運布。食之精華不能傳布上歸於肺下注膀胱故濁氣在下化為血瘕鬱久為...

厚味大便閉者。大承氣湯加桂枝或厚朴湯。穀脹痞滿心如醋。因穀食不化曰穀脹。朝陽或能食暮陽衰不...

赤白濁

赤白濁。皆因濕熱。脾胃濕熱中焦不清濁氣滲入膀胱為濁。如夏月天熱則萬木流津。赤者血分...

子飲或五積散。合四君子湯。濕痰濕火理一。肥人多濕痰。二陳湯加蒼朮白朮。青黛滑石。白芍氣虛加參...

腰痛不可忍者 久則升提斂胃宮 土燥水清思亦傷脾 精生於穀 故久則宜升胃補脾 二陳湯加升麻 柴胡 酒煮當歸丸 或用此吐以提之 如虛勞者 補中益氣湯 脾濕不斂者 蒼朮 難名 丹四炒固真丸 白朮膏 威喜丸 久甚古龍糖丸 石蓮散 遠志丸

腰痛

腰痛新久總腎虛 諸經貫於腎而絡於腰 春雖外感內傷 種種不同 必腎虛而後邪能乘之 故不可純用 涼藥 亦不可純用參芪補氣 痛外感暴痛 寒背拘攣 濕痛重者 熱煩燥 久處卑濕 雨露淫濕 為濕所 其面上忽見紅點 人中黑者 死 外感暴痛 寒背拘攣 濕痛重者 熱煩燥 久處卑濕 雨露淫濕 為濕所 狂紫五積散 加吳茱杜仲 桃仁 痛甚 加黑牽牛 少許 肢厥 濕痛重者 熱煩燥 久處卑濕 雨露淫濕 為濕所 者 古姜附湯 運肩背者 通氣 防風湯 摩腰 丹屈伸 導法 濕痛重者 熱煩燥 久處卑濕 雨露淫濕 為濕所 慰不渴 便利 飲食如故 看腎湯 加附子 停水 沉重 小便不利 五苓散 滲濕 湯腰重痛 單角 齒散 久不已 單 牛膝 浸酒 服青娥丸 加草薢 最妙 濕兼熱者 長夏暑濕 相搏 或因膏梁 成濕 熱者 亦同 實者 二妙蒼柏 散 加柴胡 防風 煎服 虛者 七味 蒼柏 散 濁赤者 五苓散 清燥湯 健步丸 有諸藥 不効者 用 風牽脚膝強難 舒 風傷腎 腰痛 左右無常 牽連 脚膝 強急 不可 挽仰 以顧 風熱 散毒 散 加杜仲 二便閉者 甘豆湯 加續斷 活寄生 散 羌活 湯 湯加味 龍 內傷失志 腰膨脹 失志 則心 血不 旺 不能 攝養 筋脈 腰間 鬱鬱 膨脹 不伸 虎散 或單 威仙 為末 酒調 服 內傷失志 腰膨脹 失志 則心 血不 旺 不能 攝養 筋脈 腰間 鬱鬱 膨脹 不伸 乳香 少許 虛者 當心 腎俱 補 憂怒 腹脇痛 相須 五臟 皆取 氣於 穀 脾者 腎之 倉廩 也 憂思 傷脾 則胃 氣不 飲食 難化 者 異香 散 宗筋 聚於 陰器 肝者 腎之 同系 也 怒傷 肝 則諸 筋 縱弛 腰痛 連脇 痛 連 肝散 七情 挾外 感有 表者 人參 順氣 散 烏藥 順氣 散 加 甘散 加 蔥白 通 用 七香 丸 香木 香丸 立安 力 連背 脇積 難仰 桂附子 控嘔 丹 大便 泄者 龜 榜丸 食積 因 醉飽 入房 濕熱 乘虛 入腎 以致 腰痛 難 以 仰 四物 二陳 湯 加 麥芽 神 龜 花 砂 仁 杜 仲 黃 柏 官 桂 桔 梗 痛 閉 到 痰 逆 夜 偏 呼 磨 腹 痛 日 輕 夜 重 宜 行 甚者 速 効 散 積 聚 者 加 味 龍 虎 散 濕 熱 者 七 味 蒼 柏 散 清 燥 湯 閉 到 痰 逆 夜 偏 呼 磨 腹 痛 日 輕 夜 重 宜 行 血 順 氣 實 者 桃 仁 承 氣 湯 或 大 黃 生 羌 等 分 水 浸 一 宿 五 數 服 之 久 者 補 陰 丸 加 作 勞 血 脈 難 週 養 勞 力 桃 仁 紅 花 或 五 積 散 去 麻 黃 加 苗 香 木 香 檳 榔 連 脇 痛 者 復 元 通 聖 散 加 木 香 作 勞 血 脈 難 週 養 勞 力

疝氣

者黃芪建中湯加當歸杜仲或四物湯加知母黃柏五味子杜仲吞 大補陰丸熱者獨活湯 勞心者 憂天 王補心丹 杜仲煎湯下 房慾 悠悠 或軟如 房慾 傷腎 精血 不 痛不能舉者 杜仲丸 補陰丸 陽虛 腰軟 不能 運用 者 九味 安腎丸 加 杜仲鹿茸 百倍丸 八味丸 加鹿茸 木 水 當歸 續斷 或 煨腎丸 猪腎酒 加 疝本濕熱標則寒 醉飽 勞役 房慾 忿怒 動火 火鬱 久則 生濕 津液 凝為 痰涎 流入 肝經 肝性 急速 又暴 為 俱熱 外腎 累垂 玉莖 挺急 寒者 遇寒 則發 二便 皆利 腸腹 清冷 外 小腸 膀胱 總由 肝 局方 多以 為小 腸氣 腎緊 縮又有 冷熱 不調 者 外腎 小腹 或冷 或熱 二便 或閉 或利 小腸 膀胱 總由 肝 局方 多以 為小 腸氣 腎其 氣相通 運為 外腎 系於 肝也 蓋 肝環 陰器 而上 入小 腸 又肝 腎所 屬於 下 與衝 任督 相附 腎與 膀胱 為臟 腑 無由 伸縮 在女子 則為 子宮 經云 邪在 小腸 連繫 於腎 腎主 筋 凡屬 於下 與衝 任督 相附 腎與 膀胱 為臟 論三陽 疝氣 寒熱 言勝 脫非 受病 之處 必傳 於肝 而後 為疝 又明 堂六法 治疝 皆厥 陰部 分 可見 疝主 肝 脫腎 納氣 房勞 過度 股精 著為 邪水 氣滯 入裏 胞絡 真氣 勝脫 氣脹 然皆 肝所 主也 所以 病發 不特 外腎 小腹 作痛 或攻 刺腰 脇或 游走 胸背 或搶 心痛 或連 臍痛 男子 遺精 女子 不月 令人 羸瘦 少氣 洒淅 寒熱 食少 嘔吐 吞酸 久則 遂成 暴吐 甚則 角 大綱 囊痛 引小 腹 疝有 辜丸 痛者 有連 小腹 痛者 感冷 觸怒 則塊 弓反 張咬 牙戰 汗汗 汗流 不止 者 難治 疝有 辜丸 痛者 有連 小腹 痛者 感冷 觸怒 則塊 中囊 筋氣 血脈 癩寒 外疝 囊腫 如水晶 或囊 疝而 流黃 水陰 汗自 出小 腹按 之 作水 聲得 於醉 酒行 房過 水在 小腹 兩旁 俗云 便毒 得於 春夏 大燥 氣勞 於便 內血 滲入 浮囊 結氣 癰腫 氣疝 狀如 仰瓦 則入 小腹 如 囊得 於晚 哭忿 怒氣 鬱而 脹或 勞役 坐馬 致核 腫脹 偏有 大小 者 難治 疝有 辜丸 痛者 有連 小腹 痛者 感冷 觸怒 則塊 或控 舉丸 而痛 得於 寒濕 使內 過勞 久而 無子 此疝 之名 從經 旨也 餘皆 疝陰 冷結 硬如 石則 入小 腹如 附臍 之上 下左 陰癰 腫痛 硬如 石 此即 癰疝 在婦 人則 為陰 戶突 出寒 勝則 腫濕 勝則 腫寒 濕相 搏毒 硬引 臍絞 痛甚 則陰 縮肢 冷囊 上生 瘡成 癰二 疝出 水不 止者 死 疝有 辜丸 痛者 有連 小腹 痛者 感冷 觸怒 則塊 手搖 如狂 面黑 舉丸 能左右 相過 氣疝 飲更 連施 石丸 寒冷 者五 積散 蟠葱 散當 歸四 逆湯 木香 勻氣 散

青木香丸... 卑濕五苓散... 木腎者有偏墜者... 用雄精樹葉不結子者... 宜詳審故特抽言之... 有熱則不固者... 合四物湯加龍胆草... 或五苓散最妙... 散加黑豆散... 寒冷者蠶豆散... 死血從芥利勝脫水... 小腸氣加小茴... 積者守効丸... 暴痒四君子湯... 為末姜汁糊丸... 危要知濕熱為病... 魏腹痛有塊盤... 疝痛者天七氣... 猪苓澤瀉以逐水... 湯氣加柴胡... 米飲下瀉... 橘核散平溫... 代針散

脚氣

脚氣須知有濕乾

脚氣內經名厥... 但初起則卒然脚痛... 筋謂之濕脚氣... 脈蹶縮痺痛... 因久坐久立濕地... 四肢多冷加以當風... 察其起處濕勝... 蒼朮大黃搜風... 兼熱則腫痛... 清燥湯食積濕... 妙丸搜風順氣... 升之衝上降... 調塗湧泉穴... 入肝頭目昏眩... 救之如少陰腎... 加砂仁青皮木... 入經絡故治脚... 疎通氣道為佳... 芍忍冬藤婦人... 丸搜風順氣丸... 酒丹當用松節... 濕丹當用松節... 二兩乳香一錢... 錢慢火焙存性... 未每一錢木... 水煎酒調服... 有膠上一生... 一孔約深半寸... 至

醫學入門

下半日痰異者此濕毒注成漏也用人中白灸出水滴入瘡口

燥類

消渴

消渴先明氣血分 經曰二陽結謂之消渴二陽者手陽明大腸主津液足陽明胃主血津血不足發為消渴又喜飲冷水當與寒涼藥以清利其熱熱去則陰生而渴自止矣有血分渴者因外感傳裏或服食燥熱耗津液氣不升或病後胃虛津液或餘熱在肺口乾作渴喜飲熱湯當與甘溫酸劑以滋益其陰陰生則燥除而渴自止矣總之是火炎不必問被火邪薰蒸日久氣血凝滯故能食者未傳癰疽水自溢也下中重下急總皆肺火自炎也上消引飲便如常熱在上焦心煩燥舌赤唇紅少食引飲小便數者四物湯合生脈散加天花心連子飲又膈滿者謂之膈消門冬飲子火留肉中消善饑無尿糞熱蓄中焦脾胃消穀善飢不甚渴清分變為癰腫者忍冬藤九黃芪六一湯益元散

燥結

燥結兩字亦有辨 燥有風燥熱燥火燥氣血虛燥燥門結有能食脈實數者燥潤結通無後患燥屬少不足平以潤之結屬太陰有燥糞苦以瀉之凡結燥鬱脹滿熱有時凡燥結有時者為實無時者為虛後仍服潤血生津之劑免其再結再通愈傷元氣濕鬱脹滿熱有時凡燥結有時者為實無時者為虛有藥石毒者大小便閉氣脹如鼓者三和散湯津少臟寒七情懣津少因發汗利小便過多及產後失血等合三黃湯散食毒者香連丸胃火者白虎湯津少臟寒七情懣津少因發汗利小便過多及產後失血等導滯通幽湯加檳榔條芩陳皮氣虛者參仁丸補中益氣湯按七情者古從沉丸臟寒則氣滿臟冷則血枯有痼疾冷氣結滯者古半硫丸古姜附湯五積散水冷氣與之其病雖宜服陽藥若大便不通者亦當暫用陳皮杏仁等分蜜丸服脈沉夜便難者換桃仁○痰滯不通者二磨湯如脈浮畫便難宿食秘喘響熱者用陳皮杏仁等分蜜丸服脈沉夜便難者換桃仁○痰滯不通者二磨湯如脈浮畫便難宿食秘喘響熱寒傷熱物者二黃丸傷寒物者丁香香積丸流行肺氣無遲慢蘇子降氣湯或蘇子麻仁煮粥又如脾約症胃強脾弱約求津液不能四布但輸膀胱故小便數而大便難此脾約丸之由制也但脾屬陰虛火燔金耗則肺失傳化尤宜滋陰養血在西北壯實者以約脾丸開結可也東南氣血虛者潤燥為主○通用冷熱熨法掩臍法麻油導法

火類

脇痛

脇痛本是肝家病 腹痛引小宜分左右審實虛左右者陰陽之道路也左肝陽血陰右肺陰氣陽實者肝氣皮龍胆草或單黃連丸虛者肝血虛也痛則悠悠不止耳目眩暈善恐如人將捕四物湯加芍藥胡或五積散去麻黃加青木香青皮虛甚成損脇下常一點痛不止者名乾脇痛甚危八物湯加木香青皮桂心或吳黃水炒黃連左為怒火與死血大怒氣逆及謀慮不決或外感風邪皆令肝火動甚脇痛難忍古黃連丸當歸龍薈丸輕者小柴加黃連牡蠣和壳○痰血必歸肝經夜

消渴 燥結 脇痛

上海華英書局

痛或午後發者是... 氣湯或瀉青丸... 七情居... 急妨悶者... 散悲哀傷者... 或煎服... 桔梗甘草蜜丸... 元通聖散...

憂遺

夢遺之病全屬心... 走精金... 救宜救陰... 分清飲或... 陰少運飲... 胡以升胃... 精字從米... 九如早年... 黑錫丹... 無形迹可... 也其不御...

淋

精自出者謂之白淫... 而固去思外淫... 靜坐養精神者... 對景忘情... 櫻膏水陸... 真丸固精丸...

五淋氣血石膏勞

黃湯單車前飲... 飲單髮反散... 痛墜反尻... 合散毒散... 便滋數數... 則熱淋血... 砂石淋如... 下源滋腎... 渴者但渴... 津又未可... 氣滿黃牛... 痛用青皮... 熱則痛又... 門冬淡竹... 葶藶散... 背者磁石... 夢遺淋

五味子以滋補腎小便短而黃者補中益氣湯加麥門冬五味子山藥以補脾腎熱結膀胱者五淋散以清熱脾肺氣燥者苓朮二味以清肺若膀胱陰虛陽無生者滋腎丸膀胱陽虛陰無以化者腎氣丸○精敗竭者童男精未盛而御女老人陰以痿而思色以降其精則精不出而肉敗莖中痛溢為淋者八味丸料加車前子牛膝煎服若精已竭而復耗之則大小便中牽疼愈疼則愈發大小便愈便則愈疼倍附子救之凡此當滋化源不可誤用知中虛總難利膀胱凡汗多亡津瀉久胃乾諸瘡失血俱宜滋補不可過相淡滲等劑既瀉真陽復損真陰

小便不通

小便不通本實熱也經曰膀胱不利為癃候其鼻頭色黃者小便必難腎主水儲於膀胱泄於小腸實相通清熱生津為主單朴硝散五苓散膀胱下脹者加琥珀或單琥珀為末蜜丸人參茯苓煎湯下或搗生車前子自然汁入蜜一匙調服有利大便行而後小便利者八正散加木香熱感莖中溢痛者導赤散加山柈丸冷熱煎法有虛有痰有氣結痛虛損久病自汗五內枯燥及諸瘡失血過多者人參養榮湯有精竭不湯加黃芪升麻有脾枯亡血及勞傷血虛者四物湯加木香香附木通俱先服一盞後煎查探吐以提其氣氣升則水自降矣實熱砂糖尋當赤澀清心上熱者導赤散加黃連燈心下虛者胞痺腸痺分利訣胞痺即調牽牛末一二錢探吐尋當赤澀清心滋腎丸上盛下虛者清心蓮子飲胞痺腸痺分利訣胞痺即便痛引臍腹上有清涕着腎湯熱者瀉腎湯○腸痺乃瀉泄小便閉溢津液偏滲後便宜分利而已

小便不禁

小便不禁不自覺赤者為熱白者為虛實熱乃膀胱火動四苓散合山柈升麻○虛乃腎與膀胱氣虛十全大補湯加益智仁或縮泉丸大免絲子丸二苓丸遇夜陰虛愈多內虛自汗者秘元丹內虛濕熱者腎氣丸八味丸減澤瀉附子加五味子杜仲故紙倍山茶葉內虛寒冷者古桂附湯大免絲子丸加肉桂心脾勞者頻頻少輕於不禁勞心者妙香散桑螵蛸散勞不約多遺或澀餘下虛內損則膀胱不約便溺自遺或膀胱陰血瀉火邪為主而佐以牡蠣山茱萸五味子之類不可溫藥古方補陰丸最妙婦人產後傷胞小兒胞冷難睜散主之

脫肛

脫肛全是氣下陷難經曰病之虛實入者為實出者為虛肛門脫出非虛如何勞倦房慾過度及產育用寒加炒黑乾姜虛間有熱者病乃暫熱則流通意也氣熱者用條芩六兩升麻一兩麴糊丸服血熱者大補丸減澤瀉附子加五味子杜仲故紙倍山茶葉內虛寒冷者古桂附湯大免絲子丸加肉桂心脾勞者頻頻少輕於不禁勞心者妙香散桑螵蛸散勞不約多遺或澀餘下虛內損則膀胱不約便溺自遺或膀胱陰血瀉火邪為主而佐以牡蠣山茱萸五味子之類不可溫藥古方補陰丸最妙婦人產後傷胞小兒胞冷難睜散主之

內傷類

傷食

傷食惡食分上下次審寒熱行吐瀉胸滿噎噎心腹脹發熱胃有伏火皆因食不化停於上脫氣壅傷冷食腹脹氣逆噎氣吞酸惡心欲吐不吐宜平胃散八益少許探吐如傷熱物或酒熱發熱心口刺痛停癢停飲伏火宜二陳湯加黃連枳實探吐傷重填塞胸中下部無脈體實年壯者方敢承蒂散吐之等常飲食過飽在膈以手探吐為好停宿中下脫者宜下以逐之如傷冷物腹脹滿痛者木香見現丸丁香脾積丸感應丸如傷熱物痞滿者二黃丸日晡潮熱者小承氣湯寒熱兩傷者大黃備急丸除原散體弱者下藥兼補保和丸九傷食乃中焦血病如牽牛猛烈傷氣及一切峻攻反傷胃氣又現有吐者二陳湯加砂仁黃連青皮枳實現有瀉者胃苓湯加山查麥芽或三白湯隨時令寒暑選用如身受寒氣口又

傷冷初得便宜辛溫理中稍吐下未淨消導之紅九子枳朮丸保和丸大安
久鬱而為熱當兼辛涼散之飲酒與水過者宜上汗下瀉分消其濕葛花解醒湯微汗即愈
補中益氣湯酒客分消與調中飲酒與水過者宜上汗下瀉分消其濕葛花解醒湯微汗即愈
善飲每早長暖不吐者小調中湯最妙一月三五次服之亦可為丸如醉飽行房以致蓄血胃口時痛者
如傷酒嘔逆眩暈頭痛如破者補中益氣去白朮加半夏白芍芍藥乾葛川芎有塊者更加荻朮木香如
大調中湯或八物湯加砂仁之類有痛飲不醉忽糟粕出前竅尿血出後竅憂思鬱抑藥嫌羈愛思傷脾
者清六九加香附妙黃連白芍姜汁蒸餅糊丸服可安○喫茶成癖者星才丸憂思鬱抑藥嫌羈愛思傷脾
瘦倦氣抑不食者二妙蒼柏散加香附白芍陳皮半夏黃連扁柏等分白朮為君姜汁糊丸服濕痰氣滯
不食者三補丸
加蒼朮倍香附

積聚

五積六聚皆屬脾經曰積聚癥瘕痞滿皆大陰濕土之氣始因外感內傷氣鬱醫誤補而留之以成積
有餘而血隨氣不行也令人脇痛痞積心積臍上曰伏梁言如梁之橫架心下令人煩心乃火之鬱也
熱藥與灸又腸癰與此相似但身股背腫環臍而痛為癰脾積胃脘稍右曰痞氣言陽氣為濕所蓄也令
人黃疸倦急飲食不為肌膚仍忌熱藥肺積右脇下曰息言言喘息奔而上行也令人痰嗽肺癰腎積發
於小腹或痿心下曰奔豚言若豚之奔衝上下無時也令人喘逆骨痠最為難治諸積勿輕吐下徒損真
氣積亦不去奔豚尤不可吐五積古有五方今增損五積丸更妙○聚者陽氣六腑所聚左右中間不移
成脈沉結或隱或見於無根痛無常處散聚湯七氣湯香稜丸大阿魏丸大安丸加參左右中間不移
氣不能作塊成塊乃痰或食積死血有成形之物而成積聚癥瘕一也積聚成塊不能移動者左死血
曰癥言堅硬貞固也或有或無或上或下或左或右者曰積言假血而成積聚癥瘕一也積聚成塊不能移動者左死血
今右氣積湯治左破血為主海石丸或當歸龍薈丸料五錢加桃仁姜黃各一兩蜜丸○治右調氣清皮
中痰結一團而凡痞塊在皮裏膜外俱宜二陳湯加補氣行氣藥有餘消導分新久積初為寒宜辛
湯為白丸大小溫中丸退黃丸河魏撞氣丸以則為熱宜辛寒推蕩不香檳榔丸通立溫消導大七氣
二八丹消塊丸通用蠶積丹生漆膏有蟲者妙應丸外治三聖膏三稜煎神效阿魏散不足平補是上醫

陽虛有積易治惟陰虛難以峻補痞積又忌滯藥止宜早服滋補藥中加薑甲龜板秋石丹午服枳朮丸
大安丸或醋薑丸善消融之妙若痞積滯冷貫臍誤為沉寒痼冷投以姜附熱藥初服甚與病情相宜
久則痞積益甚真氣傷而陰血燥矣但硫耐固不可服如知相門冬寒冷傷脾滯氣亦所不宜古云哀其
大半而止又云養正積自除皆為虛損有積而言也平補之外更能斷厚味節色慾戒暴怒正思慮度平
全萬

蠱瘴

蠱瘴皆因飲食起居而得故附
中蠱害人俗不妍據方書蠱有數種皆妖魅變惑之氣其怪使然人有造作而得之者多取虫蛇之類以
毒發令人面目青黃力乏身痛唾吐鮮血小便淋瀝大便膿血唇口乾燥胸膈妨滿腹痛如蟲蟻又如蠱
行病人所食之物皆變化為蠱侵蝕臟腑蝕盡則死死則病氣流注復染傍人入死則精魂反為其家代
力致富不知有此事否蠱病解毒丹東坡雄雄丸王主之或於足小指去處灸三壯即有物出酒飯得之隨
酒飯出肉菜得之隨肉菜出凡中蠱毒不論年月遠近但煮雞卵一枚去壳以銀釵插入卵中併入口中
脹爛而皮脫者是蠱否則亦非也如出外須用預知子置衣領中遇毒則有聲凡中蠱之人用藥已瘥自
後飲食永不得喫冷若飲食帶冷更有挑生及毒泉嶺南多有挑生毒者乃挑毒於魚肉菜蔬酒醋之中
則鬼氣乘之毒蠱復生竟不能救更有挑生及毒泉嶺南多有挑生毒者乃挑毒於魚肉菜蔬酒醋之中
日則物生能動行上胸膈沉下腹痛在上膈者用膽芥末五分投入熱茶內溶化通口服之標吐在下集
者用鬱金丹末二錢米湯調服瀉下惡物後以四君子湯去甘草調之如脇下忽腫頃刻生癰大如碗許者宜
用升麻末二錢冷熱水調連服瀉出如葱根其腫即消後以平胃丸兼進白粥調之○江南溪澗中有毒
工毒或因雨潦逐水而入人家含沙射人之影得之寒熱悶亂頭目俱痛亦如中蠱卒不能語又有水毒
蟲一名溪溫得之病同射工但有爛瘡為射工無瘡為溪溫又有沙風細如疥蟲過陰雨則行出草間著
人則入皮膚痛如針刺是三者為病朝輕暮重手足冷至肘膝二三日後中蠱食人下部膈中生瘡不
痛不痒急視下如有瘡赤如截肉者為陽毒最急如鯉魚齒者為陰毒稍緩要皆殺人不過二十瘴氣寒
日也用蒜搗濃汁煎溫洗之是水毒身軀當發赤班否則非也當以他病調治消水毒飲子主之瘴氣寒
温分內外東南兩廣山峻水惡地濕熱如春秋時月外感霧毒寒熱胸滿不食此毒從口鼻入也宜清
月外感風寒氣閉發熱頭痛自汗如瘧南人氣壯或胸滿痰食不進與北方只傷表而裏自和者不
同宜解表清熱行痰降氣二陳湯加柴胡黃芩蒼朮羌活川芎水煎服微汗即止如內傷飲食得者理脾

御瘴湯補中益氣湯不換金正氣散枳朮丸虛甚或枳房勞者一粒
金丹熟者紫苓湯承氣湯三黃湯合竹葉石羔湯或三黃枳朮丸
俱以平胃散為主隨水土風氣冷熱加減或變瘴痢黃疸瘡癩俱於各類求之然以扶脾胃為本凡縱酒
色及食魚肉時新菜果笋蔬生冷糯飲燒酒及油炒醬燻雞鴨麪食過饒過飽臥處有穢氣半夜失蓋
早行沾露空腹出外皆能發瘴任宦商
曹游外俱宜節飲食謹起居以防之

氣類

氣滯此即諸氣專抽氣
滯一邊詳言之耳

氣滯不行辨久新濕熱痰積是其因
蒼天之氣清淨不息變為雲霧為雷雨者山澤濕熱重蒸也人身元
逆於胸臆之上而為心腹刺痛等症多因七情飲食鬱滯為濕熱成痰
與積初起宜辛溫開鬱行氣豁痰積久則宜辛寒降火以除根
滯膈痞滿滯下秘
痞滿積滯上膈為嘔咳
痞滿積滯下秘
痞滿積滯下秘

湯橘皮二物湯枳實非白湯沉香降氣湯苦烏附湯濕熱者清膈滯滯湯實者解毒湯加枳朮枳殼
火者瓜蒌實丸食積者枳朮丸加木香二錢
氣滯下焦為腰痛脹墜者七氣湯加枳朮或木香勻氣散
吞青娥丸便閉者四磨湯六磨湯
滯中刺痛或週身
氣滯於中則心腹脇肋刺痛伏梁痞塊者神保丸一塊
湯木香順氣丸木香檳榔丸
氣丸木香分氣丸阿魏撞氣丸古枳巴丸濕熱古莫連
丸黃連梔石丸
氣刺於外則週身刺痛流氣飲子主之或散火破氣雖古法
手足浮腫者三和散合五苓散或五皮散加桂青木香丸
散火破氣雖古法
氣降則火自降矣但枳朮
損人真氣虛者慎之養血補虛同婦人
氣滯者去木槿加玄參黃柏或炒黑山柰一味入姜汁煎服開五

胸結益少陰血最妙○有婦人平時性急過月事不行氣填胸膈嘔惡全不入食食則吐痰或有一塊室
胸喉而痛或一塊如卵築觸心下疼痛或腹中塊物動作攻刺腰背時發熱四肢乏力脚不能行小便
白濁帶下日就瘦弱全似虛勞若穀食不入却喜果子雜物者乃有孕也產前安胎產後調氣俱以四物
湯主之○通用二陳湯上焦氣滯加枳梗香附砂仁中焦加厚朴枳實三稜莪朮下焦加青皮木香枳朮
因怒者如山柰香附痞滿加黃連枳實痰盛加瓜蒌腸痛加青皮柴胡芍藥草龍膽刺痛加枳殼氣實加
烏藥香附氣虛加參朮木香喜動心火加黃連怒動肝火加柴胡思動脾火加芍藥悲動肺火加黃芩恐
動腎火加黃柏成鬱
不解者煎吞交感丹

吐血此即諸血特
分言之耳

吐血屬胃分陰陽陽盛身熱陰盛身涼
內傷外感及飲食房勞墜閃五臟有傷血聚膈間從胃脫出者則為
易愈陽多積熱併怒火
中陽吐膿血者名肺癆枯槁○大怒氣逆上衝暴甚者四物湯加蘇子陳皮
香童便或茅根煎湯磨沉香服之若血聚滿胸則吐血者蘇子降氣湯加人參阿膠或暴吐紫黑成塊者
痰血也雖多亦不妨回物湯合解毒湯調之覺胸中氣塞者桃仁承氣湯下之五志火動熱者解鬱湯
命散陰為心力暴勞傷
陰盛多因勞力傷氣吐血鮮紅心腹絞痛自汗者四君子湯加黃芪柴胡山藥百
為守血亦錯行所謂陽虛陰必走者是也外症必有虛冷之狀法當溫中使血自歸經絡如胃虛不能化
食其氣逆上吐衄者理中湯加木香胃寒不能約血者甘草乾姜湯或七氣湯加川芎白芍者小建中湯
古桂附湯下虛極而氣壅喘嗽血不歸元者黑錫丹金液丹○勞力傷肺唾內有血咽喉不利者雞蘇散
如心脾脈破血若湧泉口鼻俱出者不治○勞心過度不能統血反上令人煩悶急者茯苓補心湯
脾湯古方治血多以茯苓茯苓神為佐者心主血故也○思色強力入房勞傷心腎陰虛火動者加減四物
湯凡血越上竅皆是陽虛陰虛有升無降俱宜補陰抑陽氣降則血自歸經矣陰虛者間有之耳

先痰帶血皆痰熱
先痰嗽後見血多痰火積熱化痰降火為急不可純用血藥恐泥痰也
先血後痰虛火
倡壯先見血後痰嗽多陰虛火動四物湯加貝母天花粉化痰止咳山柰
不可單行單止蓋血來未多必有痰於胸膈必先清痰而後涼血則止
陽熱涼血與行氣陰虛補滋自歸藏
味行氣開鬱為臣升提俾復其位為佐酸澀止塞其源甘溫收補其後○滋補血虛加減四物湯黃連解毒湯
歸氏生地芍藥湯四生丸○行氣積滯生脈散清肺生脈散虛甚者十全大補湯○滋補血虛加減四物湯黃連解毒湯
或單用炒乾姜為末童便調服善能止血降火○久者升提三黃補血湯斷根天門冬丸大阿膠丸女貞
丹○還血歸元參苓白朮散四君子湯腎氣丸瓊玉膏○抑論血疾陰火誤用陽燥藥則血枯瘦怯勞
瘵成矣勞傷誤用寒藥則胸膈滿痛血愈鬱矣墜墮悶挫誤行補溢則痰著於胃心下脹滿
食下即吐血名曰血逆古法以二陳湯去茯苓甘草加赤芍等分救之此血疾難調最宜斟酌

血類
吐血此即諸血特
分言之耳

吐血屬胃分陰陽陽盛身熱陰盛身涼
內傷外感及飲食房勞墜閃五臟有傷血聚膈間從胃脫出者則為
易愈陽多積熱併怒火
中陽吐膿血者名肺癆枯槁○大怒氣逆上衝暴甚者四物湯加蘇子陳皮
香童便或茅根煎湯磨沉香服之若血聚滿胸則吐血者蘇子降氣湯加人參阿膠或暴吐紫黑成塊者
痰血也雖多亦不妨回物湯合解毒湯調之覺胸中氣塞者桃仁承氣湯下之五志火動熱者解鬱湯
命散陰為心力暴勞傷
陰盛多因勞力傷氣吐血鮮紅心腹絞痛自汗者四君子湯加黃芪柴胡山藥百
為守血亦錯行所謂陽虛陰必走者是也外症必有虛冷之狀法當溫中使血自歸經絡如胃虛不能化
食其氣逆上吐衄者理中湯加木香胃寒不能約血者甘草乾姜湯或七氣湯加川芎白芍者小建中湯
古桂附湯下虛極而氣壅喘嗽血不歸元者黑錫丹金液丹○勞力傷肺唾內有血咽喉不利者雞蘇散
如心脾脈破血若湧泉口鼻俱出者不治○勞心過度不能統血反上令人煩悶急者茯苓補心湯
脾湯古方治血多以茯苓茯苓神為佐者心主血故也○思色強力入房勞傷心腎陰虛火動者加減四物
湯凡血越上竅皆是陽虛陰虛有升無降俱宜補陰抑陽氣降則血自歸經矣陰虛者間有之耳

先痰帶血皆痰熱
先痰嗽後見血多痰火積熱化痰降火為急不可純用血藥恐泥痰也
先血後痰虛火
倡壯先見血後痰嗽多陰虛火動四物湯加貝母天花粉化痰止咳山柰
不可單行單止蓋血來未多必有痰於胸膈必先清痰而後涼血則止
陽熱涼血與行氣陰虛補滋自歸藏
味行氣開鬱為臣升提俾復其位為佐酸澀止塞其源甘溫收補其後○滋補血虛加減四物湯黃連解毒湯
歸氏生地芍藥湯四生丸○行氣積滯生脈散清肺生脈散虛甚者十全大補湯○滋補血虛加減四物湯黃連解毒湯
或單用炒乾姜為末童便調服善能止血降火○久者升提三黃補血湯斷根天門冬丸大阿膠丸女貞
丹○還血歸元參苓白朮散四君子湯腎氣丸瓊玉膏○抑論血疾陰火誤用陽燥藥則血枯瘦怯勞
瘵成矣勞傷誤用寒藥則胸膈滿痛血愈鬱矣墜墮悶挫誤行補溢則痰著於胃心下脹滿
食下即吐血名曰血逆古法以二陳湯去茯苓甘草加赤芍等分救之此血疾難調最宜斟酌

醫學
氣滯吐血
三十一 上海滬葉山房校印

醫學
氣滯吐血
三十一 上海滬葉山房校印

嘔血

嘔血與吐無大異。成益無聲者為嘔，怒人暴甚不可當。怒氣逆其血溢口鼻，當抑怒全氣。虛發熱咽喉痛，甘桔湯加參芪歸地，荆芥黃柏水煎入童便，非汁姜汁，鬱金少許，或單黃柏蜜炙為末，麥門冬煎湯下。血虛熱熾，滋降良。加減四物湯主之。

衄血

衄血熱溢肺與胃。肺竅於鼻，鼻通於腦，血上溢於週，又行清道，所以從鼻而出，兼以陽明熱鬱。治同古人方。初宜黃芩湯加鬱金，或茅花冬青子止之。久宜清肺清脈，飲醬梅丸。古天地膠有鬱者，古莎末三錢，水調服，仍取一捻吹鼻中，或用人中白末湯調服，更加髮灰一錢，麝一分，仍用少許搐鼻立止。或將患人頭髮分開，井水濕紙頂上搭之，亦好。如鼻乾燥，以麻油滴入潤之。如吐血衄大盛不止，防其血暈，用茅根燒烟將醋酒之，令鼻嗅氣，以過其勢，或蒸熱以水噴面，使帶驚則止。此法非特衄血，雖上吐下便，九竅出血者，亦效。止後隨症虛實調之。諸般血藥不能止，必然氣鬱血無藏。涼血散火藥不効者，古沙。皆散燥者，單天門冬膏。

嗽唾咯

嗽痰帶血本脾經。虛者六君子湯加桑白皮黃芩枳。有咳屬肺，恐難。火升痰盛，身熱者，龍腦雞蘇丸。難。阿膠丸。虛者二陳芩歸湯。八物湯。或二陳湯加桂枝桑白皮杏仁桔梗，知母貝母。血隨唾出，自腎來。滋陰阿膠生地山梔蓋嫩桂枝能治上焦，故也。愈後調理，至霜膏咳血咽瘡者不治。血隨唾出，自腎來。滋陰湯。痰血聚肺火相煽。唾中紅絲，乃肺痿難治。咯出血，瘡為咯血，或帶紅絲，細如線，有血在咽下咯不出者，甚略則竹瀝姜汁童便青黛或聖餅子地黃膏。著。血在上閉塞清道，喜忘者，犀角地黃湯。此是肺腎真臟傷，滋陰降火，非偏見。

溺血

溺血純血全不痛。血從精竅中來，乃心移熱小腸。四物湯加山梔連翹。暴熱實熱，利之宜。暴起熱者，山服實熱者，承氣湯。如當歸下之，或小蘗散。子後以四物湯加山梔。虛損房勞，兼日久，滋陰補腎，更無疑。調之心經熱者，導赤散。暑熱者，益元散。升麻煎湯下，或五苓散。虛損房勞，兼日久，滋陰補腎，更無疑。者，四物湯加山梔牛膝或單牛膝膏。房勞傷精，火動溺血者，膠艾四物湯。腎氣丸。小兒絲子丸。虛甚病久者，鹿角膠丸。秋石固真丸。金櫻膏。痛不可忍者，單豆豉一撮煎湯溫服，甚效。此疾日久，中乾，非清心靜養不可救也。

便血

便血須先分內外。自外感得者，曰腸風，隨感隨見，所以色鮮多在糞前。自大腸氣分來也，自內傷得者，曰病也。皆因七情六淫飲食不節，起居不時，或坐臥濕地，或醉飽行房，或生冷停寒，或酒麪積熱，以致滯血失道，滲入大腸，經曰結陰，便血一陰結，一升二陰結，二升三陰結，三升益和犯五臟，則三陰脈絡不和，而結聚血，因停滯則滲入大腸，陰非陰寒之謂也。針經風清熱紅，其則為寒，黯濁濕不痛，此屬外感風云。陽絡傷則血外溢而吐衄，陰絡傷則血內溢而便溺。風清熱紅，其則為寒，黯濁濕不痛，此屬外感風下清血實者，人參敗毒散。加槐花荆芥。虛者，不換金正氣散。久虛者，胃風湯。古棗參散。苦參丸。結陰丹。暑月黃連香如散。甚則黑者，解毒湯。合四物湯加大黃。有痰血者，桃仁承氣湯。寒者，色黯，平胃散。合理中湯。加葛根升麻。益智神。當歸地榆。姜棗煎服。毒者，病和蘊久，色濁，後重，疼墜，四物湯加木香檳榔。痛或四味香連丸。濕者，直來不濕。癖血，箭最難除。原因傷風，犯胃，殮泄，久而濕毒成癖，注於大腸，傳於射之遠也。又有如篩四散漏下者，初起濕熱，或發當長夏者，當歸和血散。涼血地黃湯加木香檳榔。內而色紫黑者，濕毒甚也。升陽除濕和血湯。升陽補胃湯。或補中益氣湯。去柴陳加苓連川芎。槐角枳殼。內傷食積糟粕混。內傷飲食，腹必脹痛，糟粕與血同來，平胃散。加槐角枳殼。當歸烏。勞傷氣喘鬱悶。內傷元氣下陷者，補中益氣湯。脫肛者，榆砂湯。內傷中氣虛弱者，四君子湯。或單人參湯。加炒乾姜少許。古卷柏散。古烏荆丸。剪紅丸。陽虛甚者，替附丹。內傷陰虛血弱者，四物湯。加乾姜龜柏丸。活龜丸。腎氣丸。痛小腹悶墜拘急者，逍遙散。六君子湯。俱加柴胡山梔。或木香少許。已上糞前俱加吳萸。糞後俱加黃

連二味須用熱湯同浸再頓滾湯半日久初起和血祛風濕

合藥氣相和方妙各陳出若生則偏寒偏熱初起和血祛風濕
坎離丸通用四物湯祛風加柏葉所風荆芥秦艽槐花蠟皮黃芩地榆枳殼甘草久者加升麻柴胡提
之解毒加槐花柏葉荊芥枳殼連連血加積柳枳實槐花條芩瀉大腸火逆血加木通黃芩炒黃連瀉
小腸火熱者加山梔槐花黃連大下不止加血見愁少許薑汁和服虛者加炒乾姜瀉熱加蒼朮秦艽黃
芩芍藥扶氣加香附枳殼或單香附九又古芍歸湯調血上品熱加茯苓槐花冷加茯苓木香凡大小便
血俱不可純用涼藥宜辛味為佐兼升舉及酒炒藥○婦人胎前患古芍朮湯古
芍歸湯六一散三方合服產後患中益氣湯加吳萸黃連或八物湯隨症選用久只補脾滋劑俱
補中益氣湯參苓白朮散厚朴煎蓋補氣血皆生於穀氣胃氣一復血自循軌○不受補者宜滋劑香梅
丸腸風黑散單方真前酸石榴皮為末一錢荔枝煎湯下糞後艾葉為末生薑汁下或乾柿燒灰為末
飲下亦好○抑考腸風氣血有腸臟中來蟲痔之血肛門傍生小瘻射如血線夫肛門既脫腫血
侵淫化為蟲蝕傷腸口滴血淋瀝當以蕪荑艾葉苦練根等化蟲或燒鱧鱖骨重之內服黑玉丹

痰類

喘

喘急先分肺實虛呼吸急促者謂之喘喉中有響聲者謂之哮喘虛者其次當知有火無

經曰諸逆衝上皆屬火虛火宜滋補
降氣實火宜火炎得食喘暫止喘火炎肺胃喘者作進作退得食則墜下稠痰則止食已入胃反助火痰上
清肺瀉胃
喘痰者痰喘喉似水雞吹痰喘必有痰聲風痰千絡湯或合導痰湯痰氣蘇子降
導水丸痰喘引息鼻張氣喘呼吸急促而無痰聲者四七湯外感裏逆只氣粗逆外感裏實不受則氣
湯枳椇湯分氣藥蘇飲四磨湯因服補藥喘者三拗湯外感裏逆只氣粗逆外感裏實不受則氣
寒相干肺脹逆而喘者隨時令祛散風喘金沸草散麻黃杏仁飲寒喘加減三拗湯水喘怔忡或腫脹
蒼香正氣散加五味子杏仁或蘇沉九寶散暑月香葛湯熱症小柴胡湯涼膈散
水氣難轉有聲怔忡者小龍龍湯苦葶藶散白前湯○水腫水氣脹肺而喘然喘必生脹脹必生喘二症
相因皆小便不利肺主氣先喘而後脹者宜清金降火而水腫水氣脹肺而喘然喘必生脹脹必生喘二症
而清金已上諸喘皆有餘陰虛火從臍下起陰虛喘者血虛則陽無所依附而上奔宜四物湯倍芍藥加
次之

補真陰四物二陳湯氣短不能續呼吸久病氣短不能接續似喘非喘者單人參湯扶脾生脈散調中益
加知柏枳殼黃芩
陰在上清陽陷下咳喘腎冷元氣不能納下元虛冷腎氣不得歸元者九味安腎丸八味丸
嘔吐者加味瀉白散
表乎胃虛極則氣上逆擡肩擡肚生脈散加杏仁陳皮白朮或理中丸加胡椒散之○仲景云髮汗如油
汗出如珠不流擡肩擡肚喘而不休反胸前高起脈絡散張手足厥冷脈散及數者皆死但婦人喘
病尤重產後榮竭衛氣無未發扶治其本血虛補血氣虛補氣兼已發辟邪痰火疎喘非風寒乘肺則
依獨聚於肺發喘者死速未發扶治其本血虛補血氣虛補氣兼已發辟邪痰火疎喘非風寒乘肺則
散痰火疎導但火急甚者亦不可純苦藥宜溫以劫之用椒目五六錢為末姜湯下喘止後因痰治痰因
火治火諸喘不止者小龍龍丸定息餅子含奇丸定喘化痰散久者人參清肺散倍粟壳溢之○抑考內
經云夜行喘出於腎淫氣病肺有所墮恐喘出於肝淫氣害脾有所驚恐喘出於肺淫氣傷
心渡水跌仆喘出於腎淫氣損肝又云邪入六腑身熱喘呼不得臥喘之名同而所感各異

哮

哮即痰喘其而常發者
哮促喉中痰作聲吐法必須量體行體實者用紫金丹二十九吐去其痰虛者止服二三九則不吐臨發
胃丹體虛者吐下挾水挾寒須帶表水哮者因幼時被水停蓄於肺為痰宜金沸草散小龍湯倍防已
俱忌須帶表散之挾水挾寒須帶表水哮者因幼時被水停蓄於肺為痰宜金沸草散小龍湯倍防已
風痰者干縲湯或用雞子一枚畧敲壳損勿令膜破放尿缸中斷根扶正金宜清欲斷根者必先淡滋味
三日夜取煮食之効凡哮須忌燥藥亦不宜純涼須常帶表
之劑如定喘湯黃芩利膈丸是也遇厚味發者清金丸久不得
睡者飛鈴丸單方船兒頭骨燒灰酒調服二三錢一服即止

惡心

惡心欲吐不得吐一見飲食心便惡二陳湯加白豆蔻香附砂仁不渴胃虛與胃寒胃寒理中湯加陳皮半夏生薑各
加姜汁炒煩渴胃家痰火聚痰或者大小半夏湯火或者二陳
黃連少許

嘈囉

惡心欲吐不得吐一見飲食心便惡二陳湯加白豆蔻香附砂仁不渴胃虛與胃寒胃寒理中湯加陳皮半夏生薑各
加姜汁炒煩渴胃家痰火聚痰或者大小半夏湯火或者二陳
黃連少許

上海掃葉山房校印

心嘈似饑又煩噤 似饑非饑似痛非痛或兼噯氣痞滿惡食多覺皮火合 食鬱者枳朮丸如山查麥芽
九胸滿者大安丸保和丸一憂鬱者越鞠丸香連丸濕痰氣鬱不喜食者三補丸加蒼朮倍香附索食者
三聖丸○痰因火動者治痰為先二陳湯加姜汁炒蒼朮連山梔為君南星半夏為佐熱多加青黛○火動
其痰者二陳湯加姜炒蒼朮連山梔火鬱
更加撫芎蒼朮痰火俱盛者祛痰火丸
五更嘈者思慮傷血分稍虧宜補接母山梔黃連甘草

噯氣

噯轉食氣名噯氣有痰有火滯於胃 胃中鬱火膈上稠痰飲食鬱成噯噯食罷噯方形 氣或實噯食罷噯
愛轉多傷食濕熱所致一陳湯加蒼朮
虛噯濁氣填胸次 能發噯六君子湯加沉香為君厚朴蘇子為臣吳
黃為使久者勻氣丸或蘇合
香丸甚者靈砂以鎮墜之

嘔吐

嘔吐須知胃冷熱 大槩肥白肉寒多寒濕瘦黑骨露多燥熱更參脈症○胃冷面青手足厥食入乃吐二
陳湯加姜桂甚加丁香或丁香半夏丸○胃熱面紅手足熱食已即吐二陳湯加姜炒
時常口吐清水冷涎自下湧上者此脾熱所致也二陳湯加白朮芍藥炒蒼朮連山梔神曲麥芽乾生
姜等分或
丸或煎服 次分三焦有妙括眩暈不食氣上攻 子焦吐者氣衝胸膈食已暴吐而渴治當降氣和中六君
防湯加人參 胸滿酸悶食作孽 中焦吐者食積與氣或先吐而後痛或先痛而後吐治當以木香檳榔等
甘草檳榔 山查神 厥冷下焦停有寒 下焦吐者寒也朝食暮吐暮食朝吐久則小便清利大便不通乃陰氣偏結不
理中湯西逆湯丁胡三建湯 三陽熱壅大便結 咽吐不可下者常也如喜冷煩渴胸滿腹痛甚而大便
古丁半湯養口用古半硫丸 嘔吐痰火為多三陳湯加姜炒蒼朮連或二陳湯中湯主之肝火出胃者單黃連丸或單人中
火不己水怔忡 嘔吐痰火為多三陳湯加姜炒蒼朮連或二陳湯中湯主之肝火出胃者單黃連丸或單人中
白姜汁化服脾經濕痰鬱滯上中二焦時時惡心吐清或如豆汁者單黃連丸或單人中

嘔吐須知胃冷熱 大槩肥白肉寒多寒濕瘦黑骨露多燥熱更參脈症○胃冷面青手足厥食入乃吐二
陳湯加姜桂甚加丁香或丁香半夏丸○胃熱面紅手足熱食已即吐二陳湯加姜炒
時常口吐清水冷涎自下湧上者此脾熱所致也二陳湯加白朮芍藥炒蒼朮連山梔神曲麥芽乾生
姜等分或
丸或煎服 次分三焦有妙括眩暈不食氣上攻 子焦吐者氣衝胸膈食已暴吐而渴治當降氣和中六君
防湯加人參 胸滿酸悶食作孽 中焦吐者食積與氣或先吐而後痛或先痛而後吐治當以木香檳榔等
甘草檳榔 山查神 厥冷下焦停有寒 下焦吐者寒也朝食暮吐暮食朝吐久則小便清利大便不通乃陰氣偏結不
理中湯西逆湯丁胡三建湯 三陽熱壅大便結 咽吐不可下者常也如喜冷煩渴胸滿腹痛甚而大便
古丁半湯養口用古半硫丸 嘔吐痰火為多三陳湯加姜炒蒼朮連或二陳湯中湯主之肝火出胃者單黃連丸或單人中
火不己水怔忡 嘔吐痰火為多三陳湯加姜炒蒼朮連或二陳湯中湯主之肝火出胃者單黃連丸或單人中
白姜汁化服脾經濕痰鬱滯上中二焦時時惡心吐清或如豆汁者單黃連丸或單人中

嘔逆

嘔逆分不足有餘 不足因內傷脾胃及大病後胃弱多面青肢冷便軟有餘因外
之賊人之陰氣依胃氣而養胃土受傷則水氣侵之陰火所乘不得內守木挾相火直衝清道而上乃虛
之甚也○膏粱濕熱者干味小柴胡湯吞單黃柏丸或調益元散胃火善食者小半夏湯加山梔黃芩吐
之火盛者益元散加黃連黃柏自利更加參朮白芍陳皮○火病滯下及勞役傷脾故有此動濁升清陷
婦人產後從臍下逆上夜分轉甚者皆屬陰虛四物湯加知柏陳皮竹茹勞傷傷脾故有此動濁升清陷
者補中益氣湯或合生脈散加黃柏附子少許 久病寒搏火為辜 極是危症脈數為火刑金必死凡傷寒
披房勞者瓊玉膏腎氣不歸元者九味安腎丸 久病寒搏火為辜 極是危症脈數為火刑金必死凡傷寒
為胃中寒邪所遏故搏而有聲俱宜丁香柿蒂散活附子湯理中湯倍 有餘飽食填塞 胸中失升降 二陳湯
參久者三香散或木瓜根煎湯呷之虛昏瞶脈結者炙甘草湯救之 有餘飽食填塞 胸中失升降 二陳湯
砂疫鬱何由得秦舒 痰閉於上火動於下無別症忽然發熱從胸中起者蒼連二陳湯或只陳皮半夏
土復位矣 七情氣鬱者木香勻陽症失下多潮熱 微將脫者宜涼膈散解毒湯養陰退陽不可大下
氣散用蘆薈煎湯下蘇子降氣湯陽症失下多潮熱 微將脫者宜涼膈散解毒湯養陰退陽不可大下
汗吐下後胃熱未除 小柴胡加橘皮竹茹湯單瀉心湯有餘湧 泄 食平人食物太遠飲水入肺喜笑太多亦屬有餘
小陷胸湯小青龍湯去 不足補補有溫平涼莫拘 凡汗吐下服涼藥過多者當溫補脾胃陰火上衝者當
麻黃清之利之而已 不足補補有溫平涼莫拘 凡汗吐下服涼藥過多者當溫補脾胃陰火上衝者當

而益有餘宜乎
能逆之必死也

膈噎

三焦枯槁成膈噎 飲食不下而大便不通 名膈噎 疏云 膈有相格意 即隔食反胃也 玉机云 噎塞大便不
旨病因內傷憂鬱失志及飲食淫慾而動脾胃肝腎之火或因雜病誤服辛香燥藥俱令血液衰耗胃脫
枯槁其稿在上焦胃門者食不能下則胃脫當心而痛須臾吐出乃止貴門即胃脫上口言水穀自此
奔入於胃而氣則傳之於肺也其稿在中焦幽門者朝食暮吐暮食朝吐關門即胃脫下口言水穀分入膀胱大
胃中水穀自此而入小腸也其稿在下焦關門者朝食暮吐暮食朝吐關門即胃脫下口言水穀分入膀胱大
腸而為糞溺是大小腸膀胱也 陽火上升有虛熱 經曰 三陽結謂之膈 小腸熱則血脈燥大腸熱則結則不
乃氣血津液流通之道路也 陽火上升有虛熱 經曰 三陽結謂之膈 小腸熱則血脈燥大腸熱則結則不
閉塞下既不通必反而上行所以噎食不下 縱下復出乃陽火上行而下降也 實火黃連解毒湯加
童便姜汁或益元散入姜汁登白脚為小丸時時服之 溫六丸尤妙 甚者陶氏六一承氣湯入參利膈丸
導滯通幽湯或參仁丸 麻子仁丸 當歸厚朴白朮及木香少許或古黃連丸 渴者錢氏白朮散 大便閉者
寒氣口傷冷物以脾胃火衰膈上苦冷腸鳴脈必滑微宜暫用丁香香散散五膈湯 為痰為積本七情 膈噎
五噎湯 葶附子散以劫之 若不效其本編認為寒藥用辛香燥藥必致燥陰不救 為痰為積本七情 膈噎
神思悶病惟內觀養之 蓋七情火起 薰蒸津液為痰積積久則血愈衰 針經曰 怒氣所至食則氣逆不
下勞氣所致為膈噎 喘促思氣所至為中痞 三焦閉塞 咽嗝不利 痰飲脈滑或伏 二陳湯 苦參夏湯 化
痰丸 瓜蒌實丸 或用黃連吳茱萸貝母水煎 草水煎 食積脈滑而短 積積而短 積積而短 積積而短 積積而短
狗米平胃丸 琥珀平胃丸 或用保和丸 二錢加姜炒黃連三錢 山查二錢 為丸 麻仁大臘脂為衣 每六十
丸人參煎湯入竹瀝下 七情鬱結 脈沉而濡 飲食喜靜 胸背痛者 四七湯 溫膽湯 痞滿煩悶 微嗽二便
不利者 分心氣散 四磨湯 或木香檳榔 二味等分為末 白湯下 傷神不睡者 十味溫膽湯 痰積砂安神丸 腹
脹腸鳴者 木香勻氣散 有積聚者 河氣血兩虛多口沫 沫大出者 死 湯大出者 死 湯大出者 死 湯大出者 死
魏子湯 加附子 大黃 酒毒 加甘蔗汁 單人參湯 人參膏 尤妙 血虛不能滋潤 生火者 脈必數而無力 四
物湯 加童便 竹瀝 姜汁 大便閉 加桃仁 紅花 有瘀血 加牡丹皮 非汁 防生虫 加鹽尿 血虛甚 加乾姜 血燥
加牛羊乳 汁不可 以人乳代之 蓋人乳反有七情 金水二臟須扶持 起而金水二氣有養陰血有生津液
飲食之毒 火故也 氣血俱虛者 八物湯 主之

傳化合宜何膈噎 補陰養胃是總訣 不問虛實 俱以益陰養胃為主 庶免後患 通用二陳湯 加童便竹
柳不納食 加麥芽神效 結食反上 奔加大黃 桃仁 氣虛合四君子湯 血虛合四物湯 雜方燒針丸 枳
糠丸 紫金錠 霞天膏 神仙奪命丹 古阿魏散 或靈砂燒酒下 或五十歲後 血枯 糞如羊屎 及年少不淡 薄
室者不治

關格 真嘔吐膈噎 淋症參看

關不小便格吐逆 經云 人迎脈大於氣口 數倍名曰關 上寒下熱中焦窒 關乃陽不下以寒在胸中塞而不
不出上下不通 三焦格亂 中氣不足 陰陽不能相榮 故既關且格 中虛者 補中益氣湯 加橘 吐提其氣
柳以升降之中 虛痰盛者 六君子湯 去赤如柏子仁 及麝少許 虛甚吐利俱不得者 既濟丸 吐提其氣
非為痰 關格與噎稍異 胃中覺氣有碍 欲升不升 欲降不降 故食 或治下焦不可執 古云 關格死在旦夕
少陽所至為嘔 湧溢食不下 言火逆上而為嘔 吐非膈上所生 獨為關非格也 大承氣湯下之 若但吐而
不得小便者 胃苓湯 有膏梁積熱 損傷北方真水者 滋腎丸 主之 忌用淡參 利水之藥 詳前淋症 凡關格
見頭汗 者死

瘧

瘧症虛柔實則剛 陽極則為剛 瘧多類 風症宜清熱 化瘧祛風 陰極則為柔 瘧多類 厥症 口噤不醒 通身
強 瘧病發則身強 不醒 癰病發則內外皆因 挾痰火 或外因風邪 或內因七情 皆必伏痰火 而後發 瘧
身軟 時醒 瘧相相 而實不同 內外皆因 挾痰火 或外因風邪 或內因七情 皆必伏痰火 而後發 瘧
星丸 姜汁 竹瀝 下 〇 風痰盛者 敗毒散 加防風 天麻 黃芩 全蝎 生薑 薄荷 或通聖散 加人參 柴胡 開服 毒
連知柏 竹瀝 童便 補而散之 〇 實火則胸滿 口噤 咬牙 腳攣 臥不着床 大便閉者 鬱悶諸虛 甚則亡七情
大承氣湯下之 仍忌風藥 蓋火為風燥之本 能治其火 則風自散 而燥自潤 矣 鬱悶諸虛 甚則亡七情
筋此等尤不可 純用風藥 經曰 諸瘧強直 皆屬濕濕極 反兼風化 制之實非風也 虛也 故又有言曰 虛

上海培葉山房校印

為本痰火外和為標氣虛者補中補氣湯加竹瀝或六君子湯加黃芪附子柴胡

癩 癩與癩狂相似但癩病時發時止和

癩有陰陽只是痰 痰內傷最多外感極少蓋傷飲食積為痰火上迷心竅驚恐憂怒則火盛神不守舍空

食項乃醒病先身熱脈浮在表者陽癩屬六腑易治病先身冷 時師何必究五三 癩久必歸於五臟肝癩

狀心癩面赤口張頭暈馬嘶難治若神脫目眩如愚痴者不治 小兒風驚食三癩見五卷 痰挾火與

驚多少 驚人多痰動則有聲沫出風痰星香散加全蝎三枚姜煎服或逆風祛痰丸五生丸 驚痰紫石

散 食痰醒脾散 瘦人火或面赤防風當歸飲或小調中湯加南星或滾痰丸瀉青丸牛黃清心丸龍

腦安神丸千金龍膽湯 瘦火俱盛者猪心丸溫酒下上吐下利去頑痰老痰為妙 通用斷癩丹活虎

丹 蟬蝠散 調中補北瀉東南 癩本痰熱挾驚宜寒藥清心降火化痰為主故古法用二陳湯加瓜蒌南

方之木但化痰必先順氣順氣必先調中頑痰膠固非辛溫熱藥為佐何以開導是以古方治驚癩皆有

溫劑又如錢仲陽治小兒癩經吐瀉及服涼藥過多身冷閉目不食後用益黃散補中能食次服腎氣丸

救癩之壞症亦可以為成法以

癩狂 癩狂痰火閉心堂都緣喜怒太無常 素問註云多喜為癩多怒為狂喜屬心怒屬肝二經皆火有餘之地

者葉氏清心丸金箔鎮心丸珠砂安神丸心風癩者牛黃清心丸逆風祛痰丸虛者加紫河車一具為糊

怒傷肝者益神導痰湯瀉青丸當歸龍薈丸因驚者抱膽丸驚氣丸丹溪云五志之火鬱而成痰為癩為

狂宜以人事制之如喜傷心者以怒解之陽明熱結膏粱味 鬱結於中大便閉者涼膈散加大黃下之

以恐勝之憂傷肺者以喜勝之以怒解之 陽明熱結膏粱味 鬱結於中大便閉者涼膈散加大黃下之

膏粱醉飽後發狂者三黃石膏湯加黃連甘草青黛藍板根或紫金錠 護議重陰與重陽 難經云重陰者

熱氣慄悍發狂者三黃石膏湯加黃連甘草青黛藍板根或紫金錠 護議重陰與重陽 難經云重陰者

久而不發狂者故取河間合一於前難經分析於後 癩者異常也平日能言顛則沉默平日不言顛則

神吟其則僵仆直視心常不樂此陰虛血少心火不寧大調中湯主之不時倒暈者滋陰靈神湯言語失

倫者定志丸悲哭呻吟者燒蠶退故紙酒調二錢草麻仁煎湯常服可以斷根 狂者凶狂也輕則自高

自是好歌好舞甚則棄衣而走踰牆上屋又其則被頭大叫不避水火且好殺人此心火獨盛陽氣有餘

神不守舍痰火壅成而然小調中湯三黃丸控涎丹單苦參丸狂則專於下痰降火則兼平安神養血

經年心經有 妄言未見如神鬼和崇由來痰作 視聽言動俱妄者謂之邪祟甚則能言半生未見聞事

指者不治 神昏不定非真有妖邪鬼祟大藥內服傷寒瘟疫條人中黃丸照依氣血痰湯藥為使或單人中黃亦好

服或單石菖蒲末猪心血為丸服亦好有婦人夜夢鬼來交者定志丸料加赤小豆水煎服有婦人月水

崩漏過多血氣迷心或產後惡露上衝而言語錯亂神志不守者此血虛神耗也宜宜靈神膏但不可純

服補心斂神藥血熱者小柴胡湯加生薑生地煎服百餘帖即安血迷心胞踰牆上屋歌唱無時者道遙

散加遠志桃仁紅花蘇木服後病退用平胃散少用厚朴倍加蒼朮升麻常服以絕病根又男子拔痰血

者陶氏當歸治血湯有卒中屍惡吐利如乾雲亂狀或狂謔如醉人有起心先知其肇或已死口噤不開

者急用湯寒門道魂湯灌之 即醒外法詳和丹灌鼻法

驚悸怔忡健忘 湯妙香散珠砂安神丸氣血俱虛人參養榮湯養心湯時時止者痰也二陳湯加白朮黃連遠志竹瀝

姜汁 怔忡因驚悸久而成痰在下火在上故也溫膽湯加黃連山梔當歸貝母氣鬱者四七湯加茯苓

遠志竹瀝姜汁或干味溫胆湯金箔鎮心丸停飲胸中痰涎有 又有健忘非質純精神短少痰相攻 怔忡

聲快不安者二陳湯加茯苓神檳榔麥門冬沉香或朱雀心 健忘三症雖有淺深然皆心脾血少神虧清氣不足痰火濁氣上攻引神歸舍丹主之亦有新稟陰翳不

足善忘者當大補氣血及定志丸如老年神衰者加減固本丸 三症通用歸脾湯仁氣散專授天王補

心丹壽星 咽疾 附失音骨鯁

癩 癩狂 驚悸怔忡健忘 咽疾

上海掃葉山房校印

種種咽喉總是火 咽喉氣之呼吸出入乃人身之門戶也一十八種雖後世強名亦不可不知一左蛾風兩箇生於喉間關下難治四蟻風舌下再生一舌五牙風牙齦腫毒成瘡六木舌風舌腫大如者執猪舌不能轉動七舌黃風舌上腫痛黃色八魚口風口如魚吸水不九塞喉風喉痺聚毒涎唾實而發寒熱關上可治關下難治十懸壘腫破十三纏喉風自順纏繞赤色寒熱十四松子風口內滿喉惡如猪肝張口吐物則氣逆關閉飲食不能十五崩砂疔口風自舌下牙齦上腫赤口內作骨如湯熱牙赤如爛亦能脫齒十六連珠風自舌下起初起一箇又起一箇甚者三五七九箇連珠生起十七蜂子毒或在臉腮洋爛或在喉關舌下作青色黃如蜂十八走注瘰癧風頸項結核五七箇皮膚赤腫作寒熱尋常咽喉痛者多是虛火噫腫類雖煩同歸於火蓋少陰君火少陽相火二脈並絡于咽喉君火勢熾則熱結而為疼為腫相火勢速則腫甚不仁而為痺痺甚不通而痰壅以死矣故曰一陰一陽結謂之喉痺一陰肝與心胞一陽少陽三焦四經皆有相火火者痰之標故言火則痰在其中矣言咽喉則牙舌亦包在其中矣

火有虛實從何知實火便閉胸必緊 實火因過食煎炒積熱毒煩渴二便閉滯風痰上壅將後解熱毒涼膈散加黃連荊芥石膏或古荊防湯防風通聖散三黃丸合化又風燥咽乾枯常如毛刺吞酸有碍礙毒散加黃芩半夏倍桔梗薄荷生薑煎服痰盛如石羔丸服此藥子服午攻午服子攻如嘔吐咯傷因食熱物及穀芒刺流風熱併與血氣相搏腫痛者消風散心薄荷全蝎或射

虛火便利 干渴半勞子渴木舌重舌者如聖金旋舌根腫者屬香砂丸時行咽痛者普濟消毒飲

亦微 虛火因飲酒動脾火怒則動肝火色慾則動腎火火炎上攻咽乾燥必二便如常少陰脈微則乾姜附子以為向導徐徐服之如痰甚者三陳湯料入青魚膽一箇其膽先以糯米入內陰乾為末姜汁調服亦可探吐或干婚湯曾服涼藥自利或聲音有壞者秘傳降氣湯救之暴感風寒則咽喉緊縮妨礙者紫梗半夏湯酒濁湯皆傷寒及陰症者半桂湯蜜附子通用甘桔湯利膈湯水梅丸犀角琥珀膏或單百草霜為末蜜丸彈子大每三九新汲水化服凡咽喉不可純用涼藥草藥取功目前上熱未除中寒復起毒氣乘虛入腹胸前高腫上喘下泄手足攣攣吐引痰真捷法 繳法用青魚胆末繳三次紅腫即散足指甲青紫七日以後全不入食口如魚口者死 繳法用白礬半斤巴豆肉十枚同枯礬入內用引吐痰神効吐後用金鎖匙吹之常服甘桔湯最妙如無魚膽用白礬半斤巴豆肉十枚同枯礬入內一字 急用神針一發之愈有針瘡者姜汁調敷水時時呷之畏針者委曲針之凡關上血泡最宜關下不

見者今病人含水一口用蘆管削尖入鼻孔刺出血妙惟腎傷寒及咽中腫者忌針用蛇床子於瓶中燒烟令病人吸入喉中即愈**毒結開關還可救** 雄黃解毒丸龍腦破豆壓油紙上取油紙擦成條子點燈吹滅以烟熏入鼻中一時口鼻涎流牙關自開一方用巴豆肉以綿裹定隨左右塞於鼻中左右俱有左右俱塞立透蓋方中以巴豆治走馬喉痺者以熱攻熱熱則流通之意**喉失音者却難醫** 喉痺失音者秘傳降氣湯去痰皮加黃芩風寒失音者甘桔湯加訶子木通入生地尋常聲音不清者加味固本丸內傷虛損咽瘡失音者無治法○骨鯁用朴硝為末對入龍腦難蘇丸內為丸彈子大嚙化不過三五丸自然消化魚骨鯁食椒攪或以核為末順流水調服外用攤爪爬之自下餘詳七卷急批

虛類

發熱 附惡寒

發熱原無表裏症明是內傷虛損病 外感發熱人迎脈盛隨表裏見症汗下即解惟內傷虛熱經久不解勞役力倦倦昏神 湯內傷勞役發熱脈虛而弱倦怠無力不惡寒乃胃中真陽下陷內生虛熱宜補中益氣神昏恍惚眼燒者 湯○內傷色慾陰虛發熱便硬能食者滋陰降火湯加味逍遙散清骨散○內傷思慮歸脾湯從神湯 生冷鬱遏四肢甚 心熱肌膚不甚熱自汗不食者又鬱湯 書熱口淡是陽虛 勞役傷氣湯甚加附子上感下虛者清心蓮子飲 夜熱晝輕陰弱定 凡房勞思慮傷腎陰虛口中有味夜熱晝便龜板酸補其陰 陰陽兩虛熱無時 湯如臟冷藥熱脈浮者人參地骨散久虛積損者八物湯人參養榮湯甚者既濟湯去半夏加五味子當歸地黃八童便少許或二至丸八味丸二神交濟丹○抑論肥人及脈強大無力者氣虛於血宜甘溫補氣氣壯則能生血若瘦人及脈弦帶澀者血虛於氣止宜苦寒為主佐以甘溫若氣血平補後所附遂至浮散肌表而發熱實非有熱也 骨蒸傳變須防命 骨蒸因氣虛不嗜慾無厭陰氣耗散陽無所附遂至浮散肌表而發熱實非有熱也 骨蒸傳變須防命 骨蒸因氣虛不火自沸騰肉如針刺骨蒸煩燥或五心俱熱或兩肋如火或于午相應或晝微惡寒而夜反大熱雖腎經所主傳變不常蒸上則見喘咳痰血唇焦舌黑耳鳴目眩等症蒸下則見遺精淋濁泄瀉腰疼脚酸陰物

自強等症蒸中則見腹脹助痛四肢倦怠等症古云脾症發熱肉下骨上寅卯尤甚瀉青丸人中白丸心
 症發熱在血脈日中則甚單瀉心湯導赤散砂砂安神丸脾症發熱在肌肉遇夜尤甚瀉黃散三白湯肺
 症發熱在皮毛日西則甚瀉白散甚者涼膈散腎症發熱在骨亥子時甚兩手足心如火滋腎丸主之大
 要脈弦而濡者秦光扶蘇湯加味道遙散脈弦而數者節齋四物湯通用五蒸湯丸二參湯香連猪肚丸
 大胡連丸補虛煩內煩不得眠煩煩頭昏口燥乃心內煩躁無外熱也仍分氣虛血虛或大病後津液枯
 香散脾弱者三揆揆積尤難淨揆揆發熱者二陳湯加乾薑升麻人參白芍五味子揆揆發熱者清
 白湯詳見傷寒揆揆積尤難淨揆揆發熱者二陳湯加乾薑升麻人參白芍五味子揆揆發熱者清
 出痰涎然後服清熱化痰開鬱之藥古方蒼朮丸瀉甚者皮枯肢疼唇燥面赤痰嗽飲食少味者宜量體吐
 腹肚熱甚緊陳湯加山查麥芽乾葛久者保和丸和朮丸間服清骨散陰虛發熱黃白丸勞熱食積痰者
 上下甲丸因酒發熱者宜青黛承氣仁入姜
 汁每日服數匙最効凡發熱人極忌飲酒

惡寒陽虛不自任尋常外感惡寒頭痛微汗即止內傷表分衛虛惡寒者黃芪建中湯或調中益氣湯加
 晝夜惡寒甚者單用參芪桂枝內傷陽虛自汗全不任風寒者四君子湯減茯苓茶倍加黃芪桂枝或附子如
 惡寒者升麻葛根湯去芍加參附白芷草豆蔻蒼朮蔥煎服酒漸陰虛痰火盛陰虛微惡寒而發熱者二
 骨皮○拔痰濕惡寒者宜苦參赤小豆各一錢為末非汁調服探吐吐後以川芎南星蒼朮黃芩糊丸白
 湯下冬月去芍加羌活汁為丸調之○素病虛熱忽覺惡寒須臾戰慄如喪神守乃火炎痰鬱抑遏清道不
 能因痰腫理四物湯加黃芪黃連黃柏或合二陳湯如火剋肺酒漸惡寒者甘桔湯加酒芥山柅麥門冬
 五味子惡寒裏燥者四物湯加大黃下之病過服熱藥惡寒者先探吐痰後以通聖散加生地當歸或
 四物湯去芍倍地黃加白朮黃柏參芪甘草通一炒熟煎服如酒熱內鬱惡寒者黃芪一兩葛根五錢煎
 服大汗而愈○抑者內經論陰虛因勞倦氣衰則火煎胸中而生內熱陽虛則不足衛護皮虛而外寒陰
 虛則血脈不通而中寒陽虛則肢理閉塞而外熱仲景謂陽虛陰虛宜汗散其陰邪陰虛陽虛宜下瀉其
 陽邪東垣謂晝熱陽氣旺於陽分夜熱陽氣下陷陰中皆名熱入血室重陽者晝夜俱熱夜寒陰血旺於
 陰分晝寒陰氣上溢陽中重陰者晝夜俱寒再漢謂惡熱非熱明是虛症惡寒非寒明是火症壬水謂熱
 之不熱是無火也當治其心寒之不寒是無水也當治其腎噫寒熱陰陽虛實醫家大分幸四公發明經
 旨善學者必合而玩之始得

汗

自汗侵侵屬氣虛自汗者元陽真液因飲食驚恐房勞行動出汗者曰多汗不問昏醒朝夕侵侵出汗者曰
 以較其升發之性又欲其引參芪至肌表故不可缺也發亦有皮濕外邪初白痰症自汗頭眩嘔逆宜川芎
 厥者古芪附湯順元散間有氣血俱虛者黃芪建中湯
 身軟者濕也心主熱脾主濕熱相搏如地之濕蒸氣為雲霧為雨各職皆令有汗獨皮甘草水煎服多汗
 主耳宜調衛湯玉屏風散火炎上蒸胃濕作汗者涼膈散胃熱者二甘湯是知自汗亦有實者故外感初
 症亦多自汗風症桂枝湯加附子寒症古桂附湯暑症五苓散風熱相傳防已黃芪湯凡自盜汗全是陰
 汗久用參芪附子不效宜養心血或汗乾仍熱者必外感風宜參蘇飲兩止住服是反治也盜汗全是陰
分弱腎火脾濕心勞睡者出汗醒則漸收蓋睡則胃氣行於裏而表虛醒則氣散於表而汗止心火炎
 白朮腎火動其者正氣湯脾濕者四製白朮散肝熱者用防風龍膽草等分為末米飲調服心虛者用人
 參當歸各二錢半先用酒洗心火煮湯澄清以汁煎藥服思慮過度以致心孔獨有汗出者用艾湯調下茯
 苓末一錢或青桑第二番葉帶露採陰乾或焙為末米飲調服或古芷砂散通用黃芪六一湯加浮小麥
 壯爛麻黃根外用五倍子白礬為末津液調封臍中一宿即止或用牡蠣麥粉麻黃根藥本糯米防風白
 芷等分為末
 周身撲之

諸痿不痛火剋肺經曰諸痿皆生於肺熱肺熱葉焦脾弱着足痿躄色白毛枯曰皮痿五臟受之發為諸
 痿悲哀失志上發喘而下泄血乃心熱下虛也曰脈痿則筋脈筋脈居處卑濕肉蠕動而
 於地思色無窮或入房大甚日苦白淫乃肝熱膽津滲也曰筋痿則筋脈筋脈居處卑濕肉蠕動而
 口渴乃脾熱胃燥也曰肉痿則肌肉麻痺不仁有所旁行大熱而渴則陽氣以伐熱舍於腎水不勝火骨
 髓空虛色黑齒稿名曰骨痿則腰膝
肺傷木旺肢體廢肺被火傷則木寡畏而侮土則脾亦為之傷矣肺
 與春不舉骨痿不能起於床者死
 廢矣五痿總屬陽明陽明者宗筋之
 會也陽明實則宗筋潤而機關利矣瀉南補北是大經瀉南則肺金清而東方不旺脾不傷而宗筋潤矣
 清燥湯虎潛丸腎氣丸調利
 金水二臟治痿之大經也
慎勿深同風痺治痺乃風寒濕合脚氣寒濕而成緩風和深手足肢
 感宜發散痿屬內傷補血氣血虛者四物湯合生脈散加蒼朮黃柏牛膝下補陰丸氣虛者四君子湯加
 蒼朮黃柏黃芩下鹿茸四斤丸加五味子或五獸三圓丹又有瘀血妨礙者

上海掃葉山房校印

四物湯加參或兼濕熱或兼痰... 戒厚味 助火發熱故也素不能

厥

厥症不獨手足厥宗筋脾胃合為... 厥陰縮膝腰折

陽明腹滿顛狂發... 少陰心痛口舌乾

作嘔吐利不欲食則吐不得... 厥陰縮膝腰折

脈皆輔近宗筋寒厥則陰縮而... 太陽胸什足難行

四肢瀕赤而手足熱是六經之... 少陽耳聾脇肋疼

地陽明腹滿顛狂發... 少陰心痛口舌乾

不洽驚者死陽明厥逆喘咳身... 厥陰縮膝腰折

使人手足寒三日死... 外感寒泣暑相煎

閉內經謂之煎厥言熱氣煎... 內傷薄厥痰火挾

則血積於心胸內經謂之薄厥... 內傷薄厥痰火挾

散怒氣逆甚嘔血厥發厥者... 內傷薄厥痰火挾

煎服又青黛人中白香附為丸... 內傷薄厥痰火挾

者六君子湯加麥冬連竹瀝姜... 內傷薄厥痰火挾

山梔竹瀝肥人加人參卷汁凡... 內傷薄厥痰火挾

也總因濕色陰陽衰... 內傷薄厥痰火挾

獨在故手足皆寒宜十全大補... 內傷薄厥痰火挾

則為熱厥六經皆然... 內傷薄厥痰火挾

傷寒因衰不同而病... 內傷薄厥痰火挾

錯言妄語不可作風治先宜... 內傷薄厥痰火挾

用古參附湯入姜汁酒煎服... 內傷薄厥痰火挾

百壯身溫者生暴死者逆魂湯... 內傷薄厥痰火挾

正經所謂壯水之主以鎮陽... 內傷薄厥痰火挾

光益火之源以消陰翳也... 內傷薄厥痰火挾

癆瘵 癆瘵先須辨陰陽... 內傷薄厥痰火挾

者必陰陽兼病也... 內傷薄厥痰火挾

陰虛間有因外感久瘵... 內傷薄厥痰火挾

常不問陰病陽病日久... 內傷薄厥痰火挾

分輕重見血正血為本... 內傷薄厥痰火挾

其邪在肺也現有咯血... 內傷薄厥痰火挾

息知其邪在脾也當隨... 內傷薄厥痰火挾

平九嗽吐咳咯保和湯... 內傷薄厥痰火挾

湯太平丸靈肺湯肺痿... 內傷薄厥痰火挾

世白亦膏八珍湯腎氣丸... 內傷薄厥痰火挾

設身君子一月 癆瘵

癆瘵 癆瘵先須辨陰陽... 內傷薄厥痰火挾

癆瘵 癆瘵先須辨陰陽... 內傷薄厥痰火挾

氣得以相乘又飲食勞倦所傷則上焦不行下脘不通熱蒸胸中而生內熱凡頸上有核腹中有塊或當
弱則藥無由行但陽虛不可偏用辛香丁附之類陰虛不可偏用苦寒知柏之類水立有開關散定胃散
今亦難用竊其意推之○陽病開關清熱利便宜瀉白散加銀柴胡秦光桔梗木通澤瀉當歸芍藥木香
以小便多為病去○陰病開關行痰利氣宜二陳湯加便製香附貝母牡丹皮當歸山查蘇梗及生地木
香少許以氣清痰少為病減○陰陽俱用參苓白朮散○三白湯或二陳湯加白朮神曲麥芽以起脾胃如
有泄者尤宜多服久服俟胃氣轉然後依症用藥○古方以生犀散○防風久則平補火自熄○久虛精損成
散○十全大補湯○人參養榮湯○補中益氣湯○單人參湯○陰虛○加味逍遙散○滋陰降火湯○節齋四物湯○補陰
丸○天造丸○補天丸○虛甚者○瓊玉膏○百鳳膏○古云服涼者百無一生飲溲瀉萬無一死惟脾胃虛及氣血
弱者必以滋補藥中量入童便以代降火之藥今俗非偏用知柏生地滯脾則又偏用人參桂附助火治
咳輒用兜鈴紫苑款冬青黛壯燥收滋肝經治血輒用京墨金石寒涼傷其氣血退潮輒用銀柴胡黃
連消其肌肉遺精輒用龍骨石
脂滋燥其精皆不治其本耳
扶正祛邪亦亡
烏梅青蒿珠砂之類而蟲自亡矣○紫河車丹○紫河車丸
青膏膏○蛤蚧天靈蓋散選用○傳屍之說不必深泥歷觀癆瘵皆因酒色財氣損傷心血以致虛火妄
動醫者不分陰陽用藥病家不思病因自取往歸咎前入積惡其則疑及房室器血墳墓且冤業飛屍
遮相傳莊古人亦云癆瘵三十六種惟陰德可以斷之不辛患此疾者或入山林或居靜
室清心靜坐當焚香叩齒專意保養節食戒慾庶乎病可斷根若不遵此禁忌服藥不効
石改
財氣過遷善
天理回春
我有一言真藥

九蟲皆因臟氣弱濕熱薰蒸痰厥成
致中脫氣虛不運而成積積久成熱濕熱薰蒸痰厥成
行之氣變化而為諸般奇怪之形若腐草為螢是也九蟲一曰伏蟲長四寸許為諸蟲之長二曰蛔蟲長
尺許貫心即殺人三曰白蟲長一寸母子相生其形轉大而長亦能殺人四曰肉蟲狀如蘭香五曰蟲其狀
如蠶六曰蠅狀如蠟七曰蠍狀如蠟八曰蠍狀如蠟九曰蠍狀如蠟
泥炭生米茶薑椒
等物弱蟲令人多唾
瘡癰痔漏與腸鳴
疳積多蟲之為害
赤蟲令人腸鳴
又有感觸蠢動物心腹刺痛

藥不靈
或山澗蛇虺水蛭遺精誤飲其水或草木果品蟲聚其毒誤食以致
月間便能動作乃至過期不產或有腹痛此必蟲症確砂丸或萬應丸主之○血驚小兒最多大人經閉
間有蓋驚因積痰而成故也追蟲打驚丸不敢下者鈞蟲黑丸亦好但鈞後須服調脾和胃藥
下黑蟹爪明
凡蟲症眼腫鼻下青黑面色痿黃臉上有幾條血絲如蟹爪分明
傳屍癆蟲十八種
病與前人相似故又曰症化精血歸於元陽之內幻變種種最多古謂第一代蟲如嬰兒或如鬼或如蠍
三代蟲如蚊如蟻或如蟻如蟻或如蟻如蟻或如蟻如蟻或如蟻如蟻或如蟻如蟻或如蟻如蟻或如蟻如蟻
如蛇遇戊己日食起醉歸脾俞第六代蟲如馬尾有兩條一雄或一雌或如蠍或如鼠或如豬肝或如蛇
食起醉歸脾俞第六代蟲如馬尾有兩條一雄或一雌或如蠍或如鼠或如豬肝或如蛇
起醉歸脾俞第六代蟲如馬尾有兩條一雄或一雌或如蠍或如鼠或如豬肝或如蛇
則補脾取腎蟲後則補腎若病甚者不勞臟腑只用連病丹以斷其根又有輕者只用蠟蠟魚煮食或紫
河車丹陽虛者金液丹最妙○取癆蟲法先令病家用皮紙糊一室室不留些罅隙擇一老成人過渡以
安息香水酒其過渡之人身以雄黃雌黃塗耳目口鼻上安排鏡針一把布巾一箇用香油二斤以鍋盛
五更三點時一服藥後腹中疼痛如刀斧發不妨至已初必須下蟲或取下臭穢如膠漆或吐瀉膿血
痕塊皆於灰桶中其蟲或從汗出紫蠶苗狀或從耳鼻口中出或小便中出異般形狀不一或青黑或黃
紅大者急用鐵鉗取入油中煎當日將油紙聚蟲入瓦罐內石灰填實理於深山遠僻之處免再染人其
蟲色黃赤者食人血肉可六十日服藥補之蟲色紫黑者食人精髓病傳至腎可謂極
矣莫其萬一或為子孫除害則可又蟲頭白者亦難治此危氏說也丹溪謂不必深泥
癆蟲雖分五臟嘗居肺間正所謂膏之上膏之下針之不到藥之不行只宜早灸膏肓四花為佳若蝕肺
系則咯血吐血聲嘶思食無厭病患至此未易治療○又有應聲蟲每語喉中如有物作聲相應者有人
教誦本草至雷丸則無聲乃類
虛先溫補後追逐
體虛者俱宜先用溫補扶其元氣然後用王道之藥佐
服數枚而愈脈感蟲症見各條
或以蟲去而元氣亦散矣
實則吐下量體行
吐蟲痛減後煎甘草湯與之
和胃如有積自吐蟲者用
黑錫灰柳等分為末米飲下○下蟲用
諸蟲
取積藥苦練根湯萬應丸萬病解毒丹量體選用

求嗣

求嗣之理非玄微 山無不草木人無不生育婦人娶經調男子娶神足男子陽精微薄雖遇血海虛靜流存養無令妄動候陽精充實依時而合一舉而成矣人陰血衰弱難投真精不能攝入子宮雖交而不孕雖孕而不育是以男女配合必當其年未笄之女陰氣未完德感之婦所生多女性行和者經調易扶性行妒者月水不勻相貌惡者形重顏容媚者福薄太肥脂滿不可不知**精血無病交合時** 男精女血皆兼氣血子宮不能受精太瘦子宮無血精不能聚俱不宜子不可不知**精血無病交合時** 陽總屬腎與命門精血充成別無雜病宜交會得時乃成胎孕凡經盡一日至三日新血未盛精勝其血男胎成矣四日至六日新血漸長血勝其精女胎成矣六日至十日鮮有成者縱成亦皆女胎欲求子者全在經盡三日以裏於夜半子時生氣瀉精受胎必男斯時男女無暴怒母醉飽母食炙博身熱母用他術皆益陰陽和平精血調暢交而必孕孕而必育育而為子且壽後宜內遠七情薄五味大熱之物皆在所禁蓋子食後攝養一如胎前蓋母食熱則乳熱母食寒則乳寒母食膏粱則乳稠母食薄則乳稀乳稠則子難養乳稀則子難長氣以成形食母味以養精若無胎動胎痛漏血及風寒外邪不可輕易服藥亦不得交合觸動怒火生後寤慈清心為上策 寤慈則不妄交合精氣儲積待時而動故能有子凡心有所動即是慈心主血而藏神同歸腐濁而已安能發育長養於其間哉慈寤服藥陰陽得宜 若見命門脈微細或絕陽事痿弱法當神完不惟多子抑亦多壽故養生莫善於寤慈慈寤服藥陰陽得宜 若見命門脈微細或絕陽事痿弱法當是為相火妄動法當滋陰若或腎脈浮大孔緊遺精尿血法當補陰若帶洪數兼以瀉火若見腎脈微細欲絕別無相火為病法當滋陰若或腎脈浮大孔緊遺精尿血法當補陰若帶洪數兼以瀉火若見腎脈微細者還少丹打老兒丸精清淡者雀卵丸陽痿不舉命門脈虛欲脫者巨勝子丸壯陽丹腎氣丸壯來慢不能直射子宮者續嗣丹溫腎丸精漏無火者金鎖思仙丹陰虛有火者天造丸腎氣丸補陰丸虎潛丸四十以後縱有火動者只宜小兒絲子丸天門冬膏用知柏芍藥寒涼陰陽兩虛者八味丸二神交濟丹通種子大補丸玄北太極丸五子衍宗丸七製香附丸十味香附丸何首烏丸女宜鼓動微陽女金丹益壽丸大小烏雞丸調養經血四製香附丸七製香附丸十味香附丸何首烏丸女宜鼓動微陽女金丹益壽丸大小烏雞丸調養經血加味益母膏滋陰百補丸天造丸補陰丸依症選用不可慕方名之美珍藥之異而先自傷根板木亦不可過服熱藥以遺子患古云父吞剛劑子患熱淋且性燥多火男女皆然况造化之妙豈可專恃藥餌必也改過遷善懲忿窒慾人倫日用無所則肆買賣交易不致刻剝自然德可動天生子必賢且壽也

養老 附鬚髮

老人無非血液衰 兩腎中間白膜之內一點動氣如火如筋頭鼓舞變化開闔週身薰蒸三焦消化水穀外噴而出涕耳無聲而蟬鳴食口乾寐則涎溢洩不利而自遺**火動風痰百病推** 陽虛氣虛兩手脈大緊便不通而或泄瀉則對人瞋睡夜則獨臥惺惺此老人之病也**火動風痰百病推** 陽虛氣虛兩手脈大緊雖時有煩渴腦熱大便閉結但以平和湯藥消解切不可用苦寒攻瀉凡年老若水短少即是病進宜却病延年通聖散痰症二陳湯三子養清湯清氣化痰丸節齋化痰丸凡年老若水短少即是病進宜却酌湯劑當加溫補調停體弱以為養治宜補溫**和丸散可扶培** 任有外邪忌大吐汗下宜平和藥調之任中益氣湯補中氣丸平胃散竹瀝枳實丸**溫和丸散可扶培** 是衰老不宜峻補古方固真飲子神仙訓老丸通仙益壽丹拜金丹七仙丹反諸虛門養性延年之藥皆可選用服藥者只宜食治詳前二卷

鬚髮少陽髮腎水精不上白似灰 壯榮在鬚腎華在髮精氣上升則鬚潤而黑六八以後精華不能上精血藥以助之染掠亦非上策一染鬚方用大烏龜一箇鐵一盞盞內作熱龜在內旋轉不已自然撒尿五日後夜間以漆盞盛之用薄竹片置盞口通氣外放燈一盞盞內作熱龜在內旋轉不已自然撒尿髮一滾即止牛角罐收貯每用新筆蘸鬚髮表上多用則面黑○又方妙五倍一兩銅末四分生食益生白礬白麩各二分為末濃茶調膏搽鬚上候鬚乾以手擦下○內服烏髮丸胎髮青益各四兩共入罐內封固火煨三炷香久冷定取出為末用何首烏冬青子九蒸九晒早蓮草枸杞子生地當歸白茯苓各四兩入茶匙因下血多而鬚髮易白者尤宜神金丹亦妙○因吐衄失血多者瓊玉膏○因房室損精易白者還元丹還元秋石丸女貞丹有火者天造丸○因酒痰瘡癩等疾衰白單蒼水膏加味蒼水膏○皮膚肌骨有風痛痒者何首烏丸陽虛者却老烏鬚健陽丸延年益壽不老丹有火者八仙添壽丹是知烏鬚亦必因症用藥若不顧臟腑專務鬚髮**鬚髮脫落非因老內風血燥亦奇哉** 年老髮落鬚長常也少壯有肺痿內風妄動故也腎氣丸單天門冬膏主之內風甚者柏葉煎單方用自已髮或胎髮童男女髮洗淨泥固煨過為末空心酒下一二分兼烏鬚髮入補藥尤妙外用黑附子蔓荊子柏子仁等分為末烏雞脂

搗勻瓦罐封固一月取出
塗之即生餘詳癩風條

醫學入門

卷五

五

編註醫學入門外集卷之五終

西村正齋印

