

校正增圖醫學入門

埴葉山房石印

ヤ 9

1145

7





編註醫學入門外集卷之六

婦人門

經候

經病百端血滯枯... 或內傷生冷七情鬱結... 動邪氣盛而津血衰... 相搏變為水腫... 於內變為癰疽... 亦有虛熱故重則經閉... 因飲食熱毒或暴怒... 勞役憂思却宜溫和... 峻行則行氣滯道至... 若氣亂則調氣冷則... 叔和血旺氣衰不知... 偏性鄙婢妾志不得... 人仙藥經曰邪氣盛... 濕以不致或寒或暑... 皮青皮加黃芩或歸... 火者更加黃芩或小... 湯下枯傷勞食或作... 朴五錢空心水煎或... 木黃芪便製香附當... 婦人門 經候

醫學入門

卷六

婦人門 經候

上海婦葉山房校印



91-1994

粘住血海地位經閉者導痰湯加川芎黃連不可服地黃泥隔故也如用須薑汁炒過○胃熱消渴善食
 漸瘦津液為熱燥渴者宜瀉胃熱四物湯合調胃承氣湯名玉燭散再合涼膈散名三和散輕者小柴胡
 湯合四物湯去人參半夏加天花粉○素虛形瘦口燥善食厚味鬱為痰火有潮者道遠散如脫血入房
 黃芩無薄荷四物湯加桃仁紅花或加味養榮丸大藥肥人多氣弱有濕痰瘦人多血法有火脫血入房
 胞氣竭○少年大脫血或醉後入房氣或產育過勞助胎及多產育傷血或誤服汗下壯戍之不通天
 概只如此○虛熱痰氣四症而已不調亦大相同隨症調治飲食調和自然血氣流通更有疑滯然後可用
 液流通苟不務氣血充和而惟以毒藥攻通經丸之類虛者只用當歸散以通之通後又須養血益陰使津
 乞巧必死而後已○以上言經水不通以下言經水不調不調前後色何如○以期言之對期者性血不足
 為害以色言之主血陰從陽故以後期來少血不足○升麻瘦人只是血少四物湯倍歸地少加桃仁紅
 花肥人多痰二陳湯加南星蒼朮滑石芎歸香附○來少色和者四物湯點滴欲閉朝煩脈數者四物湯
 去芎地加澤蘭葉三倍甘草少許十味香附丸內寒血溢來少或日少五六日以上者四物湯加桃仁紅
 花牡丹先期來多血有餘○四物湯加黃芩柴胡香附肥人清海蒼朮丸如痰連白朮○來多或日多五六
 皮花丹先期來多血有餘○四物湯加黃芩柴胡香附肥人清海蒼朮丸如痰連白朮○來多或日多五六
 日以上者內熱血散也○四物湯加黃芩柴胡香附肥人清海蒼朮丸如痰連白朮○來多或日多五六
 有火者固經丸肥人多痰者清海蒼朮丸或前或後氣血○一月再至當歸散調經散單丹參散林歷
 不斷邪未疎○時行時止林歷不斷腹中作疼乃寒熱邪氣客於胞中留滯血海外痰也○如有積下利不定
 腹痛者半時散或行或止○心膈下逆氣上攻胸膈欲嘔者桃仁散或用當歸四錢乾漆三錢蜜丸服如腰膈
 湯和之有月事頻數者四物湯倍芍藥加黃芩有經行不止者四物湯加地榆阿膠膠芥熱者倍黃芩或
 經丸固熱色紫甚則黑淡因痰滯濕模糊○色紫者風也黑者熱也○淡白者虛也○或挾痰停水以混之也
 作片色不變者氣滯也或風冷乘之也○色變紫黑者血熱也○大抵紫者四物湯加防風白芷荆芥黑者
 四物湯加芩連香附淡白者古芎歸湯加參芪白芍香附有痰者二陳湯加芎歸如煙塵者二陳湯加秦
 先防風蒼朮如豆汁者四物湯加芎歸湯加參芪白芍香附有痰者二陳湯加芎歸如煙塵者二陳湯加秦
 索積殼陳皮隨症選用○通用琥珀調經丸百子附歸丸黑附丸○外症潮熱內腹痛○月水循環不
 以必先去病而後可以滋血調經就中潮熱痰痛尤為婦女常病蓋血滯積入骨髓便為骨蒸血滯積於中是

於中與日生新血相搏則為疼痛血枯不能滋養百骸則骨蒸熱於外血枯胞絡火感或痰氣食積寒冷
 外邪則為疼痛○潮熱有時為內傷為虛無時為外感為寔虛者大溫經湯熱者大溫經湯熱者大溫經湯
 散經前朝者血虛有滯道遠散加牡丹皮桃仁玄胡索經後潮者血虛有熱道遠散去柴胡換地骨皮加
 生地便炒黃芩此乃能加減退熱聖藥如桑白皮貝母結梗知母冬門冬咳血加生地山梔牡丹皮
 嘔血加陳皮半夏旋覆花噎膈加薑炒黃連或參連二陳湯尋常潮熱者腎氣丸大造丸或四物湯料加
 便炒黃芩各一兩○痛滯經前虛後呼○此言腹痛也經事欲行臍腹絞痛者為血滯四物湯料加玄
 製香附一斤蜜丸服○痛滯經前虛後呼○此言腹痛也經事欲行臍腹絞痛者為血滯四物湯料加玄
 氣滯烏藥丸氣滯血瘀者大玄胡索散或四物湯加桃仁紅花莪朮玄胡索香附木香發熱加柴芩經水
 將來陣痛陣止者為血寒四物湯加玄胡索木香黃連香附腿腹痛者內補當歸丸經水將行被風冷相
 搏繞臍痛者乃寒氣客於血室大溫經湯桂枝桃仁湯經水日來時痛者四物湯加陳皮玄胡索牡丹
 皮甘草○經後痛者為血虛八物湯小烏雞丸歷年血寒積結胞門嘔吐涎唾膈脹痛冷微引腰脊
 而痛者酒煮當歸丸大溫經湯○通用水腫經前血腫後○經水斷而後腫名曰血分乃痰血化水閉塞胞
 交加地黃丸滋陰百補丸七製香附丸水腫經前血腫後○經水斷而後腫名曰血分乃痰血化水閉塞胞
 通散○腎氣丸先浮腫而後經水不通名曰水腫分君丹皮加牛膝紅花有經閉腫者桑皮散○血風身
 痛痺皮膚○血風乃氣血虛而襲風冷身腫通血分君丹皮加牛膝紅花有經閉腫者桑皮散○血風身
 蒼沙丸加蒼耳白芍龜板金毛狗脊經後期者道遠散散皮膚瘙癢者四物湯加荆芥或古烏荊丸肌肉頑
 麻者烏頭丸上攻頭目暈倒者單蒼耳散頭項脊痛者柴胡調經湯頭身痛寒熱咳嗽怔忡一切雜症人
 參荆芥散素虛者安金丹史○養胃通心真要法○經曰二陽之病發心脾蓋衝為血海任主胞胎二脈起於
 國公浸酒方胎前產後皆同○養胃通心真要法○經曰二陽之病發心脾蓋衝為血海任主胞胎二脈起於
 為乳汁下為月水月水乃經絡之餘衝任氣枯則血依時而下憂思耗傷心血以致火炎血不歸肝而出
 納之用已竭母令子虛脾亦不磨而食少則肺失養水絕生化之源而經閉不調治者須知心為
 氣血之主心氣鬱結者宜調心血通心經而血自行脾胃為氣血之運飲食勞倦損其中氣以血少不
 行或行之間斷者宜平胃散四君子湯之類補養脾胃而氣血自生自運乃標本兼治法之良者也
 女扶陰抑寡居○女子十四衝任盛而月事下必近二十方可匹配可見陰氣之難成也或恣食鹹酸煎炒
 男思傷心血火炎脾虧肺燥腎枯而血閉成癆者十分難治宜四物湯加黃芩柴胡或道遠散加山梔芩
 連以養血涼血降火或腎氣丸加子芩紅花養陰梅子丸亦好因怒逆者四製香附丸加黃芩生地因驚

者抱胆丸經絕不通者瓦松散... 崩漏有虛亦有熱熱則流通虛溜泄... 崩漏

崩漏

崩漏有虛亦有熱熱則流通虛溜泄... 崩漏有虛亦有熱熱則流通虛溜泄... 崩漏有虛亦有熱熱則流通虛溜泄...

發如脾胃氣弱者補中益氣湯... 帶下赤白皆濕熱膈腹痛甚濕熱結... 帶下

帶下

帶下赤白皆濕熱膈腹痛甚濕熱結... 帶下赤白皆濕熱膈腹痛甚濕熱結... 帶下赤白皆濕熱膈腹痛甚濕熱結...

凡崩中帶下或用升提如升陽湯或用收澀如伏龍肝散白芷散然暫止而終不止者蓋衛司開闔而為榮血之主脾胃為血海水液之會衛氣與胃氣俱虛則血夜無所約制是以古方有用桂枝湯加附子以固衛氣者四君子湯加草果丁香木香以燥水健脾者或用理中湯加陳皮半夏或單半夏丸用芎藭煎湯下或補中益氣湯平胃散皆補衛厚脾使氣血日循故轍而不專於收澀以劫奪之也

癥瘕

癥瘕冷熱都是癥或因食積或鬱怒癥者堅而不走瘕者堅而能移七癥入瘕經亦不詳雖有蛇咬蟹肉以異於男子者皆曰疾瘕及經水行時或飲食生冷以致脾虛與臟氣相結或七情氣鬱生疾皆必挾瘀血而後成形要知癥瘕症瘕有癥瘕食積血癥食積血癥種種不一盡皆瘕塊之異名耳○經云大腸移熱於小腸小腸移熱於大腸兩熱相搏則血益而為伏瘕月事不和以此推之瘕瘕皆有熱者蓋瘕血亦有熱燥逼成况陽氣怒火蘊聚飲食濕熱拂鬱結成未可專以寒冷論也大概虛冷者內灸散琥珀丸溫白丸熱者消塊丸連羅丸外貼三聖膏神仙阿魏散久不愈者豬肝丸辰砂一粒丹神聖代針散○瘕血四物湯加桃仁韭汁甚者加蜀血根入玄明粉下之故桂枝桃仁湯外以韭菜搗餅熨痛處或萬痛丸地奴散○食積三稜煎得和丸紅丸于虛者百木膏補中益氣湯熱者天承氣湯加黃連芍藥川芎乾薑甘草或單黃連丸小調中湯加貝母薑汁糊丸服○鬱氣白葱散蟠葱散又製香附丸當歸龍薈丸○痰飲潤下丸或三陳湯加香附枳殼

結梗痰食積者白芥丸海石丸腹痛經閉如懷胎面黃寒熱夢無數瘕瘕得冷則發腹痛支滿胸脇腰胎之狀邪氣甚盛令人恍惚夜多異夢寒熱往來四肢不舉陰中生瘡甚者小便淋瀝或兼帶下小腹重痛面色黃黑入於子臟則絕產入於胞絡則經閉宜不參劑芥散小溫經湯通經散通經丸古班玄丸選用○血與氣併心腹痛連腰脇背脊甚則搖搖經候不調謂之血瘕宜立瘕瘕病治頗相同瘕瘕在腹內近胡索散手拈散失笑散單乾漆丸數症因痰瘀氣積者與上諸方通用瘕瘕病治頗相同瘕瘕在腹內近條筋脈急痛如臂如指如弦之狀名曰瘕瘕者偏僻在兩肋之間有腹脹不食亦可懼瘕瘕在腹內近腸胃可按血自通瘕瘕乃寒氣客於大腸與胃相搏大腸為肺傳送肺主氣氣得熱則行得冷則凝疑則移月事時下或多或少或氣病而血未病石症瘕胞經無路女子瘕瘕疝氣發則腹痛逆氣上衝乃胞中傷也宜二陳湯加香附以開之或香粉丸瘕瘕血結成久則堅硬如石瘕瘕子門大如懷胎月事不下乃先感寒氣而後血壅不流所致血瘕石瘕瘕瘕血結成久則堅硬如石瘕瘕子門大如懷胎聚湯瘕瘕瘕瘕香丹古硝黃膏石瘕瘕瘕見現丹主之或通經丸加紅花尤妙氣瘕血瘕瘕瘕如石水瘕瘕瘕瘕

治瘕者三虫聚而食血之象即瘕瘕之甚者肚腹急硬如石腫滿如水乃瘕結胞門或產後為水與血搏脹調氣破血漸消除虛者還宜補脾胃善治瘕瘕者調其氣而破其血消其食而豁其痰其痰其大半而止類名也愈後宜大小烏雞丸八珍湯交加散交加地黃丸調之凡攻瘕之藥病重者受病輕胃氣受之而傷矣或云待塊消盡而後補養則胃氣之存也幾希

胎前

胎前清熱與養血婦人無病月事時下乃能受孕氣血充實則可保十月分娩于母無虞若衝任不充偶後受孕或孕後挾熱及七情勞役動火輕則胎動不安重則過三五七陽月必墮火能消物故也月分依宜安胎丸常服以清其熱熱清則血循經而安行所以養胎也諺云胎前不宜熱良有以哉

經善調變各經氣血多少虛實不調則胎孕不安一足厥陰二少陽夫人之有生也母之血室方開父之精血乘冲氣自然旋轉不息如蠅螂之滾黃吞咬含受成一團圓旋幾九日一息不停然後陰陽大定立胎相包外似纏絲瑪瑙其中自然虛成一窠空洞虛圖與雞子黃中一火相似而團圓之外氣自凝結為胞衣初薄漸厚如彼未飲豆漿面上自結一皮中窠日生從無入有精血日化從有入無九日之後次九又九凡二十七日期一月之數窠自然凝成一粒如露珠然乃太極動而生陽天一生水謂之胚足厥陰

陰脉所主也此月經閉無潮無痛飲食稍異平日不可觸犯及輕率服藥○又三九二十七日期二月數此露珠變成赤色如桃花瓣子乃太極靜而生陰地二生火謂之輝足少陽脉所主也此月腹中或動或止能養胎而虛也二三箇月間忽心腹阻有孕明矣或偏嗜一物乃一臟之虛如愛酸物乃肝臟三四胞絡

三焦訣又三九二十七日期三月數百日間變成男女形影如清鼻涕中有白絨相似以成人形鼻與雌所主胎最易動舌苔未湯或為丸頓眼最妙如無惡阻等症胎乃太極之乾道成男坤道成女手厥陰脉相火更艾湯調服後腹中不覺動者則為輕病如覺微動者則為有孕或因驚恐墜胎氣不和轉動不能

臍腹疼痛者溫酒調下二錢加當歸尤妙如胎不安及腰背痛不可忍者古桂續丸○四月男女已分始受水精以成血脈形像具六腑順成手少陽脉所主多心腹膨脹飲食難消甚者用平胃散換白朮加香

附烏藥大腹皮如因驚怒動胎下墜小腹引腰脇小便疼痛下血者當歸湯四五

個月忽心腹癢痛者用大棗十四枚炒黑鹽一錢燒赤為末取一撮酒調服之立愈

五脾六胃七肺金

上海掃葉山房校印

癥瘕 胎前

醫學入門

卷六

胎前

始受火精以成陰陽之氣筋骨四肢已成毛髮始生足太陰脈所主○六月始受全精以成筋口目皆成足陽明脈所主五六月胎不安者安胎飲固胎飲選用○七月始受木精以成骨皮毛已成遊其竟能動左手手太陰脈所主如胎氣不安
八手陽明成竅穴 魄能動右手手陽明脈所主如胎不安者單砂仁罌砂為末米飲下止痛行氣甚捷但非八九
九腎十膀神氣完 身足少陰脈所主○十月受氣足五臟六腑齊通納天地氣於丹田使關節人神皆備足太陽脈所主惟手少陰太陽經無所專主者以君王之宮無為而已此兩月素難產者達生散素肥或及奉養安速太過者積甘散素怯弱者益氣救生散
半產須防三七 服養氣血固胎元之藥以補其虛損下月有胎先於兩箇月半後即服清熱安胎藥數貼以防三月之墮至四箇月半後再服八九九貼防過五月又至六
間有傷感并雜症 症婦傷寒詳見三卷○蘇飲去半夏熱服令肌體微潤而已風熱甚者雙解散去硝黃麻黃石羔○感寒胸滿欲嘔苦腹滿痛犬便清者大正氣散去半夏如吳阿膠○感暑肢骨煩渴尿赤驚揚嘔吐膈下苦急者香茹散合丁香木湯或十味香茹散○感濕脹脹身重者平胃散世者三白湯加砂仁厚朴蒼木內熱加黃芩○內傷七情湯帶不行者紫蘇飲○內傷勞役以後小腹常墮甚則子宮墮出者氣陷也補中益氣湯如因房勞者八傷湯加酒炒黃芪為君防風升麻為使○內傷飲食胸膈滿痛者平胃散或四物湯加麥芽黃連○內傷薑椒熱酒腥膻炙烤以致胎熱令母兩目失明頭痛腫項強者消風散或四物湯加麥芽黃連○內傷生冷水血或外又感寒以致胎冷不轉臍腹絞痛腸鳴泄瀉者宜從權以理中湯之劑治之泄甚加木香訶子陳皮白芍粟米中病即止○因感傷以致胎虛寒者八物湯加吳阿膠病原謂風冷傷於子臟而墮者此類問亦有之非常法也○雜病與男子一同但孕婦藥禁忌不犯則不動胎如子瘧熱多清脾飲去半夏夏寒多人參養胃湯去半夏久不愈者勝金丹截之胎前熱者古苓木湯黃芩湯虛者胃風湯香連丸傷冷瘧疾交作者醒脾飲子胎驚心中怔忡調治須知**三禁法** 婦人天癸未行屬少陽天癸已行睡臥不寐者疎砂安神丸虛者定志丸餘可類推
調治須知三禁法 婦人天癸未行屬少陽天癸已行病治厥陰經者是祖化之源也治無犯胃氣及上二焦為三禁不可汗下利小便是也汗則痞滿下則傷脾利小便則亡津液舊以四物湯為主如傷寒各經加減法例莫若外感時氣從四物湯合小柴胡湯陰症四物湯合理中湯古苓木湯傷寒最妙雜病四物湯四君子湯二陳湯加減四物湯合小柴胡湯陰者乃病邪重胎元實也豈可視為常法且陰陽和而後有胎凡胎家有病亦不必太攻也經曰婦人重身毒之有故無殞其胎其大半而止如陰陽調和者不可妄服藥餌三五箇月前一毫辛散滑利禁用七八月間倘有秘結乃散滑利又當審其素慎慎胎及難產斟酌用之
胎動心腹腰作疼

甚則下血如經行或因七情氣不順或因外感風寒疑受胎不堅或因驚恐或因喜怒不常或因衝任二致胎動而母心腹作痛甚則腰痛下血當安胎而母自定○胎動因七情氣逆心腹脹滿疼痛者紫蘇飲因外感發熱頭痛嘔逆胸膈脹滿者安胎飲如柴胡大腹皮氣血虛者安胎飲倍參未服熱者固胎飲○腹痛服安胎藥不止者須辨寒熱虛實寒者理中湯如砂仁香附熟者黃芩湯血虛胎痛者四物湯或平胃散加蘇鹽煎湯吞二宜丸氣虛痛者四君子湯加芍藥當歸氣寔心腹脹痛者用香附枳殼等分為末空心白湯下○心痛寒者艾葉小茴川練等分空心水煎或單豆蔻九熱者二陳湯去半夏加山枝黃芩○心腹脹痛素有冷氣腹痛衝心如刀刺者四物湯去地黃加茯苓厚朴人參吳阿膠枳殼甘草煎服酒少許煮汁飲之不飲酒者用鯉魚和粳米薑蔥煮粥十日一食善能護胎長胎○腰痛最為緊急酸痛者必欲產也因七情者紫蘇飲如杜仲續斷因閃角五錢火煎酒淬再煎再淬以碎為度研末酒調服○胎動下血者膠艾芍歸湯或加砂仁秦光卷栝桑蠅蛸寄生杜仲下血腹痛難忍或下黃汁如漆如豆汁者用野苧根全銀花根各五錢水酒各半煎服下血產門痛者用單黃連末一錢酒調服或因母病或壓產瘦弱痰氣血枯竭胎動者但治母病而胎自安矣如母有宿疾而胎不旺者長胎白朮丸有羸下之免害其分統又用紅酒醪五兩酒十盞煎二沸去渣分五服隔宿再服次早再服其子如糜令母肥或無疾或麥芽神麩煎服尋常古芍歸湯最妙○孕婦或從高墜下重物所壓致動胎元心腹脹甚下血者用砂仁罌砂勿焦為末熱酒鹽湯艾湯皆可調服覺腹中熱其健脾養血總安寧通古芍未易加胎即安胎家無所不治功同芍末如去血過多者古芍歸湯加膠艾健脾養血總安寧通古芍未易加豆豉寒加葱白或乾生薑少許熱加天花粉寒熱加柴胡項強加葱白濕熱腹痛加白芍腹脹加厚朴下血加艾葉地榆腰痛加杜仲驚悸加黃連煩渴加麥門冬烏梅思慮過加茯苓神疲嘔吐加旋覆花半夏歸勞役加黃芪氣喘去白朮加香附便燥加麻子仁素澀難產加枳殼蘇葉積墮胎加杜仲素血虛加芍歸此安胎之聖藥也凡卒有所下急則一日三五服緩則五日十日一服常服安胎易產所生男女又無胎毒蓋妊婦脾土運化遲滯則生濕濕則生熱故用黃芩清熱以養血白木健脾以燥濕安胎九金匱當歸散加味養榮丸皆此方而推之也

胎漏下血腹不痛胎動不痛者為胎漏血多為熱少為虛熱者下血必多內熱作渴者四物湯加白朮芍片者三補丸加香附白芍○血虛來少者古膠艾湯或合四物湯長胎白朮丸○氣虛者四君子湯加黃芩阿膠因勞役感寒以致氣虛下血欲墜者芍歸補子湯或下血如月信以致胞乾者母俱損者用熟地

炒乾薑各二錢 惟有犯房難救 胎漏亦有肥盛婦人 月水當來者或因登廁風攻陰戶者 雖不服藥亦為末米飲調服 或無恙但作胎漏 遂用滋藥治之 反墮 惟犯房下血者 乃真胎漏也 八物湯加膠 偶然尿血 莫糊糝 髮灰單苦 實菜飲亦妙 因暑者 益元散 加升麻煎湯下 稍虛者 膠艾四物湯 艾者用龍骨一錢 滿黃五錢 為末酒調服

惡心阻食名惡阻 或大吐或時吐瀉水 惡聞食臭 由于宮經絡結於胃口 故逢食氣引動 精氣瘦人多熱 二陳湯加竹茹 生薑 熱加芩連 亦有無陰并氣 弱無陰則嘔者 陰脈必弱 頭痛全不入食者 八物

肥人痰 因怒者 單黃連丸 從芩煎湯下 亦有無陰并氣 弱無陰則嘔者 陰脈必弱 頭痛全不入食者 八物

並加丁香 香薷 聞食氣多 吐少起者 旋覆花散 或因胎動別症 兼三四個月 病惡阻者 多因胎動不安 或味及會傷風冷者 醒脾飲子 兼傷食者 二陳湯加砂仁 香附 或單白朮 為丸 或單砂仁 為末 飲下 甚者 紅丸子 極効

子煩燥悶亂心神火盛 尅肺好生噴 五六月間 君火大行 俱能乘肺 以致煩燥 胎動不安 大抵相火盛者 單黃連丸 心神不安者 砂安神丸 煩甚 恐傷胎者 單胎散 散切不可以虛煩藥治 或有停痰胸膈滯 亦令

煩燥不宜 或有積痰 積飲 滯於胸膈之間 亦令煩燥 胎動不安 者 用

子懸 心腹脹滿 胎氣湊心 相火閉 謂之子懸 宜紫蘇飲 有許心腹脹滿 甚者 加莪朮 及丁香 香少許 不食

者 古芥末湯 倍甚 則悶絕 欲傷人 而火盛 極一時 心氣閉絕 誤藥 子死 不能動 胎此症 兩尺脈絕者 有誤服動

白朮 加芍藥 甚 則悶絕 欲傷人 而火盛 極一時 心氣閉絕 誤藥 子死 不能動 胎此症 兩尺脈絕者 有誤服動

唇爪俱青 全以舌為 胎水遍身 虛腫浮 胎孕經血閉 以養胎 胎中挾水 濕與血相搏 濕氣流溢 挾冷面目

引飲太過 或泄瀉 損傷脾胃 脾虛不能制水 血化為水 所制宜 五皮散 倍如白朮 腹大異常 亦堪憂 胎孕

為君 氣喘小便不利者 防已散 濕熱感者 單山梔炒 為末 飲調服 或單山梔丸 腹大異常 亦堪憂 胎孕

箇月 腹大異常 高過心 胸氣逆不安 胎中蓄水 所致 若不早治 必然具子 手足軟短 形 又有脚腫 或出水

體殘疾 或生下 即死 于母 難保 宜鯉魚湯 服至腫消 水散 為度 仍常煮鯉魚粥 食之

胞漿大盛故下流 甚者 平胃散 加木瓜 扶外感者 蘇散 自脚而腫 至膝 腿喘而妨食 甚至足指間有黃

水出者 謂之子氣 宜天仙藤散 如脚腫 腫者 腎著湯 手

胎孕中風名子癇 只因體薄 受風寒 發則口噤 痰涎壅 有時昏暈 胎難安 體虛受風 而傷太陽之經 絡後

痰涎壅盛 昏暈不識人 時醒時作 謂之鬼暈 又曰子癇 又曰癇 甚則角弓反張 小續命湯 如重者 異羊角

湯 輕者 四物湯 加葛根 杜丹皮 秦艽 細辛 防風 竹瀝 痰加貝母 陳皮 茯苓 甘草 或古芍活散 散如中風 寒犯

觸身 體盡疼 乍寒乍熱 胎不安 常苦頭痛 遠膝下寒 時時小便白 如米泔 或青黃寒 標腰苦冷

痛目視 眩暈者 四君子湯 去茯苓 加當歸 厚朴 杜白 薑煎入酒 調服 不省人事者 單劑芥散

子淋 溺澀 膀胱熱 胎孕飲食 積熱 膀胱以致小便 澀澀 又謂之子淋 宜古芍歸湯 加木通 天門冬 人參 甘

或腎氣丸 甚則大小便閉結 臟腑積熱 大便不通 者 用赤茯苓 枳殼 等分 大腹皮 甘草 或半葱 白煎服 或

從苓等分 為轉 轉弱閉痛 難當 轉弱閉痛 難當 轉弱閉痛 難當 轉弱閉痛 難當 轉弱閉痛 難當 轉弱閉痛 難當

六君子湯 去茯苓 採吐以提之 無他者 亦同 不可專用滑滲之藥 有素肥 感忽瘦 兩尺脈絕者 陰虛也

腎氣丸 主之 甚者 冬葵子 赤茯苓 赤芍 等分 水煎入髮 反少許 有熱者 古芥末湯 合益元散 服之 〇一

法將 胎婦 倒置 起其胎 不墜 其溺 自出 〇產後 有時 轉或遺尿 赤白 宜分別 胎孕 遺尿 古方 用白薇 白芍

亦有 虛有熱 赤者 屬熱 古芥末湯 加山茱萸

子瘡腹鳴自笑悲 胎孕三五箇月 以來 忽失音 不語者 胞絡 絡絕也 胞繫於腎 腎脈 胃舌 非藥 可療 分梳

〇腹中 免啼者 黃連 煎濃 汁理之 或青黛 亦可 〇有 胎燥 悲傷 傷感 發痘 胎命 必絕 胎前 患痘 用峻藥

嘔下 者 大麥 甘草 煎服 〇有 自笑 自笑者 紅棗 燒存 性米 飲調服 發痘 胎命 必絕 胎前 患痘 用峻藥

死 詳 諸症 濕痰 風熱 虛去 邪保 胎真口訣 阻痰 也 于煩 于淋 熱也 于癇 風也 于懸 氣也 轉弱 虛也 清熱 參

肝令子多厄食醬肉令子項短縮頭鴨子同桑棗食令子倒生心寒鮮魚同田雞食令子寤痘雀肉同豆
醬食令子生雀子斑食榜蟹橫生食薑芽令子多指食水漿令絕產食雀肉飲酒令子多淫無吐食茨姑
消胎氣食驢馬肉過月難產豆醬合雀菜食墮胎食山羊肉令子多病食鯽魚無鱗魚難產食諸般菌生
子驚風而天食雀腦令子患雀目勿安服湯藥勿妄用針灸勿過飲酒漿勿舉重登高涉險心有大驚子
必頭癩勿多睡時少步動和血脈勿勞力過傷使腎氣不足子必解頤
腦破不合衣母太溫食母太飽若脾胃不和榮衛虛損子必羸瘦多病戒之
造化玄妙古法於胎成兩月之內以斧置孕婦床席下懸弓矢於壁蓋弓矢斧斤男子事也勿令人知此
意恐不信者令待雞抱卵之時以斧置窠下盡是雄雞故胎教常令見王公大人亦此意也更佩雄黃一
二兩於孕婦身左或宣花亦可三法皆驗用其一可也○又後有月日
時遊胎殺雞不可泥然門戶床窠寔不可輕易移動求嗣者尤宜慎之

臨產

臨產切不可慌忙 十月氣足胎元壯健者忽然腹痛或只腰痛須臾產下何俟於催此易生天然之妙喜
服單益母膏免產後之患中間有體弱性急者腹痛或作或止名弄霜漿水淋瀝來少
名試水雖臍腹俱痛發動露項而腰不痛者切莫惶惶切禁洗頭直順且正逼近產門方可用力一送如坐草太早
陣密破水已後并腰痛眼中如火方可坐草須待兒頭直順且正逼近產門方可用力一送如坐草太早
用力太過產母困倦及至遲滯乃用催生之藥凡難產皆孕後縱慾及驕恣全不運動又食生冷硬物疑
滯或矮石女子交骨不開或腹大甚胎水未盡或臨產閉離之人驚恐產婦惡則精怯精怯則上焦閉
則氣逆下焦脹而不行紫蘇飲最妙 活血安胎未破漿 如腹痛漿水未破宜用古芍歸湯以活其血或
氣寔者瘦胎枳甘散氣弱者達生散 破漿已久猶難下 散血虛者古芍歸湯下名芍歸
散以固胎元切不可輕用峻藥徒滲水道反傷胎氣而 破漿已久猶難下 散血虛者古芍歸湯下名芍歸
產愈難產母亦聽其眠食自如但不可過眠過飽耳 破漿已久猶難下 散血虛者古芍歸湯下名芍歸
黑神散氣弱者四君子湯下名四君子神散橫逆側產每加麝一厘此時如舟在砂上須湧水而後滑利
可通服此藥後外用葱二斤搗爛鋪於小腹上用急水難頭砂一斗炒熱將布袱於葱上輕輕裹探
迅速要相當 催生有露頂順正而生猶遲滯者恐外感風冷寒暑所阻夏月熱產則氣散血沸宜五苓散
能下及服黑神滋藥又多者用清油白蜜等分豬肝煮汁調服或六一散七錢加葵子五錢為末每二錢
熱服有庄難日久小乾及觸犯惡氣心煩燥悶者充腦丸腰痛心煩者用人參乳香各二錢辰砂五分為
末難子清調薑汁化開冷服○已上橫生露手足露足徐徐推上任洗娘橫者兒先露手原因腹痛兒身
正產報難之法已下橫逆側得之法(橫生露手足露足徐徐推上任洗娘橫者兒先露手原因腹痛兒身

當令產母安熟仰臥洗母輕手徐徐推兒稍上漸漸以中指摩其肩推上又攀其耳而正之服芍歸黑神
散固血生血須待兒身正直且順臨門服何膠滑石葵子為末溫酒入蜜攪勻服之然後方可用手送下
○逆者先露其足因母氣之關健不牢用力太早致見逆來當令產母安熟仰臥洗母徐徐推足入去分
毫不得驚恐服芍歸黑神散固血活血候兒自順若經久不生却令洗母輕緩用手推足令就一邊直上
令兒頭一邊漸漸順下多服芍歸等藥直待兒身 坐產露腎高攀手 坐者先露其腎當高處牢繫手巾一
轉門路正當然後用三退散調服方可用力送 坐產露腎高攀手 坐者先露其腎當高處牢繫手巾一
屈足良久 嬰兒面貼頂救盤腸 盤腸者小腸先出急用熱水浸軟舊布蓋住小腸不可包托外用醋半盞新
兒即順生 嬰兒面貼頂救盤腸 盤腸者小腸先出急用熱水浸軟舊布蓋住小腸不可包托外用醋半盞新
聖膏貼住母頭頂中心腸上即拭去內兼服芍歸參芪大補之藥加升麻防風以提之末有不收者又有
久而為風吹乾不能收者用磨刀水少許火上溫過以潤其腸後用好磁石煎湯一盞服之其腸自收
碍產兒肩膊帶絆 碍者因兒身番轉帶絆住其肩難露正頂而不能生當令產母仰臥洗母輕輕推兒
下 露額側來墜腿尻 側者因兒方轉身被產母用力一逼以致兒頭偏墜左腿忽偏墜右腿或露左額角
手正其頭直向人門然後用力送下若是兒頭後骨偏墜道即令兒已露額當令洗母徐徐推兒近上以
援用手於穀道外畔輕按推兒頭上而正之服催生藥後即令產母用力送下此非洗母輕手巧妙不能
傷產鼻口翻紫 當產誤用催生峻藥傷母氣血急用安胎過日而產有種一年二年至四年五年而產
包丁燒存性入麝香一錢為末用秤錘燒紅淬酒調服一盞倉卒只以新汲水磨京墨服之墨水裏兒身
出或芍歸益母草葵心皆能逐瘀以開產路○有坐草之時驚時口翻吐沫者露臍丹○有屢石女
子交骨不開難產者龜壳散或古芍胎死母舌黑非常 外症指甲青黑脹悶不食口中極臭用平胃散如
歸湯○通用無憂散來麩散免腦丸胎死母舌黑非常 外症指甲青黑脹悶不食口中極臭用平胃散如
寔者大黃備急丸或單鹿角為末葱煎湯調服昏沉脈微者養正丹濃煎乳香湯下一百廿丸血乾或
有寒者四物湯下古桂香丸氣弱者催生五積散加麝一厘○雙胎一死一活者用蟹爪一盞甘草二兩
東流水十盞煎至二盞去渣入阿膠三兩分二三次頓服能令生者安死者出胞衣不下因血脹消痰和
氣信古方 皆因用力太早產下不能更用力送出胞衣停久被外冷所乘則血溢胞而不出腹滿衝胸
輕信洗母用手宜內服平膝湯催生五積散或用真血竭為末酒調
服甚者奪命丹外用如聖膏貼脚心昏暈危甚八角黑神散黑龍丹

產後

產後必須先逐瘀。正產體寔無病不藥可也。但難產氣衰血停留。非藥不行。古法一產後古芍歸湯加... 後上床仰臥不得側臥。宜立膝不可伸足。高枕厚褥。四壁無風。時以人為從。心括至膈下。如此三日。又不...

中帶表無過度

三白湯加乾薑陳皮黃芪滑石甘草。飲食成積痞者。內炙散晚晚丸。霍亂吐瀉煩。外感寒熱無時停。補...

寒身痛筋攣虛渴煩

桃仁木香等分。姜煎服。產後諸風。痰弱筋攣無力者。血風丸。或煎服。煩渴氣虛者。生肌散。血虛者。四...

二卷身痛筋攣虛渴煩

花粉三錢。甘草五分。糯米姜棗煎服。虛煩者。用人參麥門冬小麥。淡汗多。大便偏閉。固者。古歸散。湯汗...

指厚枚鹽。上以艾炷灸之。熱氣入腹。即通。熱者。不語。敗血濕痰。迷強。不能言。語者。七珍散。四味散。有臨... 產後風痙。不語。敗血濕痰。迷強。不能言。語者。七珍散。四味散。有臨...

劑攻一切雜症補榮衛。產後雜病與男子一同但常兼補兼逐痰則病無不愈丹溪云大補榮衛為主雖利作前一同(西物湯)加桃仁黃連木香主之理急甚者通玄二八丹。咳嗽多惟鼻血黑如煤。產後氣血是瘀血入肺(古)二母散加桃仁杏仁參茯苓水煎其餘以意會之可也。諸經不得還元故口鼻黑起乃變鼻衄皆因發喘聲高難救護。產後氣喘由榮血暴竭氣無所主獨聚於產後虛熱所致胃絕肺敗犀角地黃湯救之。陰門腫突腸不收。產後陰肉兩旁腫痛手足不能舒伸者加蘇木少許救之若散血停滯脹肺喘者用血。陰門腫突腸不收。產後陰肉兩旁腫痛手足不能舒伸者戶兩旁良久即愈。因產用力過多陰門突出者四物湯加龍骨未少許連進二服外用草麻子搗爛貼頂少收即去草麻。產後生腸不收。四物湯加防風升麻須用酒炒黃芪為君外以荆芥香椿皮煎湯洗。子宮脂膜休蓋。產後下一物如合鉢狀有二枚者子宮也補中益氣湯去柴胡連進二貼即收。臨產驚動用力太過以致瘦所致有粘席不得上者乃脂膜無妨補中益氣湯去柴胡連進二貼即收。臨產驚動用力太過以致脂膜有傷垂出肉線一條約三四尺長牽引心腹痛不可忍以手微動之則痛若欲絕先服失笑散數貼仍用生薑三斤洗淨搗爛以清油二斤拌勻炒令油乾焦為度却用熟絹五尺摺作數層方令穩重婦人輕輕感起肉線使之屈曲作一團納在水道口却用絹袋兜前油蓋稍溫傳在肉線上薰之覺薑冷又用熨斗火熨熱常使有薑氣如薑氣已過又用新薑如此溫熨一日一夜其肉線已縮入一半再乳汁不通用前法越兩日肉線盡入却再服失笑散古芍歸湯調理不可使肉線斷作兩截則不可治矣。乳汁不通氣血虛氣帶塞者戒鬱怒。產後氣血虛弱乳汁少者用鍾乳粉二錢蘆煎濃湯調理或用猪懸蹄一隻者清尿散。無子食乳要消者用麥芽二兩炒為末四物湯調服即止。凡乳母但覺小水短少即是病生便須服藥調理脾胃肝腎如不愈者必氣滯且逆也。益婦人凡事不得專行多憂思忿怒憂思過則氣結而血亦結忿怒過則氣逆而血亦逆甚則乳硬骨痛煩熱要之病皆怪疾乳長者有餘先賢治法仍因氣血鬱結所以古方多用香附砂仁木香檳榔青皮枳殼者行氣故也。怪疾乳長者有餘先賢治法仍詳具。產後瘀血上攻忽兩乳伸長細小如腸直過小腹痛不可忍名曰乳懸危症用川芎當歸各一斤水吸煙氣未甚縮再用一料則瘀血消而乳頭自復矣。若更不復舊用草麻子搗爛貼頂上片時收即洗去。附胎殺禁忌。凡胎殺所在不宜修整雖鄰家與動孕婦當避縱不墮胎令兒破形色青腫等象塞天殞。

胎殺所在。正月在房床二月在窗戶三月在門堂四月在竈五月在身床六月在床倉七月在確磨八月在竈已午日在門末申日在竈下戌亥日在房已上禁忌總要全不修理為高。

房中遊神。戊巳甲午巳未丙申丁酉日在房內北癸卯日在房內西甲辰乙巳丙午丁未日在房內東六戊六巳日在房中庚子辛丑壬寅日在房內南凡遊神所在忌安床換帳致重物於床中必主

生子所向方。子午卯酉日宜西南寅申巳亥日西北辰戌且未日東南難產以蘇葉煎湯洗臍腹陰門。

藏胎衣方。宜生氣方上正月子方二月丑三寅四卯五辰六巳七午八未九申十酉十一戌十二月亥方如生氣方有不便依歷日藏於奏書博士月德方上忌月空三殺太歲方上俗多置之河中者非

婦人終。小兒門。



觀形。小兒門觀形。上海掃葉山房校印。

察兜氣色 肝青心赤脾黃肺白腎黑凡病面無先分部位左頰青龍屬肝應春青右頰白虎屬肺應秋白

天庭 額高而離陽 應夏色 紅主大熱青乃肝風印堂青者人驚紅白者水大驚紅者痰熱印堂連準

應唇際 者皆虛 紅主渴 蛔虫咬心頭者唇必反人中候小腸喜深長至平兩黑者瀉痢死凡五岳赤者皆熱淡白

印堂 心積額角荒 心冷太陽位心熱面頰裝脾驚在髮際脾積唇唇應黃脾冷眉中岳脾熱穴太陽肺驚工

氣見而熱痰癰 青里驚痰黃青風疾 青色露而驚風怔悸如煤之黑為痛中惡逆傳似橘之黃食傷太

陰文武脾虛吐利 亦有白乃疴勞 為寒肺紫為熱熾 變黑青遮口角難醫 任里掩太陽不治 左太陽青驚

見安危 必死里色 痢疾赤黑吐瀉困倦 朱雀貫於雙瞳火入水鄉 睽睽執毒黑睛 青蛇遠於四白肝來

肺部 黃乃食積瀉痢而帶陽須防咳嗽而拖藍可忌疴痛方股面青而唇口撮驚風欲發面赤而目窳視

火 光燭燭外感風寒全 氣浮浮中藏積滯乍黃乍白疴積連綿又赤又青風邪癱瘓氣之顛門成坑

紅色驚熱夜啼紅腫驚風痰熱前頭 血衰頭毛作穗 髮黃焦稿者疴熱 肝氣眼生暖淚脾冷涎流滯頭正

風氣二池如黃土則為不宜 風池紅有風疾將發發搐 左右兩頰似青登則為客忤 驚風赤者傷寒風門

黑主疴而青為驚 吐瀉方廣光滑吉而昏黯山中庭天庭司空印堂頰角方廣皆命 手如數物分肝風將

發 頭者死 面若塗珠兮心火似炎坐卧愛暖風寒之入伸縮就冷煩熱之攻肚大脚小脾欲困而成疴目

瞪口張勢似危而必斃噫五體以頭為尊一面惟神可恃 小兒諸病但見兩眼無睛光黑睛無轉運目睫

死或外若昏困而神藏於內不脫者生黑珠滿輪睛明者少病眼白多睛珠或黃或白者稟弱多病

目紅內赤者心熱淡紅者心虛熱者肝熱淺淡者肝虛黃者脾熱無睛光者腎虛白而混者肺熱況乎

聲有輕重之不同 聲輕者氣也弱也重濁者痛也風也高喊者熱欲狂也聲急者神驚聲寒者痰聲戰者

來不大大啼哭 啼有乾濕之類異 直聲往來而無淚者是痛連聲不絕而多淚者 病之初作必先阿欠 肝所

聲者內熱心神不安者氣熱聲聲者傷風 火之大發忽欲驚叫 乃火動氣虛必死夜半發 藜藿不同於膏

梁 韋布自殊於綺緞雖因外以識中勿刻舟而求劍 相兒壽夭歌身軟陽痿頭四破臍小臍高肉不就髮

能踞能行能立死 臍深色老 性尊持方是人家長命子

察脉 小兒初生至半歲看額脉 週歲以上看虎口三關 男子五 歲女人六歲以五指上下深轉分取三部診寸口三部脉

額脉 三指熱感寒 額前眉上髮際下以無名中指食中指 俱冷指三吐瀉臍不安 食指若熱胸中滿無名熱

者乳消難上熱下冷食中熱 食中指熱則上熱下冷 夾驚名中指詳看 若無名中指熱 便是夾驚之候

食指風氣命三關 男左女右以左陽右陰故也 然陰陽男女均有兩手亦當深驗左應心肝右應肺脾於

義者肺熱風痰夜啼風闕無脉則無病有脉病輕氣闕病重命關脉紋 五色惟有紅黃安 五色紅黃紫青

短小而色紅黃外症又輕則無妨若直射二關青黑外症又重者死 淡紅寒熱 表青驚積 曲者四足驚赤

能如變如紅黃之色紅感作紫紅紫之色紫感作青紫青之色青感 深青或大小 綠一直者是母傷食所致紫綠青綠或黑綠綠隱隱相雜似出不出主慢脾風 深紅疹痘是傷寒 赤紅傷寒

泄瀉○錢氏歌紫風紅傷寒青驚
白色疳黑時因中惡黃即困脾端
固紋響停食 細腹痛 多啼乳食不消
紋多則主氣不 固紋麗黑射驚
風頑 惡候紋黑如墨困重難治
口懸針青黑 風水 驚 疳熱
命關人驚多傳慢 困魚刺 此樣刺青
風驚
氣虛勞艱困水字 關肺 驚 疳積
回乙字 驚風盡屬肝 困曲虫
肺病疳積 關大腸穢 困肝
胃 氣 疳積 總如環回流珠
點 膈熱三焦 霍 吐瀉腸鳴
自 回長珠寒熱 腹痛 積團
口來蛇乾嘔臟腑
滯 左手則 回去蛇昏睡瀉瀉瀉
區弓反裡形感寒熱 頭目昏重
心神驚悸 倦 口反外心神恍惚
問食風痼 症候絞細彎曲入裡者
病雖重而症順猶可用力
若勢子反出外駁駁靠於指甲
者斷不可回 其有三關紋如流珠
流米三五點相連或形於面
或形於身危症尤甚 四氣疳
向裡風疳向
外 回斜左傷風斜右寒
困雙鈞三曲傷冷硬 困脈亂如虫疳
蛔攢 口鎗形痰熱驚風
搐 困雙字食毒 驚積難

孩兒三歲至五歲一指三關定其息
浮洪 浮緩傷風洪緊傷寒
人迎 緊盛傷寒氣口緊盛傷食
風盛數多驚 虛冷沉遲 寔有
積脈緊如索 是風癰沉緩須知乳化難
腹疼緊弦牢寔 便秘沉而數者骨中寒
弦長多是隔干風 者氣
不和緊數驚風四肢掣浮洪胃口似火燒
單細疳勞洪虫嗜虛濡有氣 和更兼驚
守金脈吼多利大便血變
蒸脈亦隨時移伏遲寒嘔無潮熱
伏結為 前大後小童脈順前小後大必氣咽
小大不均 四至洪來苦煩
滿沉細腹中疼切切滑主露濕冷所傷
弦長客忤分明說 五至夜甚浮大晝六至夜細
晝別純陽六至 號平 和五至虛四至病三至晚七至八至
吐乳 脈浮大身溫順沉細身冷逆疳勞
脈緊數臟寔順沉細脾 吐小逆重痛脈緊滑身溫順浮大唇青逆餘病順逆同大人

五臟形症虛實相乘

肝風 氣熱為外傷風 目直 熱則兩皆俱緊不轉凡目直兼
青者必發驚咬牙甚者亦發驚 手指捻 肝主謀故指衣領亂捻物風甚身強反
導赤散渴 虛則咬牙阿欠兼 壯熱而搐利驚丸涼驚丸肺乘肝賊邪氣盛阿欠微搐法當以腎氣丸補肝
瀉白散瀉肺脾乘肝微壯多睡身重發搐先以瀉青丸定搐然後隨所見症調治腎乘肝虛邪增寒阿欠
發搐羌活膏所謂乘者猶乘車之乘五臟相乘莫測如肝病必先治肺補腎然後審肝臟虛寔而調之餘
臟故 心驚 難言合面臥 煩熱上竄舌強欲言不能吐哭胸熱故欲 虛則困卧驚悸添 溫驚丸肺乘心喘
乘心風熱大羌活湯下瀉青丸脾乘心身 脾困 倦 身熱渴不食 寔則困睡不露睛身熱渴欲飲 虛則吐瀉
熱瀉黃散腎乘心恐怖惡寒疎砂安神丸 困 倦 身熱渴不食 寔則困睡不露睛身熱渴欲飲 虛則吐瀉
風生痰 虛則吐腥泄瀉白色多睡露睛四肢漸次生風或有痰錢氏百未散異攻散理中丸肝乘脾風泄
嘔嗽 振擲大黃煎湯下等牛 肺燥 喘 鼻乾 手搥目 寔則喘而氣盛或渴瀉白散潤之手搥眉目鼻面者甘
丸腎乘脾惡寒而泄理中丸 肺燥 喘 鼻乾 手搥目 寔則喘而氣盛或渴瀉白散潤之手搥眉目鼻面者甘
氣喘嗽瀉白散 虛則唇白 少氣喘無厭 氣硬長出少氣先服益黃散而後何膠散心乘肺熱而喘救先腎
大青膏主之 虛則唇白 少氣喘無厭 氣硬長出少氣先服益黃散而後何膠散心乘肺熱而喘救先腎
肺增寒嗽清利百步丸脾乘肺體重痰嗽 腎寒畏明 顧自解 胎氣不充則神不足目多白睛畏明顧自
世瀉四君子湯加藿香乾薑木香甘草 腎寒畏明 顧自解 胎氣不充則神不足目多白睛畏明顧自
有因病而致虛者可補 下竄足熱火欲炎 下竄者骨重推欲墜下而縮身也足熱不喜衣履心火下於
為丸肺乘腎喘救皮滋寒百部丸肝乘腎拘急氣搐身寒理中丸脾乘腎體重泄瀉身寒理中丸凡本臟
虛弱皆鬼賊冠害當補本臟正氣假令肺病咳嗽當春補腎當夏救肺當秋瀉肺當冬補心瀉本臟乃名
治益肺病久則虛冷肝強寔而反勝也經曰受所制而不能制謂之真強法當先補脾肺而後瀉肝肺勝
者當補肝瀉肺然救入虛羸不可服瀉白散宜腎氣丸又肝病見秋肝勝肺也宜補肺瀉肝經者病退重
者唇白如枯骨者死肺病見春肺勝肝也心病見冬心勝腎也腎病見冬腎勝心也脾病見四臟順者易
治逆者難治五臟病機不離五行生剋制化之理所以有臟腑虛寔乘勝之病
世俗不審此理往往率指為外感內傷而用藥枉死此錢氏潔古之功大矣哉

死症

眼上亦脉下貫瞳人困絕顛門腫起兼及作玩絕心鼻乾黑燥絕肺肚大青筋不榮目多直視五臟俱絕不轉睛注指甲黑色絕肝忽作啞聲入肺絕也虛舌出口絕心啞齒咬人絕腎魚口氣急口如魚呷水之狀急肺絕啼不作聲肺

乳子調護

養子須調護看承莫縱馳乳多終損胃食壅即傷脾被厚非為益衣單正所宜無風頻見日寒暑順天時初生三五月宜繃縛令肚勿豎頭抱出六個月方可與稀粥亦不可將乳同吃五歲方可吃葷腥○養子十法一要背暖二要肚暖三要足暖四要頭涼五要心胸涼六要勿見異物七脾胃常要溫八啼未定勿便飲乳九勿服輕粉砂十少洗浴

小兒病機

大半胎毒小半內傷乳食十分之一外感風寒大率屬脾與肝多因脾胃嬌嫩乳食傷精則生胎毒類初生撮口 嘔口 疳風 夜啼 諸驚 慢驚 慢脾 馬脾 腐產 客忤 天釣 內釣 疝氣 變蒸 龜胸 龜背 解頤 滯頤 五軟 丹毒

初生

初生何故便需醫調生下啼聲未出急用錢裹手指與生甘草汁夏月用黃連汁拭口去其惡穢稍定更以蜜調火四圍燒存性若臍帶有五分入飛過辰砂二分半為末用生地當歸煎汁調勻抹兒上胎熱胎寒胎瘦胎肥胎熱因母食熱胎寒因母感寒或傷生冷胎瘦因面黃白睛多喜哭身肌肉薄大便色白屬胎肥宜預服長生丸極極積積各一兩木香五錢砂仁半夏丁香肉豆蔻全蝎各廿枚為末飯丸黍米大每五十九乳汁下寬上寔下補脾化痰止咳○胎肥生下肌膚血紅五心煩熱大便難宜用浴體法白粉青黛為峭此各一錢半天麻五分蝎稍砂各二分半麝香一字桃枝一握水煎十沸溫熱浴之勿洗

背腹瘦

背腹瘦胎寒身冷多瀉利盤腸內釣痛無時語者木香勻氣散或白羌散白羌木香官桂陳皮枳榔甘草各等分嘔如木瓜丁香香面青肢冷去枳榔加川芎當歸水煎量兒大小以綿蘸之或不能啼或腎縮綿紫包抱懷中未可遽斷臍帶且將肥衣置灰火中煨之仍作大油紙點燈於臍帶上往來遍帶煨之蓋帶連兒臍得火氣由臍而入更以熱醋湯澆洗臍帶須臾氣回啼哭如常方可洗浴并斷臍帶○有腎縮者乃初生受寒用硫磺吳萸各五錢為末研大蒜汁澄塗臍上仍生泡或身或無皮生下遍身如魚泡如水晶碎則成水流參者乃胎受寒濕也用以蛇床子燒煙微薰

奇

奇初生設道無孔者乃肺熱閉於肚門急用金銀玉簪看其端的處刺穿或用火針二便不通因不乳有刺不可深以蜜導法套住緊急只以油紙紙套住內服四順清涼飲免其再合

後面紅氣急

後面紅氣急眵淚阿欠二便不利或有血水甚則手足常搐眼常邪視身常掣跳宜連翹飲五福化毒丹梨漿飲○有不能飲乳者用黃連枳殼赤茯苓等分蜜丸乳汁下○有生下面赤眼閉二便不通不飲乳者釀乳方澤瀉五分生地四分猪苓赤茯苓天花粉茵陳甘草各二分水煎令乳母理去宿乳服之良久乳兒此釀乳法餘皆做此○有單小便不通者乃心氣積熱併於小腸急用生地龍數條蜜少許研勻敷陰莖上內用蠶退洗灰入硃砂腦麝少許為末麥門冬燈心煎湯若兼腹脹難支持大便不通腹脹欲絕調服○有不乳小便難者用乳汁四合葱白一寸煎三沸灌之

口口瘡急拭之

口口瘡急拭之白屑滿舌如鵝之口者心脾熱也用髮纏指頭蘸薄荷自然汁拭淨如不脫用保命散處吸唾三五處以紅赤為度便即自通生赤如丹生黃痘有生下身如丹塗者醫金散醫金枯梗甘草天後用藍葉淨水苔同研絞汁調朴硝土硃塗赤處○有生下肌肉紅白二腫後遍身面目小便皆黃大便不通謂之血疽因母受濕熱或衣被大暖所致宜回湯加天花粉等分水煎服兼以黃柏煎湯洗之

青鹽為末

青鹽為末噉之吐涎三日即愈大人亦宜○有口爛不能吃乳者用巴豆二粒入硃砂或黃丹土炒重舌少許同搗爛刺小兒顛門貼之如四邊起粟米包急用溫水洗去恐成瘡用葛蒲煎湯洗之立效重舌木舌牙齦白重舌心脾熱感附舌根而重生一物如舌短小而腫曰重舌着類裡及上脣曰重脣着齒齦日重齒當刺出血再生再刺不爾則脹滿塞口有妨乳食宜丹散黃連黃柏各一錢青黛

牙硝辰砂各二分雄黃牛黃礞砂各一分片腦二厘為末先用薄荷汁拭口後以藥末少許搽之咽瘡腫
塞者亦宜木舌心脾熱壅腫硬不和漸日塞滿口中亦能害人用黃柏為末以竹涎調點舌上甚者加
朴硝白鹽二症通用百草霜芒硝滑石為末酒調敷之○又弄舌舌絡微緊時舒出亦脾熱也○不可冷
藥當與瀉黃散漸服之面黃肌瘦五心煩熱者胡連丸犬病後弄舌者○有初生舌不生膜如石榴子
連於舌根令免聲不能發急摘管之微有血以髮灰搽之○連口內并牙齦生白點者名馬牙不能食與
鴨口不同少緩不能救急以針挑出血用京墨磨薄荷汁以母油髮裏手指蘸墨遍口擦之勿得食乳令
免睡一時醒後與盡皆母熱遺於兒

撮口

撮口聚面氣喘急胎家熱毒人心脾。撮口風面目黃赤氣喘喘聲不出胎熱流毒心脾則舌強唇青撮口
撮稍散竭稍四十九箇每箇用生薄荷葉捲定以綿扎之砂鍋內煎炒薄荷乾酥為度再入姜薑四十九
箇腦麝少許為末用紫羅雞肝二片煎湯調服治一切胎風及百日內撮口胎風如胎虛冷者如川烏熱
者另用辰砂膏○有初生七日患此者急看見齒齦之上有小泡如粟亦有脾肺虛寒者撮口氣不和也
米狀急以清軟布裹手指蘸溫水輕輕擦破即開口便安不用服藥
脾虛不能榮子故撮口氣急保命丹益黃散主之
口沫肢冷不可為口沫白沫四肢冰冷最為惡候一七見之必死

噤口

噤口不乳不能啼胎熱復為風搏之。噤口風眼閉啼聲清小舌上聚肉如粟先伏吮乳不得口吐白沫二
之所致宜瀉黃散疎銀丸○有初生口噤不開不收乳者用金頭赤足蜈蚣一條炙焦為末每
五分以猪乳汁二合和勻分三四次灌之或用竹瀝調牛黃末一字灌之更以猪胆汁點口中此症皆因
裡氣鬱吐痰利驚最得宜。噤口撮口一錢賦粉一字麝香少許為末每一字茶清調服或甘草煎湯探吐尤
穩却以猪胆汁點入口中即瘥次用人參養胃湯去蒼朮吹鼻噴嚏還可治
木半夏加木香蘇子與乳母服再用辰砂膏利驚即愈
吹入鼻中噴嚏可治
仍用薄荷煎湯調服
七朝見此十分危七朝見此症者危百日內見此症手足跳者亦不治

臍風 附胎風

臍風風冷濕氣流。臍風因斷臍後為尿乳所濕
臍腫腹脹四肢柔。其症臍腫或突腹脹滿或多啼搐防撮噤若日夜多
乳甚則發搐撮口噤口是為內疳不治凡臍邊青黑爪甲黑者俱死古方天利驚丸主之或用噤口條吹
鼻法有噤可治甚者金烏散金頭蜈蚣半條川烏尖三箇生麝香少許為末每半字金銀煎湯調服或外
科醫命丹一捻金炒如風搐間有熱者生可求○亦有熱在胸堂引引氣亦令臍腫千金龍胆湯小涼驚
稍定多啼煩燥者大溫驚丸○通心飲木通通連翹瞿麥山梔黃芩甘草各三分燈心麥門冬各少許
冷指甲刮薄貼臍處次日便消方服○通心飲木通通連翹瞿麥山梔黃芩甘草各三分燈心麥門冬各少許
水煎服通心氣利小便便通潮熱分水殺兼治筋脈風如春月加防風輝退夏加茯苓車前子秋加牛蒡
子升麻冬加山梔連翹行氣加鈎藤川棟子口瘡加生地野苧根○通心飲法治臍中血水汁出或赤
腫痛當歸為末或白石灰末蝦蟇沖頭髮燒灰皆可敷之○灸肚筋法兒生七朝患此者必自發出青筋
一道行至肚上截六疔青筋自消必治○痙攣法藥方見第一卷凡初生下疔或行至生兩公處
三寸處以錢扎住却於錢外將臍帶剪斷片時去錢待血流盡看近肚處臍有兩小孔一大孔用鴉毛管
送煉藥一二分入大孔內以手指輕輕揉散艾火臍頭三疔結作結常腰裏切不可時常揭看特
臍風急用銀簪於臍根傍刺破一二處入麝香末少許艾火灸三疔極妙
胎風痙症多嘔吐生者紅色注
臍風痙症用銀簪於臍根傍刺破一二處入麝香末少許艾火灸三疔極妙
眉頭胎驚痙風乃孕婦嗜慾忿怒驚撲或外挾風邪傷胎子乘母氣生下即病嘔吐搐掣口眼喎邪驚啼
胎風合眼與慢脾異不可妄用溫藥視其眉間氣色紅赤鮮碧者生青點黑者死治法解散風邪利驚化
涎調氣辰砂膏最妙○太乙散天漿子南星白附子天麻防風茯苓各二錢全蝎砂各一錢麝香少許
為末每五分乳
汁化下治胎驚

胎驚夜啼

上夜驚啼多痰熱仰身有汗赤面頰。月內夜啼驚搐者乃胎中受驚所致宜猪乳膏琥珀防風各一
丸驚有痰者龍丸驚有熱者涼驚丸龍腦安神丸等常邪熱夜啼者用燈花二顆為末燈心煎湯調抹
兜口中以乳汁送下日二服大概有痰熱者多半夜仰身有汗而赤心燥小便赤澀口中與腹皆
撮口噤口臍風胎驚夜啼

熱下夜曲腰必虛寒甚則內釣手足掣
夜啼氣虛者四君子湯加山藥扁豆煖熱加黃連竹葉血虛焦啼
也下夜曲腰必虛寒甚則內釣手足掣
者用當歸為末乳汁調服氣血俱虛腹痛夜啼者用黃芪當歸赤
芍木香甘草等分為末每挑少許看乳頭上使吮乳服之○有胎寒及衣被過涼以致寒凝腸內釣肚
腹脹痛啼則眼目上視手足搐掣蓋夜則陰盛寒則作痛甚則陰盛發躁所以夜啼宜保命丹輕者益黃
散外炒麥麩熨之凡下半夜曲腰而啼而目青白捫腹覺冷必胃氣腹痛也○有因驚受風邪而啼者二
散散活獨活各二分枳榔天麻麻黃甘草各一分水煎服或加南星為末蜜調可貼額門○有傷乳食
作痛而啼者
客忤中惡哭黃昏
有日夜驚啼必黃昏前後尤甚飲乳方啼爛口舌
有欲飲乳到口便啼身
消乳食丸
者乃客忤中惡治詳後客忤條
胎熱胎毒胎驚
得散且無奇疾要知類
瘡必喉舌腫痛宜用梅丸薄荷煎治之○凡初生月內多啼者吉胎熱胎毒胎驚
浴凍腹便成臍風不思生人異物則為客忤口驚啼乳食重服則吐瀉痰逆過暖則口舌瘡瘻過涼則
臟寒釣氣調理
之法適中而已

諸驚

神驚痰聚發風搐或因內熱風生肝
小兒元氣未充神魂未定或見生人異物或聞厲聲響氣憚人心之
而驚傷肝內生風而發搐痰涎壅盛風熱併作所以暴烈緊急心肝病也蓋心主熱脾主痰肝主風相因
而發謂之驚風痰熱可也謂之驚熱風痰亦可也大要驚熱者疎砂安神丸甚者涼驚丸虛者溫驚丸
痰感者辰砂化痰丸抱龍丸痰熱者痰厥丸驚風熱全者天麻防風丸古蒙石丸○又有驚積者受驚
日久而積成之也其症額汗喘息煩渴潮熱往來肚熱睡中覺腹內有物跳動瀉下如白脂辰砂是也治
法量與辰砂膏球導
內外夾驚成假搐不比真搐閉牙關
其有搐弱反張斜視而牙關不緊口無痰涎者
仍與調氣和胃而愈
內傷飲食壅滯或因食後遇驚謂之傷食夾驚身熱溫壯或吐不思食大便酸臭
非真搐內生驚癩也○內傷飲食壅滯或因食後遇驚謂之傷食夾驚身熱溫壯或吐不思食大便酸臭
先用人參羌活散加青皮紫蘇取表消積次用瀉青丸加辰砂蝎梢法風鎮驚食癖發驚熱者寬熱飲痰
積者白玉餅○驚食兩重四肢搐搦痰壅盛者先與利驚丸消導次服散脾胃○外感因驚虛風肝
乘入心肝二經或內有積熱外又感風俱謂之傷風夾驚神困昏憤頭疼口中氣瘴而熱先用醒睡散
蘇飲久參羌活散或大青膏選用微表次與天麻防風丸○通用瀉赤散五福化毒丹瀉青丸腎氣丸凡
驚風用水銀細粉巴豆芒硝霜腦麝蟾酥蜈蚣等劑往往由此變成慢驚難治沉驚播發熱若因內傷
外感痘瘡而作其害尤速宜用細辛羌活青皮乾羌荊芥之類以代腦麝發散獨活柴胡山梔枳殼大黃
之類以代銀粉巴豆通利蓋瀉青丸治肝熱尋衣直視或搐或不搐或臟腑發泄諸藥不止等症如驚熱

出於心者宜桑白皮葶藶赤茯苓車前子山梔甘草姜棗煎服從小便利之導赤散能瀉肝風降心火
最利驚熱或如山梔羌活大黃又有驚癱驚痢挾一切雜症者又當以意會之參用各門藥馬亦可也
搐有虛實有順逆
驚風痰熱四症輕者四肢搐搦而己重者牙關緊急搐頭齒視張口出舌角弓反張身
驚風之候寔熱為急驚屬肝木風邪有餘陽虛熱為慢驚屬脾土中氣不足陰虛慢驚本無熱所以熱
者虛使然耳故曰熱分虛寔○男搐左視左眼上竅女搐右視右眼下竅男握拳大指指出外女握拳大指
入裡五指交如差把者死男引手挽左直右曲女引手挽右直左曲凡此皆順反之則逆亦有先搐左而
後雙搐者但搐順則無聲搐逆則有聲其指紋形細彎弓入裡者順出外者逆出入相半者難痊故曰症
別逆治分先後與易難
當兼施並理一或有遺必生他症故曰治有先後○急驚屬腑易治慢驚屬臟難
治雖然五臟多傳變無非痰火併其間
驚邪入心則面紅臉赤夜啼入肝則面目俱青眼鼠入脾則面色
黑嚙孔咬牙○寅卯辰時搐者肝木旺也當以腎氣丸補腎瀉青丸瀉肝已午未時搐者心火旺也當以
腎氣丸補肝瀉赤散瀉驚丸瀉心申酉戌時搐者肺金旺也當以益黃散補脾瀉赤散瀉心瀉青丸抑肝
亥子丑時搐者水土俱旺之時小虛不旺惟土旺也當以益黃散補脾瀉赤散瀉心瀉青丸抑肝
變皆痰為患益痰乃風道火動則伏於脾胃火動則壅於肺痰火交作則為急驚或成喉痺痰火結滯則為
癩釣或為咳嗽痰火來去則為瀉青膏皆由脾胃而來所以驚風忌純用
風藥不問急慢當以養血藥為使古方保元湯加白芍為慢驚美劑也

醫學入門

卷六

諸驚

疳

上海葉山房校印

痰壅所以百脈凝滯調竅不通發時暴烈發
過如故百日内見此症二三發不愈者亦死先與和氣通關竅
凡搐痰因氣鬱氣順則痰化而搐自止矣
腦少許為末生薑汁調離藥於左右大牙銀上擦之牙熱即開次截風搐清心田
截風丸天麻姜薑南星
子防風味砂全蝎各一錢麝香少許為末發丸梧子大每一丸薄荷煎湯化下治驚風疳積○定搐散
蛇一條麻黃南星白附姜薑活代赭石蝎稍姜黃味砂各一錢麝香五分為末每一字荆芥蘇蘇煎湯
下治急驚定搐如搐不止
疳疔定痰熱尚不退下之只用抱龍丸
胆星一兩天竺黃五錢辰砂雄黃各二錢
煎湯化下一丸痰壅甚甚姜湯下
心虛傷人參琥珀煎湯下
蓋抱者保也龍者肝也肝應東方青龍主臟
魂魄安則驚自定理小兒諸驚四時感冒瘧疾熱邪致致煩燥不寐痰救氣急瘡疹欲出發搐常服

祛風去痰... 黃抱龍丸... 黃二分... 丸或半丸... 生條浴體法... 草各等分... 小兒脾困... 食吐瀉不止... 慢驚吐瀉... 足牽掣其... 或食乳或... 瀉得之為... 以吐得之... 各五錢每... 因下積取... 得者常解... 久痢傷寒... 麻南星一... 個南星一... 星已傳慢... 甘草川烏... 或蠟稍餅... 錢入砂鍋... 但礞硝雖... 忌下者靈... 麻子大每...

慢驚吐瀉... 神緩眼開... 搐搦乍靜... 又乍發身... 熱或冷面... 黃青眼半... 開或合似... 或食乳或... 瀉得之為... 以吐得之... 各五錢每... 因下積取... 得者常解... 久痢傷寒... 麻南星一... 個南星一... 星已傳慢... 甘草川烏... 或蠟稍餅... 錢入砂鍋... 但礞硝雖... 忌下者靈... 麻子大每...

慢脾風微... 搐眼全閉... 由慢驚後... 吐瀉損脾... 極故曰脾... 風逐風則... 無風可逐... 療驚則無... 驚可療但... 脾間頭... 低搖睡額... 汗多舌短... 或吐頻頻... 嘔口噤咬... 牙身冷不... 和以手摸... 人聲又小... 生胃回陽... 奈若何

馬脾風因... 肺寒甚痰... 嗽齶最危... 寒邪停留... 肺俞寒化... 為熱亦生... 痰喘促逆... 上氣肺脹... 齶齶俗云... 馬脾... 遂一錢半... 為末每一... 字用溫漿... 少許上滴... 香油若只... 痰嗽將發... 搐蘇保命... 使能痊

驚風三發... 則為癇... 症惡病闕... 五臟以驚... 風心癇面... 赤目澄吐... 舌心煩驚... 悸金箔鎮... 心丸或鎮... 心丸遠志... 雄黃

癇症... 凡外感夾... 驚亦宜此... 法防之

片為衣每... 一丸麥門... 冬煎湯化... 下肝癇面... 青上蜜手... 足拳抽掣... 反折散風... 丹胆星二... 錢羌活獨... 活防風... 天麻人參... 荆芥川芎... 細辛柴胡... 各一錢為... 末蜜丸梧... 子大每三... 九大者三... 四九紫蘇... 煎湯化下... 亦治剛... 症末棗肉... 丸梧子大... 每一丸杏... 仁煎湯下... 肺癇面白... 反視驚掣... 吐沫潮涎... 天星丸胆... 星全蠲蟬... 退各二錢... 半防風白... 附子天麻... 姜蚕各一... 錢半麝香... 五分為末... 棗肉丸菜... 豆大每三... 九荆芥生... 姜煎湯下... 體柔時... 腎癇面黑... 晦振目視... 人口吐清... 沫如尸不... 動腎癇湯... 獨活麻黃... 川芎大黃... 甘草各六... 分姜煎服

醒與症別風驚食癇治不同

小兒血氣未斂氣骨不聚為風邪所傷者名風癇屈指如數有熱生痰宜先
醒與症別風驚食癇治不同 球風熱後清痰散熱安神定搐散風丹因驚者名驚癇厥佈積驚啼吐
總宜先治驚然後清三焦去熱化痰散石散或定魄丸用青黛一錢為衣金銀薄荷川芎煎湯化下因
食者名食癇或食時遇驚停乳大便酸臭或結痞先寒後熱宜先消積然後治癇又有痰火作癇者宜吐
痰瀉火安驚紫霜丸用蠅頭煎湯下之或醒脾散為丸服諸癇通用荆芥穗二兩白芥一兩半生半枯
為末麩糊丸黍米大珠砂為衣每百丸姜湯下急驚三癇丹蜈蚣一條南星二錢全蝎防風遠志白附
子蘆薈玄胡索辰砂各一錢麝香一宇金銀箔各三片為末糊丸梧子大每一丸紫蘇草煎湯下凡癇
驚求復丹薄荷泡湯化下一二九得利即愈凡驚風對症用藥已効若覺未甚蘇省可再服數丸凡癇
症方萌起耳後高骨間必有青紋紛紛如錢見之急為爪破須令血出啼叫尤得氣通凡洗兒
衣不可夜露恐為睡鳥落羽所汚染觸其間未有不為癇也挾邪在者其色變易不常見人羞怕陽癇身
熱陰癇冷陽癇身熱搐掣啼叫仰臥面光唇浮病在腑易治陰癇身冷不掣不啼伏臥面黯脈沉病在臟
難治陽癇忌溫藥陰癇忌涼藥古方治陰癇用代赭石火煨醋淬為末每五分金銀煎湯入
金箔少清心豁痰是上工血滯心驚邪氣在心積驚成癇故以調平心經氣血豁痰為要也○通用豬心
許調下清心豁痰是上工丸或竹瀝丸白木蜜炒厚朴甘草水煎各二錢半附子犀角各一錢全蝎七個
後瘡不能言者用南星濕紙煨香為末每一字雄猪胆汁調服効○癇愈後復作者斷癇丹文桐氣血不
足者活
虎丹

一身強硬為症經終日不醒分剛柔

先譫語而發者名剛症當發汗 柔症理中剛麻葛 柔症理中湯三生
湯 通用斷癇續命投 斷癇丹小續命湯 詳雜病及傷寒門

客忤

客忤異物暴觸驚心氣不足遇人客或異物則 狀若癇風眼不窺吐沫痰癇喘腹疼雄麝于金龍胆灌
散雄黃一錢乳香五分麝香一字為末每一字刺雞冠血調灌之仍以母衣覆身即愈或鈎藤散于金龍
胆湯保命丹外用寇心土蚯蚓等分為末醋調為丸厚兜頭及五心詳前夜啼條○有中馬汗氣臭忤或
馬驚驚忤者用馬尾燒烟頻薰兜面以差為度或先用姜湯調下蘇合香丸交用豆豉水
濕搗丸雞子大厚兜頭上及足心各五六遍次厚臍心及上下良久聲聞自有毛即擲之

天鈞

天風外觸內熱痰痙因乳母受酸鹹天鈞屬陽由乳母酒食煎炒鹹酸過度毒氣入乳遂令牙兒心肝生
日天 搖熱眼翻如邪祟 壯熱驚搐手足抽掣眼目翻騰 甚者爪甲亦青藍通用鈎藤併保命 鈎藤散人參
全蝎天麻各二分甘草一分水煎溫服○風熱 挾食疎通和胃兼 寬積受驚肚熱脹硬睡中腹內跳動宜
勝者保命丹痰盛者抱龍丸熱痰者滾痰丸 挾食疎通和胃兼 寬積受驚肚熱脹硬睡中腹內跳動宜
藥治之此等不 可誤作驚風

內鈞

內鈞內臟抽掣痛 即鈞 原因胎驚胎風動 胎中風氣壅 眼有紅筋 身反張唇黑僵啼外腎腫吐瀉方子
外搗來內外兼攻寔可惡 誰知至寶鈎藤膏 鎮 疎風內外共 驚風內鈞腹中極痛僵啼面青肢冷
錢木香姜黃各四錢木蟹肉片一個為末蜜調成劑收砂罐內量兒大小加減鈎藤煎湯或四磨湯化下
次服五味木香散川練肉七個用巴豆州五粒去皮同炒豆黃去巴豆木香史君子玄胡索茴香各一錢
為末量兒大小加減未飲調下○內鈞冷痛者苦芎歸湯加乾姜肉桂等分丁香沉香青皮小茴減半水
煎服○痛甚者魏木散魏木五錢阿魏一錢先用溫水化阿魏侵我木一晝夜焙乾為末每一字紫蘇煎
湯或米飲調下○內鈞腹痛驚啼者乳香凡乳香五分沒藥沉香各一錢蠟稍十四個檳榔一錢半為末
蜜丸梧子大每一二九菖蒲鈎藤煎湯化下○內鈞陰腫便秘者歸牛散○已上皆調氣疎風之劑若驚
重者宜定魄 盤腸腰曲虫嘔攻 異古方用白豆蔻砂仁青皮陳皮香附義木甘草等分為末紫蘇煎湯下
丸以鎮之 處症亦與內鈞相似但虫痛攻心叶笑合眼嘔吐涎沫清水四肢羸瘦面青黃或寒或熱沉黙不知病
處發作有時為異化虫丸主之○一切積痛盤腸虫痛者通用沉乳感應丸沉香杏仁木香丁香各
一錢肉豆蔻一個百草霜一分巴豆十四粒為末酒煮過 中風不語似三種 盤腸虫症中風三種俱似內
黃蠟和丸菜豆大每四九姜湯或鈎藤煎湯下痢疾亦宜 鈞但中風不語為異治與大
人一同小兒有中風後瘡者不能言用木香陳皮甘草煎湯吞肥兒丸內有黃連能去心竅惡血故也
有肺風喘促涎潮竈視者用何膠紫蘇烏梅人參煎服蓋何膠能育神驚風後眼中瞳子不正者最宜

食乳難化大便青白此上寔下虛也宜益黃散後宜四君子湯隨主臟見症加減如吐瀉肢厥顛臨加
 藿香丁香脾胃虛生風多困加半夏夏越湯石于及冬瓜子少許驚啼瘳瘳睡臥不安加全蝎鉤藤白附子赤
 白痢加歸芍粟米白痢加乾姜粟泄瀉加陳皮厚朴傷風
 加川芎防風羌活細辛發渴加乾姜杜杷葉及木瓜少許
 有頭疼咳嗽氣促大概熱者宜先服大青膏或鈎藤散發散後服益黃散補脾冷者先服被濕腹脹弱不
 益黃散補脾後服大青膏或鈎藤散發散如吐瀉或瀉完穀者乃傷風甚也大半夏湯
 長○濕多身重腹脹小水不利平胃散主之虛者異政散○吐瀉作渴弱滋者五苓散
 散○壯熱體重吐酸瀉瀉者濕熱也羌活黃芩蒼朮甘草等分水煎服
 白色不渴者益黃散腹瀉者理中丸腹冷加附子○久不止者沒石子丸沒石子一個白豆蔻五個詞子
 二個木香黃連各一錢為末飯丸麻子大每十五丸米飲下兼治疳積瀉瀉○暑月吐瀉色黃引飲者誘
 行丸或玉露丸石羔寒水石各一兩甘草五錢為末糊丸黃豆大每九丸冷水下吐不止姜湯下○久不
 止者古連栢丸黃連黃栢各一兩為末入猪胆汁內煮丸菜豆大每廿丸米飲下○抑論二症多見於夏
 秋如立夏前後濕熱時行暴吐瀉者蘇葛湯夏至後吐瀉身熱或傷乳食瀉深黃者益元散合四苓散加
 蒼朮木為末溫水調服大暑後吐瀉身溫或傷乳食瀉黃白者食前服益黃散食後服益元散立秋後吐瀉
 身涼不食多睡多噦不渴者頭脹益黃散少服益瀉臭乳食必傷
 元散秋分後吐瀉身冷不食瀉青瀉水者益黃散
 肉豆蔻三稜莪朮各等分為末糊丸麻子大每五丸米飲下○小便不清者胃苓湯加肉豆蔻為丸米飲
 下○腹痛吐乳者平胃散合蘇合香丸蜜調米飲下○痰疾者二陳湯加山查麥芽白朮烏梅熱加黃連
 寒加乾姜○危甚者燒針丸黃丹一兩或加桔梗等分為末素肉丸芡寔大每服一丸用
 針挑於燈焰上燒存性乳汁或米泔水任化下此藥清鎮專主吐瀉及瀉大人亦宜
 法○吐瀉五內俱虛有失音者乃腎怯也
 腎氣丸主之凡人病後失音者同
 食少氣喘損胃腸
 吐瀉久不止者乃清氣下瀉胃口陽虛飲食少
 者錢氏
 但食即吐先除積
 內傷乳食面色青白發熱四肢逆冷腹脹當先用消乳食再取積消導寬利胸
 白米散
 或蜜丸每一下者宜或燒針丸亦妙○冷氣入胃嘔吐不已者四君子湯加白豆蔻砂仁肉豆蔻山藥為末
 湯加南星砂仁丁香藿香冬水子姜煎服或散脾丸○嘔而不止痰涎在喉有聲將作驚者二陳湯加丁
 香藿香或抱龍丸主之○因驚前逆而吐者天溫經丸○吐而湯水不納者五苓散○吐涎疾逆者白玉
 餅下之冷者溫之有吐沫或白綠水者胃冷也理中丸或半夏陳粟米等分姜煎服○吐稠涎及血者肺
 熱也久則肺虛何膠煎加減○吐沫水者後必由痛安虫丸乾漆二分雄黃巴霜各一錢為末糊丸黍米

大每五七丸或廿丸發時取東行石榴根煎湯痛甚苦練根或益黃煎湯下量兒大小服之○經年吐乳
 眼瘦黃穢有根膜者乃父母交感時吃乳所致宜益黃散五疳保童丸凡呢乳因驚因積因氣滯因外感
 與治瀉滑青者慢驚防
 香陳皮肉豆蔻姜煎服兼進固腸丸或真人養臟湯或沒石子丸加乳香肉豆蔻
 選用○瀉青色者乃夾驚木尅土也益黃散天溫經丸主之有初起黃變青或瀉藥物直過者尤為寒瀉
 三五次即困危用附子理中湯或肢冷口鼻氣亦冷欲作慢驚慢脾者觀音散加全蝎天麻防風羌活甚
 者用金泥丹為末煎生薑米飲調灌多服乃効候胃氣已生手足漸暖瘳瘳猶在者却用金液丹合青州
 白丸子等分服之兼用異攻散理中丸鈎藤散轉驚丸調理雖至危者往往死中得生金液丹真小兒吐
 瀉之妙劑也蓋小兒吐瀉皆當溫補若已虛損尤當速生胃氣惟尋常時行
 瀉症不可遽投熱藥吐瀉止痢作無疑若患瘳瘳為青乃毒去無害不必服藥

五疳

五疳由積虛而成疳者乾也瘦瘵少血也五疳病閉五臟二十歲以下曰疳二十歲以上曰癆始因乳食
 久吐久瀉久渴積積疳疳難症妄施吐下內亡津液而成者要皆脾胃虛弱血氣枯滯生積生熱
 生痰乘臟氣之虛傳入為疳間有熱者亦虛熱耳故治熱不可妄表過涼治虛不可峻溫驟補
 滿病初萌虛者必須扶胃而兼消導寔者必先疎利而後和胃不可因循以致積久成疳又有熱滿未甚
 便施蘆薈胡連龍胆
 苦寒傷胃反致疳者
 內疳痞結漸黃瘦外鼻赤爛瘳瘳生
 疳症初患中滿久則結痞初患內熱久則外潮
 泥炭土米酸鹹雜果食不消化小便不清大便反利大概熱疳多見外症冷疳多見內症○疳症鼻頭有
 瘳瘳不着痂漸遠耳生瘳瘳宜用白芨輕粉各二分烏賊魚骨三分為末先以煎水洗拭乾瘳或鼻下赤爛自
 抹者用蘭香葉燒灰二分銅青半分輕粉少許為末乾瘳○疳症遍體生瘳不歇乃虫內耗精髓外蝕皮
 膚宜連肚丸黃連七兩水濕透納雄猪肚內用線繫縫飯上蒸十分爛取出和少蒸飯搗丸小豆大每二
 三十丸米飲下仍以川芎生地茯苓神與之調血清心或蘆薈丸肥兒丸生犀散選用間服外以大熱
 腹皮苦參白芨煎湯洗後却用詞子帶皮核燒灰入麝香輕粉少許為末敷之自幼小以至弱冠皆同熱
 疳身熱大便秘疳病初起人未瘦怯但臉赤口臭唇焦項渴潮熱如火大便秘澀者為熱疳宜胡連丸胡
 取出入蘆薈末二錢麝香少許糴米飯丸麻子大每五七丸茶清下一方有青瘳
 瘳瘳各二錢○熱疳黃瘦雀目暈夜不見或生瘳者五福化毒丹陳粟米飲下
 冷疳身涼瀉不停疳病

尿浸之却取真蛆一杓入內任蛆食一日夜取出以布袋繫於急流水中浸一宿瓦上焙乾
入麝香一字為末飯丸麻子大每卅丸米飲下一服虛煩退再服渴止三服瀉住亦治諸疳
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻**疳積** 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻

疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻

疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻

疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻

疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻

疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻

疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻

疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻

疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻

疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻

疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻

疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻

疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻

疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻

疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻
疳積 疳積者小兒疳積也其腹大也甚者尻

諸積雖分虛與實虛者微寒實者微熱
甚便閉脹腫喉塞涎鳴壅盛熱毒發瘡俱宜木香丸主之虛者少用
是者倍服其或變症面黑瀉黑久瀉氣促手心生瘡瘦軟者不治
乳積吐瀉極其臭 吐乳瀉乳其氣酸
飲乳停滯不化得之雖未
吃穀而有痞是為乳積
面黃肚腹硬 腹硬啼熱瀉瀉或嘔面黃皆傷飲食無
行氣消乳食自磨 行氣丸木香丸丁香丸各二錢半三錢

諸積雖分虛與實虛者微寒實者微熱
甚便閉脹腫喉塞涎鳴壅盛熱毒發瘡俱宜木香丸主之虛者少用
是者倍服其或變症面黑瀉黑久瀉氣促手心生瘡瘦軟者不治
乳積吐瀉極其臭 吐乳瀉乳其氣酸
飲乳停滯不化得之雖未
吃穀而有痞是為乳積
面黃肚腹硬 腹硬啼熱瀉瀉或嘔面黃皆傷飲食無
行氣消乳食自磨 行氣丸木香丸丁香丸各二錢半三錢

諸積雖分虛與實虛者微寒實者微熱
甚便閉脹腫喉塞涎鳴壅盛熱毒發瘡俱宜木香丸主之虛者少用
是者倍服其或變症面黑瀉黑久瀉氣促手心生瘡瘦軟者不治
乳積吐瀉極其臭 吐乳瀉乳其氣酸
飲乳停滯不化得之雖未
吃穀而有痞是為乳積
面黃肚腹硬 腹硬啼熱瀉瀉或嘔面黃皆傷飲食無
行氣消乳食自磨 行氣丸木香丸丁香丸各二錢半三錢

諸積雖分虛與實虛者微寒實者微熱
甚便閉脹腫喉塞涎鳴壅盛熱毒發瘡俱宜木香丸主之虛者少用
是者倍服其或變症面黑瀉黑久瀉氣促手心生瘡瘦軟者不治
乳積吐瀉極其臭 吐乳瀉乳其氣酸
飲乳停滯不化得之雖未
吃穀而有痞是為乳積
面黃肚腹硬 腹硬啼熱瀉瀉或嘔面黃皆傷飲食無
行氣消乳食自磨 行氣丸木香丸丁香丸各二錢半三錢

諸積雖分虛與實虛者微寒實者微熱
甚便閉脹腫喉塞涎鳴壅盛熱毒發瘡俱宜木香丸主之虛者少用
是者倍服其或變症面黑瀉黑久瀉氣促手心生瘡瘦軟者不治
乳積吐瀉極其臭 吐乳瀉乳其氣酸
飲乳停滯不化得之雖未
吃穀而有痞是為乳積
面黃肚腹硬 腹硬啼熱瀉瀉或嘔面黃皆傷飲食無
行氣消乳食自磨 行氣丸木香丸丁香丸各二錢半三錢

諸積雖分虛與實虛者微寒實者微熱
甚便閉脹腫喉塞涎鳴壅盛熱毒發瘡俱宜木香丸主之虛者少用
是者倍服其或變症面黑瀉黑久瀉氣促手心生瘡瘦軟者不治
乳積吐瀉極其臭 吐乳瀉乳其氣酸
飲乳停滯不化得之雖未
吃穀而有痞是為乳積
面黃肚腹硬 腹硬啼熱瀉瀉或嘔面黃皆傷飲食無
行氣消乳食自磨 行氣丸木香丸丁香丸各二錢半三錢

諸積雖分虛與實虛者微寒實者微熱
甚便閉脹腫喉塞涎鳴壅盛熱毒發瘡俱宜木香丸主之虛者少用
是者倍服其或變症面黑瀉黑久瀉氣促手心生瘡瘦軟者不治
乳積吐瀉極其臭 吐乳瀉乳其氣酸
飲乳停滯不化得之雖未
吃穀而有痞是為乳積
面黃肚腹硬 腹硬啼熱瀉瀉或嘔面黃皆傷飲食無
行氣消乳食自磨 行氣丸木香丸丁香丸各二錢半三錢

諸積雖分虛與實虛者微寒實者微熱
甚便閉脹腫喉塞涎鳴壅盛熱毒發瘡俱宜木香丸主之虛者少用
是者倍服其或變症面黑瀉黑久瀉氣促手心生瘡瘦軟者不治
乳積吐瀉極其臭 吐乳瀉乳其氣酸
飲乳停滯不化得之雖未
吃穀而有痞是為乳積
面黃肚腹硬 腹硬啼熱瀉瀉或嘔面黃皆傷飲食無
行氣消乳食自磨 行氣丸木香丸丁香丸各二錢半三錢

諸積雖分虛與實虛者微寒實者微熱
甚便閉脹腫喉塞涎鳴壅盛熱毒發瘡俱宜木香丸主之虛者少用
是者倍服其或變症面黑瀉黑久瀉氣促手心生瘡瘦軟者不治
乳積吐瀉極其臭 吐乳瀉乳其氣酸
飲乳停滯不化得之雖未
吃穀而有痞是為乳積
面黃肚腹硬 腹硬啼熱瀉瀉或嘔面黃皆傷飲食無
行氣消乳食自磨 行氣丸木香丸丁香丸各二錢半三錢

桃仁丸 桃仁三錢 辣桂大黃 牽牛 茯苓 牡丹皮 各二錢 為末 蜜丸 麻子大 每五七丸 葱白木通 青皮入鹽煎湯下 或煎流氣飲子下 青木香丸 外治腎囊腫大 莖物通明 用牡蠣為末 先以津唾塗腫處 次用乾糝 或坐地被風及虫蟻吹着 囊腫用蠟退煎湯頻洗 或葱地 蚯蚓糞為末 甘草汁調敷 風熱外腎暴腫 且硬或生瘡者 用生地黄為末 先以葱椒煎湯於避風處洗淨 次用津唾調敷 外腎熱者 雞子清調敷 或加牡蠣少許 餘 脹久不通 痞塞胸 痞連積 梗當對酌 痞結因熱 聚腹不得宣通 上攻胸脇 按之則痛 時發詳大科 瓜氣

黃為熱 淡黃 胃弱 脹久不通 痞塞胸 痞連積 梗當對酌 痞結因熱 聚腹不得宣通 上攻胸脇 按之則痛 時發明砂各一兩 為末 用綠礬一兩 化水入醋少許 煮糊 或煮肉搗丸 菜豆大 每五十九丸 米飲下 磨積去苦練根皮 二錢 半 為丸 治疳消痺進食 止瀉和胃 追虫

腹痛面黃 只是積 腹痛面黃 口中氣溫 多睡畏食 大便臭者 消積丸 甚有白玉餅下之 下後以錢氏白朮散和胃 尋常輕者 只用平胃散 加山查 麥芽 砂仁 青皮 甘草 為末 每一錢 米飲下 熱加黃芩 寒加吳茱 間有寒熱 邪相擊 面赤為熱 面白為寒 感熱作痛者 面赤壯熱 四肢煩熱 口中氣熱 宜四順清涼

吐沫虫攻的 虫動心痛 與痾相似 但目下八痢本與大科同 惟有驚疳屬幼童 八痢冷痢 白積熱痢 赤積冷熱 不調積下 赤白疳痢 黃白積 或見五積 又來 腹脹便臭 肚痛 蟲毒 積下 紫黑血如猪肝 白冷換積 溫脾胃 紅白者 積冷毒也 宜感應丸 俟去其毒 赤白順氣 與和中 順毒痢下 紫黑血如猪肝 白冷換積 溫脾胃 紅白者 積冷毒也 宜感應丸 俟去其毒 赤白順氣 與和中 順則腹痛自止 和中則裡急自除 純赤者 積熱毒也 宜導滯湯 或赤或白 冷熱不調 腹痛後重 腸胃虛滑食少 困倦 宜小駐車丸 黃連六兩 乾姜一兩 當歸二兩 阿膠三兩 為末 醋糊丸 黍米大 每卅丸 米飲下 大人亦宜 久不止 及膿痢 妄下 腫脹 渴隨至 脾虛有積 積化成痢 妄下 脾胃重 補脫肛 色瘀 紅熱者 者 浸石子丸 雞子煎服下

乳嗽百日內不宜 變腦損胃 肺孤危 或因啼叫未定 吃乳或飲食過度 以致停蓄 胸膈 胃口上 熱嗽面赤 九等應 其有四時 感冒 嗽者 當用參蘇飲 捏捏散 之類 微虛者 阿膠散 可醫 阿膠七分 半 白茯苓 馬兜鈴 草二分 水煎治久嗽 肺虛氣促 有痰惡心 二三歲時 欲斷乳 夜靜用藥 畫免眉 畫眉膏 山梔炒黑 三個 雄黃 硃砂 輕粉 各少許 來自不吃 乳未効 再畫仍墨 擦乳

喘因吃乳啼未定 或挾風冷 肺家病 或因啼叫未定 吃乳與鹹酸 以致氣逆 不下 或因飲乳過度 內挾風 皮各減半 姜煎溫服 嘔吐不食 胃家虛 痰壅發熱 火炎 嘔吐驚悸 困倦 自汗者 為虛 面赤 氣喘 痰盛 尿白成疳 積中熱 尿白如泔 脾經有積 久則成疳 亦兼心 膈伏熱 得之 宜茯苓散 赤茯苓 三錢 茯苓 木 有驚氣下結 十餘歲 因驚 之候 心氣下行 小便淋瀝 日夕三四次 漸覺黃瘦 宜順經散 非于晚 汗多胃怯 兼驚 惕 驚丸 驚者 小涼驚丸 俱壯 癩疳 黃根煎湯 下全 因驚 傷盜汗者 古正砂散 脾胃弱者 錢氏白 或有氣弱 心血溢 益汗不止 氣弱 體瘦 乃心血溢 或為汗 非虛也 宜人參 當歸 各一 額汗 陽虛 蒲 扇灰 頭汗 透頸 而止 本屬 陽虛 但小兒 純陽 或因 厚衣 被而 額汗 多 或睡中 盜出 者 用 故 蒲 火熄 遍身 汗出 者 痰火 盛也 宜 香瓜 瓜 胡黃 連 大黃 柴胡 驚 甲黃 柏 黃 連 蘆 薈 青 皮 各 等 分 為 末 用 大 黃 或五七丸 食後 冷漿水 下 服下 手足 掌 心 陰 汗 前 地 骨 皮 湯 洗 白 岩 爐 底 未 敷 之

外感

小兒傷寒驚食 治與大人無異所異者夾陰陽表裡大科同傷寒左額青紋見肢冷無汗慘顏容云錢氏子面黃體重女人面赤喘急其呵欠煩悶手背熱人迎脈盛則一也若手足溫又有汗面光發熱是傷風與人迎脈盛夾食壯熱兼嘔逆右額角青似小葱如青皮紫蘇或藿香正氣散合散毒散便閉加大黃如內傷生冷外感風寒寒熱如瘧惡心少食者入夾驚手掌心有汗青紋先見額當中額正中青紋面色青紅手掌心有汗時作驚惕夜睡不參活散加姜蚕蟬退南星全蝎白附子麻黃便閉加大黃煎傷寒表初喜畏暖傷寒惡寒初起未發熱時調疎砂安神丸或溫驚丸驚輕者先發表而後安心神可也傷寒表初喜畏暖喜畏人藏身密衣被若發熱者晝夜不止俱宜量體汗之大概太陽症見羌活湯裡熱掖衣便不通人裡內熱者必揚手擲足口中氣冲和湯陽明症見葛根解肌湯少陽症見小柴胡湯裡熱掖衣便不通人裡內熱者必揚手擲足口中氣胃承氣湯或大柴胡湯微下之大概太陽症見羌活湯裡熱掖衣便不通人裡內熱者必揚手擲足口中氣知極厥陽症見羌活湯和湯加川芎柴胡有表復有裡及驚風症見雙解散加羌活天麻姜蚕白附子

汗吐下溫俱從緩免動驚痰與蛔虫 傷寒溫補

便閉大黃方可灌 便閉者大柴胡湯風熱內寔者大黃丸○風與帶血留蓄上焦胸膈高起大便不通者沒藥散沒藥大黃枳實桔梗各二分木香甘草各一分姜煎服兼脾胃冷吐瀉攻益黃補後大青散思乳食不渴者當先以益黃散或理中湯補脾後以大青膏發散如身熱能食作渴者當先以大青膏或鈎藤散肺喘心驚腎畏明各臟見症發散後以益黃散補脾如作喘脹者兼用塌氣丸虛渴者兼用錢氏白朮散

依此斷 兼肺則喘息兼心則驚悸兼腎則畏明各臟見症則畏明各臟補母臟藥選用 尋常感冒必從輕暑濕大科尤可玩 慎幼書云雙解散能治風寒

諸熱

諸病發熱辨其初 有發熱不發熱鼻塞聲重者為外感表熱屬三陽經有潮熱者似潮有信為表熱屬胃有熱者面赤或腫身熱喘咳胸膈不利屬肺有溫熱者但溫而不甚熱屬脾有腎熱者陰囊赤腫釣痛大便閉澀屬腎有驚熱者時時發熱即退來日依時發熱或面青狂叫有積熱者五心發熱壯熱至夜則甚有疳熱者骨蒸盜汗咳瀉有瘧熱者寒熱一日一發或二三日一發有血熱者書靜夜熱有變蒸者上唇微腫如卧蚕或有珠泡子有麻豆熱者耳鼻脚指中指冷肥赤噴嚏唇紅肌膚潮熱發熱種種相類初起當先詢父問母已出痘未如未患痘仔細認症益麻痘誤用陽症為陰陰症虛腫便閉暴赤氣急口渴唇下藥必變且真傷寒症亦必表症已罷日哺潮熱方敢下之

傷寒陽症宜入參羌活散 通心飲導赤散瀉白散瀉黃散涼肝丸連翹散甘露飲至犀散四順清涼飲八正散隨宜選用○凡虛熱面色青白神緩口冷泄瀉多尿夜出虛汗似傷寒陰症宜用桂枝湯

自汗者保元湯去木加芍藥浮小麥姜棗煎服 又有作清乍溫症上熱下冷不自如毒散加當歸木香若升降陰陽來復丹薄荷煎湯化

虛陽浮外熱不退和胃元氣自歸 凡發熱表裡已解忽陽浮於外煩熱大作者當與和胃氣丸選

骨蒸多因熱有餘間有稟賦榮衛虛 因大病後得者榮衛虛弱宜滋養血氣或稟賦弱者宜謹避風寒食積痰熱濕火盛因飲食得者腹有積痞面色淡黃潮熱腹痛宜磨積調脾順理三焦其熱自退積木丸肥或積木丸加陳皮半夏黃連山查神效為丸服亦好

通用梨漿飲最宜 梨漿飲青高童便浸一宿晒乾柴胡人參黃芩前胡秦艽甘治潮熱積熱瘧疾及脾積寒熱者青高飲亦妙

痘

痘症不過氣血毒 毒乃胎家注火食穢停蓄臟腑生後啼聲一發悉歸命門過歲火運時行傳染或冬暖遇春夏而發或因傷寒熱病失汗下而變成或因外感風寒內傷生冷而發或因跌撲

驚恐蓄血而發發則命門火動... 初起三日類傷寒類

分日為初症有初症并雜症... 傷寒六經三陰三陽症六日已後

傷寒六經三陰三陽症六日已後... 不治謂之壞症餘毒謂之瘧症

痘象豆形色豆惟黑陷最驚人... 逆其形則逆色者五臟精華

痘象豆形色豆惟黑陷最驚人... 白者大虛灰白者血衰而氣滯也

會不明形色反燈影迴旋眼法新... 凸而四圍無色血多氣少者痘雖陷

油紙烘之自始至終全以根... 難出虛易出則身熱無汗為表裏

難出虛易出則身熱無汗為表裏... 也表虛難出者必裡亦虛也

也表虛難出者必裡亦虛也... 毒而虛先不綻或淡表裡

毒而虛先不綻或淡表裡... 或秘脚先頭上或齊至

或秘脚先頭上或齊至... 始至終以能食者順脹貫時宜食

始至終以能食者順脹貫時宜食... 感內傷犯污穢

感內傷犯污穢... 眼忌茶醋猪肝猪血惡麻黑

眼忌茶醋猪肝猪血惡麻黑... 氣滯益氣聞香則行聞臭則止

氣滯益氣聞香則行聞臭則止... 風邪為所襲者消風散

風邪為所襲者消風散... 生令涼藥者益黃散

生令涼藥者益黃散... 湯化下蘇合香丸

湯化下蘇合香丸... 類症水痘熱三日出嚴實

類症水痘熱三日出嚴實... 小麥湯滑石甘草地骨皮

小麥湯滑石甘草地骨皮... 二分小麥七粒水煎服

毒發斑同熱則發宜散毒散表之汗後身涼紅痕自退再越二日或報痘反少又有報痘時熱感發斑者透肌散加紅花黃芩升麻咽痛加玄參磨犀角和服或玄參升麻湯加減熱感者解毒湯加芎歸白芍防風若見黑斑即死水痘膿疱後發斑者亦死斑少者可救○報痘時有紅丹如雲頭頂平有水是疹痲突者敗毒散加紫草紅花黃芩解毒之如腫高紅紫痕者透肌散加黃芩地骨皮蟬退疹如粟米微紅隱隱皮膚不出作痒全無腫痛痲即如痲頂平軟不碍指即有清水痘多夾疹同出痲亦多夾疹同出故曰痘疹痲疹但豆成膿疱後出疹者反順水痘後出者逆又有先發疹而後發斑者亦無害治疹宜消風熱用散毒散加葛根升麻白芷表退肌熱則疹自無矣又有報痘後痲疹痲有夾痘同出稠密如蚕種者透肌散加紫胡紅花解毒之若色好不可過用涼藥必傷脾胃易致陷伏也痲有夾痘同出者痲沒痘存色愈加為陽易出易沒痲沒後痘必起發形色愈加者順如形色已虧者四君子湯加芎歸黃芪黑陷者去茯苓更加痲急理痲痘急理痘痲痘源頭共一家

雜症熱毒頭亦痛 凡雜症皆因榮衛不和以致毒不泄於肌膚而反內攻臟腑或上攻咽喉紅舌胎唇託詭胎心熱口唇吐噴或怒肝熱舌上白口瘡咽痛鬱多喘之○咽乾痛不能食脾熱五福化毒丹或蜜漬黃柏汁飲湯加牛蒡子麥門冬竹葉煎服小禁不入者紫雪抱龍丸消毒散如能食便溏者又當清上溫下不可純用涼藥○多喘當察外症毒在表在裡調之如果因心熱痰熱者辰砂六一散痘未出葱白煎湯下痘出或痘心前湯下黑陷者貫脈極忌咳與喘者半表裡邪也小柴胡湯加五味子枳殼結梗小便赤者如山梔赤茯苓如服冷藥太過咳嗽肢冷嘔吐者甘草乾姜湯脹貫時呵欠噴嚏打屁亦忌如咳嗽氣喘乃毒攻肺脹胸高聲啞而死果係外感者亦必痘好乃吉○初起煩躁喘急者麻黃湯加桑白皮及屬一蘆或黃芩湯加麻黃桂枝便秘者前胡大渴不止恐陰虛口渴毒火炎上者用甘草瓜蒌根等分水煎服或枳殼湯凡無痰喘急不能臥者死

便少者恐濕漬脾土後難收醫宜六一散麥之內虛津之者保元湯加麥門冬五味子或參苓白朮散黃芪六一湯如陽虛偏盛好飲冷者木香散倍丁香官桂陰寒偏盛好飲熱者異功散如木香當歸推血虛痘黑火動發渴者難治 胸緊煩燥安眠少 胸膈緊滿者結梗湯或二陳湯加枳殼○煩燥動止不寐初起凡虛痘見渴者皆死 胸緊煩燥安眠少 報痘時燥者表未解也宜清內解肌黃芩芍藥湯和之起脈時燥者毒散散未散也宜生黑豆一味煎湯徐徐飲解毒散熱召復陰氣或抱龍丸生犀角磨汁單甘草煎湯俱能解毒貴膿時燥者毒衝心膈也宜利小便大便不通者宜潤之結痲後燥者解其餘毒可也痘

出及餘毒煩燥小便不利者用燈心一把煎湯服○煩燥不得眠者酸棗仁湯 腹痛有塊或堅硬 初熱時腹痛甚手足稍冷尻陰冷為痲毒甲二兩煎服○煩燥不得眠者酸棗仁湯 腹痛有塊或堅硬 初熱時腹痛甚手足稍冷尻陰冷為痲毒湯參蘇飲俱加山查內傷生冷飲食腹痛自利者理中湯加陳皮木香砂仁如痘出腹痛便調者無妨便秘身熱痛甚痘出不快體冷甚發厥者獨聖散或四磨湯服之則毒氣泄而四肢溫腹痛自止已出厥痛者亦腹脹初症尚可表 初熱腹脹毒與邪搏并麻葛根湯加山查牛蒡子微汗即散一切異症隨症加減者忌之如大小便難 失血肺胃被熱侵毒併大腸便於了 痘出陰分極忌動血口鼻失血肺胃熱甚宜解者四聖散紫草散 白為末蜜水調服○便血黃黑毒併大腸犀角地黃湯或小柴胡湯如生地○痘出下利黃赤膿血身熱作渴者白濁湯三黃熟艾湯解其毒而痘自出○便血神昏不醒者抱龍丸救之蓋痘雖內毒運之者血如豆汁黑者急用理中湯胃風湯得便閉紅活者生若脹貫時便血而瘡瘰無膿者胃爛必死○痘愈後便血或下腸垢身熱者升麻葛根湯下利者黃連阿膠丸小駐車丸 內外毒蘊便不通煩脹汗渴言謔者活人

者解毒湯熱毒感者小承氣湯下利者黃連阿膠丸小駐車丸 內外毒蘊便不通煩脹汗渴言謔者活人尾不可下者益痘未出有表有裡痘既出表感裡虛所以首尾忌下奈其間有因外感裡熱及內傷熱食熱藥以致熱毒益結便秘煩燥腹脹手掌心并腋下汗作渴謔語寔熱裡症悉具腸胃壅塞脈絡凝滯壅遏痘毒不出不起不屬必用下藥通其榮衛而後毒得從從下利藥中加以升提俾邪熱去而毒毒并痘未出者升麻葛根湯消毒散加大黃熱甚者涼膈散以其有連翹薄荷輕清上升發也雖痘出不快亦有此理邪寬熱者亦宜痘已出或將屬有熱毒者小柴胡湯加生地或四順清涼飲犀角地黃湯俱加大黃尋常熱輕而無煩脹狂譫痘未出者只宜散毒散連翹紫草飲紫草木通湯痘已出者四物湯加芍連桃仁麻仁或麻子仁丸以潤之苟非外感邪入裡深極內傷濕熱結毒相拒斷不敢下惟產後餘毒量體下之可也故曰痘疹下之早則為陷伏倒壓傷寒下之早則結胸也○又痘瘡利藥忌用丸丹及巴豆水銀輕粉此三味 小便赤澀腹心膨熱甚有分曉 小便赤澀以致心腹膨滿由但能去臟中驚涎積熱非痘家所宜 小兒赤澀腹心膨熱甚有分曉 胃熱心火不降陰氣不能升也痘未出者紫草散發出其痘即愈痘已出者四聖散加黃芪○小便赤澀赤熱并大便赤澀不敢下者五苓散導赤散紫草木通湯連翹散以參之如熱微又不散疹小便赤澀損真氣者只宜獨聖散紫草飲以解其毒古云大熱利小便小熱和解是也又回熱其狂喘或發驚誤投驚藥禍非小者為熱甚而無陰以斂之也犀角地黃湯○痘毒驚搐雖亦由於心熱肝風旺而脾土虛則火炎為搐宜瀉肝則風自去利小便則熱不炎若概用驚風涼藥如銀粉腦麝青黛硃砂硝石令心寒而毒氣內服當出不出已出不屬如先

上海埠葉山房校印

驚後痘者輕先痘後驚者逆痘色粒分明驚來即去者無害○痘未出因外感與內熱相搏發驚者懼怪散消毒飲加減紅綿散天青膏紫草膏兼服○氣散毒泄而心神自定氣勻而痘瘡自出矣又有暑搐昏胃者六一散痰或神昏不醒者抱龍丸或腫中手足常縮將發驚者急用導赤散利小便或四聖散以解毒○痘已出虛者保元湯加芍藥最妙熱者五福化毒丹為青丸古牛蚤散熱甚搐毒攻心以致黑陷者從權以涼驚丸或猪尾膏暫服可也○抑考熱症謔妄言屬心搖擲遍身作痛毒外行痛乃痘之善驚癩屬肝腫脹便秘屬脾喘渴咳嗽屬肺盡皆四臟所發虛症可以類推

虛寒表 諸痛為寒諸痒為虛虛寒於形色辨分之色不灰白便難而痒者為寒有因風寒者消毒飲有因藥毒者更加輝退山查羌活有痘出身痛肉破痘密者勻氣散小活血散推脹貫時作痛不治熱痒清內之或用食鹽和百草霜水溫暑炒過置火內燒烟薰之其痒立止虛痒亦效或用蜜水調滑石末塗之且令痒痂易落無痕○色淡甚則倒靨便溏而痒者為虛宜保元湯倍加黃芪寔表少加芍藥活血痒甚通體下破膿血淋漓不能坐臥者內托十宣散去桂倍黃芪加白芷止痛當歸和血木香調氣氣行血運其痒自止或小便血散合四君子湯加黃芪枳殼有痒氣陷內痒者木香散加丁香散裡官桂寔表以救動者將發痒也

虛症腹脹身必涼 腹脹宜蘿蔔子紫蘇梗陳皮各一錢乾姜甘草各五分水煎服食減者加白朮甚者發寒肢厥瘡白無血色多致不救急用木香散溫中逐冷甚則異攻

吐瀉口出最難當 初起散○有毒氣陷伏作脹者宜溫中解毒人齒散小活血散散腹脹目閉口臭者死

吐瀉 因內傷者四君子湯加砂仁陳皮理中湯去參加厚朴宿食重者感應丸○痘出後極忌泄瀉起脹尤忌有瀉皆屬虛冷急用保元湯加桂芍或不香散泄滑者用肉豆蔻一個乳香一豆大為末未飲下或固腸

自汗氣弱難收 九因泄頂陷者內托十宣散四聖散加減如吐瀉喘渴蛔虫已出目直便流利腸垢者死

風虛熱 薰蒸神木方 痘出後切忌汗多以致氣虛必難作漿收靨急用保元湯止之如初起熱薰蒸者如珠神

痘出寒熱內虛甚寒戰火鬱必發痒 已出痘而寒戰者屬內虛七日前後獨寒者氣血損而毒火內鬱難治○寒戰咬牙足膝冷如水承耳反熱脹貫膈時極忌

變症冷秘熱吐瀉 臟腑熱則便秘脾胃冷則吐瀉常也有嘔吐乃氣血虛極宜保元湯加桂甚者異攻散

變症冷秘熱吐瀉 不食面青瘦者為冷秘又不大便而無裡急後重者為虛秘俱宜內托十宣散氣虛者四物湯麻子仁丸又有能食結滯下如粟塊者為風秘胸膈脹腹引痛者為氣秘○熱毒攻胃吐瀉手掌心并腋下熱而減減有汗臉赤渴飲乳乳滿胸膈不化則吐

吐了又渴急欲飲乳是熱吐也小便赤澀而渴者熱瀉也俱宜五苓散竹葉石膏湯加陳皮疾壅吐食者二陳湯濕熱吐者葛根竹茹湯加黃連濕熱瀉下臭穢者解毒湯加白朮○大吐身熱腹滿二便赤澀面赤喘悶者當利小便四苓散

熱甚四肢仍發厥 凡痘症身寒不治但其間有患熱症而忽發厥肢冷者猶導赤散不虛者言風散下之

大便不通小便血遍身肌肉盡破裂 初熱誤用熱藥報痘又以胡荽葡萄人齒服之虛身自溫矣如痘

喉閉塞大便不通小便如血或為癰瘡肌腐破裂皆陽毒感無陰也 宜猪尾膏犀角地黃湯解毒湯三黃丸服後瘡出紅活者吉倒靨者死○暑月痘爛生蛆乃熱毒感也內服清熱之藥外以帶葉柳枝鋪地卧之或水楊湯

痘變倒靨與陷伏 痘色初出淡紅變白白變黃者吉初出鮮紅變紫變黑者逆○痘形陷伏沃之亦可

痘變倒靨與陷伏 倒靨白其內傷氣虛而外能起發而言謂之倒靨外感宜溫散寒邪而榮衛復行犯穢宜薰解之凡當出不出當脹不脹當貫不貫當腐不腐俱以照涼為氣血旺退減均謂之倒靨陷伏

有黑陷當詳究 黑乃北方寒水之色然火勢反兼水化色亦能黑故變黑當究寒熱寒在變黑者因風寒痰噎痘變不過陷伏倒靨黑陷

初出黑色狀如蚊秘燥皆因瘀血蓄 初出狀如蚊咬色黑者因毒氣暴出

出不能快如炭焦表分大熱還宜透 表熱如炭焦者

青乾紫黑身熱微便秘 聖散單輝退湯加紫草出不快者宜毒膏猪尾膏

急下去陳垢 痘出不快已出者青乾紫黑身不大熱大小便閉是熱滯於內毒氣無由發泄宜宣風散氣

黃瘡自出透若表大熱者不可大下如青乾紫黑 入裡熱極身紫黃瀉膿加惡臭毒

結痂乃毒火燥盛以致黑陷者猪尾膏涼心通氣則氣和神清而痂自結矣 ○痘出黑陷反當結痂不結痂便秘腹脹身黃紫腫變黑濕熱最重者急以單大戟丸去積散邪水猶傷寒木賊土散急下之可保

五死一生 如所下水穀不消身冷戰便多汗尻耳熱者為水溢土崩必死若下後身熱氣溫飲水

臍已亡陰痰盛發驚狂吐 以解毒透成黑陷者犀角地黃湯以養陰

長砂六一散用燈心紫草煎湯磨犀角玳瑁汁調服或護心果條虛寒二便清脾胃兼補加訶寇痘出裡散蓋涼血則不致紅紫解毒則免黑陷失治不日聲啞而死

惡熱以致黑陷者八物湯去地黃恐滯血去芍藥恐伐胃加木香和脾胃大補氣血蓋脾胃暢而不致內陷氣血盛而不致痺塌○寒冷多因乳母忍飢受冷以致牙兒寒冷歸腎痘變黑陷寒月木香散異攻散發之天溫時內托十宣散帶紫為熱帶白虛黑如烏羽猶可救者為氣虛保元湯去甘草加紫草通靈去桂木香加紫草蠅退

砂三五粒磨酒服能起黑陷凡痘變黑如烏乃光潤外黑裡白赤者輕凡痘外黑裡白者輕外黑裡赤者不發寒而凡具冷者為血活可救紫草散合小活血散外黑裡白赤者輕凡痘外黑裡白者輕外黑裡赤者中有眼如針輕甚一個大黑痘頭面上忽生三五個或只一個高大紫黑微似疔痘者名曰飛痘有此瘡孔紫黑者死針輕甚一個大黑痘頭面上忽生三五個或只一個高大紫黑微似疔痘者名曰飛痘有此瘡

手遍身斑爛膿不乾病當發散不發散則毒氣閉塞胸滿喘促悶亂不當發散而強發散則毒毒出表解毒則無目赤咽痛口瘡吐衄等症如大便不通膿水不乾者半黃丹斑爛膿汁不乾作痛者散草散或乾黃土為末乾糝輕者用猪胆汁調芒硝未敷之勿令動者直候瘡痂自落瘡爛成片若不成就痕者用乾牛糞火煨過取白心人乳香為末藉之甚者麥麩糊貼暑月熱感當藉之以芭蕉葉○有因過汗內虛

臨臍自利斑爛或因飲水多者保元湯加防風白芷外敷散草散○散草散用蓋屋及牆背上年腐草先淨培或晒乾為末帛裹撲之甚善鋪床席令兜卧之甚妙此草經霜露久善解毒作痛有如刀刻鏤然治見穢汚要知痘變頂不變陽存生意必然復報痘自頂上陽位起且稠者固凶如痘遍身變壞獨頂額上不變則吉貫喉時變成水疱無膿皮未膿如舊者可生疔痘頭面胸背危四肢點破毒可泄起脹時有痘長大而紫黑者名曰疔痘疔者釘也血勝而痘變制結於四肢或小便或個數少而穿筋骨者易治結於頭面腹背遍近於內者勢必穿臟腑難治急以保元湯加牛蒡子荆芥連助氣逐毒毒外以銀簪挑破疔頭令父母吹去惡血或綿裹指○搗去惡血展去亦可蓋痘破而毒氣得發故也或用珍珠五粒鏡器上炙黃色豌豆四十九粒頭髮一團俱燒存性為末油調胭脂膏將兜在溫暖處忌風寒穢氣先用銀簪挑開疔口將藥點入疔內即時變為紅色

白色餘瘡皆起又有黑痘獨大頂心黑發之如綿筋有臭者保元湯加芍桂糯米補其氣如變黃色者可保痘癰手足先腫疼血引毒注三陰穴凡痘癰必先腫痛深淺而知其癰之大小原因症出後被風寒鬱其熱毒或痘出服熱藥熱食過多所致又有痘變壞而毒併一處發者反吉治法見後痘症益痘未愈時雖癰發亦不宜治癰若初起胸前腦上一塊紅腫及遍身有塊者死貫喉時足腫青紅流水痘不好者亦死脹貫收醫或不齊發疔發癰反可悅毒疔痘生於腦前腰腎之間至重紅小者生黑大者死陽毒凡瘡每乘虛濕潤為寔乾枯之瘡陰毒癰腫一黨反勝諸毒而名之也其瘡濕潤者為氣血俱盛而諸毒易成漿也宜解毒湯主之其枯轉潤白變紅其氣自益矣○水楊湯楊柳五斤春冬用枝秋夏用葉洗淨搗碎取長流水一大盆煎六

七沸去渣將三分之一注盆中宜先服湯藥然後乘熱洗浴久許乃以油紙點點燈照之藥氣自然有起勢則氣血散而津液枯益痘不成漿乃氣溢血滯膜理固密藥氣力緩頰難頓兩達其頭面手足惟服藥後以此沃之其藥藉此并提開竅萬竅洗法必添湯久浴使其緩透肌肉疏通內外斯毒氣隨暖氣而發凡報痘起脹行漿貫滿痘瘡頂陷漿壞症頭低肢軟脆初起表症足冷無害惟足冷頭低四肢軟面色青腫

不進行或為風寒久尅者皆劫壞症頭低肢軟脆初起表症足冷無害惟足冷頭低四肢軟面色青腫瘡者死宜消腫毒補中氣以救之若痘色與皮一般腫根葉紅者無露睛耳焦唇紫紫崩兩目閉而露睛無害或一過面腫形如暈者吉一鼻燥有黑氣或以手按鼻孔者死露睛耳焦唇紫紫崩兩目閉而露睛無死或兩眼不封而光燥者亦死○耳內焦黃唇紫燥裂甚口爛舌卷夏牙齒口內鼻爛舌上白胎或黑舌則唇崩潰爛乃見標之時復感風寒俱熱毒攻內不治口爛舌卷夏牙齒口內鼻爛舌上白胎或黑舌

清胃消毒諸疾解散風寒之劑救之○咬牙作渴身熱者心胃熱也宜甘露飲如寒戰咬牙則為腎毒上攻內托十宣散去防聲啞飲食便挫喉聲出肺與心或感風寒失聲或飲食毒壅或加喘氣連大黃風白芷加茯苓散之聲啞飲食便挫喉聲出肺與心或感風寒失聲或飲食毒壅或加喘氣連大黃身涼者內托十宣散倍倍如漿滿聲啞者肺氣絕也不治痘出不好聲啞者亦死又有能逆胃寒冷氣上升也宜鹽炒吳茱一錢丁香五分水煎服○咽喉有毒飲食如鋸喉小漿不入或吐或常乾嘔者

危若貫膿時見此腰痛如咬囊縮死腰痛如咬不能起立胸高足冷者腎絕若微腫者風寒身溫為寔身症二便閉者反吉腰痛如咬囊縮死腰痛如咬不能起立胸高足冷者腎絕若微腫者風寒身溫為寔身涼虛溫補解毒法盡矣不問初症雜症變壞症俱以溫身溫溫則為氣血和也大概熱症身溫俱宜解毒

虛症身涼俱宜溫補虛症有熱者溫補中兼解毒熱症有虛者解毒中兼溫補○解毒初出消毒飲連翹散解毒中暑兼溫補解毒防風湯蠶絲湯○溫補血虛四物湯或古芍歸湯氣虛四君子湯或保元湯為主世者暫加白朮茯苓煖湯加麥門冬五味子虛熱加黃連濕痰加陳皮氣鬱不通加山查消毒加鼠粘子退癰腫加荆芥穗扶胃氣加陳黃米助陰發表加生薑紫色紫血熱加連翹要知連翹鼠粘山查甘草始終必用官桂川芎紫草芍藥五七日後慎用氣血俱虛者內托十宣散托裡散或保元湯加當歸芍藥以活血或合勻氣散以和氣溫補中暑兼解毒○物湯加酒炒芍藥或保元湯各一錢加牛蒡子黃芩黃連玄參綠瓜灰連翹白芍各五分姜葱煎服七日後勢重毒深者氣虛保元湯加大黃血虛古芍歸湯加大黃芒硝下之又有虛寒變症木香散異攻散古姜附湯四逆湯皆救危妙劑但虛寒常遲十數日方死熱毒者死速○已上總論初熱以至收醫

初熱儼似太陽病所異顯赤中指冷初起發熱惡寒類傷寒太陽表症但傷寒男面黃女面赤麻症則顯筋足俱冷又察其耳後有紅筋赤縷為真無赤也傷寒中指熱驚風男左女右五指俱冷麻症中指與耳鼻大及傷外感痰疾痰驚及四臟見症熱輕者勻氣令其自出熱重者清肌解毒甚則參世但誤下則傷脾誤溫則損目慎之○外感表鬱熱或痘難出難作漿宜表托以助其欲發之勢兼心症者醒脾散消毒飲兼肝症者八參羌活散兼脾症者醒脾散或保元湯加地黃芩荆芥熱者升麻葛根湯如聖湯兼肺症者參蘇飲加葱白山查根通用無汗者羌活沖和湯有汗者防風沖和湯邪傳半表半裡見胸膈嘔吐煩燥不眠等症小柴胡加生地虛者二參湯邪傳入裡二便俱秘或弱中見血者涼膈散防風通聖散下之有發○內傷飲食生冷見嘔瀉者寒月理中湯胃冷散不換金正氣散暑月六和湯二陳湯胃冷湯如傷飲食俱加山查麥芽消導之藥○披驚者加減紅綠散○痰厥見血者犀角地黃湯合小柴胡湯○抑論痘症始終必兼四臟如熱衝於心時作驚悸甚則狂譫宜珠砂參苓之類熱蒸於肝呵欠煩悶甚則發搐宜防風羌活天麻全蝎南星之類熱蒸於脾作寒作熱肢冷多睡甚則目腫腹脹便秘作瀉宜枳殼陳皮神麩山查地黃之類熱蒸於肺面赤噴嚏甚則喘渴咳嗽宜桑白皮半夏馬兜鈴之類推腎無症所以尻耳宜冷若先如瘡後發渴其瘡色黑乃腎症不治狀四臟又以脾肺為主為肺主皮毛脾主肌肉故也

初熱為根痘為標根少標多生不永痘未出非大熱不能發痘已出非微熱不能成如朝三四日後溫而死若全不發熱痘少欲防眼患藥宜清痘出太盛恐入眼為患宜清毒飲或氣血藥中加酒炒芍藥或桑而好又無雜症者輕欲防眼患藥宜清痘出太盛恐入眼為患宜清毒飲或氣血藥中加酒炒芍藥或桑

損護眼珠砂亦簡省調塗兩眼四畔則面上痘亦稀少或用珠砂為末水調塗眼眶或只用乾胭脂末蜜調塗眼眶則痘不入眼○古方用如米細砂為末蜜調少許每五分作二次量免大小加減溫水送下不拘痘瘡出未首尾可服密者可稀稀者可無黑陷者可起痘癰腫可消兼治壯熱煩渴微喘但性亦微寒不

報痘三朝毒居中止汗忌下和為上報痘毒居半表半裡寒藥傷胃帶毒熱藥助火邪忌汗者痘點在皮生薑之類和之而已熱未徹者猶有邪半清表兮半溫養熱微出痘為安如熱猶未徹者必感傷邪未表半溫裡之劑調之四聖散解毒防風湯紫草木香湯如報痘乾燥腹痛腰痛不止者死

一日母痘初見形幾點淡紅間架明痘先出者為母後出者為子孫母好子孫多則自然有不如者亦無一作三四次出或單或雙稠密乾紅宜漸補三五相連團量成個乾紅少潤未可遽施補藥但嫌枯黑間架明白淡紅色潤者順稠密乾紅宜漸補三五相連團量成個乾紅少潤未可遽施補藥但嫌枯黑

參天庭纏過如蚕種者急用消毒飲如山查黃芩紫草虛加人參或升麻葛根湯加連翹一分或散毒飲犀角地黃湯以清內解肌如初發便見腰痛瘡痲乾枯幾點紫黑者死或問紫黑歸腎陽位不宜何也諸熱屬肺發為膿疱如涕色白而大已午未時發熱屬心發為血疱色赤而小多兼斑支子且時發熱屬脾色黃微赤多兼疹寅卯辰時發熱屬肝發為水疱如淚色微赤而小此皆初發之狀不同如此若報痘三日

日當悉成血疱起脹三日後血疱成膿膿貫膿三日後膿結痂而愈愈矣蓋貴膿膿色黃充滿與初出色白淡淡如膿者名同寔不同也

二日如粟根圓混頂滿光明碍指佳二日紅點如粟如黍如豆如珍珠如水晶頂滿色光根脚圓量混合不散以手摸之覺得碍指者順如根稟雖圓而頂陷者氣弱不能

領血也保元湯加芍桂助陽但川芎暫用以為參芪之使有出速且多毒太盛者恐毒感不能收成必變汗者忌之若頂陷色枯或鮮紅連肉亦紅又無根脚者必死出速且多毒太盛者恐毒感不能收成必變

青乾紫陷宜消毒飲蠶絲湯解毒防風湯以防之○出感面黃便黑煩燥腹脹或見血者犀角地黃湯○出感內外熱壅血聚以致能食腹脹便秘煩渴喘急狂譫者毒氣與心貫注無陰以斂也宜豬尾膏毒氣

壅遏出不快者亦宜若心不快而更出遲內虛必挾邪。紅點數日不出而復陷者逆。推出遲隱隱在皮膚被外邪入裡遂至胃爛便血出而死。出遲內虛必挾邪。紅點數日不出而復陷者逆。推出遲隱隱在皮膚色白。縱出亦有忽然而斃者矣。○有禁衛虛不能出者必面青肌軟惡寒宜小活血散。○物湯中氣下陷而不起發者深元湯補中益氣湯入齒散。○有脾胃冷因服涼藥損傷以致吐利者須益氣溫中。中溫則氣不消削而自充發於肌膚矣。宜益黃散理中湯丸。木香散。甚者古姜附湯。或大斷下丸。去姜附。榴櫛加砂仁。木香。○痘出而復不出或泄或秘煩渴者乃痘出誤服涼藥逼毒在肺中。痘帶白膿者輕紫黑者重臭有黑氣者死。○外感裡虛毒氣發越不透半成血痲。半是紅點不能乳食。大便如常。小便清。宜半溫裡半助表。四聖散。解毒散。解毒散。萬全散。紫草。木香。湯。蟾肝丸。或絲瓜。連皮。燒灰。沸湯調服。或葡萄。碾酒飲之。選用。○有氣寒痲痺滯發不出者。二陳湯。疎氣散。○啼吐不已。神不安。舍不能主。行榮衛而發不出者。勻氣散。小活血散。天溫驚丸。○外感。羸。胃氣。而不出。便清。自調。知其表方。可量體微。發散。因天寒不能出者。熟料。五積散。正氣散。或參。蘇。飲。紫。草。膏。四。肢。出。不。快。者。防。風。芍。藥。甘。草。等。分。水。煎。服。痘。瘡。不。出。傷。寒。不。語。者。單。燒。人。尿。為。未。蜜。調。服。痘。毒。既。發。痘。瘡。不。發。者。黑。膏。○因。炎。熱。煩。渴。皆。胃。不。能。發出者。辰砂五苓散。用生地麥門冬煎湯下。身熱甚者。小柴胡湯加生地。煩渴便寒者。白虎加參湯。輕者。竹葉石膏湯加生地。○外感邪入裡。不發大小便秘者。毒滯於內也。宜宣風散。用大黃煎湯下。若表大熱者。不可妄下。或已出稠密喘渴者。當歸丸。黑膏。輕者。消毒散。加大黃山梔。已出復被風寒。拒青紫如瘧遍身。拒不能發出。以致發熱狂。搐。通身。或青。或紫。如。瘧。野。如。癘。疹。俗。云。鬼。捻。青。年。壯。皮。厚。者。多。有。之。宜。却。寒。溫。肌。透。裡。之。劑。危。甚。者。用。經。霜。紫。背。荷。葉。舊。者。亦。可。入。姜。蚕。等。分。為。末。胡。荽。煎。酒。調。服。或。絲。瓜。連。皮。燒。灰。為。末。沸。湯。調。服。發。痘。最。妙。見。風。寒。表。症。者。程。暉。散。苦。牛。蚕。散。見。熱。毒。症。多。者。透。肌。散。出。不。勻。遍。色。不。潤。芥。子。為。末。白。湯。調。如。膏。塗。兜。脚。心。乾。即。再。塗。其。毒。漸。漸。復。出。痘。瘡。依。前。紅。法。但。要。照。原。不。減。些。凡。痘。出。不。快。而。先。出。之。痘。形。色。照。原。者。乃。毒。未。發。也。如。形。色。漸。退。者。乃。內。虛。毒。壯。年。皮。厚。多。勞。後。舊。以。入。必。死。若。痘。出。喜。笑。如。常。飲。食。進。精。神。爽。無。諸。雜。症。則。痘。本。少。也。不。可。再。發。壯。年。皮。厚。多。勞。後。舊。以。嬰。兒。臍。疔。嬌。嫩。服。藥。但。宜。釀。乳。與。能。食。童。子。可。以。服。藥。治。有。不。同。然。年。壯。與。年。幼。者。又。有。不。同。蓋。年。壯。外。寔。皮。厚。痘。毒。難。以。快。出。或。被。風。寒。相。搏。則。身。痛。甚。宜。透。肌。散。主。之。或。勞。役。汗。交。氣。弱。發。熱。耳。目。昏。眩。脈。大。者。當。用。補。中。益。氣。湯。去。升。麻。自。始。至。終。服。之。有。虛。無。寒。不。可。用。丁。香。姜。附。反。致。熱。耗。元。氣。又。有。男。子。破。陽。已。多。女。子。通。經。已。後。乃。患。痘。者。尤。宜。謹。慎。常。服。保。元。湯。以。固。脾。胃。八。物。湯。調。理。氣。血。腎。虛。者。腎。氣。丸。以。滋。水。使。腎。氣。旺。而。孕。婦。動。胎。生。摘。衣。孕。婦。以。命。門。繫。胎。胎。毒。又。發。自。命。門。自。初。熱。至。收。靨。全。以。安。胎。飲。加。黃。毒。不。下。胎。也。

木赤扶苓赤芍。加柴胡黃芩何勝人參糯米等分。水煎服。身熱咳嗽者。暫用參蘇飲。煩燥者。古本湯。加白芍。麥門冬。或。小。活。血。散。痘。稠。密。者。鼠。粘。湯。痘。出。太。盛。或。便。秘。者。犀。角。地。黃。湯。紫。草。飲。痘。出。不。快。者。消。毒。散。痘。出。後。血。虛。者。古。芍。歸。湯。加。芍。藥。氣。虛。者。保。元。湯。加。芍。藥。氣。血。俱。虛。者。內。托。十。宣。散。去。桂。倍。歸。芍。加。烏。梅。香。附。熱。感。恐。墮。胎。者。單。胎。散。胎。動。者。安。胎。飲。連。進。或。單。砂。仁。炒。為。末。酒。調。服。服。後。覺。胎。熱。則。安。凡。胎。前。患。痘。倘。用。峻。藥。動。胎。去。血。泄。氣。者。孕。婦。必。死。如。生。摘。衣。必。動。其。蒂。也。患。麻。亦。與。痘。同。若。無。孕。婦。人。麻。痘。初。熱。煎。藥。血。海。必。然。經。來。小。柴。胡。湯。加。生。地。主。之。產。後。麻。豆。但。忌。芍。藥。以。黃。芪。代。之。亦。可。

三日出齊至靨。三日放標至足。三陰為出齊。正宜觀形色。以察氣血強弱。形尖圓光澤者。順或頂起而。上。脹。下。無。亦。可。取。未。出。或。出。未。盡。者。無。妨。淡。白。頂。軟。氣。全。虛。淡。白。頂。不。堅。寔。不。得。指。者。氣。虛。也。內。托。十。宣。散。去。桂。倍。歸。芍。加。烏。梅。香。附。熱。感。恐。墮。胎。者。單。胎。散。胎。動。者。安。胎。飲。連。進。或。單。砂。仁。炒。為。末。酒。調。服。服。後。覺。胎。熱。則。安。凡。胎。前。患。痘。倘。用。峻。藥。動。胎。去。血。泄。氣。者。孕。婦。必。死。如。生。摘。衣。必。動。其。蒂。也。患。麻。亦。與。痘。同。若。無。孕。婦。人。麻。痘。初。熱。煎。藥。血。海。必。然。經。來。小。柴。胡。湯。加。生。地。主。之。產。後。麻。豆。但。忌。芍。藥。以。黃。芪。代。之。亦。可。

結白光帶紅決不愈。痘白色薄。根全無。紅色或根帶一點紅。三淡紅。摸過又轉白。血良氣滯宜大補。根集。或。暑。紅。手。摸。過。即。轉。白。者。氣。血。虛。也。十。全。大。補。湯。或。但。淡。紅。不。轉。白。者。血。虛。也。小。活。血。湯。口。角。有。拉。如。疥。形。將。來。變。黑。歸。腎。附。口。角。此。時。有。拉。如。疥。不。補。湯。或。但。淡。紅。不。轉。白。者。血。虛。也。小。活。血。湯。口。角。有。拉。如。疥。形。將。來。變。黑。歸。腎。附。口。角。此。時。有。拉。如。疥。不。鼻。有。餘。瘡。妨。睡。息。痘。出。後。有。餘。瘡。塞。鼻。中。不。得。卧。者。用。木。筆。花。紫。痘。刺。黑。無。生。路。痘。稠。密。中。有。紫。痘。刺。開。湯。救。之。血。黑。者。死。又。有。白。痘。者。乃。氣。協。熱。毒。仍。以。化。痘。湯。解。之。

起脹。毒盡浮於表。最怕中虛入裡了。痘出三日後。當朝起脹。先報者先起。後報者後起。至五六日。毒盡。虛。症。見。而。痘。形。雖。然。氣。血。有。盈。虧。平。陷。仍。分。痘。多。少。氣。盈。血。虧。則。頂。平。而。色。又。乾。枯。恐。變。陷。伏。不。論。痘。多。少。色。反。者。皆。死。雖。然。氣。血。有。盈。虧。平。陷。仍。分。痘。多。少。氣。盈。血。虧。則。頂。平。而。色。又。乾。枯。恐。變。陷。伏。不。論。痘。多。少。俱。內。托。十。宣。散。救。之。

四日血疱已分明。四日水疱當成。血疱淡紅。不喜胸背觀尚平。額上紅者。終不起。脹。額。臉。一。身。之。主。若。額。然。若。手。足。下。身。肚。腹。等。處。皆。脹。惟。胸。背。不。起。脹。則。不。宜。上。脹。下。緩。固。無。害。上。體。已。脹。下。體。緩。慢。者。無。害。陸。續。出。者。反。長。生。有。出。不。快。時。陸。續。出。如。粟。未。於。痘。空。際。圓。淨。者。亦。吉。

報痘 起脹

上海場葉山房校印

五日頂尖欲碍指五日頂尖滿起如鼓丁額項皮紅擦破死或起滿項紅紫連皮肉紅賊痘軟大氣血衰
 報痘雖虛根窠全白無血三四日便起脹大按之虛軟者此名賊痘氣血毒陷腹上多青紫腹上痘多
 大衰也保元湯加紫草救之額上見之尤凶必貫膿時變成水疱擦破而死

六日圓滿光明美六日氣血榮盛發揚於外血熱紫紅尚不起火盛而熱色紅紫不起脹者內托十宣散
 者獨中陷黑白皆氣虛項灰白陷者氣虛也宜單人參湯或保元湯加川芎助陽當歸和血木香行滯如
 項陷漿滯不行或風寒久尅者水水痘變痒一定死頂陷灰白紫黑必變

貫膿三朝胃氣升自肌從漸至充盈痘以胃氣為本胃氣升騰化毒成膿自初忌寒涼與疎泄傷脾損胃
 漿難成或吐利不止或二便下血聲啞腹脹乳食不化寒戰咬牙痘爛無膿肌肉黑者不治

七日漿行痘裡黃淡紅軟大非直漿漿行痘裡肥滿黃光或蒼膿色或黃綠色者吉色淡者虛血虛四物
 變佳黑其間紫者血熱水痘皮薄有根活純是清血皮白而薄與水痘相似者死若畧有清水或根窠起
 灰白氣虛如前法治

八日漿成喜飽滿不滿只是氣血緩八日氣血大振毒漿已滿將收斂之時圓滿光潤者吉其有化滿
 而又不齊或入人乳

九日回漿喜自額額面上先回漿四肢方纔起脹者吉如七日回漿者凶
 實有漿延膿摸過皮紋難收

收膿一日如果熟如果熟蒂落氣收血平光色如虛寒有膿難結
 清收膿將半或見作渴驚狂等症乃氣血不能收斂宜清解其內免毒遺於臟腑以生餘症

十日瘡臘似葡萄按之堅硬不灰佳十日收膿膿滿回綠痘蓋蠟色或似紫紅葡萄色者佳
 癰疔可保

癰疔亦有熱觸穢者無陰以斂生微潮有內外熱極毒氣散漫而無陰氣以斂者宜風散如犀角磨汁以
 結黑陷不收膿者異攻散調四尿管散最妙

保元湯加將膿全白瀉難熬將膿時全白色如豆壳者仍因初時飲水過多故膿不能齊亦曰倒膿大便
 者傷冷瘡陷傷熱爛

爛不結痂者小柴胡湯瘡尾膏麥門冬煎湯下外用散草散敷之有臭爛深坑
 不收口者用猪胆汁調芒硝末敷如遍身臭爛如餅搭不可近目中無神者死

陰囊腫起命三朝陰囊及

者死

十一日漿老痂已成或有雜症一二保元湯隨症加減脚根紫者還是熱將成熟之際脚根色紅紫者屬

或犀角地黃湯加酒炒岑連連氣良頂陷漿濕乾收靨如粟尖圓結寔佳若頂陷若菜葉漿濕盈盈不斂

者亦危八物湯通身靨盡留一節通身皆靨推數顆不靨亦能殺人猶蛇退皮雖一節被傷不妨

加黃芪救之十二日痂落從頭妙從頭上至胸膈手腹腰加木易落色宜耀如難脫外見熱症瘡色紅紫因原貫膿不

散飲食壯健者連翹飲身上痂不落者加地骨皮頭面痂不落者加

白芷外翦去頭髮以烏柏油塗之若見諸虛症及有潮熱者必危

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痂落痂點或凹或凸者用韶粉一兩輕粉一字研勻猪油調塗痂上

痘癰四體脾經毒。血熱引毒流傳經絡故於肌肉虛處或關節動搖處偏盛而成癰。又有愈後餘毒不攻

足肢節軟腫而作痛。○毒氣流於脾經則癰發四肢。○毒氣流於肺經則癰發胸膈。○毒氣流於心經則癰發

此水洗手面漸。肺經手膈內穴俞。○毒氣流於肺經則膈內并手腕腫流為赤癰。○毒氣流於心經則膈內并

生肌肉無痕。肺經手膈內穴俞。○毒氣流於肺經則膈內并手腕腫流為赤癰。○毒氣流於心經則膈內并

二三九量兒大小熟茶清下以利之。如氣血虛者內托十宣散加枳梗犀角咽喉不利或腫痛者甘桔湯

加麥門冬牛蒡子薄荷口齒流涎血臭氣者用生地黃自然汁化五福化毒丹。○毒氣流於肺經則膈內并

肺毒流入大腸便秘或便。三陽背頸項結核。○毒氣流於三陽經則背頸項結核腫痛。宜小柴胡湯加生地

膿血見前雜症便血條下。○毒氣流於三陽經則背頸項結核腫痛。宜小柴胡湯加生地

虛者內托十宣散減肉桂。○通用赤芍連翹為君。枳梗甘草為臣。貝母忍冬藤白芷取蔓根為佐。上用升

麻葛根為使。下用枳榔牛膝為使。大便閉加大黃發寒熱加芍藥。○毒氣流於三陽經則背頸項結核腫痛。宜小柴胡湯加生地

通用保元湯加酒炒芍藥少許。久者上體宜保元湯加引經藥。下

體宜獨活寄生湯或內托十宣散。○毒氣流於三陽經則背頸項結核腫痛。宜小柴胡湯加生地

黑豆菜豆赤豆等分。酸醋研漿。時時以錫餅刷之。一切癰疽疔毒。不用針刀自潰如膿已熟者用被針燒

紅刺之內服消毒散。在頸項加金銀花。若不早治必至潰爛筋骨。○金華散黃丹黃柏黃連大黃黃芪輕

粉麝香為末。乾糝瘡乾油調塗。治痘後肥瘡疔瘡癰疔。收水涼肌解毒。○散肌散地骨皮黃連五倍子

黃柏甘草為末。乾糝瘡乾油調塗。治痘後肥瘡疔瘡癰疔。收水涼肌解毒。○散肌散地骨皮黃連五倍子

滿以炭火燒令乾。汁盡取出為末。乾糝瘡乾油調塗。治痘後肥瘡疔瘡癰疔。收水涼肌解毒。○散肌散地骨皮黃連五倍子

痘後身上及肢節上生疔蝕瘡膿水不絕。逃痘方是後人巧信者。縱出亦稀疎。○古無痘疹。周未秦初乃

汁服三規壳許。利下惡污亦可稀痘。○每遇冬月溫煖。恐春發痘宜預服。○三豆飲黑豆赤豆黃豆各等分

甘草減半。水煎熟。任意飲之。凡天行痘瘡。癰疽疔毒。宜先服。○小兒痘疹。無陰以制令頭

髮堅直。飲食減少。此伏熱之兆。便宜服油劑。麻油一盞。逐日飲盡。小不出痘。更服升麻葛根湯。○三豆飲以

預防之。○消毒保嬰丹。纏豆藤即毛豆梗。上纏繞細紅藤。八月間採陰乾。一兩半。黑豆三十粒。赤豆七十

粒。山查肉牛蒡子生地辰砂各一兩。升麻連翹各七錢。半荆芥防風獨活甘草當歸赤芍黃連桔梗各五

錢。經霜絲瓜長五寸者二個。燒存性。煎藥須預辨精料。遇春分秋分上元七夕忘婦人。猶天誠心修製。為

末。和勻。淨砂糖為丸。李核大。每一丸。農前甘草湯化下。凡小兒未出痘者。每遇春分秋分。時各

服一丸。其痘毒能漸消化。若只服一二次。亦得減少。若服三年六次。其毒盡能消化。必無虞矣。○錢劉陳魏

皆堪法。得要還養丹。溪書。錢劉以痘本胎毒。毒解而氣血自伸。陳魏以痘雖內毒。毒出則虛。丹溪隨表裡

托裡。甚則姜附。應法無不善。用貴得宜。痘本外科傷寒之。一兼內傷。雜病。婦女胎產。小兒驚積。痘非醫之。統要矣乎。

麻。麻毒原只肺胃。紅斑五六日方出。六腑腸胃之熱。蒸於肺。外感內傷。并發與痘症表。以同而裡。寔異。初

細脹。眼赤封閉。有赤白微黃。不同。仍要紅活。最嫌黑陷。及面目胸腹稠密。咽喉纏綿者。逆發不出。而喘者

即死。與大科癰疹相似。又與發斑相似。但發斑如錦紋。有空缺處。如雲頭狀。麻即如麻。遍身無空。但疎密

不同耳。仍有夾斑。初起寒熱咳嗽。鼻。初起呵欠。發熱惡寒。咳嗽噴嚏。流涕頭眩。宜升麻葛根湯。加紫蘇葱

夾丹。夾瘡同出者。初起寒熱咳嗽。鼻。初起呵欠。發熱惡寒。咳嗽噴嚏。流涕頭眩。宜升麻葛根湯。加紫蘇葱

思食味。初起全類傷寒。但面煩喘便。秘澀如狂。已出煩燥。作渴者。解毒湯。○白虎湯。○白虎湯。○白虎湯。○白虎湯。

氣湯。防風通聖散。○毒氣流於脾經則癰發四肢。○毒氣流於肺經則癰發胸膈。○毒氣流於心經則癰發

加炒山梔童便。輕者黃芩湯。加生地。○毒氣流於脾經則癰發四肢。○毒氣流於肺經則癰發胸膈。○毒氣流於心經則癰發

山梔童便。輕者黃芩湯。加生地。○毒氣流於脾經則癰發四肢。○毒氣流於肺經則癰發胸膈。○毒氣流於心經則癰發

四苓散。加入參。忌用豆蔻。木香。桂枝。熱藥。始終雜症。皆熱。○麻症初起。已出。已及。及一切雜症。與痘症大

小兒

癰疽總論

癰疽毒要氣血勝內外因皆濕熱
癰者壅也為陽屬六腑毒勝於外其發暴而所患浮淺不傷筋骨疽者疽也為陰屬五臟毒攻於內其發緩而所患沉深傷筋蝕骨凡年壯氣血勝毒則順年老毒勝氣血則險有內因飲食積毒者經曰膏粱之變足生大疔崇氣不從逆於肉理榮氣即胃氣胃和則榮衛順而滋養脾胃膏梁金石厚衣烘被以致溫熱臟腑濕熱聚下燒燥腎水陰火熾盛入脈沸騰經絡凝滯故水穀精微不能上行陽道反逆聚肉之腠理而成癰有外感風寒濕毒者經曰地之濕氣感則害人皮肉又曰諸癰腫筋拳骨痛者此寒氣之腫八風之變也蓋風濕外侵鬱久為熱自勝既左遷移熱小腸移熱於胆風性上衝瘡形高赤赤作痛小則為癰大則為疽若毒已非若瘡瘍皆屬心火是也
因火有君相之分微甚或鬱痛而不可腫或虛腫而不可痛雖相火能為瘡瘍諸痛症之自裡也
有因心氣鬱結飢飽勞役房室過度水竭火炎痰滯氣帶而成所謂相火能為瘡瘍諸痛症
瘡丹溪云人身血行脈中氣行脈外氣血周流不息惟寒濕搏之則凝滯而行遲火熱搏之則沸騰而行
速氣為邪鬱津液為痰積久滲入脈中血為之濁此陰滯於陽而為癰血為邪鬱津液而為瘡或結積
久溢出血外氣為之亂此陽滯於陰而為疽蓋陽氣無形陰血有質必濕熱泣血而後發為癰疽故局方
曰癰疽皆熱勝血也又曰二熱相搏熱化為膿蓋熱非濕則不能腐壞肌
肉為膿營如夏熱諸物皆不壞爛壞者交秋濕熱大行之際此理甚明
純陽激赤潰斂易純陰色暗全不疼
半陰半陽腫痛慢用藥回陽乃可生
癰疽有大而愈者有微如豆而死者陽發初起皮薄作熱色赤
脈數有力為純陽易治陰發初起皮厚不熱色黯微腫硬如牛皮不痛而斂不作膿不潰微開潰破後肉
色紫黑此為內發未清臟腑已前壞爛更加身瘦食不便利利脈無力為純陰不治又有半陰半陽
似腫非腫似痛非痛似赤非赤似潰非潰脈數無力如陽多陰少用藥托裡變陽者生陰多陽少用藥托
亦不起投陰必死就中尤以有熱無熱為死生妙訣蓋陽症有熱則氣血行而生肌陰症無熱則氣血滯
而不斂遇有熱者切不可退熱但宜
風則多痒氣則痛濕腫食則熱寒增
癰疽雖止發於一經或兼二經
溫藥清毒些小癰毒無熱亦不妨
風則多痒氣則痛濕腫食則熱寒增
癰疽雖止發於一經或兼二經
挾陰虛等症大較風氣食三種俱以不換全正氣散加川芎木香為主兼風多痒如祛風藥兼氣多痛如
調氣藥兼食多發寒熱如消積藥兼濕多腫如參濕藥又云熱瘡癩痛虛瘡淡白風寒瘡口帶白
外因四氣單用大黃半生半熟甘草節等分為末每空心酒下一匙以刺為度
遠志為末酒調二錢澄清服以查數患處

硬有如石

金石藥毒則堅硬如石不虛瘦重者泊潮蒸虛勞瘦弱禁衛石並患處重者如真石然因其有
泄之藥亦不可過用降火滯脾之藥惟腎氣丸托
裡散甚得其宜且古方謂藥毒衝毒癰疽極重
近骨生虫近虛漏
痛近骨者多冷久則化血為虫多痒少
少細認穴道屬何經
腦發屬督脈足太陽經發中屬督脈餘皆足太陽經脈發手足太陽少陽經
少細認穴道屬何經
腦發屬督脈足太陽經發中屬督脈餘皆足太陽經脈發手足太陽少陽經
陽經乳頭足厥陰經腎經足太陽經外腎腫足厥陰經足太陽經內足三陽經喉腫腫離任脈足陽
明經穿窠發管衝任三脉穿馬毒腫足厥陰經足太陽經內足三陽經喉腫腫離任脈足陽
明經惟少陽少陰太陰多氣少血厥陰太陰多血少氣肉皆難推手足陽明氣血俱多分經用藥則不
犯經禁病禁以致妄下妄汗且瘡屬腎經者展重脾肺二經者次之他經者又次之腦乃諸陽所在咽喉
飲食所通腎俞命根所係皆至險之地又不可
外因寒熱宜表散
毒因外感發者內無便溺阻隔外有六
多在表也宜托裡微汗以表散之如發腦項背黃連消毒散足腎分內托羌活湯湯胃上白芷升麻湯乳腫
內托升麻湯兩味十味中加湯散外則內托酒煎湯內近膝股內托羌活湯通用散毒散元味羌活湯
辛熱手足太陰經分自汗浮腫流注四肢附子六味湯辛温發熱十六味流氣散膏命丹者月內托復煎
散寒月內托十宣散或不換全正氣散丹藥治形是麻浮數冬月背生經腫及脾胃下痛者用桂麻各半
湯加生附酒拍瓜蔓仁甘草節羌活青皮人參黃芩半夏煎服六帖而愈
此正內托法也有謂瘡家身痛不可汗汗之則發症者邪不在表而誤汗也
內熱痛秘急疎行
內傷飲食
痛異常外無六經形症內有便溺阻隔口渴煩燥脈沉寔為邪在裡急與涼寒攻裡內疎黃連湯湯瀉心湯
活命飲四順清涼飲散者清熱消毒飲如紫草或清心散毒之○內積熱毒外又感邪者宜發表攻裡五
香連翹湯防風通聖散毒感者解
勞傷氣鬱無表裡邪在經中和銜榮
毒因內傷虛損房勞鬱結而發者
毒連翹湯防風通聖散毒感者解
勞傷氣鬱無表裡邪在經中和銜榮
毒因內傷虛損房勞鬱結而發者
便溺之阻隔如邪在經也不可妄施汗下只宜補形氣調經脈和榮銜或專補脾胃可也鬱結者十六味
流氣飲虛勞者托裡消毒散內托復煎散補中益氣湯古人治癰以寒藥者正治法也治疽以熱藥者從
治法也蓋藥性熱則開行寒則疎泄疽乃有形之物非潰後托裡排膿毒膿盡肌肉自然平潰後氣血大
熱藥從治豈能行之乎此內托內疎正治從治之義也
潰後托裡排膿毒膿盡肌肉自然平潰後氣血大
托裡之法一日不可缺也古方托裡散托裡清中湯托裡溫中湯托裡利中湯托裡建中湯托裡抑毒湯
托裡益黃湯托裡益氣湯選用益托裡則氣血旺而脾胃或膿穢目排毒氣自解死肉自潰新肉自生瘡
口自斂若不務補托而誤用寒涼反助邪火膿多臭穢甚則脈洪大瀉真氣虛而死矣丹溪云但見腫痛
參之脈症虛弱更與滋補乃可萬全又不必泥氣質素寔及參芪滿中滯度也但初潰時間有熱毒感者

量如消毒清劑如發背搭肩膜破穿心必死尤宜托裡免致毒陷托裡即護心也若毒氣上攻心神昏悶
欲嘔者問服護心散以救之如帶表邪面赤等症勢未甚起者內托復煎散或內托十宣散暫服若無熱
毒表邪但見穢氣觸犯虛熱少食不睡者便進八參黃芪湯但見膿多心煩少睡者便進聖愈湯但見脾
腐氣弱不能生肌收斂者便進補中益氣湯但見腎虛不能消潰收斂或嘔熱作渴者便進八味丸或腎
氣丸緊急不及作丸大料煎服預防危殆始終妙劑若不務本根而專用敷圍生肌之藥則斂口太速毒
反內攻或旁邊再發一癰者有之或愈後而惡症頓起大命隨去者有之惟務內治而不貴外治者為高
外治初起災最妙形傷則痛氣傷則腫或先痛後腫傷乎血先腫後痛傷乎氣腫痛並攻氣血俱傷皆因
灸至不痛不痛則災至痛時方往早覺早灸為佳一日二十灸十日三十灸三日四十灸七日五十灸七
活五日六日十灸四活過七日則不可灸矣其餘敷散透間有毒感者量用之則可 熱痛半軟針相
當癰疽毒氣已成宜托裡以連其膿膿成者當驗其生熟淺深而針之若腫高而軟者發於血脈腫下而
深按之陷而不起者膿未成按之而復起者膿已成按之却軟者無膿不痛者血痛痛者氣痛按之一邊
軟者有膿若膿生而用針氣血既泄膿反難成若膿熟而不針腐爛益深瘡口難斂若瘡深而針淺內膿
不出外血反泄瘡淺而針深內膿雖出良肉受傷元氣虛者必先補而後針其膿諸症自退若瘡毒穢盛
中有肉贅者宜內壯脾胃外塗單巴豆膏令其膿處漸低赤處漸高六七日間赤點之處自有裂紋如刀
割狀膿肉漸潰當用放針利剪徐徐引去若膿出肉腐腫痛仍作必內有筋間漏宜再引之急補脾
胃不痛者純用補藥庶可收斂若妄施針刀傷肉出血斷之不止者立危其披針用馬印鍊為之 敷圍
點痰非得已內攻難以潰斂甚則不起必內分陰陽用藥外分陰陽敷圍內外夾攻藥氣相通為妙純陽
症內服內疎黃連湯清熱消毒飲之類外敷柳陽散平陰半陽症內服托裡清毒散外敷陰陽散純陰症
內服補中益氣湯加羌活入酒煎外敷柳陰散○點於爐灰膏以去惡肉藥錢三品錠子以透膿管皆欲
敗腐盡除不至侵蝕 止痛斂口免開張癰疽不可不痛不可大痛未潰前痛者為熱毒便毒宜內疎黃連
筋骨非得已而用也 止痛斂口免開張癰疽不可不痛不可大痛未潰前痛者為熱毒便毒宜內疎黃連
氣虛四君子湯加歸芪血虛四物湯加參芪氣血俱虛托裡益氣湯脾虛者托裡和中湯腎虛者腎氣丸
因登廁犯穢氣觸者藥中加乳香芷芍之類和之風寒逼者加防風桂枝之類溫散之燥者潤之濕者導
之果徐瘀血惡肉凝滯者方可乳香止痛散和之○瘡口不斂由於肌肉不生肌肉不生由於腐肉不去
腐肉不去由於脾胃不壯氣血不旺必以補托為主而佐以行經活血之藥則肌肉受毒者自生死者自
潰又何待於點割耶大要氣虛體倦食少者補中益氣湯血虛肺熱內熱者四君子湯加歸地牡丹皮膠
水清稀者氣血俱虛十全大補湯或不痛或大痛或不亦或內膿不潰或外肉不腐者氣血虛散藥枝足

法十全大補湯加羌活桂枝其陽氣則四畔即消瘡頭即腐若脾胃虛弱慢腫不赤者六君子湯倍白朮若
初起腫痛或因起伐及入房以致色黑而不痛者乃脫陽陰急用古參附湯以救之問有血分虛熱者
瘡口肉色必赤回物湯加山枝連翹氣分虛熱煩渴者竹葉黃芪湯要知瘡口難斂或漸大漸開出血
者危俗皆以腫痕所至為量非真量也量生於瘡口之畔狀如紅筋三暈三暈尚可四暈五暈者死 洗
能疎毒活血氣毒或洗毒散肉汁湯風冷瘡口白者乾艾煎湯亦好 貼膏不被風寒傷膏藥多熱輕小
發表不透熱之意也若大毒初起用之迷塞凝滯為禍不小婦幼患此無他異婦宜調血幼宜清血調
准貴後只用白蠟膏天乙膏或水粉膏外護不致破傷風寒 婦幼患此無他異婦宜調血幼宜清血調
為主值經閉及清後月水又發所患堅硬不破不腫不疼者山小兒主去胎毒或有飲食 雜症仍以瘡為
積熱者藥稍宜清涼如素稟受體薄及稍長而久病者仍以補托氣血脾胃為主治之 雜症仍以瘡為
主潰未清心要酌量瘡後托裡補中治其瘡而諸症自退瘡為本病為標若病急而元氣衰暫治其標病
緩而元氣虛只治其本心通諸竅臟腑所包者一膜 五善能食便調順膿鮮不臭聲音長 飲食知味一也
耳若憂驚入心膜破必死藥中常加茯神遠志為妙 五善能食便調順膿鮮不臭聲音長 飲食知味一也
便利調勻二也膿潰腫消水鮮不臭三也神彩精明語音清明 七惡皆因真氣損 外似有餘而內不足
四也體氣和平五也此屬痲症病微邪淺若能慎節勿藥自愈 七惡皆因真氣損 外似有餘而內不足
法當滋補胃氣多有可生不可因其惡而遂棄不治大抵元氣虛弱或膿水出多氣血虧損或煩燥口乾
汗下失宜禁衛消燥或寒涼伐氣血不足或峻厲猛劑胃氣受傷以致真氣虛而邪氣是矣煩燥口乾
渴非常或世或閉或淋瀝或清膿大泄或汗多亡陽或下多亡陰以致陰血耗散陽無所附浮於肌表而
非火也若發熱不寢虛熱也聖愈湯兼汗不止氣虛也單人參湯發熱煩燥肉爛筋湯氣血俱虛也八物
湯大渴面赤脈洪大而虛陰虛發熱也古歸芪湯微熱煩燥面赤脈沉而微陰虛發燥也四君子湯如姜
附○凡渴不可專泥於火若燥痛發熱便利調和者竹葉石膏湯腫痛發熱大便秘澀者四順清涼飲
痛賦感者活命飲膿水多者聖愈湯胃傷內亡津液者錢氏白朮散腎水乾涸者八味丸有先作渴小便
頻數而後患疽者或愈後作渴或古黃乾硬小便頻數而後患疽者尤具惡也宜預服八味丸補中益氣
湯以滋化原可免是患蓋癰疽未有不因腎虛而作切忌知母黃柏損陽則陰氣無由而生○泄瀉因寒
涼傷脾胃者六君子湯加砂仁或托裡建中湯托裡溫中湯脾虛下陷者補中益氣湯吞二神丸命門火衰
者八味丸料煎吞四神丸腎虛不固者古姜附湯加莫莖五味子大孔痛者附子理中湯四逆湯凡癰疽
嘔瀉腎脈虛者死○便秘因熱毒入臟嘔心逆發熱腫硬秘結固宜通之又有伏熱陽氣佛鬱面赤便
秘者為邪火在經宜汗以發之潰後氣虛血涸便秘者十全大補湯或因入房傷腎便秘者加姜附以回

醫身入門 卷六 癰疽總論 上海埠葉山房校印

陽氣則大便自潤凡便秘能食而肚腹不脹者切不可下若腹脹脹而秘者猪胆法用猪胆一枚剪去頭入鹽醋少許將棉管插入胆中灌穀道內須臾自通○小便淋瀝頻數短少或莖中溢痛皆腎虛惡症詳四卷林類

七十一葉清後腫痛臭難當也人參黃芪湯或十全大補湯加麥門冬五味子黑睛緊小白睛赤目視不緊小白睛青赤腫人上視者肝腎陰虛而目急二惡喘急恍惚喜卧床喘短氣恍惚嗜卧者脾胃虛也腎氣丸料或八物湯俱加炒山梔麥門冬五味子

補中益氣湯加麥門冬五味子心火剋肺金人虛惡肩背四肢重也補中益氣湯十全大補湯俱加山藥參平肺散陰火傷肺腎氣丸料加五味子煎服

山藥黃食少嘔藥傷寒涼不能下食服藥而嘔食不知味者胃氣虛弱六惡也六君子湯如木香砂仁甚五味子

心實時作嘔陰虛清後作嘔脾虛如熱或放痛活命散護心散作嘔放痛托裡消毒散膿脹痛托裡散或針以泄之放痛便秘者內連黃連湯寒涼傷胃者六君子湯加乾姜木香木乘土位加芍藥柴胡胃散停痰加桔梗脾胃虛弱或水海上加益智仁砂仁鬱結傷脾加川芎山梔蒼朮香附濕氣侵胃倍白朮白朮生肌散妙劑又有登廁觸穢作嘔者仍宜補胃聲嘶唇鼻變青色面目四肢腫且黃脾肺俱虛七惡也補中益氣湯加姜棗或六君子湯虛寒戰腹疼甚自汗飢逆雷鳴腸陽虛皆因或清後勞役或吐瀉之後或誤入房勞遺或外邪所乘初則虛火假症仍發熱頭疼良久寒戰咬牙腹痛雷鳴泄瀉飢逆自汗盜汗陽虛寒氣所乘之症八惡也急用托裡溫中湯後用六君子湯加附子或加姜桂甚者用大劑參芪歸朮

虛極發躁欲坐并驚然變瘧身反張潰後發熱惡寒作渴怔忡睡卧不寧湯衰倍加姜附以手足溫為度

極驚然牙關緊急腰背反張變為瘧症陰病或無汗惡寒或陰虛補熱夜不寐消渴便汚血難藏原稟瘦有汗不惡寒九惡也俱宜八味丸料加參芪歸朮大劑煎服

慾竭精或瘡出膿多或誤汗下以致口補潮熱口乾作渴夜寢不着瘡出紫血四物湯托裡益氣湯腎氣丸主之○便汚黑者不治便血瘀滯者犀角地黃湯救之○瘡瘍時或愈後口鼻吐血才宜銀露皆因瘡瘍出血虛火動而錯經妄行當求經審其因而治之肝熱則血妄行四物湯加山梔牡丹皮黃芩白朮肝虛則不能藏血腎氣丸心火不能主血四物湯加炒黃連牡丹皮芍朮脾虛熱不能統血四君子湯加炒山梔牡丹皮脾結鬱結者歸脾湯加五味子脾肺氣虛者補中益氣湯加五味子氣血俱虛者十全大補湯陰火動者腎氣丸加五味子大凡失血過多而見煩熱發渴等症勿論其脈急用單人參湯補之經云血生於氣苟非甘溫參芪歸朮之類以生

五善見三容易治七惡見四真惡瘡正傳以善為順惡為逆瘡心肝之血決不能愈若發熱脈大者死

珠為又有一般無名腫非癰非疽非瘡非癩狀如惡瘡或瘡或劇名曰無名腫毒隨其見症在表在裡在黃丹輕粉為末麻油調搽一切惡瘡人所不識者皆同

癰疽癰疽也同方一尺至二尺為瘡一吋至五吋為癰五吋至一尺為疽為瘡四畔生如牛唇黑硬為癰無頭面色淡紅為癰是知腫起為癰沉潰為疽發出於外者為癰伏腸胃者為內疽癰比瘰亦更輕癰瘰癧多難治○瘡多生乳脇跨跨全宜大補氣血脾胃及蠟蟻丸護膜生肌冀其萬一○瘰癧見後週身部

腦頸部

腦發五種 頭瘡 風屑 白禿 軟瘡 大頭腫 鬢髮疽 耳瘡附 浸淫瘡 月蝕瘡 內疳瘡 疔腫 瘰癧 瘰癧 瘰癧 瘰癧

腦後頸後頂心發六腑陽毒好上蒸六腑陽毒聚項惟太陽膀胱主之久積痰火濕熱上蒸於腦古謂發

兩邊髮際穴者如有核宜取核以去病根○有生於腦心者四邊腫赤連耳項不急治膿水從頭中而出血逆疾起不治○有生於頸後者瘡頭向上瘡尾向下形如蜂窠乃反症也瘡腫者急宜托裡散加升麻赤芍桔梗枳殼毒攻心如痰發或流入兩肩者不治○有生腦後對口者名曰天疽其狀大而色紫黑不急治熱入淵腋前傷任脈內薰肝肺十餘日而死○有生耳後一寸三分至命之處名曰發頭又曰鏡毒凡

頭上癰疽宜服降火化痰消腫托裡之藥不可針灸惟初起隔蒜灸之則可但艾炷宜小焮腫納冷真熱而少熱成者外敷南星膏或陰陽散散口古香柳散若熱上蒸連頭而穿口必主穿喉而死焮腫納冷真熱症焮腫作痛項渴好飲冷水宜解毒湯如天花粉以除痰火濕口乾飲熱腎虛情腫痛口乾作渴好飲熱熱或黃連消毒散當歸湯活湯清熱消毒飲活命飲選用

頭瘡宜內服酒歸飲外用雄黃水銀各等分未以臘月猪脂半生半熟和勻洗淨敷之濕爛者用煎藥土黃柏為末乾粉和膏者用黃蠟清同煎數之○頭上風屑白屑極痒宜內服單苦參丸下虛者薄荷茶外用茶蘆煎湯避風洗頭候稍乾分間頭髮仍以茶蘆末糝頭皮上細細擦之兩日夜頭風亦效○禿瘡初起白團斑剝如癬上有白皮久則成痂遂至滿頭生瘡中有膿孔細虫入裡不痛微痒經久不瘥宜內用通聖散酒拌除大黃另用酒炒共為末再用酒拌令乾每一錢水煎服外用紅炭萃長流水洗去瘡痂再用淡豆豉一合炒令煙起色焦屋塵一團飯飲調劑炭火煨令灰虛等分為末入輕粉少許麻油調搽如有熱加黃連寒水石有水加枯礬若有虫加川椒麝香少許腫厚加消皮煙洞煙膠香蠟蓋上香膠如久不愈有虫者厚風膏加黃柏黃丹煙膠各一兩一方用鹽烏魚頭燒灰麻油調搽○軟瘡用抱雞卵壳

炒存性入輕粉黃連減半為末清油調敷外腎生瘡亦效愈而再作者用野蜂房二個燒存性為末以巴豆粒去壳煎清油二三沸去豆以清油調敷或枯若亦可多年不愈者用猪頭上毛貓頭上毛各一握尤妙如暑月生瘡用木槿花搗爛敷之最妙

大頭腫痛 又名雷時行毒 濕在高巔之上故頭面腫痛疔瘡甚則咽噤填塞 治分表裡三陽屬 連兩目鼻

明也發耳前後并頭角者少陽也腦後項下腫起者太陽也脈浮表症多者清震湯或散毒散加荆防

沉裡症見者宜姜法黃芩俱酒炒大黃酒蒸為主陽明加乾葛升麻芍藥石羔少陽加瓜蒌仁牛蒡子太

陽加荆芥防風水煎時時呷之取大便邪氣去則止甚者加芒硝或防風通聖散加牛蒡子玄參俱用酒

炒微煎下之咽喉腫痛者用姜茶二兩大黃二兩蜜丸如彈并水化服山荒勞後宜普濟消毒飲以安裡

虛者加參歸便秘加大黃或人中黃丸亦妙服後俱 表裡症罷腫不消磁鋒去血通關 表裡俱腫不

仰臥使藥氣上行故非便秘感忌用降下之藥 者補中益氣湯加桔梗清後腫赤不消膿清色白者六君子湯加桔梗芍藥元氣素弱腫微者用參末

歸陳皮柴胡升麻甘草各等分以升舉陽氣用牛蒡子玄參連 翹結梗減半以解熱毒腫赤便屬純陽脈微便屬純陰慎之

鬢疽肝胆之怒火或因風熱藥同裡 怒火風熱俱宜藥胡清 腎虛血燥日晡熱 腎水不能生木以致肝胆

者四物湯加玄參柴胡結梗甘草風熱連頭面 咽牙痛者犀角升麻湯血虛者四物湯加參芪 汗多喘渴腫過勞 因勞役腫痛寒熱喘渴自汗者補中

耳瘡三焦肝風熱 耳瘡發熱披痛屬三焦厥陰風熱者柴胡清肝湯梔子清肝湯中氣素虛者補中 益氣湯加酒炒山梔黃芩牛蒡子寒熱作痛屬肝風熱者小柴胡湯加山梔川芎

出膿兼養血 內熱痒痛出膿寒熱濁數牽引胸脇 出水貪冷屬骨虛火動切忌風藥劫 耳內痒痛出水喜

經虛火挾怒忌用風藥燥筋宜腎氣丸 耳邊侵淫瘡出黃水者用殺羊鬚刺芥棗肉等分燒灰入膩粉 為末麻油調搽 月蝕瘡生耳鼻面間及下部諸竅隨月盛衰用胡粉炒黃枯若黃丹黃連輕粉各二錢

用鹽水洗淨粉之或麻油調搽

內疳瘡 生於口上腭治以鈎刀并鐵烙敷以雄粉支其牙最是虛勞元氣薄 初發如蓮花根蒂小而下垂

鍊烙以止血其血次以雄黃輕粉粉霜白芷白薇為末敷之以兜枝作梳支其牙類間

母使口合一兩時許瘡痂定合口自便次日出膿以生肌散敷之上疳多骨疽見後

疔腫 疔腫腫痛頗難當 膏梁厚味胃經積熱腫痛或發寒熱者用升麻黃連連翹牛蒡子白芷等分

水煎服連耳上太陽部分腫屬風熱如羌活防風連耳下少陽部分腫屬怒火如

柴胡山梔牡丹皮連耳後少陰部分腫屬相火如知母黃柏頭面齒牙 俱腫內熱口乾者犀角升麻湯齒牙唇舌俱腫出血者清胃散如石羔

內寒不潰宜補 內傷生冷涼藥 體倦者補中益氣湯內傷氣血俱虛者八物湯加麥門冬五味子傷七情有寒熱者八味

道通散傷色慾連頭及耳後腫者腎氣丸 八味丸十全大補湯不可誤用風藥剋伐之劑

瘰癧馬刀屬少陽風熱痰氣結核囊 生頸前項側結核如菘豆如銀杏曰瘰癧生胸脇腋腋下堅硬如石形

後與缺盆肩膊上臂下屬足少陽部分延及頸項頰車與頭屬足陽明部分延及胸中府雲門肺經部 分者死風應火而小熱應散腫赤色又名血瘰癧推動滑軟氣痞圓而動又有鼠殘瘰癧大小不一

者化痰通經脈清肝養血是上方 無疾不成核諸瘰癧初起寔者皆以化痰為主通用二陳湯加防風結硬

心火古方必劫散五應散是也但此二藥甚峻服後宜量體調治體寔風熱感者繼以宜熱丹服之體虛

者托裡益氣湯或八物湯合二陳湯多服瘡口自斂又有虛甚者宜先服健脾胃藥而後服二散輕者只用

少陽陽明二經二湯合服調之誤下則犯經禁病禁 清肝者胆與肝合病則筋索累如貫珠寒熱微痛

乃肝氣動而為病也當清肝火為主佐以養血氣寒熱止而瘡不愈者乃肝血燥 而為病也當養血為主佐以清肝清肝益氣湯枝于清肝湯胡清肝湯選用

虛久滋潤肺脾腎 瘡如 筋筋肉色不變內熱口乾精神倦急久不消潰及肝脈弦緊腎脈洪數乃腎水不能生木以致肝血火動

筋筋肉色不變內熱口乾精神倦急久不消潰及肝脈弦緊腎脈洪數乃腎水不能生木以致肝血火動 筋筋肉色不變內熱口乾精神倦急久不消潰及肝脈弦緊腎脈洪數乃腎水不能生木以致肝血火動

或咳者死古方用玉燭散治瘰癧和血通經服之自消日進一服七八日見効便不閉者柴胡通經湯并
麻調經湯又虛者加味逍遙散清肝益榮湯或用二陳湯合四物湯加杜鵑柴胡黃芩玄參神龜為末以
桑椹膏搗丸每豆大每五十丸男子朝咳是真傷瘰癧傷症之標也故癆瘵類有口腹中有塊頸上有核最
心淡口則胡汗咳瀉惡症蜂起其可生乎但視其目內赤脈貫瞳人有幾條則知其
幾年死面色白金冠木脈共大為元氣虛敗俱為不治故曰瘰癧者有幾條則知其
痰核在頸全不痛頭項生核不紅不痛不作膿推之則動乃瘰癧不散也不可誤用瘰癧藥治宜三陳湯
多服自消如耳後與項間各有一塊者含化丹在臂或痛亦不瘰癧核或作微痛者以內無膿故外雖腫不紅或生背膊皆然宜
草三分水煎服遍身結塊多痰注濕痰下體却宜通凡過身有塊多是痰注但在上體多兼風熱在下
實服之通用海帶丸

瘰癧有五應五臟 瘰癧分五瘰六瘰惟薛立齋止言五瘰蓋瘰癧本共一種皆痰氣結成惟形有大小及生
沸騰外邪所搏而為腫曰血瘰脾主肉鬱結傷脾肌肉消薄外邪搏而為腫曰肉瘰肺主氣勞動元氣虧
理不密外邪搏而為腫曰氣瘰腎主骨勞傷腎水不能榮骨而為腫曰骨瘰瘰癧之名有五者此也仁齋云
筋脈呈露曰筋瘰赤脈交結曰血瘰皮色不變曰肉瘰隨憂愁消長曰氣瘰
瘰癧硬不可移曰石瘰瘰之名有五者此也瘰癧俱內應五臟藥治相同瘰癧走遍身瘰癧項瘰癧所以兩
似櫻桃一團縱天赤似之挺挺而垂皮寬不急原因憂患所至故又曰瘰癧今之所謂影囊者是也瘰癧初
起如梅李皮嫩而光新如石榴皮皺之狀原因七情勞復被外邪生痰聚痰隨氣留住故又曰瘰癧總
皆氣血凝滯結成惟憂患耗傷心肺故瘰癧多着頸雖無痛痒有虛寔散堅行氣不可安瘰癧或軟以便無
頭及肩勞瘰癧氣乘經之虛而作故瘰癧隨處有之雖無痛痒有虛寔散堅行氣不可安瘰癧或軟以便無
瘰癧散堅丸海帶丸瘰癧火感者散神功開結散此皆化痰行氣破堅之劑久虛者不可妄服虛者瘰癧
瘰癧丸或八物湯如小瘰癧木心必妙聖龍胆草肝火感者間以蘆薈丸暫服血瘰癧四物湯加茯苓遠志肉瘰
歸脾湯補中益氣湯氣瘰癧補中益氣湯骨瘰癧骨蒸丸補中益氣湯○通用初起者下六味流氣飲單如蛛
方稍久者蠶蟬丸常服自然縮小消瘰癧外敷南星膏切不可輕用針刀決破破則膿血崩潰滲漏無已必
至殺人但有一種脂瘰癧紅粉色全是痰結用利刀破去脂粉則愈或有如
胎生下根甚小者用藥點其蒂俟枯落即用生肌散口藥敷之防其出血

手部 天蛇頭 瘰癧 代指 紅絲瘡
疔屬肝胆小腸經 多患於手背及指間或如黃豆大或如粟粟或
清肝益榮湯怒火者柴胡清肝 切忌寒涼緊繫誤犯出血必傷生 瘰癧用寒涼降火之藥及螻蛄蝟絲
湯亡精腎枯筋縮者腎氣丸 劇重者大潰腫痛發
甲疽 惡代雖室事不似搗掌風難平 甲疽乃毒氣攻於手足指肉裏上指甲疼痛出血瘡中有虫或因
火封之次令火熾其若即浴流出赤汁者是直候流汗盡去火待冷取為末色似黃丹收之先以鹽湯洗
試後用綠碧為君入乳香少許敷之重者用綠碧五錢蓋蒼一錢半麝香一字為末以絹袋乘藥納所患
指於袋中線扎定以瘰癧為度○代指指頭先腫焮熱掣痛然後用烏梅核中仁為末醋調成膏入芒硝
煎湯淋洗然後於爪甲邊結膿甚者爪甲俱脫先用指清之自愈或用猪脂和蚯蚓搗爛敷之○天蛇頭
瘰癧生手指上或足瘡旁一塊開口腫痛用雞母楊根煎油一宿即消或以雄黃入雞子內以患指浸其
中一宿次早更以蜈蚣燒煙薰病指一二次即消如痛甚流血不止者用雄黃蜈蚣全蝎為末擦在瘡上
却以少油抹帛上托之○搗掌風瘰癧用猪前蹄爪破開入菊花蒼耳末以線縛定攪爛食之次日用白鮮
皮皂角雄黃各五分鉛製水銀三分為末臨夜用搗脂姜汁調搽次早以沙捺去然後量體服去風之藥
此瘰癧乃楊梅瘡類如多年不愈者先用磁針若到次以草麻子一兩括若二錢為末桐油調搽火烘極熱
再以秦肉三兩水銀五錢粘若三錢搗爛如泥每日擦手于餘下次以肥皂酒糟洗淨十次神効更矣勞
官或內開一穴斷根○又方桐油調密陀僧末搽掌外用水龍
骨火燒煙薰之治手足掌風及綿花瘰癧更以樟葉煎湯洗之

紅絲瘡最害更速或生於手或生足發痘初黃變紫青絲進入心毒入腹 紅絲瘡因喜怒不常氣血逆行
紫黑色即有一條紅絲迤血上而生若至心腹則使人昏亂不救或有生兩三條紅
絲者急以針橫截紅絲所到之處刺之令其出血以膏藥貼或嚼洋草根敷之立愈

胸腹部 乳癰 肺癰 腹癰 心癰 附膈癰
乳房胆胃乳頭肝 婦人之乳男子之 病初瀉瀉增熱寒 煩渴嘔吐者胆胃風熱也甚則毒氣上衝咽隔妨
腎皆性命根也 病初瀉瀉增熱寒 煩渴嘔吐者肝邪也此皆表症宜不換金正氣散加

上海埠葉山房校印

天花粉能止渴咽定寒熱咽隔有碍者甘桔湯如生薑或護心散如潰後見此四症為虛婦人胃厚多憂鬱火化汁濁塞竅結核有兒吹熱氣飲食不進憂鬱以致胃火上蒸乳房汗化為濁膿肝經氣滯乳頭數塞不通致令結核不散痛不可忍初起便當隔蒜灸法切忌針刀能飲者一醉膏加芎藭各一分一服兩服即効不能飲者煎薑散○結核亦有氣血虛弱暑被外感內傷以致痰疾凝滯俱以古法正貝散為主血虛合四物湯更加參朮柴胡升麻氣虛合四君子湯夏加芎藭柴胡升麻憂思傷脾者歸脾湯加芩薤根貝母白芷連翹甘草節水酒各半煎服有肝火結核腫痛甚者清肝解鬱湯○吹乳因乳子隔有廢滯口氣酸熱含乳而睡風熱吹入乳房凝住不散作痛初起須忍痛揉令稍軟吸取汁透自可消散不散宜益元散冷姜湯或井水調一日一夜服三五次自解重者解毒湯頃服之挾氣者古法只散單青皮湯核久成癰硬腫漫核久內脹作痛外腫堅硬外用漏蘆為末水調敷又有乳汁不行積乳脹痛者湧泉散核久成癰硬腫漫核久內脹作痛外腫堅硬者仍服瓜蒞散內托升麻湯或復元通聖散加藜蘆虛者托裡消毒散將膏兩乳間出黑頭瘡頂下作黑虛者內托升麻湯已潰寒熱者內托十宣散少食口乾者補中益氣湯嘔熱內熱者八物湯加五味子胃香者遇勞腫痛者八物湯倍參芪歸朮未過怒腫痛者八物湯加山梔又有核小全不痛久則潰漏瘡益難醫者有傷肝脾結核如驚甚于大不痛不痒五七年後外腫紫黑內漸潰爛名曰乳巖滴盡氣血方死急用十六味流氣飲及單青皮湯兼服虛者只用清肝解鬱湯或十全大補湯更加清心靜養庶可旬延歲月經年以後必於乳下潰一穴出膿及中年無夫婦人死尤速故曰夫者妻之天惟初起不分屬何經絡急用葱白寸許生半夏一枚搗爛為丸艾寔大以綿裹之如患左塞右塞右塞左塞一宿而消男兒乳疾何須怪怒怒損傷精血乾致肝虛血燥腎虛精枯不得上行疾痕凝滯亦能結核婦人胎產後亦有肝虛者大概男子兩乳腫者瓜蒞散十六味流氣飲左乳者足三陰虛鬱怒所致八物湯加山梔壯丹皮或清肝解鬱湯火盛風熱者更加炒黑草龍胆五分腎虛者腎氣丸食少作嘔胸脇作痛日晡頭痛弱溢者六君子湯加芎藭柴胡山梔潰爛作痛者十全大補湯腎氣丸因勞怒則痛并發寒熱者補中益氣湯加炒黑山梔不可輕用清熱散毒之劑

肺癰因痰火益炎 經年久咳熱極葉焦而為痰癰草木亢甚則枝葉落也火燥甚則脹腐為膿血成癰能轉側皮膚不澤胸脇脹滿呼吸不利吐痰腥穢癰口乾燥痰涎粘膿成胸痛或開竅調和金水胃脾藥肺癰脈數而實寒熱往來母痰痰冷湯主之如咯而將變癰者紫苑散火或散者人參平肺散為丸合化虛損者劫勞散虛冷不渴者天甘草湯加乾姜喘急有寒邪者小青龙湯喘急面浮鼻塞胸脹者古葶應散是知肺癰有寒有熱而以

清金降火豁痰為主也○肺癰脈數而虛口燥咽乾胸脇隱痛二便赤澀咳唾膿血腥臭置之水中則沉結梗湯主之如吐膿者消膿飲咽痛者甘桔湯便秘者天乙膏為丸白湯下人有胸脇間一竅口中所托膿血與痰相應而出者宜大補氣血血多者梅豆湯冷熱不調者雲母膏為丸甘桔湯下痰多少食者于咳唾痰壅者腎虛也腎氣丸口乾燥者虛火也八味丸去附子加五味子有吐膿血如肺癰口臭諸般藥不動者消風散加髮灰米飲下大概面赤當補脾腎面白當補脾肺益補脾以生肺金補肺以生腎水也如陰火發熱咳吐血膿血痰如糯米粥脈浮大者死若膿血自止脈浮短過者生

心癰胸發名丹疽 胸乳間生蜂窠癰發名丹疽狀如豆外發可治內傷疽降火清心為要藥心熱或極急之藥遲則不救大便澀者清心散或涼膈散去硝黃加白芷天花粉瞿麥木通大便秘者內清心散或涼膈散去硝黃加白芷天花粉

肺癰一樣忌補虛 初起神効瓜蒞湯或柴胡清胸湯蓋胸膈肝心火或虛中有熱決不敢投陽藥貴後方和敷之消腫止痛膿成者敷之即安

胃癰胃熱咳膿血人迎反盛胃脈沉 胃脘癰因飲食七情火鬱復被外感寒氣所隔使熱濁之氣填塞胃者胃癰寒熱如瘧皮毛縱先宜疎利次補升外症寒熱如瘧胃弱則肺金失養故身皮錯縱或咳或嘔或大便不利者太乙膏為丸服小便利者三仁湯內痛者失笑散虛而痛者壯丹散膿出食少者補中益氣湯升提胃氣或佐以前藥調之不可專治其瘡

腸癰小腹痛若淋濕熱痰瘀注內膜甚者腹脹有水聲便膿臍痞背敗惡 濕熱鬱積成癰痰火盛者脈數症小腹腫強按之則痛小便若淋似奔豚發熱惡寒脈遲緊者未有膿也大黃湯或五香連翹湯下之不敢下者脫毒散加秦沈連翹升麻乳香四物湯加桃仁紅花玄胡索木香脈洪數者已有膿也三仁湯神効瓜蒞湯小腹疼痛小便不利者膿壅滯也壯丹散若腹脹間有虛冷皮甲錯腹皮似腫按軟弱中無積聚外無朝脈數還宜用溫藥疑瘻成癰壯丹散或內托十宣散加茯苓甚者敗醬散以小便利為驗又

有冷熱相交併消痰和中後補托 腸癰冷熱症用雲母膏為丸牛膝煎酒下利去痰膿則愈其間有痛甚

尤妙膿止後內托十宣散或八物湯補中益氣湯以固本元愈後却宜靜養若動作躁

暴或被驚恐則腸斷而死凡癰大小腸分尤可大腸分近肛門者難治肛門破者即死

腹癰腹痛關脈數飲食七情火滯着 腹癰生於肚腹皮裡膜外左關脈洪數而腹痛甚者是也膏梁七情

不可無膿腫硬色如常 腫痛甚者邪氣寔也先用活命飲隔蒜灸以拔其毒後用托裡散以補其氣膿成

腫軟色赭若 腫起而軟色赭赤者膿成也托裡消毒散潰未宜壯胃元行經活血息涼藥 潰未潰俱宜

壯胃元氣而佐以行經活血若誤用剋伐及利下涼藥則腫不能潰潰不能斂壯者難治 吁嗟九疽認亦

老弱立死若曾經誤下及服降火破氣消痰之藥大劑參苓姜附或十全大補湯救之 難按穴方知審經絡

難按穴方知審經絡 中府屬肺巨闕屬心期門屬肝章門屬脾中腕屬胃京門屬腎天樞屬大腸丹田屬

也上肉微起者肺癰也各穴做此十六味 流氣飲或托裡散加當歸山梔黃芩杏仁

背腰部 背發七種 腰發二種 背雖膀胱腎脈所主然五臟所係於背或醋酒厚味或鬱怒房

發背五臟毒蘊成七情六慾外邪并 勞以致水枯火炎痰凝氣滯或被外邪與毒相搏隨處發生 肩下

脊上脾家毒 發在肩下脊上乃因飲食感毒廣一尺深一寸雖潰在背不穿膜不死急治脾肚

子内生 蓮子發生於右脾中外如蓮蓬內有子孔恐其毒奔入心大要藥截住如通脊皆腫者不可救 偏左初起汗即散

用燈火點破內服 左搭右搭肺肝情 右搭肩發骨上生者以動之處可治若串左肩難治左搭肩發骨上

外用去惡散或綿絮燒灰 脊中蜂窠防膜透 蜂窠發正當脊心形如蜂窠有孔在上者不宜最為反症宜

為末搽之乾者麻油調搽 散走流注風熱盛 散走流氣發毒氣乘風熱 而走急宜疎風定熱治之

對心火毒太相凌 對心發極重因心火盛而熱氣會主於此 散走流注風熱盛 散走流氣發毒氣乘風熱

其毒壯或走暴急用疎導心火之藥解之 散走流注風熱盛 散走流氣發毒氣乘風熱

則氣自息若流注於 氣食陰虛遍見 形此發頭尾俱矣而邊積大如龜之形因飲食所致而氣食相闔合

手脚腿者必死無疑 腎俞濕熱單生發 房怒兼之雙發 腎俞發因受濕并怒氣飲熱酒傷於內腎流毒腎俞生疽急用藥解

陽發於外者可治陰發痰發傷腎膜及膿稀者死又有 慢腫難治炊腫易 炊腫發熱疼痛赤亦作渴脈滑

腎俞一發脾骨上一發肩膊上又生一發亦謂之雙發 慢腫難治炊腫易 數有力先服活命飲後用托裡

消毒散覆腫不熱微疼色黯作渴脈數無力者腎虛也托裡散少食者六君子湯加姜補熱陰虛者四物

湯加參朮或腎氣丸惡寒熱四邊漸大有陽氣虛也單人參湯十全大補湯小便頻數者八味丸初起食

少者相感脾虧也急用補中益氣湯救之今俗專用養命丹二粒全施於因怒因飲食毒及肥人則可若

瘦人及因慾火者反燥陰作渴致泄或血泄毒氣不行推初起或一服之則可凡炊腫氣血勝毒易治慢

腫服托藥不應者乃毒勝氣血死在旬日或已發出而不腐潰者須急用托裡藥兼補脾胃不應死在二

旬若已潰而色不紅活者用托裡散加參朮肉桂及補脾之藥却不能生肌瘡口斃量大而不可斂乃脾前

也死在 總論中間法可憑 表症內托發汗裡症內疎通在經和解體虛 者未潰托裡消毒已潰托裡溫補詳前總論

腎腿部 腎癰附腎疽瘡 便毒 路歧 懸癰附穀道中瘡 痔 漏 陰瘡 陰囊癰附小

腎癰太陽部位與雖多血氣平到 腎居小腹之後部位僻與雖曰多血然氣 陰虛濕熱是病根內托固

裡性無躁 初起未成膿者隔蒜灸再用葱熨法欲作膿者內托羌活湯痛甚者活命飲腫硬痛者托裡消

尤宜腎虛不能消散或作渴弱淋者腎氣丸有脾虛誤服消導藥以致氣陷下腫痛甚者補中益氣湯或

瀉肝湯... 濕熱因勞倦... 補氣血... 濕熱因勞倦... 補氣血... 濕熱因勞倦... 補氣血...

懸癰足三陰虧損... 如桃李如以赤腫... 輕則漏瀝重則瘻... 輕則漏瀝重則瘻...

重則內初起量與清濕熱... 命飲去大黃或龍胆瀉肝湯... 大補氣血猶恐晚... 大補氣血猶恐晚...

腎虛者腎氣丸血虛者四物湯... 命飲去大黃或龍胆瀉肝湯... 大補氣血猶恐晚... 大補氣血猶恐晚...

細搗綿裹納下... 命飲去大黃或龍胆瀉肝湯... 大補氣血猶恐晚... 大補氣血猶恐晚...

五痔原因食色傷... 經曰因而飽食筋脈橫解... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

脫世熱毒乘虛下注... 或注入房過甚傷筋... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

血痔肛造一枚生瘡... 腸痔結核腸內脫肛... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

易虫痔浸淫濕爛... 積月累蝕腸穿穴... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

蓮花核桃毒淺者... 小如松子牛乳雞心... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

也痛極者火熱也... 痛痒者風熱也大便... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

下或軟涼血和氣清... 濕熱潤燥疎風止痛... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

行氣寬腸... 參黃芪補之氣不順... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

熱如味連... 或四物湯合散毒消... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

變漏初起... 宜蒜天已成者... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

肥肉丸... 加味地黃丸... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

以滋化原... 更節嗜欲... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

勿專服寒涼... 為火... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

九漏須知初起... 凡瘰癧疔久... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

浮腫漏... 腎主癆瘵漏... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

又有原因痔漏... 肛邊別生一塊... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

在痔孔出者... 乃食積注下也... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

牛酒加味... 龍角丸... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

艾葉薰洗... 平肌塞竅端... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

大漏小疔... 灸令微熱... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

之畏火者... 內生肌丸... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

陰瘡三等屬腎肝... 濕瘡風濕痒如癬... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

以致敗精... 流入莖內... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

腫痛小甚... 久潰爛成疔... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

侵山... 濕熱腫痛... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

試湯... 腫潰後氣血虛... 痔蓋飽食則脾不能運... 痔蓋飽食則脾不能運...

陰虛為本腫痛寒熱為標宜常
服腎氣丸若專治肝則誤矣
望津津出多脾輕
蓋中津出白津多因脾土軟弱不能滋生金水以致肝
胃為肝腎之源心寔主之○外治濕陰瘡疔蛤散銅綠散妬精瘡津調散
早螺散玉聖散裂腫痛者搗管散爛臭成瘻者截疔散或用洗藥腎莖上生瘡久不合口者用經布燒灰
蜜調塗上則愈有陰毛間生
虫作痒者搗桃仁泥塗之

陰囊癰屬肝腎經都緣陰虛濕熱并
丹溪云但以濕熱入肝施治
而佐以補陰雖潰脫可愈
弱滋清肝利濕毒
初起腫赤脹痛小便
在反掌宜腎氣丸料如車前子牛膝煎在滋腎丸
利濕熱後仍腫痛者宜補陰托裡以速其膿而針之
若膿未便秘者熱毒壅滯也宜托裡消毒散或又不
潰後托裡補陰精
膿潰皮脫畢丸懸掛或內見筋
貼囊者亦腐如半邊筆管只宜托裡散加故紙黃芪五味子免絲子或四物湯加參朮吞腎氣丸兼服補
中益氣湯倍黃芪歸朮大補氣血脾胃切忌寒涼攻伐及淡參損陰之藥外塗白蠟膏囊莖旬日可復雖
曾去陰子亦無害又有因水腫囊腫潰者見內科○陰囊兩旁生瘡濕痒甚者壯若丹或連兩腿生風
濕瘡者疏換散○小兒陰囊生瘡及陰股間汗出先痒後痛愈後復發先以火炙瘡去痂令乾以蜜敷
之却搜麩作餅炙熟乘熱熨
之冷則再火再熨以愈為度

婦人陰瘡壽火致損傷肝脾濕熱注如蛇如菌如雞冠生虫腫痛痒脫墜
陰戶生瘡乃七情鬱火傷損肝
脾濕熱下注○陰中挺出一條
尺許如蛇痛墜出水溺澀者朝服補中益氣湯晚服龍胆瀉肝湯外塗黎蘆膏而收○陰中突出如菌如
雞冠四圍腫痛者乃肝脾虛下陷先以補中益氣湯加山梔茯苓車前子青皮以清肝火兼升脾氣漸
愈更以歸脾湯加山梔茯苓川芎調理外塗黎蘆膏○陰戶突因勞力者血虛四物湯加龍骨氣虛補中
益氣湯○陰中生虫匿如小蛆者乃濕熱甚而心氣又鬱氣血凝滯而生宜霍香養胃湯補心湯古疏鯉
丸外用生艾汁調雄黃末燒煙薰之更用雄黃散納陰中○陰中生虫痒不可忍食人臟腑即死令
人發寒熱與癆症相似先以蛇床子煎湯洗淨試乾後用梓樹皮焙乾為末入枯礬四分之一麝香少許
敷之立効○陰戶兩旁腫痛手足不能舒伸者用四季葱入乳香末同搗成餅安陰中立効○陰腫痛極
便秘欲死者以橘核煎但腫痛者四物湯加柴胡山梔牡丹皮龍胆草如時常陰痛者四物湯加藁本防風
○陰戶腫痛不閉者通遠散十全大補湯腫消不閉者補中益氣湯腫墜者如山梔牡丹皮
○濕痒出水又痛者憂思過也歸脾湯加柴胡山梔牡丹皮芍藥生甘草○潰爛者通遠散
內症執倦經

不調食少胸滿尿澀滯
陰戶腫痛不閉寒熱弱體倦少食者補中益氣湯加升麻柴胡至一錢量入伏
苓山梔○陰戶不閉小便淋瀝腹中一物攷動脹痛者通遠散加柴胡山梔車前
子又有交接血即來涼藥房為苦累也
裏入陰中或用亂髮青皮燒灰敷之若出血過多見雜症者調補

附骨疽毒深着骨賊風石緩不可忽賊風得熱痛少膏
賊風西風邪搏於骨髓故其痛亦徹骨過寒則甚
外症惡寒有汗痛處常欲熱熨失治變為癰曲偏
枯宜起得
緩慢色黯石硬
腫與皮肉相似疼痛堅硬如石二者初起便宜溫熱托裡補虛散乃隨症調
湯主之

治附疽內痛真如錐外肉全無赤腫突粗人多因冷露侵濕熱痰火虛家發
者初起痛不能轉寒熱無汗
經久寒暑為熱便秘者瀉蘆飲子主之有不收下者須分經內托汗散在尻腎者內托羌活湯腿內近膝
股漫腫木硬者內托柴葛湯腿外者內托酒煎湯左腿外側漫腫長闊行步作痛以手按至骨大痛者黃
連消毒散通用換毒散散毒散○內傷厚味及勞役與酒後乘涼浴水邪入脾經環跳穴左右積痰瘀血
搏成宜青葙散相湯散汗服此不愈恐疔成者急掘地坑用火燒紅火以小便令患者赤體坐其上以
被席圍抱下截使熱氣薰蒸暖理開氣血暢而愈○內傷生冷飲食寒涼藥物血凝於內飲食如常活命
飲食少體倦者六君子湯加當歸香如因勞傷傷食右腿偏腫者補中益氣湯○內傷鬱怒腫痛如錐
赤暈散漫先用活命飲次用八物湯加柴胡牡丹皮山梔○內傷勞役兩腿腫痛寒熱食少此濕痰下注
也補中益氣湯加半夏茯苓芍藥○內傷房室兩腎腫硬二便不通者腎氣丸料如車前子牛膝煎服兼
用十全大補湯有寒熱者通遠散○抑考附疽初起宜青皮甘草節二味煎服以行其氣或天賦患處若
膿已成即用火針使毒不得內潰帶生用亦無妨且痛又易斂口○附骨疽慢腫光色者用蜂房蛇退
頭髮灰各等分為末每三錢酒調服或神應膏為丸梧子大每三十九溫酒下外仍貼之已潰者用平肌
刺或狗頭骨燒煙熏之魚眼瘡亦妙○腿上一切寒濕瘡用鴿子糞煨過為末乾糝如爛痛加黃丹少許
桐油調敷凡癰疽
杖瘡破瘀止其痛定心補益是後節
杖瘡於法本不當治據古方破瘀去血為先一杖
生伏虎穴者不治

後體感者用雞鳴散下之體薄者瘡或寒熱惡心少食宜當歸鬚散加柴胡羌活氣鬱加木香心腹脹痛
加重便心下脹滿氣不通暢加木香枳榔外用熱豆腐鋪在杖處其氣如蒸其腐即紫復以熱豆腐鋪之
以紫肉散盡淡紅為度出膿血潰爛者亦宜甚者內服乳香定痛散隨以熱酒盡量而飲虛者看後宜大
補氣血脾胃兼吞紫河車丹最易平復外貼黃蠟膏馬齒膏凡杖瘡惡乾毒攻腹內恍惚煩悶嘔吐者難治

腎腿部

上海掃葉山房校印

四十一

足膝部 鶴膝風 人面瘡 腎臟風瘡 腫瘡 腳根瘡 附脚肚瘡及袴口瘡

鶴膝風如鶴之膝。三陰虧損風邪入。而腿愈細有如鶴之膝。然初起宜用溫熨法。以內消之。寒熱者五積

艾加散。加烏藥。姜。蚕。已。潰。者。獨。活。寄。生。湯。大。防。風。湯。亦。有。虛。火。陰。血。枯。所以。痢。後。多。此。疾。湯。虛。熱。來。復。去。者。無。根。虛。火。也。下。全。大。補

八。未。丸。發。熱。大。渴。面。赤。脈。大。血。虛。甚。也。古。歸。低。湯。陰。虛。形。瘦。發。熱。者。腎。氣。丸。按。濕。熱。者。蒼。龜。丸。二。妙。養

相。散。食。少。問。黃。者。六。君。子。湯。津。乾。中。氣。不。足。者。補。中。益。氣。湯。加。五。味。子。體。清。肌。肉。不。生。者。八。物。湯。婦。人

月。經。不。調。發。熱。口。渴。兩。膝。腫。痛。者。腎。氣。丸。八。面。相。傳。積。業。完。貝。母。一。施。淚。便。出。瘡。象。人。面。眼。口。鼻。全。多。生。瘡

丸。蒼。龜。丸。道。遠。散。加。牛。膝。杜。仲。黃。柏。云。完。業。所。致。須。清。心。悔。過。內。服。十。六。味。流。氣。飲。久。者。天。苦。參。丸

腎臟風瘡有如解初起脛上遍身攻。此非腫瘡亦非外腎風瘡。乃腎虛有火血燥。或思色精不出而內散

新延開失治延及外症瘡痒滴膿水。內症潮汗痰倦。如內症補熱。盜汗。口燥咽乾。吐痰。體瘦。腰脚。倦。急。治

氣。湯。為。主。佐。以。腎。氣。丸。四。生。散。又。有。遍。身。生。瘡。膿。水。淋。瀝。兩。眼。尤。甚。體。倦。作

瘡。瘡。腫。痛。濕。熱。甚。生。兩。膝。上。初。起。成。腫。作。痛。寒。熱。者。屬。外。邪。濕。熱。者。屬。內。邪。命。飲。慢。腫。寒。熱。陰。分。虧。痛。腫。痛。屬。三。陰。虛。也。或。發

寒。熱。俱。宜。八。物。湯。十。全。大。補。湯。脾。虛。挾。表。邪。者。補。中。益。氣。湯。加。桔。梗。白。芷。脾。虛。濕。熱。流。膿。口。乾。少。食。者。補

中。益。氣。湯。加。茯苓。芍。藥。補。熱。加。炒。黑。黃。柏。地。枯。怒。氣。加。山。梔。川。芎。有。鬱。者。歸。脾。湯。加。山。梔。柴。胡。若。患。處

黑。黧。肢。體。惡。寒。飲。食。少。思。者。屬。肝。腎。虛。敗。宜。八。味。丸。內。熱。口。外。足。三。陽。需。外。治。內。足。三。陰。更。難。醫。腫。瘡。因

乾。者。腎。氣。丸。久。不。愈。者。天。苦。參。丸。腎。臟。虛。風。四。生。散。黃。芪。丸。外。足。三。陽。需。外。治。內。足。三。陰。更。難。醫。腫。瘡。因

風。濕。者。洗。以。葱。湯。次。用。龍。骨。膏。貼。之。風。熱。者。馬。齒。膏。貼。之。重。者。桐。油。膏。痒。甚。者。斷。艾。膏。久。不。愈。者。內。外。通。用。爐

許。粉。之。內。腫。瘡。初。起。洗。以。鹽。湯。次。以。蠟。燭。紙。貼。之。重。者。桐。油。膏。痒。甚。者。斷。艾。膏。久。不。愈。者。內。外。通。用。爐

灰。膏。點。去。瘡。肉。後。貼。黃。蠟。膏。然。內。必。量。體。服。藥。若。誤。用。攻。伐。傷。胃。者。亦。能。殺。人。

脚根瘡乃督腎部內因虧損足三陰。脚根乃督脈發源。腎經過脈。內因飲食起居。初必脚軟并跟痛。一味

滋補免侵奪。慢腫食少者。補中益氣湯。補熱頭昏者。逍遙散。腎氣丸。咳嗽吐痰者。十全大補湯。八味丸。又

不可忍。久成痼疾。難愈。先用貫眾煎湯。淋洗。後用百藥煎。為末。津唾調。逐旋塗敷。自外而入。○袴口瘡。生

於脚脛。或因物打撲。而成。其瘡口狹。皮肉極潤。皮薄。如竹膜。極痒。痛。終日黃水流。延蔓而生。甚者數十年

不愈。又易於染人。患者須忌房室。則易愈。用韭菜地乾地。龍尿。為末。入輕粉。清油。或白夫血。調敷。內。外。腫。瘡。亦。治。

脚發足心或縫間。三陽易治。三陰難。生足掌。或足指縫間。色赤。腫痛。膿稠者。屬足三陽。濕熱。下注。易治。微

渴。小便淋瀝者。陰。敷。未。傳。惡。症。不。治。湧。泉。發。熱。乃。其。兆。天。尉。滋。降。可。保。安。治。法。濕。熱。下。注。者。先。用。隔。蒜。灸。及。活。命。飲。以。解。蘊

初起。托裡消毒散。或托裡散。加牛膝。枳。杜。仲。或。托裡消毒散。後。天。防。風。湯。十。全。大。補。湯。又。有。散。甲。不。能。行

補湯。八味丸。陰虛。足心。熱者。四。物。湯。加。知。母。黃。柏。脾。虧。者。補。中。益。氣。湯。若。專。治。瘡。者。死。又。有。散。甲。不。能。行

五指濕爛如湯發。散。甲。因。靴。窄。研。損。爪。甲。陷。入。四。邊。腫。成。黃。水。流。出。侵。淫。相。染。五。指。濕。爛。漸。引。止。脚。趾

手。剪。去。肉。中。爪。甲。外。用。蛇。退。一。條。燒。灰。雄。黃。四。錢。為。末。乾。粉。乾。者。香。油。調。敷。與。甲。疽。條。參。治。○脚。指。了。瘡

濕。爛。及。足。指。角。急。為。甲。所。入。肉。便。刺。作。瘡。濕。爛。用。枯。礬。三。錢。黃。丹。五。分。為。末。粉。之。或。搗。掌。黃。皮。疏。灰。粉。之

又。方。用。細。茶。嚼。爛。敷。之。因。暑。手。抓。兩。脚。爛。瘡。亦。宜。能。解。熱。燥。故。也。○指。縫。搔。痒。成。瘡。血。出。不。止。用。多。年

糞。桶。箍。燒。灰。敷。之。○脚。上。及。指。縫。中。沙。瘡。用。燕。巢。泥。器。炒。黃。柏。二。味。為。末。香。油。調。敷。瘡。者。加。乳。香

脚背發必兼消渴。輕者赤痛。猶可活。重潰色黑。名脫疽。甚重筋骨盡斬。脚背發。又名脫疽。疔。以其能貴

原因。膏。梁。房。室。損。傷。脾。腎。或。先。渴。而。後。發。或。先。發。而。後。渴。輕。者。色。赤。作。痛。自。潰。可。治。先。用。隔。蒜。灸。內。服。活

命。飲。或。脫。毒。散。加。金。銀。花。白。芷。天。黃。痛。止。乃。與。托。裡。散。或。內。托。十。宣。散。去。桂。加。天。花。粉。金。銀。花。扶。氣。者。十

遍身部 五疥 五癬 血風瘡 癩風 楊梅瘡 疔瘡 多骨疽 翻花瘡 流注 暑熱瘡 癩瘡 寒冷瘡 凍瘡 手月疽 蝸瘡 癩瘡

上即安

侵淫瘡 白蛇纏 湯火瘡 肌瘡 疥瘡 漆瘡 竹木刺 折傷 破傷風 疔瘡

五疔乾濕虫破膿 五疔由五臟蘊毒而發屬足三陰者尤多便秘為寔利風虛 瘡有過體難分經絡必憑外症以斷虛寔破腫

熱或時寒熱體倦少食 乾疥癢痒肺燥甚 乾疥癢痒皮枯屑起便秘者為心肝火鬱於肺四順清涼飲古

便順利者為血虛風熱 乾疥癢痒肺燥甚 乾疥癢痒皮枯屑起便秘者為心肝火鬱於肺四順清涼飲古

血潤燥生津飲或四物湯加黃芩連翹天門冬久者腎氣 濕毒腫脾胃攻 濕毒腫脾胃攻 濕毒腫脾胃攻

毒散風通聖散俱酒蒸或大黃炒另用酒煎砂二次加木薑子或升麻葛根湯加天麻蟬退凝滯復元通

氣散濕勝者除濕丹便利者為脾虛濕熱補中益氣湯量加芩連清熱苦芷燥濕胃火作渴者竹葉黃芪

湯脾腎盜汗不寢者歸脾湯弱滋腹脹者胃苓湯加黃連 砂田作疼心血滯 砂田作疼心血滯 砂田作疼心血滯

久者二妙蒼柏丸濕勝單蒼木膏脾肺風毒者何首烏散 砂田作疼心血滯 砂田作疼心血滯 砂田作疼心血滯

便秘者當歸丸或涼膈散合四物湯久者酒蒸黃連丸胸煩多痰者牛黃 虫瘡如癬用火衝 腐草為蟻意

清心丸心煩口乾小便不利者連翹散便利者活血四物湯久者當歸散 虫瘡如癬用火衝 腐草為蟻意

也虫疥痒不知痛延蔓易於傳染便秘者肝風熱甚蘆薈丸或駝毒散磨於羊角汁刺之久者古若皂

丸便利者肝經火鬱通散磨於羊角汁刺之久不愈者胡麻散但諸瘡久則生虫須兼外治敷洗 膿

窠焮痛脾壅熱痛慢虛火腎不充 含漿稠膿色厚焮痛便秘者為濕熱五香連翹湯升麻和氣飲或行葉

或四物湯加知母黃 更分上下與肥瘦 上體多兼風熱下體多兼濕熱肥人多風濕瘦人多血熱瘦弱虛

相或四生散散腎氣丸 更分上下與肥瘦 上體多兼風熱下體多兼濕熱肥人多風濕瘦人多血熱瘦弱虛

倉耳連翹之類決不可純用風藥涼血傷胃因皮膚之疾而壞臟腑者有 開胃退熱殺其虫 開胃退熱殺其虫

之通用連歸湯湯氣虛四君子湯血虛合四物湯風合消毒飲濕合平胃散 開胃退熱殺其虫 開胃退熱殺其虫

之類退肌熱須苦寒芩連大黃之類殺虫須水銀之類此丹溪外治三法也 乾疥吳茱萸散或黃連大黃

為末猪胆汁調搽濕疥一上散砂疥剪草散虫疥硫磺餅膿瘻瘻三黃散通用厚風膏洗藥用荆芥黃柏苦

參等分煎湯痒加蛇 床子川椒腫加葱白

五癬濕頑風馬牛總皆血熱肺邪留 疥癬皆血分熱燥以致風毒越於皮膚浮淺者為疥深沉者為癬疥

梅走散風癬即乾癬癢之則有白屑濕癬如虫行搔之則有汁出頑癬 清熱殺虫祛風濕久則補腎自然

全無不知痛痒牛癬如牛頭皮厚且堅馬癬微痒白點相連又曰狗癬 清熱殺虫祛風濕久則補腎自然

收 諸風濕虫癬與疥瘡大同 初起有可下者打膿散去黃連金銀花穿山甲芒硝加赤芍白芍水酒各半

煎臨熟入大黃露一宿五更服有可汗者四物湯加荆芥麻黃各五錢浮萍一兩葱豉煎服取汗一切

癩癬皆效經久不散汗下者只用防風通聖散去硝黃加浮萍皂刺小煎服久年不愈體虛者兼吞頑癬

丸或古龍虎丹用何首烏白芷蘇木等分及猪油及鹽少許浸酒送下體虛者不可妄用風藥氣虛者何

首烏散消風散血燥者四聖不老丹或腎氣丸又服自功有虫者俱宜開服蠟殼丸 外治乾癬用狼毒

草烏各二錢半紅梅七枚生為末津唾調搽 濕癬用枯若黃連各五錢胡粉黃丹水銀各二錢為末用

猪脂油二兩炙研令水銀呈散盡磁確收貯搽之 牛癬用舊皮鞋底燒灰存性入輕粉少許為末用油

調敷 馬疥癬用馬鞭草不犯鐵器掃自然汁半盞飲盡十日即愈 通風麻油二兩入巴豆草麻子各

十四粒斑貓七粒煎三味結黑去查却入白蠟五錢蘆薈末三錢攪勻磁罐收貯搽破

塗之或用川槿皮折剪草木蠶子等分為末醋調敷 洗藥用茶葉樟腦蒼耳浮萍煎湯

上海海山房印

通身部

上海海山房印

蝕臟壞五形清肝涼血火瀉瀉 蝕因火盛氣血沸騰充滿經絡外瘡延蔓內虫攻注蝕肝眉脫蝕心足底
 或枯葉煎眉脫鼻前者癩肌散補氣瀉榮湯蝕眼者蘆薈丸肢節廢者蠲痺散通用髮膏花散胡麻散加
 味苦參丸天麻丸換骨丸天麻風丸紫雲風丸活絡丹腎氣丸四聖不老丹八物湯外治摩風膏
 浴癩方髮具不生者先用生髮膏三洗後用半夏為末麻油調搽更與四卷搽鬚髮條參看也

楊梅瘡因風濕熱或傷氣分或傷血 楊梅瘡因治與癩大同多由肝腎脾內風濕熱之毒間有天行濕毒
 以理推之形如楊梅嫩紅爛爛痒痛屬心多生乳疔形如鼓針黃豆者屬脾多生漏面謂之大風痘形如
 綿花屬肺多生毛髮形如紫葡萄按之緊痛者屬肝腎多生叢生豚臂及筋骨之處形如魚泡內多白水按
 之不緊者謂之天泡瘡乃此類之輕者如發於鬚鬚口鼻穀道邊者屬陽明及少陽太陽如發於足脛陰
 莖脇肋者屬肝腎及太陰大抵上先見者氣分受病上體必多下先見者血分受病下體必多上下俱見
 者氣血俱病 初宜疎瀉久補虛免成癰癬與漏缺 初起即服防風通聖散一貼去麻黃用硝黃以去內毒待胃
 俱病 減通聖散九多服此方內通臟腑外發經絡為首尾要藥輕者服此一劑更如搽洗足矣重者十貼後宜
 服化毒散三日却用吹藥三日瘡乾如欲脫落者服化毒散三日後量用防風通聖散加減上體多者兼
 服散毒散加劑防鈎藤下體多者兼服龍胆瀉肝湯從鼻準腫起遍身生瘡面上尤多者碎皮散便燥者
 洞風順氣丸以此調理斷根○夫治久則風毒深入經絡痰濕而成頑癬或氣血虛散而成漏或誤服輕
 粉水銀及不遵禁戒而成風堆腫爛流膿出汁謂之癰病至於此亦有蝕傷眼鼻腐爛王莖拳擊肢體與
 癩無異治宜消毒藥以補虛○消毒頑癬者皂根丸○筋骨痛者皂刺丸○換骨丸○成漏者象牙丸○腫塊者仙
 遺糧丸○通用如味苦參丸天麻丸蠟蟻丸單苦參酒○消毒補虛仙遺糧丸加鈎藤或補氣瀉榮湯胡麻
 散○補虛氣虛者單人參湯補中益氣湯血虛者四物湯加山梔鈎藤金銀花甘草節或腎氣丸四聖不
 老丹氣血俱虛者八物湯八味丸單
 仙遺糧丸○外貼天乙膏白蠟膏

疔瘡原是飲食毒發因火畜暴冷傷 疔瘡曰膏梁之變足生大疔恣食辛辣厚嗜炙烤腥葷及誤食自死禽
 之氣釀注經絡觸動其毒而發者或因感死畜蛇虫毒氣而發者其死尤速初發或因衣
 物觸着而疼痛忽生或因發疹抓破而成瘡僅一小瘡殺人一二日間比之癰疽尤毒 生於四肢及頭
 面疔發無定處或肩背腰尤緩在頭面耳鼻口目舌根唇上及手足骨節間者最急如生兩足多有紅絲
 至臍生兩手多有紅絲至心生唇口內多有紅絲入喉者俱難治須急看以針挑發其絲出血以泄

其毒氣方 頂硬根突近寸長變黑腫爛透深孔形色不一極痛痒 瘡頭黑硬如疔四畔帶赤如火盤根突
 可保生 濕爛深孔透肌如大針穿之狀其形初起大小不一或如水泡如吳萸如豆如石榴子其色孔五內經分
 應五臟各有所屬部位局方別一十二種一麻子疔狀如黍米稍黑忌麻仁麻衣二石疔如黑豆其硬忌
 瓦礫磚石三雄疔四畔仰起色黃大如錢孔四堆疔四面起起心凹色稍黃如錢孔俱忌房室五
 火疔狀如湯火燒四畔有煙起忌火燒烙六爛疔色稍黑膿水流出血熱食爛物七三十六疔狀如
 黑豆今日生一明日生二及滿三十六數即死忌噴怒八蛇眼疔狀如蛇眼忌惡眼人及嫉妬人見九盤
 疔狀大如匙面色赤中有黑粒忌食鹽十水洗疔狀大如錢頭白裡黑汗出中硬忌飲漿水水洗渡河
 十一刀鑲疔狀如雞葉大長一寸肉黑如燒烙忌刺及刀鑲切到十二浮瀝疔其狀曲圓少許不合大如
 筵葉內黃外黑黑處刺之痛黃處刺之痛十三狗疔色赤起極不礙已上皆宜依法將護若或獨
 犯則脊強瘡痛不可忍惟浮瀝牛狗無忌不治自愈○又有一種魚疔瘡頭黑深形如魚鱗破之黃水
 滲出四畔浮瀝其毒尤甚用綠瓜葉連鬚葱葉搗爛以酒和服其渣貼腋下如病在左手貼左腋下在
 左足貼左跨下右手足同在中貼心臍並用布縛住候肉下紅絲處處皆白則安有潮熱者亦宜却令人抱
 住恐其顛倒則難治或用蛇退燒灰雞子清調敷○一種水疔瘡用黃荆葉十四片獨頭蒜三個百草
 霜二錢搗酒 瘡取汗大效或不痛痒只麻木寒熱眼中流火光牙關急時驚惕甚則嘔吐毒臨腸吐症危 治分虛
 寔豁心火 寔者初服寔命丹三丸以葱酒發汗表症多者通疔湯或散毒散加蟬退姜全銀花裡症多
 者初服保生鏡子以解毒或蟾肝丸有表邪不敢汗者補中益氣湯加防風白芷裡症不敢下者蟾蛇散
 腫痛欲作膿者托裡散內托十宣散不能潰者大料參芪歸木補之或補中益氣湯合生肌散以防毒陷
 ○豁心氣者疔毒入心則神昏口乾煩悶恍惚似醉嘔吐不定危症也寔者用萬病解毒丹以黃連當歸
 煎湯化下虛者用古芎歸湯加茯苓神志遠志蓮肉清之毒上攻心嘔者護心散有因服寔命丹吐者亦
 宜此解之恍惚亂坐卧不寧煩渴身痛便秘者瀉蘆飲子煩燥作渴者行葉黃芪湯○外治輕者單蟾
 酥為末以白麵和黃丹搜作丸如麥米大用針挑破疔頭以一粒納入效重者寔命丹危者提疔鏡子
 暴死灸法可回陽 凡暴死者多是疔毒急用燈照遍身若有小瘡宜急灸之并服寔命丹亦
 有復醒者如偏僻之處藥難遵達惟灸有回生之功若專疎利表散者危

大腹皮煎湯洗之。○白蛇纏瘡有頭尾儼似蛇形初起宜隔蒜於七寸上灸之。湯火肥抗漆刺身。湯泡火仍用雄黃為末醋調敷之。仍以酒調服之。或萬病解毒丹蠟若丸外塗內服。○湯火肥抗漆刺身。瘡初時宜強忍痛急向火炙慎勿以冷物熨之使熱不能出爛入筋骨後用寒水石七兩黃柏黃連黃芩山梔大黃赤石脂各一兩甚者加冰片少許為末酒調或鴨子清調敷之。○疔瘡如魚鱗疔百瘡一樣多生手足末以紙捲成條香油浸燃之滴油搽或用猪爪燒灰麻油調搽。○疔瘡如魚鱗疔百瘡一樣多生手足又名海氣瘡宜艾炙初起者則餘者自落神効。○漆瘡因見生漆中毒面痒而腫遠眼微赤痒處搽之隨瘡重者遍身如豆如杏眼按作痛用生蟹取黃隨瘡大小遍敷之。或臘茶為末麻油調搽或柳葉冬瓜皮煎湯洗之。○竹木刺入肉不出單搗米膏貼之或頭垢或蟻蟻出搗爛敷之効。或象牙為末搽之。

折傷先問出血否。折傷有損身體或墜跌打撲倒壓閃到氣血鬱逆而皮不破或金刀未出攻之出則守未出血者宜蘇木去瘀黃連降火白朮和中三味用童便入酒煎服。在上者宜薑汁和粥吃在下者可下血冷則凝不可飲冷水引血入心即死。消痰雞鳴散花蕊石散順氣木香勻氣散如童便紅麴或紅酒已出血者急用陣王丹止血先服補托藥而後消痰虛甚者亦不致下血虛者四物湯加穿山甲氣虛者用蘇木參芪當歸陳皮甘草服半月脈散漸收方散。以前藥調下自然稠末一味空心服之。如骨不碎折者忌用。素虛損甚者紫河車丹去腐香但損腹脹痛增熱寒折傷專主血論非如六淫七情有在氣在血傷妙在補氣血或被寒冷者先宜起寒。腹脹痛增熱寒折傷專主血論非如六淫七情有在氣在血。

肝流於腸鬱於腹而作脹痛或增寒熱寒者下之虛者當歸鬚散。折傷專主血論非如六淫七情有在氣在血復元活血湯調之或十全大補湯加香附陳皮貝母等分小煎服。最嫌嘔吐血出口。凡損傷瘡口忽乾毒吐及已出血多而又嘔血不止者難治初起嘔吐者用平胃散為末。本是血疾易入陰。或始而出血過多內服外用姜汁調敷破傷風浮腫者江鏢丸氣弱者只用蜜導法。散內托十宣散以防毒開外用魚膠散或用鼠頭骨為末微月猪脂調敷亦治狗咬。○又有破傷水濕口

噤強直者用牡蠣為末敷之。仍以甘草煎調服。二錢。此病痊又恐氣亦乏。任是風邪不可攻。只宜大補令決洽。或病已十分安痊而痰壅似破傷風症又似瘧症其寔乃氣血俱虛也。凡癱疽潰後膿血大泄陽隨陰散。變症只宜大補氣血果係風症亦不宜以風藥治之。血虛者四物湯加參芪氣虛者補中益氣湯去升柴陳皮加酒炒黑黃梅五味子麥門冬肉桂大劑服之。氣血俱虛汗多作渴寒熱者十全大補湯加桂附麥門冬五味子飯逆者托裡溫中湯若妄投風藥者死。

補湯加桂附麥門冬五味子飯逆者托裡溫中湯若妄投風藥者死。

編註醫學入門外集卷之六終

錄庫靜吾湯君名建中贈列



