

校正增圖醫學入門

埜葉山房石印

ヤ 9

1145

9



婦人小兒外科用藥賦製法見本草

婦人之病與男無異經絡氣血只見於胞絡病癥瘕胎產全屬乎衝任調經固經香附四製七製或單製

調經散當歸一錢半麥門冬二錢吳茱萸肉桂各五分人參半夏白芍川芎牡丹皮各一錢阿膠甘草各七分半薑煎服治經水或前後或多或少或通月不至或一月再至○小調經散當歸赤芍桂心各一兩沒藥琥珀甘草各一錢細辛麝香各五分為末酒入薑汁調服五分治敗血停積五臟日久腐爛成水變為浮腫忌用利水之藥產後浮腫亦宜○固經丸黃芩白芍龜板各一兩椿根皮七錢黃柏三錢香附二錢半為末酒糊丸梧子大每五十九酒下治經水過多○四製香附丸香附一斤四分用酒醋重便鹽水各浸七日焙乾為末醋糊丸梧子大每七十九空心鹽酒下治經候不調如瘦人加澤蘭葉赤茯苓又合四物湯各四兩加白朮陳皮澤蘭葉各二兩黃柏甘草各一兩名十味香附丸○七製香附丸香附米十四兩分七分一分同當歸二兩酒浸一分同義朮二兩童便浸一分同牡丹皮艾葉各一兩米泔浸一分同烏藥二兩米泔浸一分同川芎玄胡索各一兩水浸一分同三棱北胡各一兩醋浸一分同紅花烏梅各一兩鹽水浸春三夏二秋七冬十日晒乾取單香附為末浸藥水打糊為丸梧子大每八十九臨臥酒下治諸虛百損氣血不調月水前後結成癥瘕或骨蒸發熱四肢無力○單香附丸香附一斤用米泔浸一宿晒乾又以米醋於砂鍋內同煮旋添旋煮以極透爛為度取焙為末醋糊丸梧子大每服五十九米飲淡醋湯送下專治婢妾氣鬱情不宣通經多不調血氣刺痛腹脇膨脹頭暈惡心帶下便血癥瘕或炒焦為丸善止血崩一方加當歸二兩艾葉四兩名艾附丸○單香附散治胎前產後諸症香附米童便浸晒畧炒為末每二錢白湯溫酒在下嘔吐泄瀉膨脹飲食不化加砂仁三分或木香一分義朮檳榔各二分蘆香正氣散下吐痰咽食不下諸氣心腹小腹痛或結痞塊聚散無時加玄胡索砂仁各四分甚者加義朮姜黃木香各三分一應頭痛腦眩加川芎五分茶清下產後惡露不下臍腹作痛或胎衣不下甚則衝心迷悶加義朮玄胡索五靈脂香附木香各七分五積散下○抑氣散香附四兩茯苓神甘草各一兩陳皮二兩為末每二錢沸湯調服治婦人氣或於血變生諸症頭暈滿○墨附丸四製香附一斤淨綿艾四兩用醋一兩煮二味至乾入石內搗爛成餅于於新瓦上焙乾八兩炭當歸人參川芎熟地炭墨火煨紅醋淬各一兩木香五錢為末醋糊丸梧子大每服八十九酒下治婦人久無子而經水不調及素墮胎者亦効○百子附歸丸四製香附十二兩阿膠艾葉四物湯料各二兩為末用陳石榴一枚連皮搗碎煎水打糊丸梧子大每百九空心湯醋淡下調經養血安胎通經導經地黃養陰抑陰或滋陰通經丸順氣胎前產後及月事參差有餘不足諸症悉治久服有孕

婦人科賦經候

上海場葉山房校印



91-1996

已温白琥珀散 香粉丸香附四兩海粉桃仁白朮各一兩為末神麴丸服治婦人血塊如孟有孕難服峻藥○連羅九黃連一兩半用吳萸蓋智各炒過一半去更智羅當于一兩半香附

山查各一兩川芎山梔三枝我朮神麴桃仁各五錢為末蒸餅丸服治婦人死血食積痰飲成塊在兩脇動作雷鳴嘈雜眩暈身熱時時作止○開鬱正元散白朮陳皮青附山查海粉桔梗茯苓空胡索神麴砂仁麥芽甘草各等分姜煎服治痰飲血氣鬱結食積氣不升降積聚脹痛宜此劑氣行血和脾向導

○温白丸 皂角巴霜厚朴吳萸紫苑黃連各五錢茯苓人參蜀椒肉桂乾姜柴胡桔梗菖蒲各一兩川烏

吐逆並治○琥珀丸 琥珀白芍川烏牛膝鱉甲義朮當歸厚朴各一兩木香澤蘭官桂各五錢麝香五分

為末酒糊丸梧子大每七十九米飲下治婦人血瘕腹中有塊攻刺小腹痛重或腰背相引為痛久瘕瘕而不治黃瘦羸之○古硝膏膏林硝大黃各一兩或入麝五分為末用大蒜搗膏和勻貼積塊動

猛攻桃奴桃仁見魄猪肝麝香而已辰砂神聖針 桃奴散桃奴假猪糞玄胡索肉桂五靈脂香附各炒

瘀血停積經水不通男子跌損撲傷皆功○千金桃仁煎先用醋二升半於磁器內慢火煎減一半入桃仁大黃末各二兩蜜虫末五錢於內不住手攪可丸時再入朴硝末二兩攪勻取出丸如梧子大每五丸

五更温酒下日于瀉下惡物以盡為度治經脉不通及血積癥瘕等症○見魄丹 附子四錢鬼箭羽紫石英各三錢澤瀉肉桂玄胡索木香各二錢血竭一錢半水蛭一錢檳榔二錢半桃仁州箇三錢五錢大黃

三錢為末酒糊丸梧子大每州九温酒下治石瘕狀如懷孕○猪肝丸 用猪肝一具入巴豆五十粒劉

在肝內以醋三碗慢火熬令爛熟去巴豆搗爛入三稜末和丸梧子大每五丸熱酒下治一切癥瘕刺痛

數年不愈者神功○麝香丹 麝香當歸木香沒藥桂心我朮各五錢羌活檳榔各一兩五靈脂桃仁三稜

各三分阿魏一分為末粳米飯丸梧子大每十九丸姜湯下治瘕癖冷氣兼症氣心腹痛不可忍○辰砂一

粒丹附子鬱金橘紅各等分為末醋糊丸棗核大辰砂為衣每丸一丸男酒下女醋湯下服後又服神聖代

針散治氣鬱心疼及小腸膀胱氣痛不可止○神聖代針散乳香沒藥當歸白芷川芎各五錢青紅精

血精疝氣及心驚欲死小腸氣痛如用弓膠腫硬一切氣刺虛痛并婦人血癖血連血暈血刺心胞

衣不下難產及一驚胎如抱甕斑玄墜落 抱甕丸 元花吳萸川烏秦芫柴胡姜蚕巴戟巴豆各等分為末

切痛疾服之神功 鬼胎如抱甕斑玄墜落 抱甕丸 元花吳萸川烏秦芫柴胡姜蚕巴戟巴豆各等分為末

胎墜為度治鬼胎感於妖魅狀似癥瘕一切氣血痛亦功 蠱腫似管箕 四香代浸 四香散 木香沉香乳香

陳皮人參白朮各五錢桂心乾姜砂仁茴香各一兩大如培五兩為 安胎東胎 芍朮歸芍常用 胎當歸

末每二錢陳米飲調服忌羊肉治脾氣血虛氣血虛水虛石虛

各八分人參阿膠各六分棗子艾葉水酒煎服治舉動驚愕胎動下墜腹痛下血○古杜續丸 杜仲續

斷各二兩為末棗肉丸梧子大每州九米飲下治胎動腰痛宜此防其欲墮○東胎丸 黃芩一兩寒月或

五錢白朮二兩陳皮三兩茯苓七錢半為末粥丸梧子大每三四十九白湯下八箇月可服○古芍朮湯

于芍一兩白朮五錢水煎服一方用芍朮等分為末粥丸梧子大每五十九白湯下名安胎丸治四五

常墮不安內熱甚故也古方一月用烏鷄雞三月用赤雄雞十月用猪腰子餘月用鯉魚煮汁煎藥尤妙

○金匱當歸散 黃芩白朮當歸川芎白芍各一兩為末每二錢酒調服或酒糊為丸茶清下此方養血清

熱字婦宜常服之如瘦人血少有熱胎動不安 長胎瘦胎歸地枳甘並行 長胎白朮白朮川芎阿膠生

素患半產者皆宜服之以清其源而無後患也 長胎瘦胎歸地枳甘並行 長胎白朮白朮川芎阿膠生

川椒三分為末蜜丸梧子大每州九米飲下治孕婦宿有風冷胎痿不長或將理失宜傷動胎氣多致損

墮常服益血保胎調經衝注○瘦胎枳甘散 枳殼五兩物草一兩半為末每二錢白湯點服或加香附一

兩尤妙治八九箇月內胎氣壅滿常宜服之滑胎易產益血舒氣若稍弱者思 胎漏者膠艾補中止血

致胎寒腹痛胎弱多驚當佐以歸地木香為丸用之則陰陽調和有益胎嗣 胎漏者膠艾補中止血

艾湯阿膠一兩艾葉二兩水煎服治跌撲傷陰動胎或胎上搶心腹痛下血○膠艾芍歸湯 阿膠艾葉川

芎當歸各一錢甘草二分水煎服治胎動不安或下血在八九箇月內少加砂仁○芍歸補中湯 川芎當

歸赤芍黃芩白朮各七分阿膠五味子乾姜各四分人參杜仲甘草 胎怯者參朮益氣救生 益氣救生散

木香各三分水煎服治血氣虛弱胎漏不能榮養以致數月而墮 胎怯者參朮益氣救生 益氣救生散

皮河子神麴各等分為末每二錢水煎服治胎 惡阻旋覆胎自保 旋覆花散 旋覆花一錢厚朴白朮枳

氣本怯不宜瘦胎合服此藥安胎益氣易產 惡阻旋覆胎自保 旋覆花散 旋覆花一錢厚朴白朮枳

藥熟地半夏茯苓甘草白朮黃芩阿膠艾葉地榆各七分姜煎服治胎動不安腹痛或時下血及惡

阻一切等 瘧痢厚朴脾能醒 醒脾飲子厚朴草豆蔻各五錢乾姜四分甘草一分姜棗煎服治

症並治 瘧痢厚朴脾能醒 醒脾飲子厚朴草豆蔻各五錢乾姜四分甘草一分姜棗煎服治

羚羊角 湯羚羊角獨活酸棗仁五加皮各五分意苳仁防風當歸川芎茯苓神杏仁各四分木香甘草各二

分半姜煎服治孕婦中風頭項強直筋脉拘急言語蹇澀痰涎不利或時發搐不省人事各名曰于

癩○古芍活散 川芎羌活各等分水煎入酒 于氣防已天仙藤 防已散 防已一錢桑白皮赤茯苓紫蘇各

少許温服胎前安胎產後逐惡血下胞衣 于氣防已天仙藤 防已散 防已一錢桑白皮赤茯苓紫蘇各

小便不利○天山藤散 天山藤即青木香藤香附烏藥陳皮甘草各六分姜煎入紫蘇木瓜各二片 臨產

同煎日三服腫消止藥治孕婦兩足漸腫以致喘悶飲食不美甚則脚指間有黃水出各名曰于氣

為歸黑神來甦無憂橫逆 舌芍歸湯 川芎當歸各二錢水煎入酒温服治胎前產後腹痛體熱頭疼諸疾

及男子一切去血尤宜如孕婦因事氣喘着胎或于死腹中惡露將下疼痛不

已口集欲絕者用酒煎乾再入水煎一二沸灌以探之若不損則痛止于母俱安若胎損立便逐下如難
 產倒橫于死腹中先用黑豆炒熟入白水童便各一盞藥四錢煎服如胎產五七日不下垂死及矮石女
 于交骨不開者加龜板并生骨過婦人頭髮燒灰為末每三錢酒調服○古黑神散百草霜白芷各等分
 為末每二錢水煎入童便米醋少許調服治橫生逆產瘦胎及胎前產後虛損月水不止崩漏等症○宋
 魁散末香神地陳皮零芽黃芪阿膠白芍各一錢寧根甘草各三錢糯米一合半氣弱加生薑煎成散
 之連進為妙治胎產用力太過氣脈衰弱精神困倦頭眩目暈口噤面青髮直不省人事○無憂散當歸
 川芎白芍各一錢枳殼五分乳香髮灰各三分木香甘草各一分半水煎服治胎氣逆或人瘦血少胎弱臨產難生
 四枚男子頭髮雞彈大俱燒灰為末分三服酒調下治橫逆難產于死腹中○三退六一散益元散一兩
 服于髮一團用香油熬化蛇退一條蟬退五枚穿山甲一片各燒存性為末用鹽水煎二沸入髮灰拌勻
 服之催生神功○返魂丹即單益母膏九端干日採紫花方莖者連根洗淨於石臼內搗爛以布濾取濃
 汁入砂鍋內文武火熬成膏如砂糖色為度磁罐收貯每服一匙或陰乾忌食大每五十九白湯下名加
 丸照後湯使下一方用益母草半斤加當歸木香赤芍各二兩為末蜜丸梧于大每五十九白湯下名加
 味益母丸服百日有孕催生用童便下如胎前臍腹刺痛胎動不安下血不止米飲或秦光當歸煎湯下
 胎前產後臍腹作痛作聲或寒熱往來狀如瘧疾者米湯下臨產并產後各先用一丸童便入酒下定魂
 魄血氣自調諸病不生又破血痛養脈息調經絡功効不能盡述產後胎衣不下落胎中及臨產
 一切產難橫生不順死胎經日不下脹滿腹中悶心悶心痛妙鹽湯下產後中風牙關緊急半身不遂失音
 不語童便入酒下產後氣喘咳嗽胸膈不利惡心嘔吐酸水面目浮腫兩脇疼痛舉動乏力者溫酒下產
 後太陽穴痛呵欠心怔氣短肌體羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節疼痛溫米飲下產後眼前黑
 暗血暈血熱口渴渴煩悶如見鬼神不省人事薄尚自汗或薄汗或薄汗或薄汗或薄汗或薄汗或薄汗或薄汗
 赤五心煩熱或結血塊臍腹奔痛時發寒熱有冷汗者童便入酒或薄汗或薄汗或薄汗或薄汗或薄汗或薄汗
 為骨蒸之疾或鼻衄口乾舌黑俱童便入酒下產後二便不通煩燥日若薄汗或薄汗或薄汗或薄汗或薄汗
 後漏血葉湯下產後赤白帶膠艾湯下血崩漏下產後二便不通煩燥日若薄汗或薄汗或薄汗或薄汗或薄汗
 或生搗敷亦好婦人久無子溫酒下服至一月決有動胎○鬼胎丸臘月免腦髓一枚鼠內腎母丁香益
 母草各一錢乳香一分麝香一分為末免髓或免血和丸艾膏大珠砂為衣油紙封固陰乾每丸破水
 後醋湯或赤小豆煎湯下即產隨男女左右手握藥出是胎及產難日久水乾服黑神並藥又最宜免
 腦滑之倉卒以免皮毛燒灰酒調服方寸七亦好又能下胎衣○龜壳散龜壳一箇生過男女婦人頭髮
 一握燒存性川芎當歸各一兩為末每三錢水煎服良久生胎胎露靈如聖○靈丹蛇退一條蟬退二錢
 胎死胎俱下胎產五七日不下垂死及矮石女于交骨不開

錢谷燒存性乳香五分黑鉛二錢半水銀七分半為末用猪心血和丸如梧于大金銀箔七片為衣每
 二九倒流水灌下或入伏龍肝調下上青兒頭戴出為妙治臨產驚風氣喘目翻口禁面黑唇青口中沫
 出子母俱損兩臉微紅于死母活○如聖膏巴豆十六箇單麻子四十九箇麝香二錢其搗如泥攤絹綿
 土如胎死腹中貼臍上一時產下即時搗去如胎衣不下貼脚心胎衣下即洗去若稍遲腸便出即移此
 膏塗頂上即入○古桂香丸肉桂一兩麝香一錢為末飯九菜豆大每十五九小兒七胞衣奪命流丹
 丸白湯下治大人小兒過食瓜果脹氣急一方減桂五錢加斑貓一錢半善下死胎胞衣奪命流丹
 丹大黃附子牡丹皮乾漆各等分醋煮大黃膏為丸梧于大每十五九至廿九溫酒下治產後血入胞衣
 脹滿衝心久而不下或去血過多肺氣喘促先取鞋底炙熱熨小腹次進此藥○奪命丸牡丹皮桃仁茯
 苓赤芍桂心各等分為末蜜丸彈子大每九醋湯下治產後血暈立出
 下或葱白煎濃湯下尤妙連進兩丸胎死腐爛立出
 黃芪陳皮各五分甘草三分姜煎服治產後一切雜病只大補氣血為主如熱輕者倍加茯苓之熱甚
 者加炒黑乾姜引藥入肝分生血又能刺肺氣血補陰虛同意曾誤服熱藥及熱食者少加酒茶暫服○
 人參當歸散當歸熟地白芍人參麥門冬肉桂各一錢先以粳米一合淡竹葉十片水二盞煎至一盞去
 米竹入煎藥并姜棗煎湯服治產後去血過多血虛則內熱心胸煩滿吸短氣目汗頭痛悶亂嘔時轉
 甚○當歸羊肉湯入參當歸各七錢黃芪一兩生薑五錢用羊肉一片或代以猪腰煮清汁五盞去肉入
 煎藥煎作六服早晚服治產後發熱自汗肢體疼痛名曰葶藶○羊肉湯精羯羊肉二兩當歸陳皮各
 一兩生薑五錢水煎入酒調服加葱鹽亦可治產後腹中虛痛氣血不足羸弱力倦及冬月生產寒氣入
 於產門臍下脹滿此寒痲也○肉芎散芎藭香葉丁香皮茴香肉桂熟地各一兩半甘草白朮當歸山藥白
 芷各八兩藥本乾姜川芎黃芪白芍木香各一兩陳皮四兩每三錢姜艾煎服或為末溫酒調服治胎前
 產後一切血疾血崩虛癆腹痛氣逆嘔吐冷氣凝積塊硬刺痛泄下清白或五色腹中虛鳴氣滿
 堅硬瀝血腰疼口吐清水頻產血衰顏色青黃勞傷劣弱月經不調下血墮胎血迷血暈血痲時發疼痛
 頭目眩暈惡血衝心悶絕昏迷惡露不止體虛汗手足逆冷等症如產後下血過多加蒲黃惡露不淨
 加當歸紅花煎加生薑上熱下冷加荆芥○觀胎丸良姜黃芩等分為末每用少許吹鼻內服白薇湯
 用蘿蔔煮爛搗汁煮糊丸梧于大每五十九錢煎湯下治產後血氣衰弱飲食停積口乾煩悶心下痞
 痛
 產後血暈四味七珍清魂調經散治產後血厥而胃○四味散當歸玄胡索血竭沒藥各五分童便煎服
 治產後一切諸疾總方分宛宜服如心腹寒倍當歸氣悶喘急倍玄胡索惡露不快倍血竭心腹痛甚倍
 沒藥○七珍散川芎人參當歸生地各一兩防風辰砂各五錢細辛一錢為末每錢薄煎湯調服治
 產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不明又心氣逼於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語○寧神
 膏辰砂乳香各五錢酸棗仁人參茯苓各一兩琥珀七錢半為末燈心棗子煎湯調服一錢或蜜丸彈子

下亦治風壅小兒痰嗽生薑薄荷煎湯化下
 龍腦安神丸茯苓三兩參地骨皮甘草麥冬各二兩桑白皮犀角各一兩半黃五錢龍腦麝香各三錢砂牙硝各二錢為末蜜丸彈子大每十五片為一丸冬月溫水夏月冷水化下小兒量服之
 治五種頭癩發作無時及虛勞發熱咳嗽語澀古強○金箔鎮心丸全蝎七箇薄荷葉包煨慢火炙乾
 天麻防風羌活牛黃赤茯苓犀角甘草辰砂麝香各一錢為末蜜丸彈子大每十五片為一丸冬月溫水夏月冷水化下小兒量服之
 荷煎湯化下鎮心解熱退驚安神除煩燥止咳喘○天麻防風丸天麻防風人參各一兩全蝎七箇薄荷葉包煨慢火炙乾
 粉草各五錢雄黃砂各二錢半牛黃一錢麝香五分為末蜜丸彈子大每十五片為一丸冬月溫水夏月冷水化下小兒量服之
 治撮口癰風及一切驚風身熱多睡驚悸手足搐掣精神昏愴痰涎不利及風濕邪熱並宜一方去牛黃
 用人參或冬瓜仁煎湯下治慢驚不省手足微動眼上視昏睡○轉驚丸人參防風白附子姜蚕全蝎各一錢南星大蘇各二錢為末飛越糊丸梧子大每十九姜湯下治小兒脾氣虛弱泄瀉腹脹法冷疳疔泄及
 吐瀉久病轉成慢驚積則消之化之紫霜白玉攸宜
 驚身冷與癰等症積則消之化之紫霜白玉攸宜
 湯下治乳食傷積心腹脹滿氣驚壯熱或嘔或瀉○木香丸木香我朮砂仁青皮陳皮砂仁各二錢丁香
 香巴豆肉各一錢為末飛越糊丸每三九乳積乳汁下食積米飲下後與大異香散氣積痞皮煎
 湯下後與流氣飲子○紫霜丸代赭石赤石脂各一兩杏仁五十粒巴霜卅粒為末蜜餅丸粟米大每三
 丸或十九量兒大小米飲乳汁任下以利為度未利再服治食積腹脹身軟腰強眼紅宜先用此取積並
 不虛人又治變蒸發熱不解并挾傷寒壯熱汗後不解及乳哺失節胸膈有痰宿食乳則嘔吐光寒後熱
 或內使冷食大便酸臭兼治驚積凡兒有熱不欲飲乳眠臥不寧此皆發癰之新印以此丸導之時間量
 與此減其或勢則無驚風釣癰之患○白玉餅白附子南星滑石輕粉各一錢巴霜十九粒為末越糊丸
 菓豆大連作餅三歲一丸五歲二丸煎湯化下治腹中有癰但飲乳而食及急慢驚風癰瘡潮搗壯
 熱痰涎壅盛一方去輕粉南星白附子用半夏十二箇巴霜五十粒滑石輕粉各一錢巴霜十九粒為末越糊丸
 各一兩水丸姜湯下治脾氣不足乳食不消吐瀉驚風壯熱朝熱咳嗽痢疾等症風寒感傷羌活大青膏
 當者羌活膏天麻赤茯苓各五錢羌活防風各二錢半人參全蝎砂仁各一錢薄荷湯化下治傷寒陰症及脾虛生
 痰肝熱生風或吐瀉後成慢驚○天青膏天麻青黛各一錢白附子一錢半薄荷湯化下治傷寒陰症及脾虛生
 香天竺黃各一錢為末蜜調成膏每服半匙于大月中兒便米大煎薄荷湯化下五歲以上煎甘露散下
 治傷風發熱熱則生風欲為驚搐血氣未實不能勝邪故也大小便調口中氣熱宜此發之○大黃丸大
 黃一兩黑丑五錢川芎五分甘草一分為末糊丸每十九量兒大小虛實蜜湯下以微利為度治
 開飲水不止有下症者宜服痰喘咳嗽葶牛百部丸可為丸葶牛九葶黑黑丑各五分九淡姜湯下治乳食衝肺腸

風咳嗽面赤身熱痰喘促○百部丸百部麻黃各三錢杏仁四
 十箇為末蜜丸每二錢九溫水化下治感寒壅咳喘喘
 犀散犀角一錢地骨皮赤芍柴胡乾葛各一兩甘草二兩每三錢水煎服治骨蒸肌熱瘦悴頰赤口渴
 熱盜汗五心煩熱○紫陽黑散麻黃杏仁各一兩大黃五錢俱燒存性為末每字乳汁調或水煎服
 於溫煖處連服微汗身涼即愈治變蒸解熱氣○連翹飲連翹麥冬滑石車前子牛蒡子赤芍各一分
 山梔仁木通蟬退當歸防風各半分黃芩荆芥各一分半柴胡甘草各二分水煎服即入正散加減治小
 兒諸熱表裏俱宜如風熱痰熱變蒸熱肝熱大腸熱痘疹熱加麥門冬丹熱實熱血熱三焦熱小腸熱加
 大黃燈心麻痘熱過氣熱已出未出症熱加紫草當歸歸餘毒熱胎熱肺熱傷寒後瘡疹後餘毒發熱加薄
 荷項上生核作熱癰毒熱加黃芩外消○寬熱飲枳殼一兩水浸去穢以巴豆四十九粒同炒黃去巴
 大黃一兩林硝五錢甘草一分錢為末每三五分薄煎湯調服當利下加鼻涕或成塊腥臭惡物治小兒
 驚熱天鈞手足搐搦肚腹有熱天乙觀音銀白散善調虛弱胃脾天乙丸打心一斤以米粉漿洗曬乾為末
 赤白茯苓兼茯苓神共五兩滑石猪苓各五兩澤瀉三兩為末用人參一斤煎膏一方用人參白朮各六兩
 甘草四兩同煎膏和丸如龍眼大珠砂為衣金箔裏之每一丸隨病引化下大段小兒生理本天一
 水之妙凡治病以水道通利為捷徑也此方清心利便所以散火也凡小兒熱毒丹毒驚風痰熱變蒸發
 熱之症用之最當而嘔吐瀉痢諸症無不治也○觀音散人參一錢連肉神麩各二分茯苓一分半白朮
 黃芪木香白扁豆甘草各一分姜棗煎服治外感風冷內傷飲食嘔逆吐瀉不進飲食久漸羸弱一方加
 防風羌活天麻全蝎各一分姜棗煎服治外感風冷內傷飲食嘔逆吐瀉不進飲食久漸羸弱一方加
 參白朮茯苓甘草各一分為末每錢湯下天柱骨倒脚軟濃米湯下交驚傷寒薄荷葱白煎湯下疳氣肚脹
 定後陳米湯下驚吐不止丁香煎湯下天柱骨倒脚軟濃米湯下交驚傷寒薄荷葱白煎湯下疳氣肚脹
 氣急多渴百合煎湯下肚熱面赤驚叫金銀箔煎湯下暴吐紫蘇木瓜煎湯下神形脫語言不正及大人吐瀉
 湯下吃食不知飢飽不長肌肉麥芽生薑煎湯下暴吐紫蘇木瓜煎湯下神形脫語言不正及大人吐瀉
 藿香葉煎湯調服若稟受氣
 怯小兒可每日服最妙痘初消毒加地皮快斑透肌如四聖消毒散風粘于八分荆芥四分甘草二
 未徹咽痛胸緊便秘及愈後一切瘡毒赤腫等症急進三四服快透消毒驅手神功惟內虛便利者忌用
 如虛熱加地骨皮壯熱加黃芩紫草實者加生犀磨汁痘已出未勻減荆芥二分出不快及痒加蟬退有
 汗加防風減食加人參山查便秘加大黃氣虛加參朮血虛加芍歸百般加減由人○快斑散紫草蟬退
 人參白芍各五分木通二分甘草一分水煎服治痘出不快一方去木通加穿山甲等分治痘已出被風
 復入○透肌散紫草一錢并麻甘草各五分糯米五十粒水煎服治痘已發不快解毒清熱涼血加蟬退
 地骨皮酒各○如聖湯白芍并麻乾葛各五分甘草紫草木通各二分半山查根三寸姜葱煎熱服治痘

賦風 賦積

瘡已出未出身熱如火頭疼臉赤呵欠鼻嚏如心煩加麥門冬赤茯苓煩渴合生脈散身熱如火加酒茶
 地皮○四聖散紫草木通各一錢枳殼甘草各五分水煎服治痘出不快及倒靨陷伏惡候毒氣入內
 腹脹瀉赤如氣弱去枳殼加黃芪○加味四聖散紫草木通木香黃芪川芎甘草人參各等分蟬退減半
 每二錢水煎服治痘出不快及變陷倒靨小便赤澀餘熱不除一切惡候或痘出被風吹復不見入皮膚
 內鬱熱不散如便閉加枳殼
 痘出解毒誇紫草活血勻氣勝萬金
 紫草飲紫草一兩用百沸湯一碗沃之
 以物蓋定勿令泄氣俟溫量兒大小服之雖出亦輕治痘欲出未出或痘一熱出齊服此重變輕惟便利
 者忌服或加陳皮葱白尤妙如發斑疹加鈞藤酒調服○紫草膏紫草白附子甘草麻黃各五錢全蝎廿
 筒姜蚕八箇蟾酥一錢為末另用紫草一兩煎膏入煉蜜二兩酒半盞攪勻和丸菜豆大每丸治痘已
 出不快及驚風癩疾如初發熱重者散散化下初發驚狂者薄荷蔥白燈心煎湯下色紅紫黑陷紫草
 煎湯下色淡白灰陷熱酒下○加味紫草飲紫草白芍麻黃甘草各五分水煎服治痘出未退如年壯
 及北方皮厚之人加蟾酥辰砂蓋紫草解毒麻黃發汗固能發痘佐以辰砂解胎毒涼心火蟾酥善祛
 附毒氣從毛孔作臭汗出凡表實難出俱宜用此四味如血虛出不勻色不潤者加當歸○紫草大香湯
 紫草木香人參白朮茯苓甘草各四分糯米卅粒水煎服治痘出不快大便泄利蓋紫草能利大便故
 用木香白朮佐之或隱或見者加藿香○紫草木通湯紫草木通人參茯苓糯米各四分甘草二分水煎
 溫服治痘出不快如大便利者去紫草加木香○活血散赤芍歸尾紅花紫草各五錢木香二錢血竭一
 錢為末每二錢痘色紫白酒調下熱極血焦不紅活紫草煎酒下○小活血散單白芍炒為末每錢出
 快溫酒下痘痛溫水下倒靨紫草煎湯入酒少許調服大能活血止痛除煩如兩脚膝攣加甘草即芍藥
 甘草湯也○勻氣散即八味順氣散各五分甘草二分半木香一分半為末酒調服治氣滯痘出不快及
 肉腠厚密身痛疎氣飲蒼朮白芷防風升麻黃芩芍藥連翹歸尾各等分甘草煎服治痘發熱不快○萬金散防風二錢人參
 蟬退各一錢薄荷三葉水煎服或為末每二錢用開花蘿蔔煎湯調服
 服取其欲發之義耳治痘已出未能勻透色不紅潤實者加升麻
 鼠粘湯治稠密以防陷伏
 鼠粘子當
 骨皮黃芩柴胡黃芪連翹各等分水煎服溫服熱退即止
 調解散醫水硬而為邪侵
 青皮陳皮桔梗枳殼當
 治痘出稠密身熱不退宜急服此藥以防青乾黑靨
 調解散醫水硬而為邪侵
 歸半夏川芎木通乾葛
 甘草紫蘇紫草各二分人參一分姜棗煎服未動如山查根治痘已
 發或為風冷所折榮衛不和或又為宿食所傷內氣壅遏以致水硬
 黑陷宣毒宣風兮大戟山梔搗尾無
 價宣毒膏砂乳香各一兩馬牙硝甘草各五錢腦麝各一錢為末臘月八日取小活積猪尾血一盞和
 勻以新竹筒一箇盛之用綿紙數重封口除於大真坑屋梁上至清明日取出晒乾更入腦麝各一錢

為末九水皂子大每一九人參煎湯化下治毒感痘出不快瘡黑倒靨神效○宣風散搗柳陳皮又甘草
 各五錢牽牛四兩為末幼者五分壯者一錢食前蜜湯調服治痘青乾黑陷身不大熱煩渴腹脹而喘二
 便赤澀面赤悶亂大吐乃熱蓄於內當利小便不愈者宜服利後宣和脾胃○單大戟九又各百祥丸紅
 芋大戟一兩用漿水煎極乾去骨晒乾復入原汁中煮汁盡焙乾為末蒸餅丸粟米大每二十九丸研赤麻
 湯下量兒大小服之治痘紫黑陷甚寒戰嘔口臭齒身黃紫腫○山梔仁湯山梔仁白鮮皮赤芍升麻各
 二分寒水石甘草各一分紫草薄荷各少許水煎服治痘疹及斑毒狀如蚊咬毒感黑色○猪尾膏龍
 腦一錢為末旋滴小活積猪尾血為丸小豆大每九丸煩燥紫草煎湯下陷伏溫酒下或用猪心血為丸
 亦可治痘出未透心煩狂躁氣喘妄譫便閉能食或已發毒感陷伏者宜此連治惟虛者忌用○無價四
 屎散人屎用無疾童子者猪猫犬屎用未破傷者先於重九日各置淨處饑之飯食勿令雜食至可日
 換盡腸中宿垢方收其屎陰乾候臘月八日未出時火煨烟淨白色為度但表虛痘發不快倒靨黑陷
 及一切惡瘡每用一字水調服其功如神
 黑陷人齒齒齒分蟬退穿山兔血難尋
 砂鍋固濟火煨通紅取
 出候冷為末每三分或入麝香少許尤妙如痘出不快既出倒靨不榮寒熱脈遲或服涼藥過多溫酒下
 痘出色黑陷和猪尾血下痘黑靨不出加赤小豆七粒薄荷泡酒下如七日以前黑陷屬熱毒燈心煎湯下
 紫陷屬氣熱溫酒下血陷屬血熱灰陷屬血寒俱酒入麝香下白陷屬氣寒當歸黃酒下如黑陷甚者用
 人齒五分羌活一錢穿山甲麝香各少許為末每一錢麻黃薄荷煎湯調下一服便起凡人齒不可過用
 一錢過則陽盡出表陰感寒必痘爛焉泄急以四君子湯加芍歸救之○四齒散人齒搗齒狗齒搗齒
 各二錢半砂鍋固濟火煨通紅候冷為末每五分熱酒調服治痘不紅不起發色灰白或黑陷而焦取
 如神○單蟬退湯蟬退廿一箇或加甘草一錢半水煎服治痘疹已出不透腹痛或痘黑靨或痘積熱毒
 及風毒充於皮膚極痒不止驚怪崩漏夜啼寒熱亦宜○周天散蟬退五分地龍一兩為末每二錢研乳
 末每五分木香煎湯少入酒調下或入麝香少許尤妙如七日以後黑陷紫草煎湯下紫陷溫酒下血陷灰陷
 香湯下治痘瘡黑陷項強目直腹脹喘急發搐連進二服而愈○獨聖散穿山甲取前足及背上者炒為
 俱酒入麝香下白陷當歸煎湯下兜血丸珠砂一兩用麻黃升麻紫草荔枝壳四味同煎一日夜研細
 乃將四味煎湯飛過晒乾天靈蓋三錢洗淨用麝香三錢炙令黃色為末和勻臘月辰日取兔血或棗肉
 為丸菜豆大每丸溫酒化下治氣虛血熱痘瘡外黑赤而內白陷者神效或口用藥末於發熱未出時
 用紫草升麻紫蘇葱白煎湯調下一分表汗出痘亦稀但天靈蓋并燒化非至險不可輕用痘家最忌穢
 汚凡臍帶童便犬糞牛糞之類非
 牛蠶散牛黃丹目黃便閉而膿不乾
 舌牛蠶散牛黃子五錢姜蚕二錢
 經煨燒聞之不可而况服之乎
 賦痘疹
 晚大熱目黃腸動身熱手冷發甚如驚惟虛寒者忌用○牛黃丹牛黃一錢生大黃寒水石升麻各五錢
 粉霜硃砂各五分為末蜜丸黍米大每十九量兒加減人參或紫草薄荷煎湯下治痘出大便不通瘡中

上海掃葉山房校印

吃彈一日一箇煎生料五精散送下不過四五癩瘡已破兼外治白蛇白蠶宣熱補中而銀石蠶爾貓蝠
 枚已破者生肌未破者消散治癩瘡多年不癒癩瘡已破兼外治白蛇白蠶宣熱補中而銀石蠶爾貓蝠
 可敷也○白蛇散白蛇二兩青皮黑丑各五錢生犀角五分為末每錢入膩粉五分研勻五更糯米飲
 發熱或痛或不痛利後用海藻石決明羌活瞿麥各等分為末取白梅肉湯泡九梧子大每六七十丸臨臥米飲下毒當
 以除病根○白蠶丸海藻姜蠶各等分為末取白梅肉湯泡九梧子大每六七十丸臨臥米飲下毒當
 從大便泄去忌豆心雞羊酒麪日五六服治癩瘡生於頭項上交接者蛇盤瘡宜早治之或單用海藻一斤
 浸酒服亦好○宣熱丹薄荷是兩連翹何首烏蔓荊子三枚荊芥各一兩為末用熱醋浸淡豆豉二兩半
 搗膏和丸梧子大每卅丸熟水下日一服解癩瘡熱之毒自小便宣毒後及病雖愈宜常服之○補中
 歷毒餅黃芪一錢人參三分甘草五分已上三味補氣調中為主當歸生地熟地白芍各三分已上四味
 和血生血涼血惟芍藥兼能益氣之虛陳皮三分順氣并麻五分足陽明引藥柴胡五分足少陽引藥連
 翹一錢散血結氣聚瘡癰不可缺也防風五分散結去上部風邪已上共為末湯浸蒸餅調劑作餅子
 晒乾搗如米粒大每三錢白湯下治癩瘡馬刀快癩在于足少陽陽明部分受心脾之邪而作如足陽明
 部瘡多倍升麻加漏蘆一錢乾葛五分手足太陽項脊皆腰強者加羌活一錢獨活五分腫甚加鼠粘子
 三分堅硬加昆布硬甚加三枝莖朮各二分寒月身涼或有腹痛加肉桂二分暑月身熱或有煩悶加酒
 黃連黃柏各三分腸胃有痰血加牡丹皮二分少食加麥芽神麩各二分便秘加酒大黃或麻仁桃仁秦
 芎陰寒秘結去諸苦藥加附子一錢姜煎冷服如瘡屬陽明部分忌柴胡鼠粘子屬少陽部分為馬刀快
 癩忌獨活漏蘆升麻乾葛加瞿麥三分○銀石散砂礞石各一分巴豆二錢半為末唾口涎調勻用本身男
 一錢七分明礞一錢信石白丁香各六分麝香三分牛黃一分○蠶蠶散蠶蠶一錢核自落後用生肌散
 左女右手塗瘡上外用新筆蘸藥圍四圍藥點中間水粉膏貼之上藥一七二七其核自落後用生肌散
 ○蠶蠶散蠶蠶一錢二味俱微黑豆上同燒其骨化碎為末乾糝治癩瘡多年不愈神效○通用貓頭要
 頭骨一箇蠶蠶一箇二味俱微黑豆上同燒其骨化碎為末乾糝治癩瘡多年不愈神效○通用貓頭要
 減加蠶蠶化丸蠶蠶一箇每卅丸臨臥米飲下如風熱實者加防風黃芩山柃蟬退川芎連翹桔梗各五
 錢虛者加夏枯草二兩虛癆骨蒸加玄參一兩胡黃連五錢汗多加牡蠣三錢有咳加麥門冬一兩血虛
 加歸身生地氣虛加參朮各一兩毒重加雄黃痛甚加乳沒各二錢堅硬加海藻四錢成漏加穿山甲一
 兩便燥用蜜為丸空心及夜臥含化三九尤妙治癩瘡○吞貼夏枯益虛者單夏枯草散正夏枯草一兩水
 煎成膏多服益善并連患處兼服十全大補湯加香附貝母遠志治癩瘡馬刀已潰未潰或日久成漏生
 血散結退寒熱之聖藥也惟實者宜以行散之藥佐之○治癩瘡清爛久不愈者用單骨亂髮如雞子大

以三年臘月指脂煎令骨髮具消半
 塗瘡半酒調服須臾鼠子從瘡口出痰核潤便含化丹或海帶丸以內消融各等分為末蜜丸含化治癩
 項耳後結核○海帶丸海帶青皮貝母陳皮各等分甚者加昆
 布為末蜜丸彈子大每九食後含化治痰核癭氣經久不消癭瘤開結故掌散或南星膏以外敷
 開結散沉香二錢木香三錢陳皮四兩珍珠四十九粒砂鍋固濟火煨搗取肉于生豬項下喉嚨系一核
 如棗大微扁色紅取四十九箇瓦上焙乾共為末每二錢臥時冷酒調徐徐嚥下輕者三五服見功重者
 一料全愈忌酸鹹油膩帶氣之物治男婦項下癭疾不問遠年近日皆效○散掌散海藻一兩散結消
 二兩降火為末每用少許置掌中時時吹之津液送下如消三分之二即止後服○單方大蜘蛛酒頭
 服或海藻浸酒久服癭氣瘰癧皆消○南星膏鮮南星一箇研細稠粘滴好醋三五點和膏或醋調乾南
 星末亦好先將針刺痛處令氣透却以前膏攤紙上量形大小貼之覺痒則頻貼取功治肌膚面頸項
 癭瘰癧大如拳小如粟或軟或硬或不疼不痛乳核一醉可消正貝中漏蘆可加一醉膏瓜蔓一箇去皮
 癭瘰癧亦治熱者加黃柏虛者加川烏尖少許○乳核一醉可消正貝中漏蘆可加一醉膏瓜蔓一箇去皮
 錢半用紅酒三碗煎至一碗半分兩次溫服重者再進一服以瘰癧為度或加當歸白芷乳香亦妙治癭瘰
 錢半用紅酒三碗煎至一碗半分兩次溫服重者再進一服以瘰癧為度或加當歸白芷乳香亦妙治癭瘰
 發背乳癰初起神効如要宣毒加皂刺一分○古正貝散白芷貝母各等分為末每錢酒調服治有
 孕乳結核名曰吹奶有兒外吹如宜此類服不蒸膿出若無乳行者加漏蘆煎酒調服外用起餅生起
 如蜂窠發過上有青色無妨焙乾為末并水調敷如乾以水時潤之甚者加白芷貝母乳香沒藥少許乳
 癭單青頻服瓜蔓外參逐難舍子一方用陳皮去白炒為末入麝香少許每二錢酒調服初發赤腫痛不
 可忍一服即散已潰及外吹亦効○瓜蔓散瓜蔓仁消毒青皮疎肝各一錢石膏二錢清胃甘草煎行
 痰沒藥止痛歸尾破血皂刺金銀花各五分青橘葉取汁二七解毒水酒各半煎空心服治乳癰未潰者
 即散如已潰者去石膏沒藥皂刺金銀花用當歸身加入參黃芪川芎白芍煎服○單方用蒲公英英金銀
 花等分水煎濃汁入酒少許服之即散○治乳癰癰爛見心者用貓兒腹下毛煨存性為末乾糝或入輕
 粉少許清消肺癰膿以南星補肺脾真要訣消膿散南星一錢知母貝母生地阿膠川芎桑白皮白芨
 油調搽○消肺癰膿以南星補肺脾真要訣消膿散南星一錢知母貝母生地阿膠川芎桑白皮白芨
 防風各七分半主姜七片烏梅一箇水煎服治肺癰有膿腥氣上衝嘔吐咳嗽○參芪補肺湯入參黃芪
 白朮茯苓陳皮當歸山茱萸山藥五味子麥門冬甘草各五分熟地一錢半牡丹皮一錢姜煎服治肺癰
 腎水不足虛火上炎咳嗽吐膿血發熱作渴小便不調○參朮補脾湯入參朮各二錢黃芪二錢半茯苓
 陳皮當歸各一錢升麻三分麥冬七分桔梗六分五味子四分甘草五分姜煎服治肺癰脾氣虛弱咳嗽吐
 膿涎中滿不食凡肺癰見膿血久不愈止肺痿血用紫苑白欬白友非苟且錢半人參桔梗茯苓各一錢
 必兼服此藥以補脾生肺否則不治

遭○加減通聖散防風白藜皮赤芍連翹黃芩各八分牛蒡子一錢金錢花三分山柃歸尾各五分荆芥槐
花各四分姜蘇甘草各二分水煎服如初起便秘加酒大黃一錢半便難加皂子三分胃弱食少加白
朮一錢陳皮半夏各五分頭上多加川芎八分薄荷一分下部多加牛膝黃柏各四分通身多加木通桔
梗地骨皮各六分心火加黃連腎火加玄參各四分氣虛加參芪血虛加熟地各六分久虛便利加硬飯
五錢○加減通聖丸即前方共半斤再加苦參半斤為末酒糊或蜜丸梧子大每七十九空米飲溫酒
任下○徐靈芝十四枚針挑火上燒半生半熟輕粉一錢片腦二厘為末猪胆汁或香油調搽不具痛
者加膽礬三分摩風骨亦好○洗藥王地骨皮荆芥苦參細辛各五錢楊梅重多化毒散吹藥限定三日
錢煎湯先蒸後洗遍身出汗為功如洗務要湯寬浸洗良久方住
散生大黃一兩解毒藥山甲五錢虛者三錢解毒藥三錢去風蜈蚣一條去蟲歸尾五錢破血為末
每二錢酒調日二服○吹藥黑鉛八分溶化入水銀一錢同結成餅銀珠一錢半妙明礬雄黃各一錢為
末棗肉搗勻分作六丸每用一丸放火籠內令病人以巾包頭日吹眼者其藥丸待烟盡則止當日早午
晚各吹一丸次日早午吹二丸第三日只早吹一丸吹後三五日或日流涎以黃連菜豆煎湯解之又服
化毒散三日後以加減通聖散
通聖散九調理斷根 皂刺皂根 頑癬筋疼可祛 皂刺皂根 皂刺皂根 皂刺皂根 皂刺皂根
脂蔓荆子胡麻子防風苦參虎骨地龍京墨木鱉天花粉各五錢白膠香乳香沒藥各二錢痛甚加麝
一字為末麵糊為丸梧子大每五十九硬飯湯下日二次服兩月斷根忌狗肉魚腥房事治遠年楊梅癩
癩頑瘡筋骨疼痛○皂根九當歸二兩黃芪一兩半人參斷艾各一兩麻黃五錢 仙根象牙 大楓癩漏如
見前樹根皮四兩為末蜜丸梧子大每五十九土茯苓煎濃湯下治楊梅癩毒
失○山遺根湯王茯苓一兩乾者七錢防風木瓜通草豉仁白鮮皮金銀花各五分皂子四分水煎空心
凡患下疳瘡者宜此預防之如氣虛加參芪血虛加芍藥歸地牛膝肺熱去土茯苓倍意或仁金銀花○
山遺根丸王茯苓一兩防風木通意仁防己白茯苓金銀花木瓜白鮮皮皂刺各五錢白芥子四錢當
歸身七錢為末蜜丸或浸酒服忌生冷魚雞煎炒茶酒房事十餘日治楊梅瘡後腫塊或癩如虛弱者加
人參五錢甚妙○單仙遺根丸一味為末蜜丸梧子大每五十九川椒煎湯下治楊梅瘡或鼻崩眉落筋
緩骨拳者皆効○象牙丸象牙三錢蜜甲蛻皮各一箇為末棗肉丸櫻桃大每一丸空心小便化下服七
日後仍用三味為末猪胆汁調敷海楊梅瘡成漏○大楓丸大楓子肉半斤荆芥當歸苦參各一兩半羌
活獨活防風蟬退全蝎各一兩為末用大楓子壳煮汁和晚米糊丸梧子大每百九日三次溫酒下但大
楓子性熱燥痰傷血服多病愈失明用者慎之○取輕粉法用開口川椒每空心以土茯苓煎湯吞下卅
粒即利輕粉於瓶內從大便出洗起川椒服至瓶內無輕粉乃止○治天泡瘡方用野菊花棗木根煎湯
洗洗後用防風通聖散同煎胡泥為末妙靈調敷之極妙或只用黃柏滑石為末油調敷之如從肚皮

上起者裏熱發外宜內 提疔養金 外治十種有三 提疔錠子雄黃硃砂各三錢青鹽硫磺白丁香輕粉
服防風通聖散加減 蠟溶化內服養命丹治疔瘡危篤發昏兼治燥癩○養金丹用明礬四兩溶化入黃丹二兩銀釵攪之
粉膏貼之內服養命丹治疔瘡危篤發昏兼治燥癩○養金丹用明礬四兩溶化入黃丹二兩銀釵攪之
慢火熬令紫色先以針週迴挑破用津液調敷數度無令磨乾其疔即消保生接命奇功第一 羌活獨
活如不消入信石一錢雄黃硃砂各五分貼之即消治一十三種疔瘡保生接命奇功第一 羌活獨
活青皮防風黃連赤芍細辛甘草節蠶退姜蠶獨腳蓮各五分先將澤蘭葉金銀花金線重樓各一錢生
姜搗酒或搗水入酒熱服然後用生薑十片水酒各半煎前藥熱服交覆取汗如有膿加首烏白者要利
加青木香大黃在脚加木瓜病後後前藥加大黃二錢以去餘毒○保生錠子蠶酥三錢雄黃二錢為末
湯漱口下外針刺開疔頭將錠子一分填入疔內被蓋出汗二日爛出即愈如背發不用冷湯磨
服再磨二分敷患處被蓋出汗其患即愈體虛清貴及婦人胎前產後毒者最宜○蠶肝丸端于日取
蠶用一具入雄黃五錢搗丸菜豆大硃砂為衣每三九忽酒下善能發汗解毒如痘疹不出用胡荽酒下
最妙○養命丹蠶酥硃砂雄黃膽礬黃豆大硃砂為衣每三九忽酒下善能發汗解毒如痘疹不出用胡荽酒下
蠶牙皂各六錢白礬用信少許同枯去信不用片腦各五分為末端于日用酒糊丸菜豆大每三九用
酒一小鍾吞下被蓋出汗或汗或不汗再進一丸服後吃白粥調理忌食瓜水茄一切動風之物治癩疽
發背疔瘡乳癰魚口便毒一切無名腫毒及小兒疳積亦動毒飛龍奪命丹○一搗金即前養命丹為末
單方養命丹一握生薑四兩同搗爛入生頭酒一碗去渣熱服大汗即愈或以菜豆野菊為末酒調飲
醉睡覺痛定熱除外用蒼耳根莖苗于燒灰為末醋或煎調塗疔上毒根即出山卿疔腫初起緊急無
利為度食穴牛馬患者尤効○五聖湯天黃金銀花甘草各一兩瓜薑一箇皂刺二兩每用生薑一兩酒
煎服一方去皂刺加當歸赤芍與殼治一切疔腫癰疽初覺憎寒頭痛○蜂蛇散上峰房一巢蛇退一除
共入罐中鹽泥固濟火煨存性為末每一錢空心酒調服少頃腹中大痛痛止疔瘡化為黃水體實者後
服五折傷損內雞鳴花藥石堪消雞鳴散天黃一兩桃仁七粒歸尾五錢酒煎五更雞鳴時服取小便
聖藥○花藥石散硫黃四兩花藥石一兩為末入瓦罐內鹽泥固濟燒成如牛觸身固濟酒乾安四方磚上以炭火自己干
之即甦○花藥石散硫黃四兩花藥石一兩為末入瓦罐內鹽泥固濟燒成如牛觸身固濟酒乾安四方磚上以炭火自己干
時至經宿候冷取出研細磁磚成之如一錢金刀及打撲身腫固濟酒乾安四方磚上以炭火自己干
如內傷血入臟腑熱煎童便入酒少許調服一錢立効如牛觸身固濟酒乾安四方磚上以炭火自己干
為線縫合腫皮縫上藥血止立活並不得封裏瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後藥如婦人

賦外科

上海埠葉山房校印

產後敗血不盡惡露奔心胎死腹中胎衣不下並用童便調服○單折傷見紅歸鬚好霜可室歸鬚散
人中白散天椒醋浮為末每五分酒調服治閉挫跌撲傷骨極重者○單折傷見紅歸鬚好霜可室歸鬚散
牛紅花八分桃仁七分甘草五分赤芍烏藥香附蘇木各一錢官桂六分水酒各半煎服治打撲以
致氣凝血結胸膈痛或寒熱如挫閉氣血不順腰脇痛者加青皮木香腸痛加柴胡川芎○古好霜散
好粉百草霜各等分為末每二錢糯米飲調服則拍枝研汁尤効治傷損大吐血或因酒食飽臥頭樹
損吐血過多并血妄行口鼻俱出但聲未失者皆効如鼻衄血動及灸瘡出血並用乾糝立止○古烏附
湯烏藥一錢香附二錢甘草三分為末淡鹽湯調服治跌撲傷損一切疼痛如血虛者去羌參加川芎芍藥生地牡丹皮
服治跌撲吐衄不止又能調中快氣治心腹刺痛○定痛應痛稱陣王○乳香定痛散乳香當歸白朮各一錢
末每二錢溫酒并童便調服治打撲墮傷損一切疼痛如血虛者去羌參加川芎芍藥生地牡丹皮
應痛丸草烏八兩生薑生葱各一斤同搗淹兩宿焙乾木破故紙碎補骨各八兩穿山甲小茴各六兩為
末酒糊丸梧子大每五十九溫酒米飲任下忌熱物治折後為四氣所侵手足疼痛○陣王丹大黃一兩
石灰六兩同炒灰紫色為度去火毒歸過敷傷處立効一方加小兒髮灰乳香沒藥蒲黃各少許為末用
未開眼老鼠子和藥搗爛陰乾為末不問刀火骨接骨見醫術○使骨法小蝦蟆四五箇皮硝三分生薑一
箭出木石損傷敷之如神且免破傷風症○使骨法小蝦蟆四五箇皮硝三分生薑一
足折傷之處一方用菜豆粉一味炒冷紫色以熱酒同熱醋調敷指處用竹紙蓋貼將杉木皮或桑皮二
片夾定其効如神○小麵散小麥麵炒各五分狗頭骨乳香五倍子各一分為末用熱酒調敷痛處不
可敷破處重者加天靈蓋少許尤妙爛者只用鳳尾草一味搗爛敷之或以此草煎湯洗亦好○使骨紫
金丹土靈自熱銅骨碎補大黃血竭歸尾乳香沒藥研砂各等分為末每八厘熱酒調服其骨自接治跌
打骨節痠痛血攻心發熱昏暈及瘀血自下吐血等症如過經事不調每服加麝七厘即通○使骨丹乳香
沒藥各五錢自然銅一兩滑石二兩龍骨赤石脂各三錢麝香一字為末用好酒三碗煮乾就炒燥為末
化黃蠟五錢為丸彈子大每丸酒煎用東南柳枝攪散熱服若骨已接去石脂龍骨歸尾各一丸亦
妙○麻藥方牙兒木蟹紫金皮白芷半夏烏藥土當歸川芎烏各五兩草烏小茴坐草草酒煮熟各一
兩木香三錢傷重手近不得者更加坐草草烏及蔓陀羅花各五錢並無製假為末諸樣骨碎骨折出
白膏者每服二錢好紅酒調下麻倒不識痛處或用刀割開或剪去膏鋒以手整頓骨節歸原用夾夾定
然後醫治如箭入骨不出亦可此藥或鉗出或鑿開取出後用鹽湯或鹽水與服立醒○關齒方
點椒五錢天靈蓋紅肉消白芷各二錢為末齒動移上即安或已落有血絲未斷者亦可移藥齒間關
之○使指方直蘇木為末敷斷指間接定外用○破傷開關定搐蜈蚣星風及二鳥蜈蚣散蜈蚣二條江
蠶繭包縛完固數日如故亦治刀矢所傷者○破傷開關定搐蜈蚣星風及二鳥蜈蚣散蜈蚣二條江
之為末每江蠶繭丸○單全蝎散蝎梢七箇為末熱酒調服凡患破傷風症非此不除○古星風散南星防

風各等分為末如破傷及金刀傷或打撲內有損傷以藥末敷傷處然後以溫酒調下一錢如牙關緊急
角弓反張及打傷欲死但心頭微溫者以童便調灌二錢并進二服如頭犬咬先以口含漿水洗拭搽之
更不作膿大動蓋南星為防風所製服之不麻○二鳥丸生川烏白芷天麻各二錢生草烏雄黃各一錢
為末酒糊丸梧子大每十九溫酒下治破傷風角弓反張牙關緊急○烏蛇散烏梢蛇六錢麻黃一兩草
烏乾姜附子川芎白附子天麻各五錢蝎梢二錢半
為末每錢熱酒調日三服治破傷風及洗頭風○破血止血定疼蟻蠟魚膠血甲質
堆內蟻蠟蟲一二箇用手捏住待蟲口中吐些小水如緊急只剪去尾將腹內黃水抹瘡口內滴些小
熱酒內飲之身穿厚衣片時瘡口覺麻兩脇微汗風出立効虎咬亦宜○魚膠散魚膠膠存性為末入麝
香少許每二錢熱酒米飲任下亦可治化毒散治破傷風口燥強直○珠砂指甲散入手足指
甲燒存性六錢珠砂南星獨活各二錢為末分作三服熱酒調下治破傷風手足顫掉不已○表熱瓜石
小芎而半表無汗審美榆瓜石湯瓜薑仁九錢滑石一錢半南星蒼朮赤芍陳皮各一錢黃連黃柏黃芩
錢甘草一錢水煎服治破傷風表熱○羌麻湯羌活麻黃荊花川芎石膏防風前胡黃芩細辛枳殼茯苓
蔓荊子甘草各五分白芷薄荷各二分半羌麻湯羌活麻黃荊花川芎石膏防風前胡黃芩細辛枳殼茯苓
草防風馬齒莧各等分白芷薄荷各二分半羌麻湯羌活麻黃荊花川芎石膏防風前胡黃芩細辛枳殼茯苓
破傷風半表裏頭微汗身無汗不可發汗者宜此○裏實江標大芎而臟和養血兼防朮
分雄黃一錢蜈蚣二條天麻一錢為末分作二分料一分燒飯為丸梧子大每九錢再服砂為衣將一分加巴霜二
分半飯為丸每用珠砂砂藥廿九加巴霜藥一丸二服加二丸至便利為度再服砂藥砂藥病愈即止治破傷
風驚而發搐腦筋不舒在裏者宜此下之○大芎黃湯川芎一錢大黃羌活黃芩各二錢水煎服治破傷
傷風二便秘赤自汗不止○養血當歸地黃湯當歸川芎生地芍藥大黃羌活黃芩各二錢水煎服治破傷
煎服治病久氣血漸虛邪氣入胃宜此養血榮筋○白朮防風湯白朮黃芪各二錢水煎服治破傷
各二錢防風四錢水煎服治破傷風發表過多臟腑和而自汗不止者宜○通用忍冬或丸或散
冬藤五兩甘草節一兩或加黃芪當歸各五兩尤妙入砂礪內水二碗慢火煎至一碗入酒一大碗煎數
沸作三次溫服一日夜或盡如病重一日夜服兩劑俟大小腸通利為藥力到外用忍冬藤蓮花葉木杆
搗爛入酒少許敷瘡四圍留中以酒浸之煉火煨一宿取出晒乾入甘草少許為末酒糊丸梧子大每百丸溫酒米
飲任下消渴後宜服此○概施黃蠟加礬加葱
藥預防發癩亦主痔漏○概施黃蠟加礬加葱
化膿及諸內癰排膿托裏之功甚大或金石補藥發疽非此莫治若遍身生瘡狀如蛇頭者每服百丸大
有神効若蛇蝎及一切毒蟲所傷溶化熱毒患處內更服之其毒即解為外科癰疽之要藥也服至三四

難貼治諸般癰腫毒外科神藥人多忽之。○萬應膏木香川芎牛膝生地細辛白芷秦光歸尾枳殼獨活防風大楓子羌活黃芩南星草麻子半夏蒼朮貝母赤芍杏仁白薇茅香兩頭尖艾葉連翹川烏甘草節肉桂良姜續斷威靈仙荆芥藁本丁香金銀花丁皮藿香紅花青風藤烏藥蘇木玄參白鮮皮姜黃草烏桃仁五加皮山柅牙皂苦參穿山甲五倍子真降節骨碎補蒼耳頭蟬退蜂房蜜甲全蝎麻黃白芥各一兩犬黃二兩蜈蚣一條蛇退三條桃柳槐桑練楮七樣樹皮各廿一寸用麻油十二斤浸春五夏三秋七冬十日方入銅鍋內文武火煎至藥枯黑渣盡磁器收貯另用松香一斤溶化入前藥油二兩同熬滴水成珠不軟不硬另濾入水中番攪揉如金色即成膏矣治一切風氣寒濕手足拘攣骨節酸疼男婦人瘡積女人血瘕及腰疼筋痛諸般疔毒結核轉筋頑癩瘡疔疔毒不愈腫毒初發楊梅腫硬未破者俱貼患處肚腹疼痛瘡疔俱貼臍上疔白而寒者尤効咳嗽哮喘受寒惡心胸膈脹滿男婦面色痿黃脾胃等症及心疼俱貼前心重傷力渾身拘攣者貼後心與腰腿諸症小腸氣等症貼臍下神効○千槌膏白松香一斤卑麻仁杏仁各三百粒銅青三兩乳香沒藥各一兩半輕粉二錢共入石臼內向日下以木杵槌成膏如燥少加香油槌之磁器收貯每用忌火宜於湯內溶化紅絹攤開貼之治諸般癰毒無名惡瘡未成者散已成者收毒追膿如神
呼膿長肉白蠟琥珀水粉分白膏紅膏綠膏如練錦內膏麻居塊及瘡疾貼大椎及身椎穴其効如神
呼膿長肉白蠟琥珀水粉分白膏紅膏綠膏如練錦內膏麻油三斤入桃柳槐枝各七寸頭髮一團雞子大熬焦枯入當歸黃芪黃連各一兩半黃柏黃芩大黃白芷杏仁防風荆芥羌活獨活連翹山柅各一兩赤芍地黃白芩青風藤全銀花各八錢文武火煎至藥枯黑渣盡去渣入黃丹半斤黃蠟五兩雁青二兩同煎至油滾漸漸加入水中軟硬得所方入乳香沒藥各味五錢血竭輕粉各三錢急手攪勻磁器收貯專治癰疽疔毒疔瘡等毒已破出膿者油紙攤貼如膿未生地各一兩用麻油一兩煎藥枯黑渣盡去渣入白蠟或黃蠟一兩溶化候冷攪勻即成膏矣治癰疽疔瘡湯火等症去腐生肌止痛補血續筋又與新肉相宜其効如神或加乳香沒藥龍骨血竭吧茶輕粉尤妙○琥珀膏歸尾川芎黃芪稍蜂房皂角才麻甘草稍單麻子木鱉子芍藥白薇獨活藁本防風稍枸杞子瓜蒌仁蘇木白芷杏仁黃連槐枝各一兩用油五錢煎至減半去渣再煎水成珠軟硬得所如軟漆丹硬再渣盡前汁和勻以槐枝不住手攪慢火熬至成膏入香油四斤真酥二兩羊腎脂油四兩攪勻文武火煎至油盡約以紙條蘸着不燥為度方徐徐入黃丹二斤柳枝不住手攪滴水成珠軟硬得所如軟漆丹硬再加油再熬方入琥珀木香乳香沒藥雲母雄黃硫砂甘松各末二錢半髮灰二兩枯礬一兩輕粉麝香各末二錢急攪令極勻微煎數沸以磁器收貯厚紙紅絹攤開量磨大小貼之神効治五發惡瘡疔瘡癰腫遠年冷疔疔漏一切無名腫毒及虎蛇傷並皆治之○水粉膏黃丹半斤水粉四兩研勻用麻油一斤煎至滴水成珠下乳香沒藥龍骨血竭吧茶輕粉各末二錢攪勻磁器收貯貼之神効治五發惡瘡疔瘡癰腫疔瘡口止痛如貼艾火瘡不須下乳香沒藥等藥便好○白膏藥水粉一兩半赤石脂一兩樟腦五錢輕粉

二錢半為末用生猪脂去膜同搗成膏光將生肌散粉上然後貼之神効○紅膏藥光以黃蠟一兩溶化次下香油三錢黃丹五錢攪勻再熬成膏磁器收貯貼諸瘡毒及湯火金瘡等傷○綠膏藥銅青單麻子各一兩松香四兩木鱉子五十箇杏仁五錢巴豆五枚乳香輕粉各二錢為末搗勻打淨石上用斧起十餘下成膏收貯水浸旋用治諸般惡瘡腫毒軟癩○貼膏藥法如瘡有膿血不淨加癩開澀須用藥水洗淨拭乾候水色乾却用膏貼貼後有黃水膿血流出用紙揩從側畔出一日一換黃水膿血流出用紙揩從側畔出一日一換黃水膿血止兩日三日一換貼至愈凡洗拭換膏必須預備即貼之新肉惡風故也
呼癆醫設天官掌制
毒有方創子手菩薩心誤傷何忍周禮天官掌瘍醫制五毒方為外科之祖
拾遺

二香散紫蘇陳皮蒼朮厚朴扁豆甘草各五分香附一錢半香茹一錢生薑木瓜各二片葱白二莖水煎服治四時感冒冷濕寒暑嘔惡泄利腹痛瘴氣飲冷當風頭疼身熱傷食不化如外感腫滿倍加車前子木瓜

柴苓湯即小柴胡湯合四苓散退熱止瀉

胃苓湯即平胃散合四苓散止瀉利水

荆防敗毒散即人參敗毒散加荆芥防風牛蒡子薄荷前胡治一切風熱丹毒風疹風堆風腫及大頭疔等症如內熱加芩連口渴加天花粉

枳椇二陳湯即二陳湯加枳椇梗寬胸膈化痰氣治痞滿

芩連二陳湯即二陳湯加黃芩黃連善化痰降火

柅子乾姜湯山柅七枚乾姜一兩水煎溫服得吐即止治醫以丸藥大下身熱不去微煩蓋丸藥不能除熱但損正氣邪氣乘虛留于胸中而未深入則身熱不去而微煩是用山柅苦寒以吐煩乾以益氣

三白姜棗湯即三白湯加姜棗煎服治汗下後頭項強發熱無汗心滿痛小便不利

八珍湯 即八物湯去白朮加砂仁等分姜七

丁香爛飯丸 丁香三枚我朮木香各二錢甘草甘松砂仁丁香皮益智仁各六錢香附一兩

三稜消積丸 三稜我朮炒各七錢巴豆和皮米炒黑焦去米青皮陳皮茴香各五錢丁香皮益智仁各

導氣枳實丸 茯苓黃芩白朮黃連各三錢澤瀉二錢大黃一兩枳實神麩各五錢為末湯浸蒸餅丸

大枳壳丸 我朮厚朴人參青皮黑丑枳壳茯苓木香陳皮白朮半夏麥芽神麩三稜各一兩攪柳大黃各

三黃枳朮丸 黃芩二兩黃連大黃神麩陳皮白朮各一兩枳實五錢為末湯浸蒸餅丸

木香枳朮丸 木香枳實各一兩白朮二兩為末荷葉煨飯

橘半枳朮丸 橘皮半夏枳實各一兩白朮二兩為末荷葉煨飯

南星丸 南星黃芩酒浸香附蒼朮童便浸各二兩川芎酒浸一兩半山柃炒一兩龍膽草酒浸

卻痛散 五靈脂蒲黃各五錢當歸肉桂菖蒲木香胡椒各一兩川烏一

古玄金散 玄胡索金鈴子各一兩為末每二錢溫酒或白

三味玄胡散 玄胡索肉桂各一兩木香二錢為末

三味川練丸 川練肉山柃各一兩當歸二錢為末

海金沙散 海金沙滑石各一兩甘草一分為末

加減八味丸 熟地八兩山茱萸山藥各四兩茯苓牡丹皮澤瀉各三兩五味子肉桂各一兩為末地黃膏

紫沉丸 半夏地黃梅代赭石砂仁各三錢丁香檳榔各二錢杏仁白朮木香沉香各一錢陳皮五錢白

增損五積丸 黃連肝積五錢脾積七錢心脾一兩半厚朴肝心脾五錢脾腎八錢川烏用肺一錢心腎脾

五仁丸 柏子仁桃仁松子杏仁郁李仁各一兩研膏另用

五參散 人參玄胡丹參沙參苦參各二兩白朮蛇一截為

鴨頭丸 防己一兩甜葶藶頭血能利水而涼血故也

撞關飲子 烏藥一錢二分香附一錢砂仁八分三稜白豆蔻甘草各五分丁香沉

雄珠丹 大黑豆四十九粒約五錢重端午日以冷水浸從早至巳時去皮晒乾研入信石末一錢再研勻

東井水 下一丸



一補一發丹 茯苓一兩半夏陳皮柴胡黃芩蒼朮葛根各七錢常山三錢為末麩糊丸梧子大每七十九

甚加黃芩黃連寒多 加草果口渴加烏梅

別離散 附子一兩天雄附子肉桂乾姜茵陳各三錢當歸地黃各五錢為末空心白湯調服二錢治心風為病男夢見女

女夢見男宜此去邪 使不復見故云別離

火輪丸 附子乾姜肉豆蔻各等分為末米糊為丸服使 脾土運轉如輪五穀易消而大腸傳送有常

金櫻丸 金櫻子一升去穢以酒二升砂鍋內熬膏桑白皮一兩雞頭實五錢桑螵蛸酥炙一分白龍骨五

錢蓮花鬚二分為末入膏為丸如梧子大空心溫酒鹽湯下三十九更入麩糊為丸治遺精或有

咳

烏犀丸 巴豆一百單八箇去心膜用沉香水浸過橘皮一兩去白切片將巴豆拌和受曉露七夜文武火

炒令黑色揀出巴豆令去油盡蒼朮六錢去麩皮濃煎犀角水浸受大陽七日晒乾微炒遂將橘

皮同碾為末將巴豆和入末內碾勻水浸蒸餅為丸羅訶子大量兒大小加減丸數臨臥生薑湯下治

小兒驚疳積聚腹大朝熱揉指咬用蛔蟲自利頸核腹痛遍身瘡疥小便如泔多汗嗜泥炭或瘧或渴

或吐或瀉或百日內尿血絞刺嘔吐脾虛易為傷犯 為疾發生宜服之常服消宿食破滯氣發散痲毒

百倍丸 牛膝補骨脂龜板各一兩肉從蓉虎骨各五錢木鱉子乳香沒藥自然銅各二錢為末

蜜丸梧子大空心溫酒鹽湯任下三十九治腎虛腰腿痛風及折傷補損有百倍之功

潤腎丸 蒼朮一斤用韭菜一斤搗汁拌九蒸九晒又用小茴一斤同蒸一次去茴晒乾熟地黃一斤五味

子半斤乾姜冬一兩夏五錢秋七錢虛寒加韭子有火加黃柏各一兩大便燥加黑芝藤四兩為

末棗肉丸梧子大空心米飲下五七十九治脾胃虛虛善退勞

熱益脾胃苦濕以蒼朮燥之腎苦燥以姜棗潤之五味收之是也

草還丹 蒼朮四兩用酒醋米泔鹽水各浸一兩胡蘆巴故紙小茴川烏川練肉各一兩覆盆子二錢木香

五錢山藥穿山甲地龍茯苓各一兩牛膝各三錢為末酒糊丸梧子大每五十九空心溫酒鹽湯

任下以乾物壓之犬壯脾胃進飲食益精壯補腎經固元陽輕

腰脚安五臟通九竅明目且悅顏色烏鬚固齒真延年之劑也

黃茂丸 黃茂烏藥向香地龍川椒防風川練肉赤小豆白茯苓海桐皮威靈仙陳皮各等分為末酒糊

丸梧子大每三十九空心溫酒下治腎臟虛風攻注手足頭面麻痺痛痒或生瘡疥腫瘡疥腫

大黃散 大黃川芎各一兩甘草黃芩枳殼各五錢每一錢

取漏膿法 皮硝三兩苦參一兩半為末用布四寸長三寸闊縫一袋入藥半袋以硫三分放藥末中

間方入全藥裝滿縫袋中兩頭安帶跨馬係住治內痔久漏取膿最妙惟牛乳外痔不用

枇杷葉丸 枇杷葉蜜炙二斤山藥一斤枸杞子山茱萸各半斤吳茱萸一兩為末蜜丸梧

子大每七十九清米飲下治婦人血崩經事失期或前或後能令有子極効

紅花湯 水蘆花芽香紅花槐花白雞冠花各等分水

煎服忌腥冷發氣之物治男女諸般血病

史國公浸酒方 防風羌活虎骨骨節甲晚蚕砂炒油煎白朮各二兩秦光單解當歸杜仲各二兩半膝

酒三十五斤封壘口浸十四日滿將壘入水鍋懸煮一時取壘入土內埋三日去火毒每日

清晨干後各服五七鍾大有補益治半身偏枯手足拘攣一切風疾神功衰年染患者亦宜

固木酒 生地黃熟地黃天門冬麥門冬人參白茯苓各四兩如熱去人參下虛寒加韭子二兩婦人虛

寒用桃核連皮為引久服生子如法浸酒服忌蘿蔔葱蒜治虛癆烏鬚一方去茯苓加半膝枸杞

黃柏木 香砂仁

仙酒方 蒼朮二兩枸杞當歸川芎白芍陳皮天麻各一兩晚蠶砂五加皮枳

殼半夏肉桂杜仲防己牛膝桔梗木瓜白芷各五錢如法浸酒服之

五積酒 用五積散去麻黃加防己杜仲牛膝風熱合則毒

散同浸渣汁為丸治虛寒筋骨酸疼腰脚無力

婦人小兒外科用藥賦及拾遺終

雜病婦人小兒外科總方

氣類

四君子湯

扶胃降火補虛固本氣虛有熱用之性緩不暴不助虛陽故稱君子治男子一切內傷外感及小兒脾胃不調等症若女子氣虛亦宜用之惟血虛者不宜單服耗血一切大病後最宜服之

以調人參

中益氣補白朮二錢扶胃健脾茯苓二錢養心利水氣弱甘草六分和中生薑三片有棗子一枚水煎不

脾胃

加陳皮半夏竹瀝姜汁虛勞有熱合四物湯內傷停飲目眩去參加官桂當歸黃芪胃冷加附子丁香砂仁脾胃氣短

豆泄瀉

不止加訶子豆蔻陽虛加附子脾胃虛弱加官桂當歸黃芪胃冷加附子丁香砂仁脾胃氣短

加木香砂仁

煩口渴倍參加黃芪心煩不定加辰砂酸棗仁遠志心熱加麥門冬茯苓蓮肉氣痛加玄胡

于杏仁

煩口渴倍參加黃芪心煩不定加辰砂酸棗仁遠志心熱加麥門冬茯苓蓮肉氣痛加玄胡

索小茴

當歸氣塊加三棱莪朮茴香附子腹痛加乾姜赤芍官桂通身疼痛加赤芍官桂潮熱往來加前

胡川芎

口渴加木瓜乾葛烏梅小便不通加澤瀉木通指苓大便秘不通加檳榔大黃小兒風疾加全蝎

白附子

細辛疹痘已出未成加升麻乾葛婦人產難加麝香白芷百草霜凡病後調理加陳皮病後虛

熱加柴胡

當歸并麻餘可類推量病依藥性百般加減由人○又有變方之法如三白湯六君子湯觀

音散異攻

散補中益氣湯及烏藥順氣散木香勻氣散七氣湯九溫氣快氣行氣散氣降氣破氣消氣

補氣清氣

皆自此方而變化之也

六君子湯

治脾臟不和嘔吐少食頭目不清上燥下寒服熱藥不得者即四君子湯加陳皮半夏各等分

甘草減半

姜棗開服○凡人參養胃湯四獸飲衛生湯托裏清中湯之類皆自此方而變化之

也

血類

四物湯

調益榮衛滋養氣血治衝任月事不調臍腹疼痛崩中漏下將理失宜胎動不安血下不止及產後乘虛風寒內搏惡露不下小腹堅痛時發寒熱等症若男子精血虛損發熱亦宜用之蓋女子

以血為主

而氣為之本血盛則精強血衰則精薄故欲益精當先補血故二方為男女通用也

白芍

二錢半經中破血腹痛非此當歸二錢潤中和氣刺痛如刀非熟地二錢半滋陰生血臍痛非此

川芎

二錢清陽和血行血頭痛非此不除肝經藥也冬倍用之熟地二錢半滋陰生血臍痛非此

黃湯

當歸和血散凡補血溫血生血涼血止

痰類

二陳湯

痰乃脾胃津液周流運用而氣由之如道路然不可無者濕感痰多加以外感固滯於中斯為患

陳皮

二錢和脾半夏一錢燥濕豁痰溫中化痰茯苓八分行氣甘草四分健脾生薑三片水煎溫服如血

瀝姜汁

熱痰加黃芩黃連連胃脘痰火加石羔痰結吐不出加瓜薑仁血痰加黃芩麥門冬知母芍藥竹

鬱類

越鞠丸凡願欲不遂如婦婦僧道之類各私不遂或先富後貧之類或久病不愈皆宜用之

蒼朮神麴川芎山梔香附各等分為末水丸棗豆大溫湯下七十九蓋氣血痰三者多有兼鬱而鬱有脈沉合四物湯痰鬱動則喘寸脈沉滑合二陳湯濕鬱周身走痛或關節痛遇陰寒則發脈沉細加白芷茯苓熱鬱小便赤脈沉數加青黛食鬱受酸腹飽不能食左寸脈平和右寸脈緊盛加山查針砂春諸鬱加防風夏諸鬱加苦參秋冬諸鬱加吳茱萸○又如六鬱湯流氣飲于四七湯分氣飲之類皆自此方而變化之也

六鬱湯能解諸鬱

陳皮半夏川芎蒼朮各一錢赤茯苓山梔仁各七錢香附二錢砂仁甘草各五錢生薑三片水煎溫服隨症加減

陰虛生內熱湯

當歸川芎蒼朮陳皮各八分白芍山梔天花粉各六分白朮麥門冬各七分夏月沙參各七分玄參五分黃柏三分甘草二分

生薑三片水煎服或以山藥代參朮久服去川芎冬月加破故紙此方與下陰分生陽湯義相發明

陰分生陽湯

白朮七分白芍六分當歸一錢甘草二分蒼朮五分陳皮八分生薑三片棗子一枚或加參朮或以山藥代參朮水煎服用故紙蓋以三焦者乃下焦元氣生發之根蒂也

升陽益胃養榮湯

當歸一錢全用隨白芍八分炒隨白朮八分炒隨人參七分山梔八分炒甘草五分如食松菜以蜜代之白朮五分木通五分以生薑三片棗子一枚水煎服

棗子二枚粳米一撮水煎熱服蓋蒼朮山梔大能除鬱因食冷物鬱火於脾胃者故屬脾胃者土也熱沃肉菓補骨脂二物冬月可服○已上三方古菴所立鬱門曾纂其畧今更詳之

總方畢

通用古方詩括此等方如文家程式不可不記以為骨但外感內傷當依各門類加減穿合摘變而物湯二陳湯二三方穿而為一或有去取合者如四君子湯合四物湯更無去取摘者如用四君子湯有痰喘二陳湯中陳皮半夏血虛摘四物湯中當歸或地黃二味血虛頭痛摘川芎一味血虛腹痛摘芍藥一味千方萬方丸藥皆然知此則處方有骨正東垣所謂善用方者不執方而未嘗不本於方也凡詩括內方無等分者悉見各門總方及用藥賦

麻黃湯中用桂枝杏仁甘草四般兒發熱惡寒身體痛須知一服汗淋漓見四卷三十七頁

桂枝湯內藥三般芍藥甘草一處攪若把二方相合服方名各半治傷寒見四卷三十八頁

九味羌活湯防風黃芩白芷與川芎蒼朮生地細辛草煎法還用姜棗見四卷三十九頁

大羌活湯即九味已獨知連朮相助一十四般白水煎兩感風寒須此治見四卷三十六頁

香蘇散即君香蘇甘草陳皮各半咀無汗麻黃宜量入腦痛芍止不可無見四卷二十九頁

升麻葛根湯四味攪上芍藥甘草是傷寒發熱與頭疼汗出惡寒風熱治見四卷二十八頁

十神湯內紫蘇多甘草陳皮香附顆乾葛升麻并芍藥川芎白芷麻黃和見四卷二十九頁

古蒼劑散藥相等甘草減半性不猛未發熱時宜急煎感冒風寒濕可省又名冲和散蒼朮荆芥各等分甘草減半水煎溫服治感冒寒濕身體沉重肢節痠疼項背拘急鼻塞聲重氣壅上感咽渴不利等症

消風百解散荆芥止陳皮麻黃蒼朮比甘草攪成姜葱煎頭疼發熱咳嗽使荆芥蒼朮白芷陳皮麻黃各八分甘草四分姜葱煎服治四時傷寒頭痛發熱鼻塞聲重如咳嗽加烏梅

參蘇飲內用陳皮。桔梗前胡半夏。宜乾葛茯苓同甘草。木香枳殼總堪題。見四卷二

大青龍湯。桂麻黃甘草杏仁石羔。藏生薑棗子煎熟。服惡寒無汗。用為良。見四卷二

小青龍湯。治喘嗽。姜桂麻黃細辛。湊半夏五味芍藥。甘心胸水氣自然透。見四卷二

白虎湯。中用石羔甘草。知母本方。披人參亦有加之。用熱渴虛煩。用米熬。見四卷四

竹葉石羔湯。用參門冬半夏。更加臨甘草。生薑兼用。米虛寒自利。熱家尋。見四卷二

苗連解毒湯。四味苗柏苗芍。梔子是。退黃解熱。又除煩。吐血便紅。皆可治。見四卷三

瓜蒂散。中赤小豆。二味勻平。有傳授。豆豉一合。水同煎。吐去膈痰。須此救。見四卷三

小柴胡湯。只五般。半夏人參。一處攪。更有苗芍與甘草。加減由人。效百端。見四卷四

大柴胡湯。用大苗。半夏枳殼。此為良。更有苗芍與甘草。加減由人。效百端。見四卷四

小承氣湯。枳朴苗。結胸譫語。煎之膏。三化湯。只加羌活。中風數閉。效非常。見四卷四

大承氣湯。用朴硝。大苗等分。不須饒。厚枳倍加。并枳殼。通腸利便。有功勞。見四卷四

桃仁承氣。五般奇。甘草硝苗。并桂枝。血症發黃。并血竭。熱泄亂語。總相宜。見四卷二

四逆湯。中姜半兩。生附減半。去皮尖。一兩甘草。水煎服。厥而下。利用之。痊。見四卷四

理中湯。用甘草。姜白朮。人參。是泛常。若是內中。加附子。更名附子理中湯。見四卷四

小建中湯。芍藥。三。生姜甘草。一分。參。更有桂枝。一錢半。膠飴。大棗。治虛寒。見四卷四

玄武湯。中芍藥。魁茯苓。白朮甘草。煨附子。炮來加減。用。生姜五片。陽可回。見四卷四

炙甘草湯。參阿膠。麥門生。姜大棗。饒生地。苗麻子。仁桂。入些。煮酒。治虛勞。見四卷四

補中益氣。黃芪。參。甘草。白朮。當歸。身。柴胡。升麻。陳皮。伴。形。虛勞。損喘。皆併。見四卷四

升陽益胃。參朮。苗連。半。茯苓。陳皮。澤瀉。防風。姜獨活。柴胡。白芍。也。堪題。見四卷四

益胃升陽。當歸。身。參朮。苓。芪。炒。陳。甘草。升麻。柴胡。使。秋。間。服。者。去。苗。芍。也。堪題。見四卷四

調中益氣。橘。升。麻。甘草。柴。胡。蒼朮。加。黃。芪。木。香。參。八。味。從。前。選。用。也。堪。誇。見四卷四

升陽補氣。湯。升。麻。澤。瀉。防。風。白。芍。誇。厚。朴。柴。胡。姜。獨。活。甘。草。地。黃。生。用。佳。見四卷四

雙和散。桂。甘草。芍。苗。芪。參。歸。熟。地。苗。姜。棗。煎。來。補。氣。血。生。甘。芍。藥。也。堪。嘗。見四卷四

升陽散火。湯。升。麻。葛。根。柴。胡。防。風。加。炙。草。人。參。羌。獨。活。生。甘。芍。藥。總。堪。誇。見四卷四

通關細辛。皂角。等。入。鼻。須。看。有。嚏。否。去。辛。加。半。或。加。礬。方。名。急。救。稀。涎。散。見四卷四

烏藥順氣。散。陳。皮。姜。枳。殼。薑。蘇。芍。止。詳。甘。草。麻。黃。桔。梗。入。中。風。先。服。最。為。良。見四卷四

用此有嚏可治無嚏者死。稀涎散。皂角。半夏。明礬。各等分。為末。每二錢。白湯調服。即吐。治中風。肢散。延潮。隔塞。氣閉。不通。見四卷四

烏藥。陳皮。各一錢。乾姜。二分。半。枳殼。姜蘇。川芍。白芷。桔梗。見四卷四

上海。海。山。房。校。印。見四卷四

甘草各五分麻黃一錢半姜棗煎溫服治男婦一切風氣攻注肢節麻痺言語蹇澁光服此疎氣道然後進以風藥氣升為逆降下為順順氣者正所謂降氣也如陰積浮腫合五積散麻痺痛極合三五七散二三年不能行者合獨活寄生湯日夜疼痛合左經湯

祛風通氣散烏藥君芍正甘梗橘朮臣麻壳人參為佐使姜棗煎來任屈伸烏藥一錢半川芍白芷甘草枳壳人參各五分姜棗煎服或為末每一錢紫蘇木瓜煎湯調服搔痒加薄荷少許治男婦氣虛內風攻注或外風中驚頭目昏痛鼻塞口吐語澀甚則身如板片攣拳屈伸不便肩背刺痛胸膈膨脹脚膝軟弱痰多咳嗽嘔吐惡心空瀉不食胎前產後一切虛風等症

星香散內炮南星更有木香生用靈若加川烏與附子方名改換號三生星香散南星四錢木香五分姜棗煎不得者○三生飲南星二錢川烏附子各一錢木香五分姜十片水煎溫服治中風昏迷痰涎壅閉口眼喎斜半身不遂脈沉無熱者可服去川烏名星附湯

資壽解語湯附子風天麻酸棗桂羊充甘草羌活次第入竹瀝多湊立奇功附子防風天麻酸棗仁各三分草羌活各五分水煎入竹瀝調服治風中心脾舌強不語半身不遂

小續命湯防己桂杏仁黃芩芍藥配甘草參芍與麻黃附子防風一同例防己肉桂杏仁黃芩芍藥甘草分防風一錢半姜棗煎服治卒暴中風不省人事漸覺半身不遂口眼喎斜手足顛掉語言蹇澁肢體麻痺精神昏亂頭目眩暈痰壅筋攣骨節煩疼又治脚氣緩弱及久病風入每遇天色陰晦節候變更宜預服之以防唇啞如有六經見症加減照依傷寒無汗惡寒合麻黃湯有汗惡風合桂枝湯身熱無汗合白虎湯有汗合葛根湯身涼無汗合古姜附湯有汗合古桂附湯無此四症少陰厥陰肢節攣痛麻木用本方八錢加羌活四兩連翹六兩為丸服亦好○交濟湯即本方合排

排風湯朮桂芍芍芍甘麻與防風獨活當歸白鮮佐栝涎治播最多功白果肉桂川芍杏仁芍藥甘草活各七分半白鮮皮二分半姜棗煎溫服治男婦中風及風虛冷濕邪氣入於五臟令人狂言妄語精神錯亂以致手足不仁痰涎壅盛此湯安心定志聰耳明目大理榮血去肝邪服有微汗不妨

大秦羌湯羌獨活芍正甘辛兩地黃歸芍芍防白朮石羔十六味平良秦羌石羔各一錢半羌活獨活白芍黃芩茯苓防風白朮各一錢細辛二分半水煎溫服治中風內外無症知為血弱不能榮筋手足不能運動古強不能言宜養血而筋自榮如天陰雨加生薑心下痞加枳實

羌活愈風湯草參芪防風蔓細枳朮皮麻荊薄荷獨活歸杜仲柴前知生熟地黃半桂芍芍芍朮已美依川芍當歸杜仲柴胡前胡知母熟地半夏厚朴防己各五分生地石羔蒼朮各一錢肉桂二分半芍藥黃芩茯苓各七分半水煎遇天陰生薑三片煎空心溫服治肝腎虛弱筋骨弱語言難精神昏瞶及風濕體重或瘦而一肢偏枯或肥而半身不遂或恐而健忘喜已多思皆精不足也宜此安神養心調陰陽不問男婦小兒風癱急慢驚風神効

萬寶回春湯甚奇甘麻芍已杏仁依生地熟地芍歸芍黑附香附沉半皮茯神參朮防風桂烏藥川烏姜黃芪

防風通聖將軍芍薄荷芍歸草朴硝梔翹芍梗并白朮麻黃荊芥滑石羔見四卷六十四頁川芍茶調散薄荷白芷防風甘草和更有細辛羌活等荊芥同煎用者多川芍荊芥各四兩薄荷白芷甘草一兩為末每二錢茶清調服治諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞聲重

消風散用荊芥參甘草陳皮白朮芍姜薑芍窮防風藿蟬退厚朴羌活停荊芥甘草各二兩人參茯苓各一兩陳皮厚朴各五錢為末每二錢感風頭痛鼻流清涕荊芥煎漫下瘡癬溫酒下治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻塞聲重耳鳴及皮膚頑麻疹痒婦人血風頭皮腫痒又治眼胞皮肉有似膠凝腫如桃李時出熱淚及偏風牽引兩臉赤爛經年不安風眼要藥也

三五七散山茱萸姜附細辛防快咀每服二錢溫酒下風寒入腦致陽虛附子細辛各三兩山茱萸炮乾姜各五兩防風茯苓各七兩一

方無茯苓有山藥五兩為末每二錢酒調服治陽虛風寒入腦頭痛目眩

山茱萸散甘菊花人參山藥茯苓神志小芍六味各五錢治眩暈轉實堪誇

清或酒調服治風眩頭暈有勁

羌活湯麻黃升麻黃柏各連與芍歸細蔓紅花蒼朮半頭項痛即時移

羌活各二分當歸川芎蔓荊子細辛黃連半夏紅花各一分水煎溫服治厥陰頭項痛或痰涎厥冷脈浮而緩

升麻胃風葛止蒼朮蔓荊草薤姜甘柏麻黃姜棗煮能消面腫與牙疳

明目流氣飲大黃芍牛芩芍花防芥蔓荊玄甘木賊決明梔子與蒼朮

草木賊黃芩山梔各一兩草決明一兩半蒼朮二兩為末每二錢臨卧冷酒調服治肝經不足風熱

洗心散用麻大黃白朮當歸芍藥涼荊芥穗同甘草等姜薄加上水煎湯

各少許水煎服治風痰壅滯心經積熱口苦唇燥二便秘澀眼腫痛多淚羞明並皆治之

洗肝散用薄荷葉當歸羌活山梔仁大黃防風甘草等川芎治眼効如神

各等分為末每二錢熱水調服治風毒上攻暴赤腫痛隱澀眩

川芎石羔散歸木芍梔大黃寒水石滑荊荊參草梗砂防翹薄荷葉煎

石四錢寒水石桔梗各二錢甘草三錢石羔防風連翹薄荷各一錢砂仁二分半水煎溫服忌食醋發熱物治風熱上攻頭目昏眩痛悶風痰喘嗽鼻塞口瘡煩渴淋閉眼生翳膜此藥清神爽志宣通氣血

又治中風偏枯解中外諸邪調理諸病勞瘵傳染

還睛散用白茯苓藜草決木賊與山梔防甘蟬退青箱子為末門冬湯下之

二錢半為末每二錢麥門冬煎湯下治肝肺一切風熱翳膜及腎風熱或暗忽痛如針刺或小兒疳眼初起溢痛久則生瘡翳腫淚出難開一切肝風及瀉痢後虛熱上行不可點者並宜服之為眼科通用

蟬花散即還睛散加上荊芥草龍胆蔓荊芍藥各均平茶清調下皆翳展

荊子蜜蒙花菊花草龍胆各等分一方無青箱龍胆有殼精草羌活黃芩等分為末每二錢茶清或荊子湯調服治肝經熱毒氣上攻眼目赤腫昏翳多淚羞明一切風毒並宜

四物龍胆湯地黃川芎芍藥當歸良防風防己草龍胆眼疼食後水煎嘗

煎溫服治目赤暴發雲翳疼痛不可忍

補陽湯物除川芎黃芪羌獨活防風澤瀉陳柴知母桂空心煎服効非常

犀角升麻湯白芷防風川芎白附子甘草羌活與黃芩風熱牙疼皆可使

草一分半水煎服治胃經風毒氣血凝滯麻痺不仁鼻額間痛唇口夾車髮除連牙腫痛口不能開雖言語飲食亦妨礙左額頰上如糊細急手觸之則痛

獨活散內用川芎羌活荊防薄荷成生地黄兼細辛使煎來漱嚥治牙齦

疥服治風毒攻注牙齦腫痛

甘露飲兩地黃茵陳天麥枇杷枳壳石甘等分煎之用男婦咽牙客熱靈

斛甘草各等分水煎服治胃中客熱咽膈乾燥牙宣齦腫或身黃如疸等症用之如神

通氣防風湯羌獨君薑本荊芍甘五分鬱加升柴寒蒼柏太陽脊強痛堪均

防風羌活獨活各一錢薑本蔓荊子川芎甘草各五分水

上海藥山房校印

方詩

煎溫服治手足太陽經氣鬱不通肩背痛不可四顧脊痛項強腰似折項似拔如身重腰沉沉然者經中有寒濕也加酒浸防已輕加附子重加川烏各一錢有鬱加升麻柴胡有濕熱加蒼朮黃柏各五分

活絡湯用羌獨活各歸白朮甘草嚼姜煎一盞不拘時風濕臂痛勝諸藥各一錢半姜煎溫服治風濕臂痛諸藥

痛諸藥不效者

舒經湯中姜黃最歸草桐朮共切碎赤芍羌活又少些沉香磨服治諸痛各二錢半赤芍羌活各二錢

五分半分二貼姜煎入沉香少許腰已上痛食後腰已下痛食前服治氣血凝滯經絡以致臂痛不舉及諸痛風針灸不効者

五痺湯中羌白朮姜黃防已二錢足甘草一錢姜同煎筋緩皮頑堪再續羌活白朮姜黃防已各二錢甘草一錢一方有柴胡姜煎熱服

治風寒濕氣客留肌體手足緩弱頑麻不仁

三痺湯即寄生湯黃防續斷秦成方一切風痺拘攣疾煎服為丸任意嘗杜仲牛膠細辛人參茯苓桂心

續斷各一錢獨活秦艽生地各五分姜棗煎熱服治血氣凝滯手足拘攣風痺等疾

黃芪湯治渾身麻葛草橘參芍藥臨臥水煎還滾服大熱三分黃柏加黃芪人參芍藥各一錢蔓荊子

服治頭面手足肘背腿脚或遍身麻木不仁及兩目羞明隱澁睛痛

補氣湯黃芪白芍甘草澤瀉陳皮枳水煎能治皮膚麻痺醫眼目多昏錯白芍陳皮各一錢半黃芪甘草

肝氣不行皮膚間麻木兼治兩目縮小羞明畏日視物無力

五積白芷陳皮枳椏枳壳川芍芍甘草蒼朮茯苓歸肉桂各三分陳皮麻黃各六分厚朴乾姜各四分枳椏

醋炒畧一分半枳壳五分半夏二分蒼朮七分半姜葱煎服胃寒用煨姜如腹痛或快氣加吳茱調經

入艾醋體薄有汗去蒼朮麻黃氣虛去枳椏加參朮若產後餘血流入遍身肢節腰脚疼痛去麻黃加

人參木瓜桃仁小茴姜煎此方大治感冒寒邪頭痛身痛項強拘急惡寒嘔吐腹痛及傷寒發熱頭痛

惡風內傷生冷外感風寒并寒濕客于經絡腰脚痠疼及婦人經脈不調及腹痛帶下等症

○煎料五積散即本方除白芷肉桂二味外餘十三味從寒熱去麻黃用烏藥一錢俱用淡醋炒過尋常冬月感寒無汗量用麻黃同烏藥乾炒半身不遂或

復麻痺及卒中風加麝少許四肢逆冷嘔吐加附子二分久虛脾瀉每用畧炒過加陳米一撮烏梅一箇乳麝初作加牛膝生地各三分產後及尋常血氣痛加木香玄胡索各五分

藿香正氣用紫蘇大腹陳皮枳椏咀甘草茯苓半夏麴厚朴白芷棗姜扶見四卷二

又不換金正氣散蒼朮半藿甘六傷濕瀉加白茯苓汗多去蒼換白朮見四卷二

神朮散用五兩倉芍正細辛藁本姜甘草六件各一兩風寒泄痢總相當蒼朮五兩川芍白芷細辛藁本

煎溫服傷風鼻塞為末葱白茶清調下治四時感冒風寒及中霧露頭項強熱身痛鼻塞聲重咳嗽時行瘧泄下痢皆効

金沸草散麻芍荆芥前胡半夏姜肺受風寒頭目痛咳嗽聲粘時疫方見四卷三

蘇沉九寶飲薄荷陳麻桂桑蘇與杏仁大腹皮同甘草入諸般咳嗽効如神薄荷陳皮麻黃官桂桑白皮

分生姜烏梅煎服治諸般咳嗽哮喘夜不得臥

發明半夏溫肺湯細辛桂心旋覆花甘草陳皮參枳椏芍藥茯苓赤者佳半夏細辛桂心旋覆花甘草陳

各三分每四錢姜煎溫服治虛寒咳嗽及中腕痰水冷氣心下汪洋嘈雜多唾清水腸脹不食脈沉弦細遲此胃虛冷所致也

人參清肺飲烏梅桑地骨皮知母培阿杏桔梗甘壘粟加蜜澄清得効來人參烏梅桑白皮地骨皮知母

分棗煎入蜜一匙澄清溫服治肺胃虛寒咳嗽喘急并久勞嗽唾血腥臭

導滯湯歸公連桂。大黃檳木甘草次。赤加甘草白加姜。胃弱去黃加朮制。見七卷○地黃湯芍朮柏榆枳滑

加之因痛墜。生地芍藥白朮黃柏各一錢地榆五分水煎溫服治血痢疼痛如

真人養臟湯。粟壳參。訶子當歸肉寇真。白朮木香并芍藥。乾姜肉桂不須尋。粟壳一錢八分人參當歸

滲濕湯中白朮。丁香蒼朮茯苓兼。甘草陳皮有等分。乾姜加上濕皆痊。白朮二錢蒼朮二錢茯苓甘草

除溼湯中用藿香。陳皮厚朴朮名蒼。白朮茯苓并半夏。入些甘草在中央。藿香蒼朮厚朴半夏各八分陳

五苓散內用猪苓。白朮茯苓澤瀉停。肉桂用之多與少。白水煎來止渴行。見四卷

四苓散。即本方如苓湯。即香如散霍苓湯。即藿香正氣

木香化滯湯。當歸稍。枳實陳皮半夏。赤芍紅花甘草。豆蔻甘草主姜腹內消。半夏一錢柴胡蒼朮各四分

茵陳蒿湯。一味濃煎。退疸去身黃。梔子柏皮兼可用。五苓加上又為良。見四卷

一清飲子。赤茯苓。川芎甘草柴桑皮。生薑棗子煎來服。黃疸發熱用之靈。茯苓二錢柴胡三錢川芎桑白

五皮散方亦甚奇。大腹桑根固用皮。茯苓姜橘俱等分。能救渾身沒指危。大腹皮桑白皮茯苓皮生薑皮

赤小豆湯。木猪苓。桑皮防己連翹仁。漆瀉當歸商陸芍。熟甚加犀角又神。猪苓桑白皮防己連翹漆瀉

三和湯中君紫蘇。橘枳檳榔甘草扶。白朮金砂木通等。姜煎行腫可通渠。紫蘇橘皮厚朴檳榔甘草白朮

平肝飲子用防歸。枳梗川芎木桂枝。揀參橘芍檳甘草。腹脇妨暈嘔脹醫。防風枳壳枳梗桂枝赤芍各五

分氣紫蘇飲。陳皮大腹桑根白共推。甘桔菓苓五味子。喘氣脾虛病可移。紫蘇一錢六分大腹皮桑白皮

大正氣散。藿香葉。檳榔朮半乾葛。枳壳橘紅朴桂甘。風寒濕氣脹須涉。白朮一錢半藿香檳榔半夏乾

人參為歸湯。木香蓬朮烏甘草。砂桂五靈脂半夏。入些蘇葉棗生姜。當歸五分木香蓬朮烏藥砂仁

四分川芎半夏各一錢。紫蘇姜棗煎服。治咽燥水迷妄驚。恐

痛悶喘急。虛汗厥逆。小便多。大便黑。肚腹膨脹。名曰血脹症。

香柴胡各二分水煎服治消中善
饑消穀如小兒去柴胡枳殼五味子

滋陰降火湯 古方稀四物湯中加柏知甘草陳皮并白朮天門冬遠志依
拍遠志陳皮川芎各六分姜煎服治潮咳汗血遺精無泄者乃養血降火之聖藥也如有痰加瓜
仁貝母咳嗽加五味子阿膠膠遺加芩實石蓮肉有熱加秦芫地骨皮唾吐咯血加茜根藕汁玄參氣
虛血少加參芪
久病者去川芎

人中白散生甘草青黛黃柏如金寶為末童便調二錢丹溪治火方真巧
人中白二兩黃柏甘草青黛各
五錢為末每二錢童便調服治
陰虛火盛及五
心煩熱等症

枳殼散防風芎藭葛細辛甘梗充姜煎一盞空心服脇疼氣痛儘能攻
見七卷
鹽齋散歸芎藭枳殼茯苓神麴青朴朮小茴各等分葱根並治腹心疼
見七卷

復元通聖散穿山甲青陳甘草瓜薑屑每用熱酒下一錢諸痛諸瘡活氣血
穿山甲瓜薑根各四錢青皮
陳皮各二錢甘草三錢為末
酒調服治諸氣閉滯耳聾耳疼諸瘡腫膿便難瘡疽一切氣
刺如瘡無頭者津液調敷諸瘡腫痛加金銀花連翹各一錢

五淋散治五般淋歸芎藭甘赤茯苓每用空心煎水服可憂氣血石膏淫
當歸甘草各五分與藥山梔各
一錢赤茯苓六分水煎溫服治
腎氣不足膀胱有熱水道不
通淋瀝不出或熱淋便血

清心蓮子飲黃芩甘草車前赤茯苓麥門地骨參芪使下虛上感作諸淋
蓮子赤茯苓人參黃芪各七分
半黃芩甘草車前子麥門冬地
骨皮各五分如發熱加柴胡薄荷水煎溫服治下虛
上感心火上炎口苦咽乾煩渴小便赤澀欲作諸淋

平胃散中四般藥蒼朮陳皮厚朴藿更加甘草調脾胃生薑棗子一同煎
平胃散蒼朮二錢調脾胃濕寬
中陳皮一錢四分和胃消痰溫
服此藥和脾胃健胃扶根固本兼有他症照依藥性加減溫補炒熟消導生用
○平胡飲子 即本方合小
寒熱
相等

參苓白朮散 薏苡仁甘草蓮肉山藥停桔梗扁豆砂仁用棗煎虛熱用之靈
人參茯苓白朮甘草山藥各
三錢薏苡仁蓮肉桔梗白扁
豆砂仁各一錢半為末每二錢棗子煎湯調服治脾
胃虛弱飲食不進或吐瀉及大病後調助脾胃最妙

凝神散參苓白朮山藥扁豆梗米續地苗地骨甘知母門冬竹葉用幾十
人參茯苓白朮山藥各一錢扁
豆梗米生地甘草知母各五分
地骨皮麥門冬淡竹葉各二分半姜棗煎服大能收斂胃氣清涼肌表一方去山
藥扁豆知母竹葉地骨苗黃當歸白芍茯苓桔梗治陽痿聲重血系瘦之

葛花解醒湯 縮砂仁木香豆蔻茯苓陳參姜木澤瀉神麴酒調一服味清辛
葛花砂仁白豆蔻各五錢木
香五分茯苓陳皮人參猪苓
各一錢半青皮乾姜白朮澤瀉各三錢神麴二錢為末每二錢白湯或酒調服得微
汗為度治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂癆瘵痞塞手足戰慄飲食減少小便不利

益胃散姜黃澤瀉乾姜砂草益智仁白蔻黃芪參厚朴陳皮通用十分靈
姜黃乾姜白豆蔻各三分澤瀉
砂仁甘草人參黃芪厚朴陳皮
各七分益智仁六分水煎溫服治服
寒藥過多或脾胃虛弱胃脘作痛

青皮湯橘玄胡索枳朮三棱神麴藥姜煎痞滿雖能調過服能令人氣弱
青皮一錢枳朮三棱各七分陳
皮神麴各五分玄胡索三分姜
煎溫服進食利脾胃消積化聚如痞滿加炒黃連三分有鬱加山梔仁少食
加山查麥芽各二分婦人加香附一錢半川芎八分紅花木香各一分

消積正元散朮麥查甘橘海粉青香砂麴枳玄胡索鬱火仍須善減增
白朮一錢茯苓陳皮青皮砂仁
麥芽山查甘草各三分神麴香
附枳實玄胡索海粉各五分姜煎溫服如上焦火鬱加酒炒
砂連下焦火鬱加炒枳柏冷氣作疼加沉香木香磨水煎服

散聚湯杏附桂心檳榔橘半吳萸浸茯苓歸甘草朴便秘大黃旋酌斟
杏仁桂心橘皮各二分附子吳
萸茯苓枳殼川芎厚朴甘草各
散聚湯杏附桂心檳榔橘半吳萸浸茯苓歸甘草朴便秘大黃旋酌斟

醫藥入門 卷八 方詩 上海歸葉山房校印

一分檳榔半夏當歸各少許。姜煎溫服。如大便秘加大黃。治久氣積聚狀。如癥瘕隨氣上下。發作有時。心腹絞痛。攻刺腰脇。小腹脹大。小便不利。

四七湯理七情氣。陳皮厚朴半夏。紫蘇葉同生。姜煮。喘急。兼將中腕利。四七湯厚朴一錢半。半夏二錢。或痰涎壅盛。上氣喘急。或因痰飲中節。嘔逆惡心。兼治婦人惡阻。及男子思慮過度。小便白濁。

七氣湯中半夏。朴桂苓芍。紫蘇對橘。參姜棗同煎。服七情。霍亂。妙難過。半夏一錢。厚朴桂心各六分。白。四用人參甘草肉桂各五分。半夏二錢。半姜煎。服治七情鬱結。于中心腹絞痛。大便虛秘等症。

大七氣湯。棧莖。橘。藿。梗。桂。益智。仁。甘。青。香。附。前。白。水。一切氣積。自舒伸。三棧莖。木青皮。陳皮。半夏。桔。梗。半。香。附。一。分。半。姜。棗。煎。服。治。七。情。相。于。陰。陽。不。得。并。降。氣。道。壅。帶。攻。衝。作。疼。一。方。無。三。棧。有。半。夏。越。

大異香散。京三稜。莪。木。半。夏。與。陳。青。藿。梗。智。仁。香。附。子。甘。草。枳。壳。有。高。能。三。稜。莪。木。青。皮。陳。皮。半。夏。越。藿。香。梗。桔。益。智。仁。香。附。枳。壳。各。五。分。甘。草。半。分。姜。棗。煎。服。治。氣。脹。

紺珠正氣天香湯。天台烏藥。血。乾。姜。香。附。陳。皮。紫。蘇。葉。婦。人。得。此。是。奇。方。烏。藥。一。錢。半。香。附。六。錢。陳。皮。紫。蘇。葉。各。六。分。水。煎。熱。服。治。婦。人。一。切。諸。氣。作。痛。或。上。塞。心。胸。或。攻。梁。脅。肋。腹。中。結。塊。發。渴。刺。痛。月。水。因。之。不。調。或。眩。暈。嘔。吐。往。來。寒。熱。胎。前。產。後。一。切。氣。症。

分心氣飲。木通。桂。赤。芍。茯苓。半。夏。配。桑。白。大。腹。青。陳。皮。甘。草。羌。活。紫。蘇。對。木。通。官。桂。赤。芍。赤。茯苓。半。夏。甘。皮。各。五。分。紫。蘇。二。分。姜。棗。燈。心。煎。服。治。男。婦。一。切。七。情。留。滯。心。胸。痞。悶。脇。肋。虛。脹。噎。塞。吞。酸。嘔。噦。惡。心。頭。目。昏。四。肢。倦。面。色。黃。口。舌。乾。飲。食。減。少。日。漸。羸。瘦。或。大。腸。虛。泄。或。病。後。胸。中。虛。痞。不。思。飲。食。皆。功。

流氣飲。子。蘇。烏。藥。青。皮。大。腹。苓。歸。芍。芍。枳。半。防。風。甘。木。香。桔。梗。隨。人。酌。紫。蘇。烏。藥。青。皮。桔。梗。各。五。分。陳。皮。半。夏。防。風。甘。草。各。七。分。半。大。腹。子。一。錢。木。香。二。分。半。一。方。有。枳。壳。檳。榔。各。五。分。姜。棗。煎。服。治。氣。攻。背。脇。肋。走。注。疼。痛。及。痞。脹。嘔。喘。氣。閉。浮。腫。胸。氣。

木香流氣。飲。霍。香。伏。參。朮。甘。菓。檳。瓜。通。夏。朴。青。丁。陳。大。腹。蘇。蒲。桂。並。香。麥。木。香。霍。香。草。菓。檳。榔。丁。香。大。甘。草。厚。朴。青。皮。陳。皮。香。附。各。一。錢。半。赤。茯苓。人。參。白。朮。木。瓜。葛。蒲。白。芷。麥。門。冬。各。四。分。木。通。八。分。半。夏。二。分。姜。棗。煎。服。治。諸。氣。痞。塞。胸。膈。膨。脹。面。目。虛。浮。四。肢。腫。滿。口。苦。咽。乾。大。小。便。秘。

木香勻氣。散。藿。下。檀。白。豆。砂。仁。甘。草。鹽。煎。服。湯。湯。為。末。用。氣。痞。惡。心。積。痛。關。木。香。丁。香。檀。香。白。豆。砂。仁。各。一。錢。四。錢。一。方。有。沉。香。為。末。每。二。錢。入。鹽。少。許。沸。湯。點。服。治。氣。滯。胸。膈。虛。痞。惡。心。宿。冷。不。消。心。腹。刺。痛。又。名。木。香。調。氣。散。

木香順氣。散。青。陳。智。澤。歸。吳。姜。半。苓。并。柴。草。寇。蒼。朴。類。能。消。腹。脹。濁。氣。生。木。香。草。豆。蔻。蒼。朮。各。三。分。厚。朴。瀉。生。姜。半。夏。吳。萸。當。歸。各。五。分。升。麻。柴。胡。各。一。分。水。煎。溫。服。治。濁。氣。在。上。則。生。腹。脹。

蘇子降氣。湯。半。夏。甘。草。前。胡。肉。桂。咀。當。歸。厚。朴。陳。皮。等。姜。棗。同。煎。痰。喘。舒。蘇。子。半。夏。越。各。五。分。甘。草。前。胡。如。虛。喘。加。人。參。五。味。杏。仁。鹽。梅。紅。棗。虛。煩。加。知。母。人。參。煎。服。

秘傳降氣。湯。訶。子。甘。草。柴。胡。骨。碎。補。桑。陳。地。骨。五。加。皮。枳。梗。半。夏。越。蘇。使。訶。子。草。菓。骨。碎。補。五。加。皮。桔。梗。皮。枳。壳。陳。皮。各。四。分。桑。白。皮。八。分。紫。蘇。一。分。姜。煎。溫。服。治。氣。不。升。降。上。感。頭。目。昏。眩。痰。嘔。逆。胸。膈。舌。瘡。咽。痛。耳。聾。下。虛。腰。脚。無。力。小。便。數。大。便。秘。如。心。肺。虛。滿。加。人。參。茯。苓。熱。感。加。黃。芩。虛。感。加。附。子。婦。人。血。虛。加。當。歸。

三和散。用。沉。木。香。芍。木。紫。蘇。大。腹。羌。檳。橘。木。瓜。甘。草。輩。水。煎。和。氣。自。通。腸。沉。香。紫。蘇。大。腹。皮。羌。活。各。四。分。分。川。芎。一。分。木。瓜。二。分。水。煎。溫。服。治。七。情。氣。結。五。臟。脾。胃。不。和。心。腹。脹。急。大。小。便。秘。寢。食。俱。廢。不。渴。者。乃。氣。秘。耳。未。可。施。以。硝。黃。秘。甚。再。加。枳。壳。蘆。薈。于。皂。角。于。氣。滯。腰。疼。倍。木。瓜。浮。腫。加。車。前。于。草。薈。于。小。便。閉。加。麥。門。冬。澤。瀉。

復元通氣。散。陳。白。丑。甘。苘。穿。甲。木。香。有。索。歸。乳。沒。俱。為。末。鬱。痰。癱。瘓。并。跌。墜。陳。皮。白。丑。甘。草。玄。胡。索。各。一。錢。苘。香。穿。山。甲。木。香。當。歸。各。一。錢。二。上海。歸。葉。山。房。校。印。

方詩

一錢半乳香沒藥各五分為末每二錢熱酒白湯任下治一切氣不宣通瘀血凝滯周身走痛并跌墜損傷或負重到悶氣滯血分作痛等症一方去白丑玄胡當歸加青皮白芷貝母漏蘆治發乳癰疽及一切腫毒磨癩

犀角地黃湯牡丹芍藥四件有機關加上大黃黃芩藥能消瘀熱發狂蠻見四卷二十九頁

清胃散升麻二錢六分歸地與黃連牡丹皮用一錢重能止吐血及牙宣升麻一錢牡丹皮一錢當歸生地黃連各六分水煎冷服治胃

經音梁積熱吐衄牙宣或唇口腫痛或上下牙齦潰爛喉痛連及面皮惡寒發熱

枇杷葉散香如君麥門陳皮厚朴分丁瓜甘與茅根和暑毒攻心吐血欣枇杷葉陳皮厚朴丁香各五分香如七分麥門冬木瓜茅根

各一錢炙甘草二分姜煎溫服或為末水調服

小劑飲子生地黃蒲滑通草藕節房甘歸竹葉山梔子每服空心白朮涼小劑生地黃蒲滑石通草藕節甘草當歸淡竹葉山梔各五分

水煎溫服治下焦結熱尿血成淋

大劑飲子桑白皮犀角升麻甘草宜蒲黃杏仁桔梗炒肺疽熱血用之宜各等分甘草減半姜煎溫服治

歸脾湯歸龍眼肉酸棗遠志參朮朮神木香甘草姜夏過度真宜服當歸龍眼肉酸棗仁遠志人參

分甘草三分姜棗煎服治憂思傷脾內熱食少體倦或血妄行發熱嘔吐或健忘怔忡驚悸少寐

或心脾作痛自汗盜汗或肢體腫痛大便不調或經候不調補熱內熱或唇口生瘡流注等症

二陳芍歸湯人參阿膠五味細辛芍姜煎專治虛勞人毛寒失血咳嗽咯人參當歸川芍茯苓白朮芍藥

胃風湯參血芍歸苓朮芍桂等相將粟米百粒止便血腹痛還宜刺木香人參當歸川芍茯苓白朮芍藥

服治風冷乘虛客于腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴疼痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血

當歸和血散槐花青皮荆芥穗并麻川芍白朮并熟地腸澀濕毒用之佳當歸并麻各二錢槐花青皮荆

為末每二錢米飲下治腸澀濕毒下血

涼血地黃湯歸槐青柏知等分血即靈去槐青加荆細蔓羌黃為薑苓連并柴胡紅花依次入空煎煎膏

治血崩熟地當歸槐花青皮黃柏知母各等分如小便澀大便後重加木香檳榔水煎溫服治血崩最

羌活防風柴胡各三錢川芍藥本黃連并麻各二分紅花少許水煎溫服治血崩因腎水

真陰不能鎮守包絡相火故血走而崩經脈不佳或如豆汁五色相雜面黃體痛寒熱

五飲湯即六君子加枳朴猪澤前胡桂心芍藥旋覆等姜煎痰飲盡消除人參白朮茯苓甘草枳實厚朴

芍藥旋覆花各等分姜煎溫服忌食肉生冷等物治酒

後傷寒飲冷過多故成五飲如因酒有飲加葛花砂仁

小調中湯製法奇連草瓜半交相持大調中湯用四味少加參朮茯苓歸黃連煎水浸甘草甘草煎水浸

煎水浸瓜萋仁各炒水乾為度四味各等分姜煎溫服或姜

汁糊為丸服尤妙治一切痰火及百般怪病善調脾胃神效

○大調中湯即本方加人參白朮茯苓川

痰火者用百般加減由人

定喘湯麻桑杏蘇子白菓欬冬花最良甘草黃芩同半夏水煎百沸不瀆姜見七卷六十五頁

安脾散菓木丁香百年壁土煮良姜椒參朮橘苓甘草入鹽煎服米煎湯高良姜一錢用陳壁土和水煮

白朮橘皮茯苓各五分甘草一錢半為末每二錢米飲

入鹽少許調服治停飲傷胃嘔食噯酸嘔吐黃水不已

丁香散散益智椒紅豆青陳甘草梢乾姜良姜川烏炮姜鹽煎治胃家翻丁香紅豆蔻青皮陳皮甘草乾

分胡椒二分姜煎服

丁香二陳湯 丁香四分姜煎入姜汁三五匙調服。○柿蒂二陳湯 即前方去薑丁加柿蒂人參各一錢竹茹一團。

丁香透膈湯 沉香一分甘草七分半草菓神麩半夏各一分半人參茯苓砂仁香附各五分。厚朴薑香各三分。白朮一錢。姜棗煎服。治脾胃不和。痰逆惡心。嘔吐飲食不進。十膈五噎。痞塞不通。

五膈寬中散 青陳皮。丁香厚朴。甘草。咀香。附砂仁。白豆蔻。木香。八味。總堪書。厚朴香附各一錢。半。甘草五分。分木香三分。白豆蔻二分。或加南星。半。夏。為末。每二錢。姜鹽湯點服。治四氣。七情傷脾。陰陽不和。胸膈痞滿。停痰氣逆。遂成五膈。一切冷氣。並皆治之。

五噎湯即六君子湯。去半夏。加枳殼。莪朮。使訶。桂木。檳榔。姜棗煎。虛實由人。加減。爾。見七卷二。

大續命湯 桂枝。麻黃。竹瀝。生地。汁。兩。防附子。石。黃。龍。齒。末。姜。煎。治。癰。身。反。張。肉。桂。附子。石。黃。防。已。各。二。分。水。煎。入。竹。瀝。七。匙。生。地。汁。五。匙。頓。服。治。癰。疔。反。張。口。噤。吐。沫。

妙香散 要麝香。真。山。藥。茯苓。并。茯。神。參。芪。遠。志。炙。甘。草。木。香。桔。梗。硃。砂。珍。麝。香。一。錢。山。藥。茯苓。茯。神。黃。芪。各。五。錢。木。香。二。錢。半。辰。砂。三。錢。為。末。每。二。錢。溫。酒。調。服。治。男。婦。心。氣。不。足。精。神。恍。惚。虛。煩。少。睡。多。盜。汗。常。服。補。益。氣。血。安。鎮。心。神。

拔萃桔梗湯 連翹。薄荷。黃。芩。梔。子。饒。甘。草。同。煎。加。竹。葉。喉。痺。腫。痛。十。分。標。扁。意。也。治。熱。腫。喉。痺。即。涼。

十全大補有人參。肉桂。川。芍。地。黃。蒸。芍。藥。伏。苓。并。白。朮。黃。芪。甘。草。當。歸。停。十。全。大。補。湯。人。參。白。朮。茯。苓。白。朮。各。二。分。半。姜。棗。煎。服。治。男。婦。諸。虛。勞。傷。生。氣。血。壯。脾。胃。

人參養榮助大補去芍加橘遠味熟。劫勞散亦大補湯。去芍桂加半味膠。人參養榮湯。白芍三兩。當歸人。一兩。熟地五錢。于茯苓各七錢。遠志五錢。每三錢。姜煎。空心。溫服。虛甚者。煉蜜為丸。可以常服。治。虛。成。損。四。肢。倦。怠。肌。肉。消。瘦。面。少。顏。色。淡。淡。短。氣。飲。食。無。味。如。遺。精。加。龍。骨。阿。膠。各。四。分。姜。棗。煎。服。治。虛。知。母。○。劫。勞。散。白。芍。一。錢。黃。芪。甘。草。人。參。伏。苓。各。三。錢。地。黃。歸。身。五。味。子。半。夏。阿。膠。各。四。分。姜。棗。煎。服。治。黃。柏。○。劫。勞。散。心。腎。俱。虛。勞。嗽。無。痰。反。熱。盜。汗。四。肢。倦。怠。體。瘦。食。少。恍。惚。異。夢。喉。中。有。血。石。曰。肺。痿。

黃芪建中湯 肉桂。甘草。芍。藥。補。榮。衛。姜。棗。飴。糖。煎。服。之。或。加。當。歸。同。此。類。黃。芪。肉。桂。各。七。分。甘。草。一。錢。半。少。許。再。煎。令。空。心。服。治。男。婦。諸。虛。不。足。小。腹。急。痛。胸。膈。脹。滿。驚。悸。面。黃。唇。乾。口。燥。腰。痛。骨。痠。行。步。喘。急。短。氣。少。食。或。因。勞。過。或。病。後。不。復。最。宜。服。之。如。虛。甚。加。附。子。血。虛。加。當。歸。

黃芪益損湯 斛桂。歸。木。半。甘。木。地。白。芍。五。味。熟。加。柴。諸。虛。勞。倦。此。方。議。官。桂。熟。地。半。夏。甘。草。木。香。各。三。分。姜。棗。煎。服。如。有。熱。加。柴。胡。

從蓉散 木。巴。朮。冬。茯苓。牛。味。杜。仲。供。車。前。乾。姜。生。地。輩。酒。調。陰。痿。最。多。功。肉。從。蓉。白。朮。巴。朮。冬。各。錢。車。前。子。乾。姜。各。五。錢。生。地。半。斤。為。末。每。二。錢。食。前。酒。調。日。三。服。治。腎。氣。虛。寒。陰。痿。腰。脊。痛。身。重。腰。弱。言。音。混。濁。陽。氣。絕。効。

固真散 參。朮。歸。山。藥。地。柏。澤。萊。黃。連。補。骨。脂。五。味。陳。皮。伏。苓。杜。仲。甘。草。酌。人。參。山。藥。當。歸。黃。芪。黃。柏。各。一。錢。山。藥。補。骨。脂。各。五。分。五。味。子。十。粒。陳。皮。伏。苓。各。八。分。杜。仲。甘。草。各。七。分。水。煎。溫。服。蓋。門。冬。地。黃。瀉。於。滋。陰。久。則。滯。胃。滯。經。致。主。癰。疽。又。或。多。服。金。石。桂。附。助。陽。久。則。積。溫。成。熱。耗。損。真。陰。火。妄。動。消。渴。肺。痿。症。作。惟。此。方。備。五。味。中。年。已。上。之。人。可。以。常。服。能。治。陰。陽。兩。虛。氣。血。不。足。飲。食。少。五。心。熱。目。昏。睛。潮。熱。精。氣。滑。脫。行。步。無。力。腰。跨。痠。疼。世。瀉。脈。沉。弱。少。痰。多。或。乾。咳。或。氣。血。精。神。不。足。體。倦。頭。目。昏。食。少。脈。虛。數。潮。熱。將。成。勞。症。者。或。傷。力。氣。虛。脈。弱。腰。背。疼。痛。動。輒。鼻。衄。者。或。便。血。過。多。面。黃。瘦。瘠。食。少。氣。促。者。或。婦。人。陰。虛。瘦。瘠。食。少。虛。熱。自。汗。腹。痛。面。浮。腰。痛。赤。白。帶。下。者。並。宜。服。之。此。方。備。五。味。合。氣。中。和。養。氣。血。理。脾。胃。充。膝。理。補。五。臟。無。寒。熱。偏。併。過。不。及。之。失。也。

正氣補虛湯 參。朮。桂。地。芍。伏。等。分。各。桂。歸。止。味。木。丁。姜。附。木。夏。草。減。半。芍。人。參。當。歸。香。葉。厚。朴。黃。芪。白。朮。當。歸。熟。地。川。芍。茯。神。各。五。分。

分胡椒二分姜煎服

正氣補虛湯 參。朮。桂。地。芍。伏。等。分。各。桂。歸。止。味。木。丁。姜。附。木。夏。草。減。半。芍。人。參。當。歸。香。葉。厚。朴。黃。芪。白。朮。當。歸。熟。地。川。芍。茯。神。各。五。分。

上海掃葉山房校印

肉桂五味子白朮半夏附子丁香木香乾姜甘草各二分半。姜棗空心煎服。治內傷飲食七情兼外邪所襲寒熱頭痛身疼脚軟弱轉筋自汗肢冷麻痺男婦諸虛通用。婦人產後感寒尤宜。

秦光扶羸湯。黃甲柴胡人參當歸切。地骨皮半紫苑。甘能治肺膽二經熱。秦光黃甲人參當歸半夏紫苑七分半。烏梅姜棗煎服。治胆肺二經虛熱及肺痿骨蒸已成勞嗽或寒或熱聲啞不出。體虛自汗四肢怠惰如熱癆症加大黃。黃甲犀角赤芍青蒿桂枝煎服。勞瘵亦効。

黃芪驚甲湯。桑地皮桂苑參苓柴半知。天冬地黃赤芍藥。秦光甘桔也相宜。桑白皮半夏甘草各二分半。水煎服。治虛勞客熱肌肉消瘦四肢煩熱心悸盜汗少食多咳嗽有血往來寒熱勞瘵等症。

保和湯。知貝天麥門。欬冬意香瓜萸根兜苑合桔甘五味。歸地蘇薄姜飴。見七卷三十一頁。

保真湯。歸芍木茂參蓮肉天冬赤白苓陳芍。知柏柴甘味地骨地黃熟又生。見七卷三十一頁。

清骨散。柴生地黃熟地人參薄荷防。秦光赤茯苓連少。每服半兩水煎。嘗。柴胡生地各二錢。熟地人參防風各一錢。薄荷七分。秦光赤茯苓。

當歸六黃湯。參連生熟地黃柏綿芪降火補陰止盜汗。水煎一服上床時。當歸補陰各五分。黃芪止汗三錢。臨臥水煎服。

清燥湯。蒼蒼白朮參冬連柏地黃歸。猪澤門冬五味子。甘麴并柴痿痢醫。黃芪白朮各一錢。半蒼木一錢。澤瀉五分。五味子九粒。水煎服。治痿厥癱瘓下痢等症。

霍仁養胃湯。烏朮參草神冬半夏麴砂仁。薏苡單渣加。能治陽明虛痿弱。霍香烏朮白朮人參茯苓各一錢。半。單渣加甘草各一錢。姜棗煎服。治胃虛不食四肢痿弱行立不能。皆由陽明胃虛。示筋無所養。遂成痿躄。

四順清涼。歸芍黃甘草等分水煎。嘗加以柴苓生薑使。更能解熱入於陽。當歸芍藥大黃甘草各等分。不通或一身盡熱或日脯肌熱或夜發熱皆血熱也。

涼膈散。連翹山梔仁大黃甘草朴硝。竹葉薄荷加蜜。諸般積熱効如神。連翹一錢。山梔大黃黃芩竹葉薄荷各五分。朴硝二分。甘草一錢。水煎入蜜少許。調服。東垣去硝黃加桔梗。治諸般積熱。口舌生瘡。痰實不利。煩渴。腸胃秘澀。便溺不利。一切風熱。人參瀉肺湯。桔梗桑白皮杏仁各等分。水煎服。治活命丹。即涼膈散加藍根青黛蜜丸。彈子大。珠砂為衣。轉舌膏。即涼膈散加葛蒲。連子高熱。喉便秘。砂為衣。每服一丸。薄荷煎湯。化下。治中風。痰涎舌塞不語。

八正散。車前子瞿麥扁蓄滑石山梔仁大黃木通入甘草。熟林熱。効如神。各等分。燈心煎服。治一切下熱症。諸淋諸氣諸血。導赤散。生地木通甘草等分。竹葉同。去草加苓名火腑。熱林赤澁。總收功。各等分水煎。溫服。治小腸實熱。小便赤澁而渴。煩滿而口舌生瘡。丹見六卷。

半夏湯。中姜最多。地遠志酸棗和。茯苓米長流水。胆熱不眠。用莫訛。半夏乾姜各三錢。黃芩一錢。生二錢。黍米一合。每一兩用長流水煎。澄清。溫服。一方無地黃。遠志。有麥門冬。三錢。甘草二錢。人參一錢。治胆腑實熱。精神不守。熱泄。煩渴。不得眠。

瀉黃散。霍山梔仁石羔甘草防風。停為末。酒蜜相拌炒。能醫口內瘡。瘰癧。生。霍香七錢。山梔一兩。石羔五錢。酒拌炒。香焙乾。每三錢水煎。溫服。治脾胃壅熱。口內生瘡。煩悶。多渴。頰痛。心煩。唇燥。口臭。咽乾。壅滯。不食。一方有砂仁。

瀉白散。君桑白皮地骨相。等甘草微。一方加青茯苓。人參。加味瀉白散。尤奇。瀉白散。桑白皮地骨皮各二錢。熟氣。麓鼻塞。或加知母。貝母。桔梗。山梔仁。麥門冬。生地之類。由人。加味。瀉白散。桑白皮一錢。半。地骨皮。茯苓各一錢。二分。人參八分。青皮甘草各三分。五味子。陳皮各五分。梗米一撮。水煎。溫服。治陰氣在。

上海掃葉山房校印

下陽氣在上致
咳嗽嘔吐喘促

加味石羔湯。梔子。參。苓。知母。生地。使。竹葉。水煎。入蜜。硝。膀胱實熱服之。愈。石羔八錢。山梔。人參。茯苓。知母。各三錢。生地。黃。淡。竹。葉。各一兩。

每兩水煎去渣。下蜜半合。煮二沸。食前服。欲利加芒硝三錢。治膀胱實熱。轉不得小便。苦煩滿。難於悅仰。

消遙散。三白柴歸等。甘草減半。薄荷煎。婦人調經專用。此加味男膠。總是山。白朮。白芍。白茯苓。各等分。甘草減半。薄荷煎。少許。

煨姜煎服。治婦人月經不調。及血虛有熱。無汗者。最宜。或加味消遙散。門冬。生地。各六分。甘草。桔梗。各二分。地骨皮。當歸。各八分。山梔。仁。黃。柏。各三分。水煎。溫服。治潮汗。咳嗽。虛甚者。加山藥。破。故。紙。枸。杞。子。餘。與。癆。瘵。加。減。同。

大溫經湯。炒阿膠。芍藥。歸參。桂枝。枳。芍。半。牡。吳。萸。草。生。姜。五。片。水。中。炒。阿。膠。芍。藥。川。芎。當。歸。人。參。肉。桂。二分。半。麥。門。冬。五。分。姜。煎。溫。服。治。衝。任。虛。損。月。事。不。調。或崩中。去。血。過。多。或。經。損。孕。瘵。血。停。留。小。腹。急。痛。五。心。煩。熱。

小溫經湯。歸芍。芍。官。桂。牡。丹。莪。木。等。人。參。甘。草。牛。膝。煎。寒。客。血。室。痛。者。省。當。歸。芍。藥。川。芎。官。桂。牡。丹。皮。莪。木。各。五。分。人。參。甘。草。牛。膝。各。一錢。水煎。溫服。治。血。海。虛。寒。或。為。風。邪。所。襲。月。水。不。利。

滋血湯。中用馬鞭。牡。丹。荆。芥。穗。相。連。桂。芍。歸。并。枳。殼。烏。梅。一。箇。也。同。煎。馬。鞭。草。荆。芥。各。八。分。牡。丹。皮。二。分。肉。桂。赤。芍。川。芎。當。歸。枳。殼。各。四。分。烏。梅。一。箇。水。煎。溫。服。以。經。調。為。度。治。血。熱。氣。虛。經。候。不。調。血。聚。四。肢。或。為。浮。腫。肌。體。發。熱。疑。為。癆。瘵。宜。此。藥。滋。養。通。利。之。

紅花當歸散。寄奴。牛。膝。紫。葳。白。芷。蘇。肉。桂。去。皮。甘。草。芍。月。經。若。秘。可。通。衝。紅。花。白。芷。肉。桂。各。一。分。半。當。歸。寄。奴。五。分。赤。芍。九。分。為。末。每。二。錢。熱。酒。下。經。閉。紅。花。煎。湯。下。治。血。虛。弱。經。候。不。調。或。斷。續。不。來。或。積。癥。塊。腰。腹。痛。肢。體。瘦。弱。

紫葳散。肉桂。當歸。赤芍。白芷。牡丹皮。玄胡。寄奴。各。等。分。紅。花。少。入。酒。煎。宜。壯。丹。皮。當。歸。劉。寄。奴。各。等。分。酒。一。水。二。八。紅。花。少。許。煎。服。治。婦。人。月。水。不。行。發。熱。腹。脹。

玄胡索散。蓬。朮。當。歸。酒。浸。共。三。棧。月。水。不。調。紅。花。使。更。兼。童。便。酒。煎。行。玄。胡。索。莪。朮。當。歸。三。棧。各。等。分。血。發。甚。月。水。不。調。童。便。紅。花。煎。酒。調。服。治。婦。人。氣。血。走。作。疼。痛。不。可。忍。及。月。水。不。調。面。色。痿。黃。飲。食。減。少。產。後。諸。疾。

大玄胡索散。歸。木。香。枝。葉。芍。練。林。檳。榔。桂。芍。芍。梗。大。黃。藥。紅。花。甘。草。性。多。涼。玄。胡。索。莪。朮。當。歸。三。棧。赤。芍。川。芎。各。一。分。半。桔。梗。黃。芩。大。黃。各。五。分。甘。草。一。錢。檳。榔。二。分。水。煎。日。三。次。熱。服。如。惡。物。多。去。大。黃。官。桂。加。黃。藥。子。槐。子。龍。骨。各。五。分。治。婦。人。經。病。并。產。後。腹。痛。或。腹。滿。喘。悶。或。癥。瘕。癖。塊。及。一。切。心。腹。暴。痛。平。常。人。心。胃。急。痛。者。尤。宜。服。之。

桂枝桃仁湯。生。地。黃。芍。藥。甘。草。半。中。良。經。脈。不。通。繞。臍。痛。煎。加。姜。棗。莫。商。量。桂。枝。桃。仁。生。地。芍。藥。各。一。錢。血。室。月。水。不。通。繞。臍。寒。痼。痲。痛。痛。或。月。候。前。先。腹。痛。不。可。忍。

桑寄生散。川。續。斷。川。芎。當。歸。白。朮。伴。香。附。阿。膠。神。草。參。姜。煎。溫。服。治。經。漏。附。阿。膠。神。草。各。五。分。甘。草。人。參。各。二。分。半。姜。煎。服。治。胎。漏。及。經。血。妄。行。淋。瀝。不。已。

伏龍肝散。艾。石。冬。姜。桂。當。歸。草。地。芍。單。用。龍。肝。芍。地。草。白。朮。阿。膠。治。便。紅。伏。龍。肝。六。分。艾。葉。川。芎。各。一。錢。姜。當。歸。各。三。分。肉。桂。甘。草。熟。地。各。二。分。棗。煎。溫。服。或。為。末。未。飲。調。服。治。血。氣。勞。傷。衝。任。虛。經。血。非。時。注。下。或。如。豆。汁。或。成。血。片。或。五。色。相。雜。及。血。崩。赤。白。帶。下。臍。腹。冷。痛。經。久。不。止。一。方。單。用。伏。龍。肝。八。分。黃。芩。生。地。甘。草。阿。膠。白。朮。各。三。分。水。煎。溫。服。治。先。便。後。紅。及。吐。衄。血。等。症。

解毒湯。合。四。物。湯。入。藥。等。分。共。煎。湯。經。行。不。止。崩。不。住。寒。熱。腹。痛。盡。堪。嘗。解。毒。四。物。湯。黃。連。黃。柏。黃。芩。山。水。煎。溫。服。治。婦。人。經。脈。不。住。或。如。豆。汁。五。色。相。雜。面。色。痿。黃。臍。腹。刺。痛。寒。熱。往。來。崩。漏。不。止。等。症。

四物承氣加朴硝。此名王燭散名標。涼膈漆歸同四物。名為三和散同條。

牛膝散中用羚羊。檳榔硝黃各一兩。防已牡丹桂芍。通經兼治脚氣腫。一錢防已牡丹皮肉桂甘草赤

芍各五分。水煎溫服。治婦人月經不通。或脚氣腫痛。

大腹皮飲防木瓜。桑朴枳大黃加。青陳五味子等分。水煎入酒一分。花。大腹皮防已木通瓜蒌仁桑白

味于厚朴各等分。水煎入酒少。許調服。治婦人血瘦單腹脹。

茯苓補心湯。治血虛。兩分四物。一參蘇。感傷無汗。與經閉。失血惡阻。任意嘔。即四物湯兩分。參蘇飲一分。

紫蘇飲極能安胎。芍藥川芎大腹皮。當歸酒浸陳參草。姜葱煎服。保仙懷。蘇葉芍藥川芎大腹皮當歸陳

安胎。飲八物去茯苓。加上陳皮與黃芩。蘇葉縮砂姜煎服。胎痛腰腹動可尋。當歸芍藥生地白朮各一錢。

固胎飲。即八物湯。去茯苓。加桑樹羊。冷柏連參煎糯米。血虛阿膠旋化。洋。生地川芎各五分。歸身白芍陳

達生散。用蘇葉葉大腹甘草芍切。歸芍參陳黃楊腦。煎宜服在九月。大腹皮甘草各二錢。黃芩白朮

蘇各五分。黃楊腦一箇。葱五莖。水煎溫服。懷孕八九箇月。及稍虛者。宜用。春加川芎夏加黃芩秋加澤

瀉冬加砂仁。或俱加。枳殼。如氣虛加參。元氣實倍香附。陳皮。血虛倍當歸。加生地。性急多怒。加柴胡。食

易。難。多。加。黃。楊。腦。腹。痛。加。木。香。胎。動。如。字。根。

催生五積加烏附。星香膠古酒調助。冬月破水後最宜。生胎死胎俱可墜。催生五積散。蒼朮一錢。桔梗五

芍各一分。半當歸。乾姜。厚朴。白芍。茯苓。半夏。枳殼。川烏。附子。南星。各二分。木香。半分。阿膠。杏仁。各一分。

牛膝湯。治胎中死。瞿麥滑石冬葵子。赤小豆當歸木通。水煎。一服。見懼喜。半膝瞿麥赤小豆當歸木通各

八味黑神散。蒲黃熟地赤芍藥乾姜桂心甘草并黑豆。酒便調。嘗惡露。黑豆四兩。餘味各二兩。為末。每

三分散用。小柴胡。四物。四君子。同咀。產後傷寒并痢者。依方取効。似神扶。

千金龍胆湯。鈎藤柴苓梗芍草茯苓。大黃一分。蛭一箇。薑湯調下。鎮風驚。龍胆草鈎藤柴胡黃芩桔梗赤

蛭。一。枚。為。末。每。一。錢。或。五。分。棗。子。煎。湯。調。服。治。小。兒。初。生。臍。風。撮。口。月。內。

蝎稍餅。蜈蚣乳蛇。南星姜蠶等。硃砂。麝香。減半。磨化。服。驚風。關閉。兼擦牙。蜈蚣一條。蝎稍乳香白蛇。硃

脫甲散。用麻黃根。柴歸知母。龍胆草。參芍。甘茯苓。次第。入。感寒發熱。頭痛。腦。麻。黃。柴。胡。當。歸。知。母。龍。胆。草。各

分。半。甘。草。四。分。姜。葱。煎。服。治。小。兒。發。熱。頭。疼。

日久不痊。如表不解。加麻黃。裏不解。加大黃。

方詩

上海歸葉山房校印

上海歸葉山房校印

上海歸葉山房校印

紅綿散天麻黃芩荆芥甘草發散多入裏瀉加大黃類驚搐加蟬紫薄荷天麻麻黃全蝎荆芥甘草一方無荆芥有大黃白附子蘇木各

等分水煎溫服量兒大小加減紅綿散即本方去甘草加蟬退紫草薄荷各等分

人參羌活散枳梗芍藥各柴胡獨草充地骨天麻偏減半感冒疹痘盡可攻羌活獨活柴胡前胡枳殼桔

分地骨皮天麻各二分半薄荷一葉姜棗煎服治小兒感冒四肢

惺惺散即四君子薄荷芍藥細瓜蒸熱風寒并痘疹水煎一服小兒誇人參白朮茯苓甘草白芍桔梗

薄荷半分生姜煎溫服治變蒸發熱或傷風寒時氣頭疼咳嗽

加減惺惺散蒼朮荆防芍藥細辛羌甘草當歸天花粉赤芍薄荷桔梗良

痰涎鼻塞聲重氣喘清涕吐熱目溢多睡及欲作痘發熱頭疼

連翹飲即八正散去蓄大黃加芍歸荆防羌藥柴蟬退竹葉燈心表裏宜治小兒膈熱眼目腫赤唇口生

此常利小腸

觀音散即四君子加麩朮蓮豆正更加蝎麻與羌防慢驚與痰暈湯使見八卷

銀白散亦四君子加羌藿扁蠶糯米天升白附與山香小兒百病有湯使見八卷

益黃散陳皮用一兩青草丁訶各二錢每服水調補脾胃一切痞嘔盡皆痊陳皮一錢青皮甘草訶子各

小加減服之治脾胃虛寒嘔吐不止或泄瀉腹痛或客熱在內不思乳食因之神懶心驚

異攻散即四君子去甘加橘理胃脾治痘更湊木歸桂朴丁香附攸宜一錢半姜棗煎服治脾胃虛冷

腹痛自利不食陳氏異攻散用參朮茯苓橘皮加官桂厚朴丁香肉豆蔻各二分半附子半夏各一

木香散大腹皮桂參訶扶前草青丁等分二錢姜煎服痘虛熱渴用之靈木香大腹皮桂參訶于

丁香各三分姜煎溫服治發痘疹身熱

透肌散紫升甘等糯米煎吞發痘瘡去升加木通枳壳方名四聖倒靨良見八卷

快斑蟬退紫草功白木人參與木香甘草等分水煎服痘出不快須與充見八卷

解毒防風湯地皮荆芥鼠粘芍枳朮等分水煎發痘瘡壯熱氣弱用之宜見八卷

消毒飲內君牛等荆芥甘草升麻黨熱加犀角與苗苓加減在賦曾脩纂牛蒡子一錢二分荆芥二分甘

溫服治毒飲變過壯熱心煩便秘痘疹

黃連消毒羌獨苳芍柏苗黨草參歸翹梗地知蘇橘澤胸背尻臂太陽宜內有防

難出未能勻透餘毒亦宜便利者忌之

內托羌活湯酒柏苳苗歸黨連翹橘甘蒼陳桂水酒煎太陽豚臂此方擇二方見八

白芷升麻湯葛根荆歸鼠肉桂君甘草黃柏煎入酒乳癰頭瘡効若神見八卷

十味中和湯葛蒲牛蒡羌芍防漏蘆荆麥前胡甘草等能消髮腸胆之辜見八卷

八味道遙散歸芍苓朮柴草桂拖略無虛火或少陽癰乳腸頸項盡堪嚼見八卷

醫學入門 卷八 方詩 上海掃葉山房校印

內托茂柴湯歸翹。土瓜根共羌桂饒。生地黃柏半酒水。腿內膝股太陰調。亦治陰厥。見八卷八頁。

附子六物湯防己。肉桂苓朮甘草耳。姜煎專治足太陰。流注臂腫無不已。見八卷八頁。

內托酒煎湯歸朮。柴翹肉桂大力兒。升並柏甘水和酒。腎經腿經濕寒移。見八卷九頁。

瀉心湯中用大黃。苓連枳翹瀉蘆良。澤蘭蘇木各等分。水煎瀉毒可通腸。見八卷九頁。

龍胆瀉肝湯澤瀉。車前木通生地亞。歸枳苓草白水熬。肝經濕熱多腿躄。見八卷九頁。

清肝湯即四物湯。加柴枳壯去地黃。血虛怒火最能消。百般加減賦多方。見八卷九頁。

內疎苗連涼膈意。加木香連橫芍歸。瘡腫發嘔大便燥。脈洪實者微利之。見八卷九頁。

活命 散 甘芍正風歸。天皂皂刺貝母隨。金銀花乳陳沒藥。大黃穿甲酒煎宜。甘草節赤芍白芷。天花粉。尾見。用刺。陳皮。各一錢。半。金銀花。三錢。沒藥。五分。大黃。五錢。穿山甲。三片。用酒。好酒。五。確。煎。封。確。口。勿。令。世。氣。煎。熱。隨。瘡。上。下。飲。之。服。後。再。飲。酒。二。三。盃。則。臥。而。睡。忌。酸。物。鐵。器。此。藥。不。動。臟。腑。不。傷。元。血。凡。一。切。癰。毒。瘡。瘍。未。成。者。內。消。已。成。者。即。潰。排。膿。止。痛。消。毒。之。聖。藥。惟。已。潰。者。忌。用。如。在。背。皂。刺。為。君。在。腹。白。芷。為。君。在。四。肢。金。銀。花。為。君。在。胸。加。瓜。蒞。仁。二。錢。疔。瘡。加。紫。河。車。單。根。三。錢。大。便。調。者。宜。去。大。黃。五。香。連。翹。湯。麝。香。乳。丁。沉。木。香。大。黃。通。草。寄。生。川。獨。活。甘。草。升。麻。扁。竹。涼。木。通。升。麻。丁。香。各。七。錢。沉。香。青。木。香。各。二。錢。半。生。甘。草。乳。香。麝。香。各。一。錢。半。每。四。錢。水。煎。熱。服。以。利。惡。毒。為。度。一。方。有。竹。瀝。芒。硝。隨。熱。輕。重。加。減。治。一。切。積。熱。結。核。癰。癤。疔。瘡。瘰。癧。

五香連翹湯麝香。乳丁沉木香大黃。通草寄生川獨活。甘草升麻扁竹涼。連翹。扁竹。根。大。黃。桑。寄生。獨。活。木。通。升。麻。丁。香。各。七。錢。沉。香。青。木。香。各。二。錢。半。生。甘。草。乳。香。麝。香。各。一。錢。半。每。四。錢。水。煎。熱。服。以。利。惡。毒。為。度。一。方。有。竹。瀝。芒。硝。隨。熱。輕。重。加。減。治。一。切。積。熱。結。核。癰。癤。疔。瘡。瘰。癧。

內托復煎散地皮。芍芍參苓桂黃芪。兩防兩木歸甘草。尤先煎餘次之。地。骨。皮。黃。芩。白。芍。人。參。茯。苓。芍。藥。黃。芪。防。風。白。芷。甘。草。白。朮。各。一。兩。防。風。二。兩。倉。朮。一。斤。先。以。水。五。碗。煎。著。朮。至。三。碗。去。渣。入。餘。藥。再。煎。至。四。盃。取。汁。終。日。飲。之。其。渣。亦。如。前。煎。汁。飲。之。治。陰。疽。癰。毒。結。於。中。常。服。托。裏。健。脾。大。藥。冬。月。內。托。宜。下。宜。散。夏。月。及。有。熱。者。宜。此。多。服。最。妙。

流氣參歸茂梗風。木香甘枳芍川芎。桂檳芷朴蘇烏藥。流注傷寒不見蹤。十六。味。流。氣。飲。人。參。當。歸。黃。芪。川。芎。肉。桂。檳。榔。白。芷。厚。朴。紫。蘇。烏。藥。各。等。分。一。方。無。檳。榔。肉。桂。有。皂。角。刺。水。煎。溫。服。治。無。名。惡。腫。癰。疽。等。疾。此。表。裏。氣。血。藥。也。非。麻。洪。緩。沉。遲。緊。細。者。不。宜。用。

升麻和氣 散 半歸蒼。伏梗陳甘枳。芍芍大黃并白芷。燈心十五治諸瘡。升。麻。蒼。朮。枳。殼。芍。藥。大。黃。白。芷。燈。心。各。一。錢。半。夏。五。片。燈。心。十。五。根。煎。服。治。四。肢。瘡。疥。癩。癬。不。常。增。寒。發。熱。陰。下。濕。痒。並。治。

內托十宣 散 參茂歸。朴梗桂芍防。芷草十味為末酒調之。癰疽加減如珍寶。人。參。黃。芪。當。歸。厚。朴。桂。梗。肉。分。或。加。忍。冬。藤。尤。妙。如。天。熱。去。桂。加。瓜。蒞。根。赤。芍。各。為。末。每。三。錢。至。五。六。錢。不。飲。酒。者。木。香。磨。湯。調。下。瘡。愈。服。之。尤。佳。治。一。切。癰。疽。瘡。癤。已。成。者。潰。未。成。者。散。敷。膿。自。出。無。用。手。攪。惡。肉。自。去。不。犯。針。刀。服。藥。後。疼。痛。頓。減。排。膿。生。肌。其。功。如。神。小。兒。痘。疹。亦。宜。用。此。托。裏。

普濟消毒 散 苓連犀參。陳甘梗玄藍。幾翹升柴馬姜蠶。同或加防薄為歸耳。大便硬者又加黃。前。湯。調。末。隨。人。使。二。錢。升。麻。姜。蚕。各。五。分。為。末。白。湯。調。時。時。服。之。留。一。半。蜜。丸。合。化。或。加。防。風。薄。荷。川。芎。當。歸。水。煎。服。或。大。便。硬。加。酒。大。黃。一。二。錢。以。利。為。度。治。天。行。大。頭。病。頭。目。腫。或。目。不。能。開。上。氣。喘。急。咽。喉。不。利。古。乾。口。燥。此。邪。熱。客。於。心。肺。上。攻。頭。目。互。相。傳。染。害。人。甚。速。

清震湯治雷頭風。升麻蒼朮一兩充。蓮葉一荷煎水服。腫痛寒熱立收功。每。服。五。錢。水。煎。食。後。徐。溫。服。發。熱。四。肢。拘。急。症。似。傷。寒。蓋。雷。屬。震。震。仰。孟。故。藥。內。加。青。荷。葉。謂。象。其。震。之。形。狀。也。宜。此。主。之。

升麻調經湯葛龍。苓連柏梗連翹空。我稜歸芍甘草輩。少陽加柴癩無蹤。內。有。生。芍。酒。各。一。錢。八。卷。十。頁。

桔梗湯中用防己。百合貝母瓜蒞子。甘節參歸杏芍仁。桑白苗茂姜佐使。桔。梗。防。己。貝。母。瓜。蒞。仁。人。參。當。歸。杏。芍。仁。桑。白。苗。茂。姜。佐。使。歸。意。沒。仁。桑。白。皮。各。四。分。百。合。膿。血。咽。乾。多。渴。如。大。便。秘。加。大。黃。小。便。赤。加。木。通。

知母茯苓湯黃芩五味款冬半木參梗麥柴薄芎膠草夜嗽歸地藥宜增知母茯苓黃芩各一錢五味子

分人參半夏各七分薄荷三分甘草白朮各六分川芎阿膠各四分

紫苑散中知貝母參梗茯苓阿膠許甘草五味生薑煎善治虛咳成肺痿見八卷

人參平肺散桑皮君知草地骨五味群青陳半伏門冬冬姜煎為丸要搗勻桑白皮一錢知母七分甘草

粒茯苓青皮人參天門冬各四分如熱加黃芩四分紫蘇半夏各五分姜煎溫服或為末姜汁糊丸彈

神効瓜薑用一箇當歸甘草五錢挫乳沒一錢酒水煎乳腸腸癰功莫過見八卷

大射干湯赤茯苓赤芍白朮及梔升水煎入蜜地黃汁胃癰甲錯自然清見八卷

大黃湯偏治腸癰硝牡瓜薑桃仁同虛去硝黃加醬意立止寒熱與消膿敗醬薏苡仁見

五痔散用猪鬃甲蛇退蝟皮蜂房挾每服二錢少入麝不拘內外冷熱如壯痔每二錢入麝少許并水調服治五痔不拘內外冷熱如壯痔

大防風湯熟地黃白朮參芍芪附羌牛膝杜仲歸甘芍痢後鶴膝空心嘗熟地白朮防風當歸白芍杜仲

牛膝羌活甘草人參各二分一方無羌活有茯苓姜煎服去風順氣活血壯筋治足三陰經虧損外

邪乘虛患鶴膝風或時骨節腫痛或腫而不痛不問已清未潰用三五劑後當用調補之藥或痢後脚

何首烏荆蔓荆芥蚶蚶甘草威防再湯酒每服抄二錢能治癩風頑癬疥見八卷

浮萍散治諸風痒荆芥川芎甘草麻黃赤豆當歸各等分葱根豆豉共煎湯

復元益血湯當歸柴將軍穿山紅黃排瓜薑桃仁煎酒水墜跌脇痛効難猜當歸一錢二分柴胡一錢穿

分酒大黃二錢桃仁十枚水酒各半煎服以利為

當歸鬚散有紅花桃仁甘草赤芍梔高藥香附蘇木桂水酒煎治折傷家見八卷

乳香定痛散歸木白芷沒藥羌活足甘參為末調酒便專醫墮墜并跌撲見八卷

如聖散中香白芷川芎防風細辛使雄雀蒼烏兩頭尖熱酒調之忌油膩白芷川芎細辛防風各五錢雄

兩頭尖四錢一方加當歸麻黃荆芥何首烏全蝎天麻藥本各五錢甘草二兩八錢川烏四兩石

解一兩為末每一錢臨臥茶清或熱酒少許調下忌一切動風油膩熱物治左癱右瘓半身不遂口眼

養血當歸地黃湯川芎芍藥藥本防白芷細辛煎水服破傷虛者急宜嘗見八卷

四君子湯參苓朮甘草姜棗煎要熱氣虛用此古今同合上四物八物足見八卷二

四物湯地芍歸血病還須血藥醫熱者赤芍當歸尾小芍生地始相宜見八卷二

二陳湯要橘半陳茯苓甘草姜煎溫血虛合上四物藥氣虛更宜合四君見八卷二

六鬱湯陳皮半夏芍茯苓蒼朮砂仁充山梔香附子甘草姜煎加減在中心見八卷二

右方詩三百首按經八十七首新增二百一十三首其間等分遵古未及校正用者因病加減不必拘

泥即如清脾飲治熱多寒少當以柴胡黃芩為君餘藥為佐豈可九味皆等分耶又如六味地黃丸補

上海葉山房校印

腎固以地黃為君若病水腫當以澤瀉為君病遺精當以山茱萸為君丸藥亦可煎湯湯散亦可作丸膏藥間有可服者丸散亦有可外敷貼者存乎人之善悟耳

方詩終

急救諸方 萬病解毒丹乃急救通用妙劑外傷內傷

救縊死 自旦至暮但心下微溫雖一日以上可活急起死人解繩寬解去切不可割斷極須按定其心却無正喉嚨攪倒臥令一人以手掌掩其口鼻兩人吹其兩耳一人急牽其髮不放手及屈伸其手足摩拊之少活即以粥飲與之此法救人無不活

救溺死 先以刀砍開口效筋一頓即活可出小便後解去其衣服以艾足臍中令兩人以筆管吹其耳灌之○又法用酒躡一箇以紙錢一把燒躡中急以蠟口覆死

救凍死 其症四肢強直口噤只有微氣者且慢向火急用布袋盛熱灰放在

救魔死 原有燈即得如無燈切不可用燈急用竹管吹其兩耳或通關散吹入鼻內或以盞湯灌之或用

救墜死 墜下血衝心欲絕者用豆豉濃煎湯服若便覺

救絞腸沙 即腹痛難忍回陰沙腹痛而手足冷看其身上紅點以油燈心點火燎之即愈陽沙腹痛而手

下其惡血令聚 指頭血出為好

解砒毒 其症煩燥如狂心腹攪痛頭眩欲吐不吐面口青黑四肢逆冷此毒於內飯中得之則易治飲酒

丹藥毒及

解川烏附子毒 心煩燥悶甚則頭昏眩然遍身皆黑勢危必死煎菜豆或黑豆冷飲或防風甘草煎湯冷

解巴豆毒 令人大瀉或吐瀉發熱急用黃連黃柏煎湯

解諸草毒 治誤食毒草并百物毒救入於必死板藍根四兩貫眾青黛生甘草各一兩為末蒸餅丸梧

解豆腐毒 過食令人生瘡喉氣遺精白濁用

解諸菌毒 掘新地取真黃土以冷水於內攪之令濁澄少頃取飲之可解亦治楓木菌食之令人笑不

解鼠莽毒 用大黑豆煮汁服之如欲試其驗先刺鼠莽

解鴉鳥毒 即孔雀毛并胆也用乾葛為末水調服

解六畜肉毒 用犀角磨濃汁一碗服之○食自死六

解河豚魚毒 一時困急殺人急用清油吐或服槐花末

解斑蝥毒 其症吐而不止或用菜豆或烏豆或糯米煎湯

解金蠶蠱毒 總覺中毒宜先吃白礬味甘而不澀次嚼黑豆不腥者

解中諸物毒 吐即動末吐再服或萬病解毒丹丸下之

解中毒 及蛇虫咬癩疽癰疔服此毒氣不聚用

誤吞銅鐵碗瓦 萬病解毒丸大黃大戟連翹寒水石各二兩白芷黃芩茯苓石羔滑石天花粉各

誤吞蜈蚣 其蜈蚣在血中吐出繼以雄黃為末水調服

誤吞鐵鉞 用蠶豆煮熟同韭菜喫

誤吞銅錢 其銅自化或用砂仁煎濃汁飲之其銅自下或用葶藶研爛服之

誤吞蜈蚣 其蜈蚣在血中吐出繼以雄黃為末水調服

誤吞水蛭 中乾泥一小塊小死魚三四箇將猪脂溶攪勻用巴豆十枚研爛入泥內為丸菜豆大用田

骨鯁入喉 用砂仁甘草等分為末以綿裹少許嚥之良久骨隨痰出甚者用南硼砂少許水洗漱口中含

未芒刺喉 即下以鷲善消穢芒也

虎咬 先喫清油一碗次用油洗傷處或白礬為末納

馬咬 人尿或馬屎燒灰為末皆可敷之

犬咬 調服利下惡物從小便而出○顛犬咬及常犬咬用虎脛骨或腦骨為末每二錢熱酒白湯任下

蛇咬 急飲好醋二碗令毒氣不隨血走或清油亦可○一方用貝母為末酒調令患人盡醉飲之頃久酒自

鼠咬 少許津液調敷

蜈蚣咬 用雞屎塗之良○一方用蜘蛛投冷水中免傷其命

蜘蛛咬 用醋磨炷鐵汁或桑白

壁虎咬 毒入必死用桑柴燒灰以水煎三四沸

蚯蚓咬 煎鹽湯洗浸腫處即消

八脚虫傷 其虫隱於壁間以尿射人遍體生瘡如湯

蝎子螫 痛不可忍用白礬半更各

黃蜂螫 用熱油洗之清油擦之亦

溪毒 兼辟射工夏月出行取知母為末自隨欲入水先取少許按上流亦取服之○一方用蒼耳子搗汁

避難止小兒哭法 用綿為一小球隨兒大小為之畧使滿口而不致閉其氣量用甘草煎湯或甜物皆可

劉跛暇日記方也丘瓊山云此法平世誠無所用不幸而遇禍亂全活嬰兒之命不可勝記蓋嬰兒

未解事者不可戒語啼聲不止又恐為盜賊所聞勢不得已棄之道旁哀哉此法雖小不可不知

避難大道丸 黑豆一升去皮貫仲甘草各一兩茯苓蒼朮砂仁各五錢剉碎用水五盞同煎煎火須文

為終日飽雖異草殊木素所不識亦無毒甘甜與進飯糧一同專備荒亂飢餓食草木以濟生一方只

散被歐癢痕 服之即愈 治跌打損傷 用熟麻油與酒同煎 魚肉菜果及熱水熱湯數日後身力壯健不復思飯食

傷重痛悶欲絕者 用牛一雙剖腹納其人于牛腹浸熱血中可甦如傷腹用血竭飲之出

治中創血出 亦治金瘡 用原蠶蛾一味炒為末 敷之立止血出如箭者亦効

鎗傷腹裂腸出者 用黃芪當歸川芎白芷續斷鹿茸苗苓細辛乾姜附子芍藥各二兩為

金刃中骨脈中不出者 用白磁半夏等分為末每方寸 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

救方終 下蠶室創口不合方 用所到勢火焮為末酒調服昔有沈生者押近女冠或欲白其師沈懼引刀自

兩足心凸 如腰上面生黑色豆瘡硬如釘于地不得腰骨生碎眼髓流出身發寒

腹脹忽瀉 腹脹經久忽瀉數聲晝夜不止服藥不驗乃為氣脫用益智仁煎濃湯服立愈

腹上麻痺 不仁多煮葱白食之自愈

四肢節脫 但有皮連不能舉動名曰筋解用黃芪三兩以酒浸一宿取出焙乾為末每二錢酒下服盡安

玉脛堅硬 不痿精流無狀時時如針狀捏之則脆乃為腎滿漏疾用韭子破故紙各一兩為末每三錢水煎日三服愈則住服

喉間生肉 層層相疊漸腫起不痛多日乃有礙于鼻氣自出遂退飲食用臭橘葉煎湯連服自愈

腹中如鐵 石膈中水出旋變作虫行之狀繞身匝呀痒痛難忍鋪毛撥掃不盡外用蒼木煎湯浴之內用蒼朮為末入麝香少許水調服之即愈

眼見虫飛 眼前常見諸般禽虫飛走以手捉之則無乃肝胆經為疾用酸棗仁羌活空明粉青箱子花各一兩為末每二錢水煎和渣飲一日三服

大腸虫出 不斷斷之復生行生不得用鷄虱末五錢水調服之自愈

眼睛垂出 至鼻如黑角色痛不可忍或時時大便血出至鼻如黑角色痛不可忍或時時大便血

腹中作聲 腹中有物作聲隨人語言用板藍汁一盞分五次服之又名應聲虫當服雷丸自愈

喜飲清油 五碗以來方始快意當得啣即安不爾則病此是髮入胃被氣血裹了遂化為虫用雄黃五錢為末水調服其虫自出如虫活者置熱油中迨巡間連油滾於長江中

臥床能食 啣於床上四股不能動只連得食好大言語與物謂之失說物望病治如說食猪肉時便云你啣猪肉一頓病者聞之即喜遂置肉令病人見臨要却不與啣此乃失他物望也當自睡中延

十指節斷 身壞惟有筋連無節肉間虫出如燈心長尺餘遍身綠毛名曰血餘用茯苓胡黃連煎湯飲之愈

十指節斷 身壞惟有筋連無節肉間虫出如燈心長尺餘遍身綠毛名曰血餘用茯苓胡黃連煎湯飲之愈

十指節斷 身壞惟有筋連無節肉間虫出如燈心長尺餘遍身綠毛名曰血餘用茯苓胡黃連煎湯飲之愈

十指節斷 身壞惟有筋連無節肉間虫出如燈心長尺餘遍身綠毛名曰血餘用茯苓胡黃連煎湯飲之愈

十指節斷 身壞惟有筋連無節肉間虫出如燈心長尺餘遍身綠毛名曰血餘用茯苓胡黃連煎湯飲之愈

十指節斷 身壞惟有筋連無節肉間虫出如燈心長尺餘遍身綠毛名曰血餘用茯苓胡黃連煎湯飲之愈

十指節斷 身壞惟有筋連無節肉間虫出如燈心長尺餘遍身綠毛名曰血餘用茯苓胡黃連煎湯飲之愈

十指節斷 身壞惟有筋連無節肉間虫出如燈心長尺餘遍身綠毛名曰血餘用茯苓胡黃連煎湯飲之愈

十指節斷 身壞惟有筋連無節肉間虫出如燈心長尺餘遍身綠毛名曰血餘用茯苓胡黃連煎湯飲之愈

十指節斷 身壞惟有筋連無節肉間虫出如燈心長尺餘遍身綠毛名曰血餘用茯苓胡黃連煎湯飲之愈

十指節斷 身壞惟有筋連無節肉間虫出如燈心長尺餘遍身綠毛名曰血餘用茯苓胡黃連煎湯飲之愈

遍身皮響 遍身皮底混混如波浪聲痒不可忍抓之血出亦不能解謂之氣奔

眼白渾黑 眼白腫人渾黑見物依舊毛髮直如鉄條雖能飲食不語

肉片能飛 因者艾艾說大痲便退落瘡肉鮮肉片子飛出形如粉蝶騰空去了痛

多虱號哭 臨臥混身虱出約至五盞隨至血內俱壞每宿漸多痒痛不可言狀雖喫水

眼赤鼻張 大喘渾身出汗毛髮直起乃熱毒氣結於下焦用白礬滑石

皮下虫走 有虫如蟹走于皮下作聲如小兒啼為筋肉之化用雷

甲生肉刺 手足甲忽然長刺生肉刺如錐

鼻中毛出 晝夜可長一二尺漸粗圓如繩痛不可忍雖忍痛摘一莖即後更生此因食猪羊血過

瘡似猫眼 面上及遍身生瘡似猫兒眼有光彩無膿血但痒痛不

腸破腸出 具穢急以香油搗腸用手送入煎入參拘

口鼻氣出 盤旋不散凝如黑蓋色過十日漸漸至肩胸與肉相連堅如金

肉出如錐 遍身忽熱肉出如錐既痒且痛不能飲食此名血壅若不

眉毛動搖 目不能視交睫喚之不應但能飲食有經

毛竅血出 脈次若血不出皮膨脹如鼓須臾眼鼻口被氣

氣喘不言 脈合此名脈溢飲生薑汁水各一二盞即安

口內肉球 口內生肉球其惡自己惡見有根線長五寸餘如釵肢吐球出以飲食了却

瘡內有石 渾身生瘡如燎泡如甘棠梨每箇破出水內有石一片如指甲大泡復生

頭面發熱 頭上面發熱有光色他人手近之如火

自覺自形 兩人並卧不別真假不語問亦無對此乃離

善飲致羸 男子自幼喜飲酒至長成日飲一二斗不醉片時無酒叫呼不絕全不進食日就羸弱令其父

穿斷舌心 自行被跌穿斷舌心血出不止用雞翎釀米醋制斷處其血

浮腫如蛇 身上及頭面肉上浮腫如蛇狀者用雨滴塔

烟薰欲死 乾烟薰人注注致死口中含蘿蔔一片烟氣不能毒人或晒乾為末備用亦可或新水插爛

心痰欲死 牙關緊急者用隔年老葱白三五根去皮鬚葉搗為膏將病人口於開用銀銅匙將葱汁下咽而甦

五尸惡病 飛尸者遊走皮膚穿入臟腑每發刺痛變作無常道尸者附骨入內攻鑿血脈每發不可得近

平中惡忤 中惡中忤鬼氣其症昏反或登廁或出郊野或遊空冷屋室或人所不到之地忽然眼見鬼物

方不歸或內急用生犀角判木五錢碎砂磨香各一分為末每二錢新漢水調灌體薄者桃枝葉煎湯下

怪疾

上海醫學

鬼擊徹痛 卒被鬼擊如中箭忍一點痛如注不可忍用桃皮一片將裏面濕處貼痛

鬼擊吐血 夢中被刺殺或杖打諸般不祥卒然吐血衄血下血甚者九氣皆有宜用汁

淘井殺人 夏月不可淘井多致殺人五七月尤甚古塚及深塚中亦然皆有伏氣令人胃悶奄奄欲死即

驚癡不語 用密陀僧一味為末茶調服一七許有因入

血自皮膚濺出 用煮酒瓶上紙碎揉如楊

咽塞呻吟不食 昔華陀見一人病咽塞食不下呻吟令取

恹疾 終

治法

水火分治 此于和以臟腑分濕火比之以肥人寒濕

肝膽由來從火治 三焦胞絡都無異 此火內陰外陽主乎動也凡動皆相火之為天非此火不能生物人非

非伏不能鳴龍非熱不能飛海非附地不能波鳴飛波皆動為火也人之火寄於肝腎肝屬木腎屬水

而以為元氣之賊者人生恒動於欲相火扇起煎煎真陰陰 脾胃常將濕處求肺與大腸同濕類腸胃屬

虛則病絕陰則死此戴人及東垣明言不獨張子和而然也 脾胃常將濕處求肺與大腸同濕類腸胃屬

何屬濕論以其清氣上則在天為雲在人為氣濁氣下降則在天為雨在人為濕腎與膀胱心小腸寒

也 惡寒表熱小勝濕惡熱表寒心腎熾 十二經最端的 四經屬火四經濕四經有熱有寒時攻裏詳表細

消息裏熱裏寒宜越竭表熱表寒宜汗釋濕同寒火同熱寒熱頸頭無兩說六分分來火熱寒熱中停

直浪舌熱寒格拒病機深元則害分承通制 氣之來也既以極而成炎則氣之乘也必以復而得平物極

畏亦不過防之而已一或有亢即起而尅勝之矣餘臟皆然以人事言之我與彼亢則緊寒數熱脈正邪

標本治之真妙訣 休治風休治燥治得火時風燥了當解火時莫攻裏當攻裏時莫解表表裏如或兩可

攻後先內外分多少 治濕無過以決川 火常有餘水常不足然火有餘者邪火也若真火護衛形骸灌脫

者真水也若邪水泛溢經絡為腫痛麻痺痰瘡毒宜止下分消猶如決川其間精

枯血竭潮熱痿弱乃真水不足心火獨炎宜滋陰補腎最忌滲利此治水之折衷也此固荃蹄最分曉感

謝軒岐萬世恩 爭奈醯雞笑天小

標本分治 標本之道要而博小而大不知標本是謂妄治

少陽從本為相火 太陰從中濕土坐厥陰從中火是家 陽明從中濕是我 太陽少陰標本從陰陽二氣相

包裹風從火斷汗之宜燥與濕兼下之可 萬病能將火濕分掣開軒岐無縫鎖

標本論 天陽無圓氣上外升生浮晝動輕燥六腑 地陰有方血下內降殺沉反靜重濕五臟

夫治病者當知標本以論之則外為標內為本陽為標陰為本故六腑屬陽為標五臟屬陰為本各臟

腑之經絡在外為標在內為本更人身之氣為標血為本以病論之先受病為本後傳流病為標凡治病

治法

上海歸業山房校印

者必先治其本後治其標。若先治其標後治其本，邪氣滋甚，其病益蓄。若先治其本後治其標，雖病有十數，症皆去矣。謂如先生輕病後滋生重病，亦先治輕病後治重病，如是則邪氣乃伏，蓋先治本故也。若有中滿無間標，本先治中滿，謂其急也。若中滿後有大小便不利，亦無間標。本先治大小便，次治中滿，謂其急也。又如先病發熱，加之吐利大作，粥藥難入，略緩治熱一節，且先定嘔吐，漸進飲食，方兼治瀉，待元氣稍復，乃攻熱耳。此所謂緩則治其本，急則治其標也。推其至理，先治其本也。除大小便不利及中滿吐瀉之外，其餘皆先其本，不可不慎也。假令肝受心火之邪，是從先來者為實邪，實則瀉其子也。然非直瀉其火，入肝經藥為之引，用瀉火為君，是治實邪之病也。假令肝受腎邪，是從後來者為虛邪，虛則補其母，入腎經藥為引，用補肝經藥為君，是也。又經云：「工為標，病為本，但標本已得，邪氣乃服。」治標不相應者，謂之標本不得，謂醫工無失色，服用之不惑，治之大則法。若反理到行，所為弗順，豈惟治人而神氣受害，病者當去故醫，逆理之人，宜就新醫，明悟之士，乃得至直精曉，以全己也。此二法乃治病之至理，誠醫之良規也。

求本論

將以施其療病之法，當以窮其受病之源，蓋疾疢不離陰陽二邪。風熱火病屬陽，濕燥寒病屬陰。苟不求其本而治之，則陰陽邪氣滋蔓而難制矣。久而傳變，不勝其眾。今夫厥陰為標，風木為本，風邪傷人，掉搖瘳癎，卒暴強直之病生焉。少陰為標，君火為本，熱邪傷人，瘡瘍暴下，水液渾混之病生焉。少陽為標，相火為本，火邪傷人，躁擾狂越，如喪神守之病生焉。善為治者，風淫所勝，平以辛涼，熱淫所勝，平以鹹寒，火淫所勝，平以

鹹冷，以其病本於陽，故必求其陽而療之。太陽為標，濕土為本，濕邪傷人，腹滿身腫，諸瘧強直之病生焉。陽明為標，燥金為本，燥邪傷人，積鬱發揭，諸濕枯涸之病生焉。太陰為標，寒水為本，寒邪傷人，吐瀉腥穢，諸寒收引之病生焉。善為治者，濕淫所勝，平以苦熱，燥淫所勝，平以苦溫，寒淫所勝，平以辛熱，以其病本於陰，故必求其陰而治之。如是而病之不愈者，未之有也。六氣為本，三陰三陽為標，蓋天之三氣，其氣自下而上，在人足三陰經受之，太陽寒水症，其脈浮而緊，緊者寒水本也。浮者太陰標也。發於三陽經，意以辛熱之藥攻本之緊，在是緊入府也。以熱藥攻之，浮由經入也。仍以熱藥攻其本，寒藥解其標，發於三陰經，意以辛熱之藥攻本之緊，在是緊入臟也。以熱藥攻之，浮由經入也。仍以熱藥攻其本，寒藥解其標。其本寒藥解其標，少陰君火症，其脈沉而大，大者君火本也。沉者少陰標也。發於三陽經，則以辛寒之藥攻本之大，佐以甘溫，輕劑解標之沉，發於三陰經，則以辛寒之藥攻本之大，佐以甘溫，重劑解標之沉。少陽相火症，其脈浮而數，太陰濕土症，其脈沉而緩，本末同故，從本也。厥陰風木症，其脈沉而弦，陽明燥金症，其脈浮而短，本末與中不抑論治法，各有其要，豈止于一端而已。其在表者，汗以發之，其在裏者，下之奪之，其在高者，因而越之，謂可吐也。慄悍者，按而收之，謂按摩也。臟寒虛奪者，治以炙炳，脈病掣痺者，治以針刺，血實蓄結腫熱者，治以砭石，氣滯痿厥寒熱者，治以導引，經絡不通，病生於不仁者，治以醪醴，血氣凝泣，病生於筋脈者，治以射藥。始焉求其受病之本，終焉蠲其為病之邪者，無出於此也。昔者黃帝坐於明堂，受業於岐伯，傳道於雷公，曰：陰陽者，天地之道也。綱紀萬物，變化投生，蓋有不測之神。軒旋宰制於其間，病既本於此，為工者奚可他求哉。又曰：有者求之，無者求之，此求病機之說，與夫必求其本之理一也。

弱病深兮固本乃是。痰火濕熱百病關鍵。少壯新病燥濕清熱。豁痰瀉火。老衰久病攻補兼施。氣虛則以滋補。血虛則以四物。湯補血而兼瀉火。諸痰清。熱燥。老人氣多血少。只宜調和。小兒純陽無陰。不可過治。西北風高土燥。常若渴秘。癰疽。宜清熱潤燥。以滋化源。不可東南地卑水濕。多患腫痛。瘧疾。腫活血則消痛。便利則減。治瘧利便在陰分者。忌截。治痢下。過用涼藥。東南地卑水濕。多患腫痛。瘧疾。腫活血則消痛。便利則減。治瘧利便在陰分者。忌截。治痢下。易降凡人陰常不足。陽常有餘。故病氣升者多。膏粱無厭。食毒多。傷食前能食者。胃熱。○東南之散濕溫寒為妙劑。呀病有微甚。治有逆從。微則逆治。以寒藥治熱。以熱藥治寒。此甚則從攻。以熱藥治熱。以寒藥治寒。治寒以寒。其和調也。寒因寒用兮。而熱則因熱。塞因塞用兮。而通則因通。○嘗考手足少陰太陽四經。標本寒熱不定。標寒本熱者。宜辛若大寒。入酒熱服。以瀉其熱。是亦寒因熱用也。本寒標熱者。宜辛熱。大溫而冷。飲以扶其真陽。是亦熱因寒用也。手足太陽主收。主藏。痞滿室塞。或苦寒以瀉其滿。或甘溫以助其氣。是亦寒因寒用。塞因塞用也。手足少陽風木。禁汗者。風自汗。禁下者。恐損陰。禁滲者。恐損陽。宜辛溫。上通天氣。順其春升之令。是亦通因通用也。凡標本相反。不順者。故立反治之法。惟手足陽明厥陰四經。不從標本。從乎中治。蓋厥陰主化之源。其支在卯。陽明喜清惡熱。足厥陰肝喜潤惡燥。手厥陰心包經。謂其分則氣異也。是以手陽明大腸喜熱惡清。足陽明胃喜清惡熱。足厥陰肝喜潤惡燥。手厥陰心包經。乃包絡十二經之總不係五行。乃坤元一正之土。雖主長生喜靜惡燥。稟乎少陽元氣。乃能生育。故曰三焦為元氣之父。胞絡乃陰血之母。是四經好惡不同。法不可泥。故從中治。中非中外。中下之中。乃隨時以取中。收驚者。神妙醫師之擊。竟。昔有婦宿樓上。被驚。自後聞响。皆倒于地。曰驚則傷膽。非心疾也。乃命常見之。必無驚者。神上越也。從。止傷者。痛信軍吏之炒葱。昔有貴客因傷。指甲索金。磨藥裹之。遂飲下擊。竟使之下視。所以收神也。尸厥形若死。而脈動如常者。百會一穴可灸。息積氣久逆。而飲食如故者。導引一法收功。不在胃。故不妨飲食。不宜溼。世無定。或因真水欠旺。宜三白湯。加故紙。五嘔逆。不納。全煎。不納。莫非邪火上衝。宜谷連二陳湯。噫。藥不執方。中病為妙。法無定解。隨時取中。自宜注意。

苗連苦參賦云。多服反熱。以苦入心。為熱。和火降。而真水盛。乾姜附子。誰知久飲。遭山。賦云。附子乾姜。而真陽衰矣。非補旺而致偏勝之。意必苦熱。而招見化之害。當本賦。旺時補益。旺氣大甚。則賦。氣偏而天凡。用藥不宜偏勝。而招見化之害。故曰。藥不具五味。不備四氣。雖獲勝益。久必暴大。直中誤。而誤中。直機關要識。真中有誤者。泥古方。執常法。總已動自以為真。而不知其誤也。誤中。統會有宗。雜病雖緒多。無條。惟憑經。昔人謂讀仲景書。須得仲景之本意。予亦謂遵丹溪法。須有丹溪之心胸。要之傷寒。孰者。則雜病。愈加明決。雜症。孰者。則傷寒。益以渾融。傷寒。從外之內。法當先治外。而後治。治外。至於中外。俱傷。治法一也。傷寒。不離乎表。雜病。不離乎裏。表則汗裏則下。中則和。劑有輕重。緩急之殊。耳。後世分科。而醫道支離。既不能融會貫通。又何以隨機應變。而救人於危亡之際。耶。醫道一貫。制作原於先聖。後學時思。不可自恃其聰明。 治法終

習醫規格

隆慶辛未。文。盧子廷和。何子明善。李子星。姪時思。相聚一堂。而請曰。入門。書已成帙。可無規格。以習之子。子曰。醫司人命。非質實而無偽。性靜而有恒。真知陰功之趣者。未可輕易以習醫。志既立矣。却可商量。用工。母早對先天圖。靜坐玩。讀孝經論語小學。大有資力者。次及全部四書。古易白文。及書經。洪範。無逸。堯典。理會大意。蓋醫出於儒。非讀書明理。終是庸俗昏昧。不能疎通變化。每于將入門。大字從頭至尾。逐段誦讀。必一字不遺。若出諸口。如欲專小科。則亦不可不讀。大科。欲專外科。亦不可不讀。內科。蓋因此識。讀後。潛思默想。究竟其間。意義。稍有疑難。檢閱古今名家方書。以廣見聞。或就有德高明之士。委曲請問。陶節庵云。但不與俗人言耳。蓋方藥而外。於本草。理趣而外。於素難。及張劉李朱。縱有小方捷法。終不是習醫規格。

大家數慎不可為其誣惑。入門書既融會貫通而後可成一小醫。愈加靜坐。玩讀儒書。稍知陰陽消長。以已驗人。由親及疎。自料作車於室。天下合輒。然後可以應人之求。及其行持。尤不可無定規。每五鼓清心靜坐。又早起。仍玩儒書一二。以雪心源。時時不夫平旦之氣為妙及其為人診視。先問症起何日。從頭至足。照依傷寒初症雜症。及內外傷辨法。逐一詳問。症雖重而門類明白者。不須診脈。亦可議方。症雖輕而題目未定者。必須仔細察脈。男必先左後右。女必先右後左。所以順陰陽升降也。先單看以知各經隱曲。次總看以決虛實。既診後對病家言必以實。或虛或實。可治易治難治。說出幾分症候。以驗自己精神。如有察未及者。直令說明。不可牽強文飾。務宜從容擬議。不可急迫激切。以致恐嚇。如診婦女。須託其至親。先問症色與古。及所飲食。然後隨其所便。或症重而就床隔帳診之。或症輕而就門隔帷診之。亦必以薄紗罩手。貧家不便醫。寡婦室女。愈加敬謹。此非小節。又其論病。須明白開諭。辨折斷其為內傷外感。或屬雜病。或屬陰虛。或內傷而兼外感。幾分。或外感而兼內傷。幾分。論方據脈下所定。不可少有隱秘。依古成法。參酌時宜。年紀與所處順逆。及曾服某藥否。女人經水胎產。男子房室勞逸。雖本於古而不泥於古。真如見其臟腑。然後此心無疑於人。亦不枉誤用藥之際。尤宜仔細。某經病以某藥為君。某為監制。某為引使。丸劑料本當出自醫家。庶乎新陳炮炙。一一合則。況緊急丸散。豈病家所能卒辦。但有病家必欲自製者。聽其意向。須依本草註下古法脩合。不可逞方以傷藥力。病機稍有凝滯。而藥不甚効者。姑待五鼓靜坐。潛心推究其源。再為診察。改方必無不愈。治病既愈。亦醫家分內事也。縱守清素。藉此治生。亦不可過取重索。但當聽其所酬。如病家亦貧。一毫不取。尤見其仁且廉也。蓋人

不能報天必報之。如是而立心。而術有不明不行者哉。明善又進而言曰。先生之教悉矣。但不識某等業。可以成次否。曰。子皆故家業儒。又多精明警敏。他日大有所悟。煩將素問本草。并東垣十書。劉河澗原病式。刪繁校正。更輯四方醫哲。將前經書本草。合為醫學大全。古今方論。悉皆附入。或作箋註。然後醫書儒籍。並明於

昭代。亦不負為中土之人也。明善曰。有見而後可以著書。小子能知入門足矣。曰。入門不過捷徑之類耳。况集書與著書不同。如張劉李朱。發前人未發。乃獨得之見。真可愛而可傳也。若某所集。不過古人陳言。而類次之耳。放下筆墨。已不識其中意義者有之。若任為己見。冒負虛名。深可慚懼。况病骨稜層。未嘗見諸躬行。惟一念好生。欲與同志。共守內外門戶。不至差謬太甚耳。若必欲知之真而行之熟。惟于與盧友尚其勉之。盧子又進而言曰。諷質弱且鈍。敢丐一言為約。曰。不欺而已矣。讀入門書。而不從頭至尾。靈精熟得一方一論。而便謂能醫者。欺也。熟讀而不思悟融會貫通者。欺也。悟後而不早起。靜坐調息。以為診視之地者。欺也。診脈而不以實告者。欺也。論方用藥。潦草而不精詳者。欺也。病愈後而希望貪求。不脫市井風味者。欺也。蓋不患醫之無利。而患醫之不明耳。屢用屢驗。而心有所得。不纂集以補報天地。公於人人者。亦欺也。欺則良知日以蔽塞。而醫道終失。不欺則良知日益發揚。而醫道愈昌。欺不欺之間。非人之所能與也。明善乃相率而拜曰。敢不矢志。以承先生之德教哉。於是就盧子錄稿之半。以歸于建寧。而託時思繪寫。校正。將以傳于通家楊子幹。子柱。余子允龍。李子距。并親友之相信者云。時士申仲春稿也。

萬曆乙亥仲春初吉南豐邑東李挺謹書

門人族姪李聰校寫

門人盧天謁

姜瑚
李春魁
楊文輝

鄧學堯
鄧孔泗
刻

編註醫學入門外集卷之八終



