



孫丹見隆和解
錦囊妙藥秘録
明和九年

ヤ 9
1148



1148

錦囊妙藥秘錄目錄

中風諸症	傷寒諸症
瘟疫諸症	傷風諸症
瘧疾諸症	吐瀉諸症
霍亂諸症	痢疾諸症
痰嗽諸症	勞瘵諸症
虛損諸症	吐血諸症
衄血諸症	下血諸症
腫脹諸症	水腫諸症
脹滿諸症	黃疸諸症
痞積諸症	痿痺諸症
諸風諸症	頭痛諸症
耳疾諸症	眼目諸症
鼻疾諸症	口舌諸症
齒牙諸症	咽喉諸症
心痛諸症	腹痛諸症



91-2068

脾胃諸症	五十二	膈噎諸症	同
腰痛諸症	五十四	腸痛諸症	同
大便諸症	五十五	腸風諸症	五十五
脫肛諸症	五十七	痔瘡諸症	五十七
小便閉諸症	五十九	淋疾諸症	六十
遺精諸症	六十一	疝氣諸症	六十二
脚氣諸症	六十三	婦人諸症	六十七
妊娠諸症	六十八	產育諸症	七十
產後諸症	七十二	乳病諸症	七十六
婦人諸病補遺	七十九	小兒諸症初生通用	八十
急慢驚風	八十四	五疳諸症	八十四
小兒雜病	八十六	痘疹諸症	九十
折傷諸症	九十二	破傷風	九十一
中毒諸症	九十七	虫獸傷症	九十七
瘡毒諸症	九十九	餘方補遺	百

錦囊妙藥祕錄例言

夫醫不執方貴因病發藥但藥餌所不及或隨物以奏功至治療所難痊又無意而收效是能去病即良方也。因輯其明簡經驗者。用藥須辨病源。倘病源微差即藥物不效不得徒諉於方也。且藥有分兩。有修製必須一一詳察。而其間藥品。又有真偽。有形似人命所關。尤不可。幸以從事。醫以濟人。必不自任。且屢試屢驗之方。其中配合必經細心斟酌。倘意為

減雖識力或過前人而偏見之誤亦不少矣養生者自慎焉。

一症之內必備數方者非一方不驗又識一方也或藥有未便其處得之易彼處得之難或症有殊途誓之其症而對誓之彼症而不對因是並載惟用所宜

是書專取藥品簡易便於窮村僻壤應手而得容有一二方藥較多者因立方奇驗不忍棄置且仁人君子製一料而能濟數十人蓄多品而能起數百命功孰

大焉因亦附錄於篇

陶隱居修本艸以蠱蟲水蛭為藥功雖及人而害及物命以致淹陷上昇是書雖有偶用者亦危疾中僅見之非得已也修製家慎勿多傷為幸

病痊之後貴調養尤貴修省蓋始病之由必因六氣七情所傷以至若此今幸值方而愈則節飲食慎起居必矣而養心尤亟於養身修省可不猛乎

是書始輯於丁酉成於乙巳俱屬初授經驗為多但字

内良方奇效者不少凡我同志更祈廣為惠傳嗣有續集悉當編入即諸君子之功德曷有既耶
 仁和醒菴主人王夢蘭
 做識于寧壽堂
 順治丁酉槐七月之既望

錦囊妙藥秘錄



大明王夢蘭蕙子父編輯
 皇和藤井以求子見隆和解

○中風諸症

初中痰盛不省人事其症卒二暈倒
 言語不能此時急二蘘谷圓ヲ用ユ
 竹瀝生薑汁ニテ調ヘ口中ハ灌ハ即醒
 隨テ用ル方

白木 天麻 當歸 川芎 薄荷 桂枝
 天南星 陳皮 各等分 水一碗半 俗云一杯半分
 也後 入煎七分竹瀝小蓋二生薑汁二匙加ヘテ服スヘシ
 如蘘谷圓無之時ハ急ニ星香湯ヲ用ユ
 木香 煎服ス
 ○又方 真牛黃一分研細ニシ湯五

送下ス效アリ

○又方 細辛末鼻中へ吹入一壺ハ即醒

○又方 五月五日白鳳仙花ヲ取燒酒ニ浸シ能包置年月ニ拘ルヘカラス此症ニ遇ハ此燒酒ヲ温メテ一杯服スレバ其痰立處消

中風口噤不能開 白鹽梅ヲ齒ニ楷付

レハ即口ヲ開クモノナリ又齒ヲ傷ナシ

中風口噤不語 明礬ニ及研テ細末トシ

生薑汁ニテ調ヘ口ヲ開テ灌入ヘシ痰涎ヲ吐テ即醒

○又方 黑豆 馬料ニ用ユル 一升水ヲ入煮テ其汁ヲ煉飴ノ如クニシテコレヲ含スベシ即能言

因寒中風 其症身強直戰掉テ無汗者

ナリ用薑附湯温之 乾薑 附子 各

等分煎服ス或ハ麻黃少加

因虛中風 補中益氣湯或ハ六君子湯

ノ類ヲ用ユ人參白朮ニテ效ヲ取ベシ

書ニ見タリ

中風口眼歪斜 生瓜萋搗テ汁ヲ絞リ

大麥麩ヲ和テ餅トナシ炙熱シテ心頭

ニアテ熨ヘシ口眼ノ歪正クナラハ便チ止

ヘシ度ニ過コトナカレ

中風半身冷 桑寄生ヲ酒ニテ煎シ服

スベシ緩ニ用ルニ酒ニ浸シ置テ温メ服

此物偽り賣者多シ 正真ヲ選テ用ユヘシ

中風口噤及口歪半身不遂 其症邪經

絡ニ中ルトキハ口眼歪邪血脈ニ中ルトキハ

半身不遂 白附子 白僵蚕 全蝎

各等分細末之每服二錢酒二下送下ス

○牛黃散 中風痰厥不省人事及小兒

急慢驚風ヲ治ス 牛黃 一分 辰砂 五厘

白牽牛子 頭末 二分 共二研テ末之痰厥ニハ温

香油ニテ用ユ小兒ニハ右ノ半劑ヲ用ユ急

慢驚風ニハ好酒ニ蜜少許入右ノ藥ヲ

與フベシ

○史國公藥酒方 元臣史天澤ト云

人曰臣天子ノ聖恩ニ沐シ叨ニ官職ニ

居リ節氣ノ宜ヲ謹ス遂ニ風疾ニ染テ

身偏枯手足拘攣行歩ニ堪ズ療治ハ

ルコト十年全ク才效ナシ官ヲ辞退シテ

里ニ歸リ廣ク名醫ヲ訪至元十七年三

月中驛道ニテ異人ニ逢面リ臣ガ疾ヲ

見テ神方ヲ傳ヘ大ニ靈驗アリト云臣方

ニ依テ酒ニ浸シ一日服セザル先ハ人ニ扶ラ

レテ起ルコト能ズ此酒一分ヲ次第ニ飲テ

手ニテ自髮ヲ梳ニ升ヲ飲テ手足屈伸

ニカアリニ升ヲ飲テ言語舒暢ニ行歩故

ノ如シ四升ヲ飲テ肢體通煖百節遂ニ

和シ歩コト飛カ如シ其效如神乞天下ニ

頒行テ万民壽域ニ至シト云

防風 去蘆頭二十分治四肢

秦艽 去蘆頭二十分治四肢

當歸 三十分補

羌活 二十分治風濕

獨活 二十分治風濕

油松節 壯筋骨

乾茄根 凡在諸骨節不伸屈伸

杜仲

三十分姜汁拌炒
去絲補腰膝

白朮

二十分姜汁拌炒
補脾胃

右各劉ハカニ布袋カマニ入大ナル罈クワチノ内ニ置好酒

三十五斤ヲ入罈ノ口ヲ封シ浸コト十四日滿

テ罈共ニ大鍋ニ湯ヲ沸シ此中へ入テ煮

ルコト三時ニシテ罈ヲ取出シ土内ニ三日

埋メ火氣ヲ去ベシ如地ニ埋メサレハ二月過テ
服スレハ火氣亦出毎日

清辰午後二右ノ酒ヲ五七杯應ニテ服

スベシ大ニ補益アリ他藥ヲ服スルニ愈

リト云。

○傷寒諸症

傷寒六經辨 傷寒ノ書多シトイヘトモ

仲景ヨリ詳ニハナシ但經ニ傳ルコト各時

アリ療治スルニ一法ヲ執ガタシ因テ脈法

ヲ尤ニ録ス閱者傳ル所ノ經ヲ知治ス

ル所ノ方ヲ知ハ服藥悞タク病可愈

○脈浮緊無汗頭頂痛腰脊強者傷寒

ト云病太陽經ニアリ○脈浮長ニノ身

熱シ目疼鼻乾不得眠病陽明經ニアリ

○脈弦ニノ胸脇痛耳聾寒熱往來ノ

脈者病少陽經ニアリ○脈沉細ニシテ

咽乾腹滿テ自利者ハ病太陰經ニアリ

○脈微緩ニノ口燥キ舌乾者ハ病少陰

經ニアリ○脈沉ニノ洪煩滿ニテ陰囊縮

ル者病厥陰經ニアリ

傷寒諸症 陰陽虛實ヲ論ゼズ一切ノ

症ニ潔白ナル砂糖五錢目ヲ用ユ症ニ

隨テ湯ニテ服ス○陰症ハ葱生姜ノ

湯ニテ服ス○陽症ニハ百滾湯ニテ用ユ

○暑症中熱ニハ新汲水ニテ服ス○虛

症ニハ米湯ニテ下ス○實症ニハ陳皮湯

ニテ下ス。○傷食ニハ山査子ヲ煎サシル
湯ニテ用ユ。○結胸症ニハ鹽湯ニテ用ユ。
○蛔厥症ニハ烏梅ト花椒トヲ煎シタ
ル湯ニテ用ユ。○腹痛ニハ新汲水ニテ
用ユ。○婦人ノ血崩ケツホウニハ鍋臍煤ナベスミヲ湯
入カキセテ此湯ニテ用ユベシ。

傷寒惡心 惡心トハ俗ニイフム子ワルキ
ナリ不換金正氣散ニ白朮茯苓桔梗
紫菀大腹皮ヲ加ヘ生姜入煎服ス。方ハ諸書ニ出タリ故

解利兩感傷寒 經云兩感不治陰陽俱ニ
受ル受ル兩感。所稟有虛實所感有淺深若
稟實感淺間亦可生治之而不救者
有矣未有不治而生者。此方十中一
ニヲ活スベシ。羌活五分 獨活

防己 黃芩 黃連 白朮 川芎 各二錢
細辛 五分 生地黃 知母 各二錢 水煎熱服
傷寒狂走 雞子殼湯ニテ服スハ却睡
テ止ナリ。ニハトリノタニヨカラ

傷寒結胸停食 結胸トハ心下堅ク滿テ
石ノ如クニ痛イタミ心膈高ク起リ手ヲ近ルコト
ス得ス頂強ルコト傷寒身熱ニテ醫コ
レヲ下スコト早ニテ熱氣虛ニ乘ジテ入
痞結ニテ散セザルヨリ致ス所ナリ停食
トハ不食ト同シ。陳香糟右キ香物ノ
生姜 四兩 石菖蒲根 四兩 鹽 二兩 共ツクム

總ツク勻ツクハ炒熟シ餅トナシ平子胸ノ痛處
ニアテ温アタ燻メベシ内響ヒキテ即去ルモ
酒ハ心ニ住セテ茶湯ヲ飲ハシ大便カガニ
惡物ヲ利下テ即愈。

傷寒熱結不解 枳實五枚大黃二枚

瓜蒌四枚煎之服之

傷寒發黃 發黃トハ全身黃色ニナ

サリ傷寒五六日忽此症アラハ急ニ麻

油蓋ニ半分水半分サカキ和シ雞子清

入攪カキセテ服又神効アリ

傷寒并一切雜病嘔噦手足逆冷

陳皮白ミツク 生姜 一兩 水二碗入八分ニ

煎シ徐々ト嚥下スベシ即愈

時疫傷寒舌黃狂言發熱 雞子二

枚生ニテ吞ベシ即時ニ氣清ク爽ナリ

○又生藕ヲ搗絞リ汁ヲ取テ冷服ス效

アリ

傷寒喉管 此症喉ノ中癢忍難シ其

時茶酒湯水ノ類ヲ飲ベカラス若コレヲ

知ズシテ茶酒湯水ヲ喫スレバ頃ニ喉

塞テ救ベカラズ 薄荷 二分 麝香 一分

極細末シ管ニ入喉中へ吹其氣通ズル

ヲ待延シ一碗許吐出スベシ其後ニ陳

黄米湯ヲ茶碗ニ半分バカリ飲入ベシ

即愈

傷寒發頤 此症ハ原風寒ヲ受表邪

盡ス日欠シ身熱退ス頂ノ前後ニ腫

ヲ結痰痛初起ニ身熱シ口渴クモノ也

柴胡 天花粉 葛根 黃芩 桔梗

牛蒡子 連翹 石膏 各一匁 甘草

外麻 三分 水煎シ時ニ不稍服スヘシ

○此症初起身熱ナク不渴上微熱ア

テ腫ノ處不紅疼痛ニハ 牛蒡子

蒸梗 陳皮 天花粉 黃連 川芎

赤芍藥 茯苓 甘草 各二錢 水煎服之

○傷寒日久之汗不出者二八丸煎

一ツ生姜一塊同搗之汁ヲ取童便一碗

ヲ入隔湯煮俗云湯煎ナリ熱ノ服不バ汗即出

○傷寒藥ヲ服ス作吐出シテ不納

生姜汁ヲ半盞溫メ服スベシ吐即止

○發散傷寒法 陰陽二証ヲ不問倉

卒ニ無藥時ハ生姜一兩葱白好酒大茶

碗ニ二杯一碗ニ煎ジ熱服シ被ヲ蓋テ

周身汗透レハ即發散ス然レ汗ヲ太

過スルナカレ葷菜ヲ食スルコト五七日忌ム

春秋此方ヲ用ユ夏ハ生姜葱白半減ス

用ユ冬ハ黑豆炒テニ合加フ右煎服尤

效アリモシ旅次ニテ煎藥ナキ時ハ生姜

五片葱白四莖紫蘇葉モト無之時ニハ 細切テ代用ユ

湯ニテフ出シ熱服スベシ

○瘟疫諸症 和名チキト云

瘟疫 丹溪曰衆人病一般者此天行時

疫治法ニアリ補ベク散ベク降ベシ

大黃 黃芩 黃連 人參 桔梗 蒼朮

防風 滑石 香附子 人中黃人ノ糞

名細末ニ神麴糊ニテ丸シ每服五七十九

症ニ從テ煎湯ニテ用ユ○氣虛ニハ四君

子湯ニテ用ユ○血虛ニハ四物湯ニテ用ユ

○痰多ニハ二陳湯ニテ用ユ何レモ症ヲ

照シテ丸藥ヲ送ス若熱甚者ニ童

便ヲ加フ

○神仙石解散 山茵陳 柴胡 前胡

羌活 獨活 蒼朮 甘草 葛根

柴麻 防風 蒼朮 藿香 白芍藥

半夏 白朮 各二兩 立春已後三月減

去身後柴胡赤茯苓當飯 各五分加之

秋已後八月當飯一分減之當飯赤茯苓

除辛葛根炮肉桂 各一分麻黃五分加之

冬已後八月無加減在細末之每服三分

生姜三片棗三枚水一碗半入一碗二煎

之此湯ニテ服スベシ如表散セント欲セバ

名ノ湯ニ葱白三寸加一煎之藥ヲ服シ

散ヲ覆テ汗ヲ出セハ愈イユ

○時疫不傳之方 蒼朮三分三分三分

甘艸一分六分川芎六分葛根一分三分三分

生薑一片葱頭一片右水二碗入八分

煎シ空心ニ服ス已ニ病者ハ愈イユ不病

者ハ不染雄黃ヲ酒ニ浸シ一杯飲ム

○時疫ノ病家ニ至シ決メ傳フナシ

○又疫内行時我家ノ水缸ノ内へ每朝

黑豆一握之握茶ヲ此缸ノ水ヲ家内用之ニ

又寅刻ヒソカニ黑豆一握ヲ井ノ中へ

投入ス但人ニ見スベカラス凡此水ヲ

飲家ニ時疫ヲ染ルコトナシ

○辟瘟丹 時疫ヲ不傳方 蒼朮木紅

各等分共ニ研杵テ膏トシ彈子ノ

大サニ丸シ疫病時行ニ丸ヲ火ニ燒ベシ

○時疫方 半夏 川芎 茯苓 陳

皮 山查子 白朮 甘艸 各等分 蒼

朮為君 右水一碗半碗ニ煎シ服ス

頭痛セハ酒製黃芩ヲ加テ口渴ハ葛

根ヲ加テ身痛ハ羌活薄芎防風若

蟻蟻蠱蠱其症頂腫頭大ニ或ハ蟻蟻

薑ノ如シ 白僵蚕 二兩 姜黃 二兩

蟻 各五分 大黃 四兩 各細末細末

姜汁三升煉子有子藥末九之三一分トス

蜜水ニテ服スベシ 大人ニハ一丸ヲ用

○傷風諸症 谷ニハハ半ヲ用 初レ起ルトキ葱白白鬚

トモニ五根生ニテ搗酒ニ入温服ス

一方葱灰三分 甘草三分 生姜大ニシテ

葱根鬚トモニ五根 春夏ハ荆芥一分五分

秋冬ハ防風一分五分ヲ加ヘ水煎シ服シ被シ

ヲ蓋テ汗ヲ出シテ即愈ス

傷風身熱有汗脉浮咳嗽痰多

陳皮八分 紫蘇 杏仁 半夏 桑白皮

貝母白木各五分 五味子七粒 甘草六分

生姜三片 棗一枚 水煎シ熱服ス

傷風頭痛發熱身汗 冰沙糖

生薑 湯熱服取汗

傷風發熱頭痛咳嗽 川芎 白芷

紫蘇 各八分 陳皮 七分 香附子 一分

甘草 五分 生姜三片 葱頭二個 水二

碗入八分二煎ス空心ス二服ス

傷風頭痛發熱寒濕熱 細辛 白芷

名膏 川芎 六分 水二碗入八分二

煎ス空心ス温服ス

傷風中寒之重者 蒼朮 半夏 厚朴

各一分 前胡 一分 川芎 一分 麝香 各八分

陳皮 七分 甘草 五分 水二碗入八分二

煎ス温服ス汗出テ愈ス

風熱發瘧起斑塊 防風 荊芥 連翹 各一分 甘草 五分 升麻 一分

葛ノ根六分 枳壳八分 桔梗七分 水煎服

風疹 白雞冠花ヲ煎シ洗フ

○十神湯 時令不正瘟疫要行感

冒發熱或疹ヲ出サシテ後ハ治ス

此藥陰陽兩感ヲ不問並ニ皆治之

藥方諸書 出故畧之

○瘧疾諸症

瘧疾總論 王節齋曰瘧是風暑ノ

邪一日一發モノアリ 二日一發モノアリ 三

日一發モノアリ 間一日二日連發モノアリ

日ト夜ト二度發モノアリ 有汗モアリ

無汗モアリ 上半日發モノアリ 下半日

發モノアリ 夜發モノアリ 治法邪氣外

ヨリ入キルヲ散スベシ 然レ胃氣ヲ

扶持シテ本ヲ固メ陰分ヲ分ル

藥ヲ用テ邪ヲ瘡ニ新ニ熱スル者

之或ハ截テ瘧瘧及久者ハ氣血ヲ補

ヘシ 若截藥ヲ服シ過セハ脾胃ヲ傷

テ總綿テ不休

○瘧疾 主方 柴胡 白朮 蒼朮

已上三味瘧疾 必用ノ藥ナリ 陳皮七分 甘草各五分 薑

根一分二分 水煎服ス 一日一發及午前

發者ハ邪在陽分 枯黃芩 茯苓 半夏

各一匁加フ 熱甚頭痛再川芎石膏

各一匁加フ 口渴ハ石膏知母麥門冬

各一匁加フ 間日或ハ三日二發午後

或夜發者ハ邪在陰分 常山 川芎 芍

藥 酒炒 熟地 黃知母 紅花 黃柏

酒炒 各一匁 陽分ハ提起テ可截之 陰分ハ

藜蘆二病也人參黃芪白茯苓各
 一錢當飯白芍藥熟地黃各
 二錢加以補氣血○陽瘧多汗者八
 草黃人參白朮加以飲之無汗
 柴胡蒼朮白朮黃芪葛根加以
 發之○陰瘧多汗者八當飯白芍藥
 熟地黃黃芪黃柏二錢飲汗無汗柴
 胡蒼朮本用苦紅花生麻二錢發汗故曰
 有汗散邪為主○病人胃氣弱食
 少或八服截藥傷脾胃少食者人參
 一錢酒製麥芽各一錢食之厭
 五合病悶或八食積二錢神麩麥芽枳
 實炒各二錢痰盛者二八半
 夏南星枳實炒各二錢黃連各一錢

若欲截之在柳葉青皮常山
 烏梅加以日之虛瘧寒熱不多或
 無寒但微熱者八邪氣無之只八物湯
方用柴胡黃芪黃芪陳皮加以氣
 諸書血之滋補又二

止瘧諸方 間日或八日發虛瘧漸

多者二八柴胡知母當飯各一錢
 桂枝六分防風四分黃芪二錢何首烏
 青皮各八分穿山甲土炒八分水二碗入一碗二
 煎之一宿露三星影發日朝向北
 溫服

○方 陳皮 澤瀉各八分 當飯 柴胡

各一錢 羊夏 茯苓 黃芪各一錢

甘密 人參八分但虛實考 水煎增減用

貝母 生半夏 各末下端午

腫ノ母一處ニ合セ瘡ノニダ發ス又發シ
トスル瘡ノ發シ要間ホト前ニ右ノ藥末
女生養汁ヲテ調服ス之止

○又方 白沙糖四兩燒酒ノ内六分温メ
服スベシ飲テ微醺ニ至レハ自止

陳月坡治瘡方

陳皮 半夏 當歸 各一

柴胡 黃芩 澤瀉 茯苓 各八 耳州 炙

升麻 乾薑 各五 生姜二片 棗一 桃五ツ

水ニ碗入煎シ熱服ス生冷ノ物魚類麩

類ヲ忌陳月坡云瘡方百種アリト云

只此方穩當無悞二十劑ヲ服スベシ五六

劑服後ハ人參ヲ加ヘ更易愈

治陰瘡

午後ヨリ夜分ニ發ル瘡ナリ

茶碗ニ水ヲ分入草葉一匁ヲ浸紙ヲ

蓋ニシ紙人上ニ人參末ヲ置一匁

次ノ日其人參ヲ煎シニテ蒸此

ヲ煎湯ニ入服スレハ即愈草葉ハ用ザル

ナリ如不愈再煎ノ如クニ服ス治セス

ト云フナシ

○又方常山一兩黑豆一合ト同ク煮テ

常山ヲ去黑豆ヲ取テ食ス神效アリ

再發ルナシ

治久瘡

貝母 當歸 川芎 柴

胡 各三 水煎シ發ラサル前ニ服スヘシ效アリ

隔年瘡

乾姜 白朮 煎服ス

○又方 雄黃 龜版 火ノ上ニ

置雄黃末ヲ徐々ト龜版ハ止ニフリカ

ケ煨黑シ茶碗ヲ蓋チ存性取出シ研

細末シ酒ニテ服シ厚被ヲ蓋テ

ベシトコロニ愈

年久虚癰

人參 一川芎

青皮

各二兩

當歸 白朮

炒黃

蒼朮 苡仁

炒

白茯苓

鼈甲

醋三錢 炙 楮子 云 楮碎 未 末 二 兩

右細末 糊

三九梧桐子 大サニノ早晚日々百餘

丸白湯ニテ用ユ

瘴癘

山嵐 瘴氣 二感 瘴作 二實

症ニハ藿香 正氣散 虛症ニハ人參 養胃

湯ヲ用ユ

吐瀉諸症

嘔吐

食スレハ即吐ハ為火 食停 不テ

吐ハ為寒 皆脾胃 和セザルヨリ發ル

蒼朮 厚朴

陳皮

甘草

半夏 茯苓

寒症ニハ丁香 乾姜

肉桂 加 熱アラバ 姜製 黃連 五分

加右煎服ス

胃虚食納久吐

人參

白朮

半夏

其神

茯苓

陳皮

丁子

縮砂

煎服ス

霍亂吐瀉

霍亂ハ揮霍 掠乱スル也 外

感内傷陰陽乖隔リ上吐下利ス陽

偏ナルハ熱多ク陰偏ナルハ寒多ク此症

率然ニ發危ク風前ノ燭ノ如シ吐瀉者

ハ濕霍亂ト名ツク輕ニ所傷物ヲ盡ク

出スユヘナリ吐セントノ吐セズ利セントノ利セ

ズ乾霍亂ト多ク多所傷物ヲ出スヲ

得ズ死スル一甚速ナリ鹽湯ヲ用テ探

吐ムベシ吐ハ則寬五穀ノ食ヲ與ル

十カレ口ニ入ハ即死ス飢一甚吐瀉シタ

ル後三時三時過テ踰ラ少ク人良サス

○治方 吳茱萸 木瓜 鹽各五 各炒
焦先磁罐ニ水三碗盛煎能沸右藥
ヲ入煎ノ一碗半ニ病人ノ立息ニ隨ヒ冷
クテテ毛熱シテモ服ス

○又方 生半夏ツキタタ 煨シ之ノ脘ノ内ニ貼ベシ
立止モシ死ノ腹ノ尚タラ煖ナル氣ヲスル鹽ヲ
脘中ニ入上ニ灸七壯スベシ立トコロニ生

○霍乱腹痛スルニ炒鹽一撮陰陽水一
杯ニ入調服ス腹痛稍止時服藿香正
氣散陰陽水トハ湯半碗ト水
半碗ヲ和白ハタルラニナリ

霍乱但一點胃氣存者 陳皮 藿香
各五錢煎服愈

傷暑霍乱吐瀉 其症暑伏熱ヲ胃シ
煩心ノ氣不舒解霍乱轉筋嘔吐泄瀉
寒熱交リ喘喘咳嗽胸痞頭目昏痛

肢體浮腫小便赤澀急愒臥ラ好自汗出
猪苓 澤瀉各七 赤茯苓 乾葛各一 天花
粉ニ香薷 黃連 白朮 甘草各五分

生薑三片水二碗入八分ニ煎之温服ス
泄極ニ八升麻七分 黃芩石膏各八分 加フ
○熱極ニ八石膏知母各一 加フ○腹痛ニ

芍藥炒 肉桂三分 加フ寒痛ニモ此加味
ヲ用ユ 右病症如藥十時ハ絲瓜葉
一片白梅二枚并核中仁同研爛之新汲
水ニテ用ユベシ忽愈瘥

胃氣虛冷吐瀉 蒼朮一分 厚朴一分 陳
皮八分 甘草五分 水煎服ス

水瀉 艾三 水煎空心ニ服ス或ハ枯
礬炒 砂糖二和テ小丸ニ三粒ツ
用ユ油膩ヲ忌ベシ

五更溲

又腎浮ト名ツク早朝寅刻ノ

比浮ナリ蓋陰感然脾ハ溲ヲ惡ム溲則

溲テ困ム困ムトキハ水ヲ制スルヲアタハス

水性ハ下流則腎水不足五味子二兩

吳茱萸五々各炒細末シ毎服二々陳

米飲ニテ用ユ

○又方四神丸

破故紙

酒一夜浸

肉豆

蔻

煨ニ二兩

五味子二兩

吳茱萸二兩

芍

未生姜八兩切片大棗百ト同ク煮燂シ

生姜ヲ去棗肉ニテ右藥ヲ子リ桐子大

二九シ毎服一々五分生姜湯淡ノ用ベシ

此丸藥原脾胃虛弱小便不利飲食ヲ不思或ハ泄

痢腹痛等症兼テ腎泄崩漏瀉泄者二三次毎日

不吐者

沉香

茯苓

石斛

白

脾胃弱

茯苓

南星

厚朴

各兩

肉豆蔻

白朮

山藥

神麩

糊ニ

二九シ毎服二錢ツ、白湯ニテ用ユ寒熱

二不拘服之皆能順之氣理脾

○痢疾諸症

痢疾總論

王節齋曰痢是濕熱食積

ノ三者赤白青黃黑五色ヲ別テ五臟ニ

屬ス白者濕熱氣分ヲ傷ル赤者濕熱

血分ヲ傷ル赤白雜ル者ハ氣血トモニ傷ル

黃色ニ濁ル者ハ食積也治法腸胃ノ濕

熱ヲ厚シ鬱結ノ氣ヲ開キ積滯ヲ消

化ス其初ハ下之後イニダ愈サレハ調之

痢病久シキ者ハ下スベカラス胃虛スルユヘ

ナリ痢ハ多ク熱ニ屬ス亦虛ト寒トア

リ虛スル者ハ補ベシ寒ナル者ハ温ムベシ

老人又虛弱ノ人ハ下スベカラス

○主方 黄連炒五分 黄芩炒五分 白芍炒二分

木香 枳殼炒各一分 枳榔子五分 甘草各三分

煎服 ○腹痛ニハ當飯一分 宿砂一分 再木

香芍藥各五分 加フ ○後連小便 便二 八滑

石炒五分 再枳殼 枳榔子芍藥 生黄芩各五分

分 加フ ○白痢ニハ白朮 白茯苓炒 滑石

陳皮各一分 加フ 初ニ欲下之 加大黄五分 ○

食積ヲ兼ル者ハ山查子 枳實各一分 ○紅

痢ニハ當飯 川芎 桃仁各一分 加フ 初欲下之

再 大黄五分 加フ ○赤白相雜ルニハ當歸

川芎 桃仁各一分 加ヘ 理血 滑石 陳皮 蒼朮

各一分 加ヘ 理氣 食積了 又山查子 枳實

加フ ○白痢久シク 胃弱ク 氣虚シ 或ハ

下後 愈ガルニハ 黄芩 黄連 芍藥各七分

白朮五分 黄芩 茯苓 陳皮各一分

宿破 乾姜各五分 加ヘ 枳殼 枳榔子

○紅痢久シク 胃弱ク 血虚シ 或ハ

下後 愈サルヲ 黄芩 黄連各五分 減

當飯 川芎 熟地黄 阿膠 陳皮各一分

白朮五分 加フ ○赤白相雜ハコレ 濕勝也

小便 澁少キニハ 木通 澤瀉 茯苓各一分

山梔子炒五分 加ヘテ 分利之 ○血痢ニハ當

飯 川芎 生地黄 桃仁炒 槐花各一分 加フ 久

シク 不愈 黄芩 黄連各七分 減ヘ 枳榔子

枳殼ヲ 去 再阿膠 側柏葉炒各一分 黑炒乾

姜一分 白朮一分 陳皮一分 加フ ○痢病已 二

久シク 後 重 不去 此 大腸 墜下スル ナリ 枳

榔 枳殼ヲ 去 加升麻一分 升提之 ○嘔吐

食口サルニハ 石膏一分 陳皮一分 山梔子

仁炒五分 加ヘ 生姜 汁ヲ 入テ 緩ニ 呷之 以 瀉

胃口之熱

有一種氣血虛而痢者

四物湯二人參白

朮陳皮黃芩芍膠ノ類ヲ加ヘテ補之痢
自止氣下陷セハ加升麻

有一種寒痢

黃連木香酒炒芍藥當

飯炒乾姜宿砂便朴肉桂之類ヲ用テ
温之

痢疾誤服温熱止瀉之藥

稍久シキモト

イヘ前法ヲ用テ下之下後後可調之又前

法ヲ用テ下シイニダ愈サレハ又前調理

法ヲ用テ治之然レ凡久シク愈サル者ハ

此虛寒ニ属ス前ノ虚ヲ補方寒ヲ温

ムル方ノ中又擇用テ更ニ竜骨赤石

脂罌粟殼烏梅等ヲ加ヘテ收法之

治紅白痢方三月三日蒸糯米花ヲ根ヲ

連子採テ風乾ニ掛テ乾ニ瓦上

ニ焙乾ノ灰トナシ砂糖湯ニテ服ス

又方陳細茶三生姜片三水一

杯半ハ八分ニ煎シテ食ヨリ間アリテ服

ス痢疾近ニモ久シキニモ赤白共效アリ

噤口痢

男女共ニ痢ヲ病食物湯水

モ不可喉者ヲ云烏梅一斤敲碎キ盆

中ニ置此盆トハ水十餘碗煎シテ入レ

熟シテ病人ヲ其盆上ニ坐セシメ熱氣

ヲ肛門ニ冲上ルツキヤワニ温メ即此湯ニテ

病人ヲ洗ハ睡出ル時扶テ寢床ハ十

ヲシ粥湯ヲ與ヘテヤウスヲ俟フレモシ

食ヲ思氣アラバ又粥湯半碗ホド與ヘ

少頃シテ稀粥ヲ半碗與フ必一度ニ

多用ユバラス小兒ニハ右方半減ノ可也

○又方 黃連一匁 人參一分 水煎温服
藥入合即甦レ

○又方 木鱉子研テ 麩ニ 和餅ト ナシテ
臍中ニ貼ベシ 亦效アリ

○又方 五倍子一匁 車前子一分 細茶各二分
煎服ス

○又方 老蓮子ヲ 末トシ 陳米湯ニ テ
調テ 三々服ス 或ハ秤錘ヲ 燒キ 紅ク シテ
醋ヲ 澆シ 之病人ニ 其烟ヲ 嗅シ ムレ 八即
胃口開テ 飲食ス

痢赤白俱治 蘿蔔搗 テ汁ヲ 取リ 蜂
蜜ト 等分ニ 三四匙服ス レハ愈ム

○又方 白砂糖 茶葉 蓮肉 紫蘗
生薑各三 烏梅二個 水煎服ス 但赤痢
ニハ煎メ 一夜露シ 翌日温服ス 白痢ニ ハ
其ヲ 煎服ス

下痢純血 生薑黒ク ナルホト炮末 トシ
每服ニ 二々分 飲ニ テ用ユ

○同久不愈 阿膠蛤粉ニ 炒 黃連酒洗イ
當歸洗酒各 烏梅肉ヲ 焙燥シ 乾姜炒黒 ス
各五 分

右細末ト 阿膠ヲ 解キ 化麩糊ニ 和シ 桐子大
丸ト 空心清酒ニ テ百丸用ユ

痢病三四月者 瓜蒌一個 子襖 共ニ
黒燒ニ 之為末好酒ニ テ一服ニ ノ用ユ

○久痢二 八木香五分 耳叶多 黃連各三分
訶子一兩半生 右為末芍藥白朮煎湯
ニテ二 々ツ 服ス

疫痢 コレ一人痢ヲ 病テ 他人即傳染ス
者ナリ蒼朮一兩 水三 大碗入二 碗ニ 煎
之蒼朮ヲ 去リ 其煎湯ノ 中ハ 防風白朮

白芍藥羌活人中黃各一各入煎之
一碗トシ温服スヘシ

痰嗽諸症

痰嗽總論 丹溪白熱痰濕痰食積

痰風痰老痰燥痰有大法降火清
肺火降トキハ痰自除也經曰咳ハ魚
之痰有聲謂之嗽魚聲耳痰アルヲ云咳
ハ肺氣ヲ傷テ脾濕ヲ動ス也病本
六氣ト五臟ノ殊ヲ分トイヘ其要ハ
皆肺ヲ主トス肺ハ氣ヲ主リテ聲出
治法新久ト虛實トヲ分ツベシ新病
風寒者ハ發散之火熱ハ清之濕熱ナ
ハ瀉之久病ハ虛ト鬱トニ屬ス氣虛
ハ氣ヲ補血虛ハ血ヲ補フ鬱時ヲ兼ルハ
鬱ヲ開キ滋潤之飲之降之テ治

痰之法也 痰嗽諸症 藥ヲ服スルニハ
時ニ臨テ細々嚥下スヘシ能肺經ニ入也

竹瀝達痰丸 此藥ヨク痰ヲ大腸ニ運
シ大便ヨリ出之氣ヲ不損達痰如神一
切痰失咳嗽魚不治之

半夏 二兩湯ニテ泡スルヲ七度洗生姜
汁ニ浸曬乾切片微火ニ炒熟用之 人參 去芦 一兩

白茯苓 二兩 陳皮 二兩 甘草 二兩 白朮 三兩
微火ニ炒 大黃 三兩酒浸 黃芩 三兩酒
炒 沉香 五兩

青礞石 一兩 煨ク多キ煨硝 二兩 和合セ 銷銀罐ニ入レ
煨造シ三言礞石ノ名金ノ
コトク黄ニテ者ヲ取テ用ユ 右細末シテ竹瀝大碗ニ

一ツ半生姜汁ニ杯ト和勻ハ鎔ニ入煎スル
一刻許ニ右ノ藥末ニ和攪テ醬ノ如クシ

磁器ニ入レ晒乾シ又竹瀝生姜汁ニ和攪
フ前ノ如クシ再晒乾ス如此スルヲ三度其

後竹瀝ニテ煉合小豆ノ大サニ丸シ食遠

度二百九ツ、白米湯ニテ服スヘシ 丹溪曰痰在四肢非

竹瀝不

痰火 真麻油 三兩 牛黄 五合 明礬 一兩

研末ノ油ノ内ニ浸シ痰火發時一二匙服スレバ痰自下ル

○又方 老足西瓜 純熟之也 一個青皮ヲ

削去孔ヲ一ツアケテ蜜一兩ヲ入レ繩ニテ

絡風處ニ掛テ冬ヲ過シ春ニナリテ取用

凡痰火嗽ニ鍾ニ半分ホド服スレバ立愈

○又方 天薤水 霜降テ後老タル天薤一株地ヲ

ハサミ汁ヲ存スルヲ 瓜蒌仁 天花粉 羌活 紅花

生薑汁ヲ加ヘ煉テ膏トシ服スレバ即愈

遠年痰火 肉桂 甘草 款冬花 炒

旋覆花 炒各 貝母 二合 共研末シ芦管ニ

入テ不時ニ咽喉内ヘ吹レ肺熱散用テ咳

嗽ノ物ケレ但度ニ多ク吹入ヘカラス徐

々ト少吹入ルヲ妙トス

○又方 餹二兩 豆腐漿一兩煮テ化シ

頻ニ服ノ愈

老痰 男女久シク老痰ヲ積或失音或

發喘或氣促湯藥不效者蜜陀僧一

二合砂糖ニテ調ヘ白湯ニテ送下痰ト

藥ト大便ヨリ出テ無礙愈

風痰喘急逆呃欲吐眩暈欲倒 大丸半夏

生ニテ 雄黄 三合 細末シ薑汁ニテ蒸餅ヲ

煉糊ニシ胡椒八大サニ丸シ每服五十九生

姜湯ニテ用ユ

痰暈 痰ニテメヒスルナリ明礬名火ニ

煨研末シ生薑湯ニテ服シ吐逆シテ愈

○痰厥氣絶心温者八千百年ノ石灰二

合 古塔旧城ナリノ堀ニ
又リタル年冬物ヲ取 水一大碗煎ノ去水再ヒ

清水ヲ入シ煎シ澄清ヲ傾ケ出シ口中へ
灌之痰下テ自愈

久咳嗽連四五十聲者 生姜汁半合蜜
一匙加煎之温服ス

冷咳 咳トハ喉ニ痰ツリセリツクナリ

咳吼 咳喘ニ云冷テ發ルヲ冷咳トス
清晨ニ豆腐漿ヲ服ノ愈

○又方 茯苓 乾姜 各一 南星 石膏
各七 生半夏 杏仁 各五 研末之烏梅ト

燈心煎湯ニテ一度ニ三五ツ服スベシ
咳嗽吐膿 此肺傷也 知母 貝母 白芨

枯礬 各等分 研細シテ每服ニ錢生姜三
片煎湯ニテ藥ヲ嚼服ス三五度ニノ愈

○暴失 猪油一斤入鍋煎シ渣ヲ
濾去白蜜一斤入再煎シ少頃ノ濾淨シ

磁器内ニ入テ膏ト成時々ニ匙ヲ
服ス其音次第ニ清ク頗潤肺好方也

勞損諸症 勞瘵虚損ノイテ註ス

傳屍勞 瘵瘵ノ中ノ一證ナリ三尸虫トテ
人ノ臟腑ヲ食虫ナリ瘵瘵ヲ一人病トシヨ

リ一家ノ親類ニ傳染テ悉死スル症ナリ
懶肝又ハ懶瓜ヲ粉ニシ酒ニテ服スハ愈

虚怯 勞症ナリ鰻魚一條一斤ノ重サ
アル者古キ壺ニ入鹽泥ニテ壺ノ口ヲ塗

封シ固メ火炙擊碎肉ノ白キ處并鰻
灰ヲ取研末トシ米飲ニテ二匙ホドツク

用シハ自愈
骨蒸勞熱 地骨皮 一兩 小青州 三錢 桑

六月霜五々 胡黃連一五 紫胡二五 芒萁

苡仁三五 鷄一隻洗淨 去洗淨 三三 逢酒ト水 小等

藥ヲ腹ノ内ヘ入レ線三 逢酒ト水 小等

分ニ合セ鷄ヲ丸ナク煮テヨク熟タル

時酒ニテ鷄ノ肉ヲ啖ヘシ其骨ハ炒燥

シ右ノ藥ト共ニ細末シ煉蜜ニテ桐子

大サニ丸シ毎日巳ノ時申ノ時ニ三五ツ

白湯ニテ服ス

怔忡心ノサワキ也其症心中毎ニ人ニ捕

ラントスル狀ノ如ク思ナリ半夏茯苓

人參各等 煎シ服ス即愈

○又方 辰砂五分 當歸五々 猪心肉血

三ツ丸ニ睡ト スル時酒ニテ一錢ツ

服ス亦效アリ

腎經虛損俗水ノ 其症目眩耳鳴四

肢倦怠腹脹 滿足酸痛 步履艱

難小便滑數或水道澀痛時有遺瀝

等此方治之 兔絲子五兩炒ヲ淘去 白

茯苓二兩 蓮肉二兩 山藥二兩 右為末

山藥ノ末ニ兩ノ 水ニ煮テ糊ト且餘ノ

藥末ヲ和桐子大ニ丸シ毎日清晨空心

ニ二三ツク白湯ニテ用ユ

諸汗 黃蘗 黑豆 煎湯飲之半月

ニ全愈

自汗盜汗 當歸六黃湯ヲ用テ效アリ

不寐 夜寐レ サレ 症也病後虛弱及

キレ 高レ 人陽衰テ不寐者アリ大極補ニ

安神 人參 乳香 硃砂各 酸棗

仁炒 蜜ニテ彈子大ニ丸シ睡時分ニ

○二十二

竜眼肉ノ煎湯ニテ用ユ

又痰膽經ニ在テ神不眠舎不寐者

アリ温膽湯ノ加減用之方ハ諸書ニ見タリ

見血諸症

此條下ニハ吐血衄血下血等ヲ註ス

吐血總論

人身ノ血ハ水ノ地中ヲ行ガ如

ト百川皆理ルトキハ水壅逆ノ患ナシ

身ノ柔衛柔ハ陰血也 衛ハ陽氣也調ヲ失シ七情四氣相

干ニ氣血逆乱逆乱ハ氣血ノ逆乱也ヲ致シ變ノ吐血咳血ノ

諸症ヲ生ス夫血ノ妄行ハ固積熱ノ致

ス所ニ因然レ其症多端飲食ノ過

ルニヨリ又重物ヲ負テ胃ヲ傷リ吐血ス

ル者アリ思慮ニ心ヲ傷リ并ニ熱ヲ積

テ吐血衄血出ル者アリ苦勞ニテ心肺

ヲ傷リ又七情ノ為ニ干サレ咳血吐血ス

ル者アリ血ヲ至トリ肝ハ血ヲ藏シ

脾ハ血ヲ統ルナリ故ニ思ヲ過テ脾ヲ

傷ル者未能吐血セシム治之方其因ト

コロヲ究ムヘシ傷胃者ハ調胃安血方

心者ハ補益心志積熱者ハ清之氣鬱

スルトキハ順之傷脾トキハ安之其脉ハ

宜宜ハ調和也沉細不喜浮數血ヲ吐テ不咳ハ易

治唾中唾中ハ痰也紅絲ノ如クナルヲ交ルモノハ

難治損スルトゴロアルカ為ナリ

○止血方 蒲黃 生地黃 各一兩 鐵屑 忌

磁器ニテ水ニ碗入八分ニ煎シ藕節

七枚搗テ汁ヲ取煎藥ニ入レ食後ニ

温服ス

○葦方 葦葉根洗石白ニ入木杵ヲ

搗爛童便ヲ入レ布ニテ絞渣ヲ去

汁ヲ茶碗ニ入レ火邊ニ置温メ濁者ハ

碗ノ下ニ居ルヲ不用上ノ汁ヲ澄メ服
夜熱咳嗽口燥吐血初起 黄芩四兩
猪膽三個ニ拌勻飯鍋ノ上ニテ蒸
乾如此スルヲ三度ヲ為細末糊ニテ
丸ニ空心ニ白湯ニテ用ユ輕キモノハ四
兩ニノ即愈重キモノハ一升ヲ服ノ數
アラズト云フナレ

吐血咳嗽

阿膠

蛤粉ニ拌セ

天門冬

一兩

貝母

水洗キ

白茯苓

炒テ五々

杏仁

湯ニ泡シ

炒テ黄色

ニス五々

共ニ細末ニ煉蜜ニテ竜眼肉

ノ核ノ大サニ丸ニ時々一丸ヲ嚙化服ス
或甘柿五々加フモ可也

又方 藕節汁 梨汁 茅根汁 和出
蘿蔔汁 雞冠油 麻油 各四兩 煎ニ煉テ

膏トシ服ス

又方 產便一掬ニ生姜汁ニ一匙
緩ニ服シ自愈

血熱妄行

生荷葉

生艾葉

生栢葉

側柏葉

ヲ用ユ 生地黃各等分搗爛ニ雞子

大サニ丸ニ一粒ヲ水ニ碗入ハ分ニ煎シ
渣ヲ去テ服ス

血噴成升汁者

花葉石多少ニ拍ス

煨存性細ニ研童便一盞ヲ温メ右ノ

藥ヲ三々食後ニ用ユ男子ハ酒ヲ童
便ニ和女子ハ醋ヲ和テ藥ヲ服シ後ニ

獨參湯ヲ用テ補之睡テ覺ハ即止
痰中見血 白朮 牡丹皮 各五分 當歸

芍藥

桃仁

去皮尖

貝母

各一分

黃芩

桔梗

七分

青皮

五分

耳竹

三分

水煎服

凡吐血下血

其症皆內損ニ因或ハ酒上

色ト過度或ハ心肺ノ膜破血氣妄行

血泉ノ湧如ク口鼻ヨリ出ル者ニハ
側柏葉焙乾 人参焙 細末毎服 二
ク用ユ再ヒ飛羅麩二々加 井花水二
調ヘ糊ノ如クニノ服ス

○又方 荆芥一握黑燒ニシ火氣ヲサシ
細末シ陳米ヲ煎シタル湯ニテ三々用ユ
二三服ニ不瀉自愈

鬱熱存内吐血及咯血吐血下血 枸杞子

柴胡 黄芩 地骨皮 天門冬去心 白芍
藥 黄芩各一 黄連八分 生地黃厚 地
黄各一分 耳朮四分 水煎空心服ス 下血
ニハ地榆一々加フヘシ

鼻血不止 麥門冬去心 生地黄各一分
煎服ス

○腫脹諸症 鼓脹水腫脹滿等 黄芩

鼓脹 鼓脹ノ症ナリ氣鼓 食積 熱

鼓 風鼓 勞鼓 濕鼓 蟲鼓 疝鼓 胸腹腫

脹 并ニ四肢腫者アリ病人ヲ見ルニ腹ヲ手
ニテ按テ窩ハ可治 脉壯ナル者ハ治

脉細ニノ臍腫出ル者掌上無紋米穀
不消陰囊無縫者ハ皆難治

雞裏金一貝ニハリノモク 沉香 砂仁各三
陳香圓去核五々陳ヲ用 右細末シ生姜湯ニ
テ五々ツ用ユ

氣鼓 大麥鬚陳キ者ヨシ煎湯ニノ

服ス泄氣即消ス 鼓脹水腫 陳皮 木通 大腹皮

茯苓各一 車前子三々 茵陳五分 薏苡仁三々
水煎服ス淡物ヲ食スヘシ

○又方 絲瓜乾毛 去皮剪碎 巴豆十四粒入共炒之 巴豆ノ色黄ニナルトキ 巴豆ヲ去リ 絲瓜バカリニシテ 其内へ陳倉米年ヲ経タルヲ等分ニ入炒テ黄ニシ 絲瓜ヲ口子米ナリ去米バカリヲ研テ細末シ 清水ニテ梧桐子大サニ丸シ 一度百粒ツク湯ニテ用 腫脹不脹藥自去水方 水銀真丸者 粉ニスニ

巴豆去殼研テ 去油四兩 硫黄生一 右研テ餅トナシ 脐上ニ貼ヘシ 黄水自下貼ル時先糸ヲ一上ニ糸餅ヲ貼 其上ヲ帛ニテクリ人二里ホド道ヲ行 爾アル黄水自下ルニ五度下ラハ餅ヲ去テ病人ニ温湯ヲ與ヘテ補之ヘシクシキ病人ニハ日ヲヘクテ 黄水トク水ヲ取ナリ但一糸餅ヲニ五十度用斤五 水腫腹脹及黃疸火丹發腫 香圓陳ク者去

火丹 丹毒ノ一種ナリ 芥葉搗碎敷之 又方 山梔子 黄連 黄芩 黄柏 大黃 寒水石 共ニ細末 水ニテ調ヘ敷ヘシ立愈

○黃疸諸症 五疸 症有五トイヘ凡皆濕熱ノ發ルハ異ナル下ナシ蓋濕熱脾胃ノ中ニ積コトクシテ不散故ニ其土色面ト肌膚トニ形ルナリ

穀疸 食シテ後頭眩心中怫鬱不安 饑飽所致 胃氣蒸冲而黄ナリ 苦參 二兩 龍胆 一兩 牛膽汁 一兩 煉蜜少許入桐子ノ大サニ丸シ 一度ニ五十九空

酒疸 身目俱黄心中懊懣シ足脛滿 尿赤ク面黄赤斑ナリ 酒後胃熱醉卧 二生薑湯或甘草湯ニテ服ス

○二十六

風水濕ニ當ルニ因テ此疾ヲ得

山茱子十五 大黄一兩 淡豆豉一兩 枳實一兩

五個煎之服ス

女勞疸 額黒ク身黄少腹滿急小

便不利房事ノ後水湿ノタメニ搏レテ

得之 硝石 礬石 各煨過之等分細

末シ大麥ノ粥ノ汁ニテ調毎日ニ々ツ、

日ニ三度服ノ取汗

黄汗 汗山梔子水ノ如ク衣服ヲ染

テ黄ナリ嚼不渴是脾熱汗出テ入

水浴スルニヨツテ致ス所也

黄蘗 赤芍藥 茵陳各二兩 石膏四兩

麥門冬志 豆豉各一兩 甘草炙 右細末

毎服五々淡姜湯ニテ食ヨ一盞ク

服ス

黄疸 通身面目悉ク黄ニシテ金ノ如ク

飲木 猪苓 澤瀉 茵陳各二兩 茯苓一兩

十五 細末シ白湯ニテ五々ツ、毎日三度

服シ多温湯ヲ飲テ汗ヲ出セバ愈

黄疽通治方 三白州一把切 茯苓一兩

茶碗ニツ取白酒ノ内へ入空心ニ服ス

冬ハ用根汁ヲ取酒ニ和テ服ス若貯

ント欲セハ根ヲ晒シ乾シ服スルトキ細

末シ三々ツ、酒ニテ用ユ

○又方 枸杞根搗テ汁ヲ取生白酒ニ

和熱シテ服ス

○又方 土牛膝四兩生白酒三碗煎シ

沸日六七度空心ニ連服ス三百餘根

○又方 純黑猪胆一個 陳黄末炒 猪

胆汁ヲ入テ為丸生白酒ニテ送下ス

○又方 白芥子ニハ五分 研碎燒酒ニテ
解キ白布ニ攤ラ之ハ臍ハノ下少肚ホカミノ上ニ貼ツクベシ
一時過ステ貼ツクタルトコ泡フクヲ起テスラ度
ノ藥ヲ去ル鹽又ハ甜物ニキヲ足スベシ

陰黃虛黃二症 陰黃ハ四肢冷自汗

シ泄利小便清白脉沉遲ナル者也虛黃
ハ耳鳴口淡怔忡微熱アリ四肢無力急
惰嗜臥脚軟弱脉沉細ニノ寒熱熱之
澀白者是ナリ主方理中湯ヲ用テ治
之空心ニ服スベシ 方諸書ニ出
タリ故畧ス之

黃病 六味地黄丸加綠礬ニキ

白湯ニテ朝夕服ス

瘀血發黃 其症發熱シ小便自利シ

大便黑少脉沉瀯コウナルモノナリ
桃仁ニキ大黃 芒硝各一甘草六 桂枝八

牡丹皮各一 枳殼ハ分 右大黃芒硝ニ味

又別ツモ餘藥ニ水ニ碗入一碗ニ六
黃ヲ入ニ沸シテ再ヒ芒硝ヲ入ニ沸シテ
熱服ス大便ニ黑物ヲ下シテ愈但此方

澀劑ニキナハノ虛實ヲ量テ服ス

投テ候ヘカラス凡ハ此方一切瘀血脹滿
大實シ大痛手モ近ツクヘカラス者服
之立ドコロニ效アリ

○痞積諸症

諸痞積 丹溪ノ論ニ積聚癥瘕一ニ症
ナラス積者停蓄タタルノ總名也在中ニ在レ左
在レ右ト云フ分テ治スベシ凡ハ塊ハ形アル
物ナク氣ハ形ヲ成スアタハス痰ト食
積ト死血ト而已其積塊在中ニ為レ痰飲
在レ右ニ為レ食積在レ左ニ為レ死血大法鹹ヲ

以テ鞭之堅ヲ以テ削之行氣用痰為
 多及痞痞及老人ハ大約妄動ベカラス
 損及亦乱治スベカラス孕婦尤痞痞
 治スベカラス恐クハ其胎ヲ傷ラシ慎之
 枳殼 八分 大腹皮 一匁 藜蘆 八分 厚朴 一匁
 青皮 一匁 莪朮 八分 山查子 二匁 烏藥 六分
 香附子 五分 宿砂 五分 木香 三分 水二碗入
 八分ニ煎シ空心ニ服ス三四劑ニ愈
 ○痞塊ヲ慰法 葱ヲ蜜ト搗合セ布
 キニ攤患處ニ貼テ熨斗ニ微火ヲ入
 徐ニ熨之痞立トコロニ下
 ○同貼藥 松脂 水煎乾シ 革麻子肉
 搗爛 皮硝 五匁 朴硝 五匁 共ニ搗テ膏トシ布ニ
 攤痛ノ大小ヲ量テ貼ベシ或ハ貼ルキ
 鹿茸 二厘加テ弥良此膏藥立愈

自落止下妙也

○又方 清油一介 蜜陀僧六兩 銀粉底
 細末 先油ヲ煎スルヲ數刻次ニ蜜陀僧ヲ
 入美活末一兩餘入レ煉テ膏ト成ント
 大ル時阿魏五匁麝香二匁入レ煉テ
 水ニ一滴落シ見テ珠ノ如クナリ手ニ粘
 カルヲ為度止藥ヲ熬法春冬ハ軟ニ
 秋夏ハ硬クスレシ痞ノ大小ニ隨テ布ニ
 攤貼ベシ立トコロニ消セズト云フナシ
 諸物食積作痛 白朮 茯苓 半夏
 各一 藜蘆子 二匁 山查子 十五匁 陳皮 五匁
 細末ニ煉蜜ニテ丸彈子大ガニ空心
 ニ湯ニテ一丸ツ、服ス
 食積血痞 木賊 枳朮 枳殼 枳實 枳實
 心ニ白湯ニテ服スレハ痞自消ス年久シ

牛者モ二服ニ不遇ニテ愈

諸蟲積

苦棟根

東ニ向ヒ上ニ出サレ者佳ク皮ト滑トラ去リ四兩

史君子

穀ヲ去

生姜

切片

右一服トシ永

五碗入三碗ニ煎シ渣ヲ去再煎ノ一

碗トシ白蜜四兩加ヘ又煎ノ一碗トシ

星月ノ下ニ一夜露次朝空心ニ服ス但

一度ニハ服シガタシ三五度ニ用ユ凡此

藥ハ朝日ニ服シテ佳不吐不浮喪大

便ノ中ヨリ團成テ出虫少キハ一服多

ハ二服ニ及除根

諸虫作痛

口中必涎流出湯水ヲモ

飲フアタハス命危者ニハ

烏梅

サニセリ

花椒

生姜煎湯ニノ服

○又方

蘆薈

史君子

去殼

雷丸

各五

苦楝根

東向者

蕪荑仁

炒

研テ細末シ砂糖ニテ一粒

重サ三錢ニ九シ五更ニ一丸服ス

或ハ猪肉ヲ煮タル湯ニテ

服ス

如二愈

追蟲去積方

大黃

栝榔

木香黃

連

夏月ハ倍ス

各等分細末シ每服三錢白湯

ニテ用ユ法効尤アリ

貪食茶葉壁泥

椽炭石灰生米等

此症

皆虫ニ屬ス

芝麻

炒一碟

雄黃末三分

二拌

七鉛

白湯ニテ用

下ス三日ノ後々

芝麻ヲ炒テ喫ベシ半月ニ自愈

○又方

生樞

一升

每日砂糖ニ蘸數十

粒喫ベシ一升ヲ食シ盡スヲ受トス或ハ

史君子肉四五枚半生半熟入芝麻ト

同食シテ更ニ效アリ

○貪食茶葉面黃腹有蟲毎日空心

川椒百粒白湯ニテ吞下ス自愈
川椒ヲ用ルモノ

痞滿 心下堅如盤者ニハ 枳實一合 蘇枳一合

白朮三合 水一杯七分ニ煎シ温服ス

○消痞法 独頭蒜 穿山甲 艾卷上

各等分先穿山甲ヲ洗ヒ淨メ毛ノ上ニテ

煨炭ト成研テ細ニシ又艾ヲ揉碎モミサセ

香ニハ蒜ト共ニ搗合セ薄キ餅トナシ

痞ノ大ハニ隨テハリ付線香一炷ノ間

置テ餅及去ル痞忽消ス

○痿痺諸症 附諸風

痿症 痿症ヲ皆風ト作テ治シ悞テ

熱源ノ被攻風藥ヲ用ユベカラス凡不痛

者ヲ為痿屬虛痛者ヲ為痺屬實

証者有別蓋痿病ハ肺熱ヨリ生ス血氣

少虛火盛ニシテ金ヲ制ス肺葉焦枯

筋不潤金既ニ水ヲ生シ以テ肝木ニ

乘シ狂々ルヲアタハス脾土受傷クハ骨

痿軟ニシ筋弛四肢拳ガタク伸縮動

ス不能狀若癱瘓者久此劑ヲ服

ズニ 當歸 白芍 杜仲 牛膝 黃

芪 白朮炒各 熟地黄二合 知母 黃柏

各分 水煎空心ニ服ス

軟癱 樺皮燒テ灰トシ毎服ニ酒

ニテ服ス久用テ效アリ

筋骨疼痛手足痿不行 白朮 羌活

赤芍藥 當歸 甘草 海桐皮 白芷

薺金 烏藥 香附 各等分水煎

當歸ニ服ス

風氣痛 老薑 鳳仙葉 香油

川椒末 共三搗テ痛ム處ニ擦ル或風仙

花子ヲ煎シタル湯ニテ洗フヘシ皆效

鷺掌風 掌ニハタケ瘡生スルヲ云

槐花 花椒 大麥 地骨皮 艾葉

鷓鴣 白芷 煎湯ノ先薰後ニ洗フ

一毎日敷度ノ愈

○又方 雄黃 穿山甲 火ニ燒テ熏之

敷度ニノ自愈乃品祖法也

鶴膝風 三陰ノ氣不足ニ風邪乘之

兩膝痛 早ニ之キトキハ膝大ニノ腿細

ト因テ鶴膝風ト名ク敗症ナリ

人參 防風 白朮 附子 當歸 白

芍藥 川芎 杜仲 黃芪 羌活 牛膝

甘草 熟地黄 各一 生姜三片 水二碗 八

分 煎シ食前ニ服ス 此方兼テ附骨疽皮

腫脹腫痛等症悉治ス

○又方 酒糟 皂角 皮硝 五

味 各等分 砂糖 薑汁 各 右藥調

和膠ノ上ニ付包置テ十日餘モシ燥ハ

燒酒ヲ敷度上ニヌリテ潤ヘシ年久キ

者モ亦效アリ

○又方 艾半斤好醋ヲ入シ鍋ノ中ニテ

炒熱シ痛ト口ニ敷冷シテ取換ヘシ敷

度ニノヨク包内ニ服ス方 硃砂 雄黃

乳香 沒藥 川烏頭 草烏頭 各

一錢 碾細末シ毎服五分古酒ニテ用

白癩風 硫黃 蜜陀僧末トハ屢

汁ニ調テスリ付ル

○米方 白癩紫癩ニ 雄黃 硃砂

等分細末シ茄蒂ノ切口ニ藥ヲツケ癩

ノ上ニ擦ベシ三日ヲ経ズノ愈神效アリ
又白癩ニハ右ノ藥ノ内ハ蛇蛻ヲ粉ニシ
加ヘテ右ノ如ク擦ベシ永ク痕ナク治ス

紫雲風 紫癩ノ如ク遍身ニテクモ

ルナリ 甘草一兩 川烏頭姜汁浸 草烏

頭黑豆ト同ク炒リ黑豆ノ熟シ 防己 各五匁

牛膝炒乾 羌活上部ニ 獨活下部ニ 川芎

白芷 馬兜鈴炒各 共ニ細末ニ一度ニ

七分ツ好酒ニテ服ス 外蛇床子夏枯

地ニ味ヲ煎湯ニシ風塊アル処ヲ數度

洗ハ即退

汗斑 汗出タル後ナニツノ如ク斑ニナ

ル者 硫黃 蛇床子 蜜陀僧各 煎テ

生姜汁ニテ解茄蒂ニ藥ヲ蘸シテ

細ク擦之ヘシ甚效アリ

○頭疾諸症

頭疾總論 頭ハ乃諸陽ノ會ナリ其

疾ニ端ニアラス大約頭痛ハ十之經ヲ

分テ治之ベシ丹溪曰頭痛多ク痰ヲ

去トス甚シキ者ハ火多也可吐者アリ

可下者アリ又眉眶痛ハ風熱ト痰ト

ニ屬ス肝虛痛モノアリ幾ニ光明ヲ見

レバ眶痛甚眉後脊痛眼開ガタキモ

クアリ晝ハ輕ク夜ハ重モノハ屬痰

頭風ハ經ニ云首風之狀頭面多汗惡

寒スト云々其人素ヨリ痰火アツテ風

寒腦髓ニ入テ然リ婦人多クコレ

患ハ頭ニ中積ノ風寒ヲ禦クコトナキ

故也偏痛アリ正中痛アリ熱アリ風

アリ血虛アリ痛尤ニアルハ風ト血虛ト

二属シ右ニアルハ痰ト熱トニ属ス頭眩
 上シ月ニ花チリ黑暗ナリ旋倒ナリ頭
 眩ノ状目闭身轉耳聾舟車ノ上ニ立
 如ク起ントスレハ倒ント欲ス虚極ル
 ニ乗ノ得之故ニ風ナレハ有汗寒ナレハ
 掣痛暑ナレハ煩悶之湿ナレハ重滞ル
 此西氣虚ニ乗ノ眩暈スル也或ハ七情
 鬱ツクニテ痰ヲ生シ火ヲ動シ氣ニ随テ上
 厥ハレコレ七情虚ヲ致シテ眩暈スルナリ
 酒ト名トシ過ス之腎虚ノ氣ヲ納メテ
 見ニ帰スルヲアタハズ氣逆奔テ上ルコ
 シ氣虚ノ眩暈スルナリ吐血衄血崩漏
 或ハ産後失血脾虚ノ營エイ氣キヲ損カ損
 一アタハズ諸血ヲシテ失道妄行此血
 虚ノ眩暈スルナリ症各候アリ治各方

聊其經驗者教種ヲ録ト云

十二經頭痛主方 川芎 羌活 白芷

柴胡 蒼朮 蔓荆子 石膏 防風 半

夏 細辛 藜蘆 南星 天麻 各各分

其少 生薑 三片 葱白 二枚 煎服ス

○又方 太陽症 川芎 羌活 藜蘆 蒼朮

麻黄 煎服 ○少陽症 小柴胡湯ヲ

用ユ ○陽明症 升麻葛根湯ヲ用ユ

○太陰症 蒼朮 半夏 南星 川芎

葛荊子 等分 煎服ス ○少陰症 麻黄

去節 細辛 附子 煨煨各各 煎服ス ○厥陰症

麻黄 去節 羌活 去去各各 五分 吳茱萸 四分

本 升麻 黄芩 葛荊子 細辛 柴

胡 紅花 半夏 炮 黄連 炒炒各各 黄芩

當歸 酒洗 黄柏 炒 蒼朮 未未水浸一日一夜

晒晒乾乾ニニ炒炒 ○三十四

川芎^{各一} 水煎^一服ス

諸頭痛

生薑^{生薑}薑汁^{薑汁} 規殼^{規殼}ニツ^{ニツ}仰臥^{仰臥}

鼻ノ中ニ注ク^{注ク}之^之龍頭痛^{龍頭痛}セバ^{セバ}龍ノ鼻孔^{鼻孔}右

頭痛^{頭痛}セバ^{セバ}右ノ鼻孔^{鼻孔}ニ注テ^{ニ注テ}即愈^{即愈}

諸虛痛

血虛^{血虛}作痛^{作痛} 川芎^{川芎} 當歸^{當歸} 各三

水煎^一之^之食ヨリ遠ク^{遠ク}服ス^{服ス} ○氣虛^{氣虛}作痛^{作痛}

四君子湯^{四君子湯}煎服ス^{煎服ス} ○氣血^{氣血}兩虛^{兩虛}作痛^{作痛}ニ

黃芪^{黃芪} ^{蜜炒一} 人參^{人參} 一各 陳皮^{陳皮} 蒼朮^{蒼朮} 川

芎^芎 蔓荊子^{蔓荊子} 細辛^{細辛} 各五 黃柏^{黃柏} 木香^{木香}

柴胡^{柴胡} 升麻^{升麻} 其^其 各三 生薑^{生薑} 棗^棗 入煎^{入煎}ニ

服ス^{服ス} 巔頂痛^{巔頂痛}必ス^{必ス}蒙本^{蒙本}柴胡^{柴胡}防風^{防風}ヲ

用^用

風熱^{風熱}痛^痛 川芎^{川芎} 白芷^{白芷} 石膏^{石膏} 煨^煨 荆芥^{荆芥}

各等分^{各等分}細末^{細末}ニ^ニ一^一瓦^瓦ヲ^ヲ湯^湯ニ^ニ用^用ユ^ユ ○寒

濕痛^{濕痛}ニハ^{ニハ}紫蘇^{紫蘇} 川芎^{川芎} 花椒^{花椒} 茶^茶 葱^葱 頭^頭 水

煎^煎ニ^ニ頭^頭ヲ^ヲ蒸^蒸テ^テ一^一刻^刻多^多ク^ク衣^衣服^服ヲ^ヲ蓋^蓋汗^汗出^出

テ^テ愈^愈

半^半汗^汗頭^頭痛^痛 頭^頭偏^偏痛^痛也^也 石膏^{石膏} 熟^熟 牛^牛 旁^旁 子^子

各^各三^三 細末^{細末}ニ^ニ酒^酒ヲ^ヲ調^調微^微醉^醉ホト^{ホト}ニ^ニ用^用テ^テ汗^汗ヲ

出^出ス

○又方^{又方} 白芷^{白芷} 天南星^{天南星} 各一 川烏^{川烏} 頭^頭 半

夏^夏 各^各八^八 細末^{細末}ニ^ニ每^每服^服一^一瓦^瓦水^水ニ^ニテ^テ服^服ス^ス 婦^婦 人^人

甘^甘 草^草 一^一瓦^瓦 加^加フ^フヘ^ヘシ

頭痛^{頭痛}週^週身^身癢^癢 コ^コレ^レ風^風火^火也^也 雄^雄 黃^黃 三^三 瓦^瓦 輕

粉^粉 一^一瓦^瓦 白^白 礬^礬 黃^黃 柏^柏 川^川 椒^椒 各^各二^二 醋^醋 二^二 碗^碗 入

煎^煎ニ^ニ半^半分^分ニ^ニ渣^渣ヲ^ヲ去^去週^週身^身ノ^ノ痒^痒ト^トコ^コロ^ロヘ

刷^刷 擦^擦 ツ^ツク^クヘ^ヘシ

頭^頭 風^風 偏^偏 痛^痛 正^正 痛^痛 遠^遠 近^近 ニ^ニ拘^拘ズ^ズ 此^此 方^方 ヲ^ヲ 用^用

白^白 芷^芷 川^川 芎^芎 各^各 三^三 細^細 末^末 之^之 黃^黃 牛^牛 腦^腦 ヲ^ヲ 和^和

合^合 磁^磁 器^器 ノ^ノ 内^内 ニ^ニ 入^入 シ^シ 酒^酒 ヲ^ヲ 加^加 ヘ^ヘ 能^能 煮^煮 テ^テ 食^食 ス

へし盡く食し其煮タル酒ヲ飲醉テ睡
テリテ後酒醒ハ其痛ヲ失フ

○主方 葛根一分 柴胡五分 黄芩 黄芪
羌活 川芎 白芍 蔓荆子 甘菊花

各一分 黄連 甘竹一分 甘竹生各 藁本一分
蒼朮一分 升麻三分 葱白二 水煎之服ス

○方 皂莢子七粒 薏苡仁三分 奇良
四兩 水六碗入三碗ニ煎之次ニ水四碗入テ
二碗ニ煎之服之

偏正頭風 男女筋ヲ連痛極テ甚者ニ
ハ花神ヲ細末ニシテツ、湯或ハ酒ニテ
用ニ數服ニノ愈

○又方 雄黄 細辛 細末ニシテ許鼻ノ
中へ吹入ル九痛ニハ右ノ鼻孔右痛ニハ左
ノ鼻孔ニ吹入ルヘシ○頭風左ニアルハ風ト

血虚トニ属ス風者荆芥薄荷ノ類ヲ用
○風熱者荆芥白芷麻黄各一分 陳皮一分
蒼朮一分 甘竹一分 水煎服ス○血虚者

川芎當歸各三分 荆芥防風白芷黄芩酒
薄荷蔓荆子各一分 煎之服ス○頭風在右
痰ニ属ス蒼朮半夏ノ類○湿痰頭風

ニハ酒製黄芩三分 蒼朮四分 川芎細辛
各二分 甘竹一分 為末生姜ト茶橘白 服ス

○頭風属火酒製黄芩ヲ主トシ陳
皮半夏白茯苓甘竹薄荷川芎細辛
ヲ依トシ煎服ス○年久頭風ニハ天麻白

芷半夏川烏頭南星各一分 甘竹三分 生姜
五片水煎服ス或末トシ生姜湯ニテ服ス

諸頭眩 凡眩暈諸症アリ類ヲ分テ療
治スヘシ○風熱虚眩薄荷川芎各一分 荆

○風熱虚眩薄荷川芎各一分 荆

○風熱虚眩薄荷川芎各一分 荆

芥六分羌活 甘竹焙 白芷各五分 細辛防

風各三分煎服

○風寒上厥眩暈各二分 附子生 白朮川芎

各一分 肉桂 甘竹各五分 生姜三片煎服

○暑火眩暈各二分 陳皮 半夏 白茯苓

甘竹人參 白朮 山梔子 黃連 川芎

煎服

○傷濕眩暈各二分 白茯苓 白朮各二分 甘

竹 乾姜各二分 水煎空心服

○氣虛眩暈各二分 宿砂 木香各七分 白朮

煨 陳皮 半夏 白茯苓各二分 丁子十四粒

甘竹各八分 生姜三片水煎食後服

○血虛眩暈各二分 右ノ氣虛方ニ當飯川

芎肉桂ヲ加ヘ用ユ

○痰火眩暈各二分 大黃酒ニ浸シ 九蒸

九晒細末 水ニテ苧 苧丸 大サニ丸 一度

ニ百粒食後 又臨卧清茶ニテ送下治

スル神效アリ

○耳疾諸症

耳聾 精氣調和スルトキハ腎臟ツヨク

盛ニ五音ヲ聞モ血氣ヲ勞傷ニ兼

少ニ風邪ヲ受シハ腎臟ヲ損ニ精脫ノ

耳聾トナルナリ上好新鉄小キヲ三塊

ヲ口中ニ含咬好磁石ニツニテ兩ノ耳

ヲ塞静ニ坐スレバ其耳忽鳴テ通ス

頃刻ニ通スル者アリ右ノ法ヲ數日

用テ通スル者アリ

○通耳丸 牽牛及腎虛耳内風水鍾

鼓ノ声ヲ作者ヲ治ス穿山甲 大者二片 粉ヲ以テ炒

穿山甲ヲ用ユ 蝎稍 麝香少 細末

之麻油ヲ入テ子リ丸ニ綿ニ裹テ耳ノ孔
ヲ塞ヘシ

氣閉耳聾

耳聾 耳逐 各五分 麝香 分

研テ細末シ葱ヲ管ニテ藥ヲ入耳中ヲ
塞ハ八愈

鼻塞耳聾

柿餅 其法糯米洗一斗ニ大ナル
乾柿五十八掛テ粉ニシ蒸

テ餅トス 切テ細シ糠米三合ノ内ヘ入レ粥ニ煮
テ空ニ食之

耳虛鳴

薄荷生葉十四枚ニ全蝎十四

麝香少 畏之瓦上ニテ焙乾シ共ニ研テ細
末シ水滴ヲ入テツク子耳ノ内ヲ塞クヘシ

極テ效アリ

耳内腫痛出膿及黃水

大人小兒トモニ

此方ヲ用ユ 枯礬 五分 胭脂 紅花ヲ用
麝香 五重 陳皮 燉灰 共ニ細末シ先綿

棍ニテ膿ヲ取テ此藥ヲ耳中ヘ吹コム

ベシ

又方

銅鐵ノ香炉ノ蓋ノ上ニアル香

烟ノ塊ヲ取輕粉ニ和研為末菅管ニ
テ藥ヲ吹入ヘシ

又方

金絲岬ノ葉搥テ汁ヲ絞滴

テ耳ノ内ヘ入即傾出スヘシ日ニ三度ニ
シテ愈

耳爛

陳皮 燉灰 輕粉 三分 麝香 五

共ニ研テ耳ノ内ヘ吹入レハ即乾クナリ

耳痛生瘡

昆布 蘘朮 甘草 生

蒲黃 竜胆 各二分 連翹 牛蒡子 黃

連 黃芩 當歸尾 甘草 炙 生地黃
各三分 柴胡 黃芪 各四分 桔梗 五分 紅花 少
桃仁 三法皮末 另研 右水二碗入一碗ニ煎シ食

後二服々寒藥大便ヲ利藥ヲ忌ヘシ
耳中出血 竜骨ノ末ヲ耳ノ内ヘ吹入
レハ即止

○眼疾諸症

目疾總論 其症七十二種アリ治之
法其源ヲ究ヘシ大約紅ヲ為熱白
ヲ為冷瘡ヲ為風淚ヲ毒氣ノ作
トス風ナレバ散之熱ナレバ清涼之冷ナ
レバ温補之氣結ハ調順之刀針ヲ用
ユルナカレ偶愈モ僥倖ナレモ倘不然
身ヲ終ルニテノ患トナル又涼藥ヲ多
ク用ユルナカレ怒ハ其血凝テ不流亦
痛疾トナル 俗ニ云ニ凡ノ老少氣體ノ
虛實ヲ量テ藥ヲ用ユベシ又腎虛者
アリ眼目光ヲ失フ或冷翳ヲ生ス下部

ヲ補ヒ煖メ其腎水ヲ益ベシ自愈又
北方ノ人ヲ治スルハ南方ノ人ト異ナリ北
方ノ人ハ眼ヲ患者最多シ皆日々ニ
風沙ヲ冒寒國ニニ夜火ノ邊ニ眠ル
故ニニ氣更蒸テ眼ヲ疾治之寒藥
ヲ多ク用ユ北方ノ人ハ稟受原南方ノ
人ト不同也婦人ヲ治スルニ又男子ト異
ナリ蓋其藥中ニ胎ス傷産ヲ墜モノ
アリ懷妊カモコレヲ除去ベシ當飯ヲ主
藥トシ血ヲ活ベシ其餘ノ藥症ニ對シ
用ユ小兒ノ眼疾ハ又大人ト異ナリ胎
毒多シト知ベシ其母孕タル時熱物遠
食スレバ其兒眼ヲ患フ生テ百日一週
ヲ過タリ疔胎毒トノ療治スベシ一二歳
ノ後眼ヲ患者ハ是煎炒熱物ヲ好

食テ五臟ニ毒ヲ受攻冲^{カキ}ニ眼ニ發ス
 凡^{ハラン}孩童ノ眼疾ハ有^テ實症無^ニ虚症熱
 多ク冷ハナシ若^モ眼ヲ疾^ラ稚^ラ子ニハ吹^ス點ノ
 藥ヲ用ユベカラス 俗云カケスリ洗
カスリサレケスリ名也 恐^ラクハ血
 氣イニダ定ラズ其目ヲ傷^フ一^ツヲ致ス冬
 敗毒散ヲ用テ治之ベシ又痘瘡疹瘡
 ノ後毒氣心肝ノ二經ニ鬱^ル結^シテ其
 毒氣池^ルル^フアタハズ眼ニ攻^テ腫^テ瞳^子ヲ
 傷^ム素^{ヨリ}無^ニ治^法

○眼疾通治方 荆芥 羌活 甘州 甘
 菊 防風 蔓荊 黃芩 當歸 山梔子
 赤芍藥 白芷 乳香 沒藥 各一^分
 全蝎 三^個 水ニ碗入^テ碗ニ煎^シ空心ニ
 服ス凡^レ眼疾初^テ起^リ十日餘ニ至^ルニ急
 ニ一^二劑ヲ服スレハ三^トコロニ愈^スト云
 コトナシ藥味ヲ意ニ隨^テ加^減スレハ却
 テ不^驗

眼痛

鷄肝^{水ニ落サレ} 蓮葉^{乾燥シ研テ}
 湯膽^{七分} 肉豆蔻^{五分} 已上三味ヲ粉^ニ
 石ノ鷄肝^ノ肉ニ入^レ飯^鍋ノ上ニテ蒸^熟
 シテ食^之初^テ膳^{タル}者モ多ク服^スハ
 能^ク愈^ク也

目珠至晚疼甚

夏枯草 香附子^{各二}
 共ニ細末^シ一度ニ一^分五分ツ、茶清ニテ
 服^ス三四日ニノ頓^ニ愈^ス

虚眼

氣惱怒^ニ因^テ肝^經ヲ傷^リ或
 患^シ想^苦勞^ノ氣^血兩^ナカテ虚^ノ眼^ヲ
 ナリ則^チ 當歸^三 生地黃 赤芍藥^{各四}
 川芎 甘州 各一 水ニ碗入^テ八分ニ煎^シ空
 心ニ連^服ス三四劑ニノ自^愈

火眼 當飯黃芩 連翹 菊花 山椒

子 生地黄 各一分 赤芍藥 柴胡 青皮

川芎 防風 竜胆 各八分 桔梗 羌活 各七分

黃連 五分 甘草 五分 燈心 二十 石水煎服

風爛眼 白梅 一箇 核ヲ去 綠礬 少許

山椒三十粒入古錢二文ニテ白梅ヲ夾ミ

苧麻ヲ以テ紮住 魚根水ニ浸テ此水

ニテ洗フベシ 魚根水トハ井ノ水ツルヨリ傾ケテ

若シ瘡瘡出ル時此症アリバ右ノ方ニ小キ黒

豆ヲ小兒ノ歳ノ數ホト水中ヘ加ヘ湯ヲ煮テ

眼ヲ洗フベシ 患接スルニハ爛眼ノ洗クスリハニキフタ

準 ハカリヲ洗テ目珠ヲアラハスニテ佳此方モ

眼流冷涙 菊花 蜜蒙花 石決明

芍藥 甘草 木賊 去節 白蒺藜 去刺 各

等分細末ニ毎服一匁二分ヨリニ匁ニ至テ

止茶ニテ用ユヘシ

○凡眼昏暗或冷淚ヲ流スニハ夜半ヨ

リ後目覺タル時口ヲ開キ言サル唾ヲ

眼ニ搽ツテ是ヲ久シク用ユル自愈

眼中起星 葶藶ヲ槌碎水ヲ入紙

ニテ漉タル汁ヲ取晒シ粉ニテ乾

テ許眼中ニ點ヘシ

洗眼方 自身ノ小便熱ヲソムニ眼ヲ

洗イ拭テ少頃目ヲ閉ベシ自愈

○雪水ヲ貯六月六日鹽ニ淋過シテ

置一切眼病腫痛時泡湯ニ頻ニ洗

ハ即效アリ常ノ鹽湯ニテ洗フモ亦好

冷水ニテ洗フヲ思

○又方 黃連 當飯 朴硝 各一分 明礬

三分 杏仁 七粒去尖 郁李仁 四分去尖 銅

○四十一

青三分 水二碗入一碗二煎之外人乳一
小盞ヲ加へ先薰ニテ後洗フハニ數度ニ
シテ神效アリ

之毎月洗眼法

朴硝六分 淨水一碗入之

分ニ煎シ澄テ眼ヲ洗スベシ年久ク眼

不明者モ能ク治スルナリ洗日身ヲツクシテ

奇效ノ心ヲ清シ思慮寡クスヘシ其驗ハ

如神 每月洗眼日 正月朔日 二月朔日

五月朔日 六月朔日 七月朔日 八月朔日

九月朔日 十月朔日 十一月朔日 十二月朔日 右日

ヲ選テ朴硝湯ニテ洗フベシ

明目補腎兼治筋骨疼痛 小紅棗十二

冷水ニテ洗淨帶ヲ去リ枸杞子一小馬

大豆四分 水二碗入一碗二煎シ早晨空

心ニ藥味ト煎湯ト共ニ食スヘシ

又明目方 枸杞子三菊花七去毒

每朝白湯ニテ用エ久服スレハ青盲目モ復

明ニナルヘシ

赤眼暴發腫痛 先藍染ノ布一切水ニ

浸シ洗テ乾シ白礬ノ末ヲ生薑汁ニテ

解右ノ布ニ蘸シテ眼胞ノ上ニ搭目ヲ

閉テ少頃スレハ淚出痛即止也

凡赤目ヲ疾人ハ熱湯ニテ足ヲ濯テ

佳若身ヲ浴スレハ必明ヲ失フヘシ犬雞

魚鴨蛋ヲ食スルト大ニ忌ヘシ

雀目治方 菊花乾 黃連各三 夜明

砂七分 右細末シ水ニテ胡椒ノ大サ三丸シ

鹽湯ニテ七粒ツ用ユ

尖手毛倒睫 サカミツダノ也木鱉手一ツ

翳ヲ去粉ニ綿ニ裹テ眼ナレ右ノ鼻

孔ヲ塞キ右ノ眼ナレ右ノ鼻ノ孔ヲ塞ヘシ

一二夜ニテ睫毛自上下ニ分レテ愈

點眼方

カク藥サシ藥也 羊胆一ツ割

用蜂蜜二入入線ニテ紫兩手ニテ揉水

ニテ一滾煮テ即取出シ冷水ニ半日

浸シ水ヲ去祖ノ内ノ汁ヲ傾出シ眼ニ

點ベシ七十二種ノ眼疾ヲ治スル一妙也

○又方 凡目ノ中努肉赤筋及腫障

蔽アルニ白丁香ヲ用テ初産男子吞

又此方ヲ用テ面ノ雀子班ニ傳テ障

雜物入目 東塘上ノ馬齒莧ヲ取テ灰ニ

燒措頭ニ少許點スヘシ即出ル一妙也

○鼻疾諸症

鼻塞 凡鼻フサカハ外感ニ因又ハ内火

熾ニ因此方何ノ病ニテモ鼻塞リ香臭

ヲ聞カレニ用テ效アリ 通州 附子湯

細辛 細末ニ蜜ニテ丸ニ綿ニ裹ニ

鼻孔ヲ塞ベシ立ニコロニ通ス

鼻淵 腦漏トモ云風寒ニ因豆腦ニ

入太陽經ト濕熱交蒸テ此症トナル

鼻ニ清涕ヲ流シ或ハ黄水ヲ流

落ニ濕ニ乾一十キ也 白芷 一兩 蒼耳

子 炒 辛夷仁 各ニ分 薄荷 五分 細末ニ

葱茶清ニテ調ヘ食後ニ服ス

○又方 鷓鴣不食艸 鼻孔ヲ

塞ハ涕自止

○又方 藿香末一兩猪胆一個共ニ熬

テ膏トシ丸ス一度ニ二錢食後ニ百

滾湯 白湯ナリニテ服ス如日夕ニクニテ

頭眩虚暈不巳ニハ補中益氣湯ヲ用

テ源ヲ滋バ愈ヘシ

鼻紅 好古酒ヲ熱ノ足ヨリ浸シ洗テ

臍蹠ニ至テ洗ヒ汗出ルヲ度トス

○又香高ヲ搗絞汁ヲ服シ其渣ニテ

鼻孔ヲ塞グヘシ

○又方 孩児菊 檉蘭 搗爛シ汁ヲ取

酒ニ和テ服ス渣ニテ鼻ヲ塞グヘシ

○又鷄子清ヲ多ク食スレバ皆效アリ

○乱髮燒テ性ヲ存シ火毒ヲ去リ井ノ

水ニテ一々五分服シ再髪ノ灰少キト

麝香少入鼻中吹口ニ外ニ紙一張

以テ摺冷水ニ浸湿シコレヲ頂上ニア

テ熨キテ其上ニテ一ニ重ノ紙カハ

カハ即止

○又方 麥門冬 白芍藥 荆芥

山梔子 連翹 甘草 生地

黄芩 右煎服ス止血後調理ニ此方

ニ黄芩知母ヲ加マ

鼻瘡 百洲霜研細ニシ三夜冷水ニ

テ服ス

○又杏仁 去皮 乳汁ニ和テ鼻瘡

リツク

鼻痔 俗ニ云 瓜蒂 炒 耳遂 枳

椽 五分 松香 五分 右粉ニシ香油ニテ

硬ク丸シ松香ヲ衣トシ一粒ツ、鼻ノ

中へ入痔ニ點スレハ臭水ト化ノ一日ニ

度ツ鼻爛下テ愈

酒齋鼻 サクロハナ也血熱入肺也症ト

ナル苦參 當飯 酒糊ニテ桐子

大サニ丸シ食後ニ熱茶ニテ八十粒ツ、

吞ベシ一初ヲ用盡セバ即愈

○又方 穀樹脂ヲ採テ鼻ニ度々捺塗スル能散紅

○中舌諸症

口瘡 口瘡ノ涼藥ヲ服ノ愈サル者

中焦ノ土虚ニ属ス土八脾且相火衝上

テ無制理中湯ヲ用ユベシ人參白朮

甘草ハ土ノ虚ヲ補ヒ乾姜ハ火ノ標ヲ

散ス或キトキハ附子ヲ加フ或ハ肉桂

ヲ嚙モ亦妙也

○又方 黄連乾姜等分細末シ口瘡

ニ捺塗ス之涎流テ自愈

口瘡 紅棗十黑燒ニシ竜腦二分梅

右研和吹ヘシ

口破 水ニテ漱フ禁ベシ滑石一分辰

痰 鷓鴣口ニ傳テ妙也

口唇燥裂 橄欖ヲ湯ニ漬テ服之同

核中仁ヲ研爛燥裂タル處ニ敷之或

ハ臍脂ヲ敷之平トコロニ敷アリ

口中生草 用醋コラ漱ス茄大ナルラ 鹽

即愈

口臭并狐腋體氣 丁子 藿香 麝香

香附子 甘松 零陵香 白芷 當歸

桂心 白豆蔻 栝柳 益智仁 各等分

煉蜜コ桐子大サニ丸之毎日五丸ツ

嚙化ス一日ニメ口香二日ニメ身香三日ニ

メ衣香シ

舌出血 烏賊骨 蒲黃 研末ノ傳

○又槐花炒黃色ニシ粉ニシテワリカクヘシ

舌平長大 竜腦ヲ研テ敷ヘシ即収

舌腫満口 蒲黃末ヲ舌ニテワリカクヘシ

○又錫礬煉ヲ研テ細末ニシテ白酒ニシテ
調塗ベシニシテコロニ腫消ス

重舌木舌紫舌 大人小兒共ニ皆心火

安ニ動ヨリ起リ結成重舌木舌紫舌

腫硬シ語言不利者ニ此方ヲ用ユ黃

連山梔子荆芥黃芩連翹木通薄

荷牛蒡子各一分 甘草五分 燈心廿根 水ニ

碗入八分ニシテ食後ニ服ス

○又方 醋ニテ薄荷ノ末ヲ解トキ 日餘

テ涎ヲ出スヲ救度コノ愈煎炒ヲナ

日餘忌ベシ又治單蛾双蛾

苦腫出火能入 萬麻子油紙ニ蘸シ燃

テ火更ツテ薰ヘシ即収

○齒牙諸症

齒牙痛 母溪曰牙疼者乃陽明胃

經去屬スルナリ風熱上侵トキハ感スル

所アリテ拳アツク 有熱有風有寒有蟲

有濕熱皆能痛ヲナス

齒痛 石膏三分 生地黄 升麻各三

黃連二分 牡丹皮 當歸各一分 右水煎

ニ服ス

○又方 燒酒半盞馬牙三個燒紅シ

酒ノ内ヘテ洋酒ノ冷タルトキ馬牙ヲ

去テ以酒上テ疼処ヲ漱キ吐出セハ

トコロニ痛止ル咽ヘ吞ヘカクヘシ

○又方 荔枝一個殼ニ孔ヲアケ鹽ヲ

入テ填黒燧ニノ細末ニ齒ニスリツケ片

時ホト含^ミ再^ニ防風山椒耳州浮麥ヲ煎^シ口漱^ハ即愈

○又方 黃連生薑共子^ヲ燻^シ之^ヲ縫^フ二付^テ亦止

○又方 橄欖一個磁器^ニ入^テ黑燒^シ之^ヲ胡椒七粒入^テ共^ニ研^テ粉^ニ綿^ニツ^ク之^ヲ痛^ル処^ヲ塞^グ之^ヲ一飯^ノ頃^ニ即愈^ス但多用^ユハカラス

○又方 蟲牙痛^ニモ妙也 雄黃^一華^一擦^ル各^ニ麝香^ニ分^ニ共^ニ細末^ニ磁罐^ニ入^テ置^テ疼^時指^ニテ^テ藥^ヲヒ^キリ^ツ多^ク之^ヲ方^ヲ滑石^六分^ニ耳^ノ中^ニ一分^ニ研^末ト^リツ^ケテ^テ愈^ス

喪^テ牙^痛 龜腦^五分^ニ白^{茯苓}一^分粉

又方 松脂^一煨^テ乾^シ之^ヲ虫^ノ牙^ノ孔^ニ塞^テ之^ヲ少^頃頂^ニシ^テ虫^出テ^テ脂^ノ上^ニア^リ即^愈

齒^縫出^血 薄荷^一天^花粉^一連^翹桔^梗各^一分^ニ水^煎之^ヲ服^ス

胃^經實^火上^攻齒^縫或^ハ牙^根作^腫血^出不^止 黃^芩一^分黃^連一^分生^地黃^一分^ニ牡^丹皮^一分^ニ

升^麻一^分石^膏一^分各^一分^ニ水^煎之^ヲ食^後三^服又^ハ胃^中虛^火動^牙齦^腐爛^以致^淡血^滲流^不止

不^止 芦^薈一^分柴^胡一^分胡^黃連^一分^ニ黃^連一^分牛^旁子^一分^ニ去^參一^分桔^梗一^分山^梔子^一分^ニ

石^膏一^分羊^角一^分薄^荷一^分各^一分^ニ甘^竹一^分麻^分各^五淡^竹葉^十枚^ニ水^煎之^ヲ食^後三^服

牙^痛一^切主^方 石^膏一^分荆^芥一^分防^風一^分牡^丹皮^一分^ニ生^地黃^一分^ニ青^皮一^分甘^竹一^分

水煎之食ヨリ遠ク温服又加味法○上ノ
正中齒痛ハ心火ニ属ス黃連八分麥門
冬一々二分加○下ノ正中齒痛ハ腎火ニ属
ス知母鹽散黃柏各八分加○上兩邊牙痛
ハ胃火ニ属ス白芷八分川芎一分二分加○下
兩邊牙疼ハ脾火ニ属ス白朮八分白芍
二分加○上兩邊牙疼ハ膽火ニ属ス羌
活一分竜胆竹八分加○下兩邊牙疼ハ
肝火ニ属ス柴胡山梔子黑炒各一分加○上
右邊牙疼ハ大腸火ニ属ス大黃酒製
枳殼各一分加○下右邊牙疼ハ肺火ニ属
ス黃芩桔梗各一分加○右症ニ隨テ加味
シ煎服之徐々ト漱下ス三帖ニ即愈
油煎煎炒鴨蛋糟醋酒ノ類火ヲ至
ス物ヲ忘ヘシ

牙齦腫痛

生姜黃連搗爛シテ貼ヘシ

齒疎陷物

齒ノ間スキテ食物夾ナリ

苧其石煨

寒水石生

細研テ少ツ、擦ス

取痛齒法 白馬尾ヲ燒テ灰トシ齒ニ

テ用テ牙ヲ刷齒ヲ漱一ハ忌ヘシ

取痛齒法

白馬尾ヲ燒テ灰トシ齒ニ

點スヘシ即脫ナリ但シ輕々ニク點スヘカラス
好齒ニ着バ亦落ル也新シキ筆尖ニ此藥
ヲ一二厘添テ點スヘシ或ハ痛或ハ動ク齒
ノ上ニ用ユ先筋ニテ上ノ唇ヲサヘ用
テ藥ヲ點スルナリ

咽喉諸症

咽喉通治

其症十八ニ分ツ所屬熱内ニ

結スルニ因テナル也

○主方 喉初テ腫痛ヲ治ス荆芥防風

牛蒡子 射干 黄芩 枳殼 独活 金銀花
牡丹皮 生地 黄天 花粉 各等分 燈心 竹節
入水煎之服ス

○同粉藥方 蜈蚣 頭ト脚ヲ去テ米ト同ク炒
末ヨク熟スレハ止

辰砂 研テ細ニス
飛ス各五分 乳香 沒藥 俱ニ去
研 雄黃

各一麝香 二分 右細末ニ和勻 大人ニ七八
分 小兒ニハ三四分ツ、前ノ煎藥ニテ用ユ

或ハ酒ニテ 送下ス

○同嗽藥 薄荷 三四極テ細ニ
末ト別ニス 硼砂 二分
分

雄黃 三分 孩兒茶 一分 竜腦 三分 共ニ研斤

極細末ニ薄膏末ヲ入和勻確ニ貯テ

藥氣ヲ泄スヘカラス 芦管ニ此粉藥ヲ

少許入テ喉ニ吹入チリ或ハ茶匙ニテ舌

上ニ挑ケ火シ嚙テ嚥下スヘ一日ニ八九度

用ユ 鎖喉風 コウヒノニハカニ發シテ
ニハカニ入ラズ 口ノ内乾モノニハ

井水ニテ此藥ヲ調ヘ灌ヘ即閉ヲ開テ

津ヲ生ス若脾胃弱泄者ニハ多用ユヘカ

ラス其外ニ忌ムナシ

○便藥 薄荷 三四研テ極細
ニ別ニス 硼砂 雄

黃 各五分 孩兒茶 三分 竜腦 五分 青黛 一分

共ニ細末ニ薄膏末ヲ入生蜜ニテ子リ合

セ確ニ貯テ氣ヲ泄スヘカラス用時黃豆

大サニ丸シ臨臥ニ一丸夜半ニ一丸其者ニ

ハ三丸口ノ内ニ嚙藥自化ルヲ待テ嚥下

スナリ湯水ニテ用ユルケカレ脾胃弱者

ニハ多用ルルヲ忌ム 小兒ニハ半粒
用ユ

喉閉 喉腫ヲサガル也 石膏 燒紅シ各五
出ス

菊花 杏仁 各五分 麥門冬 一兩 犀角 四分

水三碗入一碗半ニ煎ニ蜜一小盞加ヘテ

緩々ト服スレバ喉即開ク若急ニ藥無

之時ハ紫髮及繩ヲ以テ手ノ大指ヲ入ル
針ニテ甲邊ヲ刺血ヲ瀉リ出セハ喉即開

喉腫痛 耳竹 貝母 黃芩 黃連

薄荷 川芎 各一 桔梗 三五 玄參 二五

水煎服

○又方 扁柏葉 雪裏靑 山豆根

皆搗テ汁ヲ絞服之效アリ

○喉腫ハ風ト火トノ分アリ風ニハ鶴風沖

ヲ含ベテ火ニハ玄參ヲ服スヘシ其苦水ヲ

舌下セハ即愈

双蛾單蛾 喉ノ間ニ癰小キ如ナル者腫

方ヲ生スルヲ双蛾ト云一方ニ生スルヲ

單蛾ト云 平地木 木蓮蓬 雪裏靑

各根ト葉ヲ取搗テ汁ヲ絞リ醋ヲ煎ジ

サレシモノ汁ヲ入鵝卵ニ蒸シ喉中ヲ掃又

此汁ヲ許含ミ漱天吐出六即愈

○又方 醋ハカリニテ漱ク一三五次スヘシ又

天蘿水ヲ吞ヘシ皆效アリ 天蘿水方痰 嗽口見タリ

○又方 荔枝竹 ツルイシテ 蔓ナリ 搗爛ニ醋ヲ加ヘ

テ綿ニ裹ミ上唇縛喉中へ入ルテ救次ニ愈

喉癰腫脹不進水穀 胆礬三厘口ノ内ニ含

涎ヲ吐出セハ愈

喉癰 百杓霜 枯礬 研細末ニ喉ノ内

へ吹入レハ自愈

喉痺 竜腦 五分 明礬 生三 鹿射香 五

石膏 一々 細末ニ吹入テ涼スレハ即愈

石通治ノ外ニ伏ニ氣病アリ腎傷寒ト名

ク暴ニ寒ニ中テ其毒小陰瘰癧ニ伏ニ

始ハ衰テ不病日ヲ重テ乃ニ死ル脉微

弱ニノ咽痛次ニ必ス下痢ス此症ニハ辛

熱ノ藥ヲ用テ其本病ヲ攻其陰陽ヲ
順セバ水升火降テ咽ノ痛自ラ已又少陰
傷寒々々邪太陽ニ傳ヘ木柳葉射ニテ
内傷氣入格熱上リテ咽門經會ノ
如ニ行寒熱相搏テ喉痺トナルコノ
症ニ辛溫甘苦ノ藥ヲ以テ其標病
ヲ制スレバ咽自通ス此ニ症ニハ悞テ
前ニ出タル寒涼ノ劑ヲ用ユレハ救レズ
治療者慎テワキニヒルベキナリ

○心腹諸症

心痛

丹溪曰心痛者即胃脘痛

以新米殊ナルヲ分ツヘニ身ニ寒
氣ヲ受口ニ寒物ヲ食ノ病初メ發
ル時ハ溫散溫利ノ劑ヲ用ユヘシモシ
病稍々レクシテ藥ヲ減射スルトキハ

蒸熱大熱久シクハ必火ヲ生ス此

症ニハ溫劑ヲ用レハ火ヲ助テ病ヲ

添ナリ山梔子大ナルモノ七ツ或ハ九ツ

炒焦黃ヨノ水一盞入七分ニ煎シ生

薑汁一二匙加ヘ熱ノ飲之ニトコロ

ニ痛止此病日殺多ク不食ストモ不

死若痛方ニ止ハ便物ヲ喫ヘシ病安

クシテ後ニ恣ニ飲食スレハ再發シテ

難治

○治心痛方 乳香 雄黃 各二分 砂

糖 三分 好酒ニテ調下ス

○又方 蚌子殼七次煨醋ノ内ヘ入テ

滓研テ細末シ痛發ル時吹許舌

上ニ置酒ニテ送下ス

○又方 屋上猫糞炙乾シ末トシ之

酒ニテ下ス

○又方 胡椒七粒 菘菜豆九粒 研テ末トシ 燒酒ニテ下ス 不止再服ス 即止

胃脘痛

良薑

酒洗七次 焙研末

香附子

醋洗七次

焙研 寒ニ因テ登ルハ良薑末ヲ香附ノ末ス

一倍ニス怒ニ因テ登ルハ香附末ヲ良薑ノ一倍ニス寒ト怒ト兼テ登ルハ各

等分ニス清米飲ニ姜汁少許入テ右ノ藥ヲ服スヘシ

○又方 雄黃末一匁 烏梅肉三匁 小豆大サニ丸シ酒ニテ服ス 輕者ハ二九重者ハ三本

心氣痛 胡麻生ナク用 銅鑊アト子ナクニ入炒黒クシ細末ニ好酒ニテ送下ス 一服ニシテ除根痛時取来テ炒用ユヘシ

冷心氣痛 乳香五分火ニ炙テ油ヲ去 明礬五分

共ニ末トシ好酒ニテ下ス

○又方 良香 甘竹 川烏頭 肉桂 香附子 芍藥 煨 木香 各等分鹽少許入水煎シ温服ス

熱心氣痛 錫脐煤ナハスミ 三匁 童便トウビン 熱ニテ服ス 卽愈

蛔厥心痛 虫ノボリテ坐痛也 烏梅二個 川椒十四粒 煎湯服ス

真心痛 芭蕉葉ハセヲフ 搗テ汁ヲ取 白酒ニテ服ス

急心痛 陳皮 香附 吳茱萸 良香

石菖蒲各等分 水一碗入七分ニ煎シ茶碗ニ入香油三五滴入小盞ヲ蓋ニシテ藥ヲ淋下シ熱服スヘシ 卽愈

腹痛 腹痛ハ皆寒ニ由テ生ル惟大

便閉ノ一種熱ニ属ス陰症ニハ急ニ理中

湯ヲ用テ治之方ハ諸書ニ見タリ

心疼腹痛 五倍子生ニテ研細末シテ

鉄杓ノ内ニ入テ炒ク烟ヲ起シ黒色ニナル

時好酒一鍾ヲ入傾ク出シテ服之立効ニ

止ム臍下大ニ痛ミ人中黒色ナル者ハ多ク

ハ死ス

冷氣腹痛 吳茱萸ニク搗爛シ酒一

鍾ニテ調ヘ香油一小盞鍋ニ入煎シ熱シ

其内ヘ右ノ吳茱萸酒ヲ入テ一滾煎シテ

服スハ心車トコロニ止ム

○脾胃諸症

胃強脾弱 其症男女飲食運化スル

アハズ胸膈脹滿シテ不舒變亂嘔吐

酸ヲ作シ口苦舌爛痰アツテ頭眩スルニ此

方ヲ用ユ 蒼朮 二竹去芦片洗シ浸シ洗ヒ黒

ニテ粉ニシテ番 白茯苓 刺ヲ去炒黄ニテ

粉一升ヲ用ユ 山查子 飯ヲ蒸フ三火 右煉蜜一和

炒細末 桐子大サニ丸シ毎日食後巳申時白湯ニテ

七八丸ヲ服シ百九餘ニ至テ自愈

病後胃弱 蓮肉 炒米 各四 白茯苓

二兩 細末シ砂糖二兩加ヘ一度ニ五六匙

時ニ拘ス白湯ニテ服ス飲食スルアタハカ

ル者ニ用ユヘシ

胃脘嘈雜吐清水 陳皮 上々白ヲ去 清晨

寢所ヲ起坐ノ陳皮末五分ヲ羊ノ肉ニ

安 男ハ丸女 越テ喉ニ下ス又卧フナカレ三四

次如此シテ即愈

飲食不佳口易餓 菘豆 糯米 黃麥

各一升トモ共ニ炒磨ウサニテ粉ニシ酒杯サハシ一ツ之湯ニ
テ服ス三五日ニノ效アリ

心膈飽脹腹中又饑又痛 胡椒七粒研末
トシ好酒ニ入テ服ス立処ニ愈

胸膈飽脹腹中又饑又痛 胡椒七粒研末
トシ好酒ニ入テ服ス立処ニ愈

厚朴各五 川椒各五 猪肚一具アブラ 脂アブラヲ
去大蒜ヲ入線ニテ口ヲ縫スヒ冷水ト熱湯

ト各七碗入猪肚ヲ煮テ水乾カクヲ度トス
取出ト搗爛ト之右ノ藥ヲ細末ニコレニ和

テ丸シ毎日空心ニ湯ニテニムツク用ユ

胃脘不清將漸成噎膈 茯苓 陳皮

白朮陳皮 枳實交粉ニ 半夏製各

黃連派浸 沉香五々 厚朴十カ々 白茯苓

白豆仁四々 白芍藥一兩 人參一兩 各

細末ト一瓊糊ニテ桐子大サニ丸シ粥カクヲ喫

元後白湯ニテ百丸徐服スヘシ

膈噎嘔吐 芦根五兩切碎水二碗入煎

一碗空心ニ服メ即止

膈氣 沈香一々 細末ト之泉水イソミノ煎湯

ニテ徐ニルヤニ下ス

膈氣吐食 大ナル鯽魚一尾 腸カクヲ去鱗カクヲトメ

紙ニテ十重ニ包ニホミテ 平胃散一兩ニ和ト枳爛ト之蜜

ニテ桐子大サニ丸シ三十粒ツク米湯ニテ用ユ

翻胃吐食 樹上黃香圓キナヲ採テ糞フン内ニ

七日浸シ再童便ニ七日浸シ風ニアテ、乾

煎湯ニ入服ス

又方 仙人杖退竹也此ハ筍竹トナラントキ立死スル

煎之汁ヲ服スヘシ

又方 甘蔗汁一升ニ生姜汁二合入温

熱シ五次ニ服メ效アリ

噎膈翻胃鼓脹

沉香 紫葳子 陳

皮各二 肉桂一々 木香三々 蘿蔔子三々

俱三末トシ毎服三分狗宝クホウ一分加ヨキイソミ好泉

水ニテ通州ヲ煎シタル湯ニテ空心ニ服

老年翻胃噎膈 辛香ノ氣ヲ散スル

等ノ藥ヲ服シ過シ米粒喉ニ不下病

危キニ至ル者ニハ 狗宝イヌクシ 三々 牛黄真者 三分

人參二々 沉香上々 右細末ニ時ニ拘カハラス

少許舌ノ上ニ置テ嚙徐ニ嚥下ス一日

二四五分服スヘシ尤效アリ

○腰脇諸症

腰痛 杜仲 骨碎補 青鹽 共細

末シ猪腰子ノ内ニ入濕草紙ニ包煨ウイシ

熟シ好酒ニテ連服ス即愈猪腰子ハ猪ノ陰莖ナリ

腰痛曲筋難伸 山查子末三々茶酒又

八鹽湯ニ服ス

腰痛并或時閃挫 杜仲 破故紙 桃

肉各等分酒ニテ煎シ服ス

○又方 糯米モチコメ一二升炒極テ熱アツク囊

ニ入痛処ニアテ縛置ヘシ大茴香フスシ三々

細末シ鹽酒ニテ時ニ随服スヘシ皆效アリ

脇痛 草豆蔻炒 枳殼炒 赤芍藥

砂仁 香附子 烏藥 各等分水ニ碗

入一碗ニ煎シ温服

○又方 小茴香炒一 枳殼炒五 共ニ細末

シ七々以鹽湯ニテ服ス

腰閃 枳殼 桔梗各六 甘竹 紅花

各五分 防風 烏藥 當歸 杏仁炒去皮

半夏製 木通各一 右水煎シ服ス

○又方 凡打傷閃腰并ニ手足ヲ傷

損血ヲ出サス只青紫色ニ内傷者
ニハ先葱ミツカンシロミ白ヲ搗爛ミ之炒テ熟ク之痛
処へ遍ク擦ツケ次ニ生大黃シヲ粉ニ
シ姜汁シニテ調ツヘ傳ツ其人少シシ醉モトニ
酒シヲ飲ムトハ三箇月カ或ハ半年
ニテ不愈者ニモ用此法神驗アリ

腿痛 生地黃大五者二兩 何首烏十五

當歸身酒洗 白朮炒 金銀花 胡

麻各二 苁苁七々 牛膝十五 右好酒ヲ

用テ蒸熟ス之毎日空心スニ服ス半劑ヲ

以テ度トス

○木便諸症

大便閉 皂莢ヲ末トシ蜜ヲ煉水ニ

落シ珠トナル時皂莢ノ末ヲ入棗ノ大

甘丸斗年時ノ内ヲ塞ハ即チ通ス

○又方 麻子ヲ搗碎シ麝香三四重入

臍内ニ傳ヘシ

○又方 苦練子六煎湯ニノ服ス三ナ

之ルジアリ

腸風下血 清血ヲ下メ色鮮ナル腸風

ナリ血濁テ色黯モノハ臟毒ナリマタ腸

風下血ハ必ス糞前ニアリ近血ト名ツ

臟毒下血ハ必ス糞後ニアリ遠血ト名

○主方 生地黃 牡丹皮 赤芍藥

升麻各二 水二碗入八分ニ煎シ空心ニ

服ス

○又方 當歸 生地黃 熟地黃各五

小薊根一兩 酒ト水ト等分ニ入煎服

ス愈テ後十全大補湯十劑服スヘシ

方ハ諸書ニ出タリ異之

○又方 茅根多少ニ拘ス水煎シ渣ヲ去テ温服ス即止

○又方 豆腐ノイマダ袋ニ入テ濾出サルヲ渣トモニ取鍋ノ内ニテ炒黃色

ニ煉タルヲ研末シ紫色ノ血塊ヲ下ス者ニハ白砂糖湯ニテ清晨ニ三々ツク

服ス紅色ノ血塊ヲ下ス者ニモ同シ遠年下血面色黃瘦危者モ服之神效アリ毎日三次用ユ

腸風臟毒下血痔漏

黃連 槐花各

酒ニ浸シ炒四兩共ニ細末シ猪大腸一具

ニテ煮テ爛シ韭ヲ去テ猪腸ト藥

ヲ搗テ桐子ノ大サニ丸シ毎服八十九空

心ニ痛ム者湯ニテ用ユ

糞後下血 飛霜下血 時ニ冬 昔人子ヲ取

蜜ニ浸シ晒乾ス一三次ニノ空心ニ二三

粒湯ニテ吞ヘシ

脱肛 此症多氣虚ヲ主ル 人参 黃

芪 川芎 當歸 升麻 水ニ碗入八分

ニ煎シ食前ニ服ス 血虚者ニハ芍藥

地黃ヲ加フ 血熱者ニハ黃柏 炒加フ 虚

寒者ニハ黑煨乾姜ヲ加フ 外ニハ五倍

子末ヲ以テ托テ上之

○又方 蟬蛻ヲ焙黃ニテ細末シ脱肛

ヲ點スハ即收ル

○脱肛ノ人ハ杖箠ノ代ニ桑葉ニ枚ツ

皆市ニ用ユヘシ治スルノ效アリ

虚人脱肛 補中益氣湯ニ黃柏 知

母 蒼朮 黃芩ヲ加フ 肛門痒ニハ同方ニ

秦芫桃仁ヲ加フ大便閉ニハ皂莢ヲ加フ
痔瘡 苦參一斤 當歸四兩 雄黃三錢

白礬四錢 共ニ細末シ猪大腸一具ニ藥

朱ヲ入線ニテ兩頭ヲ紫テ罐ノ中ハ入

水ヲテ煮腸ノ爛タルヲ度トシ搥テ桐

子大サニ丸シ五十九ツ、酒ニテ毎日三

タヒ服ス。

○又方 牡蛎二兩煨過シ地ニ坑ヲホ

リテ埋メ之火氣ヲ去、研テ細末シ痔濕

アラハ糝ケヘシ痔乾ハ津液ニテ調ヘ

スリツケヘシ

痔漏 胡黃連二兩 穿山甲麻油ノ内ニ煮

石決明煨 槐花微炒 共ニ細末シ蜜ニ

テ煉麻子ノ大サニ丸シ一々ツク空心ニ米

湯ニテ服ス早晚ニ度用ユ重者ハ四十

日服メ愈ル方針刀掛線等ヲ用ル

ナク苦ミ楚ヲ受スメ誠ニ痼疾ヲ治ス

ル良方ナリモ之漏四邊ニ硬肉突起ル者

ニハ蚕繭ニナヲ炒研テ右ノ藥ノ内加フ

ヘシ遍身ノ漏ヲ治スルニ皆效アリ

○丹溪先生漏瘡ヲ治スルニ先補藥ヲ

用テ氣血ヲ生ス人參黃芪當歸白朮

ヲ主トシ大劑ニテ服之外ニ附子ヲ細末

シ津液ニテ解丸ク平メ錢ノ厚ニシテ

漏ノ上ニ傳艾ニテ灸シ微熱シ甚痛シ

トスルヲ藥乾ハ取易ヘシ困倦ハ即止テ

明日再ヒ灸セヨ肉平ニナラハ止ヘシ前ノ

補劑ヲ服シ漏ニハ生肌長肉ノ藥ヲフ

リカケテヨシ

○生肌散 五倍子黃名ニ炒 沒藥 乳香

孩兒茶 各一 白礬 飛過 共二細末五々 管ヲ用テ漏クダ瘡ノ口ニ吹入ヘシ

痔瘡便血 凡痔新久ニ拘ス肛門墜カハラ重シ大便ニ血ヲ下シ疼ヲナス者ニハ

防風 秦艽 當歸 川芎 生地黄 白芍藥 連翹 赤茯苓 絡石 枳椇子

甘草 山梔子 地榆 枳殼 槐角 白芷 蒼朮 各六 水ニ碗入八分ニ煎シ食

前ニ服ス大便秘結スル者ニハ大黃ヲ加牛奶痔 イボ 甄種殼 灰ニ燒研ニ細

末シ龜腦イボヲ入シクヘシ 洗痔方 五倍子 皮硝 煎スルノ數

十沸ニテ渣ヲ去熱ヲ木盆ノ中ニ入シ板ヲ蓋ニシ板ノ中ニ一孔ヲアケ痔ヲ

蒸ヤ入シクニテ後其湯ヲ手ニ掬ヤテ痔ヲ洗ヘシ湯冷シハ佳甚效アリ

○又方 枳殼一味煎湯前ノ如クニシテ蒸洗モ亦效アリ

○痔イニタ不破者ニハ茄蒂オモヒノク或ハ根ヲ晒乾シ煎湯ニシテ殺度洗ハ愈

點痔方 龜腦 五厘 熊胆 一分 蝟牛 一分 大ナル者一ツ殼ヲ去リ研ス 共二研テ膏トナシ水ニ滴ホ

ト入テ痔ニスルベシ酒又ハ風ヲ動ス物ノ類食スルヲ忌

○痔翻出ニハ大ナル田螺一個漆盒ノ内子置シ龜腦五厘ヲ田螺ノ共四ノ内ヘ入シ水

滴ノ下ルヲ鳥ノ毛ニテ痔ノ上ニ塗甚效

○小便諸症 小便閉 麥麩ヲ子リテ豚ノ外ニ圍ニヲ作り鯉魚鱗腸共ニ搗爛シ麝香ニ

分入レ生蜜四兩ニシノ和勻ニシトシノ孔ヲ填ウツメ圈
ノ内ニ滿シメ其上ニ碗ノ覆テ燻シハ立
トコロニ通ズ

○或ハ冬ニ葵子亦茯苓各ニ分水煎シ
食前

○又方 木通 生地黄 各ニ分 甘草 八分
水煎シ服ス皆效アリ

小便不通上脹垂危者 琥珀 四分 研テ
末トシ葱ヲ濃煎シタル湯ニテ二度ニ
用ユ漸々ニ通シテ自愈

小便閉腹痛難忍 木通 滑石 各二兩 研末
黑牽牛子 五錢 磨テ 共ニ和ニタツ燈心
葱白ノ 湯ニテ食前ニ服ス

○又方 車前草 旱生ニテ搗汁ヲ半盞
取蜜一匙入テ温服ス

小便不通肚腹脹悶 明礬 生細末ニ脩
ノ内へ入レ指ニ水ヲ蘸滴ヲ其上へ入レ良久
シテ即通ス

○小便澀痛ニハ牛膝ヲ濃煎シ酒ニテ
服スヘシ
五色淋病 薤菜ヲ搗テ汁ヲ取生白酒
ニ和空心ニ服ス其渣ヲ煎湯ニノ陰
ヲ洗フヘシ

熱淋有血 小便澀痛腰酸足軟三面ノ
色黄ニメ魚方精神倦怠久不止者ニハ
地榆 陳皮 白茯苓 側柏葉 桑白皮
炒テ 艾葉 生地黄 黃柏 鹽水浸 阿膠
蒲黃 炒 沙參 蓮房殼 各等 生姜一片
加ヘ水煎シ食ヨリ遠ク服ス

○又方 生地黄汁 一升 生姜汁 一合 和勻

服スルモ亦愈一切酒糟麴類炙炒山椒
生薑炙タル物海物ヲ忌ヘシ

○又方 乱髮ヲ黒燒ニシテ麝香少許入
白湯ニ醋ヲ加ヘテ調服スヘシ

○乾椀ツツ一升ハタ蒂核共ニ切碎キ砂鍋ニ入
水ニテ煮只湯ヲ用テ時ニシタカヒ服ハ一
日ニ服シ尽スヘシ枳殼ツツ介ヲ用テ自愈

肉淋 小便ニ濃ク塊リ
肉ノコトクナルヲ下ス 銀杏一年ニ一粒ツク
取咳用キ明礬カミ一ニ厘入無灰酒ニテ煮
熟シ酒共ニ服スヘシニ三服ニテ愈

小便血 地骨皮新シキヲ洗淨ノ搗テ汁
ヲ取若汁ナクハ水ニテ濃煎シタル汁ニ薑
ニ酒少許加ヘ食前ニ温服ス心腎ヲ清シ
鬱結ヲ開キ以テ分利スル治法也若專
濕補スレハ及テ濕熱ヲ生シ害ヲナスト多ク

白濁 小便多ク
ニシテ赤ク 薤子ハ兩ハ炒テ為末ハ空心ニ
酒ニテ一々三分ハ服ス

○又方 淡竹葉 地骨皮 桑白皮 蜜炒
各等分煎湯ニテ服スレハ即止

○又方 藕節多クニ拘ハス蜜ハ三ハ椀ハ飯上
ニテ蒸連服又三四次ニテ愈

○又方 車前ハ四兩ハ搗爛シ生白酒ハ三ハ汁
ヲ攪ハセ鹽少許入空心ニ熟服ス一二次ニ
テ愈小便道疼者ニ更ニ佳

○白濁淋疾痛忍ヘカラサル者ニハ羊角
ヲ燒テ灰トナレシム好酒ニテ服ス

遺精白濁 薤菜ニ介搗テ
汁ヲトル 牡蛎辛行以炭火
ニシテヤシクニ
ノ莖ノ外ニ浸
燉乾カシ 研テ細末ニ毎服三々空心ニ燈
心ノ煎湯ニテ服スヘシ

治遺精 白朮六兩 苦參 牡蛎 各三兩

○六十一

共ニ末トシ猪肚一具水ニテ煮爛シ藥末
ヲ入シ搗テ桐子ノ大サニ丸シ四十粒ツク一日ニ
三次酒ニテ服ス

○又方・蓮子心二反 硃砂一分 共ニ末トシ
空心ニ服シ愈

精滑不禁如油 牡蛎 竜骨各殿 白朮二兩

炒二兩 青鹽二反 益智仁二兩 蓮鬚二兩 艾實二兩

枸杞各二兩 香椿皮四兩 共ニ細末シ黃芪ノ

嫩カナル者小金櫻子刺ト核トヲ去リ一升

煎シ膏トナシ右ノ藥末ヲ丸シ毎日空心

ニ鹽少クタル湯ニテ二三々ツク用ユ

夢遺膏藥 川練子三反 竜骨一反 牡蛎二反

細末シ灸瘡ノ膏藥ニシテ下一寸

三分ニ貼ヘシ

○乳香指ノ大サナルス一塊卧時 出一 目醒テ 否之 救度ニ 有自 愈

○疝氣諸症 七疝總論 七疝ノ症各不同治モ亦有別

○寒疝ハ陰囊冷結硬如石陰莖不舉或ハ

畢丸ニ控テ痛ム濕地ニ坐卧シ冷水テ得

之温ヲ去ノ初ヲ用テ下之○水疝ハ陰囊腫

テ水晶ノ如ク陰汗痒シテ搔ハ黃水ヲ出ス

或ハ小腹ヲ按ハ水ノ声ヲナス 酒ニエイテ

房事ヲ行ヒ汗出テ遇風寒ハ陰囊中

ニ結スルヨリ得之逐水劑ヲ用テ下之○筋

疝ハ陰莖脹或ハ潰或ハ膿或ハ痛裏急

ム筋縮リ或ハ陰莖ノ中痛ム痛極ルトキ

ハ痒シ或ハ挺出テ不收精ノ如キ白物濁ニ

隨テ出是房事ヲ行フ邪術ヲ使所ニ

因テ得之心火ヲ降劑ヲ用テ下之○血疝ハ

狀黃瓜ノ如シ小腹ノ兩傍橫骨ノ兩端ニリ
俗ニ便癰ト名ツク今スベテヨコナキ是春夏ノ大燠
ニ重感シ内ヲ勞シ其氣流溢ノ膨脹ニ滲
入結テ腫ヲキス血ヲ和スル藥ヲ以テ下之○
氣疝ハ上腎ニ連リ下陰囊ニ及ヒ或ハ號哭
忿怒ニ氣鬱ノ脹氣ヲ散スル藥ヲ以テ
下之○狐疝ハ狀瓦ノ如ク卧時ハ腹ニ入リ行
時ハ出テ上下無定狐ノ惑力如シ故ニ名ツク
逐氣流注利ヲ用テ下之○癰疝ハ陰囊
大ニ腫不癢不痛是濕氣ヲ受ルニ因テ
生ス去濕利ヲ用テ下之

疝氣初起

鳳仙花陰乾 烏芋乾 等分

燒酒ニ浸シ日ニ二三鐘服ス

○又橘核去殼カラクテ末トシ之毎日空心ニ温
酒三ノ一ニ入服ス效アリ

○又方 山查子 荖子各五 枳實一 乾牛
入八分ニ煎シ熟服ノ被ラ蓋卧テ汗ヲ出ス
數服ニノ愈

諸疝發痛不可忍

荔枝核炒脆 細末シテ

空心ニ白湯ニテ下ス或ハ青皮山梔子吳茱
萸各等分ニ炒末シ加ヘテ白湯ニ調服ス
○又方 荖蒂末ヲ晒乾シ切片好酒ニ煮
テ服スハ自愈恙疝ニハ砂仁五分 加ヘ蒸テ
服ス上二方秋
同ハ不用

木疝

即木腎也凡人心火下降スルトキハ

腎水其温メサルヲ不患真陽下降スルトキ
ハ腎氣其不和ヲ不患温ニ且和セハ安ソ
木強ト云者有ニヤ木強ハ則傷腎ナリ故
ニ純モヲ燻カ藥ヲ用ユヘカラス温和散利メ
其邪ヲ逐トキハ邪自消シ榮衛流轉

愈枸杞子丸ヲ服スヘシ 枸杞子 昆布

吳茱萸各四 南星 半夏 白芷 山查子

神曲炒各二兩 滑石炒 蒼朮鹽炒 黃柏酒炒各三兩

共ニ細末シ酒糊ニテ桐子大サニ丸シ毎服

七十九空心ニ鹽湯ニテ下之

寒疝攻痛及偏墜偏墜ハ單丸カクタル云 老少ヲ不

論病在左荔枝核一歳一粒取タルヲ慢

吹ニテ煨テ石性研末ノ空心ニ好酒ニテ

服スヘシ按荔枝核年ヲ經タルモ妨ナレニキニ一粒ヲ取ラズ多敷服トナレニ服スニ 病在右小

茴香鹽水ニ浸シ炒研細末シ空心ニ三五

ツ燒酒ニテ服ス

○偏墜ニハ雞子一ツ尖ノ上ニ孔ヲ開硫黃

末ニ入火ニ煨テ炭トナシ研テ細末シ白

湯ニテ用ユ

囊癰凡ノ小膿瘻入ナレ陰莖ニ引寒熱少

熱以ク好テ熱湯ヲ飲スナリ氣ナリ

如陰囊紅腫癰熟ニ小便赤澁内熱口

乾キ墜重ノ作痛囊癰ノ候テリ疝ヲ

治スル熱藥ヲ用ユヘカラス

○主方 川芎 竜胆 天花粉 當歸

生地黃 柴胡 山施 黃芩各一兩

澤瀉 木通 甘州各五 燈心ヲ加ヘ水

煎シ食前に服ス

○囊癰潰後移藥 蚌殼 黃連 青

黛各等分 研末ノ糝ヘシ

陰囊癢 燥者ハ油核桃油ニテ潤シ之

濕者ハ五加皮千里光明葉劉寄奴各一兩

稀茶煎湯ニシテ洗之

○脚氣諸症

脚氣總論 脚氣ハ始濕ヲ受復風寒

暑熱ノ邪ヲ挾テ成故ニ先腿足ヨリ起
 テ必ス脚屈弱ク拳體轉筋之肢節疼
 テ足腫小暖不仁之心中悸動之胸滿
 小便澀但桑熱頭痛身疼ノ候絶々
 傷寒ニ似タリ人多ク得リ治ス仲景脚
 氣ヲ以テ類傷寒ノ症トシ別ニ篇目ヲ
 立テ以テ別之蓋為此也羅謙甫云南
 北ノ脚氣受病不同南方ハ早濕ノ地
 濕每ニ襲虚病下ヨリ起ル此脚氣ハ外
 ヨリ受ル也北方ハ地高クシテ無濕其俗
 澆乳酒麪ヲ多ク飲快ク食ヲ為能或
 ハ奉養太過之其濕ヲ滋水性潤下氣
 拘ルアタハス故ニ下テ足ニ注テ腫痛多
 ナス此脚氣ハ内ヨリ受ルナリ所因ヲ推キ
 ハメテ可治之

濕脚氣 足痛腫腫ニハ脚氣飲ヲ服

スヘシ 白朮炒 犀角 蒼朮炒 生地黄酒炒

黄栢酒炒各一匁 本通 防己 茯神 川芎

各ハ 甘草稍七分 水煎熟服ス有熱加

黄芩熟甚 天冷熱セハ加石膏疼ニ

加竹瀝姜汁或南星大便秘結セハ

加桃仁小便澀ハ加牛膝

○又方 蒼朮米泔水ニ浸 黄栢酒炒 牛

膝酒炒 水煎空心ニ服ス或ハ為丸亦

可ナリ

○又方 萊菔根葉共ニ煎シタル湯ニ

干洗又シ生ナル無之時ハ晒乾シタル者

モ亦可用

○又方 明礬二兩ヲ地漿水十大碗入

テ六七沸煎シ半分ヲ汲テ脚ヲ浸ル

半分ノ湯ヲ徐々ト添入テ洗ヒ上ニ云ク
重テ身ヲ圍微汗出ルハ愈薄粥ヲ喫
テ飲シムヘシ此方ヲ用テ如不愈前方
内へ硫黄三五加へ如前洗フヘシ效アリ
地漿水トハ地ヲ二三尺深ク掘其内へ水ヲ
傾入テカキマセ其水ノ澄タルヲ待テ取用ユ

風寒暑濕脚氣 風仙花葉ヲ晒シ乾シ

煎湯ニテ脚ヲ洗ヒ葉ヲ搗爛シテイタ
ムトコロヘシクシ

食積流注成脚氣 蒼朮炒 防己 黃

栝酒炒 白芷 犀角各一兩 栝柳 南星

川芎五兩 肥兒人三兩 貝母志 陳

皮各一兩 加フ若細末シ酒糊ニテ桐子ノ大サ

ニ丸シ毎服七十九空心ニ白湯ニテ二三

脚氣癰腫 馬鞭竹ノ煎湯ニテ二三

洗フヘシ即愈

爛之患処ヲコレニテ裹只脚指頭ヲ露
シ出ス

○虚腫六 槐花 山梔子鹽酒炒 為末空

心ニ米湯ニテ下ス又脚瘡ヲ治ノ效アリ

治脚轉筋コムラ 轉筋助ハ皆血熱ニ属

ス急ニ赤絲ヲ取テ脚心ヲ磨テ編ク

熱セシメ即四物湯ニ酒苓紅花ヲ加へ

煎服ス筋足ノ大指ノ上ニ動キ至腰

住者ハ風寒濕ニ因テ作又蒼朮天南

星ヲ加フヘシ

脚癰 脚ノ皮膚ノ面ニホコシ 土大黃ノ末ヲ

津唾ニテツクヘシ自能疼ヲ止メ腫ヲ消

○脚裂 黃蠟六兩 降真香二兩 研テ

細末シ猪油半斤入蒸テ傳之

脚城

勃脬半箇患処ニ貼テ一夜過
次晩再貼五六夜如此スハ其城連根
脱出

又方。葱根 勃脬 共ニ搗テ汁一
碗 取テ煎シ再松香四兩ニ麻油ヲ入シ煎シ
水ニ滴ヲ落シ見テ珠トナル時右ノ汁ヲ
入煉テ膏藥トシ貼ヘ即落

暑氣ノ時脚ヲ振破テ爛瘡トナル
ニハ茶葉ヲ口ニ嚼爛シテシク

婦人諸症

婦女總論

經曰女子七歳腎氣盛
齒更髮長二七而天癸至任脉通太
衝脉盛月事以時下天トハ天眞ノ氣
降ヲ云癸トハ壬癸ノ水ノ名故ニ天癸
ト云ナリ然モ衝ハ氣血海任ハ胎胎

腎氣全ク盛ナレハ子脈 漸盈テ應時下ルコシ月事ト云ハ平和
ノ氣常ニ三十日ヲ以テ一見シ月事不調

子虧ニ象カリ若任脉行時ニ遇ハ調理
ヲ謹ムヘシ 調理トハ俗云 身持養身也 調理宜ヲ失スレハ

産後ニ受病ニ似タリ輕ハ宿疾ト成
重ハ疾ト益發ヲ被トキハ氣血錯乱

之任脉斬然トノ不行身ニ逆トキハ血
分癆瘵等ノ疾ヲナス若其時カヲ方

スレハ虚熱ヲ生シ變ニテ疼痛ノ根トナ
ル若悲怒スルトキハ氣逆ス氣逆スル

トキハ血逆ス腰腿ニ逆ルトキハ淫水行
時ニ遇テ腰腿痛重ニ期ヲ過レハ安

之頭眩心肺背脇手足ノ間ニ逆レハ淫
水行時ニ遇テ其症亦然リ若怒極ル

トキハ傷肝眼暈脇痛嘔血瘰癧癰
ノ病アリ加之淫血其間ニ滲漏テ遂ニ竅
穴ヨリ血淋瀝レテ已リテ九経水行時
風ニ中ハ病風冷ニ感スレハ病冷久レテ
不愈變症百出可不慎哉

○滋陰百補丸 專ラ女人ノ勞傷ノ氣血不
足陰陽不和乍寒乍熱心腹疼
痛ニ飲食ヲ不思羸瘦力乏者治之
香附子一斤炒去毛四分製表ス酒三浸四兩磁水二
浸四兩醋三浸四兩童便浸四兩俱炒焙乾レ用
益母草半斤湯十日掠
テ去氣ヲ去 當歸二兩
酒洗 川芎 白朮
熟地黄各四兩
酒洗 芍藥二兩
炒 人參 茯苓 延
胡索各二兩
酒洗 耳朮各一兩
酒洗 右細末レ煉蜜ニテ
桐子大サニ丸ニ空心ノ時五六十九粒以テ白湯
或ハ宿砂湯或ハ醋湯或ハ酒ニテ服ス

○調經順氣方 當歸酒洗 生地黄酒蒸

白朮酒洗
炒各四兩 茯苓酒洗 川芎酒洗 陳皮
鹽湯ニテ用ユ

○治骨蒸調經方 當歸一兩 白芍藥
地骨皮各八分 黃芩酒炒 耳朮各一分 白朮
陳皮 白茯苓各七分 枳殼五分 半夏酒洗
三分
澤蘭葉二兩 棗二枚 水二碗入煎服ス

經脈不調漸成癥瘕氣塊 香附子一斤炒
四製

艾葉八兩醋煮
炒黃三 右細末レ醋ニテ桐子大サニ
丸ニ毎服六十九粒醋湯ニテ送下ス一日二
ニ服生冷油膩等ノ物ヲ忌ム

月水久閉 蚕砂四兩炒テ羊黃各二斤

魚灰酒一壺ノ内ハ入砂鍋ニ湯ヲ沸レ其

内へ酒ヲ壺ナカラ入テ沸過シ取出シ磁器ニ盛リ蚕砂ヲ去テ酒ヲ温メ飲テ教盞ニノ即通ス

調經種子方

經水ヲ調子ヲ求ル方

艾葉 香附子

當歸身 生地黄 熟地黄

杜仲 續斷 山藥 芍藥

茯苓 川芎 甘草

右為細末醋糊ニテ粟太ニ丸シ每服ニ々空心ニ淡鹽湯ニテ用ユ

○又方 益母葉 生地黄 當歸 芍藥 香附 熟地黄 川芎

右細末シ蜜ニテ桐子大サニ丸シ每服三々ツ、空心好酒ニテ下ス

○妊娠

妊娠心腹痛不可忍 鹽少許以赤クロテ

一撮酒中入洋服之即止

安胎方

茯苓 白朮 香附子

玄胡索 益母草葉 紅花

沒藥 各研テ細末シ煉蜜ニテ

桐子大サニ丸シ毎日空心ニ白湯ニテ七丸ヲ服ス多用ムヘカラス如胎不安一日間四五次

可用一度ニ多服スルナカレ胎安キトキハ

又一日ニ一服ス或ハ日ヲ間テ用ルモ亦可

七丸ヲ為極丸腹痛腰酸脹ヲ作ハ即服スヘシ如胎三五月ニノ常ニ墮者ハ三

六月ヨリ製シ服スヘシ惱怒勞力煎炒

氣ヲ殺スル物ヲ食スルヲ戒ム并ニ

冷水冷物房事ヲ忌ヘシ此方紅ヲ見

胎墜ントスルニ至テ服之往々ニヨリ保テ

月ニ足テ産スニコトニ神方アリ

胎動不安腹痛下黄水 糯米一合黄芪

川芎各五々水一升八合ニ煎シ二次ニ
温服ス

○胎重作痛不可忍鯉魚ヲ酒ニテ煮
食之

○胎漏不安糯米二合粥ニ煮生地黃
ヲ搗汁ヲ一合取粥熟シタル時ニ入レテ
調空心ト服ス但煮ル時鉄器ヲ忌破
鍋ヲ用ユヘシ

○孕婦磕閃跌撲半産シ或ハ胎ヲ墜
ト欲シ安ニ毒藥ヲ服シ諸ノ惡症ヲ
見ス者ニハ胎已ニ下イニタ下ヲ不
此方ヲ用ユ當飯 川芎ニ々 益母
仲紫花者亦々
自然者ヲ用 水煎シ温メ飲シムモシ口

嚙者併用テ灌之胎可安即愈不則安
即下也産後ノ諸症モ亦治ス古酒重
便各一小杯ヲ入テ用コ各之妙

娠娠卒倒 頃刻ニテ甦者兒暈ト名
ツク葛根 麻黄連節各
三々 桂枝 芍藥兩枚

其州各々
ニ々 姜枣煎服微汗ヲ出ノ愈

東胎散 益母州各二
分 當飯 川芎 茯苓
各一々 枳殼八分 陳皮 甘草各五
分 人參一々

煎服ス或冬ニ麥子四十九粒
胡麻半入合カフ 人參ヲ服スルヲアタ

ハサル者ハ不用可也八九箇月ノ間一日一服
用ユ臨産後他患ナシ

○産育

○催生丹 早ク用ユ分ラヌ産後日ニシテ
遅ク胞破ノ時服之 益母州 一介 當飯 八箇

其州 四箇 乳香六箇
出汁 麝香 三々 右細末シ

端午日調合ス鷄犬不淨婦女近ツク
忌煉蜜ニテ竜眼肉大二九シ臨産ノ時
乳香五分煎湯ニテ送下ス或ハ前ノ妙
半散ヲ濃煎ノ飲之一服不生再服ス
又不生ニ服スレハ即生ス蓋州藥調和
氣血不致偏難イニ夕正産ニ當サレハ
即能安胎止痛已ニ正産ニ當ハ即ヨク
催生ノ痛苦ヲ免ル既ニ産メ後服之ヨク
去舊血生新血中ヲ行シ補フ孕婦ノ
家ニ預メ救帟ヲ贖買ヘシ輕忽ニオモ
フコトナカレ

治難産

破水已ニ下時ヲ過メ不産

必用利ノ藥ヲ服スヘシ。車前子一兩微炒
水煎服ス催生ノククヲ煎ス或ハ車前子
免赤子等分細末シ温酒ニテニ五分服

入亦救アリ

○又方 千里馬鼻五個路三棧タリ

麝香五厘 雄黄五分燒 共ニ細末
ノ每服三分好酒ニテ下ス被ヲ擁テ微

夏月熱心難産

滑石六分 其州及細

未シ新以水ニ蜜少シ加ヘテ用ユ但酷
暑大熱ノ時ニ非ハ輕シク服スヘカラス
冬月為寒氣所逼難産 五積散生姜

産門閉

葱白八煎シ熱服スヘシ方ハ諸書ニ
出タリ 前胡一兩 川芎三錢 酒ニテ

煎シ服ス

盤腸産

子宮先出キ後子ヲ産テ其

參五錢加ハ煎服ス

姪有兩子一死一活 即妙手散 在前丹

腸才サミラサルナリ 枳實 三々 肉桂 五分
水煎之 急ニ服ス

○腸已ニ出テ再々入者ハ驚シウコカス
ナカレ 鉄銹水ヲ温テ灌之 磁石真ナ
ル者ヲ煎湯ニテ飲シムヘシ即入也

臨産交骨不用

龜殼 一個 男子ヲ生
タル婦人ハ髮一把俱ニ燒テ灰トシ存性
一度ニ三々々當飯 二兩 川芎 五々 濃煎
シタル湯ニテ服ス人一里ヲ行間ボトナリ
テ交骨即開クタトヘ子死タルト復ニ
下ルナリ

横生倒産

艾葉 粒ホトニノ婦人ノ存
脚小指ノ尖ニ三壯灸ス即順ニ生ス

○又方 蛇蛻 一條 蟬蛻 十四金キ
共ニ黑燒ニシテ末ニシテ服ス分温酒ニ調

下ニ仰臥行時ニ順ニ生ス

○竈下ノ金ニ對スル底ノ紅焦土研テ細
ニシ酒ニテ一々服シ産母ノ臍ノ内ヘ塗ヘシ

生子ノ頭ニキヲ帶テ出
子死腹中不下 黃牛糞乾者白湯ニテ

服ス即下
○又方 苧葫蘆黑燒之每服一々空心ニ
熱酒ニテ下ス

月數未足胎死不出 大豆ヲ醋ニテ煮テ
服之空処ニ下ル未下ラサレハ再々服

○子死腹中連日不出 巴豆 三粒 葶麻
子 七粒 麝香 少許 研餅ノ如ニ臍ノ上

ニ貼ヘシ即産ス産スレハ速ニソノモチヲ去
ヘシ然サレハ子腸亦出 凡ノ産婦舌ノ口子

胎衣不下 荷葉剉水煎シ濃ノ服スレハ

即下

○又雞子清ヲ一ツ吞ヘシ即下
○又産婦自髪ノ稍ヲ條テ口中ニ置一
夕ニ惡心スレハ即下

○産後

産下保生錠

蒲黄

五靈脂

各十
兩

胡索

五兩
醋炒

甘州

三兩

青皮

二兩
醋炒

テ錠子

ニノ

産シテ後

飯ノ間

ア

リテ薑湯

ニテ化シ服ス此藥端午ノ日

修合ス鶏犬不淨ノ女人ヲ近クモ

定暈寧心散

澤蘭

荆芥

各一
當

飯 川芎

十兩

甘州

四兩

極細末トシ産

シテ後三々ツ、清米湯ニテ調服ス童便

半盞加ヘテイヨクヨシ

産後養暈

當歸尾

川芎

一
山

各一

益母州

五兩

胎

中

水煎服スル時童便

一盞加ヘテ用ユ

○又方 荆芥

炒黑
研末

童便半盞

白湯ニ

テ調服ス效アリ

産後血暈

惡心

冲心

人事ヲ不知者

久

両手ニテ産婦ノ頭髮ヲ提起

ニスヘカラス放ハ血攻心テ不救急ニ醋ヲ燒

テ嗅セ醋少許燒熱シ口中ニ灌ハ自定

時ニ髪ヲ提ケタル手ヲ放テ坐シ正ク記

ヘシ大抵サウ飯湯ニテ荆芥黑燒ヲ調下

ス熱童便ニテ調灌下セハ即甦ル

血衝上昏暈欲絶

紅花

一撮

好酒一

鍾數沸煎シ童便ニ盞入熱ヲ灌下

ス立トコロニ驗アリ

産後惡血下不盡上奔衝心煩向腹痛

藕ヲ搗テ汁ヲ取温服ス

或惡露不盡腹痛及兒枕疼 山查子

百十 打碎煎湯ニ砂糖少許入空温服

產後發熱 大劑ノ當飯炮姜治之如

風寒ニ冒ハ加減ノ治之愈此症多ハ
血虚ニ由故ナリ

產後遍身疼痛 此症産メ血氣ヲ走

動スヲニ升降其常ヲ失ニ關節ニ流
滯リ筋脈引急是以テ遍身疼痛甚

トキハ腰背強硬俛仰スルヲアタシ
足屈伸シカタク或ハ身熱ニ頭痛ニ他

病トナシテ治スヘカラス 牛膝 酒浸 當飯
去尾 肉桂 火忌 白朮 黃芪 独活 生

姜 白僵蚕 桑寄生 甘草 各等分
細末ニ毎服四五錢易大調服神效

產後敗血流注經絡成腫塊疼痛

香附子 赤芍藥 川芎 當飯 熟地黄

陳皮 紫葳 牡丹皮 紅花 牛膝 枳
殼 各一 甘草節 獨活 各五 水二碗入

八分ニ煎シ酒一小盃入食前ニ服
產後舌出不收 丹砂ヲ舌ニ敷

盒蓋ヲ擲テ地ニ墮シ声ヲ作ス産婦
驚之舌即收ル

產後大便閉 當飯 生地黄 茜草根

桃仁 延胡索 赤芍藥 紅花 水煎ス
如寒痛ニ木香ヲ加フ有汗木香ヲ去

入參 甘草 酸棗仁ヲ加フ惡心ヲ作ニハ砂
仁三分加フ

產前產後痢疾 敗龜甲ヲ醋ニ浸シ

炙為末服スヘシ

○胎前產後通治

○回生丹 胎前產後三十六症及崩漏

淋經ノ諸疾不治去ナシ此誠ニ神驗ノ

妙方也 大黃 錦紋者一 茯苓 三兩劉河水

三碗トシ渣ヲ 紅花 三兩黃芩ニ炒好酒一大壺ニ入煎

去汁ヲ用ユ 黑豆 三升煮熟シ汁三碗ヲ取テ豆ヲ去リ

未ヲ好醋三碗ニ入攪ニ口始文火後武火ニ

煎シ煉テ膏トス 次ニ紅花

酒ニ煮タシ汁ト茯苓ノ汁ト黒豆ノ汁トヲ

合セ大黃膏ノ内ヘ入又熬テ膏トス

出之後ノ藥ヲ入ル 當歸 白芍藥 川芎

地黄 好酒浸九 白茯苓 烏藥 蒼朮

香附子 延胡索 蒲黃 陳皮

牛膝 桃仁 甘草 木香

地榆 山茱萸 白芍藥

良姜 人參 白朮 木瓜 青皮

乳香 沒藥 以上廿七味為細

末大黃膏ニテ彈子大サニ丸シ一丸ツ、陳

好酒ナリニテ化シ服スヘシ諸症治方丸ニ

録ス○産期未至惡露先下リ乾燥

難生俗ニ立漿ト云○橫生逆産保損テ

道盤腸産暑氣ノ産寒ニ氣ノ産同乱

シ日ヲ連テ生シ難ニ○子腹中ニ死シ唇

青ク腹冷ハ命須臾ニアリ已上ノ症ニ當

飯川芎益母仲各三 水茶碗ニツ入七分ニ

煎シ好酒三分加右ノ丸藥ヲ調服スヘシ

○胎衣不下脹胸昏迷スルニ○惡露上ニ

攻昏暈ノ不醒○産後無力時々暈下

厥之或ハ喘促シ汗出或不頭旋眼黒○

已上並ニ當取川芎^{カクコウ}水茶碗ニツ入
七分煎之酒三分加へ丸藥ヲ服又再ヒ
童便半盞入テ用之○産後惡露不盡
或ハ不行以腹脹疼痛ス○産後寒熱
往来之瘧疾ニ似テ飲食不進日久ニテ
骨蒸トナレニ○産後飲食ニ傷レ浮腫肢
痛ニ○産後胸脹滿嘔吐不止○産後
腹脹腫ニ○産後麪ヲ食スルト早ク
血結在心口壅悶ニ○産後狂乱ノ鬼
神ヲ見ルカ如キニ○産後敗血^{クハク}經^ニ流
百節酸疼ニ○産後血心孔ニ入テ失音
不語○産後怒ニ因テ肝ヲ傷リ小便ニ血
ヲ下シ雜肝ノ如クナレニ○産後敗血肺ニ
入テ喉^ト癆^ト鳴カ如クナルニ○産後體^ニ腰
痛身及張ニ○産後^ニ食生ノ^ニ直カラ^ニ

血崩漏ニ似タレニ○産後^ニ面黄^ト舌^ト乾^ト或
ハ鼻血出遍身紅點ヲ出ニ○産後小便淋
瀝ニ大便不通或ハ乍子寒ク乍子熱ク
醉^ニタ^ル如ク癡^トナル如ニ○産後虚損身瘦
面黄飲食減少ニ^ニ發熱^ト盜汗^ト漸^ト發^ト瘰
トナルニ○婦人經水閉或ハ不調崩漏帶
下及臍^ト冷^トテ孕ス或ハ胎漏半産等ノ症
已上並ニ當取川芎各少許水一盞^ニ煎
入七分煎之酒三分加へ丸藥ヲ調へ服ス
○産後傷寒頭痛身熱無汗麻黃末
三分加へ葱姜ノ煎湯ニテ丸藥ヲ調下ス
○如頭痛身熱自汗セハ冬ハ桂枝ノ末
三分春夏ハ防風白朮ノ末各三分加へ葱
姜ノ煎湯ニテ調下ス○産後乳ナキニ
黃連天花粉當取尾穿山甲ノ末各三分

加へ酒ノ内へ入化之服ス其乳湧カ如シ
初産数日ノ内氣血定ルヲ俟テ服セヨ
凡ソ症深ク重キ者ハ多ク服ノ自愈初
産ニ危急ノ際日ニ二三度用テ最效アリ

○乳病

乳汁不通 老絲瓜子ヲ連テ黒燒ニシ
細末之酒ニテ服之被ヲ益汗ヲ出セハ
即通スヘシ

○又方 胡麻ヲ炒搗爛之炒タル鹽少
許入テ服ス

○産婦無兒乳ヲ喫サハ乳腫堅痛急
カタキニ 川芎 當歸 白芍藥 熟地
黄 各ニ 炒テ粉ニス 水ニ碗ハ八分ニ
煎之食ヲ遠ク服之脚布ヲ用テ兩ノ
乳ヲ緊束キテ揉撫ハ其腫消散ス甚

者ハ再上ニ服用ユ
内吹外吹 懷胎ノ中ニ乳ノ腫ルヲ内吹
ト云ヒ兒ノ乳ヲ飲トキ腫ルヲ外吹ト云フ
寒熱作甚ニキ者ハ惡心嘔吐ス此方ヲ
服スヘシ 柴胡 陳皮 川芎 山梔子
青皮 石膏 黄芩 連翹 各一 橘葉 廿
廿叶 五分 水ニ碗ハ八分ニ煎之食ヲ遠
ク服ス葱白ヲ切碎キ炒熟之搗爛ニテ
乳ノ上ニ敷帛ニテ包ヘシ冷ルトキハ易ヘシ
自愈

○乳結核アリテ腫痛忍カタキニハ陳皮
白ヲ去晒之乾之麩ヲ微黃色ニ炒共ニ
細末之麝香少許入再ヒ研和一度ニニ
女熱酒ニテ調服之乳ヲ揉ハ即散也ノ

乳癰 乳癌

丹溪曰乳癰房ハ陽明胃經ニ

属スル所乳頭ハ厥陰肝經ニ属スル所也
 兒ニ乳ヲ飲スル母或ハ忿怒肝ヲ傷リ或
 ハ厚味ヲ食シ熱ヲ積以テ氣流行サル
 一ヲ致シ竅通スル一ヲ得ス乳汁出ル
 コトヲ得ス結テ腫ヲナシ痛ヲナス陽明ノ
 經ノ血熱スルトキハ化ノ膿ヲ為ス又兒ノ口
 ノ氣吹テ爛熱ニ次ニ結ノ核ヲナス初起
 時痛ヲ忍テ揉散シ軟ナラシムルハ血脉通
 シテ自然ニ消散ス此ヲ失スハ不治ノ癰
 疽トナリ紅腫發熱之疾痛者ハ是乳癰 初起時
ナリ堅クニテ潰爛者ハ乳癰ト名ス
 ハ癰散シ流氣藥ヲ用ユ若已ニ膿ヲ成者
 ハ又内托排膿ノ養血順氣ヘシ安ニ刀針
 ヲ用テ処ヲ取リナカレ又婦人憂又積テ乳
 房ノ内ニ核子ノ大サニ核ヲ生シ其硬ト石
 ノ如シ不痛不癢或ハ十年二年或五三年
 ニシ始テ癰トナリ破陥リタラ乳癰
 ト名ツク其源四一處穴ニ似タルニ也此症
 多ハ難治此瘡ヲ得者ハ天命也下トモ
 若ヨク心ヲ清クシ思慮スナク暴怒ヲ戒
 メ厚味ヲ不食メ内托ノ劑法血順氣
 藥ヲ服セハ可生ノ理アリ

乳癰初起 藕根切片無灰酒ニテ煎
 服其人ノ酒ヲ飲ホトラ量テ用ユレハ
 即消散ス

○又方 五味子 ニ々陳壁泥 阿膠 ニ々炒ニ
ニ々 各研テ末シ陳好酒ヲ熱クシテ服之被ヲ
 蓋汗ヲ出セハ即愈
 ○又方 蒲公英 ニ々 金銀花 ニ々 穿山
 甲 三片灰拌黃色ニ 橘葉 七枚 白酒一碗水
効テ槌碎ク 碗入八分ニ煎シ半ハ飽時ニ服ス外ハ橘葉

ノ煎湯ニテ洗ヒ其渣ヲ腫ル処ニ敷クニ腫
ハ汗出テ即散也

○又方 鹿角尖シカクノトカリニ寸煨紅シ碾末シニ三々
熱酒調服ス重者ハ二服ニメ必ス消ス

結核作痛未成膿 酒ニテ白蠟ヲ化テ
一錢服ス

乳癰乳腫 芭蕉葉搗テ汁ヲ取白酒ニ
服之渣ヲ腫ル処ニ敷

乳癰治方 先甘竹水ヲ以テ洗ヒ白蠟
三々好酒ニテ化服ス五七次ニ亦愈

○又方 圓蛤殼ヲ研極細末ハニクワカラニ身ニ末
末少許加ハ醋ヲ煎之右ノ粉藥ヲ調下
敷ヘ之即愈

○同穿爛者ニハ貝母各一々知母各一々麝
香各一々細末ニ雞子白ニ調敷ヘ之

○凡諸瘡潰後ニハ皂角穿山甲ヲ服ス
ヘカラス

乳癰 松脂色白者川椒北粒研テ細末
之先槐枝ノ煎湯ニテ洗ヒ猪油ニ葉末ニ
ヲ調擦ツケヘ之

○婦人諸病補遺

血瘕 婦人經水閉結ノ血瘕ハ腹
脹痛欲死者ニハ 水菘花スイコウカ 馬鞭竹ウマヒナ
洗淨 煎之煉テ膏トシ 當飯 生地黃

川芎 白芍藥各二 紅花 沒藥各一
延胡索 五灵脂各二 烏藥 木香各一

右細末ニ前ノ膏少ニ米糊ヲ加ヘ丸ノ
毎服空心ニ紅花酒ニテ百丸ヲ送下ス

山崩漏不止赤白帶下 烏梅黑燧ニ

細末ニ白湯ニテ服ス止リテ後ニ蓮肉ヲ

黑燒ニ香附子炒芝ニ細末ニ每服二

女湯ニ醋ヲ少シ加ヘテ服スヘシ按スルモ

此方男子小便ニ血出ルニ用テモ效アリ

血淋 淋疾血出 青蒿子 八九月三版ヘシカラテ

一味研末シ冬米飲ニテ搗テ丸トシ清

晨ニ好酒ニテ三々ツク送下ス輕者ハ半

日重者ハ二十日ニテ自效アリ但此藥ヲ

服後ハ永ク孕フナシ子ヲ求メント欲

スル者ハ此方ヲ用ユヘカラス医家功ヲ奏

ノ易ク貪フナカレ上帝好生徳ヲ絶ハ

速ニ天ノ譴ヲ受ニ如シ病危ト者ハ路邊

母ノ命ヲ扶ルヲ亦重シ何ソ服スルヲ

妨ケンヤ

白帶 薯麥麩雞子清ニテ丸ニ大サ

其藥ハ好クニシ注湯ニテニテ服ス

○又方 破故紙炒云細末シ雞子ニ一ツ

ノ孔ヲ用破故紙ノ末ハ分入攪ニセテ封

シ固メ飯上ニテムシ空心ニ酒ニテ服ス重

者モ十次ニ不遺ノ即愈

小便不通 鯽魚一尾搗爛シサ許

臍ノ内ヘ入ヘシ即通ス

○又方 搗上蛭螺ノ内ヘ麝香ニ厘入

即蛭螺水滴出ルヲ取テ臍ノ内ヘ入ヘシ

即通ス

婦人顛狂失心 明礬 煨過 麝香 七々

共ニ末トシ糊ニテ桐子ノ大サニ丸ニ每服

五十九白湯ニテ送下ス數服ニソ即愈

鷄爪風 婦人不時ニ癢又手足拘攣

拳束テ鷄爪ノ如クニナリ疼痛急ニ左

右ノ膝ノ骨ノ兩傍ニ赤キ窟アル如ク

四穴ニ各三壯ツ、灸スレハ六穴ニ愈俗ニ鬼胎

鬼胎 婦人月ヲ過シテ不産産カズヲ抱

如ク尤者ヲ云 是ニコトノ懷 胎モラス也 吳茱萸 川烏

頭 秦芫 柴胡 白姜 蚕 各等 細末

煉蜜ニテ桐子大サニ丸シ一度ニ七粒ツ、

蜜酒ニテ服ス惡物ヲ下メ自消ス○此症

詳審ニ辨知テ藥ヲ與ヘシ古人多ク月

ヲ過テ生スル者アリ幸ルニ下スナカレ

鬼胎ノ説ヲ以テ却テ害ヲナスヲアリ

可慎セ々

○小兒諸症初生通用

○小兒初生先黃連 甘草ヲ濃煎シ

ニ軟ナル絹或ハ綿ニテ指ヲ包ミ藥ヲ

蘸シ包ミ口ニ入口中ノ惡血ヲ振出スヘシ

倘如ク亦カタク時ハ右ノ煎湯ヲ少シ

ツ石ニ灌クニ惡沫ヲ吐出スヲ待テ後

ニ乳ヲ飲ム是胎毒ヲ去リ痘疹稀也

○兒生レテ七八十歳ノ老人ノ舊裙ヲ縫

改メテ小兒ノ衣服トスヘシ壽命長シ福

貴ノ家ナリ任新製タル衣服綾羅類

ヲ用ユヘカラス小兒ニコレヲ看スレハ病ヲ

却ルヲ不能スアラス壽ヲ柳テ福ナシ

馬牙 初テ生シタル小兒ノ口中牙銀ニ白

點ヲ生ス馬牙ト名ツク乳ヲ飲カクニ此

胎熱ヲワザナリ裁割口ト不同此症ハ療治

ヲ以テ緩ニスレハ救フマタハス急ニ針ニテ

白點ヲ挑破血ヲ出スヘシ症凶キトキハ

毎日如此ス緩十日後ヲ間テ挑破ルナリ

挑テ後青絹ヲ用テ涎ヲ取絞出シテ好

京墨ヲ薄苛ノ煎湯ニテ磨兒ノ口中

搽乳ヲ飲スヘカラス片時睡出ルヲ待テ後
乳ヲ飲スヘシ立処ニ效アリ若小兒ソ為
痛ヲ護者ハ多クハ死ス

初生小兒面赤眼閉 大便不通不能進

乳者ハ多胎中ノ熱毒ニ由テナリ急ニ糞

清ヲ以テ解之糞清ノ製法
本綱五十二詳

小兒生下遍身無皮 急ニ早米粉ヲ遍

身ニフリカケテ即皮生スル時止ムヘシ

臍風撮口 此症ハ風濕ニ傷レ臍帶ヲ

断テ後イニ乾ス頻ニ浴サセ風濕臍ノ

中ニ入或ハ衣服ヲ換ル時臍ノ内ハ風ヲ

受テ遂ニ臍風トナル面赤ク喘急シ嘔

吐不出撮口ト名ツク 蜈蚣 赤脚金頭者

蝎梢 四尾全蝎ノ 白姜蚕 七 瞿麥 五分 共ニ

研天細木汁鳥羽ノ莖ヲ管ニノ糞ヲ臭ノ

内入吹入噴嚏啼出セ六療治メ治ヘシ即ハ

薄苛ク煎湯ニテ右ノ藥末ヲ服スヘシ

○又牙銀ヲ見テ小泡ノ如キモノアラハ急

ニ淨綿ヲ温湯ニヒタシ手ノ指ヲ裏ニ懸

クト牙銀ニ出タル物ヲ擦破ハ即口ヲ用

ク也或ハ小兒ノ頭頂ニ五七壯灸メ即愈

又小兒ノ臍帶ヲ煎シ服サセテ效アリ

又方 多啼テ乳ヲ飲ス口ニ白沫ヲ吐

ニハ全蝎二十頭尾全者去毒
煎酒ヲ塗アリ末トス 麝香共計
別研

共ニ調合シ金銀ノ器ニテ湯ヲ煎シ藥

末ヲ服スヘシ

臍風青筋 小兒初生七日ノ間若臍風

症發リ腹下ヨリ青筋引發リ一ツ道ノ

如ク両方全ノ如クニナリ上テ心ニ至レハ不

治此症ヲ見ハ其主日筋ノ初テ發テ

二視テ青筋ノ頭ニ灸ヲ三壯スヘシ或ハ
灸ノ如クテ頭ニ灸ルル処ニモ両方各ニ壯灸ス
ヘシ青筋自消ノ必ス活

○又方 独蒜ヲ切片臍ノ上ニ安其上ニ
灸之口中蒜ノ氣アラハ即灸ヲ止ヘシ

臍腫出汁 枯礬ノ末ヲツクヘシ或ハ黄柏
末ヲツクル皆效アリ

臍瘡不乾 綿子燒灰フリカケテ即愈
兒臍出血 小兒初生イニ夕月ニ滿ス多

ク啼叫トキハ臍ノ中ヨリ血出ルコトアリ
白石脂ヲ末ニ貼ヘシ愈若不愈ハキハ
白石脂ヲ微炒テ貼冷レハ再ヒ貼ヘシ初
ツケタル薬ヲ剥取ナカレ

臍久不乾 當飯焙乾シ末ト臍ノ中ニ
ニ入レ頻ニ用テ愈

○九 臍帶ヲ斷時ニ明礬生ニテ細末シ臍
ニ多ク糝ヘシ總テ臍ノ病ナシ

止夜啼方 蟬蛻ニナセ頭ト足ト去去根
砂少許入細末シ蜜ニテ丸シ兒ニ吮シム
ヘシ自止

顛門腫 黄栢末ヲ水ニテ調足ニ塗
ヘシ或ハ顛門陷ニハ半夏ノ末ヲ水ニテ調

足心ニ塗ヘシ

毒瘡 凡小兒生シテ百日ノ内ニ生瘡毒
瘡ト名ツク胎毒ノワザナリ又毒瘡ト名ツ

ク身ニ出テ次第ニ頭ニ至ル者ハ人患ヘシ
若初頭ニ出テ次第ニ腹ニ至ル者ハ難治
犀角丸ヲ服スヘシ 牛黄 犀角 羚羊
角 全蝎酒洗 白僵蚕炒 防风 羌活

天麻 麻黄 牛胆南星 天竺黄 黄連

京墨煨テ微烟 以上各三分細末シ蒸餅ス

糊ニ打テ丸シ艾實大ニテ辰砂金箔ス

衣トシ丸ツ薄荷ノ煎湯ニテ送下外ニ

付藥等ヲ用ユカラス毒内ニ入テ及テ他ノ

疾ヲ生ス藥煮ノ衣服ヲ着スヘシ其法

大黃八兩 甘草四兩 當歸二兩 朴硝二兩 以上四

味青布本綿ヲ兒ノ衣服ニツニ右ノ藥ト

同ク鍋ニ水ヲ入煮テ取出シ陰ニ乾ノ早晩

トリカテ見ニ着スヘシ一度着タルハ又右ノ如ク

煮テ陰乾シ着スルナリ愈ニテニ毎日用之

又乳母ニ煎藥十劑用ユヘシ其方

苦參二分 羌活一分 甘草四分 連翹防風

荆芥牛蒡子 研金銀花 各一 水煎之服ス

鷄鶩油臍物 薤葱蒜等ヲ忌酒中飲

テ見下

○急慢驚風

○小兒癆痲俗ニ驚風小名ツク陰陽ノ症

アリ身熱シ面赤ク搐搦上視牙緊タルハ

陽症也吐浮シ或ハ只吐シテ不浮日漸ク面

色白ク脾虛シ或ハ冷テ至驚搐搦甚シ

カラス微ツ目上視手足スコシ動者ハ陰症

也陽症ニハ用涼藥陰症ニハ用温藥一

際ニ驚風ト作テ治スカラス又痘疹至セ

ントテ先身熱シ驚跳或ハ搐搦ス此驚風

ニ非ス至驚ノ藥ヲ服用スヘシ

○嚏驚散 半夏生 皂角五 為末少許

鼻中ハ吹入レハ即甦

○又方 牛胆南星 辰砂二分 研テ細末

シ毎服五分ヨリ一分ニ至ル午前ニ一服午後ニ

一服燈心生姜煎湯ニテ送下ス

急慢驚風灸

眉心中ニ灸五七壯スヘシ

喉ヨリ志出テ愈

○又尾尻脊下葉豆大ホトニ艾ヲ圓一壯灸スルハ即志ヲ出スニ壯ニノ立処ニ愈

○又鼻梁ノ両旁突突ニ窟アル処ニ點ヲ付

両方ニ三五壯ツ、灸スレハ立トコロニ愈

諸書ヨリ多シ故ニ畧之

○五疳

疳症不同病ニ對シ藥ヲ用ユヘシ

心疳 小便不通口乾舌爛牙臭ク是心

臟ニ受積ナリ羊肝散ヲ用ユ 穀精汁 五分

胡黃連 二分 柴胡 二分 甘草 五分 地骨皮 五分

盧菴 三分 共ニ細末シ羊肝一具竹刀ニテ割

開キ右ノ藥末五分ヲ入肝内線ニシ肝ノ用

キ處ヲ縫テ砂鍋ニ入テ煮熟シタル時ニ

服テ一七日ニ即愈

肝疳 熱ヲ積テ目ヲ損ス又雞眼ト

名ツク是肝臟受積ナリ雞肝散ヲ用ユ

夜明砂 水洗淨 雄黃 上 威灵仙 蛤粉 穀

精汁 各一分 共ニ末トシ雞肝一具藥末五分ト

共ニ砂鍋ノ内ニ入雞肝煮テ熟シタルトキニ

止テ服スヘシ

脾疳 夜盜汗ヲ出シ泄浮口乾ク是脾

臟受積ナリ白朮散ヲ用ユ 白朮 白

朮 土炒 澤浮 各五分 山查子 五分 胡黃連 一分

神麴 五分 炒黃 陳皮 一分 共ニ末トシ毎日清米

飲ニテ一及送下

肺疳 龜胸咳嗽發熱夜啼ス是肺臟

受積ナリニ冬膏 天门冬 麥門冬 苦

楝皮 桑白皮 陳皮 生地黄 各三分 河水

十碗入一碗二煎之白蜜八兩入共三膏上
之再山藥末一兩膏內加和白每日
三次服スハ愈

腎疝 肌體極テ瘦遍身瘡疥癩之

齒齲腫甚ニキトキハ牙齲潰脱俗ニ

走馬牙疝ト云寒熱ニ頭熱ニ脚冷ニ已

上五疝也 腎痛治方ヲ不載者ハ走馬牙疝ノ
方別ニ二條アリ下ニ見タリ可考也

五疝奇方 凡小兒五疝滿熱面黃肌瘦

煩渴吐浮腫大ニ筋青手足如紫精神驚

恃等症ヲ治ス 白木蜜水浸炒 白茯苓

史君子切碎炒各 蓮肉隔紙 麥芽炒 金

櫻子畧炒 陳皮 山查子各五 麥門冬去心

芡實五分 甘州五分 青皮五分 以上細末ニ

藥末一兩ニ蜜四兩入煉調テ日中ニ晚ト

濕湯ニテ口ヲ漱テ此藥教匙服スハ

身熱ニ咳漱スルニハ地骨皮百部根各

五分加○稟氣弱ニハ人參一分五分加○

腹脹大便稀腸鳴テ色ヲ作或ハ虫吐テ

不和枳櫛子二分五分木香五分加

疝病欲絕 黑牽牛子 雷丸 史君子

各一共研テ末ト小兒一歲ナラハ藥末一

厘二歲ナラハ二厘ヲ雞子黃一ツ分ニセ

合セ紙ニ包ミ飯上ニテ蒸熟テ用ユ三

四ツ分ヲ服ノ即愈

疝積諸病 雄黃二分 鷄肝不落水者

磁碗ニ入共二搗和好酒ニ盞入肝內飯上

ニテ蒸熟ニ空心ニ服ス三四次ニノ愈

○瘦損ニ神曲十兩陳 山查子八兩 馬子

城四兩醋浸 右細末ニテ砂糖ニ調テ服

ス小兒常ニ服ノ能シ生シ肌肉

○小兒雜病

○五福化毒丹 小兒胎熱大小便不通丹
毒瘡瘍赤疹赤目重舌木舌口瘡等
ノ症ヲ治ス 玄參 二兩 人參 七錢 茯苓
十五 馬牙硝 五錢 青黛 一兩 麝香 一分但夏
ハ不用 甘草 五分 一方黃連一兩 加以上細末蜜
ニテ丸トシ辰砂ヲ衣トス毎服一丸薄荷ノ
煎湯ニテ服ス瘡疹ノ後餘毒上テ攻口
齒臭ニ生地黃ノ煎湯ニテ服スヘシ

赤遊丹

此症胎内ニテ毒ヲ受生テ
後ニ発スルナリ身胎内ニアルトキ父母猛
怒ヲツ、ニス淫火熾ニメ又厚味ヲ食ス
ルヲ戒ス又炭火ノツヨキニ烘又兒生テ
熱湯ニ洗ヒ衣類ヲツヨク烘テ着セ内ノ
毒ヲ觸動シテ此症ヲ発ス身熱ニ啼叫

驚キ搐搦或ニ紅腫ヲ生シ發熱ニ驟
息間ニ紅腫身ヲ遊走ノ定レルトコロナシ
先頭額ヨリ起ル者天麻丹ト名ツ多餘
ハ皆腹背ヨリ起リテ四肢ニ入者ハ輕シ
四肢ヨリ起テ胸腹ニ入者ハ重シ先生姜
汁葱汁燒鹽ノ煎湯ニテ腫ノ処ヲ洗ヒ
洗時湯ヲ自ニ入ルヲナカレ若目ニ入レハ損
傷スルナリ洗テ急ニ服スル方

白芍藥 陳皮 各五分 麥門冬 一分 甘草 五分
藿香 木通 各四分 黃芩 五分 水一小碗入煎
ニテ用ユニ服ニメ愈乳母ニハ藥ヲ一倍
ニメ用ユ○赤遊腫痛ニ破草鞋亂髮共
ニ黑燒ニテ醋ニテ調ヘ敷ヘシ○平常ノ紅
腫ニ蒜頭 半個 荸薺 二個 煮熟ニ搗爛シ
白酒ヲ温テ服スヘシ自消ス

走馮牙疳

此症患迅速ナルヲ以テ走馬

ト名ツク治方遅ルヘカラス是多ク痘疹ノ餘

毒ニ中ラレ又難病ノ熱甚シクシテ成モノ也

牙銀爛腫次第ニ黒ク腐臭シ不治者五

種アリ口臭ク涎穢ルハ不治黒腐不脫不

治齒落テ無血不治穿腮破唇ハ不治

藥ヲ用テモ不效ナリ○初テ起ルニ用ル方

人中白煨テ紅シ 孩兒茶一兩 黃柏 薄荷

青黛各六分 龜腦五分 右極テ細末シ先温

湯ニテ口漱淨メ藥末ヲ爛タル処ヘ吹ヘ

シ一日ニ六七次用ユ藥ヲ吹テ後涎外ヘ

流ルヲ吉トス涎毒内ニ収ルハ凶ニ内藥

ノ方 芦薈 柴胡 黃連 胡黃連 牛

蒟子 玄參 桔梗 山梔子 石膏 薄

荷 羚羊角各五分 甘草 升麻各三分 淡竹

葉十枚 水二盞入六分ニ煎シ食後ニ服ス

此方穿腮破唇者ナリ凡服メ效アル或ハ黃

連乾姜等分ニ細末シ吹入ヘ即效アリ

小兒嘔吐 温中止吐湯凡清凉ノ物ヲ吐

メ順ニ易出者ハ為寒此方主之

白豆蔻 白茯苓各一分 半夏五分 生薑五片

水煎シ沉香四分磨テ入熱服ス○酸物ヲ

吐ノ逆ニ難出者ハ為熱和中清熱飲主

之 黃連姜炒一分 半夏姜製一分 陳皮 藿香

砂仁各七分 白茯苓一分 水煎徐ニ服ス

同吐浮 脾虚スルトキハ浮シ胃虚スルト

キハ吐ス脾胃不和陰陽不順清濁相干

トキハ吐浮兼作止 安胃醒脾湯ヲ用ユ

白朮 茯苓各一分 滑石水飛 砂仁炒各七分 木香

煨ス 姜枣入水煎シ服ス○不食ニハ枳實

五分

山查子ヲ加○驚ヲ決ムハ天麻南星ヲ加
○風ニハ防風葛根ヲ加○暑ニハ香薷白扁
豆ヲ加○虚ニハ者ニハ人參ヲ加○内熱アル
ニハ黄連ヲ加○口渴ニハ烏梅ヲ加○吐逆
不止ニハ藿香ヲ加○浮不止ニハ升麻ヲ加
○吐不止ニハ砂仁一兩童便ニ拌炒一三四
次各ユネ末トメ丁香藿香各三加共ニ細ニ
粉ニメ毎服一匙ツ、生姜湯ニテ用ユ○吐乳
乳ヲア本香、蛇蛻糞共ニ研テ米湯ニテ調
服スヘシ即安シ

小兒泄瀉 山藥半生 細末ニ砂糖水ニ
テ調服ス即愈

痢病奇方 鷄子一個湯ニテ二三沸煮
テ殼ヲ破白ヲ去テ黄ヲ取研不テ生姜汁
ニ和勻ハ小兒ニ與ヘ服スヘシ茶ヲ飲フアルヘ

カラス其效如神
小兒浮痢肚疼 宿砂 川椒各五 炒テ研
生姜汁少許ニ和唾津ニテ丸ニ臍肉ニ安
外ニハ膏藥ヲ蓋ニ貼ヘシ

小兒瘡疾 小兒瘡ハ大約食積ト痰
飲ヲ以テ治スヘシ 檳榔子 草菓 半夏
貝母 柴胡 黄芩各等 甘草少 水煎テ
服ス、陰瘡至晚クニ即カ棄リ日カ累テ不カ已ニ
ハ人參 白芍藥 川芎 柴胡各一 甘草少
紅花各三 水煎テ服ス即愈

小兒尿血 滑石六 甘草一 細末ニ甘
州ノ煎湯ニテ服ス一方ニ升麻三分 加テ
同煎ス更效アリ

小便不通者 木通 茄兒蒂 煎服ニテ
立トコロニ通ス

立トコロニ通ス

外腎腫大 木通 五分 甘州 三分 黃連 四分

當飯 六分 黃芩 七分 水一碗入五分煎之

空心二服ス

遺尿 紅紙ニテ馬ヲ四匹剪コレヲ小兒ノ

穴下ニ安ヘシ毎夜如此ニノ自止

脫囊瘡 小兒陰囊ニ瘡ヲ生シ潰爛

テ皮脫テ欲墮ヨ云也此濕熱ノ致スト

コロナリ紫蘇葉ヲ細末シ瘡濕ニハ上

ニ糝乾ハ清油ニテ調テ傳ヘシ又墻上

蝸牛殼 白者 碾末ノツクルモ效アリ

小兒卒死吐利不解何病 狗屎一丸汁

ヲ絞テ灌之濕ナキ者ハ乾者ヲ水ニ煮

テ汁ヲ取ヘシ

○又方 葱ヲ下部ト鼻中へ納ヘシ立効

ニ甦ナリ

小兒喉中痰壅喘甚 巴豆一粒搗爛シ

一丸トシ綿ニ包ミ男ハ左女ハ右ノ鼻中

ヲ塞クヘシ痰即墮下ル

白毛瘡 松脂研細ニシ一尺餘ノ生白布

ニ裹線ニテ縫蠟燭ノ形ノ如ク香油ノ

燈ノ上ニテ燒其滴ノ下ル油ヲ罌ニ取テ

白毛ニ搽ツケヘシ即愈

○痘疹

痘瘡不快 絲瓜枯タル者ヲ黑燒ニシ

辰砂少許加ヘ研末シ蜜水ニ調ヘ服ス

甚妙ナリ

○痘疹時作浮

白朮 土炒五分 人參 山藥

焙蓮肉 各一分 茯苓 宿砂 五分 藿香 五分

木香 三分 肉桂 五分 蒼朮 三分 肉豆蔻 五分

油一 訶子 三分 右細末シ飯湯ニ調一ニ服ス

治痘瘡不起 荔枝殼共二ツ 橄欖核 共二ツ 槌碎キ煎服ス

○又方 紫葺茸四五分 砂鍋ニテ煎服ス
スレハ痘即起脹也再ヒ人參三四分ヲ加ヘテ更ニ炒ナリ

痘陷不起 其色黒ク氣欲絶者ニハ 穿山甲洗淨ノ黃色ニ炒末トシ紫葺ノ煎湯ニ酒少シ加ヘ右ノ藥末五分ツ、調服ス

倒陷色黒唇冰冷 狗蠅七狗ノ身上夏ハ多以テ取ヘシ焙乾シ末トシ酒ニテ服スヘシ時ヲ移ニテ即紅潤出ツ

痘疹濕爛不結痂 菜豆粉ヲ敷クヘシ
○痘後頭上ヲ破カクルケヌキヲ以テ取ヘシ痂ヲ結サルニハ魚豆ヲ炒細末シ香油ニテ解ツクヘシ

痘後頭面抓破膿水淋漓 屋草ヤブ草干久シキ柑爛タル者ヲ炙乾シ末トメアリカク

ヘシ痘後膿不收者ニモ可用内ニハ保元湯ヲ服スヘシ 人參一匁 黃芪二匁 甘草五分 生薑入水一椀半ヲ五六分ニ煎シ時ニ不拘服ス

痘後餘毒 初至紅腫ニ赤豆アツキ 苜蓿豆フントウヲ如醋ニ浸シ爛シ搗テ汁ヲ取鳥ノ羽ニテ常ニ患処ヲ刷ヘシ自消ス凡疔瘡ノ後ニハ豆腐腥魚肥肉ヲ忌ヘシ食之脾胃氣ヲ泄シテ後ニ必ス多病ヲ生ス

痘毒出膿之後脾胃虛弱膿清不斂 人參 黃芪 白朮各一匁 甘草三分 姜一片 棗二ツ 水ニ碗入八分ニ煎シ食ヨリ遠ク服ス

痘瘡入目

凡痘初テ起ル時胭脂ヲ

眼眶ニ搯ヌルヘシ痘目ニ入ルトナシ

○又痘初テ出ル時牛房子ヲ其母カミ

クタキ見ノ顛門ニツクヘシ痘不入目障防

妙法ナリ

○痘瘡入目ニハ黑狗ノ耳ノ上ノ血ヲ取

一滴眼ノ内ニ入ヘシ即除ク

○一方 蟬蛻洗淨ノ白菊花各等分ニ

研テ為散葉一度ニニム白湯ニ蜜一匙入

テ食ヨリ遠ク服ス一日ニ兩度用ユヘシ此方

或ハ病後ニ障翳ヲ生スル者ニモ用效

○又方 免糞焙乾シ或ハ散葉又ハ丸

モ茶ホノウハスミニテ用ユ

痘後目眼

菊花 蛤粉 免糞 草決

明 穀精粉 兩 蟬蛻 糊足ヲ去 右細末シテ

雞肝一具 不落水 竹刀ニテ用キ葉末一ム

ヲ入箱ニテ裏蒸熟ノ食之

折傷諸症

打身 金瘡 湯火傷 竹木刺

跌打損傷

氣絶不能言 氣急 韭汁ヲ

童便ニ和テ蓋服ス

渾身打傷

小麥多葉 燕窩 葡萄葉 青松毛

各一丈把共ニ搗爛シ布タル上ニ攤ヘシ皮ヤ

フシタ生モ肉ニ貼其上ヲ被ニ裏テ酒ヲ醉

ホトニ飲睡醒レハ即愈

○同 湯處瀾大ニノ血出テ不止麩ヲ上ニ

敷風ニアタルナカレ七日ニノ愈或ハ麩ヲ

姜汁ニ和傷處ニ貼ヘシ亦能止血疼ヲ去

○跌打遍身腫疼拘頭骨ヲ灰ニ燒陳

香糟ト同ク和疼處ニ貼ヘシ

○同 青腫ニ豆腐ヲ指ノ厚ニ切片鍋ニテ

多熱腫如ニ貼冷ハ又易ヘシ面ヲ打青
腫ニモ敷次貼レハ舊ノ如クニナル

打頭腦破骨折 葱白ヲ蜜ニ和搗勻ヘ
厚ク付ヘシ立トコロニ效アリ

肩破骨折 葱白ヲ蜜ニ和搗勻テ厚
付再ニ蟹ヲ瓦上ニテ灰ニ焼研末ニ酒ニ

テ服シ碎テ睡ル其骨自合テ志アリ
○又方 白茯苓炒テ末トシテ毎服一合熱

酒ニテ調服シ被ヲ蓋汗ヲ出セハ愈
從高墮下瘀血沖心欲死 倉卒ニ無藥

車夕開テ熱心便ヲ灌クヘシ
○同瘀血積痛難忍 當歸尾 五反 大黃

酒煮 桃仁 去皮尖 酒ニテ煎シ鷄鳴ノ時服ソ
至曉瘀血ヲ下ニテ即愈

隊車落馬助骨痛不止 延胡索末ヲニ
好酒ヲテ服スル一日ニ二次即愈

金瘡 急ニ已カ小便ヲ淋ニ淋ヘシ口渴
水ヲ飲ヘカラス但肥膩タル物ヲ食シ之

ヲ止シ若薄粥ヲ食スレハ血沸出テ必ス
死ス慎ニ分狼之傳藥ニハ花葉石ヲ研末

シ敷或ハ荔枝核ヲ細末シ敷ヘシ或ハ竜眼
肉核殼乾ニ燒テ細末シ敷ヘシ皆效アリ

○若血出ルテ多ク寒熱シ口渴ハ補中益
氣湯ニ麥門冬五味子ヲ加ヘテ姜枣入

水煎シ空心ニ服スヘシ
金瘡磕損折傷 血出テ疼痛不止葱白

砂糖等分ニ研和テ傳ヘシ痛立トコロニ
止リ更ニ無瘡

○生半夏研テ細末シ血ヲ帶テ上ニ以テ
之立処ニ捺ヲ止且結痂ノ口ヲ収メ生肌

○止血方 石灰凡化 大黄切片 錫四兩 內ニテ
共ニ炒桃花色ニ丸ヲ取テ研末ニ細細ニ細細ニ細細
收藏置テ金瘡折傷ニ敷ヘシ即時止血
切ナリ

箭鏃傷

海蝶蛸ヲ研末シ付ヘシ血オノ
ツカラ凝テ愈

○毒箭ニ遇タルハ纏ワラニ皮肉ヲ傷トイヘ
便膿チク沸爛テ死ス急ニ人尿汁ヲ飲又傷
ノ処ニ塗ハシ救命為急臭穢ヲ嫌キフ
杖ニ打レテ後童便ニ碗ヲ飲ヘシ

杖傷

杖ニ打レテ後童便ニ碗ヲ飲ヘシ

中攻心ノヲノ鬼ノ熱ノ豆腐ヲ打レタルトコロニ
鋪キテ其氣蒸カ如クニシキ其ノ腐爛紫色ニ
ナル時ニ取易々々スヘシ紫色散ニテ淡ニ色
ナルキ止ルナリ

本耳油兩鐵錫ニテ煎焦存性細末シ一度
ニ五錢ツ好酒ニテ服ノ後少時坐スハ藥
力杖瘡ノ上ニ至レハ肉裏ヨリ外ニ出ル也
ニ刺ス如ク瘻ニ甚シク不時血流ル也
ニ膏ヲ第ニ次日自消ス

○杖瘡腫痛ニ雄黃二分 蜜陀僧一分 研
テ細ニ水ニ調テ敷ヘシ極テ妙也
○又大黃末ヲ醋ニ調テ敷ク或ハ童便ニ
調テ敷ヘシ

○又方杖ニ打レテ後毎日白芨末ヲ米飲
ニテ下スヘシ神效アリ如潰爛ニハ乳香ヲ
香油ニ煎シ瘡ノ口ニ塗ヘシ

湯火傷

冷水ニ浸スハカラス即時痛ス

トイヘ後ニ必ス爛テ膏ニ至リ難愈也
玄妙飲ヲ服スヘシ 天花粉 玄參各

陳皮 桔梗 山梔子 各一匁 淡竹葉 二十片
水煎服ス如急ニ藥ヲ求メカタク時小蘗
葡萄絞汁ニ碗ヲ服ス或ハ薑便ヲ服メ其
心ヲ護火毒内ヲ攻ルアタハサラシム外ニ
ハ大黃末ヲ桐油ニ調ヘ付ヘシ即愈者モ
此方ヲ用レハ皆愈恙

湯火傷皮紅末破爛者 大寒ノ藥ヲ
付ルヲ急ニ洒シ以テ洗ヒ其熱ヲ殺トキ
ハ毒外ニ出テ不爛

同爛去肌肉或見骨者 百竹霜 三匁 輕
粉 一匁 蘇末 一匁 香油ニ調テ塗ヘシ

○又金箔ヲ貼テ其上ニ桐油ヲ塗フニ
金箔ハハミナク厚ク貼ヘシ

○又方青黛ヲ敷ヘシ或ハ白芨末ヲ香油
ニテ付シハ末蘗皮晒乾シ細末ニ香油
ニテ敷成ニ楠滑石 各一匁 研細末ニ敷ヘ
シ皆能止痛無痕

湯火傷毒入裏 或冷水ニ浸シ火傷
内ニ攻煩燥之内熱口乾大便秘結ス

連翹 赤芍藥 羌活 防風 當歸
山梔子 甘州 各一匁 大黃 炒 水ニ碗燈心
二十根入ハ分ニ煎シ食ヨリ遠ク服ス

爛被傷 鈔所傷 蜂蜜八兩煎シ燒酒
上入量ニ隨テ熱服シ汗ヲ取テ安卧
ス次日鉄子自被ノ上ニ粘ス

火藥沖眼瞎 即地ニ卧テ人ノ熱キ小
便ヲ眼ニ澆ハ痛即止徐ニ已カ小便ニ
テ常ニ洗ハ明ニナルナリ

○火藥ニテ傷爛ニ蜂殼 鹽羅中者 茶
葉ト同ク搗爛ニ搽ヘシ

人口咬傷 生栗ヲ搗テ付ヘシ毎日一次

換痛ヲ止紅ヲ消ス

抓破面皮 輕粉ヲ生薑汁ニテ調付

ハシ無痕愈

竹木刺入肉不出 鹿角ヲ燒末少水

ニ調付ヘシ立処ニ出 久者モ一タラ 不出

○又方 栗子生ニテ嚼敷ヘシ即出

○又象牙刮テ水ニ調敷ヘシ

○破傷風

破傷風 皮肉損傷後外風邪ヲ受

獲テ経絡ニ入漸傳テ裏ニ入其患寒

熱ニ作口噤咬牙之角子中ニ沫ヲ吐

陰ニ入トキハ身涼ク汗之傷処及

ニ陷如故者其毒即内ニ収ルナリ萬

病ヲ用テ中ニ茶ニ風邪ヲ引出サシメ

頂ニ玉真散ヲ用テ之膿ヲ出シテ為

效如汗ノ後前症不退傷処不高漸醒

漸昏時ニ茶ニ時ニ口噤不用

茶出者ハ終ニ死ス

萬靈丹 蒼朮 全蝎 石斛

天麻 當歸 甘竹 炙 川芎 荆芥

細辛 防風 麻黄 川烏頭 湯炮 去核 草烏

頭 湯炮 去核 何首烏 各一兩 雄黄 六分 右細末

煉蜜ニテ丸之或ハ一兩ヲ分テ四丸トシ或

ハ一兩ヲ分テ六丸トシ或ハ一兩ヲ分テ

九丸トス右三等ニコレラユルハ病人ヲ老

ト壯ト又病ノ緩ト急ナルトニ用ユルタメ

ナリ辰砂ヲ衣トシ磁鐵ニ收貯用ユル

時ハ葱白鬚トモニ九莖煎湯ニシ茶

碗ニ一ツニテ右ノ丸藥一粒ヲ口ニ含化シ

熱服之被^フ蓋汗ヲ出^シ人愈^ス如服^後汗
出ル^レ遲ハ再^ニ葱湯ヲ用^テ催^スス^ハ汗必
ス淋^カ如^シ少頃^ニ被^ク去^ル汗自^ラ飲^ル
此方^凡一切腫毒風氣疥癩^スヘキ者^ハ皆^テ可^ク服^ス之^レ如^シ諸病
表^証相^兼ル^レチ^ハ散^クガ^ル者^ニハ^ハ只^シ熱酒^ニテ^テ服^ス之^レ後
風^ヲ避^ク稀粥^ヲ食^スス^レ冷^{タル}物
忌^ム此藥^ヲ婦^ハ服^スル^ナラ^ズ

○玉真散 南星 防風 白芷 天麻

羌活 白附子 各等^分 研細末^ニ傷^處敷^ヘシ

此藥^凡一切腫毒風氣疥癩^スヘキ者^ハ皆^テ可^ク服^ス之^レ如^シ諸病
表^証相^兼ル^レチ^ハ散^クガ^ル者^ニハ^ハ只^シ熱酒^ニテ^テ服^ス之^レ後
風^ヲ避^ク稀粥^ヲ食^スス^レ冷^{タル}物
忌^ム此藥^ヲ婦^ハ服^スル^ナラ^ズ
一方 蕪^木末^ヲ酒^ニテ^ニ女^服ス^ヘシ^又蓮
房^灰燒^キ研^細ニ^テ敷^之再^テ酒^ニテ^テ服^ス
皆^ニ效^{アリ}

○又方 蟬^蛻四^兩灰^二燒^存性^魚吹^酒
服^シ蓋^被出汗^愈

○中^藥并^虫傷^傷

解諸毒 腹中不快^覺ハ生^豆ヲ^合嚼

テ腥^氣チキハ此^中煮^ナリ^急ニ升^一杯^一味
濃^煎連^飲手^ニテ喉^ヲ探^リ吐^逆ス^レ
ハ即^チ愈^ス

服藥過^多生^出毒^病 頭^腫如^斗唇^裂

流血^或ハ心^中飽^悶之^或ハ脇^腹痛^甚ニハ
黑豆^小者^各五^合煮^テ濃^汁ヲ^服之^其
豆^ヲ食^スヘ^シ即^チ愈^ス

○百^藥ノ毒^ヲ解^キニハ甘^州煎^湯ヲ^飲ヘ^シ

解^附子^川烏^頭斑^猫等^毒 黑^小豆^ヲ煮

タル汁^ヲ飲^ヘシ

解^砒霜^毒 凡^此毒^ニ中^ル者^ハ煩^燥如

狂^心腹^痛頭^旋吐^セシト^ノ吐^セス^面色^青

黑^四肢^逆冷^之命^在頃^更急^ニ甘^州湯^ヲ

飲へ之或ハ菘豆湯或ハ冷水数碗ヲ飲へ
之或ハ夏枯草ヲ濃煎之飲或ハ鷄子ヲ
五六枚碎和勻テ灌下ス總テ吐逆ノ毒
ヲ解シツルヲ度トス醒テ後不言者ハ
毎日常菘豆水ヲ飲ヘシ毒盡テ自愈

解巴豆毒

芭蕉根葉ヲ搗汁ヲ取テ
飲之或ハ黃連一匁煎服ス或ハ冷水ヲ

鹽海毒

豆腐漿ヲ口ニ灌下ス
時ハ黃豆ヲ水ニ浸シ浸シ搗爛テ灌下ス

酒毒至死

黒大豆二升煎之汁ヲ飲ハ
餘ノ燒酒ノ毒ニハ鍋蓋ノ上氣水ヲ半盞

灌クヘ之即醒

野菌毒

滑石 六匁 甘草 一匁 研末之毎
服ニ水煎服ス效アリ

解藥毒

麝香一分煎湯白湯服ス
河豚魚毒 香油一碗灌之吐止メ愈或ハ

蘆根ヲ煎服ス

解解毒

藕根ヲ搗汁ヲ服ス或ハ冬瓜ノ
汁或ハ紫菀汁ヲ服メ解ス

諸骨哽喉

喉ニ骨ヲ立
白飴ヲ唾人ハサニテ
飲ヘシ立止ニ下ル或ハ鹿角ヲ剉ミ津ヲ含ミ

燻之如七日ヲ經テ不出ニハ鯉魚鱗皮ヲ
燒テ水ニテ服スヘシ

○悞テ吞鉄物栗ヲ燒炭ニシ紅ヲ其ニ
研テ粉ニシ砂糖ニ調ヘテ二三匁服スヘシ

立トコロニ愈

稻芒入喉

白飴糖ヲ食スヘシ妙ナリ

○麥芒入目大麥ヲ煮タル汁ヲ以テ目
ヲ洗ヘシ即出

狗咬

百州霜

山野人家者用
カミミカミ
カミミカミ

香油二調之

へし或ハ杏仁ヲ嚼テツクへし或ハ牛糞蝨蝎屎
ヲ敷へし皆能救急

馬咬及踏傷

傷處ニ灸メ人糞馬糞氣

糞此内何ニテモ一味ヲ燒細末シ猪脂ニ和
テ敷へし内ニハ獲木湯ヲ一碗服シテ即
止痛

蛇咬

針ニテ傷処ヲ刺血ヲ出シ雄黃

五分五厘亞脂一兩共ニ為末毎服ニ好
酒ニテ服シ傷処ニモ敷之瘡ハ少留出
スへし燥ハ油ヲ塗頭ヲ縛毒氣ヲ内
ニ攻メテ防久シ

蜈蚣咬

吳茱萸搗爛シ付へし或ハ

頭垢ヲ搔テ掩之
蜂螫ハハ毒ヲ洗拭乾シ香油ヲ塗

之或ハ湯湯ヲ敷之數見
諸瘡毒
鐵箍散 一切腫毒初テ起ルニ圍之即散

成ニ圍之毒氣攻走ルニ不至無膿圍
之有膿イテ潰サ生圍之即潰已ニ潰ルニ

圍之膿ヲ追出ス 荷葉 九月 薑黃 陰乾ニシテ

白欬 五倍子 白芨 各五分 大黃 二兩 蠟殼 五個

陳川粉 炒 右細末シ醋ヲ濕メカタク調テ
腫物ヲ圍貼ル

○又方 貝母 南星 各七分 連翹 五倍子

荷葉 錢霜者 各二兩 共ニ末シ水ニ調テ腫処ニ敷
中ニ孔ヲ留テ毒氣ヲ出ス救アリ

治癰疽方 一切癰疽諸毒膿已ニ成テ
不穿破者ニ黃芪 穿山甲 研末 川
芎 三分 當歸 二分 皂角刺 一分 水二碗入一

碗二煎之隨病前後服又酒一杯入テ服ス
ハ毒即出

疔瘡 煩燥之作渴惡毒攻心ニハ 靑

靑二兩四者ニハ 雄黃五々 麝香サ許 蒼耳

燧灰 右細末之ニ々々、蜜水ニテ調下急ラ

護ルヘシ

○疔瘡ニ針ヲ刺テ後餘毒走散之腫ヲ

刺スハ、蟬ノ肝 雄黃如キ者 白芨・白蔞 大黃

白芷各四 黃柏二兩 輕粉五々 菴豆粉一兩

共ニ末トシ醋ニ調テ腫ノ四邊ヲ圍ハシ夏

月熱甚時ハ蜜水ヲ調テ貼ル

嘴唇上疔瘡 西ノ腿腕ノ中紫黑筋ア

ルヲ針ニテ刺惡血ヲ出シハ立ニ消ス

疔瘡初起 白芷 生薑 一兩 共ニ搗テ

温酒ニ浸テ取テ汗ヲ取テ吹散ス

○疔腫 敗毒 菊花 一握 汗 搗テ 弄ル

口即落冬ハ根ヲ采テ用ユ神驗ノ方也

火珠瘡 其瘡珠ノ如ク始ハ髮ノ中ニ發

シ相深テ不已亦命ヲ傷者アリ生薑ナニタイコン

ヲ搗爛シ蒲ヲ取テ醋ニ浸シ患處ニ貼

ヘシ即愈

絲瘡 形線ノ如ク大小不一上下心ニ

至ハ即死ス治法ハ瘡ノ頭ヲ截住針ヲ

刺テ血ヲ出シ浮萍ソクサヲ嚼テ塗ヘシ即愈

疥瘡 今俗ニ云ヒセン 大風子油五々 水銀

樟腦 油核桃 輕粉各一 川椒五々 共ニ

研テ搽スルヘシ自愈

○又方 鷄子五六者テ黃ヲ取炒テ油

ヲ出シ此油ニテ梳椰子一ツ硫黃少 研

末シタルヲ調ヘ毎日三四次擦スルヘシ十日

ヲ不道ニテ愈

○又方 松香一兩 雄黄一兩 共ニ細末シ紙ニ捲テ條子トシ菜油ニ一夜浸シ取出シ倒ニノ燒之滴下油ヲ瘡ニ塗ヘシ即愈

臙瘡 俗ニ云ハバ 杏仁皮去テ紙ニ包テ 輕粉五

共ニ和勻猪脂ニテ子リ先黄栢ヲ水ニ浸シテ瘡ヲ洗ヒ拭乾ノ此藥ヲ敷箱ニ包ヘシ投日

白癬瘡 俗ニ云ハクモ也 癩癬ハセニガサ 班猫ヲ糯米ト同ク炒米ヲ去テ班猫ヲ研末シ煉蜜ニテ

解テ付ヘシ黄水出テ多拭去ニ四次ニテ愈

○又方 頭上身上ニ風癬出テ癢ク抓破

テ瘡ヲ作時ニ愈時ニ癩ニハ 巴豆殼ニ 明礬分 研末シ生姜片 藥ヲツケテ痒トキニ愈

○又方 荊芥一兩 甘草二兩 研末シ元陽ニテ瘡ヲ洗ヒ拭乾シ藥ヲ付ヘシ

楊梅瘡 牛黄如上身ニ在ニ五分 丁香五分

天竺黄三 羚羊角二 木蓮蓬十個 黄麻

花二 葛麻花二 生地黄四兩 皂角刺二

奇良四兩 以上細末シ煉蜜ニテ糊子 大ニ丸シ

海清清 晨ニ白湯ニテ四五十九服ス

破者ニ土茯苓三斤 爛處ヲ去 乳香 沒藥

一介十兩藥ヲ和勻 施一 千餘下ニノ麻油ヲ手ニ擦テ丸トス大彈子ノ如ク毎日清晨ニ四粒服シ晚ニ三粒服ス土茯苓三斤 濃煎シタル湯ニテ用ニ藥一劑ヲ用盡セハ立トコトニ愈ニ水ク無茶セス丸姜諸腫物食 スルヲ

止へし

下疳瘡

洗藥方 荆芥 黃柏 馬鞭

炒 甘州 葱 右煎湯ニテ洗之 訶子ヲ

灰ニ燒テ麝香少シ入洗タル紙ニ移ヘシ

便毒

大黃 二兩 五靈脂 四分 穿山甲 四分

白芷 四分 乳香 沒藥 五分 共ニ為末毎服

六分空心ニ好酒ニテ送下ス

陰頭生瘡

白蜜ニテ甘州ノ末ヲ調塗ヘシ

諸患瘡不愈治ス
又白蜜ハカリヲ用ヒモ效アリ

努肉

瘡癢諸毒新ニ愈ハ官肉腫出ル

ニ烏梅肉搗爛シ蜜少入紙ニ攤貼之患

肉即収リテ永無後患

熱癰

菊花根搗テ汁ヲ取魚吹酒一

テ調服ス上ノ身ニアラハ空心 服又下身

凡ニ食後ニ服又自消ス

諸瘡不収口

白檀花黑燻ニテワラケヘシ

瘡ノ中宛

大サノ如キ者モ神效アリ

標瘡

馬刀瘡已ニ潰ルニモ未潰ニモ或

ハ日久シク不愈者ニ夏枯州六兩水ニ碗入

七分ニ煎シ食ヨリ遠ク服ス虚甚シキ者

ハ濃煎シ膏ノ如クシテ服シ腫外ニ五錢之

多ク服シ益善兼テ十全大補湯ニ

膏附子貝母遠志ヲ加ヘテ煎服シ數日

同傳藥

白玉簪花ノ葉ノ嫩ヲ取テ醋

ニ一夜浸シ飯鍋ノ上ニテ蒸爛シスリテ膏

藥ノ如クシテ患処ニ貼ヘシ即愈

手指天蛇毒

白粉 陳者 雄黃末 一匁

搗爛シテ貼ヘシ

又方

蜈蚣 一條 雄黃 三匁 研末ノ鷄屎

清ニテ調ヘ患処ニ付ヘシ即愈此方俗ニ

云指へウソニ用テ救アリ

黒子疝目 續隨子熟スル時塗之自落

肺癰 口鼻キ膿ヲ吐ク即肺痿テ難

治者服之神效アリ 第一四劑服スル方

薏苡仁 絲瓜 大耳竹 俱 牡丹皮 赤芍

藥 貝母 桔梗 瓜蒌仁 陳皮 升麻 鱉

生薑一片棗二個水二碗入八分二煎之食

後温服ス如大便不通加麻仁始

方ヲ四劑服シテ後次ノ方ヲ用ユ 第二

服スル方 赤芍藥 天花粉 甘草 瓜

蒌仁 桔梗 知母 貝母 百合 獨活

杏仁 連翹 各等 水二碗燈心十根 白果

去殼七 八分二煎之食後温服ス此方ヲ

四劑服シテ後次ノ方ヲ用ユ 第三服ス

ル方 貝母 獨活 百合 杏仁 桔梗 瓜

蒌仁 天花粉 瓜蒌仁

各等 燈心十根 白果 水二碗入八分煎

之食後温服ス此方四劑用テ即愈

後白養紅葎葡萄鴨蛋身ヲ終ルニ食

ハカテス若食之再発ノ不治

○又方 白花百合洗淨搗汁ヲ取毎

日二碗時ニ不拘服ス七日ニシテ愈

肺痿 肺癰ハ先風寒ニ感シ受

テイニタ発シ越ルノ経ス肺中ニ停リ示

七情饑飽勞役ニ因テ脾肺ヲ損ノ生ス

ル者アリ其証初ハ毛聳テ惡風咳嗽声

重ク胸痛頂強轉スルノ不能其候ナリ

久之キキハ飲食減少シ又嗽勞傷ニ至

リ痰血ヲ吐寒熱往來ニ膿ヲ咯声不出

咽痛其候轉ノ肺痿トナル如此者八百死

一生ノ病也 大ナル瓜蒞一個孔ヲ册内ノ子
ノ殺ホト杏仁去皮ヲ入孔ヲ封シ黄泥ニテ
包ミ煨テ烟ノ止時ニ取出メ冷シ去リ又
杏仁ノ殺ホト貝母ヲ加ヘ共ニ研テ細末ニシ
蜜ニテ調ヘ卧時ニ吞ツ、燈心湯ニテ服ス
腸癰 小腹堅ク掌ノ如ク熱ニ換之痛
肉色ハ故コトニ或ハ嫩赤ク微腫モアリ
小便頻ニシテ汗出憎寒脈緊者
効有方服此神效アリ 大黃炒 朴硝各
牡丹皮 白芥子 桃仁去皮尖 水ニ燉入ハ
分ニ煎シ食前或ハ空心ニ温服ス
又方 明礬四兩 肥皂十五個 雄黃二兩
大黃酒拌蒸 共ニ為末空心ニ金銀花五
酒ニ煎シ此酒ニテ吞ツ、服ス有膿
大便出無膿守消シテ不世

其脈洪者有膿可下其脈沉ニシテ
緊者ハ下膿不可下

肚内無名腫毒 蠶甲ヲ煨テ存性為末
酒ニテ服ス

○餘方補遺

早起辟穢方 凡人蚤起テ或ハ冷後不
時或ハ油膩ヲ食シ或ハ穢氣ヲ聞多ク
嘔吐之腹痛泄泄等ノ症アリ用此
之蒼朮水浸ス一宿 白朮壁土拌 陳皮
厚朴姜炒各 甘呬 白芷茯苓 丹參各
右細末之蜜ニテ龜眼肉ノ大サニ丸之口ニ
嚙化服ス或ハ淡薑湯ニテ服ス之感冒
風邪寒暑者瘧疾並ニ皆治之

許真君七寶如意仙丹

服之百疾悉瘳

川烏頭泡 黃連去 人參去 茯苓

乾姜慢炙 桔梗去芦 肉桂去粗皮 石菖蒲日干

蒲洗淨 厚朴去皮 吳茱萸去核 柴胡去根

紫苑洗淨 川椒去子炒 皂角去皮 當歸洗淨

木香去粗皮 大附子一個童便泡 巴豆去殼紙包壓

以上十八味各二兩外二枚椰子一兩加土 地酒

選清淨三 五月五日午時或八 每月七日庚申

甲子福生日天德日身ノ 吉日ヲ 頌擇 雞

犬ノ 邑不 聞處 ヲ 丹ヲ 煉室 卜ス 人事

除辛 先許 真君 ノ 神位 ヲ 奉安 置供 物ヲ

具ヘ 拜ニ テ合 藥救 入ノ 旨ヲ 陳人 如法

炮製共 三極 細末 卜シ 柏ノ 中ニ 入杵 ヲ

二千分 リニ 煉蜜 或ハ 麩糊 ニ テ 梧桐 子

大カ 丸ニ 丸ニ 上好 辰砂 ヲ 衣ト 際ノ 收貯 ハ

病ノ 運ハ 積ニ 隨テ 運送 ノ 時服 ス ハ 宜

外ニ 藥ヲ 單服 生ハ 勿ラ 日忌

へシ 田ノ 法ニ 瘋癩 熱病 ニ 三五 九九 抄水 ニ 用子

傷寒ニ 丸ニ 生毒 湯ニ 下ス ○ 鬼崇 邪氣 ニ 六

九九 ○ 嵐瘴 不服 水土 傳尸 癘症 五痛 怔忡

二八 九九 ○ 顛狂 ニ 九九 ○ 已上 俱ニ 寒ノ 煎湯 ニ テ

下ス ○ 大麻 風成 塊遍 身麻 木面 虫行 力

如ク 或ハ 口眼 歪斜 眉脫 肉爛 左癱 右瘓

偏正 頭風 ニ 五九 ○ 鶴膝 風紫 白癩 風

痰風 癰二 三九 俱ニ 荆芥 ヲ 煎シ タル酒 ニ テ

下ス ○ 誤テ 毒藥 ヲ 吞タル ニ 九九 ○ 消湯

浮二 三九 ○ 痢疾 大小 便閉 ニ 七九 ○ 酒毒 ヲ 三九

喉閉 ニ 七九 ○ 腮腫 丹瘤 癰疽 疔瘰 癧

二八 五九 七九 已上 俱ニ 温酒 ニ テ 下ス 赤痢 ニ 八

黃連 煎湯 ニ テ 下ス ○ 白痢 ニ 八甘 州煎 湯

二テ 下ス ○ 食積 心腹 膨脹 心氣 終痛 ニ 七九

○喘息咳嗽二三九俱二生姜湯三下ス

○及胃吐食二五九華澄茄湯三下ス

腸中氣塊七煨五シタル生薑湯三下ス

腹中成塊痛不止二五九皂角煎酒三下ス

下ス○疝積二八九莪朮生薑煎湯三下ス

○腰背痛二三九鹽湯三下ス○七

水氣二八九茯苓湯三下ス○黃疸二五九

茵陳湯三下ス○虫益毒二五九甘草湯三下ス

下ス○癰疾二七九桃枝湯三下ス○

五淋二九燈心煎湯三下ス○虫積二五九

史君子湯三下ス○腸風臑毒下血三

陳米湯三下ス○疝氣腫痛二八九蘿蔔

子三研或八茴香湯三下ス○諸痔二九

淡癰湯三下ス○婦人血崩二八九百

酒三下ス○血氣刺痛二八九牛膝湯三下ス

○血氣刺痛二八九牛膝湯三下ス○母水

不調子宮冷孕二九子三笑或突症二

五九艾醋湯三下ス○赤白帶二九絲綿三

下ス○艾醋湯三下ス○赤白帶二九絲綿三

下ス○艾醋湯三下ス○赤白帶二九絲綿三

下ス○艾醋湯三下ス○赤白帶二九絲綿三

下ス○艾醋湯三下ス○赤白帶二九絲綿三

下ス○艾醋湯三下ス○赤白帶二九絲綿三

下ス○艾醋湯三下ス○赤白帶二九絲綿三

下ス○艾醋湯三下ス○赤白帶二九絲綿三

下ス○艾醋湯三下ス○赤白帶二九絲綿三

下ス○艾醋湯三下ス○赤白帶二九絲綿三

下ス○艾醋湯三下ス○赤白帶二九絲綿三

下ス○艾醋湯三下ス○赤白帶二九絲綿三

下ス○艾醋湯三下ス○赤白帶二九絲綿三

下ス○艾醋湯三下ス○赤白帶二九絲綿三

下ス○艾醋湯三下ス○赤白帶二九絲綿三

下ス○艾醋湯三下ス○赤白帶二九絲綿三

下ス○艾醋湯三下ス○赤白帶二九絲綿三

下ス○艾醋湯三下ス○赤白帶二九絲綿三

病家へ出入る者ハ縁紗囊ニヨリ入テ
ニ佩ヘシ最ヨク邪氣ヲ除ク高人仕官
人旅ニ行ニ携ヘシ亦人ヲ利便アリ
凡此藥一劑ヲ合シ千人ヲ濟總テ奇
沐浴シ慎テ修製スレハ沉疴奇恙
起死回生ノ功アリ予因テ為好
樂施者勸焉

七情交感丹

一切公私佛情名利三笑

志抑鬱煩惱ニ七情ニ傷ラレ飲食不

進面黃形羸胸痞悶疼痛スル等ノ

症ヲ治ス 香附子 一升長流水ニ浸ス

神 各細末シ煉蜜ニテ彈子ノ大サニ丸

清晨ニ一丸ニ嚼白湯ニテ下ス或ハ

陳皮湯モ可也

脫類 俗ニ云フトカイカ文此症皆肺ノ虚損元神

ノ不足ヨリ起ル或ハ官ク矣談倦ヲ忘シ

元氣接續ハルヲ不能ニテ此患ヲ致ス也

先身ヲ平カニ正ク坐シ人ノ面ノ手ニテ

下類ヲ托住メ腦後ヨリ穴竅ヲ送リ上テ

絹一條ニテ類ヲ頂ノ上ヘ包括リ風ヲ避

テ急ニ煎藥ヲ服スヘシ不然風邪ヲ外

ニ受テ必ス痰涎壅盛シ口眼歪斜ニテ

風臟腑ニ中十二魚一生活方

附子 炮皮臍ヲ 白姜 蠶 當歸 各二人參

半夏 白朮 茯苓 各一匁 天麻 煨 陳皮 各

甘州 三分 川芎 八分 燈心 根 生姜 三片 煎服

木癩成瘡 南方多雨地ニ有物木癩

小云大概鼻湯ニ似タリ陰氣積テ古

木ノ上ニ生ス人氣ヲ聞ハハトノ動ク人

其下ヲ過シハ其體ノ間ニ墮ニ成瘡タ

之テ其肌ニ遍ク癩ス辰砂麝香ヲ塗
之即愈

烏鬚黑髮方

茄樹ニ茄ヲ一ツ留孔ヲ
一ツ用丹ノ京墨ヲ内ニ入紙ニテ塞封シテ
樹ノ上ニ留茄ノ老タル時取テ黑燒ニシテ水
ニテ調ヘ指ニ蘸ノ鬚髮ニ搽塗ヘ之即
ク丸ナリ是ヲ糊椶溜樹方ト云ナリ

雀子斑

皂角 三茶 蜜陀僧 各三
丁香香者 連翹 各三 白附子 白芷 白姜 各
右細末シ先皂角ヲ以テ面ノ垢ヲ洗イ
去生蜜少許ニテ藥末ヲ調ヘ面ニ塗一夜
過シ昇辰ニ洗去ヘシ

玉肌散

一切風濕雀斑白屑皮膚作痒
モノヲ治ス 赤豆 五合 礬石 白芷 白芨
各二 滑石 細末シ一升ニ三匙ホク湯ニテ調

早晚洗テ塗ヘシ

呂祖枝梅

男女大人小兒新スノ諸病
生死定カタキ時此藥ヲ豆ノ大ホト印堂
ノ中ニ貼印堂トハ額ノ正中ヲ云線香一本ヲ炷間置テ
藥ヲ去後一時許ニ藥ヲ貼タル處紅斑
色ニ暈ヲナシテ腫起リ散スコレヲ紅霞
捧百小謂其病危シトイヘ凡不死如藥ヲ
貼處一時ノ後紅色ナク腫起ス皮肉常
ノ如キノ不變者ハ白雲漫野ト謂其病
輕シトイヘ凡必ス死ス小兒急慢驚風

切老少ノ痢病ニ貼之紅腫者ハ即愈

此方預生死ヲ知スト云一ナシ

辰砂 三分 銀硃 一分五分光明朱ヲ用ニヘシ 五靈脂 三分
麝香 三分 革麻子 五分去皮 雄黃 巴豆 各五分不去油
各研細ニノ端午ノ午ノ時靜ナル室ノ中ニテ

共二能研油燕脂ヲ加膏トナシ磁盒ニ
入收置女人ノ手ニ觸レテカレ用ル時豆ノ
大一圓印堂ノ中ニ貼其功立如ニアラハ
ル用テ後其貼タル藥ヲ河ノ中ニ流
送ルヘシ

此書明王夢蘭先生輯選而病論詳治法
明附以經驗神妙劑至難治病症發返魂
之術揭速効之方濟世之要軌未有如此
之深劫者因請國手藤井先生以諺文和
解速黃楊登實與王氏外臺葛氏射後鼎
峙之祕錄神方也杏林橘井苟資此書以
治療施起死回生之功可隨手而得焉享

錦囊妙藥祕錄跋
夫祕者止取其驗今復
何取乎祕而世人始因
祕求驗繼因驗及祕定
醒菴蕙子又有茲編也
即出而公世者最不祕
焉嘗自述是言余細閱
之見其探治疾之源裁
試驗之方可謂濟生之
功大矣僭乎本邦不
遍行於是余忘編陋采
而解之終以和語遂為
自濟規格耳題是書者

如何。試驗切要祕方是也。

烏巢先生著述書目

傷寒通玄類證 全部一冊

金匱通玄類證 未刻

醫療手引草 上編 中編 下編 刊行 未刻 全部二冊

同續編 上中下三編各二冊 近刻

周別錄 未刻

張氏醫通纂要 全部五冊刊行

病家示訓 增補附錄 本邦老醫傳 全部一冊

治痢經驗 內經金匱ニモトツキ治論ヲ參テ本邦名古屋丹水子北山友松子等ノ治例ヲ考テ弁明シ痢ヲ治スル方ヲツヒラカニス

和韓人參考 全部一冊

稻若水ノ論并ニ韓人ニ會シ諸參ヲ正セシ筆ヲ語畱録韓參唐參和參ノ品類悉ク真偽ヲ弁明スルノ書ナリ 右合冊ニシテ安永四年校正發行

同後編 附錄家授切紙傳 全一冊未刻

六八本草 中山氏片玉 全二冊近刻
本草頭書

醫方捷經 全二冊未刻

方的 的効方附六經證治要領 全一冊

衆方規矩方解大成 全部二冊刊行

本邦良醫賢達ノレタシク病人ニテタヘ治療ヲナシ覺ヘタル某方ノ的ニ基深ノ妙理アルヲ口受シテ筆記スレ置レシ考解今日療治ノ自的トスヘキ書ナリ

合類衆方規矩大成 全部一冊刊行

副古方後世方經驗之丸散濕毒一切經驗良方
此書ハ鳥巢道人著述ニアラストイハレ手引草ノ中ニ往々参考スヘキヨシヲ記ス療用深理ノ書ナリ又近世用イラル丸散方ノ効驗著明ナルヲ搜リ求テ是ヲシテ附スルニ精瑣ノ治方諸名家ニ秘セラル某方下疳便毒或ハ古濕トナリ元百方治セザルモコレヲ用イテ治シ得タル濕毒一切ノ療治經驗ノ良方ヲ載ス

中條流産書 全部二冊刊行

産前産後ノ治療ハ中條流産ト手引草ニモ記セラル是ハ古書ニ抱ラス的然ニ産婦ヲ治療シテ良タル方法ナレハウキタル事ニアラス実ニ婦人科ノ良書タルヘシ中世旭山先生校正アリテ改メ刊行ス

王機微義 明徐彦純 全部五十冊
劉宗厚著 合本十五冊刊行

黄帝内經ヨリ仲景傷寒論金匱要略等ノ經旨某方ヲ病門ニ悉ク引證シテ治術ヲ發明シテ後世ニ及ヒ孫真人千金方張子和儒門事親王壽外臺秘要嚴氏河間東垣丹溪其餘諸名家ノ書ニ至ルニテ右論ヲ折衷シテ内經傷寒論金匱其外諸子ノ方論病門ニ附スルニヨツテ古方後世方ニ貫通シテ大ニ治療ニ益アル書ナリ

錦囊外療秘録 全部一冊刊行

腫物ヲ悉ク圖ニアラハシ治方膏茶ヲ詳ニ記ス附スルニ下疳便毒五痔梅毒濕毒一切ノ治方ヲ載ス

本草弁明 全部一冊

茶ノ能毒製法真偽考近年國手ノ說ニ糾シ簡便ニ書

本草匯 清康熙帝朝 全部二冊
佩蘭章著

痘疹撮要 痘疹麻疹ノ療治本 全部五冊

本草和解

茶名はろは分
合本四冊

刊行

茶世能毒本草ノ要ナルヲ折衷シテノ世茶ノ真偽辨正ヲソビラカニス

天文醫案

三喜齋稿本
若山立意注
加藤玄順校

全一冊刊行

仲景全書正誤

医宗金鑑
板書

全一冊

藥種名寄帳

前後集有

全一冊

いろは分茶名異名和名ノ知レカタキヲ見ルニ便リス

錦囊妙藥秘錄

明王夢蘭著

全部一冊刊行

單古古方疾病沉痾ヲイマスノ神ノ如クの中ナル方ヲ撰集

華佗中藏經

魏ノ世ノ名醫古方
遺テミツキモ

全部五冊合本

小兒活法

讀陽良医
松下元真著

全部一冊

小兒療治本并秘方ヲ輯録ス

增補燈下集

啓迪院道三先生治療ヲナレ功
驗著明ナル茶方ヲ撰之用イカ加
減法詳ニ記セラル書ナリ

刪補醫方大成

全部一冊

刪補方要

好生子著

全部五冊發行

良医好生子世ニ行ル回春等ノ雜駁ノ書ニテ治療ヲ誤ルヲ歎シ仲景ノ方一モトツキ輯メテラサレ後世トイハル考究片是ヲ撰之病門ヲ百世ニワカチ二千有餘方ヲ附ス和漢各医ノ方考治論ヲハ本邦医道盛ニシ良医多ク時ニ撰レテ專ラ世ニ用ヒラレシ補写ノ偏見ナク古方後世方ノ療治甚深理ナク書ナリ故アテ書林ノ庫藏ニ納テ久シク世ニ流布セス今年先生ノ檢閲ヲ得テ題名ヲ改メ發行ス

龍骨弁

金龍道人選

全部一冊

醫西原

初編二編

各全一冊

鏡法辨惑

藤井郡子著

全部一冊

嚴氏濟世方

嚴用和著

全部一冊

梅瘡秘方

全部一冊

大坂書肆

高麗橋壹丁目
心算橋南四丁目

藤屋彌兵衛
吉屋市兵衛

