



卷之三
1149

傷寒方序

西林正傳圖書

91-2069

夫登高者必自卑行
遠者必自通焉張長
沙傷寒論挈三陔
陽為大綱繫以許
節因其論高矣其旨
遠矣自非墨跋涉之
勞安能窮河源而睹
彼岷崐者乎中澤生
著斯編也蓋有見於
此遂開一大捷徑能
使臨病之際閑卷瞭

熒也而波三陰三陽
許多節目亦浩靡不
率由矣豈非自卑自
適之袁虛若艾窮河
源賜崑崙亦存其人
耳

官醫山田正熙宗圓父識



鄱陽山元禮書



傷寒方題言

夫醫之應變而處劑譬之涉水
淺則可以揭焉深則可以厲焉
其揭之與厲則在於水而已漢
晉而降至唐宋元明家製其方
愈出愈盛為此故也繁豈可厭
乎近世醫流動輒以古今議之
編獨於傷寒採摘諸家方凡若
今不可謂無所見矣庶足以播
于世乎

安永戊戌夏五月

東都侍醫法眼丹波惠仲明



傷寒方

目錄

○初得病一二日發熱惡寒頭痛身疼
日至四五日發熱惡寒頭痛身疼

麻黃湯六

葛根湯六

葛根加半夏湯六

桂枝湯六

桂枝加葛根湯六

桂枝麻黃各半湯七

桂枝二麻黃一湯七

桂枝二越婢一湯七

大青龍湯七

小青龍湯七

度瘴發汗青散八

五苓散八

延年秘錄解肌湯八

麻黃附子細辛湯八

麻黃附子甘草湯八

雙解散九

涼膈散十

白虎加人參湯三

○發汗後

芍藥甘草附子湯土

調胃姜氣湯土

茯苓甘草湯土

五苓散土

茯苓湯土



茯苓四逆湯土

桂枝加芍藥生姜各一兩人參二兩

新加湯土

麻黃杏仁甘草石膏湯土

桂枝甘草湯土

茯苓桂枝甘草大棗湯土

厚朴生姜甘草半夏人參湯土

梔子豉湯土 真武湯土

桂枝加附子湯土

溫經益元湯土 四逆湯

生姜瀉心湯土

竹葉石膏湯土

奪命獨參湯土

溫粉方土

小柴胡湯土

桂枝麻黃各半湯土

柴胡加桂枝湯土

柴胡桂枝乾姜湯土

黃芩湯土

黃芩加半夏生姜湯土

黃連湯土

○發汗後不解四時來寒熱者當和解之
五日至七八日 往來寒熱者當和解之

○七八日至十一發熱譁語便秘腹滿硬
二日病在裏

脈沈實者當下之

大柴胡湯土

大柴胡萎蕤知母湯大

小柴氣湯大

調胃養氣湯大

抵當湯土

十棗湯土

三乙柴氣湯土

抵當丸土

六乙順氣湯土

蜜煎導方土

黃連解毒湯土

三黃石膏湯土

大柴氣湯土

黃龍湯土

○下後利或心下痞或結胸或心煩者

大陷胸湯共

小陷胸湯共

- 半夏瀉心湯 芒
附子瀉心湯 芒
甘草瀉心湯 芒
附子粳米湯 六
茯苓四逆湯 六
茯苓桂枝乾姜湯 六
赤石脂禹餘糧湯 八
麻黃杏仁甘草石膏湯 芒
白虎加人參湯 六
猪苓湯 六
危子厚朴湯 六
大柴氣湯 六
五味麥門冬湯 六
獨參湯 六
○下利厥逆者
附子湯 六
四逆湯 六
白通湯 六
吳茱萸湯 六
○虛家假熱者
益元湯 六
升陽散火湯 六
桂附理中湯 六
加減八味丸 六
○十二三日至十七八日 汗下不解為壞症者
大紫胡湯 美
羨氣丸 六
三黃石膏湯 六
小紫胡湯 六
紫胡百合湯 六
一方 千金
炙甘艸湯 六
酸棗仁湯 六
枳實梔子湯 六
○勞復食復陰陽易
枳實梔子湯 六
梔子湯 六
大黃黃連瀉心湯 芒
生薑瀉心湯 芒
桂枝人參湯 六
桂枝湯 六
四逆湯 六
桂枝白朮甘草湯 六
乾姜附子湯 六
深師黃芩人參湯 六
危子乾姜湯 芒
深師黃芩人參湯 六
危子敗湯 六
桃花湯 六
猪苓湯 六
導赤各半湯 六
回陽反本湯 六
補中益氣湯 六
附子理中湯 六
通脈四逆湯 六
真武湯 六
六乙順氣湯 六
黃連解毒湯 六
竹葉石膏湯 六
芍藥湯 六
獨參湯 六
深師酸棗湯 六

大黃豉湯三丸

一方 肝後 三十九

深師竹葉湯 三十九

又方 肝後 三十九

一方 三十九

麥門冬湯 四十

梅師方 四十

竹皮湯 四十

逍遙散 四十

○辟溫方

粉身散 四十

老君神明白散 四十

雄黃丸 四十

附錄

傷寒方

初得病一二

日至四五日

緣熱惡寒頭痛身疼當發汗

麻黃湯 傷太陽病頭痛發熱身痛腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

麻黃 兩

桂枝 二

甘草 一

杏仁 七

箇

右水煎服覆取微似汗不須啜粥餘如

桂枝法將息

○凡發汗欲令手足俱周時出以衆：然一時間許亦佳不可令水流漓若病不解當重發汗汗多必亡陽陽虛不得重發汗也○淋家不可發汗緣汗必使血○瘡家雖身疼痛不可發汗緣汗則痙○衄家不可發汗汗出必額上陷脉急緊直視不能眠不得眠○亡血家不可發汗發汗則寒慄而振

葛根湯 傷太陽病項背強拘無汗惡風葛根湯主之○太陽與陽明合病者必

自下利葛根湯主之

葛根 四

麻黃 二

桂枝 二

芍藥 二

甘草

生姜三 大棗二

兩 右水煎服覆取微似汗不須啜粥餘如

桂枝法將息及禁忌

葛根加半夏湯傷太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之

於葛根湯方內加八半夏半升

桂枝湯傷太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇々惡寒漸々惡風翕々發熱鼻鳴孰嘔者桂枝湯主之○太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂

枝湯主之

桂枝二 芍藥三 甘草二 生姜三 大棗

枝 右水煎服須臾啜熱粥一升餘以助藥力溫覆令一時許遍身熱、微似有汗者益佳不可令如水流漓病必不除若不服汗出病瘥停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小促其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病証猶在者更

宋板有麻

桂枝加葛根湯傷太陽病項背強几々反

汗出惡風者桂枝加葛根湯主之

葛根四 芍藥二 甘草二 生姜三 大棗

桂枝 右水煎服覆取微似汗不須啜粥餘加桂枝法

桂枝麻黃各半湯傷太陽病得之八九日如瘡狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發云宜桂枝麻黃各半湯

桂枝兩十六錢 芍藥 生姜 甘草

麻黃各兩 大棗四 杏仁二十六箇

右水煎服

桂枝二麻黃一湯傷服桂枝湯大汗出脉洪大者與桂枝湯如前法若形如瘡日再發者汗出必解宣桂枝二麻黃一湯

桂枝一兩十 芍藥六錢 麻黃十六錢 生姜

兩六錢

杏仁十六箇 甘草二十六錢 大棗

右水煎服○按陽明篇曰病人煩熱汗

出則解又如瘡狀日晡所蒸熱者屬陽
明也脉實者宜下脉浮虛者宜發汗下
之與蒸氣湯發汗宜桂枝湯宜參考

桂枝二越婢一湯傷太陽病蒸熱惡寒熱
多寒少脉微弱者此無陽也不可發汗

宜桂枝二越婢一湯

桂枝 荀藥 甘草各十
八生薑一兩 大棗
故四

麻黃六 石膏四錢

桂枝 二 甘草二
兩 杏仁四十 生薑

右水煎服

大青龍湯傷太陽中風脉浮緊發熱惡寒
身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主
之若脉微弱汗出惡風者不可服服之
則厥逆筋惕肉瞶此為逆也

麻黃六 桂枝二 甘草二
兩 杏仁四十 生薑

大棗二 石膏加雞子大

右七味水煎取微似汗汗出多者溫粉
粉之一服汗者停後服汗多太陽遂虛
思風煩燥不得眠也

小青龍湯傷寒表不解心下有水氣乾
嘔發熱而咳或渴或利或噎或小便不

利小腹滿或喘者小青龍湯主之
麻黃三 芍藥三 五味半乾姜三 甘草
兩 桂枝三 半夏半細辛二

右水煎服○若微利者去麻黃加茺蔚花
如雞子○若渴者去半夏加桔梗根三
兩○若噎者去麻黃加附子一枚○若
小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩
○若喘者去麻黃加杏仁半斤

度瘴發汗青散金治傷寒赤色惡寒發熱
頭痛項強體痛方

麻黃三 桔梗 細辛 吳茱萸
防風 白木香一烏頭 乾姜 蜀椒
桂心各一 兩

右十四味治下篩溫酒服方寸匕溫覆
取汗汗出止若不得汗汗少不解復服
如法若得汗足如故頭痛發熱此為內
實當服駁故圓云云○時後方曰度瘴
散辟山瘴惡氣若有黑霧鬱敷及丑南
溫風皆為疫癘之候方云云平旦酒服
一錢七辟毒諸惡氣冒霧行尤宜服之

五苓散千金主時行熱病但狂言煩燥不安
精彩言語不與人相主當者方

猪苓 白朮 茯苓各十八銖桂心十二銖澤鴻

右五味治下篩水服方寸七日三多飲

水汗出即愈

延年秘錄解肌湯外臺主天行病二三日頭痛壯熱者方

乾葛四兩 麻黃三兩 荘藥二兩 黃芩二兩 甘草一兩

右水煎服得汗愈

麻黃附子細辛湯傷少陰之為病脉微細但欲寐○少陰病始得之反發熱脉沈者麻黃附子細辛湯主之

麻黃二兩 細辛一兩 附子一枚

右水煎服

麻黃附子甘草湯傷少陰病得之二三日

麻黃附子甘草湯主之

麻黃二兩 甘草二兩 附子一枚

右水煎服

雙解散漢張仲景

益元散通聖散各半兩姜棗水煎

風寒暑湿飢飽勞逸憂愁思慮恚怒悲怒四時中外諸邪所傷但覺身熱頭疼拘倦強痛無問自汗無汗增寒發熱渴與不渴微甚傷寒疫癥汚病兩感風氣雜病一切舊病發作三日裏外並宜雙解散設若感之勢甚本難解者常服雙解散三兩日間亦漸可減並無所損或裏熱極甚腹滿實痛煩渴譖妄須可下証未全或大汗前後逆氣或汗後餘熱不解或遺熱復勞或染他人病氣污毒傳染或中瘴氣羊氣牛氣一切穢毒并漆毒酒毒食毒一切藥毒及墜墮打撲傷損疼痛或久患風眩頭痛中風偏枯破傷風洗頭風風癆病或婦人產後諸疾小兒驚風積熱瘡瘍疹痘無問日數但以雙解散服之周身中外氣血宣通病皆除愈然雙解乃通仙之藥但除孕

婦及產後月經過多并泄瀉者勿與服之惟年老最宜自有造化於中矣○又曰表証脉浮身體肢節疼痛惡風惡寒者可汗之不可下也傷寒無汗麻黃湯傷風自汗桂枝湯一法不問風寒通用雙解散或天水散最妙○又曰凡傷寒疫癘之病何以別之蓋脈不浮者傳染也設若以熱藥解表不惟不解其病反甚而危殆矣其治之法自汗宜以蒼朮白虎湯無汗宜滑石涼膈散散熱而愈其不解者通其表裏微甚隨証治之而與傷寒之法皆無異也雙解散益元散皆為神方

通聖散
防風 川芎 當歸 芍藥 大黃
薄荷 麻黃 連翹 芒硝各半石膏
黃芩 桔梗各一 滑石三分 甘草
荆芥 白术 柏子殼三
右剉五錢 姜五片水煎
益元散

滑石粉 甘草二分
右為末水調或加蜜或葱豉湯調一名
天水散一名六一散

涼膈散

心法類萃

連翹一 黃芩半 柏子半 甘草半 朴硝
薄荷 大黃半
右五錢水煎入蜜少許○一法本方加

滑石

白虎加人參湯傷服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者白虎加人參湯主之○傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯主之○傷寒脉浮數熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之方

發汗後

芍藥甘草附子湯傷發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之

芍藥三兩 甘草二兩 附子一枚

右水煎服

調胃姜氣湯傷發汗後惡寒者虛故也按

者可與芍藥湯不惡寒但熱者實也當和甘草附子湯

胃氣調胃姜氣湯主之 方十九

五苓散傷太陽病發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者少與飲之令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱消渴者與五苓散主之○發汗已脉數煩渴者五苓散主之

猪苓六錢澤瀉六錢茯苓六錢桂半兩白朮六錢

右五味為末以白飲和服方寸七日三服多飲緩水汗出愈

茯苓甘草湯傷寒汙出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之

茯苓二兩 桂枝二兩 生姜三兩 甘草一兩

右水煎服

茯苓湯金治傷寒發汗若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩其脉沈緊發汗則動經身為振○搖者方按即仲景茯苓湯方六桂枝白朮甘草

湯方六

茯苓四逆湯傷發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之

茯苓六兩 人參一兩 甘草二兩 乾姜半兩 附子一枚

右水煎服

桂枝加芍藥生姜各一兩人參三兩新加湯傷發汗後身疼痛脈沈遲者桂枝加芍藥生姜各一兩人參三兩新加湯主之
按於桂枝湯方更加

麻黃杏仁甘草石膏湯傷發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻

黃杏仁甘草石膏湯主之

麻黃四兩 杏仁五十粒 甘草二兩 石膏半斤

右水煎服

桂枝甘草湯傷發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯主之

桂枝四兩 甘草二兩

右水煎頓服

茯苓桂枝甘草大棗湯傷發汗後其人膽下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯主之

茯苓二兩半 甘草三兩 大棗十五枚 桂枝四兩

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

厚朴生姜甘草半夏人參湯傷發汗後腹脹滿者厚朴生姜甘草半夏人參湯主之

厚朴半斤 生姜半斤 半夏半斤 人參一兩 甘草二兩

右水煎服

梔子豉湯傷發汗若下之而煩熱胸中窒者梔子豉湯主之○發汗吐下後虛煩不得眠若剝者必反覆顛倒心中懊惱

梔子豉湯主之○若少氣者梔子甘草
豉湯主之即梔子豉湯方內加入甘草
兩餘依前法得吐止後服

○若嘔者梔子生姜豉湯主之即梔子
內加生姜五兩餘依前法得吐止後服

即梔子
豉湯方

前法得吐止後服

梔子枝香豉合

右水煎服得吐者止後服

真武湯傷太陽病發汗汗出不解其人仍
發熱心下悸頭眩身瞶動振欲辟地

者真武湯主之

梔子三兩芍藥三兩生姜三兩白朮二兩附子一枚

梔子三兩芍藥三兩

生姜三兩

白朮二兩

附子一枚

餘

右水煎服○若欬者加五味半斤細辛
乾姜各一兩○若小便利者去梔子○
若下利者去芍藥加乾姜二兩若嘔者
去附子加生姜足前成半斤

桂枝加附子湯傷太陽病發汗遂漏不止
其人惡風小便難四肢微急難以屈伸
者桂枝加附子湯主之於桂枝湯方內
加附子一枚餘

法依前

溫經益元湯奮治汗後大虛頭眩振欲

辟地及肉瞶筋惕或大汗後衛虛亡陽
汗出不止或下後利不止身體疼痛者
悉宜用

人参 肉桂 甘草當歸熟地 生地
白朮 當歸白芍 陳皮 黃芩

梔子一枚

水二鐘姜三片枣一枚梔法加糯米一

撮煎溫服

四逆湯傷病發熱頭痛脉反沈若不瘥身
體疼痛者當救其裏宜四逆湯○脈浮
而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主
之○大汗出熱不去內拘急四肢疼又
下利厥逆而惡寒者四逆湯主之○大
汗若大下利而厥冷者四逆湯主之

方十

生姜瀉心湯傷寒汗出解之後胃中不
和心下痞堅乾噫食臭脣下有水氣腹
中雷鳴下利者生姜瀉心湯主之

生姜四兩

甘草二兩

人參二兩

黃芩三兩

乾姜

黃連一兩半復升大棗十枚

方十一

右水煎服

竹葉石膏湯傷寒解後虛羸少氣；逆
欲吐者竹葉石膏湯主之。○千金曰：詔
譙汗後表裡虛煩不可攻者，但當與此

方

竹葉二兩 石膏一升半 夏朮半升 人參三兩 甘草

粳米半升 麥門冬一升

右七味以水一斗煮取六升去滓，內梗
米煮米熟湯成去米，溫服一升日三服。
奪命獨參湯暑治傷寒汗後終日昏悶不
省人事，卒熱發燥似有狂言，一切危急
之症宜此服。後額上鼻尖有微汗是其
應也。

人參去蘿蔔

右剉作一劑水煎不拘時服，查再煎服

溫卦方

本事方

白术 藜本 川芎 白芷
右細末每服一兩，八米粉三兩和勻，粉
撲周身，以此汗無。藜本亦得。若汗已出，
盡劑服必汗多亡。陽厥逆惡風煩躁不得
眠也。

發汗後不解四
五日至七八日譙熱惡寒者，當和解之。

小柴胡湯傷寒五六日中風往來寒熱
胸脇苦滿默；不欲飲食心煩喜嘔或
胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下
痞鞭或心下悸小便不利或不渴身有
微熱或咳者與小柴胡湯主之。○傷寒
中風有柴胡証，但見一証便是不必悉
具。○傷寒四五日身熱惡風頸項強脣
下滿手足溫而渴者，小柴胡湯主之。○
凡柴胡湯病證而下之，若柴胡證不罷
者復與柴胡湯必薰；而振却發熱汗
出而解。○本太陽病不解轉入少陽者，
脇下鞕滿乾嘔不能食，往來寒熱尚未
吐下，脉沈緊者與小柴胡湯。○陽明病
發潮熱大便溏小便自可，胸脇滿不去
者，小柴胡湯主之。○陽明病脇下鞕滿
不大便而嘔舌上白脰者可與小柴胡
湯。○上焦得通津液得下胃氣因和身微
汗而出解也。○婦人中風七八日續

得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故使如瘡狀發作時小柴胡湯主之○婦人傷寒發熱經水適來旦日明了暮則譫語如見鬼狀者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈○時後方曰三日已上至七八日不解者可服小柴胡湯微覆取汗半日須更便瘥若不除更作一劑

紫胡半 黃芩三 人參三 甘草二 半夏

半生姜三

大棗十二

右水煎服○若胸中煩而不嘔者去半夏人參加桔梗實一枚○若渴者去半夏加入參合前成四兩半桔梗根四兩○若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩○若脇下痞鞕去大棗加牡蠣四兩○若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩○若不渴外有微熱者去人參加桂三兩溫覆取微汗愈○若咬者去人參大棗生姜加五味子半斤

桂枝麻黃各半湯 傷太陽病得之八九日

如瘡狀發熱惡寒熱多寒少其人不能清便欲自可二日二三度發熱宜桂枝麻黃各半湯方七

柴胡加桂枝湯傷傷寒六七日發熱惡寒支節煩疼微嘔心下支結外証未去者柴胡加桂枝湯主之○發汗多亡陽譫語者不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛以通津液後自愈

桂枝 黃芩 人參各一 甘草兩
半夏二合 茯苓兩 大棗六 生姜半

柴胡四

右水煎服

柴胡桂枝乾姜湯傷傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不呕但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也柴胡桂枝乾姜湯主之

柴胡半 桂枝三 乾姜三 桔梗根四

黃芩三 牡蠣三 甘草二

右七味水煎服初服微煩復服汗出便愈

黃芩湯 傷太陽與小陽合病自下利者與
黃芩湯 若嘔者黃芩加半夏生姜湯主

之

黃芩兩三 甘草兩二 大棗十一枚

右水煎服○若嘔者加半夏半升生姜
三兩

黃連湯 傷傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹
中痛欲嘔吐者黃連湯主之

黃連二兩 甘草一兩 乾姜一兩 桂枝各三錢 人參
半夏半升 大棗十二枚

右水煎服

心法類萃曰 痘在半表半裏用小柴胡涼
膈散合而解之 或小柴胡合解毒湯
如服熱勢未退者大柴胡合三乙氣氣
湯裏俱微半表半裏若裏微者宜大
柴胡合解毒湯

七八日至十一

二曰病在裏 痰熱譖語便祕腹滿硬

痛脈沈實 當下之

大紫胡湯 附後三日已上至七八日不解者可服小紫胡湯微覆取汗半日須臾便瘥若有熱實得汗不解腹滿痛煩躁欲謬語者可服大紫胡湯方○傷寒論曰傷寒發熱汗出不解心下痞鞕嘔吐而下利者大紫胡湯主之

紫胡 半枝 **大黃** 一兩 **黃芩** 三兩 **芍藥** 二兩 **枳實**

枝 半夏五兩 生姜五兩 大枣十二枚

右水煎服當微利也 ○心去類革曰表裏熱勢更甚而心下急鬱微煩或發熱汗出不解心下痞鞕嘔吐不利或陽明病多汗或少陰病下利清水心下痛而口乾或大陰病腹滿而痛或無表裏証但發熱七八日雖脉浮而數脉在肌肉實數而滑者並宜大紫胡湯合解毒湯下之下症未全不可下者用白虎湯脉洪躁裏有微熱不可汗者用黃連鮮棗湯

大紫胡萎蕤知母湯 金治傷寒七八日不解默々心煩腹中有乾屎譖語者上

紫胡 半枝 **萎蕤** 各二兩 **知母** 一兩 **大黃** 一兩 **甘草**

各二兩 半夏二兩

右水煎服即下為効

小承氣湯 傷陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞕鞕則譖語小承氣湯主之若一服譖語止更莫復服○問曰陽明病外証云何答曰身熱汗自出不思寒反惡熱也○陽明為病冒家實也○傷寒轉繫陽明者其人濁然微汗出也○問曰何緣得陽明病答曰太陽病發汗若下若利小便此七津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難者此名陽明也○傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濁然者是轉屬陽明也○陽明病譖語發潮熱脉滑而疾者小承氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉失氣者更服一升若不轉失氣勿更

與之明日不大便脉反微洪者裏虛
也為難治不可更與大氣湯也○
陽明病潮熱大便微鞭者可與大氣
湯不鞭者不与之若不大便六七日恐
有燥屎欲知之法少与小氣湯湯入
腹中轉失氣者此有燥屎乃可攻之按
攻之者謂以大氣若不轉失氣者此但
湯下之也下同
初頭鞭後必溏不可攻之攻之必脹滿
不能食也云云○太陽病若吐若下若
發汗微煩小便數大便因鞭者与小氣
湯和之愈

大黃四兩厚朴二兩枳實一枚

右水煎服初服湯當更衣不爾者盡飲

之若更衣者勿服之

大氣湯傷陽明病譖語有潮熱反不能
食者胃中必有燥屎五六枚也若能食
者但鞭爾宜大氣湯主之○汗出譖語
者以有燥屎在胃中此為風也須下之
過經乃可下之若早語
言必亂以表虛裏實故也
下之則愈

宜大氣湯○病人不大便五六日續

臍痛煩燥發作有時者此有燥屎故也

不大便也○病腹中滿痛者此為實也
當下之宜大氣湯○二陽併病太陽
證罷但發潮熱手足熱々汗出大便難
而譖語者下之則愈宜大氣湯○陽
明病潮熱大便微鞭者可与大氣湯
云○病人煩熱汗出則解又如瘧狀日
晡所發熱者屬陽明也脉實者宜下之
與大氣湯脉浮虛者宜發汗宜桂枝
湯○得病二三日脉弱無太陽紫舌証
煩燥心下鞭至四五日雖能食以小氣
氣湯少與微和令小安至六日與大氣
氣湯一升若不大便六七日小便少者
雖不能食但初頭鞭後必溏未定成鞭
攻之必溏須小便利屎定鞭乃可攻之
宜大氣湯○傷寒六七日目中不了了
睛不和無表証大便鞭身微熱者此
為實也急下之宜大氣湯○陽明發
熱汗多者急下之宜大氣湯○發汗
不解腹滿痛者急下之宜大氣湯○發汗
腹滿不減不足言當下之宜大氣湯○

○外臺載崔氏方曰若胃中有燥糞令人錯語正熱盛亦令人錯語若秘而錯語宜服羨氣湯通利而錯語者宣服四味黃連除熱湯按即黃連羨氣湯用芒硝余以有毒故去之用之數年安穩得下良既服湯亦應外用生姜、羌活、芍藥、大黃、甘草、桂枝、大黃塗之內下部中立通使必去燥糞若服湯兼充而並不得下者可依本方加芒硝

大黃四兩厚朴半斤枳實五枚芒硝三錢合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芒硝

更上火微一兩沸分溫再服得下餘勿服

調胃羨氣湯傷太陽病三日發汗不解蒸

蒸發熱者屬胃也調胃羨氣湯主之

大黃四兩甘草二兩芒硝半兩

右三味㕮咀以水三升煮取一升去滓

內芒硝更上火微煮令沸少少溫服

桃核羨氣湯傷太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下者愈其外不解者尚未可攻當先解外解已但少腹急結者乃可攻之宜桃核羨氣湯

桃仁半升桂枝二兩大黃四兩芒硝二兩甘草二兩

右五味以水七升煮取二升半去滓內芒硝更上火微沸下火先食溫服五合

日三服當微利

抵當湯傷太陽病六七日表證乃在脉微

而沈反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當軟滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也抵當湯主之○太陽病身黃脉沈結少腹軟小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之○陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖硬大便反易其色必黑宜抵當湯

水蛭三升蟲蠅三升桃仁二十粒大黃三兩

右四味為末以水五升煮取三升去滓
溫服一升不下再服

抵當丸傷寒有熱少腹滿應小便不利
今反利者為有血也當下之不可餘藥

宜抵當丸

水蛭半蟻蟲半薑半桃仁半茴大黃兩

古四味杵分為四丸以水一升煮一丸
取七合服之時當下血若不下者更

服

十枣湯傷太陽中風下利嘔逆表解者乃可
致之其人熱汗出發作有時頭痛心
下痞鞕滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不
惡寒者此表解裏未和也十枣湯主之

芫花甘遂大戟

右三味等分各別搗為散以水一升半
先煮大枣肥者十枚取八合去滓內藥
未強人服一丸七羸人服半丸溫服之
平旦服若下少病不除者明日更服加
半丸得快下利後糜粥自養

六乙順氣湯奮代大羌氣小羌氣調胃兼

氣大柴胡三乙羌氣湯大陷胸湯之神
藥也舉世無人知此竒妙耳秘之莫與
俗人言○此湯治傷寒熱邪傳裏大便
結實口燥咽乾怕熱諱語揭衣狂妄揚
手擲足班黃陽厥潮熱自汗胸腹滿硬
遠躋疼痛等證悉皆治之効不可盡述
○凡傷寒過經及虛弱并血氣兩虛之
人或婦人產後有下症或下後不解或
表證未除裏証又急不得不下者用此
湯去芒硝一下之則吉蓋恐硝性燥急故
有此戒

大黃錢枳實黃芩厚朴紫胡

芒硝

芍藥錢甘草分

右將水二鐘滾三沸後入藥煎至八分
槌法臨服時入鐵秀水三匙調服立効
取鐵性沈重之義最能墜熱開結有神
此千金不傳之秘若非吾之子孫羌經
焉肯泄露玄机故戒耳

三乙羌氣湯心法類華陽明病脈逕汗出
不惡寒身重短氣狂語如見鬼狀剝者

發則不識人循衣摸床惕而不安直視
微喘三乙羔氣湯○凡裏証脉實而不
浮不惡寒及惡風身不痛自汗譯語不
大便或咽乾腹滿者可下之不可汗也
以上之証宜小羔氣湯大羔氣湯調胃
羔氣湯選而用之一法不問風寒暑濕
或表裏兩証俱無表証而有可下者通
用三乙羔氣湯下之此藥峻峻効使無
表熱入裏而為結胸及痞之衆疾也或
熱結極深而諸藥數下畢竟不能利不
救成死者大羔氣湯加甘遂一錢七下
之病在裏脉沈細者無問風寒暑濕或
表裏證俱不見或內外諸邪所傷有汗
無汗心腹痛滿譯妄煩燥畜熱內盛但
是脉沈者宜三乙羔氣湯合解毒湯下
之云云

大黃一錢半 芒硝半錢 厚朴半錢 枳實一錢 甘草

右作一貼水煎溫服

蜜煎導方傷陽明病自汗出若發汗小便

自利者此為津液內竭雖硬不可攻之
當須自散大便宜蜜煎導而通之

蜜合

一味內銅器中微火煎之稍疑似餡狀
擾之勿令焦著散可丸併手捻作挺令
頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷
則硬以內穀道中以手急抱散大便時
乃去之

心法類萃曰或表熱極甚而恐羔氣不能
退者或已下後而熱不退者或畜熱內
甚陽厥極深以陽氣怫鬱不能營運於
身表四肢以致通身清冷痛甚不堪項
背拘急目青睛痛昏眩恍惚咽乾或痛
躁渴噏汗嘔吐下利腹滿實痛煩冤悶
而脈道不利反致脉沈細而散絕俗未
明其造化之理而反謂其傷寒極陰毒
者或始得之陽熱暴甚而便有此證候
者或兩感熱勢甚者通宜解毒加大羔
氣湯下之熱不退者宜再下之雖古人

云三下之而熱未退即死矣亦有按法
以下三五次利一二十行熱方退而得
活者免致不下退其熱而必死也下後
熱少退而未愈者黃連解毒湯調之或
失下熱極以致身冷脉微而脅冒將死
者若急下之殘陰暴絕而死蓋陽氣後
竭而然也不下亦死宜涼膈散或黃連
解毒湯或二藥合服或白虎湯合涼膈
散養陰退陽積熱漸以宣散則心胸溫
煖脉漸以生至於脈復有力方可以三
乙羔氣湯下之或解毒湯加六乙散調
之愈後宜服退熱之藥忌發熱諸物裏
熟脉厥者宜白虎湯熱極厥深而諸藥
下畢竟不能利者不救必死黃連解毒
湯更加甘遂末一錢七下之

七八日至十一

二日病在裏

發熱譯語大便調或下

利脈沈實者當清解之○按下利譯語或有可下之者宜詳審文

白虎湯傷三陽合病腹滿身重難以轉側
口不仁而面垢譯語遺尿發汗則譯語
下之則額上生汗手足逆冷若自汗出
者白虎湯主之

知母六石膏一甘草二粳米六

古四味以水一斗煮米熟湯成去滓濕
服一升日三服○心法類萃曰傷寒寢
汗不止白虎湯加麻黃根浮麥傷寒下
後自汗脉虛熱不已白虎加入參蒼朮
服之汗止身涼通仙之法也

白虎加人參湯傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時惡
風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者
白虎加入參湯主之○傷寒無大熱口
燥心煩背微惡寒者白虎加入參湯主
之○傷寒脉浮發熱無汗其表不解者

不可與白虎湯渴欲飲水無表證者
白虎加人參湯主之於白虎湯方內加人參三兩

黃連解毒湯 外臺載崔氏方曰前軍督護劉車者得時疾三日已汗解因飲酒復劇苦煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不得卧余思作此黃連解毒湯方○又曰若胃中有燥糞令人錯語正熱盛亦令人錯語若秘而錯語者宜服兼氣湯通利而錯語者宜服下四味黃連除熱湯即黃連解

黃連解毒湯 黃連兩 黃芩兩 黃柏兩 桔子十四枚

右四味切以水六升煮取二升分二服一服日明再服進粥於此漸瘥余以療凡大熱盛煩嘔呻吟錯語不得眠皆佳傳諸人用之亦効此直解熱毒除酷熱不必飲酒刺者此湯療五日中神効忌豬肉冷水○肘後方曰療傷寒時氣己六七日熱極心下煩悶狂言見鬼散起走及煩嘔七不得眠○心法類華曰凡

是裏証法當下之依法下之其病又不

解或大下後或再三下後熱勢尚甚而不退本氣虛損而不能實擬更下之恐下晚而立死不下之則熱極而死寒涼諸禁不能退其熱勢之甚者或湿熱內餘下利不止熱不退者或因大下後濕熱利不止而热不退脉弱氣虛不可更下者或諸湿熱內餘小便赤澁大便溏泄頻併小腹而急痛者必欲作痢也通常宜黃連解毒湯以解之

如神白虎湯害身熱渴而有汗不解或經汗過渴不解脉來微洪宜用

石膏

知母

甘草

人參

山梔

麥門

五味

水二鍾東一枚姜一片搘法加淡竹葉十片煎之熱服○心煩者加竹茹一團○如大渴心煩背惡寒者依本方去山梔加天花粉無渴者不可服此某為大忌

三黃石膏湯善傷寒發熱脉大如滑數表裏皆實陽盛沸當醫者不達已發其汗

病热不退又復下之大便滑頻小便不利五心煩熱面目如火鼻乾面赤舌乾齒黃大渴過經已成壞証云云○此湯治陽毒發班身目面黃如塗朱眼珠如火狂叫欲走六脉洪大燥渴欲死鼻乾面赤齒黃過經不解已成壞證表裡皆熱欲發其汗則熱不退又復下之大便遂頻小便不利亦有錯治溫症而成此症者又八九日已經汗下後脉洪數身壯熱拘急沈重欲治其內由表未解欲發其表則裏症又急趨趣不能措手待斃而已殊不知熱在三焦閉塞經絡津液枯竭榮衛不通遂成此症○又治汗下後三焦生熱脉洪數譁語不休昼夜喘息鼻時加歛身目俱黃狂叫欲走者通用此湯治之有神人所不識

石膏

黃芩

黃連

黃柏

山梔

右水煎服未中病再服其効如神

○按外臺載深師方石膏湯即同此三

石膏

黃芩

黃連

黃柏

山梔

右水煎服未中病再服其効如神

○按外臺載深師方石膏湯即同此三

黃石膏湯唯用茱萸量不同耳外臺曰石膏湯療傷寒病已八九日三焦熱其脉滑數昏憒身體壯熱沈重拘攣或時呼呻而已攻內體猶沈重拘攣由表未解今直用解毒湯則攣急不瘥直用汗茱則毒因加劇而方無表裏療者意思以三黃湯以救其內有所增加以解其外故名石膏湯石膏黃連黃芩黃梔黃香豉一升蠻梔子半升麻黃三兩右七味切以水一斗煮取三升分為三服一日併服出汗初服一劑小汗其後更合一劑令兩日服常令微汗出拘攣煩憒即瘥得數行利心閑令語毒折也

黃龍湯善治有患心下硬痛下利純清水譖語於渴身熱庸醫不識此証但見下利便呼為漏底傷寒而便用熱藥止之就如抱薪救火悞久死者多矣殊不知此因熱邪傳裏冒中燥屎結實此利非內寒而利乃日逐自飲湯茱萸利也宣急下之名曰結熱利症身有熱者宜用

此湯身無熱者用前六乙順氣湯

大黃 芒硝 麝枳實 厚朴 機甘草

人參 當歸各

水二鍾 姜二片 茶二枚煎之 捷法再加桔梗煎一沸熱服為度

恐脫字以利下

大黃氣湯傷小陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之宜大黃氣湯○下利三部脉皆平按之心下鞕者急下之宜大黃氣湯○下利脉遲而滑者內實也利未欲止當下之宜大黃氣湯

方六

大黃湯外臺仲療天行若已五六日不解頭

痛壯熱四肢頑疼不得飲食大黃湯方

大黃兩半黃連七黃柏半梔子兩半

右四味切以水八升煮取六七沸內貼一升葱白七莖煮取三升分三服此許

推然方神良又療傷寒已五六日頭痛

壯熱四肢頑疼取汗竝宜老小

下後下利或心下痞或結胸或心煩者

按病在表誤下者或為結胸心下滿或為痞但滿而不痛或為癟此為痞或協熱而

利利下不止或有不因誤下而為痞

為結胸者宜詳之

大陷胸湯傷太陽病脉浮而動數浮則為

風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛

發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也

醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空

虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣

內陷心下因鞭則為結胸大陷胸湯主之○

傷寒十餘日熱結在裏復往来寒熱者

與大柴胡湯但結胸無大热者此為水

結在胸膈也但頭微汗出者大陷胸湯

主之○太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮

熱從心下至小腹鞭滿而痛不可近者

大陷胸湯主之○病發於陽而反下之
熱入因作結胸病發於陰而反下之因
作痞所以成結胸者以下之太早故也
○結胸其脉浮大者不可下下之則死
結胸證悉具煩燥者亦死

大黃六兩芒硝升甘遂一錢

右三味以水六升先煮大黃取二升去
滓內芒硝煮兩沸內甘遂末溫服一升
得快利止後服

小陷胸湯傷小結胸痛正在心下按之則
痛脈浮滑者小陷胸湯主之

黃連一兩半夏半升桔梗實一個

右三味以水六升煮桔梗取二升去滓
內諸藥煮取二升去滓分溫三服
半夏瀉心湯傷寒五六日呕而發熱者
紫胡湯證具而以他藥下之紫胡證仍
在者復與紫胡湯此雖已下之不為逆
必蒸而振卻發熱汗出而解若心下
滿而鞶痛者此為結胸也大陷胸湯主
之但滿而不痛者此為痞紫胡湯不中

與之宜半夏瀉心湯
半夏半升黃芩乾姜人參各三

黃連一兩大棗十二枚甘草三兩

右水煎服

大黃黃連瀉心湯傷心下痞按之濡其脉
關上浮者大黃黃連瀉心湯主之○傷
寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未
解也不可攻痞當先解表表解乃可攻
痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉
心湯

大黃二兩黃連一兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去
滓分溫再服○按金匱要略瀉心湯用
大黃二兩黃連黃芩各一兩以水三升
煎取一升頓服之婦人吐涎沫医反下
乏心下即痞當先治其吐涎沫小青龍
湯主之涎沫止乃治痞瀉心湯主之金
匱又曰心氣不足吐血衄血者瀉心湯
主之傷寒論不載此方蓋缺文也臨病
之際宜併考焉

附子瀉心湯傷心下痞而復惡寒汗出者

附子瀉心湯主之

大黃兩 黃連一 黃芩兩 附子一枚

右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內附子汁分溫再服

生姜瀉心湯傷寒汗出解之後胃中不知心下痞鞕噫食臭脇下有水氣腹

中雷鳴下利者生姜瀉心湯主之

生姜四兩 甘草兩 人參三兩 乾薑兩 黃芩一兩

半夏升 半升 黃連一兩 大棗十枚

右水煎服

甘草瀉心湯傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不尽復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞕也甘

草瀉心湯主之

甘草四兩 黃芩三兩 乾姜兩 半夏升半升 大棗十二枚 黃連一兩

右六味以水一斗煮取六升去渣再煎

桂枝人參湯傷太陽病外證未除而數下之遂協然而利利下不止心下痞鞕表裏不鮮者桂枝人參湯主之

桂枝四兩 甘草四兩 白朮二兩 人參三兩 乾姜一兩

半升

右水煎服

附子粳米湯霍腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐附子粳米湯主之

附子一枚半夏半升甘草一兩 大棗十枚 粳米

半升

右五味以水八升煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

四逆湯傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宣桂枝湯○大汗若大下利而厥冷者四逆湯主之

甘草二兩 乾姜半兩 附子一枚

右水煎服

茯苓四逆湯傷發汗若下之病不解煩躁

者茯苓四逆湯主之 方土

乾姜附子湯傷下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表症脈沈微身無大熱者乾姜附子湯主之

乾姜附子一枚

右水煎服

茯苓桂枝白朮甘草湯傷寒若吐若下心下逆滿氣上衝胸膈則頭眩脉沈緊發汗則動經身為振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯主之

茯苓四桂枝四白朮二甘草一

右水煎服

紫胡桂枝乾姜湯傷寒五六日已發汗而復下之胸膈滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也紫胡桂枝乾姜湯主之 方十六赤石脂禹餘糧湯傷寒服湯亦下利不止心下痞鞕服渴心湯已復以他藥下之利不止醫以理中之利益甚理中

右水煎服

者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不止者當利其小便
赤石脂一禹餘糧一

右水煎服

麻黃杏仁甘草石膏湯傷

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無

方十一

大熱者可与麻黃杏仁甘草石膏湯

右水煎服

白虎加人參湯傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者

方十二

猪苓湯傷陽明病脉浮而緊咽乾口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重

白虎加人參湯主之 方十三

湯加湯客必發汗則燥心躁不得眠若下之則胃空虛氣動膈心中懊憹舌上胎者槐子散主之若渴欲飲水口乾舌燥者白虎湯主之若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

猪苓一枚

茯苓一

阿膠一

滑石一

澤泻一

右五味以水四升先煮四味取三升去
滓內下阿膠烊消溫服七合日三服○
陽明病汗出多而渴者不可与猪苓湯
以汗多胃中燥猪苓湯復利其小便故
也

梔子豉湯傷發汗吐下後虛煩不得眠若
剽者必反覆顛倒心中懊惱梔子豉湯
主之○陽明病下之其外有熱手足溫
不結胸心中懊惱不能食但頭汗出者
梔子豉湯主之○發汗若下之而煩熱
胸中窒者梔子豉湯主之○傷寒五六
日大下之後身熱不去心中結痛者未
歌解也梔子豉湯主之方十三

梔子厚朴湯傷寒下後心煩腹滿卧起
不安者梔子厚朴湯主之

梔子十四厚朴四枳實四

右水煎服得吐者止後服

梔子乾姜湯傷寒醫以丸散大下之身
熱不去微煩者梔子乾姜湯主之

梔子十五乾姜二

右水煎服得吐者止後服

大承氣湯傷大下後六七日不大便煩不
解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本
有宿食故也宜大承氣湯○病人小便
不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不
能卧者有燥屎也宜大承氣湯十六
深師黃芩人參湯外臺療傷寒吐下後內
外有熱煩渴不安方

黃芩 人參 甘草 桂心 生姜

大棗十五

五味麥門冬湯深師外臺下後除熱止渴五味
麥門冬湯方

麥門冬 五味 人參 甘草

石膏各

右水煎服

右五味搏篩三指撮水一升二合煮令
沸得四合盡服

增損理中丸外臺其年時行四五日大下
後或不下皆患心中結滿兩脇痞塞胸
中氣急厥逆欲絕心胸高起手不得近

不過二三日輒便死歿諸醫用瀉心湯
余用大小陷胸湯並不得療重思此或
是下後虛逆而氣已不理而毒復上攻
毒氣相搏結於胸中縱不下者毒已入
胃胃中不通毒還衝上復搏於氣氣毒
相激故致此病療之當先理其氣次可

諸疾思與增損理中九方

人參二兩 白朮二兩 甘草二兩 乾姜六分 拏薑

根二兩 枳實四枚 茯苓二兩 牡蠣二兩

右八味未之以蜜和為丸服如彈子一
丸熟水下不歇復服余時用此効的神
速下喉即折續復與之不過服五六丸
胸中豁然矣用藥之速未嘗見此然渴
者當加栝萎不渴除之下者當加牡蠣
不下勿用余因以告領軍韓康伯右衛
毛仲祖光祿王道豫靈臺節顧君苗著
作商仲堪諸人並悉用之咸歎其應速
于時枳實乃為之貴云云

獨參湯濟世全書治傷寒汗下後不解或投
藥錯誤致患人困重垂死昏沈或陰陽
知人事者並治方三十六

二症不明七日以後皆可服此藥不拘
男婦傷寒時氣疫症二七三七不解不
知人事者並治方三十六

下利厥逆者當溫之

附子湯傷少陰病得之一二日口中和其
背惡寒者當灸之附子湯主之○小陰

病身體痛手足寒骨節痛脉沈者附子

湯主之

附子枝茯苓三人參二白朮四芍藥兩

右水煎服

真武湯傷少陰病二三日不已至四五日
腹痛小便不利四肢沈重疼痛自下利
者此為有水氣其人或歟或小便利或
嘔者真武湯主之

茯苓二芍藥兩生姜三白朮兩附子枝

右水煎服○若啖者加五味半斤細辛
乾姜各一兩○若小便利者去茯苓○
若下利者去芍藥加乾姜二兩○若嘔
者去附子加生姜足前成半斤

四逆湯傷少陰病脉沈者急溫之宜四逆

湯○病發熱頭痛脈反沈若不瘥身體

疼痛者當救其裏宜四逆湯○少陰病

飲食入口則吐心中溫、欲吐復不能

吐始得之手足冷脉弦遲者此腰中實

不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔

者不可吐也急溫之宜四逆湯○自利

不渴者屬太陰以其藏有寒故也宜服

四逆葷○大汗出热不去內拘急四肢

痛又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之

○大汗若大下利而厥冷者四逆湯主

之○嘔而脉弱小便復利身有微熱見

厥者難治四逆湯主之○下利腹脹滿

身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏

四逆湯攻表桂枝湯

甘草二乾姜兩附子枝

右水煎服○霍亂篇曰吐利汗出發熱
惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主
之○又曰既吐且利小便復利而大汗
出下利清穀內寒外熱脉微欲絕者四
逆湯主之

通脉四逆湯傷下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之○少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通脈四逆湯主之

甘草二兩附子一枚乾姜三兩

右水煎服其脉即出者愈○面色赤者加葱九莖腹中痛者去葱加芍藥二兩○嘔者加生姜二兩○咽痛者去芍藥加桔梗一兩○利止脈不出者去桔梗加人參二兩

白通湯傷少陰病下利白通湯主之

葱白四莖乾姜兩附子一枚

右水

煎服

桃花湯傷少陰病下利便膿血者桃花湯主之○少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之

赤石脂一斤

乾姜兩粳米升

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合內赤石脂末方寸匕日三服若一服愈餘勿服

吳茱萸湯傷少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

右水煎服

猪苓湯傷少陰病下利六七日嘔而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之方羌九

附子粳米湯裏寒中寒氣雷鳴切痛胸膈逆滿嘔吐附子粳米湯主之

附子一枚半粳米半升甘草兩大棗十枚粳米半升

右五味水煎服

同陽救急湯六書治寒邪直中陰經真寒

証初病無身熱無頭疼止惡寒四肢厥冷戰慄腹痛吐泻不渴引衣自蓋踴卧沈重或手指甲唇青口吐涎沫或至無寐或脉來沈遲無力者宜用

熟附

乾姜 人參 乾草 苍白木

官桂 分

甘草 分

陳皮

半夏

水 分

二鐘 姜二片 煎

○無脉者加猪膽汁

一匙

○泄瀉不止加升麻黃耆

○嘔吐

涎沫或小腹痛加鹽炒茱萸

○嘔吐不

止加姜汁

大業氣湯傷少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之宜大業氣湯

○下利譁語者有燥屎也大業氣湯生

之方十八

虛寒假熱者

益元湯六書治有身熱無頭痛不頑便作燥悶面赤飲水不得入口庸醫不識呼為熱証而用涼藥誤死者多不知元氣虛弱是無根虛火泛上名曰戴陽症

熱附 乾姜 黃連 人參

各分 甘草

父葉 分

知母 麥門冬

五味拗

水三鐘 姜一片 葱二莖 連二枝 煎臨服

槌法入童便三匙冷服

導赤各半湯六書治傷寒後心下不硬腹中不滿大小便如常身無寒熱漸變神昏不語或啞中獨語一二句目赤唇焦舌乾不飲水稀粥與之則嗽不與則不渴形如醉人此熱傳手少陰心也心火上而逼肺所以神昏名越經症

人參 黃連 茯神 分 甘草 知母 滑石 分 麥門 石膏

水二鐘姜枣煎之槌法加灯心一握煎

三沸熱服

升陽散火湯六書治又手冒胸尋衣摸床

譖語昏沈不醒人事名曰撮空症小便

利者可治如不利者難治

人參當歸芍藥各黃芩麥門

白朮

紫胡各陳皮茯神各甘艸

水二鍾姜二片枣二枚槌法入金首飾

煎之熱服○有疫加姜汁炒半夏○大

便燥譖語甚渴加大黃

回陽反本湯六書治陰盛格陽陰極躁燥

微渴面赤欲坐卧于泥水井中脉來無

力或脉全無欲絕者宜用

熱附

乾姜人參各一錢茶甘草

分三

五味九

麥門皮各一錢

澄清泥漿水一鍾煎槌法臨服入蜜五

匙頓冷服之取汗為効○面戴陽者下

虛也加葱七莖黃連少許

桂附理中湯即理中湯加肉桂治房勞傷寒頭

目疼痛發熱如燎口燥唇焦嘔逆煩悶

脉浮微無力尺細如脫者救正論

補中益氣湯加肉桂治勞力感寒頭眩發

熱兩手觸動六脉洪緩無力者救正論

加減八味丸即六味九料加肉桂五味子大抵病熱作

渴飲冷便秘此屬實熱人皆知之或惡

寒發熱引衣捲卧而肢逆冷大便清利

此屬真寒人亦易知至於煩擾狂越不

歇近衣歇坐卧泥水中此屬假熱之證

其甚者煩極發躁渴飲不絕舌如芒刺

咯吐痰如湧喘急大便秘結小便淋瀝

三部脈洪大而無倫當此時也郤似兼

氣症兼氣入口即斃郤似白虎症白虎

下熱即亡若用二九緩不濟事急以加

減八味丸料一斤內肉桂一兩以水頓

煎五六碗冰冷與飲諸症自退翌日必

畏寒脉脫是無火也急以附子八味九

料煎服自愈○又曰予嘗于陰虛發熱

者見其大熱面赤口渴煩躁與六味九

黃大劑一服即愈如見下部惡寒足冷

上部渴甚躁極或欲飲反吐即以六味
湯中加肉桂五味甚則加附子冷飲下
燕即愈予嘗以此治人多矣醫宗必讀
附子理中湯即理中湯加附子治傷寒煩躁面赤
昏亂悶絕時索冷水手搃足擲脉洪大
無倫按之如絲者医宗必讀

十二三日至十四五日 汗下不解為壞證者

大柴胡湯傷太陽病過經十餘日反二三
下之後四五日柴胡證仍在者先与小
柴胡湯適不正心下急鬱微煩者為
柴解也與大柴胡湯下之則愈

柴胡半黃芩兩芍藥兩半夏半生薑

兩五

枳實四大枣十二

枝皮一枚

右水煎服

○一方用大黃二兩若不加
大黃恐不為大柴胡也○按正函經方

用大黃二兩又生姜五兩作三兩

大柴胡湯傷大下後六七日不大便煩不
解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本
有宿食故也宜大柴胡湯○病人小便
不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不
能卧者有燥屎也宜大柴胡湯方大
柴氣九崔氏方外臺 若十餘日不大便者服大
柴氣九方

大黃

杏仁各一

枳實兩

金硝一

右四味搏篩密和丸如彈子以生姜湯

六七合研一丸服之須臾即通不通更

服一丸取通為度

六乙順氣湯六書凡傷寒過經及虛弱并血氣兩虛之人或婦人產後有下症或下後不解或表症未除裏症又急不得下者用此湯去芒硝下之則吉蓋恐

硝性燥急故有此戒方平

三黃石膏湯六書治汗下後三焦生熱脈洪數譫語不休昼夜喘息鼻時加衄身目俱黃狂叫欬走者通用此湯治之有

神人所不識方平

黃連解毒湯心法類萃凡是以証法當下之依法下之其病又不解或大下後或再三下後熱勢尚甚而不退本氣虛損而不能實擬更下之恐下晚而立死不下則熱極而犯寒涼諸藥不能退其熱勢之甚者或溫熱內餘下利不止而熱不退者或因大下後溫熱利不止而熱不退脉弱氣虛不可更下者或諸溫熱內餘小便赤澁大便溏泄頻併小腹而急

痛者必欲作痢也通宜黃連解毒湯以解之方平

小柴胡湯傷寒瘥已後更發熱者小柴胡湯主之脉浮者以汗解之脉沈實者以下解之○千金曰治傷寒瘥後更發頭痛壯熱煩悶○外臺古今錄驗黃龍湯按即小柴胡湯療瘧寒十餘日不解往來寒熱狀如溫瘡渴胸滿心腹痛方十五

竹葉石膏湯傷寒解後虛羸少氣、逆欹吐者竹葉石膏湯主之方十三

柴胡百合湯六書此湯治瘧後昏沈發熱渴而錯語失神及百合勞復等症

柴胡

生地

黃芩

陳皮

人參

知母

百合

甘草

水二錘枣二枚姜三片槌法醋煮鱉甲煎之溫服○渴加大花粉○胸中煩躁加山梔○有微頭痛加川芎羌活○嘔吐入姜汁炒半夏○胸中飽悶枳殼桔梗○食後者枳實黃連甚重大便實者加大黃○胸中壅煩加竹茹竹葉

○瘧後乾嘔錯詎失神呻吟睡不安者
加黃連犀角○喉喘者加杏仁○百合
宣加麻黃○霍汗者加黃耆○脾倦加
白朮○腹如雷鳴加煨生姜○勞復時
熱不除加葶藶烏梅生艾汁

加味柴胡湯濟世全書治百合病

人參 半夏 柴胡 黃芩 百合

知母 甘草

右剉一削青竹茹一團粳米炒食鹽一
撮入姜汁少許水煎服

一方半金治傷寒後不了了朝夕有熱

瘧狀方

知母 二 麻黃 甘艸 茯苓 黃芩

桂心各一

右水煎溫服覆令微汗若心煩不得眠
其人欲飲水當稍飲之令胃中和則

愈

芍藥湯深師療溫毒病及吐下後有餘熱
渴芍藥湯神方

芍藥 二 黃連 二 甘艸 二 黃芩 二 桂心

右水煎溫服覆令微汗若心煩不得眠
其人欲飲水當稍飲之令胃中和則

愈

一方外臺張仲景療傷寒八九日不瘥名為敗傷

寒諸藥不能消者方

鼈甲 炙升麻 前胡 烏梅 枳實

炙

犀角屑 黃芩 各二 甘草 二

生地黃 二

好人參 二

剝片

右水煎服

獨參湯濟世全書治傷寒汗下後不解或投某
錯誤致患人困重垂死昏沈或陰陽二
症不明七日以後皆可服

水二鍾煎至一鍾半溫服病人好冷以
新水沈冷服之渣再煎服連進數服至
鼻尖上潤汗出是其應也此藥不拘男
婦傷寒時氣疫症二七三七不解不知
人事者並治

炙甘草湯傷寒脉結代心動悸炙甘草

湯主之

甘草 四 生姜 三 桂枝 二 人參 二 阿膠

生地一升 麥門半升 麻仁半升 大枣

右九味以清酒七升水八升煮八味取
三升去滓内膠烊消盡服一升日三服
一名復脉湯

深師酸枣湯外臺療傷寒及吐下後心煩

乏氣昼夜不眠方

酸枣四升
川芎二兩
大麥門升
甘草
知母二兩
茯苓

右七味切以水一斗六升煮酸枣取一
斗去滓內藥煮取三升去滓溫分三服
酸枣仁湯金匱靈勞靈煩不得眠酸枣仁

湯主之

酸枣升
甘草一兩
知母二兩
茯苓二兩
芎藭

右五味以水八升煮酸枣仁得六升內
諸藥煮取三升分溫三服

勞復食復陰陽易

枳實梔子湯傷大病瘥後勞復者枳實梔子湯主之若有宿食者加大黃博基子

大五六枚

枳實一升
梔子四升
豉升

右三味以清漿水七升空煮取四升內
枳實梔子煮取二升下豉更煮五六沸
去滓溫分再服覆令微似汗○病人脉
已解而日暮微煩以病新瘥人強與穀
脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀
則愈

梔子湯范汪外臺療傷寒瘥已後飲食勞復梔

子湯方

梔子四升
豉升
桂心二兩
麻黃二兩
大黃

右水煎服當小汗及下利

大黃豉湯范汪外臺傷寒已愈飲食多勞復大

黃豉湯方

豉升
甘草二兩
桂心二兩
大黃四兩
芒硝

右水煎服
伴

一方肘後治篤病新起早勞及食飲多致
欲死方

燒鼈甲服方寸匕

又方 肘後

刮青竹筍二升以水三升煮令五六
沸然後絞去滓以竹筍湯溫服之此
方亦通治勞復

深師竹葉湯外臺療天行後虛熱牽勞食
復四肢沈重或一卧一起氣力吸羸

弱方

竹葉一把小麥一升甘草一升石膏二升芩
半夏一升前胡一升知母一升黃芩

人參二兩生姜四兩

右水煎服

一方千金治傷寒溫病後勞復或食或飲
或動作方

梔子仁一枚

石膏一升香豉一升鼠屎

右四味水煎服

麥門冬湯千金治勞復氣欲絕起死人方

麥門一兩甘草一兩京密一枚竹葉一升

右四味㕮咀以水七升煮粳米一升令
熟去米內諸藥煎取三升分三服不能

服者綿滴湯內口中用之有効

竹皮湯訖江外臺療交接勞復卵腫腹中絞痛
便欲死○療傷寒病瘡語言書疎坐起

行步勞復方
刮青竹皮升

右水煎頓服立愈

梅師方 肘後治傷寒瘡後交接發動困欲
死眼不開不能語方

梔子一枚

水三升煎取一升服

逍遙散六書治傷寒瘡後血氣未平勞動
助熱復歸於經絡因與婦人交而復發
者謂之勞復因交淫慾而無病人反得
病者謂之陰陽易予曾見古出數寸而
死者多矣此症最難治宜用此湯

人參 知母 地黃 柴胡 蓼甘草
 荘根 壓黃連 分犀角 砂滑石 竹青
 水二鐘 姜三片 薤二枚 煎之 檉法臨服
 烙棍襠未一錢半 調服有黏汗出為効
 如無則再服以小水利陰頭腫即愈○
 如耶縮腹痛倍黃連

傷寒溫疫一病辨

原夫天行溫疫之為病也蓋陰陽失位寒暑錯時之所致非關鬼神也曹子建所論是也是以其治之之術淺則汗之深則下之豈他之求厚故傷寒與溫疫二而一而二未始有脉証之可以殊亦未始有治術之可以別其名曰疫取諸役不往其名曰傷寒取諸所感之源疫者病名也傷寒者病因也昔人之立論舍其名而取其因者何也以治術之所關不可不明也已後世醫家不察此義傷寒溫疫判為二病至其甚者則以為鬼神所作不亦愚乎嘗考仲景氏序論曰余宗族素多向餘二百建安紀年以來猶未十稔死亡者三分之二傷寒十居其七此非天行溫疫而何不則未十稔之間何以至於病且死之若斯已甚乎但其序中建安二字宜改作建寧說具考證中檢諸後漢書五行志自建寧四年至光和二年相距僅九年大疫三行與序中未十稔文合若符契可見其稱傷

寒者果是天行溫疫無疑矣又觀千金方引小品方曰云傷寒是雅士之辭天行溫疫是田舍間號耳亦足以爲一徵焉近聞友人中澤氏所著傷寒方者以傷寒溫疫為同病一依仲景氏以立其治方實得吾心者也因書斯說併考証以贈云

考證

醫史曰張機字仲景漢靈帝時舉孝廉官至長沙太守由是觀之序論中建安二字宜作建寧若夫建安漢末獻帝時年號與序中感徃昔之淪喪詎不令苦在獻帝時而紀獻帝時事豈可稱徃昔邪據文乃義其爲傳寫之誤者明矣後漢書五行志曰靈帝建寧四年三月大疫熹平二年正月大疫光和二年春大疫五年二月大疫中平二年正月大疫獻帝建安二十二年大疫魏曹植論疫氣曰建安二十二年癘氣流行家有僵尸之痛室有號泣之哀或闔門而殪或覆族而來或以爲疫符厭之亦可笑也

萬姓統譜曰張機長沙太守時大疫流行治法襍出機著傷寒論金匱方行於世外臺秘要方天行病門引許仁則曰此病方家呼爲傷寒

東都 山田正珍宗俊父

辟溫方

粉身散 千金辟溫病常用方

芎藭

白芷

藁本各等分

右三味治下篩內米粉中以粉身
雄黃丸古今醫統 凡入病家須避其氣漸不
知使染著為正此一醫人之患也不可不

雄黃一丹參

鬼箭羽

赤小豆

炒各

右為細末煉蜜丸梧桐子大空心溫水
下五丸雖與病人同床令被不能染也

老君神明白散方千金翼方

四兩去黑皮

白术一
桔梗一
細辛一
附子一
烏頭

右五味擣篩絳囊盛帶之所居間里皆
無病若有得疫癘者溫酒服一
方寸七
覆取汗得吐則瘥若經三四日者以三
方寸七
内五升水中煮令大沸分三服

附錄

客曰傷寒之為病在表發之在裏下之仲景之法盡矣又有疫病者雖仲景之書缺而不論至於後世諸家皆別立之方治今子獨以傷寒治之者何也答曰人之為肌膚逢溫熱則開開故有汗得寒涼則閉閉故無汗是以自季春至仲秋之際天時溫熱腠理常開若有非常暴寒至則腠理不能先之客寒邪乃入自季秋至仲春之際天時寒涼腠理常閉若有非常暴溫至則腠理為之閉寒邪隨入故一鄉有非常之氣則一鄉同病天下有非常之氣則天下同病此之謂疫在表發熱惡寒在裏燥結譖語傷寒與疫其名雖異實則一病耳在表發之在裏下之一據仲景足矣豈他求之為乎

客曰疫之流行也有強壯反炳者有柔弱反免者何也答曰夫人之在世也不問男女老少強弱思慮憂愁飢餓之際勞役湍慾遠行之後凡有一時之虛而表氣適不

固則邪氣隨入寒熱隨作若其當大疫流行之時得免者蓋無一時之虛也可不慎乎

客曰傷寒之染人有或三五人而止或十數人而止者是亦非常之氣所致而治法亦同乎答曰否是热毒熾盛之所致非非常之氣也譬言之鑽燧之火之微至其燉則消爍金石焚燒屋宅其染與不染唯微甚為然在表發之在裏下之非治有異也客曰傷寒論立六經以盡方治子治傷寒一逐日期何也答曰仲景立六經其旨隱微非愚之所能辨也按千金方載小品曰夫傷寒病者起自風寒入於腠理與精氣分爭營衛否隔周行不通病一日至二日氣在孔竅皮膚之間故病者頭痛惡寒腰背強重此邪氣在表發汗則愈三日以上氣浮在上部填塞胸心故頭痛胸中滿當吐之則愈五日以上氣沈結在臟故腹脹身重骨節煩疼當午夜則愈予一主日期竊據于斯庶幾可以辨淺深矣

五

安永丁酉春正月

中澤養亭識



本石町十軒店

萬笈堂英平吉





