嬰兒論

清福州周士補著

全

ヤ9
1155

中9
1155

嬰兒論序

人之所愛莫有過愛子者也而愛之至不能無所憂憂之至莫有過憂其疾者也惟其疾是憂不知所以防之之道而可乎傳云有疾不擇醫焉不慈不孝夫

91-211D

苟欲免不慈不孝之譏。冝莫如擇醫之良矣。夫醫之為技。不專其科。則不殆滑也。志分道歧。曷至技亦不能精也。如甘繩之射。窮越之學。輪扁之劉輪。佝僂丈人之承蜩。可以觀也已。自非神

完守固。外物不膠。夫何能有慧解哉。是以醫之為技。專門之士而往往有良矣。平安廣川子壽業唖科。来遊平岐等留三歲。術日大行。而越人之感陽也。予頗好方脉之書。廣川子請與予

交。每或相會。輒及脉家之說。一日携清人周士祓嬰兒論告曰。某曩購四書實如蔴異寶。玩而驗之。發鷲之痼癖沈痾。率皆參不奇中。周氏之於小方脉。可謂精矣。予欲附之剞劂。以公于天下。

子幸賜弁一言。可以行遠也。予受卒業。乃欣然而笑曰。周氏之精啞科。猶葉生鑑之病於鏡。臟腑癥結。瞭然可知也。蓋神完守固。外物不滕。而後得者也。廣川子之蔴之。為不異越人之遇長桑君也。斯

聿之行也。天下之愛其子。而
其疾者。必延熟斯書之醫。則亦
可不謂知所擇哉。夫行後廉義
免不意之譏矣乎。
寛政丁巳孟陬望日長崎吉村
正隆士興題

嬰兒論序

天下世豈有深害者長
沙之書也。維指事於備急。
而有缺嬰孩与雜病者。
出乎人而未害者歟。頃者
周士補先生著嬰兒論於後

序於予。予三編卷以備。予始
於初生。孩孤於離病。其體全
擬長沙之書。蓋先生業
而科。亦依長沙之書。親謂
葦緘救次。終矣。看人諸曰。
長沙是症。終之症。終之。
曰。莊周知詔無用之用。顧
藏斯意。則可與語此矣。
有所著。蘊奧實繁。肇長沙
之口氣。先生記名。倘嘗則世
通所志。予何敢贅矣。嗚
呼天運循環。或有遲速。嘗

出長沙氏而後千百
年今又生
鉄自是以後長沙与周氏而
衡於天地之間而將應去
予之所述非過尚矣予深
感周氏能
世之上言以言乎鉄用
豫為上言冠乎首以為之
叙乾隆戊戌三年之望福
海信伯韓謹題

初生七
火濟湯十
花蕊仝
犀消毒飲仝
湯仝
草菓飲玉
枝湯仝
湯仝
九
九達元飲仝
世
湯仝
湯仝
湯仝
湯仝
湯仝
五香湯七
蜜附湯九
大麥煎玉
甘石湯玉
大炭毋湯仝
芍加芒湯十
麻杏甘石
葛根湯仝
調養
柴乾桂湯
甘附湯
防茯湯
養脾
紫霜丸仝
寒熱十四
甘連湯仝
活血湯仝
碧雪仝
紅花湯仝
逐瘀湯十六
麻湯十七
五苓散仝
小兼湯仝
柴湯十
竹石湯仝
斬鬼丹十
滲濕湯十
茵湯仝
文蛤油八
健骨湯仝
桃
大青龍
大柴湯十
大兼氣湯
犀辰砂湯
柴桂乾
麻加术
茵五苓散

蓄飲 全
蜜飲 全
大順散 全
解暑補眞湯
四逆湯 全
通四湯 附
吳湯 全
湯 全
茯苓四湯 全
烏梅丸 全
拘肝湯 全
麥門湯 附
既濟湯 附
麥實湯 全
蘿蔔粥 全
養榮湯 附
四逆散 全
柴平湯 附
當歸湯 全
甘草湯 全
庶葉湯 全
蘿蔔 全
柳肝加飴湯 附
續命湯 全
附理湯 全
鎮肝湯 九
金 全
防排毒飲 全
麻蚕湯 全
托毒湯 全
紫寶丹 全
防解毒湯 附
烏頭煎 全
茅草湯 全
無患湯 四
托裏湯 全
良膏 全
雪 全
一寧肝湯 四
鈞湯 全
了々丸 全
一字灰 四四
苦參湯 四五
奇 四三
斷癇丸 四二
獨活寄生湯 四三
發驚 附 二
還魂湯 四五
朱蜜 紫雪 全

七
薄荷煎 四八
膏 全
湯 五十
五一
附膏 全
好墨傳之 五三
療黑痣 全
寶丹 全
熏方 五六
猿膽傳之 全
元湯 全
醋 全
八
黃明膏 全
龍腦酒 全
九
猫毛灰 全
宿砂飲 全
礬湯 全
杉棋膏 全
松灰散 全
白屑散 全
五翹湯 全
葛加荊防湯 全
夏枯膏 四九
射麻湯 全
春霞丹 全
雞子清 全
附煎 全
柑膏 全
熏方 全
米粃油 全
蜜陀膏 全
蠟丸 全
七
紅藍酒 五五
木鼈湯 全
蘿蔔汁 五七
桐葉醋 全
鐵漿 全
杏仁粥 全
綿實熏 全
黑豆湯 五十
熊膽 全
逐毒飲 全
良姜飲 全
蜘蛛散 全
膠飴酒 全
橘核酒 全
黃明膏 全
雞子油 五
馬戈散 五
胡椒粉 全
還
芥子
地

漿 仝 石榴湯 仝
服之 人糞汁灌之 黑鉛雞鴨血
蜜 六二 消痞湯 仝 濱堅湯 六二 痞病 六一 熊膽
龜尿煎 六三 伏肝丸 仝 白梅湯 六三
四益元散 仝 養眞湯 仝
遂痛丸 仝 鰻膏 仝 柴鼈湯 仝 扶脾湯 六五 掩子
飯 六六 八珍湯 仝 七珍膏 仝 陰陽調 鵪胡湯
勻湯 六七 大麥煎 仝 蹩麥湯 仝 七成
湯 六八 溫臟丸 仝 五蒸湯 頭痛 七十 柴葛湯
仝 鼈拘飲 仝 犀漆湯 充
柱苓朮甘湯 仝 菊湯 仝
苓加味丸 仝 眼目 七一 鐵漿 仝 夜明丸 七三 鰻膽鯽
膽食之 仝 蘘荷病 七三 葛花湯 七四 蜂
汁點之 仝 好黑點之 七三
審點之 七四 瓜蒂散 仝 通肺飲 仝 衄血咳血
玄參湯 仝 噦冷水 七五 灸法 仝

七五 燒酒蘿蔔汁 紫糖 仝 大蒜
玉 貼之 仝 花蕊散 仝 攝血湯 仝 耳病 七六
防攻毒飲 仝 烏鴉 齒齦 七七 木鼈散 仝 涎流 仝
散 仝 白礬油 仝 蘿勒散 仝
養臟湯 仝 啞聲 七八 白糖飲 七九 半夏湯 仝
蜜陀丸 仝 嘔吐 仝 安蚊湯 仝 伏湯 八十
仝 燒酒服之 仝 臍噎 八十 蜆殼散 仝 大半夏湯 仝
丁香煎 仝 噯氣吞酸 八一 鸕鷀散 仝 老涎飲 仝
生姜瀉心湯 仝 膻雞 仝 青皮湯 仝 噦吃 八二
柿蒂湯 仝 小青龍湯 仝 斂肺飲 仝
蘿蔔飲 仝 咳嗽 仝 鵪方 仝 樞實食之 仝
苦酒雞子方 仝 喘嗜 仝 伏杏甘橘枳姜湯 仝
湯 仝 澤瀉湯 仝 麻杏甘石 茶實飲
膏 仝 蹟 肺痿肺癰 八五 桔湯 仝 蒂
大瀉肺湯 仝 骨鯁 仝 膠飴

食之 金 金餅鰒 金 苦酒白糖
鳳實 六 蘿蔔汁 金 誤吞稍芥 食膠
飴 金

吞金銀銅鐵 金 宿砂 飲 金
八十 胸痛 金 鬼箭湯 金 大連
蜜湯 八 胸痞 金 半瀉湯 金
瀉湯 金 厚大湯

金 十 腹痛 八 平胃散 金 厚生甘半參湯 金
棗湯 金 九 厚朴湯 金 厚三
湯 金 猪膽酒 金 熊膽飲 金 大陷胸湯
當四逆加吳湯 金 薰臍法 九 烏桂湯
當附湯 金 甘粉
桂

茯苓 九 蟹枳湯 金 大附湯 金 附粳
湯 金 木天蓼湯 潰堅酒 金 羅勒
九 金 挾 瀉痢 九 葛芩連湯 金 清管湯 九 芩加夏生湯
四 金 硬湯 金
瓜蔞湯 金 桂參湯 金 剪紅 九 金 山漆
桃花湯 金 氣痢 九

金 小蕎湯 六 連肉飲 金 薯蕷湯 九
參茯白散 金 堯花煎 百 白朮 膏 金
大便難 百 二 金 波淡花食之 金
蜜導 三 逐腸 九 金 小便不利
防茯湯 三 防芪湯 金
滑湯 五 蕁痢湯 金 越婢湯 金 降氣
祈水

散 金 胸煎 五 黑散 金 破 淋病 金 石
故湯 金 桃花煎 金 紅豆煎 三 蕁
湯 金 涼血湯 金 甘附湯 六 夢遺失
實湯 金 海金湯 金 猪苓湯 金 梔
精 百 九 桂加龍嚼湯 金 腎漏白濁 金 知柏枸
安神 九 金 飲 金 陰痿 金

極秘滋陰膏 五 陰器疼痛 金 黑豆湯 金 髓骨隱痛 金 灸及
湯 金 遺尿 百 十 一 破故九 金 甘湯 金 囊痂 金 防湯 金 柏皮
破故酒 金 金鈴 九 百 烏霜

土蠣散 全
煎 全 烏煎 全
湯 卷四 烏桂湯 全
全 烏湯 卷五
寬溫湯 全
卷六 三妙湯 全 麻膏 全
通計三百九七方

目次尾

蛇床 緩風 全 大柈湯 卷三 白
全 花湯 全 杉節
山蒿湯 全
寬凉湯 全 桂芍知湯
小連湯 全
芥子膏
樟木湯 全

清福州周士補著　閩中郡李子安撰次

辨初生脉證并治第一

兒初生。肌膚至紅。啼聲吃々。胸腹堅硬者。此為
熨毒所致●兒生下。身體石硬。啼聲沉濁者。此
為寒毒所致●兒落草。肌肉淡白。啼聲微細者。
此為虛質難養也●兒始生髮黑體實。遍身順
和。啼聲高朗者。為無病也●兒口內含痰濁。先

急拭去而宜與甘連湯以吐若瀉也●初生肌膚淡白啼聲虛微者為血氣所虧也宜五香湯主之五香湯方丁香三分藿香二分木香二分沉香三分紅花三分甘艸二分右六味以沸湯五合漬之須臾絞去滓分温服●兒為純陽若身紅如然及胎腹石鞕者宜甘連湯主之甘連湯方甘艸三分黃連二分大黃三分右三味以沸湯漬之須臾絞去滓用綿纏子釀以令兒吮之●兒初生無脉周時微動也●嬰兒脉大指下六七至是為常脉也●兒脉亂髮一息七八至為無病也●童仆脉一息五六至為常脉也●兒初生二晬時則與乳而可若速與乳則使毒內伏遂為瘡疹之病也●兒生下黑便當續出若稠粘而少者甘連加大黃湯主之●兒落艸胸腹石硬者為毒多宜攻擊方●兒濁便竭者可與乳餌不竭者未可與乳餌若誤與者後必致胎毒之病也●兒

初浴後六日而浴。爾後隔日而浴。三七後減浴。
若妄浴者。致風寒之病也。●落胎後濕爛者。為
惡候也。桃花篩傅之。●兒初生。妄灸者。發驚。無
病不可逆灸也。●落帶後。欲浴者。宜之蛤油傅
之。丈蛤油方。川丈蛤一枚甘艸一分右二味研篩調
清油傅之。●兒初生。臍瘡出血。啼叫不安者。以
白石脂研傅之。●兒初生。嘔汁稀少。飼以佗物。
則致於癖。或驚痢。泻痢之病也。●兒初生。遍身微

冷。啼聲不發者。宜蜜附湯主之。蜜附湯方。人參
三分蜜香三分附子二分乾薑二分右四味。以水一升。煮
取七合。去滓分温服。●兒初生。哺飯者。以周歲
為可。法用陳米飯。始哺之。要研爛如泥。與乳每
日與一二匙。漸至完飯。●兒四五歲者。不與乳
而無妨。二三歲者。未可斷乳。若強斷則。致疳癖
之病也。●兒顱門跳動者。為筋骨不實。宜五香
加殭蚕湯主之。●兒身體羸弱。肌膚乾燥者。宜

活血湯主之。活血湯方。當皈一錢芍藥一錢紅麴五分甘草三分右四味。以水一升。煮取七合。去滓分温服。●児顱成八字。名解顱。此為鉄乳所致也。●児語遲屬口軟。行遲屬脚軟。此為體氣虚鉄所致。宜健骨湯主之。健骨湯方。人參二分當皈五分白殭蚕五分蓮蕊二分野蚕三分甘草二分生薑二分右七味。以水一升。煮取七合。去滓分温服。●児口瘡如雪。為白雪瘡。腹中飢欲乳。口為妨。用羅纏指頭。醸薄荷湯。以漬拭。宜火濟湯。火濟湯方。黄連三分黄芩三分黄柏二分梔子二分炒茉莉白二分右五味以水一升。煮四味。取七合。去滓内茉莉白。攪調分温服。●児鵞口者。即白雪瘡也。若喉内腫者。名乳蛾。有雙單。俱胎毒熱灼所致。宜火炭母湯。火炭母湯方。火炭母一戔大黄苦消各三分桔梗五分甘草二分右五味。以水一升。煮四味。取七合。去滓

肉苁蓉。攪調分溫服●乳蛾喉腫熱痛。啼聲不出。乳餌不能者。碧雪主之。碧雪方。芒消六兩寒水石兩研細青黛半兩研細甘草一兩右四味。以水一斗。煮至半斗。內藍根。以色碧為度。不住手攪和勻。傾盆內經宿。凝成雪研末。每含漱三分。或以水服一錢七●兒初生。臍瘡若遺毒。餘爛者。宜桃花簍貼之。桃花簍方。石灰二兩右一味。以雪水五升。漬三旬。加辰砂攪調。色如桃花為度。以釀簍子

一旬晒乾寸裂。貼患處●兒舌下腫尖。如小舌。名曰重舌。此為熱毒所致。急用鈹鍼刺之。血出當差。仍灸廉泉。若再發者。以不灸故也●兒初生。元陽未實。若乳餌失節。若努力啼號。必臍尖。名曰臍突。宜消痞湯●臍尖如旋螺。脉數實者。積芍加芒消湯主之。積芍加芒消湯方。枳實三分芍藥五分炒芒消三分右三味。以水一升。煮取七合。去滓分溫服●兒初生。眼目不開。脉必數。若大

便難。此為胎熱所致。宜甘連加大黃湯。傳以熊膽汁。●兒初生。皮肉鎖其穀道。此為鎖肛。法急割破。大便當通。若不通者難治。●兒癡慧。此為胎毒散。宜紅花湯主之。紅花湯方。紅花三分 大黃三分 黃連三分 苦硝三分 甘草二分 右五味。㕮咀。以水一升。煮取七合。去滓分温。頻々服。●兒交姤為病。必發熱。或有癍者。即是也。宜犀角消毒湯。犀角消毒湯方。犀角二分 荊芥五分 防風五分 牛蒡子五分 甘草二分 右五味。以水一升。煮五味。取七合。去滓內犀角屑。攪調分服。●兒初生。身熱不解。大便如膠。名曰胎焚。必發口瘡。若劇者發丹毒。宜紅花湯主之。●諸焚温々。元真昏晦者。發驚。若虫動。若胎毒亦發驚。●兒初生。身热四五日。紅班簇々者。為丹毒。宜火済加辰砂湯。●兒初生。身體肥厚。反筋骨乏力。名曰胎肥。宜大麥煎主之。大麥煎方。茯苓五分 砂仁三分 馬舄三分 麥芽五分 右四味。

以水一升。先煮麥芽、咸二合。內諸藥。再煮取六合。去滓分温服。●兒始生。露骨柴削。晨暮啼躁不安。名曰胎癉。宜養脾湯。養脾湯方。宿砂五分 茯苓五分 紅麴三分 白朮三分 生薑二分 右五味。以水一升。煮取五合。去滓。加蜂蜜一匙。攪調分温服。●兒初生。面體疱然浮肥。其色鮮明者。為胎肥。茯苓加桃花飲主之。●兒初生。胎未乾。屢浴。為濕邪所襲。遂発熱而驚。名曰胎風。宜還魂加辰砂湯

之。麻杏甘石湯方。麻黃五分 杏仁五個 甘草三分 石膏一弋 右四味。以水一升。先煮麻黃。二三沸。去上沫。內諸藥。煮取七合。去滓分温服。●兒初生。發驚脉弦。痰喘張口。胸滿嘔而煩。不能乳者。紫霜丸主之。紫霜丸方。代赭石二錢 醋碎 石脂二錢 巴豆二錢 去皮 油杏仁四錢 右四味。相和。搗糊丸。黍粟大。每服二三丸。●兒生下。頭大頸細。若目多白睛。面皎白。

身體瘦者多愁少喜也●兒初生遍身赤胎腹硬啼聲吃々者必發驚●兒初生身冷膚鞕啼聲嗄名曰鞕癰此為陰毒也●兒生下脉微續者為有壽也●兒啼聲絕復揚急者為腹痛也●兒啼是歌蓋胎毒散也●兒初生卵縫總黑者為實浮白若腫大者為虛●兒頸細者致夭橫痃硬者亦致夭橫●兒初生體膚如石硬名曰五硬胎毒凝結令煞厥冷而聲不發者死●兒始生身體軟弱而無力為筋骨不成名曰五軟宜健骨湯主之●腦內腎風發驚而嘔者不可治百一十二咳喘亦不可治●嬰孩腦後發瘡如鷄子大紅紫而燃炙名曰腦瘡死●兒生下無肛者為鎖肛急割之鎖肛者生鎖肛者死

辨寒熱脉證并治第二

寒熱之為候有風濕有瘡疹有宿食有驚動皆

能發寒熱須要別論以無令誤也●病人發熱惡寒脉緩者名曰感風●病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脉陰陽俱緊者名曰傷寒●兒纔漸惡寒毛聳身厥者發大熱脉急弦者發驚●病人惡寒而振反發熱瀉然汗出而解者瘧病也●病人寒慄鼓頷反發熱汗流而解反復必期時者為瘧疾也●發熱惡寒身振慄而無汗面紅尻冷者為痙痓脉緊者必發驚●

兒發熱嘔乳面紅神昏睡則惕跳者為客忤也●兒身挾腹滿必吐乳脉滑而實者為食傷發驚●兒發熱啼哭緩急交作握拳噛齒者為腹痛也●兒發熱有時其熱睡則益盛者以虫動所致也●兒微熱啼號嘔乳發作肌膚漸甲錯者為缺乳也●病人脉細而數或渴或溏元眞昏晦身熱鬱鬱睡反益劇者草菓飲主之

草菓飲方 草菓 三分 柴胡 五分 黄芩 三分 小連

惺二散

翹五分 生薑三分 大棗二枚 右七味以水一升煮取七合去滓分温服●児身體微熱若児乳反氣力如故者為交奶必發疹也●児挽臀必發口瘡如疳熬痢熬發赤焦黑醬須要屢視其口內也●児發熱惡風鼽嚏鼻塞若咳喘吐乳若微搐夜臥不安者惺惺々散主之惺惺々散方人參二分 白朮三分 茯苓五分 桔梗五分 天花粉三分 細辛二分 薄荷二分 甘草三分 右八味咬咀以水一升煮取七合去滓

逐痕一

麦一

分温服●児敗病者乃飲母觝乳所致宜逐痕湯逐痕湯方青皮茯苓各一錢 白朮史君子紅麴炒各五分 甘艸三分 右五味以水一升煮取七合去滓分温服●児交奶傷與五香湯發癍者與犀角消毒飲●惡寒發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之桂枝湯方桂枝二分 芍藥一錢 甘艸三分 生薑二分 大棗二枚 右五味咬咀以水一升煮取七合去滓適寒温分服須臾歠熱稀粥以助藥力温覆令汗出

若不汗更服●服桂枝湯大汗出脉洪大者與桂枝湯如前法若形如虐日再發者汗出必解宜桂枝二麻黄一湯●太陽病項背強几々無汗惡風葛根湯主之葛根五分麻黄三分桂枝二分芍藥五分甘艸二分生薑二分大棗二枚右七味㕮咀以水一升先煮麻黄葛根減二合去沫內諸藥煮取七合去滓温服將息及禁忌●傷寒身熱晴不了々致衄血若發驚是以陽氣重故也

●傷寒脉浮緊無汗反致衄者欲解也宜麻黄湯主之●太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黄湯主之麻黄五分桂枝三分甘艸二分杏仁八個右四味以水二升先煮麻黄減五合去上沫內諸藥煮取一升去滓温服覆取微似汗如桂枝法將息●大陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之大青龍湯方麻黄二錢桂枝五分甘

艸三分 杏仁八個 生薑三分 大棗三枚 石膏如彈丸大右
七味。以水二升。先煮麻黃減五合。去上沫。內諸
藥。煮取一升。去滓。溫服五合。取微似汗。若不汗。
再三作劑。汗出多者。停後服。●傷寒陽且證醫
服陽且湯。尚不汗者。以氣運未適故也。須續服
前方。後得氣運適者。肌肉即和諧。仍濈々汗出
也。●大陽病。發汗遂漏不止。其人惡風小便難
四枝微急。難以屈伸者。桂枝加附子湯主之。●

傷寒六七日。發熱微惡寒。支節煩疼。微嘔。心下
支結。外證未去者。柴胡加桂枝湯主之。●傷寒
五六日。若中風。往来寒熱。胸脇苦滿。默々不欲
飲食。心煩喜嘔。或胸中煩而不嘔。或渴。或腹中
痛。或脇下痞鞕。或心下悸。小便不利。或不渴。身
有微熱。或欬者。與小柴胡湯主之。小柴胡湯方。
柴胡一戔 黃芩五分 人參三分 甘艸三分 半夏一戔 生薑三分
大棗三枚 右七味。以水二升。煮減七合。去滓再煎。

取一升分温服●大陽病発汗後大汗出胃中
乾煩燥不得眠欲得飲水者少々與飲之令胃
氣和則愈若脉浮小便不利微熱消渇者與五
苓散主之五苓散方猪苓五分澤瀉五分茯苓三分桂
枝三分白朮五分右五味為末以白飲和服方寸七
日三服多飲煖水汗出愈●潮熱者實也先宜
小柴胡湯以解外後以柴胡加芒消湯主之●
潮熱發譫々嘔不止小便赤者柴胡加芒消湯主

之●傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在
裏表裏俱熱時々惡風大渇舌上乾燥而煩欲
飲水數升者白虎加人參湯主之●傷寒脉滑
而厥者裏有熱白虎湯主之●傷寒脉浮發熱
肌膚大熱反大便溏小便白此為真熱假寒候
宜白虎湯主之●大陽病過經十餘日反二三
下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡湯
嘔不止心下急鬱々微煩者為未解也與大柴
胡下之則愈大柴胡湯方柴胡二錢黄芩五分大黄

五分 芍藥一戔半 夏五分 生薑三分 枳實五分 大棗二枚 右八味以水二升煮取一升去滓再煎分温服●發汗後惡寒者虛故也不惡寒但煩者實也當和胃氣與調胃承氣湯●調胃承氣湯方 大黃一戔甘州五分 芒消五分 右三味㕮咀以水二升煮取一升去滓內芒消更上火微煮令沸少々温服●陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞕々則讝語小承氣湯主之若一服讝語止更莫

復服●小承氣湯方 大黃一戔厚朴四分 枳實五分 已上三味以水二升煮取一升去滓分温服初服湯●當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之●傷寒六七日目中不了々睛不和無表裏證大便難身微熱此為實也宜大承氣湯●大承氣湯方 大黃一戔厚朴四戔 枳實五分 芒硝三分 右四味以水二升先煮二物減五合去滓內大黃煮取一升去滓內芒硝更上火微一兩沸分温再服●病位

於開者桂枝湯所適也位於樞者柴胡湯以和之●病人振寒大熱流汗而解三日若四日再三發作如故此為溫毒所致宜達元飲主之

達元飲方 知母三分 芍藥五分 黃芩三分 草菓三分 甘草二分 右七味以水二升煮取一升去滓分溫服●傷寒解後虛羸少氣々逆欲吐者竹葉石膏湯主之

竹葉石膏湯方 竹葉七葉 石膏五分 半夏五分 人參三分 甘草二分 麥門冬五分 右七味以水二升煮取一升去滓內粳米煮米熟湯成去米溫服●病人脉微弱而氣逆面紅小便難時々嘔不食者

犀角辰砂湯方 茯苓一戔 犀角 辰砂三分 食鹽二分 生薑三分 右五味以水一升煮取七合去滓分溫服●大陽病二三日惡寒而汗出一身涼和反脉弦緊此為瘧疾也●大陽病忽退身涼頭痛未歇者為瘧邪也●病人

惡寒脉數而弦腕冷如灌水者必瘧疾也柴胡
乾薑桂枝湯主之柴胡乾薑桂枝湯方柴胡五
黃芩三分半夏五分桂枝三分乾薑二分生薑二分人參二分
大棗二枚甘州二分右九味以水二升煮取一升去
滓分温服●瘧病必振寒而発熱休作難愈者
食鮭(大鮫)魚為妙附子摩散主之附子摩散方附子
一塊去皮右一味研如泥醋調発前一時傳脊骨自
驗●瘧疾若温病虚羸少氣々逆欲吐小便必

赤若足熱此為餘熱未解宜竹葉石膏湯主之
●瘧病夜発者法出血中之邪宜桂枝加桃仁
當歸湯若欲截邪者斬鬼丹主之斬鬼丹方黃
丹(研)獨頭大蒜(研如泥)右二味同搗為丸發日五
更以水五合服一錢七●傷寒若瘟疫発汗而
復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭
汗出往来寒熱心煩者此為未解也柴胡桂枝
乾薑湯主之柴胡桂枝乾薑湯方柴胡五分桂枝

痓濕暍

甘草附子湯方

甘草二兩 白朮三兩 桂枝四兩 附子二枚 右四味以水六升煮取二升去滓分温三服 ●風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者

甘草附子湯主之

桂枝附子湯方

桂枝四兩 附子三枚 生薑三兩 甘草二兩 大棗十二枚 右五味以水六升煮取二升去滓分温三服 ●一服覺身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者

桂枝附子湯主之 ●風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而伊伊風氣通泄治在表者

白朮附子湯方

白朮二兩 附子二枚 甘草二兩 生薑三兩 大棗十二枚 右五味以水六升煮取二升去滓分温三服 ●一服其人身體麻痹或重或輕或不仁或但欲飲熱或但欲飲冷或大便堅或小便難或時嘔或不嘔或但欲吐或但欲寐或但欲驚或但欲笑或但欲哭或但欲眠或但欲坐或但欲臥或但欲行或但欲住或但欲食或但欲不食或但欲近衣或但欲去衣或但欲近火或但欲遠火或但欲近水或但欲遠水或但欲近人或但欲遠人或但欲近男子或但欲近女子或但欲近老人或但欲近小兒或但欲近畜獸或但欲近飛鳥或但欲近走獸或但欲近魚鼈或但欲近蟲蟻或但欲近草木或但欲近金石或但欲近土或但欲近水或但欲近火或但欲近風或但欲近雨或但欲近雪或但欲近霜或但欲近露或但欲近雲或但欲近霧或但欲近虹或但欲近霓或但欲近日或但欲近月或但欲近星或但欲近辰或但欲近天或但欲近地或但欲近人或但欲近鬼或但欲近神或但欲近仙或但欲近佛或但欲近道或但欲近法或但欲近僧或但欲近尼或但欲近道士或但欲近女冠或但欲近和尚或但欲近沙彌或但欲近沙彌尼或但欲近優婆塞或但欲近優婆夷或但欲近比丘或但欲近比丘尼或但欲近式叉摩那

皮水為病。四肢腫。水氣在皮膚中。四肢聶々動者。防己茯苓湯主之。防己茯令湯方。防己一戔黃耆五分桂枝三分茯苓一戔甘艸二分右五味。以水二升。煮取一升。去滓。分温三服。●陽明病。發熱汗出。此為熱越。不能發黃也。但頭汗出。身無汗。劑頸而還。小便不利。渴引水漿者。此為瘀熱在裏身必發黃。茵蔯湯主之。茵蔯湯方。茵蔯蒿二戔梔子一枚大黃五分右三味。以水二升。先煮茵蔯減五合。

內二味。煮取一升。去滓。分温三服。小便當利。尿如皂角汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便去也。●諸病黃家。但利其小便。茵蔯五苓散主之。茵蔯五苓散方。茵蔯蒿一戔五苓散一戔右二物。以水二升。煮取一升。去滓。分温服。●黃家所得。從濕得之。一身盡黃。發熱煩喘。胸滿口燥者。生薤葛嗽之。●諸病黃家。假令脉浮。當以汗解之。熱在裏。當下之。以汗解之。宜桂枝加葛根湯。欲下之。

宜大承氣湯●夏熱所傷。頭痛身熱。脉微浮而小便如血。宜黃連香薷飲主之。黃連香薷飲方。

香薷三分 厚朴五分 黃連三分 白扁豆五分炒 甘草二分生 薑三分 大棗三枚 右七味。以水一升。煮取七合。去滓分温服●大陽中熱。煩渴是也。脉浮而渴。若睡中微搐。若小便澁者。五苓散加辰砂三分服之●夏月伏熱煩渴。脉微數。若泻黃者。大順散主之。

大順散方。桂枝四錢杏仁四錢乾薑四錢甘州二錢右四味。㕮咀篩。每服一錢七。以白飲服●兒體羸弱。少氣力。適感鬲夏熱客邪。食眞遂發泄。而脉微弱者。解暑補眞湯主之。解暑補眞湯方。黃芪五分 炙甘草三分 人參三分 麥門冬五分 黃連二分 五味子拾個 茯苓五分 白朮三分 陳皮五分 右九味。以水一升。煮取七合。去滓分温服●暴卒腹痛。若霍亂吐泻。四肢厥者。宜藿香飲方。藿香三分 木香三分 益知三分 白朮三分 木瓜三分 食鹽二分 右六味。以水二升。

煮取一升去滓分温服●身热煩々煩渴舌焦
脉滑而數小便如血宜白虎加人參葉湯主之
●渴病身熱煩悶大渴少氣倦怠或霍亂昏眩
吐瀉冷汗者濕霍亂也不吐瀉者此為乾霍亂
難治紫霜丸服之●傷寒若中喝吐利汗出發
熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之四
逆湯方附子三分乾薑三分甘草三分右三味咬咀以
水一升煮取七合去滓分温再服●少陰病下

利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絶身反不
惡寒面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉
不出者通脉四逆湯主之通脉四逆湯方甘州
五分附子五分乾薑五分右三味以水二升煮取一升
去滓分温再服其脉即出者愈●身體暴厥以
陰陽難順接故也若脉濇而厥者熱厥也宜白
虎加桂枝湯●少陰病吐利手足厥冷煩躁欲
死者吳茱萸湯主之吳茱萸湯方吳茱萸五分人

參五分 生薑五分 大棗二枚 右四味以水二升煮取一升去滓溫服●病人奄忽而厥者發大熱前熱者後必厥今劇者熱亦劇厥微者熱亦微紫霜丸導之十二●病胸腹鞕痛額汗出四肢厥寒此為食厥宜急吐之●發汗若下之陰虛陽暴絶病仍不解煩燥者茯苓四逆湯主之茯苓四逆湯方茯苓五分人參二分甘艸二分乾薑五分附子五分右五味以水二升煮取一升去滓分溫服●吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絶者通脉四逆加豬膽汁湯主之●傷寒脉浮身汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽甘艸乾薑湯方甘艸三分乾薑三分右㕮咀以水一升煮取七合去滓分温服●發汗病不解反惡寒者虛故也若四肢攣拘而微厥者宜芍藥甘艸附子湯主之芍藥

甘艸附子湯方
甘艸二兩 甘艸五分 附子五分 已上三
味以水二升煮取一升去滓加蜜一匙分温服
蚘厥者當吐蚘令病者靜而復時煩此為藏
寒蚘上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者
蚘聞食臭出其人當自吐蚘烏梅丸主之烏梅
丸方烏梅二百箇 細辛六兩 乾姜拾兩 黄連一斤 當歸四兩
附子六兩炮 川椒四兩去仁 桂枝六兩 人參黄蘗各六兩 右
拾味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核

蒸之五升米下飯熟擣成泥和藥令相得內臼
中與蜜杵二千下丸如梧子大先食飲服拾丸
三服稍加至二拾丸禁生冷滑臭等食●病人
腹滿身煩合面倦卧其脉細數雖腹硬不可攻
之宜柴胡平胃湯柴胡平胃湯方柴胡五分 黄芩
三分 人參三分 甘草三分 半夏五分 生薑二分 蒼朮三分 陳皮
五分 厚朴五分 右九味㕮咀以水二升煮取一升去
滓分温頻々服●潮熱反復腹硬而肉脫轉屬

痃病壞病也宜酒痃湯主之●虛勞悸衄身體
微煩四肢痠痛者當皆建中湯主之當皆建中
湯方當皆五分芍藥五分桂枝三分生薑二分甘艸三分大
棗二枚右六味以水二升煮取一升去滓內膠飴
更上微火消解溫服三合日三服●氣血兩衰
鬱火起伏胞鞕腹弱少氣悸動兼主眼目不了
々者宜枸杞凉肝湯枸杞凉肝湯方枸杞厚朴
香附子各一錢茯苓二錢黃柏甘草各五分右七味以
水二升煮取一升去滓分溫服●齲齒之氣腰
腹拘急四肢沉重咽乾唇燥面顏少色二脉不
足者黃耆建中湯主之●身熱發作氣血消爍
若煩渴眞熱假熱俱既濟湯主之既濟湯方生
地黃五錢搗碎黃連五分右二味以水二升煮取一升
去滓分溫服若渴劇者冷服眞熱加石膏假熱
加人尿鑿語加辰砂●身體血燥暮時潮熱吸
々咳喘喉內痰響者鹿角菜湯主之鹿角菜湯

方○鹿角菜鼈甲牛皮消各二戔 犀角五分 竹茹三分 甘草三分 右六味○以水一升煮五味減三合○去滓內犀角攪調分温服●少陰病○二三日不已○至四五日○腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者○此為有水氣其人或欬或小便利○或下利○或嘔者○眞武湯主之○眞武湯方○茯苓五分 芍藥五分 生薑三分 白朮三分 附子三分 右五味○以水二升煮取一升○去滓○分温服●大逆上氣咽喉不利○止逆下氣者○麥門冬湯主之○麥門冬湯方○麥門冬五分半夏五分 人參三分 甘艸二分 粳米五分 大棗二枚 右六味○以水一升者取七合○分温服●大熱口焦○讝語欲死者極於陽也○厥冷鄭聲煩悸欲死者極於陰也●病屬陰脾氣衰弱○口內乾燥○嘔而不食其舌恰如鳥肉○名曰濡舌○試以芡實湯主之○芡實湯方○芡實微炒五分 參葉三分 蓮蔥五分 右三味○以水一升○煮取七合○去滓分温加姜汁服之●傷寒若痢

疾雖客熱稍解其脾氣遂失運行食飲不思者
當令嚼桐斷令以延胃氣也●病發於陽引日者多惡候也●病者多佳兆也病發於陰引日者多惡候也●病自外動者候在於鼻也自裏動者候在於口也
●病人體羸脾衰脉微弱食飲難進者宜薤白粥方薤白去皮研作泥等分陳米不拘多少薤白二味
先以水煮陳米作稀粥內薤白調和再上火四五沸●夫實則讝語虛則鄭聲鄭聲重語也劇者撮空循衣此為氣血兩敗也養榮湯主之養榮湯方人參三分黃芪三分麥門冬五分五味子五分當歸五分地黃五分甘草三分右七味以水二升煮取一升分溫服虛逆者加人尿厥冷者加附子●病人煩苦忽斷食者尚可治無煩苦漸失食者雖今少食不可治●兒腹癖胸滿小便如米泔其脉緊弦細數或能食反羸瘠者不可治●兒骨蒸潮熱頸細腹大眼睛無神足跗微腫者亦●

蚘厥驚呼煩渴面昏沉試捻之仍不醒者為死候也●厥冷煩渴面赤吐利不休小便如血者不可治●病態隨時變動假令朝劇暮安若胸脇攣急劇則四肢厥冷此為癇厥也四逆散主之柴胡芍藥右四味各十分擣篩白飲和服方寸匕或加膠飴攪調服之●病人體瘦脉微面鬱赤如醉狀四肢冷哽口捻衣此為陽絶也●病人身熨飲食不能反欲飲酒者少々與飲但勿令意極也●諸病解後脾氣必衰弱要慎飲食若妄飼者致食復●夏月腹痛煩燥若暴泄身忽厥反眼跳動元陽欲脫者為直中灸之陽復者生不復者死●喝之為恙多脫症須要春夏交服健脾劑此謂豫防何以論之曰喝病必發於吐瀉故也●食厥腹痛劇者必反覆顛倒脉結欲死者要吐瀉宜紫霜丸主之●暴泄忽厥

脉微額汗出者灸天樞湧泉厥不還脉不鼓反微喘者死●病人煩動大汗出脉陰陽俱盛者死●體羸食減脉陰陽俱虛身熱不解者死●諸病勞復二三若自復若擊天和者俱不可治（生氣）

○病人脉浮而洪身汗如油喘而不休水漿不下體形不仁乍靜乍亂此為命絕也

辨発驚脉證并治第三

問曰驚有陽有陰何以別之答曰兒肝氣實盛適與風氣相搏窜視反張脉浮而弦者名曰陽癇也●兒元眞虛弱肝氣獨亢睡惕露睛脉細而弦者名曰陰癇也●兒風熱傷食若瘡熱虫動是皆発驚跳以元眞不勝任也●陽癇為病大熱皆強上窜撮口四肢必瘈瘲者還魂湯主之還魂湯方麻黃五分杏仁五枝核芍藥一錢釣藤三分射干三分甘州二分右五味以水一升煮取七合去滓分温頻々服●兒啼聲輕者氣也弱也重濁者

痛也。高喊者。熱欲狂也。聲急者。神驚也。聲塞者
痰也。聲戰者寒也。●兒發熱頰赤。瞌睡跳惕。齘
齒嗽乳者。宜釣藤湯主之。●兒體熱面無色。反
折而啼號者。欲驚也。●陽癇為病。角弓反張。直
視而脉促。若劇者。厥寒。欲死。須要截風去痰。若
勢不減。々不足言。當急攻之。大承氣湯主之。●
惡寒發熱。若呵欠面赤。無汗而脉盛大者。必致
驚惕。宜大青龍湯主之。●兒發驚。痰涎壅盛。短

息煩躁。腹硬。脉弦者。宜紫霜丸。導以減其盛氣
也。●馬脾風。即肺脹也。搖肩滾肚。張口喘鳴者。
宜鐵漿加薑汁服之。●身熱昏沉。咽內如水鷄
聲。脉促面赤者。欲驚。宜麻黃杏仁甘草石膏加
射干湯主之。●驚之為病。有上竄熱證者。發於
陽也。有下竄微搐者。發於陰也。●兒昏沉五六
日。吐乳跳惕。身熱不解。奄忽發驚者。病反差。若
不差。直視伏作者。難治也。●兒驚跳。似寒似熱。

似嘔似泻名曰陰陽合病宜與芍藥甘艸湯以
將息也●驚病恍惚手脚偏動吐若泻其脉微
濇此為陰陽俱虛不可更汗更攻宜通脉四逆
加猪胆汁湯主之●児微熱瞌睡必露睛四肢
致動惕此為慢驚之兆也●児身體微熱慢跳
休作溏泻遺溲此為純陰也宜四逆加人參湯
主之●児一身微冷反指頭熨此為熱厥必発
大痙若驚搐也●病眞熱者陽也假熱者陰也

陽者発急驚陰者発慢驚急驚者宜寒泻方慢
驚者宜温養方●驚病身熨力猛者為陽癇身
冷力劣者為陰癇若擗地而作聲口流涎者癲
癇也●驚之為病仰視者為天吊内視者為内
吊角弓反張脉數疾者為痙病也●驚病者須
要扶持而將息若強擒捉則邪熨益激遂迫入
骨假令病差必手脚攣拘也●発熨窩視痰涎
潮盛口禁痙瘛此為榮衛凝結百脉不通故暴

朱蜜
紫雪

裂也●驚有陽有陰天釣者為熱陽也內釣者似癎陰也●児発驚脉浮數洪緊弦為急驚也脉沉遲散緩微為慢驚也●急驚緩治之宜寒冷方慢驚急治之宜温熱方●児初生児乳惕而不安此為胎驚宜朱蜜朱蜜方朱砂豆大蜂蜜鶏子大右二味研調每日含之日二三次●臍内直視齒噤齒手脚拘急脉促弦者為胎驚宜紫雪主之紫雪方黄金拾両寒水石四両八銭石膏四両八銭玄参一両犀角一両羚羊角一両甘艸八銭升麻六銭沉香五銭木香五銭丁香五銭右十一味以水五斗先煮黄金及二石至三斗入諸藥再煎至一斗去滓入芒硝三両二錢慢火煎以柳枝不住手攪候欲凝入磁盆中更下朱砂麝香各三錢急攪自然凝成紫雪為度●臍内発驚假者可治眞者不可治何以論之曰假者為風外也眞者為癎裏也●客忤者客氣忤犯其主氣之謂也発熱児乳

竹茹溫膽

睡必微跳宜惺々散主之●客忤発熱微搐若劇則如狂癇反視撮口惕而不安宜紅雪服之●児入語物響易動跳者此為元眞虛拙必発驚癇也宜竹茹温膽湯主之竹茹温膽湯方 茯苓一錢 陳皮五分 半夏七分 黄連三分 枳實五分 竹茹三分 甘草二分 生薑三分 大棗五枚 右九味咬咀以水二升煮取一升去滓分温服加辰砂三分為佳●児善怒啼哭脚腹攣拘脉必沉弦劇則齧齒齘乳此

柳肝加膠湯

為虫驚宜芍藥甘艸湯●虫驚如癇怒號而顔紅胸脇必攣拘脉乍動乍静者是也宜柳肝加膠飴湯方柴胡五分 川芎三分 當帰五分 白朮三分 茯苓五分 釣藤五分 甘草三分 膠飴雞子大 右八味以水二升煮七味取一升去滓内膠飴更上微火消解温服日三服●身温睡多胸腹滿而微煬或食臭或嘔逆者宜厚朴三物湯●児體壯熱面赤尻冷寒慄而振奄忽発驚此為痘

疹兆也宜續命湯主之續命湯方葛根五分麻黃三分桂枝二分芍藥五分鈎藤三分生薑二分大棗三枚右拾味以水二升先煮麻黃葛根減五合去沫內諸藥煮取七合去滓分溫服●兒膚有瘡發熱而驚者名曰破傷風即痓病也宜續命湯若身厥者芍藥甘州附子湯主之●病者身熱無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛痓葛根湯主之●病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭動搖卒口噤背反張者痓病也若發其汗者寒濕相得其表益虛即惡寒甚發其汗已其脉如蛇●太陽病發汗大多若亡血虛家俱致痓病宜黃芪建中湯主之●痓為病胸滿口噤臥不著席脚攣急必齘齒可與大承氣湯主之●大陽中熱者喝是也汗出惡寒身熱而渴劇者竅視反張宜白虎加人參湯●喝病發熱面赤而哽

其脉弦細乳遲。小便已。洒々然毛聳。手足逆冷。咽燥口乾。若発其汗。則其惡寒甚。加温針則発熱甚。宜生脉散主之。生脉散方。人參三分 麥門冬五分 五味子三分 炒右三味。以水一升。煮取七合。去滓。加薑汁。若竹瀝。攪調頻々服。●喝病頻渇而顔赤。脉促者。欲驚。宜黄連白虎湯。●暴卒中喝。直視失溲。四肢厥寒者。附子理中湯主之。附子理中湯方。人參三分 白朮五分 附子五分 乾薑五分 甘艸

三分 右五味。㕮咀。以水一升。煮取七合。去滓。分温服。●諸暴病。及眼瘈瘲。若痰喘短息。不論陰陽。先與人參黄連湯。人參熊胆湯亦主之。痰喘甚者。加薑汁主之。●驚病致上竄者。為陽實也。致下竄者。為陰虚也。實者攻之。虚者温之。●児元眞不實。動受物驚。編即客忤之謂也。中惡者。惡邪鬲害之謂也。即客忤之重也。白虎者即軽也。●児驚発不可灸。令努氣益盛。須用善推法。劇

者刺之宜鎮肝湯主之鎮肝湯方牡蠣五分麻黃三分寒水石五分枳實三分芍藥五分甘艸三分生薑三分右七味以水一升煮六味取七合去滓內牡蠣龍調分溫服●發熱驚跳短氣燥煩神魂亂若口渴若嘔吐者宜金雪金雪方金膏石膏各一戔龍腦二分麝香一分右四味碾調每服一字●驚癎眼神翻騰者為天釣諸治驚法須要寬氣托毒也宜釣藤湯主之釣藤湯方釣藤五分野蠶

一個均藥五分辰砂三分犀角三分甘艸二分生薑三分右七味以水一升煮取七合去滓分溫服●陽癎日二三發引日不解遂轉屬陰癎此為壞病也●陰癎不得有汗若有汗者恐亡陽也宜四逆湯●驚病昏況氣塵喉內如挽鋸者宜麥門加竹瀝湯○驚病衄血者可治嘔血者不可治何以謂也曰衄血者邪熱散也嘔血者榮血敗也●陰癎即慢驚也若兒乳而大便溏者名曰慢脾

風難治●天釣者神昏惡時若齒妳挽也內釣者多啼瞌睡必動惕寒也●児腎風若胎驚胸腹石硬反視而不能眴者宜紫霜丸服丸須臾大便通者生不通者死●驚熱夜不可停燈若停燈者陽炎却挽氣益驚跳而藥力必不可鎮也●驚病眼睛如魚喘鳴氣急額頭有汗爪之吃々者死●暴卒發挽痰喘肩息啼聲吃々乳餌不通者名曰纏唇疾風不可治●陽癎口鼻氣冷露睛而微惕有汗者亡陽也宜桂枝附子加黃芪湯●驚病必有痰々者動於脾若挽盛痰動者發驚癎驚癎四證八候盡備者不可治●身體厥冷反煩渴動躁而神魂亂小便如血者屬牝臟洞竭也●昏睡不醒四肢舒撒二便不禁者死二便不通者亦死●諸挽發驚反復二三亂髮尚可治嬰孩必不可治●發挽發驚短息痰鳴反復而不解女者可治

男者難治●身冷面焮倦睡呻吟若尸臭者孤陽飛越也●嬰孩爲物有焮必虛驚亂嚢則少減虛至童丱則更減之然焮盛則不能全無虛也●問曰癲癎何狀也答曰暴驚有聲而倒口延必流須臾還穌名癲癎也●癲暴倒狀如死須臾自惺後必苦頭痛若鬱勃如痴者是也宜斷癎丸主之斷癎丸方黄芪五分鮑退五分雪砂三銖細辛五分甘州二分蟬退四枚牡蠣三銖右七味爲末

棗肉丸如麻子大每服二十丸以人參湯服●病人肥白多濕黑瘦多癎屬濕者宜滲濕方屬癎者寧肝湯主之寧肝湯方沉香五分宿砂三分附五分吳茱萸三分黄連三分右五味以水一升煮取七合去滓分温服●病人重陰者癲重陽者狂如婦女月信適動病益劇獨言妄語者宜了々丸了々丸方黑鉛一兩半水銀二兩硃砂一兩乳香一兩牡蠣七銖右五味先以黑鉛入銚溶化次下水銀

候結成砂子。再下二味。乘熱用柳木槌研勻。內牡蠣末。如芡實大。每服二丸。以井水送下。病人若睡。勿驚動。自覺即安。再服二丸。癇病沉痾。必變痴。名曰痴癇。若口吶而不能語者。名曰瘖啞。廢人也。

○辨瘡疹脉證并治第四

瘡疹為病。熱毒所致。惡寒發熱。發熱食飲反如故。此為瘡疹之漸也。●寒熱發作。口渴脉滑。身體有

熱處者。發瘡瘍也。●惡寒發熱。脉滑而肌膚發紅班者。名曰丹毒也。●洒淅惡寒。肌肉發紅脉者。名曰紅絲疔也。●紅絲疔者。為浸蔓法急砭。以取毒血也。狼牙湯主之。●兒丹毒。為雲片。若癬疥。若毒熱喉腫。兼殺腹內一切蟲。宜狼牙湯主之。狼牙草湯方。狼牙草五分 防風五分 惡實一錢 甘草三分 生薑三分 右五味。以水一升。煮取七合。去滓內茉莉白三分。調均。分溫服。●兒身體血燥白癍

作痂者。名曰白遊風。宜托裏湯。托裏湯方。當飯
五分 黄芪 三分 紅花 三分 野蚕一個 惡實 五分 甘州 三分 大棗
二枚 右七味。㕮咀。以水一升。煮取七合。去滓。分温
服。●児始生。鼻口若穀道。蝕爛此為遺毒発動
也。托毒湯主之。托毒湯方。小連翹一戔 亀板 浸醋炙碎
一戔 紅藍 炒 五分 右三味。以水二升。煮取一升。去滓
分温服。若蝕爛惡臭者。加人中白三分。攪調分温
服。●児遺毒発動。蝕爛惡臭。諸方無効者。宜一

字灰主之。一字灰方。蝦蟆燒灰一戔 礬石燒二分 石灰
水飛二分 龍腦二分 麝香一分 右五味。研調。摻瘡上。日二
三次。或以鶏子清。調和傳之。●児胎毒若遺毒。
蝕潰浸淫者。宜奇良膏主之。奇良膏方。奇良一兩
八戔 亀板一兩 雞子殻五戔 右三味。研羅。以膠飴。調均。
毎服彈丸大。●児悪瘡痛痒。若瘭膿滴瀝不竭。
若大人徹毒骨痛。遠年近日。腐爛臭敗。或咽喉
唇鼻破壊。諸藥無験者。紫寶丹主之。紫寶丹方。

龜板醋炙二兩　石決明煅紅浸童尿　天靈黑炒銀炉粕各六錢右四味擣篩醋糊丸每服小兒五分大人一錢骨節疼痛者温酒服腐爛惡臭者奇良湯服●傷寒陽毒紅潤稀疏者五六日自差若紫黑稠密致大熱者不可治●陽毒身冷反大渴者難治身熱煩渴者宜化斑加犀角湯主之●陽毒如錦文狀此為熱極令然也宜火消湯主之●陰毒發胸背若四肢如敗咬狀者宜大建中湯主之●黄芪建中湯亦主之●児四肢若背腹痲疹出没者名曰風疹宜主麻各半加荆芥防風湯主之●風疹者即時毒也癢劇抓則發疹為泄風宜傅薑汁而解也●風疹煩癢抓益劇兼主陰毒諸瘡慰方白礬四錢食鹽二兩樟腦三錢右三味以水五升煮減二合以屢慰也●児悪寒發熱々解反發疹如痘泡名曰天泡瘡宜消毒飲主之●児天行熱痲簇々口燥而渴脉數鼾睡者化

班湯主之●児夏月疹如粟狀者名曰痧瘡宜
苦參湯浴之苦參湯方苦參一斤腦二兩右�once咀
以水一斛煮熟浴之日二三次●児身體濕爛
浸淫痛癢者名曰浸淫瘡宜防風排毒飲防風
排毒飲方防風一兩野蚕一簡鼠婦炒研三分生薑三分大
棗三枚甘艸三分右六味以水二升煮五味取一升
去滓內鼠婦攪調分温服●病人本有瘡率差
者為悪候若本無瘡反発者為佳兆也●疹発
指岐煩癢漸延遍身名曰癬疥宜防風解毒湯
防風解毒湯方防風五分荊芥三分悪實五分小連翹
五分大黄二分火炭母五分甘艸三分右八味以水二鐘
煮取一鐘去滓分温服●疥疹必痛癢若膿瀝
觸則傳染者是也烏頭煎洗之烏頭煎方川烏
頭四枝右一味以水三升煎取二升以洗日二二
次●瘡疹忽燥腹脹息迫煩而不安是以毒內
伏故也麻黄野蚕湯主之麻黄野蚕湯方麻黄

三分 野蚕一個 杏仁七枚 桑白皮二分 沉香二分 丁香二分 紅豆黒炒一錢 木香二分 生薑二分 甘艸二分 大棗三枚

右十二味。以潦水二升。先煮麻黄再沸去上沫。内諸藥煮取一升。分温三服。●疥疹感觸。煩痒爬反痛。唯癢者。宜蒴草湯洗之。蒴艸一斤 韶腦一兩 食鹽半斤

右三味。以水一斗二升。煮取六升。去滓温洗。日二三次。以瘡差為度。●児夏月面脆腫微熱瘡如砂。此為漆氣感觸也。●漆瘡熱痛煩痒者。宜無患子皮煎。無患子皮煎方。

無患子十個 去實

右一味。以水二升。煎減半升。去滓用管吹之。當泡起。仍追取傅患處。●漆瘡煩痒難差者。宜鐵漿灌之。礬石湯亦主之。礬石湯方。

礬石一斤

右一味。以醋一斛。水二斛。煮熟浴之。瘡毒痛。若脚氣冲心。俱浴之。●児癬疹起伏若微熱。若吐乳。此為交奶所致也。●頭瘡醫欲急攻之。是誤也。若被攻者。其瘡忽燥。痰鳴息商。必

腹滿。四肢厥。宜麻黄野蚕湯主之。更將結片。浸温酒。以熨頭上。瘡潤者生。否者死。●頭瘡。白班瘑瘡。若癢。若不癢。名曰白禿瘡。狼牙湯主之。●児禿瘡。難差者。宜松子灰散。松子灰散方。松子灰四戔。韶脳四戔。右二味。研篩。以雞子白。傅患處。●頭髮臭癢劇。爬則作片而落。名曰白屑風。宜白屑散主之。白屑散方。白附子三兩。土硫黄二兩。礬石二兩。側柏葉一兩。五戔。百藥煎八兩。甘松香四戔。三奈三兩。龍脳一戔。右八味。研篩。分髮擦之。以差為度。●皁皰發紅班。若痛痒者。名曰肺風。薄荷煎主之。薄荷煎方。薄荷一兩。防風一兩。石膏一兩。研。枳椇子一兩。搗如泥。白糖三兩。右五味。以水一斗。先煎薄荷防風。減四升。去滓。内三味。再煎如膏。每服彈丸大。●児胎感酒毒。皁紅。若紫而瘡。名齄皁。宜枳椇子膏主之。枳椇子膏方。枳椇子二兩。去核。石膏一兩。燒。蜂蜜八戔。右三味。内白中。擣為膏。每服彈丸大。以白湯服

之●鼻內瘜肉。此為鼻痔。宜砭惡血去其重勢也●九竅蝕瘡。隨月盈虛起伏者。名曰月蝕瘡。宜五香連翹湯主之。五香連翹湯方。麻黃三分 射干三分 枳實五分 大黃三分 連翹三分 雞舌香一分 沉香三分 木香二分 薰陸香二分 麝香一分 右十味。以水二升。煮九味。取一升。去滓內麝香。攪調。分溫服●鼻齆瘡熬燥。意欲濕者。名曰鼻癢也。熊膽膏方。熊膽一錢匕 羖脂二分 蜂蜜五分 右三味傳之。熊膽膏方。熊膽一

調和。以重湯微溫。傳。日五六次●病人結核。如梅實狀。名曰瘰癧。如馬刀蛤。名曰馬刀瘡。發頸若胸脇。即氣腫也。夏枯草膏主之。夏枯草膏方。夏枯草一斤 右一味。以酒二斗。煮取一斗。去滓內膠飴八兩。以文火再煮。攪調。每服彈丸大●瘰癧馬刀。無膿者是也。灸瘡頭若肩髃肘髎俱主之。瘡頭隔蒜而灸之也●結核家。須食海菜。常食胎毒無膿者。疼核也●兒體腫結。有膿者為

則經久當自愈也●發熱惡寒頭面暴腫其脉緊數者宜葛根加荊防湯葛根五兩分芍藥五分甘艸二分桂枝二分荊芥三分防風三分生薑二分大棗二枚右八味以水二升煮取一升去滓分温服●頸項強痛難顧眄者法以纏厚纏其頸服葛根湯以酣睡瀉之汗出而差●頭面腫起煩熱頭痛脉洪數此為風毒所致名曰頭瘟宜消毒飲主之●面傍脽腫熱痛者為鼻瘟

也●頭瘟耳鳴如海響名曰雷頭風若從頤頷硬腫食飲難通者名曰鸕鷀瘟難治也●問曰有喉痺有乳蛾有纏喉有走馬喉其狀如何答曰乳蛾者以形之謂也纏喉者以病劇之名也走馬者以病急之謂也喉痺者為總名此皆為陰陽鬱塞所致宜桔梗湯主之桔梗湯方桔梗一戔甘艸二味以水一升煮取七合去滓分温服●鼻塞腫若帝鍾風宜射干麻黄湯主之

射干麻黃湯方。射干一錢麻黃五分狼牙五分牛房子五分甘艸二分右五味。以水一升。煮取七合。去滓分温服。●喉嚨即懸癰也。腫者帝鍾風也。喉風者刺而愈。帝鍾風不可刺也。●兒喉塞発熱肩息痰響啼聲吃々者。名曰纏喉風。●兒暴卒喉腫。発熱反張欲死者。名曰走馬喉也。●諸喉風腫痛。食飲不能者。宜急刺取血也。●風毒盛奎若胃熱熏灼。上焦怫鬱。口爛食斷也。春霞丹主之。

春霞丹方。寒水石一鈺鼇砂一錢辰砂一錢馬牙硝一錢龍腦五分氷糖七錢右六味。碾調令服。●喉風者多痰発熱脉數。食飲不能者。含蓄膏主之。含蓄膏方。雀屎二十箇梅肉一個白糖一匁右三味。以薑汁碾調入絹袋含服。●舌瘡若喉腫咽嗌不利者。宜火済加薄荷湯主之。●乳蛾喉腫者。烏頭一塊研如泥。醋麪調以貼足心。再三換之。●舌腫喉瘡。槵欖膏主之。槵欖膏方。槵欖肉三箇白糖四錢右

二味研調含服●痧毒脉微血燥咽蝕者宜翹
花煎●病人體羸血涸假火漸熏灼遂為喉痺
食飲廢絕者死●纏喉若走馬喉大熱脉急反
眼肩息者死無熱大便瀉者亦死●問曰指瘡
有代指有甲疽有瘭疽其狀如何答曰指頭瘍
熱腫痛爪甲脫落者名曰代指瘡爪甲發瘡煩
痛若有熱若無熱名曰甲疽瘡色紫黑而蝕脫
者即瘭疽也宜鷄子清浸之鷄子殼鹽作末以

浸指須臾當痛定也●指瘡瘍熱煩痛者宜蝦
蚓油傅之蝦蚓飼三條去泥右一味研為泥以蓖麻油漬之●指頭發瘡黑硬者瘭疽也宜
附子膏主之附子膏方附子一枝韶腦五分飴餹一枝
右三味研調以傅當引出毒氣也●掌內濕癬
休作不解者名曰鷲掌瘡宜熏之熏方鼠屎二枝
川芎四枝大黃四枝右三味燒烟以熏之日二三次
禁烟撲熏也●指頭觸寒毒血頑凝不知痛痒

附子論

清冷膏

者名曰凍瘡宜附子煎洗之附子煎方附子一塊
韶腦五分右二味以酒二升煎取一升温洗日二
三次以瘡愈為度●胎癬毒腫若癰瘡俱宜清
冷膏解之清冷膏方木芙蓉花葉同一兩不拘生乾紅豆
半兩右二味以蜂蜜研調以傅且乾且傅始發者
熨散痛散膿成者膿當自出也●身體發瘡若
大若小若多若少無定者此為血花名曰血風
瘡宜防風敗毒湯服之●體膚班瘡若圓若斜

蜜陀言

肥必有白屑名曰白癬也●白癬若紫癬漸長
頻癢者磨好墨傅之●夏月蒸熨汗氣凝結發
班如錢狀名癍瘡即汗班也●瘥瘡得秋涼而
解若不解者朱粉燒取油傅之●問曰瘢風如
何答曰無瘡而有色者瘢風也瘢風有白有黑
黑者易治白者難治宜蜜陀膏傅之蜜陀膏方
金蜜陀四錢天南星四錢附子四錢右三味碾篩用茄
蔕醋釀熬藥末以磨患處二三次有驗●面顏

發黑黜。此為瘰癧濁所致。名曰黑癘。黑痣方。糯米百粒 石灰大拇指巴豆三個 右三味。碾調。內磁瓶窖三日。先以鍼撥醫子。仍點膏當蝕落也。●身體發瘡。狀如椒子。名曰疣瘡。宜灸瘡頭。自然脫落●面顏有滓者。此為嗣面。婦人則粉氣所致也●問曰。有贅有瘦。其狀如何。答曰。瘦者痂癥桃是也。瘤者留結之謂也。贅者贅出者是也●贅瘡宜以蜘絲纏其脚。經久而當落也●贅瘡

若努肉。宜白梅肉傅之。白梅肉去枝不拘多少 右一味。研如泥。以傅。自然消盡也●瘦瘤。若大若小。無瘡癤者是也●問曰。五瘦六瘤如何也。答曰。石肉筋血氣。此為五瘦也。骨肉膿血石脂。此為六瘤也。俱不可剪割。唯脂瘤當割破而去脂也●五般瘦瘤俱蠃磬丸主之。蠃磬九方。黃蠃二兩 白礬四兩 右二味。搗調。丸桐子大。每以溫酒服三十丸。日三次。內疽腸癰俱治之●腺瘡。餘瀝不斷。

七宝丹
广香油
嬰孩諸
煩癢者宜洗之熏之海桐皮石榴皮各等分以水煎去滓灌洗更燒蒿子熏之●黑癬癮疹若瘡瘡膿瀝不竭者七寶丹主之七寶丹方福㷀八錢漬醋殿數次去粗皮銀丹一錢研末鉛丹五戔五分大黃七戔五分甘艸三分五厘白糖四戔右七味研篩以蜂蜜若砂糖湯服日二三次●遺毒若黴瘡膚肉欲蝕盡宜麝香油方麝香麝香一分鱔鯨一分人油一蜆殼右三味碾調傅之日二三次

紅藍酒
逐毒之
●問曰五痔何也答曰牝痔牡痔腸痔血痔脈痔是也●腸風臟毒者大便血即瘀濁腸澼也若毒凝塞者名曰痔瘡也●痔血鮮紅者為腸風濁瘀者為臟毒宜紅藍酒去瘀血生新血紅藍酒方藍花一兩五戔胡椒四戔白糖一斤右三味以燒酒一斤釀一七日紋去滓分温服●臟奘凝結腸頭作塊名曰痔宜逐毒飲逐毒飲方小連翹一戔惡實一戔鷄子殼炙碎五分右三味以水一升煮取

七合去滓分温服●九竅腫突者俱為痔也宜刺取血若作口而膿瀝名曰瘻瘡宜七寶丹主之●痔為毒腸澼是也劇者大便血即腸風臟毒也●風毒客於腸間者為腸風也焚毒客於臟內者為臟毒也腸風者宜驅風焚也臟毒者宜逐瘀血也●問曰血有遠近者何也答曰鮮明者必近血也濁瘀者必遠血也近血者易治遠血者難治●痔沉痾者漏也用熏方熏方五倍子四戔韶腦四戔艾葉一兩八戔右三味為麤末缸內熨火跨坐以烟盡為度●痔漏蝕爛煩痛者宜木鼈湯主之木鼈仁五箇右一味擣如泥內焚湯熏且洗更木鼈粉調雞子清以傅其痛當自解也●痔瘡遺毒諸漏瘡萬方無驗者宜七寶丹兼食龜卵其應如桴鼓也●児兩腸衰弱魄門翻脫者名曰腸痔也良姜飲主之良姜飲方良姜三分蓮蕊三分龍骨三分粳米一戔甘州

腸脫方

三分右五味以水二升煮四味取一升去滓內龍骨搗調分温服●兒泄痢廣腸脫出者宜猿膽傳之猿膽一戔韶腦三分右二味以雞子清碾調傅痛處●病人腸氣虛極廣腸翻脫者宜蜘蛛散主之蜘蛛不拘多少黑炒右一味以蜂蜜研調傅之●問曰傷損如何答曰大便必難劇者瘀血衝胸若妄語此為驚氣入心宜桃核承氣湯主之●傷損如血大黃々連瀉心

膠飴酒

湯主之●打撲血出者為血散若血不出者此為伏血宜蘿蔔汁傳之蘿蔔生一個右以醋研調陰痛處日四五次●傷損血出過多目眩悸動者此為氣血虛耗所致宜凉肝湯主之●諸瘀血衝心煩躁欲死者還元湯主之還元湯方金水五合苦酒二合右二味調和煮三兩沸加薑汁攪調頻服●諸瘀血家宜膠飴酒主之膠飴酒方膠飴半斤梅肉二兩研清酒升一右三味煮調分温服

桐葉醋○
芥子醋○
橘核散○

●傷損燥熱煩痛若瘡疹熱腫者桐葉醋傳之○
桐葉醋方桐葉一兩苦酒三合右二味研調傳患處○
日數次●瘀血凝結作塊而痛者芥子醋傳之○
芥子醋方白芥子三兩生薑一兩右二味以醋研調○
傳患處●閃肭失足瘀血凝結而煩痛者宜橘
核散主之橘核散方橘核炒三兩延胡索一兩桃仁
炒一兩右三味研篩每二錢以温酒服之●瘀血
衝心驚悸煩躁欲死者宜鐵漿主之鐵漿方鐵

鐵漿方○
雞子油○

砂三兩右一味以童尿一斗攪調入罐内密蓋冬
月埋地三尺至春出之分温加苦酒薑汁服之
●問曰湯火傷瘡如何答曰火傷忍痛反灸則
痛自解若灌水者痛不可解也●湯火瘡煩痛
者雞子油主之雞子油方雞子黄七個熬取油雲母
一枝右二味研調傳痛處●湯火傷瘡熱腫煩痛
者宜蘿蔔汁若痛不解者生梨汁亦傳之●湯
火傷皮脫肉蝕者宜黄明膠膏主之黄明膠膏

黄明膠

杏仁粥方

馬錢サン

猫毛灰

方。黄明膠二兩清酒五合右二味以文武火煮為膏。傳患處●問曰風犬傷如何答曰春夏之交犬多発狂被咬傷者。焚腫疼痛劇者作讖言妄語。此為毒入心所致也●犬狗傷者急砭去血仍灌人溺再塗人屎更掩以紙灸之百壯紙焦屎燥則再三易之連日如斯灸至四五百壯為度●犬咬瘡用杏仁粥禁酒若服酒者毒入心驚躁不可治杏仁粥方。杏仁一合陳米一合右二味調和煮熟食之●問曰蛇咬傷如何答曰誤被咬傷者急灌自已溺仍傳以馬錢散馬錢散方。

馬錢一右一味研篩調唾以傳更服醋二合令毒無妄走也●問曰鼠咬瘡如何答曰毒鼠咬人焚腫疼痛若劇者致鼠鳴宜猫毛灰傳之猫毛灰方。猫毛燒灰三錢麝香一分右二味研調以唾傳之●鼠傷瘡者宜綿實熏主之綿實熏方。綿實一升右一味燒烟以熏瘡將息二三次●鼠傷若

犬毒衝心而煩躁者宜鐵漿兼防風解毒湯服之●諸虫傷煩癢者宜胡椒粉傅之胡椒研篩一分右一味以唾沫調和傅痛處●河豚為毒膚肉潤動者毒在腑也胸腹疠痛者毒在臟也毒在腑者宜韶腦酒毒在臟者宜承氣湯韶腦酒方韶腦五分右一味以酒二升煮減二三合分温頻頻服●魚毒食傷胸腹絞痛二脉沉弦者宜宿砂飲主之宿砂方宿砂一銭山查子一銭厚朴五分枳實三分青皮三分白朮三分生薑三分甘艸二分右八味。以水二升煮取一升去滓分温服●病人誤服烏附目眩欲死者宜地漿主之地漿方黄土二銭右一味以水二升攪調令清澄傾取冷服多食膠飴亦佳●人誤服輕粉口顏喎僻手

黑豆 地漿水

湯方黑豆一銭茉莉白三分大黄二分生薑二分甘艸二分右五味以水二升煮取一升去滓分温服●病人誤服烏附目眩欲死者宜地漿主之地漿方。

脚拳攣不能伸舒此為毒入骨髓也石榴皮湯

主之石榴皮湯方石榴皮二戔甘草五分石決明醋煅去鹿皮研篩一戔右三味以水二升先煮二味取一升去滓内石決明攪調分温服●砒礵為毒煩悶吐血劇者一身紫色而煩熱急取黑鉛四兩磨水一升灌服兼刺雞鴨熱血服之又人參汁灌之又巴豆去殼一箇為末砂糖大一塊水化調一升服之

辨疳病脉證并治第五

問曰疳有五疳者何謂也答曰五疳者五臟所發見也疳者屬脾々實則無五疳有五疳者此為脾既病也●疳之為恙肉脫血燥腹硬而脉細數若身熱發作若大便溏小便必如米泔也●疳有陽有陰蒸熱便難者陽也身腫便瀉者陰也●疳有陽有陰始多陽終多陰陽者宜寒涼方陰者宜温熱方●疳病鼻燥欲濕者名曰

臭疳宜熊膽蜜傳之熊膽三分芦硝一分
蜂蜜一戔右三味研調傳乾再三傳之●疳病嗜
泥好炭此為脾鬱所致也●児啼哭聲噎者氣
不順也喘痰者氣促迫也聲濁沉靜者疳積也
●児身熱発作胸腹痞鞕若嘔乳者宜柴胡平
胃散料主之●疳癖胸脇轆々有聲若潮熱発
作若氣逆妄怒者宜潰堅湯主之●児疳露骨
萎黄身熱而溏臭不可近者消疳湯主之消疳

湯方茯苓三分白朮炒二分乳柑皮五分莪茂五分三稜
五分馬嚢五分史君子去殻研二分生薑二分右八味以水
一升先煮七味取七合去滓加史君子攪調分
温食遠服●病人手背熱者為眞火也手心熱
者為假火也●児無食腸而與食遊致食癖劇
則穀不化血氣漸孤弱者名曰疳癖也●病乳
癖易化穀癖難化體瘦腹鼓脉沉緊者名曰穀
賊宜潰堅湯潰堅湯方茯苓五分白朮炒三分半夏

三分 枳實炒 三分 陳皮 五分 梔擲 五分 山查子炒 二分 香附子 五分 病砂 三分 綿實 黑炒 五分 風化硝 三分 莪茂 三分 三稜 五分 麥芽 黑炒 一錢 生薑 二分 甘草 一分 右十六味咬咀以水二升煮取一升去滓分温服●病體瘦熱動。臉赤鼻燥大便難小便澁者名曰陽疳宜柏皮湯主之●兒身挽啼哭腰腹如削者此為缺乳疳也●兒無食腸者强與食胸腹硬滿時痛若唇紅唾沫宜鷓胡湯主之鷓胡湯方鷓胡菜一錢 梔擲 五分 大黃 五分 苦楝皮 二分 甘州 五分 右五味以水二升煮取一升分温二服暮時減食次朝勿食。當有驗糜粥自養●兒頭脹大漸長反四肢瘦者名曰腦疳宜逐疳丸主之●兒體羸腹大眼內生翳者名曰疳眼宜柳肝加馬鬲湯主之●疳挽鬱釀致蝕瘡者宜烏頭灰以雞子清傅之●兒疳骨節疼痛逐致傴僂跼背若胸上突起名曰龜胸宜鐵漿服之更龜尿煎傅之龜尿煎

方龜尿三合燒酒五合詔腦三分右三味調和煎熟棄
滓慰突處●疳熱膠凝骨節疼痛胸皆欲突起
者宜速疳丸類服當自愈也●疳病脉細數必
蒸熱蒸熱者致盜汗遂屬肌膚甲錯也●児疳
愛喫泥土者宜伏龍肝丸伏龍肝丸方伏龍肝
二兩使君肉二兩槟榔一兩南星薑製一兩鰻鱺頭黑炒二兩熊
膽一枝右六味研調蜜丸喫炭者去伏龍加炭二
兩喫米者加米二兩●児體羸膚燥煩渴者名

曰疳渴宜白梅湯主之白梅湯方白梅二個兎絲
子一枝右二味以水一升煮取七合去滓分温服
●児疳煩渴不解脉微數小便赤而澁者宜益
元散主之益元散方滑石三枝辰砂一枝右二味研
調以雪水冷服●児體瘦咬爪大便溏泄連日
不解名曰疳泻宜扶脾湯主之●痢疾既解反
潮熱血燥者為疳病也●痘瘡解後血液必竭
四肢瘦削脉細而數此為轉屬疳病也●児病

胸骨露腹肚脹大四肢微冷而大便溏者名曰
痰痕宜養眞湯主之養眞湯方茯苓五分白朮三分
乳柑皮五分青皮二分半夏五分香附子五分便製病砂三分
酒製藿香二分人參二分破故紙三分附子二分麥芽五分甘
草三分生薑二分大棗二枚右十五味以水二升煮取
一升去滓分温服●病身熱血燥脉細而數脾
氣衰則大便鶩溏胃氣衰則四肢微腫名曰脾
癆宜扶脾湯主之●病腹肚石硬胃弱不殺穀
面顏銀白朝涼暮熱脉細數而肌膚甲錯者名
曰痕勞宜扶脾湯主之扶脾湯方茯苓五分白朮
二分半夏五分病砂三分香附子童便製蓮蕊三分乳柑
皮五分青皮三分食鹽一分人參二分紅棗二分生薑二分右
十二味以水二升煮取一升去滓空肚温服●
痕勞為病朝涼暮熱咳痰心悸肌肉血燥脉細
而數者宜逐痕丸主之逐痕丸方天靈蓋黑炒一兩
蝦蟆灰四錢鰻鱺頭燒灰四錢獺肝炙乾八錢眞珠一錢松脂

水飛九戔 田螺灰四戔 犀角戔 龍腦一戔 麝香五分 右十味研篩以燒酒糊丸梧子大每服五分雞卵濃湯送下●病人骨熱起伏其脉微數四肢肉脫一身血燥名曰乾血勞宜鰻鱺膏鰻鱺膏方鰻鱺去頭骨三斤 清酒一斗 右二味以文火煮為膏隨意食之●疳之為病陽虛則吐血陰虛則小便難陰陽俱虛竭則身體枯燥蒸熱盜汗心悸不安若口渴而咽痛者宜柴鼈湯柴鼈湯方柴胡一戔 黃芩三分 鼈甲炙二戔 枳實五分 寒水石二戔 鹿角菜三分 蓮鬚二分 甘草一分 右九味以水二升煮取一升去滓分温服●疳熱骨蒸肌肉銷鑠者宜梔子飯梔子飯方梔子四戔 右一味以水一斗煮取汁以炊米作粥食●病人氣血虛竭鬱熱起伏二脉細數大便若燥若溏胸痞悸動呴其氣而熱愈動滋其血而胸益痞宜八珍湯主之八珍湯方人參三分 茯苓二戔 枸杞三戔 硇砂五分 鹿角霜七分

七珍膏

蓮蕊三分 生薑一片 甘州三分 右八味。以水二升。煮取一升去滓。分温服。●陰痿遺精。腰脚痠痛。胸間悸動。腑下脫力。呴眞元。滋腎液。七珍膏生之。七珍膏方。人參四錢 破故紙微炒二錢 枸杞二十錢 雀肉研如泥十錢 雞子黃陰板面烈日晒乾十錢 白糖二十錢 蜂蜜一合 右七味。以燒酒二升。文火煮。膠凝為度。每服彈丸大。鹽湯送下。●氣血耗散。脾胃虛弱。遂變見諸症。勿論其證。勿拘其脉。宜連服陰陽調勻湯。以取

陰陽調勻湯

窮境之効也。陰陽調勻湯方。人參三分 茯苓三錢 甘草一錢 白朮五分 橘皮炒五分 半夏一錢 香附子便製一錢 縮砂五分 枳殼五分 枸杞一錢 黃柏酒製三分 甘州三分 生姜一片 右十一味。以水二升。煮取一升。去滓。分温服。●瘧勞。身體微腫。四肢沉重。若大便泄瀉者。宜眞武加馬病湯。若有陰熱者。更加鼈甲三分。●病人肌膚乾燥。咳喘少氣。名曰瘧咳。攙子去殼。微炙。蘸蜜。每食一二枚。日二三次。●病胸脇攣拘。夜臥盜汗。

若身發虛班若心悸動者○黃芪建中湯主之●
疳病腹癖臍脹雷鳴而微痛若四肢微腫者大
麥煎主之○大麥煎方○紅豆出芽五分五分茯苓一錢乳柑皮
五分枳實三分大腹皮五分大麥芽二錢生姜二分右七味○
以水二升煮麥芽減七合去滓內六味再煮取
七合去滓分溫服●疳腫腹脹小便不通者宜
瞿麥湯主之○瞿麥湯方○瞿麥五分商陸五分茯苓一錢
琥珀二分大腹皮三分生姜二分甘艸三分右七味○以水
二升煮取一升去滓分溫服●疳病面黃頸細○
腹大青筋大便溏而澄清者宜七成湯主之○七
成湯方○破故紙一錢附子三分蓮蕊二分茯苓一錢人參
二分生薑二分甘草二分右七味○以水一升煮取七合○
去滓分溫服●疳病玄府衰則自汗出牝臟衰
則大便溏宜溫臟丸主之○溫臟丸方○鯪鯉炙四錢
病砂二錢破故炒二錢蓮蕊炒一錢熊膽五分甘艸三分右
六味研篩以燒酒糊丸每服三十丸●疳熱發

渴要視口內若齒焦黑者名曰走馬疳宜大黃
黃連瀉心加茉莉白湯主之●疳挾骨蒸咳喘
煩悸渴而小便赤者五蓋湯主之五蓋湯方石
膏五分知母三分黃柏二分龜板五分地黃三分生用人參二
分甘艸二分生薑二分大棗二枚右九味㕮咀以水二升
煮取一升去滓加童便分溫服●疳熱骨蒸咳
痰吐食其腹鼓脹膨若微痛吞酸腥臭者宜鱉甲
枸杞飲鱉甲枸杞飲方鱉甲一錢枸杞一錢犀角三
分

右三味以水一升煮取七合去滓分溫服●病
骨熱咳痰身微腫吐鮮血者宜犀角山漆湯犀
角山漆湯方犀角五分山漆二錢人中白三分右三味
先煮二味去滓內人中白攪調分溫服若痰多
者更加竹瀝三分●亡血家飲食減少肌色脫是
跌必致腫也●疳病脈細而沉腹滿腸鳴必作
飧也●跌陽脈浮而數浮則為虛數則為熱虛
熱相搏故令氣鬲言胃氣虛竭也●百骸之力

咳痰倚息身浮腫大便泄利者不可治○痼病腹滿如鼓為丁奚若吐乳食為哺露俱屬難治之動也○痼病倦臥唇色脫盜汗不歇者死○病人倦臥而不食其眼失神顴時紅者孤陽病免口倚息鼻焦唇燥舌既出者死○病暴發倚息飲食不能者可治漸發休作行動煩悸飲食少進者不可治○陰虛者陽必動之發也陽虛者陰必湊之腫也陰陽偏廢者不可治

○辨上焦病脉證并治第六

問曰上焦病何謂也答曰假令如鼻耳眼口所患此為上焦之病也○頭痛發熱咳嗽鼻鼽脉浮而數者風寒也○頭痛休作肌膚鮮明而脉滑者為留飲也○頭痛胸痞若脚攣脉細而弦者宜柴胡湯本湯主之柴胡湯本湯方銀柴胡五分黃芩二分半夏五分人參二分甘草本五分川芎二分桂枝三分大棗二枚生薑二分甘艸二分右十味咬咀以水二

苓桂朮甘湯。

苓姜加味朮丸

升。煮取一升。去滓分温服。●頭痛氣逆。若頭眩。脉微滑者。桂枝茯苓白朮甘艸湯主之。桂枝茯苓各五分。白朮甘艸各三分。右四味。以水一升。煮取七合。去滓分温服。●頭痛発作。脉數實。此為頭瘡之兆也。宜芎黄加味丸。芎黄加味丸方。天靈蓋大黄各二兩。川芎一兩。

味丸。芎黄加味丸方。天靈蓋大黄各二兩。川芎一兩。右三味。研篩。以酒糊丸。●頭痛脉細。胸中温々。唾白涎者。宜吳茱萸湯。●頭痛胸痞。若悸動脉。關上浮者。大黄々連瀉心湯主之。●頭痛眼黄。大便鞕者。宜大承氣湯主之。●頭腦刺痛。四肢厥冷。額汗出。此為痛入泥丸宮。即眞頭痛也。朝發者夕死。夕発者朝死。●児痫熨薫灼。遂客於頭腦。其顏尖高者。名曰顏填也。●児泻泄不禁。眞元降陷。顏致坑者。名曰顏陷。宜扶脾加薑蚕湯主之。●問曰。眼病何以所致。答曰。痫熨風毒。若胎毒。是皆眼疾之所因也。●眼目暴腫。燃熨

而疼痛者風熱所致也●眼翳朧々悉胸腹如
娠脉沉細者痞熱所動也●眼目熱紅膚作斑
者為胎毒宜犬滑湯主之●眼瞼餲爛身凉和
脉沉細者為遺毒也芎黄加味丸主之●眼疾
熱痛不解者宜鐵落散點之鐵落散方鐵落四
以雪水五合浸之一晝夜取汁一盞脂寒製右二味調和以
七日色和皂角二分
點日四五次●眼病脉數緊目脉血腫而痛此
為風眼若不痛名曰疫眼也菊花湯主之菊花

湯方菊花五分防風一錢川芎三分梔子黑炒二分甘艸二分
右五味以水二升煮取一升分温服●眼瞼発
瘡脾鬱所致名曰眼疳●眼瞼赤痒名曰雀目此為痞鬱所致也宜夜明砂丸
暮暗
主之夜明砂丸方夜明砂二錢炒研熊膽五分右二味
研調溲丸麻子大每服三十丸●血眼熱痛若
疫眼紅腫俱點還元水兼與三黄加細辛馬鬻
湯主之●痞火鬱蒸遂害精華腎如霧裏此為

疳眼也●兒省母。若疳眼者。鼈鱉膽。若海鰕膽。
皆食之當自愈●兒眼瞼浮腫休作者。食飲過
飽所致也●瘡眼致星隱若翳瞙者。須要急治。
熬以雞冠血。點熬卵清亦佳●痘毒若風毒致
翳障者。宜用砂膏主之。用砂膏方。蓖麻子一兩 去
油三合 用砂四錢 右三味。搗爛作膏。貼百會。又傳諸
瘡而愈。若產婦胞衣不降者。貼足心●傷損眼。
煩熱煩痛者。宜襄荷根熬之。熬方。襄荷根一個 去
皮 右一味。研絞取液。以屢熬痛。當自解也●塵
砂侵眼。疹痛多淚者。好墨磨清水。以熬入闔眼
少頃。以紙撚。從眥尾向眥頭拭淨二三次。塵當
出也●眼目煩熱。煩痛者。為陽眼也。無熱而碧
白。不辨物者。陰眼也。陰眼者難治。陽眼煩痛。瞳
仁破者。亦難治●風眼熱腫疼痛。瞳仁翻突者。
不可治●問曰。鼻病如何。答曰。鼻煩熱而燥。屢
欲濕之。濕則蝕爛而痛者。為鼻疳也●鼻熱紅

若腫大脉洪而數者為肺風也●鼻濁瀝流如泉名曰鼻淵即腦漏也此為風搏客於肺所致必致瞑目劇者致衄衊宜三黃瀉心加細辛薄荷湯●鼻內瘜肉即鼻痔也若煩熱紅腫鼻凝塞名曰鼻齆宜割破取瘀濁也●肺風腫痛諸鼻瘡其脉洪數者宜火濟湯服之●鼻瘡齲鼻酒毒入肺所致者葛花湯主之葛花湯方葛花五分枳椇五分薄荷三分石膏一錢甘草二分右五味以

水一升煮取七合去滓分温服●兒鼻熱燥遂窒塞鼻息高鼾睡眠不安名齁鼾宜蜂蜜點之●病人肺竅為風熱所鬱遂齁鼾難以息者宜瓜蒂散用管吹之燥煩而解也●鼻瘡腫大其脉洪而滑者為鼻齆也通肺飲主之通肺飲方蒼耳子五分辛夷仁五分白芷三分細辛二分薄荷二分龍腦一分生薑二分右七味以水一升煮六味去滓內龍腦二三沸分温服日三服●鼻不聞香臭此

為肺竅鬱遏所致宜通肺飲主之●問曰有衄
血有吐血其別如何答曰鼻者與腦通血溢於
腦者致衄血也血動於胸者致吐血也●病人
血氣暴動致衄血其脈數實者宜大黃々連瀉
心湯主之●衄血為慈惡寒発熱其脈浮而緊
者此為風熱欲解所致也●鼻衄若吐紅喘痰
盜汗脈虛微者宜玄參湯●玄參湯方玄參三兩分 地
黃生三兩分 梔子炒三兩分 犀角三兩分 右四味以水一升煮
取七合去滓分温服●驚觸逆動而暴衄者先
以冷水噀其面仍與大黃々連瀉心湯●鼻衄
吐紅暴流元陽欲脫者宜灸湧泉大敦兪百會
亦為佳●病人身體羸瘦其脈細數咳血若衄
血者此為上實下虛之候也宜燒酒加蘿蔔汁
服之又紫糖以燒酒和解服之更大蒜研如泥
貼足心●病人衄鰓顏紅此為孤陽奔騰好墨
磨焚湯加人尿服之又花蕊石散主之花蕊石

花蕊石七
攝血一
防風攻毒廿

散方。花蕊石四錢食鹽一錢右二味研均。以童尿服
●咯血。若大便血。諸虛動所致者。宜攝血湯主
之。攝血湯方。當皈五分芍藥五分地黃生三分川芎二分
蝱蝀炒研三分生薑二分右六味。以水二升。先煮五味。
取一升。去滓。內蝱蝀攪調分溫服。●血動為病。
陽盛則身熱。陰盛則身冷。身冷者易治。身熱者
難治。●病人九竅失血。身熱不解。脉滑數者。不
可治。●傷寒熱客於膀胱。遂致血泄。此為病解
也。●病人吐紅腥臭不可近。其脉洪大若頭眩
者為難治。●血動為候。其人肌膚黑瘦者易治。
白肥者難治。●問曰。耳疾如何。答曰。耳之為恙。
脉浮者為實。沉者為虛。實者發瘡。虛者致聾。●
兒耳膿瀝而敗臭。此為脾鬱所致。以食飲過飽
故也。名曰聤耳。宜大黃々連瀉心湯。●風熱上
攻而鼓擊。耳鳴恰如海濤者。宜防風攻毒飲主
之。防風攻毒飲方。防風五分細辛二分牛蒡子五分黃

柏炒 三分 寒水石一錢半 甘草二分 右七味以水二升煮取一升去滓分溫服●病人耳鳴恰如蟬聲暮則劇朝則減此為無根假火奔騰所致也烏鴉黑散主之烏鴉黑炒 黑炒二錢 梔子 黑炒三錢 右三味研調以白湯加童便服之●耳痛休作若膿滴若蟬聲者宜白礬油主之白礬油方白礬五分 麝香一分 右二味先以清油二升煮白礬內麝香攪調滴入日二三次●耳鳴休作久々致聾者不可治●風毒逆鼓而耳鳴加聾者尚可治假火奔騰為勞聾者不可治●問曰齒齦腫痛何謂也答曰齒齲挾腫而痛脉必浮數者為風挾所致若脉沉數其齒焦者為齲齒也○齦齲暴腫而痛此為風毒所致宜消毒飲主之●齒齦煩挾疼痛若風挾若脾挾所致者宜木鼈散方木鼈子一錢 龍腦二分 右二味研篩醋調傅患處●齒暴腫灼乾

黑而脫落者。爲走馬疳也。蘿勒散主之。蘿勒散
方。蘿勒三分 鰕蟇燒作灰一分 龍腦二分 右三味研調傅
患處。重齲。煩熱而煩痛者。宜砭瘞血也。○齒
痛体作者。灸列缺。若陽谿不復發也。問曰。口
涎流出者。何謂也。答曰。涎者脾液也。口流涎者。
此爲脾失收攝所致也。養臟湯主之。養臟湯方。
茯苓五戔 白朮秒三分 陳皮五分 半夏四分 人參二分 柯子
二分 生薑二分 大棗三枚 甘草三分 右十味。以水
二升。煮取一升。去滓。分温服。○問曰。暴啞者何
以所致也。答曰。病人暴啞。其聲啾々。脉沉伏而
咳。此爲風痰凝結也。若聲吃々。脉動數。狀如狂
者。驚觸。若蟲癖也。○病人失聲。如囁狀。此爲風
痰凝塞所致也。白糖飲主之。白糖飲方。白糖四戔
蘿蔔汁五分 薑三勺 右三味調和。頻々服。○病人由
驚觸而啞者。宜蜜陀丸。蜜陀丸方。金蜜陀四戔 麝
香一分 辰砂三分 猪膽二分 右四味研篩。薑汁糊丸。桐

子大每服三十丸以温膽湯服之●児情態恰如痴而吶語此為癎啞也●病人體倦之氣力其聲如隔壁而語此為病末以血液竭故也●病人身熱脉數而嘔者為胃熱所致也若身冷脉沉者胃寒令然也●病候有聲而無物名曰嘔無聲而有物此為吐若脉滑為痰飲脉弦為虫動虫動所致宜安蚘湯安蚘湯方人參二分白朮三分茯苓五分乾薑三分烏梅一個蜀椒二分右六味以

水一升煮減三合去滓分温服●病人諸嘔吐水穀難入者宜半夏茯苓湯主之半夏茯苓湯方半夏五分茯苓五分生薑三分右三味以水一升煮取七合去滓分温服●嘔逆微熱胸脇苦滿其脉細弦者宜柴胡湯主之●病人胸間漉々作聲吐出水穀者茯苓飲主之茯苓飲方茯苓五分人參三分白朮三分枳實二分橘皮三分生薑二分右六味以水一升煮取七合分温服●病発熱而渴飲

反噉者為水逆也五苓散主之●嘔吐伏作飲食不能者宜燒酒服之服法燒酒五合白糖四戔姜汁一合右三味研調每服一蜆殼日五六次●嘔家腹滿潮熱若腹痛唇燥舌乾者此為實宜大承氣湯主之●兒暴吐脉腹反如故此為乳餌所妨也●嘔家有癰膿者勿治膿盡自愈●嘔乳伏作連日不解者發癇癎不可治也●嘔吐腹大四肢瘦其脉細弦者疳也●嘔家要減飲

食若妄飲食者不可治也●問曰膈噎病何以所致也答曰天質虛弱七情鬱塞若飲食飢飽過度脾方仍孤竭濁痰膠凝致以飲食溢吐也●飲食噎出肌膚血燥脉微弱者為極虛也與蜆殼散蜆殼敲方蜆殼浸醋燒四戔雞子殼四戔白糖一兩右三味研調以生姜湯服之●病人脉滑而動飲食時噎吐者宜大半夏湯大半夏一戔人參三分白蜜五戔右三味以水二升調和煮取一升去滓分温服

●膈噎胃反飲食時吐出者宜鸕鷀散鸕鷀散方
鸕鷀黑炒右一味研篩每一錢以燒酒温服●膈噎
飲食吐出而難內其脉沉弦此為病屬沉痼也宜
老涎飲主之老涎飲方老牛涎一升燒酒一升右二味
調和而三沸更加姜汁每服一二合以病愈為度
終身當不復發也●胃反膈噎諸脾虛食穀不化
若留飲胸腹雷鳴俱宜丁香煎主之丁香煎方丁
香三十五箇大棗二十枚生姜一斤右四味以水五升煎取
三升去滓煮陳米一升為粥加食鹽一匙攪調
歠食兼服白梅蘿蔔汁等●朝食暮吐暮食朝
吐四肢瘦腹肉脫者為難治●嘔家勿攻以上
實下虛所致也飲食噎而難內者尚可治內而
難收者不可治●問曰噯氣吞酸何謂也答曰
噯者出食臭酸者致酸味是以食餌鬱塞也●
食穀不殺吞酸噯臭劇者膨滿而痛宜平胃散
主之●病人腹力衰弱胸間留飲若嘔逆食臭

者宜茯苓飲服之●病人胸痞雷鳴大便泄利若乾噫食臭者是以胸腹不和故也生薑瀉心湯主之生薑瀉心湯方生薑三分甘艸二分人參三分乾薑三分黃芩三分半夏一夾黃連二分大棗二枚右八味以水一升煮取七合去滓分温服●論曰鼈雜為恙痰火鬱灼為此害也宜青皮湯和之青皮湯方青皮一夾食鹽燒三分生薑五分右三味以水一升煮取七合去滓分温服●師曰穀氣實則噫虛則噦々為吃逆吃者噦聲軽也噦者吃聲重也●噦者吃々作聲以草刺鼻噴而解即是也●吃逆休作數月不解食飲喜戲反如故此為虫氣令然也●病人困倦噦吃而脉沉細此為胃虛也宜柿蒂湯主之柿蒂湯方柿蒂一夾半夏五分丁香三分生薑三分右四味以水一升煮取七合去滓分温服●噦吃若熱若寒俱宜蘿蔔飲主之蘿蔔飲方蘿蔔汁五合白糖二兩燒酒二升右三味

調和分温頻々服●嗽家體羸血燥脉沉而細此為陰陽失順攝也●問曰咳嗽其別如何答曰浮風緊寒數焮細濕虛勞俱為肺氣不利也●風寒所襲其人若胸間有水氣若乾嘔必脉數而咳宜小青龍湯主之小青龍湯方麻黄五分芍藥五分半夏五分五味子三分乾姜三分桂枝三分細辛三分甘草二分右八味以水一升五合先煮麻黄減五合去上沫内諸藥煮取七合去滓分温服●

咳家夜間更劇引日難解者宜斂肺飲兼鼕方主之斂肺飲方射干一戔白芥子一戔生薑三分醬三分殼炒一戔右四味以水二升煮取一升去滓分温服鼕方木鼈子一兩敗棗一兩右二味作莫每三錢焚烟以鼻吸少頃當涎出仍服生薑湯●児骨露血燥咳喘而乏氣力此為瘠咳宜苦酒雞子嗽之方雞子一個右一味取實蜜炙亦佳苦酒再煮數之●咳家體瘦血燥淪熟去殼以苦酒再煮數之●咳家體瘦血燥

其脉細數必致咯血此為虛極也驚枸湯主之

●論曰病有喘有嗜短氣息迫名曰喘也咳內致聲聲名曰嗜也宜茯杏甘橘枳薑湯主之

杏甘橘枳薑湯方茯苓一戔杏仁七個甘艸三分橘皮五分枳實三分生姜三分右六味�mu以水一升煮取七合去滓分温服

●喘家多以暑月寒月必發動此為肺臟久畜濁氣所致也茶實飲主之

實飲方茶實炒五分蔊薤五分桑白皮三分乾姜三分大棗二枚甘艸二分右六味㕮以水一升煮取七合去滓分温服

●喘咳氣逆痰息煩動其脉沉弦者澤漆湯主之

澤漆湯方澤漆一戔半夏五分紫參五分白前三分生薑三分右五味以水一升煮取七合去滓分温服

●病人動躁汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘艸石膏湯主之

麻黃杏仁甘艸石膏湯方麻黃四分杏仁七個甘艸二分石膏一戔右四味以水一升先煮麻黃減二合去上沫內諸藥煮

取六合去滓分温服●咳喘交作短息而動躁其脉浮大眼如脫狀此為肺脹也越婢加半夏湯主之●體瘦肌燥喘哮休作若痰咳咯血夜臥不安者蕷煎膏主之蕷煎方蕷一斤上一味㕮咀以水一斗煮取一斗去滓分温服●肺癰息迫四肢厥額汗流脉沉結者死●問曰熱在上焦者因欬為肺癰肺癰之病何從得之師曰或從口入或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又被快藥下利重亡津液故得之曰脉數其人欬口中反有濁唾涎沫者何師曰為肺癰之病若口中辟々燥欬即胸中隱々痛脉反滑數此為肺癰欬唾膿血脉數虛者為肺癰欬數實者為肺癰桔梗湯主之桔梗湯方桔梗二斤甘草五分右二味以水二升煮取一升去滓分温服●肺癰吐涎沫而不咳者其人不渴必遺尿小便數所以然者以上虛不能制下故也此

為肺中冷。必眩多。涎。甘艸乾姜湯以温之。●肺癰喘不得卧。葶藶大棗瀉肺湯主之。葶藶大棗瀉肺湯方。葶藶炒一戔大棗三枚白芥子五分右三味。以水一升。煮取七合。去滓。分温服。●欬而胸滿振寒脉數。時出痰血腥臭。此為肺癰之漸也。○肺癰。吐膿血不息。一身盡熱。脉細而數。自汗若盗汗者。不可治。●問曰。骨鯁何以所治。答曰。魚骨為恙。急嚥膠飴。無驗者。再三嚥而愈。●人誤為魚骨所害。金鳳實服之。金鳳實三箇研末。以冷水調服。更以焼湯嗽之。●人嚥餅。誤膠其喉。煩悶而欲死者。急苦酒白糖攪調服。蘿蔔汁頻服亦佳。●児誤呑稻芒咽嗌不利。而煩乱者。急食膠飴。無驗者。再三食之。●児誤呑金銀若銅鐵。宜宿砂飲。宿砂飲方。宿砂一戔生姜五分右二味。以焼酒一升。煮取七合。去滓。分温内白糖攪調服。●問曰。胸痺心痛何謂也。答曰。胸痛其人脉滑

半浮

大黃二浮

者。發飲所致也。腹滿而胸痛。脉實緊者。穀飲所致也。胸脇拿拘。其痛休作有時。此為重動也。●傷寒脉浮。反攻之。遂胸痞而痛。名曰結胸。但滿而不痛。此為痞。宜半夏瀉心湯。半夏瀉心湯方。半夏五分 黃芩三分 乾薑三分 人參二分 黃連三分 大棗三枚 甘艸二分 右七味。以水一升。煮取七合。去滓。分温服。●胸痞按之濡。其脉關上浮者。大黃々連瀉心湯方。大黃五分 黃連五分 右二味。以麻沸湯一升漬之。須臾絞去滓。分温再服。●胸痞乾噫食臭。脇間有水氣。腹中雷鳴下利者。生薑瀉心湯方。生薑四分 甘艸三分 半夏半升 黃芩三分 乾薑三分 人參三分 黃連一分 大棗十二枚 右九味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎取三升。温服一升。日三服。●心下痞。按之濡。其脉關上浮者。大黃黃連瀉心湯方。大黃二分 黃連一分 右二味。以麻沸湯一升漬之。須臾絞去滓。分温再服。●胸痞乾噫食臭。脇間有水氣。腹中雷鳴下利者。生薑瀉心湯主之。●支飲胸滿者。厚朴大黃湯主之。厚朴大黃湯方。厚朴一尺 大黃六分 枳實三分 右三味。以水一升。煮取七合。去滓。分温再服。●心下痞。而復惡寒。汗出者。附子瀉心湯主之。●心胸中有停痰宿水。自吐出水後。心胸間。虛氣滿不能食。茯苓飲主之。●大陽病外證未

除而數下之遂愈焚而利々下不止心下痞鞕表裏不解者桂枝人參湯主之●胸痞劇則致痛々劇則徹背遂動躁而脉沉伏宜鬼箭湯鬼箭湯方鬼箭二銖人中白五分苦硝三分甘艸二分右四味以水一升煮取七合去滓分温服●大寒痛嘔不能飲食皮粟起宜大建中湯主之大建中湯方蜀椒五分乾薑四分人參三分右三味以水二升煮取一升去滓内膠飴二錢微々火煎取一升分温再服●蚘蟲之為病令人吐涎心痛発作有時毒藥不止甘艸粉蜜湯主之甘艸粉蜜湯方甘艸五分粉三分蜜一銖右三味以水一升先煮甘艸取七合去滓内粉蜜攪令和煎如薄粥温服●胸間虚氣滿若疼痛其脉細弦者熊膽飲主之熊膽飲方熊膽三分石決明燒去火毒五分右二味以燒酒先解熊膽更内石決明攪調分温服●潮熱胸滿而痛不可近者大陷胸湯主之大陷

十棗

胸湯方。大黃五分 芒硝五分 甘遂五分 右三味以水二升。先煮大黃取一升。去滓內芒硝。煮一兩沸。內甘遂末。溫服。得快利止後服。●支飲家。故煩胸中大痛。宜十棗湯主之。十棗湯方。芫花甘遂大戟大棗右上三味等分。各別擣為散。以水一升半。煮大棗肥者十枚。取八合。去滓內藥末。強人服三分。羸人服二分。溫服之。利後糜粥自養。●胸腹急痛。若噫息。其脉滑動。急與食鹽湯。仍以鵝翎探其喉。當暴吐而愈。●胸腹硬滿而大痛。其脉滑數。急與厚朴三物湯。●胸腹硬滿卒痛。身厥脉伏。急與紫霜丸。●胸腹痺痛。脉乍數乍遲。當吐。玆也。●胸痛反覆動轉。面顏失色。額汗如流。身厥脉結。名曰眞心痛。朝發者暮死。暮發者朝死。

辨中焦病脉證并治第七

問曰。中焦為病。候何謂也。答曰。乳食飢飽失度。

遂致腹内萬變病。假令如痞癖敦寢若腫滿脹
曺即是也●児嗔聲緩急。啼號無涙而脉弦急。
此為腹痛也。腹痛在臍上硬滿者。必食餌所致者。
臍下石硬者。後必致淋也●腹痛。食餌所致者。
平胃散主之。平胃散方。厚朴三兩 陳皮四兩 蒼朮
一兩 甘艸五錢 生姜五錢 右五味。㕮咀。焙擣為末。每服
一錢。以鹽湯。攪調服●傷寒。發汗後。腹脹滿者。
宜厚朴生曺甘艸半夏人參湯主之。厚朴生姜

甘草半夏人參湯方厚朴一兩 生姜三分 半夏五分 人
參二分 甘草三分 右五味。以水一升。煮取七合。去滓。
分温服●児腸胞窄。過餐生冷。腹鬱滿而微痛
此為食鬱。莪朮丸主之。莪朮丸方。莪朮三稜 陳
皮青皮 各五錢 乾曺胡椒 各二錢 右七味。搗篩。
以醋糊為丸。每服二三分●脇腹攣。拘而痛者。
與建中湯。若膨滿而痛者不當與也●體膚迪
白。四肢乏力。腔内時痛。雷鳴而瀉。宜厚朴枳實

厚朴三物

湯厚朴杈實湯方。厚朴五分杈實三分陳皮五分枳椇五分香附子五分桃柳五分黃連三分右七味。以水二升。煮取一升去滓。分温服。●腹硬脉弦痛而閉者。厚朴三物湯方。厚朴一尺杈實五分大黃五分甘艸三分右四味。以水一升。煮取七合。去滓。分温服。●腹内絞痛。四肢厥冷。脉沉伏而陰縮者。猪膽酒主之。猪膽酒方。野猪膽一枚右一味。以燒酒一升。煮減二三分。々温。頻々服。●胸

腹雷鳴急痛。脉沉弦。腰脚如冰冷者。宜薰臍法。

薰臍法。椀表鑿二三孔。仍以熟艾指大。倒著其裏面。點火以覆其臍。烟當從孔出。薰竭再三依前法。以腹温為度。●盤腸痛。屬寒疝。但不直視者是也。烏頭桂枝湯主之。烏頭桂枝湯方。烏頭一枚右一味。以蜜三升。煎減一升。去滓。以桂枝湯一升解之。分温少々服。不知者。稍加服。知者如醉狀。得吐者為中病。●盤腸痛。冷氣鬱結而

不解者。當飯四逆加吳茱萸湯主之。當飯四逆加吳茱萸湯方。當飯一錢芍藥一錢桂枝三分細辛三分吳茱萸二分生姜三分通草一錢甘艸二分大棗二枚右㐱味。以水一升。清酒一升。煮和。取一升去滓。分温三服。●兒腹肚絞痛。有瘈瘲者。內釣也。無瘈瘲此為盤腸。宜當飯附子湯。當飯附子湯方。當飯牛膝芍藥各二錢桂枝附子甘草各五分右六味。以水二升。煮取一升。去滓。分温服。●婦女腰腹絞痛。面紅者。此為血氣所致也。宜桃核承氣湯。桂枝茯苓丸亦主之。桂枝茯苓丸方。桂枝茯苓牡丹去皮桃仁去皮尖熬芍藥各等分右五味。末之。煉蜜和丸。如彈丸大。每日食前服一丸。不知加至三丸。●腹內血氣疾痛者。蟹爪枳實湯主之。蟹爪枳實湯方。蟹爪一錢浸醋炙枳實一錢芍藥一錢桃仁五分甘艸三分右六味。以水二升。煮取一升。去滓。分温服。●脇下偏痛。發熱脉緊弦。此寒也。以温

大黄附子

附子粳米

藥下之。大黃附子湯主之。大黃五分 附子三分 細辛三分 右三味。以水二升。煮取一升。去滓。分温三服。●腹中寒氣雷鳴切痛。胸脇逆滿嘔吐。附子粳米湯主之。附子三分炮 半夏五分 甘艸三分 大棗三枚 粳米五分 右五味。以水一升。煮米熟。湯成去滓。分温服。●論曰。腹滿按之硬而落々者。為癖塊也。濡而漉々者。為溼腫也。●児脾弱。食穀不化。遂致食瘕。宜潰堅湯

主之。●腹内食穀不消。鬱塞而硬滿。遂致蟲塊。宜鷓鴣菜湯。●癖塊属脾弱。其治無瀉法。宜磨穀化塊方。●癥結。積聚虚冷。若中鴨霍乱。宜木天蓼湯主之。木天蓼方。木天蓼五分 枳實三分 桔梗三分 桂枝三分 生薑三分 右五味。以水一升。煮取七合。去滓。分温服。●癥塊鼓滿。按之不移。四肢細削者。潰堅酒服之。潰堅酒方。狼毒一両 三稜五錢 莪朮五錢 枳實四錢 枳椇四錢 宿砂三錢 青皮三錢 乾姜三錢 白

糖半斤右九味搗篩。以燒酒一斗。攪調密封。四五日分服。日二三次。● 病者腹滿。時減復如故。此為脾虛鼓滿之漸也。宜羅勒湯主之。羅勒湯方。

羅勒一錢 人參三分 枳實三分 青皮三分 茯苓五分 白朮三分 厚朴三分 生姜三分 大棗三枚 右九味。以水二升。煮取一升。去滓。分温服。● 消食破滿氣。檳榔丸主之。

檳榔丸方。檳榔三錢 木香 人參各二錢 枳實四錢 胡椒一錢 甘艸二錢 右六味。酒糊丸。● 病人鼓滿漸脹。飲食反如故。此為腸表瘕肉。名曰腸覃。

胸腹大滿。本脉悸動。短息而額汗出者。不可治。● 塊瘕漸大。四肢腫滿。從脐水瀝流者。為難治。● 腫從四肢向腹者。尚可治也。從腹向四肢者。不可治也。

△ 辨下焦病脉證并治第八

問曰。下焦病何謂也。答曰。大便難。若瀉小便不利。若遺溺。及癈躄脚痛。此為下焦所患也。●大

陽病。桂枝證。醫反下之。利遂不止。脉促者。表未解也。宜葛根黃芩黃連湯主之。葛根五分 甘草五分 黃芩五分 黃連三分 右四味。以水二升。先煮葛根。減半升。內諸藥。煮取一升。去滓。分溫三服。●大陽與少陽合病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者。黃芩加半夏生薑湯主之。黃芩三分 芍藥一戔 大棗三枚 右四味。以水二升。煮取一升。去滓。分溫服。●脉浮小便不利。微熱消渴。大便洞瀉。其色黃。此為熱瀉。宜五苓散主之。●發熱惡寒。吐瀉煩渴。若腹痛者。清寧湯主之。清寧湯方。葛根五分 麥葉三分 蒼朮三分 桂枝五分 木香三分 藿香三分 甘草二分 右七味。以水一升。煮取七合。去滓。分溫服。●發熱汗出不解。心下痞鞕。嘔吐而下利者。大柴胡湯主之。●下利。脉遲而滑者。實也。利未欲止。急下之。宜大承氣湯。●下利。脉反滑者。當有所去。下乃愈。宜大承氣

硬飯

湯下利已差至其年月日時復發者以病不
盡故也當下之宜大承氣湯少陰病四逆其
人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下
重者四逆散主之下利脉沉弦者下重脉大
者為未止宜硬飯湯硬飯湯方硬飯二戔半黑炒半生用
桂枝一戔芍藥一戔甘艸三分大棗五枚
生薑三分右八味以水二升煮硬飯減五合內諸
藥煮取一升去滓分温服有熱者加黄連黄芩

有寒者加附子乾薑各一戔半下利清穀裏寒
面赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者
通脉四逆湯主之通脉四逆湯方甘艸二戔半生用
乾薑三戔分附子一枚生用去皮破八片
右三味以水三升煮取一升去滓分温服面赤
者加葱九莖腹中痛者去葱加芍藥二戔半嘔
者加生薑二戔半咽痛者去芍藥加桔梗一戔
半利止脉不出者去芍藥加人參二戔半
白朮三分茯苓三分
右五味以水二升煮取一升去滓分温服
大陽病外證未除而數下之遂協熱而利下
不止心下痞鞕表裏不解者桂枝人參湯主之
桂枝人參湯方桂枝三分甘艸二分白朮三分人參二分
乾薑三分右五味以水二升先煮四味取一升內

桂。更煮三兩沸。去滓。分温服。○下利。腸澼腥臭。腰髖煩痛。宜煎紅丸方。蜜香四錢 宿砂四錢 熊膽一錢 阿片一錢 龍腦三分 麝香一分 甘草三分 右七味。研篩。以燒酒糊丸。桐子大。每服二三丸。○大便後重而節續煩渴而小便澁。若大便去紅者。山漆湯服之。山漆根二錢 山藥酒制炒芍藥一錢 枳實五分 大棗三枚 生姜三分 甘艸二分 右七味。以水二升。煮取一升。去滓。分温服。○大便窘迫。腰腹絞痛而煩。取熱湯灌觸器。仍登器。湯氣薰蒸。腰腹自和。大便當快通也。○下利。手足微冷。脉濇者。不可更攻。宜昫血散。昫血散方。當皈四錢 鱉甲三錢 炙 蛇黒三錢 炒 右二味。研篩。以温酒服之。○発熱暴瀉。脉浮。渴而小便不利者。五苓散主之。○発熱脉數。腹中痛。屢欲圊便。煩渴而小便少。血為瘕泄也。○瘕泄大便如糜。法須攻之。瘕不竭。痢亦不罷也。○痢疾為瘀濁。故後重而腸垢。必苦裏急。

假令無腸垢者無後重也若脉滑而疾者當屎膿也○腹痛暴瀉惡臭不可近者為食積也○児暴瀉難以陽決之久痢難以陰決之暴瀉以多脫陽也久痢以多瘀熱也○小陰病下利便膿血若廣腸脫出宜桃花湯主之桃花湯方赤石脂五分乾姜三分粳米三分右三味以水一升煮米熟去滓温服○下利如蟹潮勃勃作聲者此為氣痢也氣痢丸主之氣痢丸方訶子皮四銭蜜香二銭人參三分右三味研篩蜜丸桐子大每服二十丸○痢疾後重不解其脉虚而動此為便血之兆也小連翹湯主之小連翹湯方小連翹二銭芍藥一銭檳榔二銭木香七分甘草三分右五味以水二升煮取一升去滓分温服○大腸熱則致後重寒則致魯瀉若曖息者穀餌也○夏月腹痛而泄瀉痛一陳泄一陳此為腸間熱也黄連香薷飲主之○発熱煩渴大便如卵黄者熱瀉也無

渴而清澄者。鶩溏也。○病人為冷食所傷。遂脇寒而利。如鴨屎。此為鶩溏也。扶脾湯主之。○下利日數十行。血液内竭。脾氣空乏。煩渴嘔逆。飲食不能。此為禁口痢也。蓮肉飲主之。蓮肉飲方。蓮肉炒二錢 黄連三分 食鹽炒二分 右三味。以水一升。煮取七合。去滓。内藿香汁。攪調。分服。○下利陰陽内竭。胸腹悸動。飲食不能。宜薰臍温之。○痢疾。腰腹絞痛。諸方無驗者。灸章門京門。若腰腹諸穴。○痢下旬餘。體瘦血燥。四肢微冷。反面色緑々正赤。此為孤陽沸鬱所致也。麥門冬湯服之。○大便滑泄。胸腹雷鳴。脉沉弦。此為脾冷所致也。薯蕷湯方。薯蕷一錢 茯苓一錢 白朮五分 人參三分 青皮三分 半夏一錢 宿砂三分 香附子浸童便灸五分 藿香三分 蓮蕊三分 甘草三分 生薑三分 右十一味。以水二升。煮取一升。去滓。分温服。○脉微而數。微為陰虚。數為陽動。虚動相搏。孤陽不能獨立

體膚自冷瘦𡸁明大便溏此為腎冷令然也宜
七戒湯主之○小陰病二三日不已至四五日
腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為
有水氣眞武湯主之○病人陰陽俱厥脾氣孤
弱五腧注下下焦不闔清便飧泄若腹築淋而
痛者參苓白朮散主之參苓白朮散方人參白
朮茯苓山藥宿砂陳皮乾姜蓮肉各三錢香白
扁豆薏苡甘艸各半右十二味搗篩為散或以

膠飴調勻服之○痢病疾禁妄攻若妄攻者瘀濁
未減而血液必竭也○痢疾要屬視口內若齒
焦者為走馬疳也○痢毒疫熱若瘡疹毒宜翹
花煎服之翹花煎方翹花五錢白糖五錢右二味以
水二升煮翹花去滓內糖服之○痢勢不減煩
渴而昏腫其脉弦急者此為発驚之漸也○溏
泄家要減飲食若妄食者為難療○痢後血液
燥竭脚肉殊脫削若攣急而疼痛此為雞膝風

也○痢疾後重而努力必致脫肛以下焦虛故
也○痢下數旬不解血液乾竭而脉細數者轉
屬痢瀉也○病人脉沉而遲面少赤身有微熱
下利清穀者必鬱冒汗出而解其人必微欬所
以然者其面戴陽下虛故也○面體羸瘠脾胃
虛弱飲食減少苦瀉泄者宜白朮膏服之白朮
膏方白朮一斤焙茯苓四兩陳皮四兩右三味以水一
斗熬取三升濾去渣又以水八升熬取二升將
渣擣爛又以水五升熬取一升都合前汁再熬
至二升加蜜四兩熬至稠滴水成珠為度每服
彈丸大日二三次○瀉泄家小便當少今反多
是欲愈也○痢疾為恙以順氣活血為要其氣
順則裏急減其血活則泄利自愈○痢下數月
休作者為休息痢也○病人瀉泄脉浮而遲此
為表熱裏寒其便必完穀也○四逆湯服之○少
陰病下利清穀裏寒外熱四肢厥脉微欲絶者

通脉四逆湯主之加人參三分○前後二便易其位而出名曰交腸此為臟腑錯雜所致也○痢下腸澼如魚腦若屋漏目紅唇燥此為氣血敗絶也○痢下旬餘不解鮮血自利脉微眉息多呼少吸者死○下利手足厥冷無脉者灸之不温若脉不還反微喘者死○暴利脉絶手足厥冷時脉還手足温者生脉不還者死○痢下體瘦脉虚反能飲食者生不能飲食者死○

體厥脉微口渴下利清穀短氣煩躁者死○痢下數旬不解嘔噦足避微腫若吐蚘者死○問曰大便難何以所致答曰脾實則大便難虚則大便溏不溏不難其人必實健也○潮熱便難若譫語若目中不了了者此為邪熱在裏也大承氣湯主之○病人不大便六七日頭痛有熱者大承氣湯主之○孩兒胸膜脹硬滿大便不利此為乳癖所致也白花湯主之○體羸肌

燥大腸血乾大便硬者宜波淡花敷之波淡花
一升白糖一升搗如泥盛壺密蓋每嗽梅實大
○趺陽脉浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮
濇相搏大便則難其脾為約麻仁丸主之麻仁
丸方麻子仁四戔芍藥四戔大黃八戔厚朴二戔枳實一戔
杏仁四戔右六味為末煉蜜為丸桐子大飲服十
丸日三服漸加以和為度○陽明病自汗出若
發汗小便自利者此為津液内竭雖硬不可攻
之當須自欲大便宜蜜煎導而通之蜜煎導方
蜜七合一味内銅器中微火煎之稍凝似飴狀攪
之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如
指長二寸許當熱時急作若冷則硬以内穀道中
以手急抱欲大便時乃去之○病人體羸血燥
大便結燥者以熨湯内觸器乘熨而登須臾當
肛潤便通也○病人氣之體羸腸内血燥大便
必硬宜逐腸丸主之逐腸丸方巴豆四戔硫黃二

有客熱若脉濕而身微腫者此為風濕也○病
人腹硬脉沉而小便不利是癖塊令然也○病
人脉浮微熱消渴小便不利者五苓散主之○
身腫小便少水氣在皮膚中四肢聶々動者宜
防已茯苓湯防已茯苓湯方防已一戔黄芪一戔桂
枝三分茯苓一戔甘艸三分右五味以水二升煮取一
升分温三服○風濕脉浮身重汗出悪風小便
少者宜防已黄芪湯方防已黄芪湯方防已一戔甘

栝樓二戔甘松二戔鐵落四戔大黄四戔右六味擣篩酒
糊丸朮實大別蜀椒二錢以水二升煮取一升
去滓洗掌中栽浄更塗胡麻油仍握一丸男左
女右以大便通為度若不通更握新者或左右
俱握若通而不禁者以冷水頻洗掌中便當頓
止○問曰小便不利者何謂也答曰膀胱以氣
化理寒熱虚實其氣不行仍失轉化小便不利
即是也○病人脉數身熱渴而溲便澁者膀胱

草三分 白朮三分 黃耆五分 右剉麻豆大每抄二錢匕
生姜一片大棗一枚水盞半煎八分去滓分温
服○風水惡風一身悉腫脉浮不渴續自汗出
無大熱越婢湯主之越婢湯方麻黃一戔石膏一戔
生薑三分 大棗二枚 甘艸二分 右五味以水二升先煮
麻黃去上沫內諸藥煮取一升分温三服○身
重從腰以上必汗出下無汗腰髖弛痛如有物
在皮中狀劇者不能食身疼重煩燥小便不利

者桂枝加黃耆湯主之○病人溲便澁痛而旁
射是胞胱挾熱也滑石湯主之滑石湯方滑石一
芒硝三分 柏實五分 茯苓一戔 甘艸三分 生姜三分 右六味
以水二升煮取一升去滓分温服○肚腹硬滿
腰脚攣急而小便不利此脬痺也○病人滲道
癃閉所致腹滿短氣者蓴麻湯主之蓴麻湯方
蓴麻一戔 茯苓二戔 豆黃卷三戔 馬鳥二戔 甘艸三分 右五
味以水二升煮取一升去滓分温服○病人元

陽減耗胞胱乏轉化遂腹脹小便不利醫欲以
淡滲利之是誤也得之反益劇短氣息迫宜折
水湯主之折水湯方桑白皮一戔吳茱臾五分枳實
七分柝椰一戔茯苓一戔宿砂五分香附五分附子三分生姜
三分麥芽二戔右十味以水二升先煮麥芽減五合
內諸藥煮取一升去滓分温服○病人胸腹大
滿結焮不解若脚氣心悸俱與降氣散降氣散
方田螺去殼黑炒一兩麝香三分右二味研均每錢七以

白湯服之○病腫脹稍解但足跗難消者宜附
子煎附子煎方附子四戔樟腦四戔右二味以酒五
升煎取三升温熟頻々熨之日五六次○病人
脬轉而小便不利者陰陽熨法主之○疳瘧鼓
滿小便不利者與黑散黑散方蝦蟆一兩宿砂一
兩右二味為黑炒存性研篩以生姜湯服之○病
人小腹攣急心胸中動氣此為元臟虛也溺必
如泔汁宜破故湯破故湯方破故一戔鹿角霜五分

茯苓一錢三分 連翹一錢三分 紅麴一錢五分 甘艸一錢三分 右六味以水二升煮取一升去滓分温服○病人胸腹腫滿如石硬雖體氣虛弱須先破之有故無害此為覇道也桃花煎破之桃花煎方茯苓一錢三分 白朮一錢三分 枳實一錢三分 半夏一錢三分 人參一錢三分 香附一錢五分 砂仁一錢三分 藿香一錢五分 甘草一錢三分 乾姜一錢三分 右十味以水二升煮白桃花一錢減五合內諸藥煮取一升去滓分温服得泄利二三行為度後去桃花服本方○小便當漸通也

○諸小便不利腫滿轉側不能者紅豆煎主之紅豆煎方紅豆一錢炒 茯苓一錢 枳實一錢五分 吳茱萸一錢三分 桑白皮一錢五分 桂枝一錢五分 白朮一錢三分 生姜一錢三分 右八味以水二升先煎紅豆減五合內諸藥再煎取一合去滓分温服○病人跗腫脉微口張氣麤額上汗出者死○腫滿小便不利多脾虛煩悸而飲食不進者不可治○問曰淋有五種者何謂也答曰淋之為病有寒有熱有血有石也又眞臟大

虛肚○腹鼈急而溺黵滴者○此名勞淋也○陰頭痛而小便淋瀝其色如血者○名曰焚淋也○宜石葦湯○石葦二錢滑石二錢茯苓五錢黃柏五分甘艸三分右五味○以水二升○煮取一升○去滓○分温服○小便難澁而鮮血滴○此為血淋○後致膿淋也○凉血湯主之○凉血湯方○小連翹五分當皈一錢藥一錢枳實五分桂枝三分桃仁三分生姜三分右七味○以水二升○煮取一升○去滓○分温服○身體冰冷○其脉沉弦○小便頻數○或身微腫○此名曰冷淋○宜甘草附子湯主之○甘草附子湯方○甘艸三分附子三分紅麴三分桂枝三分右四味○以水二升○煮取一升○去滓○分温服○血活則膀胱滋氣○化則溲便行○若氣血窒塞○則滲道澁○名曰氣淋也○枳實湯主之○枳實湯方○枳實三分厚朴一錢茯苓一錢木香三分藿香三分糖霜二錢生姜三分右七味○以水二升○煮六味○取一升○去滓○内糖霜攪調○分温服○膀胱鬱結○瘀

濁致淋凝則為砂散則為膏宜海金砂湯主之
海金砂湯方海金砂一錢琥珀五分茯苓五分糖霜五分
大棗二枚生姜三分右六味以水二升煮取一升去滓分温服○發熱脉浮渴欲飲水溲便澁而不利者豬苓湯主之豬苓湯方豬苓茯苓阿膠滑石澤瀉各五分右五味以水二升先煮四味取一升去滓內阿膠烊消若嘔家去阿膠加蜂蜜分温服五合日三服○淋疾有熱膿多者為易治○無熱膿斃滴不盡者為難治○問曰夢遺失精者何謂也答曰實壯人慾火盛而致夢遺者宜轉移其情想而愈也若羸弱人假火妄動而致遺泄者桂枝加龍骨牡蠣湯主之桂枝加龍骨牡蠣湯方桂枝三分芍藥一錢生姜三分甘艸三分大棗二枚龍骨五分牡蠣一錢右七味以水二升煮取一升去滓分温三服○病人夢泄時目眩若腰腹弦急而痛此為牝臟虛宜安神丸鎮之安神丸方

黃連六錢生地黃一錢當皈二錢硃砂五錢牛黃五分甘艸一錢右六味為末蒸餅糊丸黍米大金箔為衣每服十五丸○腎漏白濇頭眩掁々胸間悸動强陰不倒此為虛火不皈其原也宜知柏枸杞飲知柏枸杞飲方知母二錢黃柏酒炒三分枸杞二錢食鹽二分甘艸五分右五味以水二升煮取一升去滓分温服○病人二臟衰弱陰痿不振夢交精脫脉微況細弦數起居勞汗出此為過極豕創所致也極秘滋陰膏主之極秘滋陰膏方反鼻黑炒七錢破故五錢寇砂十錢枸杞子八錢蓮蕊五錢萹蓄八錢雞子黃十錢山茱萸八錢龍涎六錢夏草冬虫五錢人參五分右十一味為極末先以燒酒二升煮雀肉雞子黃為膏更以蜂蜜二升燒酒八升與諸藥同煮為膏每服彈丸大○問曰陰器疼痛者何謂也答曰陰器為恙有腫痛有隱痛此為牝臟毒火所致也○陰物隱痛煩乱毒火所致者黑豆湯主

之黑豆湯方黑豆一斗屑角五分甘艸三分右三味以水二升煮二味減一升內屑角末攪調分溫服

○玉泉腫痛若隱痛恰如刀割動燥不安者宜甘草湯浸之甘艸湯方甘艸八分食鹽二分炒右二味以水五升煮取三升內竹筒適寒溫以浸玉泉冷易之日五六次以痛定為度○論曰髓骨隱痛朝昏不解諸藥無療者但灸法治之灸龜尾仍與柏皮湯○論曰腎氣實則溲便適度虛則失其約名遺溺宜破故紙丸方破故紙二兩砂一兩附子半兩五倍子一兩黑炒甘艸五分右五味研篩酒糊丸桐子大以馬溺溫服○遺溺若陰痿俱為牝臟虛冷所致宜破故紙酒服之破故紙一兩砂一兩蓮蕊五分右三味擣為末以燒酒一斗糖霜一斤同調均內壺密封七日酒熟每服二三合日三次○師曰腎囊偏大漸長若腰脚攣急而痛名囊疝病寒令然

宜防風湯防風湯方防風一錢芍藥二錢烏頭霜五分甘草二分生姜二分右五味以水二升煮取一升去滓分温服○腰脚攣拘屈伸不任若行動跛跳其睾丸偏大者卵疝也與烏頭霜芍藥甘艸附子湯亦服之烏頭霜方烏頭霜二兩白糖二兩右二味研調每一錢七以温酒服之○諸寒疝病若陰腫腰冷宜當皈四逆加吳茱萸生姜湯○陰囊腫大腰冷轉筋其脉沉伏此為厥疝大

金鈴子丸主之大金鈴子丸方金鈴子去核四錢破故紙二錢附子一錢桂枝四錢吳茱萸一錢甘艸一錢右六味搗篩以燒酒糊丸桐子大每服三十丸日二三次○陰囊濕瘡得温氣反益劇者名腎臟風宣滲濕湯○陰囊偏腫漸長大者宜牡蠣散陰之牡蠣散方牡蠣一錢右一味研篩以雞子清調和陰之日二三次○腎臟風煩痒數旬難解者宜鮀狀子煎洗之鮀狀子煎方鮀狀子一錢白礬

為悉食飲起居如故卒起脚屈弱者即是也○
脚弱頑痲若攣拘反不濕腫者名乾脚氣也腫
者為濕脚氣劇者如瓜瓠也○風濕身腫脉洪
小便澁而脚弱者宜越婢加朮湯主之○脚胻
軟弱頑痺著轉筋胞滿短息者宜大桃柸湯大
桃柸湯方桃柸一枝生薑三分菁皮五分茯苓一枝厚朴一枝桑白皮一枝吳蓁萸五分半夏一枝白芥子三分木瓜五分右十味以水二升煮取一升去滓分溫服○

三枝煙草莖一兩右三味以水五升煮取三升以洗之冷則更温洗日二三次以煩痒解為度○身厥脉伏腰腹酷痛額汗出名寒疝宜烏頭煎主之烏頭煎方烏頭大者五枚熬去皮不咬咀右一味以水三升煮取一升去滓內蜜二升煎令水盡取二升○強人服七合弱人服五合不愈明日更服不可一日再服○問曰緩風痿躄何謂也答曰南方多濕瘴氣所襲致脚痺者名曰緩風也○緩風

脚腫漸長○諸藥不禁者○須急攻之○後利滲道○此謂劫其重勢也○宜白花湯主之○白花湯方○白花一枝 栝樓三分 枳實三分 茯苓五分 麥芽炒一枝 生姜三分

右六味○以水二升○煮取一升去滓○分温服○脚氣始起○多不令人識○飲食語言○氣力如故○惟漸頑痺○躓蹶○寒風濕之病也○脚氣奔騰○毒氣鼓擊○痰喘悸動○息迫而欲死者○宜與鐵漿方○

脚氣毒入腹○喘滿氣褰○昏眩躁煩○四肢厥寒○脉沉伏者○宜杉節湯主之○杉節湯方○杉節炒一枝 白芥子一枝 栝樓一枝 枳實一枝 生薑三分 吳茱萸三分

右六味○以水二升○煮取一升去滓○分温服○論曰○濁氣所襲○深入髓元○陽不能昫○遂致疼痛○此為寒湿○宜烏頭桂枝湯主之○烏頭桂枝湯方○烏頭右一味○以蜜二升煎減半○去滓○以桂枝湯一升解之○服二合○不知即服三合○風濕血痺○身體不仁○若四肢痿弱者○山蒁菜湯主之○山蒁菜湯方○

山萸茱一戔防風一戔當皈一戔牛蒡子一戔甘艸三分右
五味以水二鍾煮取一鍾去滓分温服○発熱
惡寒手脚關節掣痛名白虎歷節風々毒鼓擊
所致也○脚腫疼痛若痿躄脉洪數小便如血
宜白虎加桂枝湯主之○肢節疼痛身體尪羸
脚腫如脫頭眩短氣温々欲吐桂枝芍藥知母
湯主之桂枝芍藥知母湯方桂枝三分芍藥五分麻
黄五分防風五分知母五分白朮五分附子三分甘艸三分右

九味以水二合煮取一合去滓分温服い歷節
風病若脚氣攣急不可屈伸者宜烏頭湯烏頭
湯方麻黄一戔芍藥一戔黄耆五分甘艸三分川烏一戔咬咀
以蜜二升煎取一升即出烏頭右五味咬咀以水二升煮四味
取一升去滓内蜜煎中更煎之服三合不知再
服之○寒濕疼痛脚脛攣拘揲腫若瘦削是
属鶴膝風也寛筋凉血湯主之寛筋凉血湯方
防風威霊仙牛膝小連翹當皈各二戔寒水石芍

藥各三戔　甘艸生姜各一戔　右九味以水二升煮取一升去滓分温服○痺疾稍解反脚痛乏力此轉屬鶴膝也宜寬筋温血湯主之

寬筋温血湯主之

方防風牛膝當皈芍藥各一戔　桂枝附子各七分　甘草五分　右七味以水二升煮取一升去滓分温服○風濕疼痛若血痺不仁若鶴膝痿弱諸身體頑痺俱宜麻黄膏服之

麻黄膏方麻黄三兩　桂枝一兩　膠飴一斤　右三味以酒一斗煮二味減二升去上沫及滓内膠飴再煮為膏每服彈丸大一日五六次○腰脚寒痺不仁痿弱身無大熱者宜芥子膏除之

芥子膏方白芥子不拘多少　右一味研如泥温酒調隆日二三次○病人胞腹攣急而蹠跛此為癇瘕若蟲塊所致宜以法治之○體筋弛脚力空脫行動難支者宜三妙湯主之

三妙湯方牛膝一戔　黄柏三分炒　知母一戔　杜仲一戔　破故紙一戔　桂枝三分　附子三分　甘草三分　生姜三分　右九味以水

二升煮取一升去滓分温服○脚氣痿躄難
月常須著綿褌至冬寒倍令兩脛温煖得微汗
為佳常令按摩數勞動關節令氣血通暢此拒
風濕之法也○陰虧則形壞故肢體為之廢弛
膝臗腫大不能行步名曰鶴膝風血燥劇者不
可治○風痺寒濕痿痺偏廢若鶴膝々臗疼痛
如虎咬者宜樟木湯浴之樟木湯方樟木屑一斗
桐木皮升五右二味以水一斛煎以浴痛處日七
八次以痛定為度○脚氣房勞虛乏小陰脉不
至腎氣微少精血奔氣促迫上入胞膈者為難
治○脚氣衝心恍惚氣急四肢厥額汗出脉乍
大乍小者不可治○脚氣之為恙不得大補亦
不可大瀉多由氣實而死氣虛者亦難治

護養

兒護養皆失於姑息富家過愛遂多夭横貧家不及反得壽長○兒受三分冷哭七分飽此為護養之要○兒心胸要冷背腹要温哭是歌不哭不傷儡也○兒有胸無心病多從口成乳後勿與食々後勿與乳○兒乳養飲者必致疳病藥補是不知食補也○兒頭以凉為要足以温

為要體易虛易實勿服多寒勿服多熱○児敏解人意是眞陽發泄恐難養○児瘦先撿乳餌一挩粥勝一斤參○児肌膚鮮明者有留飲宜滲泄方青暗者有寒毒宜溫散方○児額有筋而頸細身體乏力者屬疳病也宜赤風蛤嗽之○風者百病之長食者百治之原飲食不能者不可治○児妄笑者為心虛笑少者為心實○児穀腸多蟲乳腸少蟲有病者胎毒也○児穀氣勝於元氣者體肥而多病元氣勝於穀氣者體瘦而少病○諸病解後脾胃必衰弱強食則發熱而腹滿是食復也○病人貪食者當戒也若惡者反要强何以論之曰貪即惡之基惡者眞元不支故也○寒熱必有眞假眞者勿慢治假者勿拘泥○病候有眞假眞者隱伏多在裏假者發見多在表○児哭少勿哭多○醫有常變有寬急勿以常為

變勿以變為常勿以寬為急勿以急為寬○方有君臣有佐使勿以君為臣勿以臣為君勿以佐為使勿以使為佐○方有多有單多者補澤所用也單者攻擊所用也致偏廢者有偏見也○劑有寒因热用有热因寒用有寒因寒用有热因热用寒因热用热因寒用此為從治所用也寒因寒用热因热用此為反治所用也○醫有反治有從治體實者反治所宜體虛者從治所宜反治者為常治從治者為變治○問曰醫有逐機有持重何也答曰逐機者逐病候而轉方也持重者重病因而不轉方也若識逐機者假令一日轉百方不為以誤也若識持重者假令百歲用一方亦不為以誤也○凡診病者當以一級重決之也若以軽決之者必取敗缺也○醫之為伎劑也易處病也難診若置其診而欲擬其劑者未可與論也○児病始吐蚘者為

熱病當差終吐蚘者為寒病不可治○問曰病熱用寒方益盛用熱方反安者何也答曰夏月體熱然反灌熨湯後身自凉也假令如火燒瘡急忍痛而灸後痛頓減此皆從治之類也○問曰醫有從治有反治何謂也答曰熨用寒此為反治熱用寒此為從治病輕者反治所宜也病重者從治所宜也○兒暴泻昏沉脉微弦而四肢冷若驚惕者冬月易治夏月

難治○病始為實終為虛暴虛者易治漸虛者難治○兒病多兼蚘以脾虫故也始吐蚘者佳終吐蚘者不佳○兒未期月而生者致脚弱以筋骨有所缺也○醫役非劑而在七以劑說治者未可與論也○診病要在氣息安靜者生短急者死○癖塊有磨法無泻法若妄攻者眞元必傷不可治○兒腹有塊者不問食癖虫塊俱為惡候須急論治○診病以銀海為要虛

實必顯。以精華所奏故也。○病五實者死五虛者亦死。○病多反復者。不可治也。

嬰兒論尾

嬰兒論跋

元天地之間。祖名易求。精者難得。於金玉之寶。瓦石之多。從昔醫書雖多。至傷寒論真。精者鮮矣。又方脈家則傷寒論真。精者尤鮮矣。

清閟士稱先生著嬰兒
論。真識金出於長砂之腸。
是小方脉家之精者也。
嗚呼滔滔皆此兩書也。
誠貴於彼金玉。蓋望道
書矣。真他假令有所取

得全玉之精者固忘固
陋。漫漶兔罝。以為跋。

寛政丁巳之歳
平安僑屋廣川獬撞書

以書雖專主嬰兒然至雜病篇則大人當亦
兼療焉譬猶傷寒論以兼療雜病然矣蓋多
奇方妙論余屢試屢驗今不敢自秘遂命剞
劂以與世共之云

寛政九年歳次丁巳夏六月

瑤池齋藏

平安書舗

二條通柳馬場東エ入町
林伊兵衛

二條通堺町東エ入町
林喜兵衛 發行