



傷寒論國字辨

二

ヤ 9
1159
2



傷寒論國字辨卷之二

尾張

淺野徽元甫 著

大陽病篇第一

大陽^{ソトクル}人身^{ソトクル}外^{ソト}廓^{ソト}即^{スナハチ}皮膚^{ヒダ}也故^{ナニ}大陽^{ヒダ}大表^{ヒダ}云^{ヒダ}カ如^{ヒダ}故^{ヒダ}其

病^{ヤミ}表^{ヤミ}アル皆^{サレバ}大陽^{ヒダ}病也又大^{サカシ}隆^{サカシ}也陽^{サカシ}陽^{サカシ}病也故^{ナニ}其^{サカシ}病^{サカシ}ノ盛^{サカシ}

熱^{アツク}實^{アツク}症^{アツク}陽^{アツク}明^{アツク}少^{アツク}陽^{アツク}症^{アツク}非^{アツク}皆^{アツク}大陽^{アツク}病也此^{アツク}二^{アツク}病^{アツク}大陽^{アツク}病

ノ本^{アツク}症也又大陽^{アツク}陽^{アツク}明^{アツク}或^{アツク}少^{アツク}陽^{アツク}ノ合^{アツク}病^{アツク}併^{アツク}病^{アツク}モ此^{アツク}篇^{アツク}論^{アツク}列^{アツク}ス又

大陽^{アツク}病^{アツク}陰^{アツク}症^{アツク}ヲ帶^{アツク}ルト始^{アツク}メ大陽^{アツク}病^{アツク}ノ医^{アツク}治^{アツク}アヤリテ陰^{アツク}症^{アツク}變^{アツク}

スト亦^{アツク}皆^{アツク}此^{アツク}篇^{アツク}論^{アツク}ス六^{アツク}部^{アツク}ノ説^{アツク}總^{アツク}論^{アツク}見^{アツク}ヘタリマヅ總^{アツク}論^{アツク}ノ諸^{アツク}説^{アツク}

會^{アツク}得^{アツク}ノ而^{アツク}後^{アツク}見^{アツク}ルヘシ

大陽^{アツク}之^{アツク}為^{アツク}病^{アツク}脉^{アツク}浮^{アツク}頭^{アツク}項^{アツク}強^{アツク}痛^{アツク}而^{アツク}惡^{アツク}寒^{アツク}

大陽^{アツク}ノ大^{アツク}表^{アツク}云^{アツク}カ如^{アツク}ク即^{アツク}皮^{アツク}膚^{アツク}也大陽^{アツク}之^{アツク}為^{アツク}病^{アツク}大陽^{アツク}ノ位^{アツク}地^{アツク}於^{アツク}



テ病ヲナス者ト云フカ如レ位地トハ大陽ノ場所イ也脉浮トハ其脉ウ
カミテ皮膚ノ際ニテウツラ浮ト云也其病表アリ故ニ其脉浮也
頭項強痛ト頭ハカシラ項ハウナキ強ハコバル痛ハイタム頭痛項強
也惡寒ハサムケ也卧具ヲ着テモ火ヲタリテモゾゾトサムキ也是大陽
病ノ總目章ニテ大陽病ノ發病ヲ明也言ハ大陽病ノ發病ハ其
病表ニアリ故ニ脉浮ト頭項強痛而惡寒也凡總目章トハ其篇
ノ病症ノ自録也此篇大陽ノ病症ヲクロク論列ストイエ其症多
其發病ノ狀ヲ分別シガタシ故ニ其症一定ニ必スル所者ヲアゲテ
目録ト其部ノ目ヲアテス凡萬病其症ヲ見スナハ其部ノ病ト脉浮
頭項強痛而惡寒スル者ハ大陽病ト口苦咽乾目眩スル者ハ少陽
病トスルカ如レ凡六部及中風傷寒皆總目章アリ是仲景氏病
診部位ヲ定ムル根本也

問曰是大陽病ナレハ必發熱スレモ若發熱セズ惡寒ノミナレハ陰症ト
大陽病非ス然レニ此總目章ニ發熱ヲ舉サルハ何ナ答曰大陽病ノ
發病ハユヤカラ中風傷寒ノ發病ハツツ發熱シテハゲレキ者也故ニ
發熱ヲ舉ルルキハ中風傷寒ニギレヤスレ故ニ此章ニハ發熱ヲ畧メアデ
ズ其分別ヲセテ後ノ章ニ大陽病頭痛發熱汗出惡風者桂
枝湯主之ト云テ發熱ヲアゲテ此意ヲ知ラレル也其發病ユヤカ
ナル故也故ニ頭痛ヲ以本ト而後ニ惡寒發熱脉浮ナル者又頭痛
項強ヲ本ト而後ニ惡寒發熱脉浮ナル者是大陽病發病ノ本症
也

大陽病發熱汗出惡風脉緩者名為中風ト
此章ニツツ發熱ヲ舉ルハ中風ノ發病ニツツ發熱ハケレキヲ明也汗出ハ
大表症ナルカ故也惡風モ表症也凡惡風ハ風ニアタレハサムケノアル

也脉緩緩^ハユル^ハリ^ハニテ系^イナ^ハト^ハヒキハ^ハス^ハ也脉ノ^ハユ^ハク^ハヨ^ハワ^ハキ也名^ハ中風^トハ中^ハ傷^ハ義^ニテヤ^ハブル也風^ニヤ^ハブル^ハト云^ハ也中風ノ總目章^ニテ中風ノ發病^ヲ明^セ也言^ハ其始^ハ發病^ノトキ發熱汗出惡風脉緩^ハ者^ハ是亦大陽病也但其發病^ノトキ發熱其症頗^ハケ^ハレ^ハ其病^ハ反^テ淺^キ者也故大陽病ノ内^ニテ此症^ヲ分^テ中風^ト名^スル也中風ノ發病其鼻中^ニツ^リ鳴咽^ハ喉^ト和^セズ發熱汗出惡風脉緩^ハ者^ハ中風ノ本症也中風汗出^ハ定症也

大陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脉陰陽俱緊者名曰傷寒

此章^ニツ發熱^ヲアル^ハ傷寒ノ發病^ニツ發熱^ハゲ^レキ^ラ明^ス也或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆^ハ其發病^ノトキ或

已^ニ發熱^{スル}モアリ或^ハイ^マダ發熱^{セサル}モアリテ定^ムヘカ^ハス^ハ必^ズ其アル所^ノモ^ハ惡寒體痛嘔逆也惡寒^ハゾ^ゾトサムケアリテ火^ニア^タリ^テモ卧具^ヲキ^テモヤ^サル也惡風^ハ風^ニア^タレ^ハサム^クア^タラ^サレ^ハサムカラス故惡寒^ハ深^ク惡風^ハ淺^ク體痛^ハ總^ク身^イズ^ル也嘔逆^ハコ^ミア^ケテ物^ヲ吐^ナリ以上ノ症皆寒邪ノ深^ク入^{タル}也脉陰陽俱緊^ハ脉^ウカ^ミテ皮膚^ノ際^ニテウ^ツテ陽^トレ^シ沈^テ筋肉^ノ際^ニテウ^ツテ陰^トス緊系^ナト^ノロキ^リツヨキ^トニテ脉^ニカ^アリ^ツヨキ也是亦寒邪^ノツヨキ脉也傷寒^ハ寒^ニヤ^フラ^ル也傷寒ノ總目章^ニテ傷寒ノ發病^ヲ明^セ也言^ハ其始^ハ發病^ノトキ發熱^ハケ^レク又惡寒^ハツヨク必體痛嘔逆或^ハ其始^ハツ惡寒^ハ甚^クツ^ハイ^マダ發熱^セ體痛嘔逆脉陰陽俱緊^ハ者^ハ是大陽病也但其發病^ノ勢^ハ急^ニハ^ゲレ^ク其症^ヲカ^レ故大陽病^ノ内^ニテ此症^ヲ分^テ名^ステ傷寒^ト云^ハ也傷寒汗出^ハ定症也汗

出六變症也

問曰中風傷寒_ハ是大陽病也其内ニ就_テ其症ヲ分テ中風傷寒_ハ云_フ何義_ヲ答曰經文曰大陽之為病脉浮頭項強痛而惡寒_ハ是之為_ニ字ヲ以テ云_フモハ凡_ソ大陽ノ位地ニ於テ病ニ入者_ハ云_フカ如_シ然_ハ中風傷寒_ハモヨリ大陽ノ場所ノ病ナ_ル是皆大陽病ナル_ヲ明_シ又中風傷寒_ハ發病亦皆脉浮頭項強痛而惡寒_ノ症_{ナル}者也豈但中風傷寒_ハニナ_ラマ_ル凡_ソ萬病脉浮頭項強痛而惡寒_ノ者_ハ皆大陽病也_ハ是仲景氏萬病ノ法度ヲ六部ニ繫_テ後世傳_テタガワサル所以也然_レ其症ヲコニカニ別_ニ至_テ輕重同カラス其邪深キアリ又淺キアリ又深カラス淺カラス中間ニアルアリ故_ニ皆大陽病トス_ル其病混雜_ノ治法_ニ於テ誤_ラ致_ス故ニ大陽病_中ニ就_テ其邪深者_ヲ傷寒ト_シ淺者_ヲ中風ト_シ深々

淺_カス其中間ニアル者_ヲ大陽病ト_ス也曰何_ヲ以證_{トス}ヤ答曰經文曰大陽病發熱汗出惡風脉緩者名為中風又曰大陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脉陰陽俱緊者名曰傷寒_ハ是大陽病内ニテ如此_ハ名_テ中風ト_シ如此_ハ症名_テ傷寒ト_シ義_ヲ明_シ也且篇中中風_ト稱傷寒ト_稱シ又大陽病ト稱_シ其症各淺深同カス主方_モ亦各同カ_ス中風傷寒大陽病ト分別_ス明_シ也

又問曰大陽病_ハ發病_ハ云_フカ_ラ中風傷寒_ノ發病_ハケレキト云ハ何_ヲ以證_{トス}ヤ答曰中風傷寒_ハ其發病_ノトキ發熱_ヲ以主_トハケレキ也_ハ是_ヲ除_ク外頭痛_ヲ以主_トシ發熱惡寒項背強_ヲ以主_トシ發熱惡風或其症前後_ニ至_リ其發病緩_{ナル}者皆大陽病也經文中風傷寒_ハ發病_ハ發熱_ヲ以主_トハケレク大陽病_ノ發病_ハ

ユルヤカナルヲ知シシトス故ニ太陽病ノ總目章姑發熱ヲ畧シ惡寒ノミヲアケテ人ヲ此意ヲ知シル也是其明證也然ニ太陽病モ亦發熱ヲ以其本症トスコトニ其發病ノトキユルヤカニ必シモ發熱セザルノミ故ニ太陽病總目章姑發熱ヲ畧シ惡寒ヲアゲテ下章於テ始テ發熱ヲアル此意ヲ明シカタメ也

又問曰中風傷寒ノ發病ニ急シハケレ其中ニ就テ中風ハ少ク緩シ淺傷寒ハイヨイヨ急シハケレ又深ト云何々答曰中風總目章曰發熱汗出惡風脉緩是其文甚緩也傷寒總目章曰或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆是其文甚艱澁也中風ハ其脉緩ト云イ傷寒ハ其脉陰陽俱緊ト云亦是中風ハ太緩傷寒ハ太急トハケレキ也又桂枝湯中風章曰啻啻惡寒淅淅惡風翕翕發熱ト其次章曰太陽病頭痛發熱汗出惡

風ト是中風ハ太急トハケレ太陽病ハ太緩也此四章ヲ通觀スルニ其總目ニ章ハ傷寒發病ノハケレキヲ明シ欲ス故ニ中風ノ緩ト示ス其桂枝湯ニ章ハ太陽病ノ緩ヲ明シ欲ス故ニ中風發病ノハケレキヲ示ス畢竟傷寒中風其發病ニ急シハケレキ也但中風ハケレキトイハレ緩也然レ太陽病ニ比シハ甚ハケレキ也又中風總目章曰發熱汗出惡風脉緩ト是其言極テ平淺シ其症ノ易ヲ明シ欲スル也傷寒總目章或已ト云或ハ未ト云又必スト云是其言キワテ艱澁ニ傷寒其症深重ナルヲ明シ欲スル也是太陽病中風傷寒發病ノ別也

太陽病及中風傷寒合シテ云ハ太陽病也故ニ中風傷寒ハ冠ムラシムルニ太陽病ヲ以テ而頭項強痛而惡寒者ヲ太陽之為病ト云テ總統ノ言ヲ中風傷寒ヲ其内ニコム是中風傷寒ハ太陽病所

ニヤム寸ハ中風モ亦頭痛ス者アリ傷寒モ亦頭痛ス者アリ傷寒モ亦惡風アリ中風モ亦惡寒アリ中風傷寒モ大陽ノ場所ニヤム寸ハ大陽ノ症アルモトヨリ其少也凡大陽病ト稱ス者頭項強痛ヲ本トシ其始發病ノトキ緩也其邪深者アリ淺者アリ又一再發汗而後陰症ヲ見ス者アリ又漸々陰症ヲ見スアリ又終々陰症見サルアリ中風傷寒ハ發熱ヲ以本トシ其始發病ノトキ急ニバケレ然レ中風ハ其邪淺易傷寒ハ深甚故中風ハ其發病ハケレトイヘ根據ナレ傷寒ハ其發病ハケレシ其邪モ亦根據ヲカレ故ニ傷寒發病緩タルニ似タル者トイヘ其邪ノ根據亦カレ故ニ中風ハ太表桂枝ノ症ニ始リ麻黃大青龍湯ノ症ニ終ル故ニ中風ハ始陽明ノ症ヲ帶ル者ナレ故ニ終々陰症ヲ帶ルナレ故ニ中風發病ノトキハケレトイヘ其邪反テ淺レ傷寒ハ麻黃大青龍湯ノ症ニ始リ白虎湯ニ至ル其發病ノトキ已ニ陰症ヲ

帶ル者アリ又漸々陰症ヲ帶者アリ又始終陰症ヲ帶サル者アリ然レ始終陰症ヲ帶ル者甚少何トナレ其發病ノトキ已ニフカク陰陽二症ノ交ニ處スルヲ以故也故ニ苟モ治法ヲアヤレハ必死症ニ至ル是傷寒ノ治法詳ナラキタラレユエ也故ニ此篇中風ノ名ヲ建ルハ其疑似ノ者ヲ辨明ノ傷寒ノ治法ヲ審テ誤ルナカラシムル也是中風ノ名ヲ建ルハ其意專傷寒ノ症ヲ別ツアリ是立言ノ本志也然レ傷寒ノ症其變最多シ審スヘカラス故ニ此篇大陽病及中風ノ症ヲ詳ニ舉テ其疑似ヲ辨別シ是ヲ除外多クハ是傷寒ナルヲ知ラレム故ニ大陽桂枝ノ症ヨリ大小青龍湯ニ至テ終々傷寒ノ正症ヲアゲガレハ其要スル所學者ヲ其真症ヲ開悟セシムルニアリ故ニ熟思スル者非サハ其趣ヲ窺フアタハス是傷寒ノ大節忽忽畧ニスヘカラス然レ大陽病ト稱ス者及中風傷寒モ大陽ノ場所ニヤム故ニ其症相

似者多分別シカタレ故ニ其論列スルヲ考ヘ其發病ノ類ヲ舉
テカリニ名目ヲ立テ作者ノ本志ヲ發明ノ以學者ニ示ス

大陽病四症

一正大陽病 頭痛項背強^{コウハイコウ}ヲ以本^ホ發熱汗出惡風^{スル}者是
大陽ノ正症^ギ疑似^{ナキ}者也

二浮大陽病 頭痛ヲ以本^ホ發熱汗出惡風^{スル}者又項背強^{コウハイコウ}ヲ
以本^ホ發熱汗出惡風^{スル}者此二症^{モトモト}最大表^ニアリテ中風ニ疑似
スル者也

三中大陽病 項背強^{コウハイコウ}テ凡^ニ發熱汗出惡風^{スル}者浮大陽病
比^{スレ}其症深キ一^ニ等者也

四深大陽病 頭痛ヲ以本^ホ發熱惡寒^シ身疼腰痛汗ナク喘^{セン}
者又頭痛ヲ以本^ホ發熱惡寒^シ骨節疼痛汗ナク喘^{セン}スル者

此二症深大陽病ヲ傷寒ニ疑似スル者也

中風五症

一浮中風 發熱惡風ヲ以本^ホ其惡風^{セキセキ}漸^シ其發熱翕翕^{キウキウ}
鼻鳴汗出其脉陽浮^シ陰弱^{ナル}者也

二中中風 啻^{シヨクシヨク}啻^ト惡寒^シ翕翕^{キウキウ}發熱^シ汗出乾嘔其脉
陽浮^シ陰弱^{ナル}者浮中風^ニ比^{スレ}其症深キ一^ニ等者也

此二症正中中風ニ疑似^{ナキ}者也

三深中風 翕翕^{キウキウ}發熱^シ漸^シ惡風頭痛身疼汗ナク
喘^{セン}脉緩^{ナル}者アリ翕翕^{キウキウ}發熱^シ啻^{シヨクシヨク}啻^ト惡寒頭痛骨節
痛汗ナク喘^{セン}脉浮緩^{ナル}者此二症^{モトモト}深中風^ニ傷寒ニ疑似
スル者也其傷寒^ニ異^{ナル}者其脉浮緩^{ナル}然^レ其治法ヲ
施^{ホト}ス及^テ傷寒^ト中風^ト問^トス其見症^ニ隨^テ其方^ヲ處^{スル}也

四疑中風 發熱惡寒汗出^{イダ}身疼^{イダ}但重^{ヲモク}忽輕^{シキ}時^{アリ}有^リ脉浮緩^{ハル}者也是其熱半^ハ發^{ハツ}半^ハ伏^{ハツ}者也故^ニ疑^キ中風^{トス}傷寒^ニ疑似^{スル}者也

五伏中風 發熱惡寒汗^ヲ發^シ汗出^ス煩躁^{ハシソウ}脉浮緊^{フキギン}者也^ニ是其熱皆伏^ス者也故^ニ伏中風^{トス}傷寒^ニ疑似^{スル}者也此二症^ハ權時^ノ法^ヲ以^テ發^ス之^ヲ而後^ニ是傷寒^カ是中風^カ知其方^ヲ處^{スル}者也

傷寒六症

正傷寒 或已^ス發熱^セ或^{イマ}未^ダ發熱^{セズ}必惡寒^ニ體痛^ヲ嘔逆^ヲ脉陰陽俱緊^ニ者是其症已^ニ大陽極深^ノ地^ニアリ然^レ純陽^ニ症^ニ陰症^{ナク}傷寒中^ニ於^テハ深^{カラ}ナル者^ニ傷寒^ノ正症也

二淺傷寒 發熱惡寒身疼腰痛脉緊汗^{ナク}喘^{スル}者此症

汗^ヲ發^シ汗出^ル者也此症正傷寒^ト淺深^{アル}非^ス但深大陽病^ニ疑似^{スル}ヲ以^テ別^テ淺傷寒^ト亦正傷寒^ノ一類也

三深傷寒 發熱惡寒脉浮緊汗^ヲ發^シ汗出^ス煩躁^{スル}者是^ニ發^シ而後^ニ深傷寒^{ナル}ヲ知也其熱^ハ前症^ニ比^シ深^キ一等深中風^ニ疑似^{スル}者亦正傷寒^ノ正變也

四伏傷寒 發熱惡寒脉浮緩汗^ヲ發^シ汗出^ス身疼^ス但重^ク乍輕^キ時^{アル}者亦汗^ヲ發^シ而後^ニ伏傷寒^{ナル}ヲ知者也其熱皆伏^ニ疑中風^ニ疑似^{スル}者也

五陽脉傷寒 脉浮發熱惡寒體痛自汗出小便^ハ數^ニ煩微惡寒^ヲ脚攣^ヲ急^{スル}者也是陽脉^ニ陰症^ヲ帶^ル似^ル者其症輕^キ似^テ大^ニ重^キ者也

六陰脉傷寒 脉微弱發熱惡寒身疼痛汗出^ル者是陰

脉陽症ノ者其症亦輕ニ似テ大ニ重者也

右大陽病四症中風五症傷寒六症皆常ノ症也其變症至
テハ舉テツクスヘカラス其治療ノ法三種ニカワラス其見症隨テ治
方ヲ施ス故ニ大陽病ノ方中風ニ施シ中風ノ方傷寒ニ施スヘシ
其論皆各方ノ下ニ備フ

右大陽病及中風傷寒ノ發病淺深輕重併帶陰症カクノ如ク又
少陰表症惡寒發熱及脉沈者麻黃細辛附子湯ノ症右三
種ノ發病トミキヤスレ此症傷寒帶陰ノ症ト附子ヲ用ニ非ハ救ヲア
タハス然ルレ古今ノ医書コレヲ症ヲ細ニ論セスアマスサヘ感冒ノ一門ヲ
タツユレ因テ凡外邪ノ發病惡寒惡風頭痛發熱等ノ症アル者ス
ベテ敗毒散十神湯香薷散ナリノ發散ノ輕劑ヲ用ユ純陽ノ輕症
幸ニ愈トイエ其重症ハ大病ナル況帶陰ノ傷寒ト少陰症

死症至ル者多シ又近世古方ヲナルニヨリテ右ノ發病ニ桂枝麻
黃葛根香龍湯ヲ用トイエ傷寒論ヲ讀コクワカラス仲景氏
ノ規矩法度合テ故誤リヲトル多シ況マ帶陰ノ傷寒ト少陰ノ表症
トニ用レハ必難治ニ至ル此二症慎重スヘキノ第一也其病家ニ於テハ
モトヨリ發病ノ内ニ重症アルヲ知ス或ハマフ医ニカセ或ハ賣藥ヲ用或
ハ藥ヲ服セサル數日是以大病トナリ又ハ死症ニ至ル多シ古人ノ
曰禍人ノ勿畧ニル所ヨリ生ストステ人々大事ニスルハアヤキハナ
キモノ也是ホトノハタカノ知レタ事トソニスル所ヨリ大キナル過ハ生スル
也況マ大病ニテモ發病ハカキモノ也必勿畧ニスヘカラサル也凡大病ニ至リ
テハ医業祈禱心カ金錢ヲツクストイエ其益ナレ但發病輕症ノ
トギニ心ヲ用ヘキ也予此書ヲ著スノ山野ノ医人ト病家トノタメ也中
就病家告テ此事ヲ肝要トス

傷寒一日。太陽受之。脉若靜者。為不傳。頗欲吐。若躁煩。脉數急者。為傳也。

傷寒一日大陽受之ヲツモンチツロシ素問熱論二日大陽二日陽明三日少陽四日大陰五日少陰六日厥陰ケツ一經ケイヲ一日ツニワリ付ケタル説アリ一日二經ツ病ヤシテ六日ニテ六經盡ツキテ病イユルモアリ若病盛サカニナレ七日メニ大陽ニカエリテ病ト云フアリ故ニ一日大陽受之ヲ云也脉若靜者ナル為一不傳ト脉靜ル者ハ病イユル也故ニ二日メノ陽明ヘ傳ル也頗欲吐セントソツ若躁煩ソツハシ脉數急者サソキツル為傳也頗ハヨホト也躁ハサワク也煩ハ胸イキレクルシム苦也言ハ病人頗吐セントスルキミアルカ又ハ胸ムネイキレクルレミ苦アガキサワギ脉ガズアリテ急ナルハ病邪サカン也故ニ二日メニ陽明ヘ傳ル也此章ハ後人ノ偽章ニテ仲景氏ノ正文ニ非ス故ニ素問ノ説ヲ本編ノ例ト合ス

傷寒二三日。陽明少陽證不見者為不傳也。

此章モ前章ノ意ニ後人ノ偽章也此二章ハ素問傳經ノ說ニテ
本編ハ大ニ劣リ本編大陽中風ノ症ニ乾嘔アリ傷寒ノ症ニ嘔逆
アリ皆發病ノ症也又中風ノ症ニ煩躁アリ又大陽病ハ盛熱ツ症
ナハ其脉多^サ數也右ノ諸症本編ニ於テ皆治法アリテイタ陽明少陽
傳^トセズ又本編ノ法併病^ハ或ハ大陽陽明或ハ大陽少陽二部ノ症始
ヨリ併^ナラユル者也其他大陽ヨリ陽明少陽ニ傳ルハ三四日四五日或ハ
八九日及^フテ二三日ニテハ傳^モヘサルモイヘタ知^シヘカラス今日病
人ニテ試^ムルニ皆然リ況ヤ一日ニ一經ツ傳ルハナレ素問ハ五行ノ理ニテ
クミ立タルモ^ノ故ニ事情^ニアタヌ^フ此類多シ傷寒論ハ病^ニテクミ
立タルモ^ノ故ニ皆事情^ニヒレ^クトアタリテ素問ハ大ニ異也凡上一字
ヲアケテカコミノ内ニ書タル後人ノ加ヘタルニテ仲景氏ノ正文ニ非ス

大陽病發熱而不渴者為溫病若發汗已身灼熱者名曰風溫風溫為病脈陰陽俱浮自汗出身重多眠睡鼻息必鼾語言難出若被下者小便不利直視失溲若被火者發黃色劇則如驚癇時瘵瘵若火熏之一逆尚引日再逆促命期

溫病冬寒傷之病傷寒也寒毒肌膚カクレテ春ニ至テヤマラ温病トシ夏ニ至テヤムヲ暑病トモ云也コレハ素問ノ説也灼ハ熱也脈陰陽俱浮ハ陰陽ハ尺寸也説總論アリ鼻ハ鼻息ノ多カキ也被下ト下之也直視目ヲ見ツメル也失溲ハ遺溺也小便ノヲボエナキ也被火ハ火ニテアタメテ汗ヲ發スル也微發黃色ハスコシ黄疸色ナル也如驚癇ハテカン也瘵瘵ハビクヒクト引ツケル也火熏之ハ火ニテアタメテ一逆ハ一度逆治スル也ヨキ療治ヲ順治ト云リ療

治ヲ逆治ト云引貝永ビク也命期ハ其人ノ命數也促ハヤメル也言ハ大陽病發熱ノ口カキサムケナキハ温病ヲ傷寒ニ非ス若發汗以後熱反強キ者ハ風溫ト名風溫症脈尺寸浮汗自出身重多子リ鼻息多ク語言出カ多ク若之ヲ下セハ津液ヲ亡ン小便利セヌ又目ヲ見ツメ遺溺ス若火ヲ以テアタメテ汗ヲ發セトスハ火ニ火ヲ多カ如テ汗ハ出ス熱△レ立テ黃疸ナル又益甚キテカン如ク時々引ツケ又火ニテアタメハ遂ニ死症トモ故ニ一度逆治スル其病永ヒ再ヒ逆治スル死期ヲハヤメル也

本編六部ヲ立テ陰陽表裏變化逆順ヲ辨明スル總論述如レ故ニ六部及中風傷寒外ニ病名ヲ立ツル然ル此章温病ヲ舉フ本編ノ例ヲ知サル人ノスル所也又本編ノ例傷寒中風ハ四時ニ通ス名也冬ハ傷寒春ハ温病夏ハ暑病ト云素問ノ例也且今

時疫ト云俗問ノ名也實ハ皆傷寒也

病有發熱惡寒者發於陽也。無熱惡寒者發於陰也。發於陽者七日愈。發於陰者六日愈。以陽數七陰數六故也。

病人發熱惡寒者風衛ヲマフツ中風トス風陽也衛モ亦陽也故陽發トス惡寒シ熱ナキ者ハ寒榮ヲマフツ傷寒トス寒ハ陰也榮モ亦陰也故陰發トス陽ノ數ハ七陰ノ數ハ六故ニ七日六日愈ト是ハ素問五行說也本編ノ例ハ三陽三陰ト脉症トヲ以陰陽別ツ是ハ風寒榮衛ヲ以陰陽ヲ別ツ三陽三陰ト脉症ト事實ニ手取ヘシ風寒榮衛空理ニ手取ヘカラス學者孰思スヘシ大陽病頭痛至七日以上自愈者以行其經盡故也若欲作再經者鍼足陽明使經不傳則愈

素問ノ例六經各一日ツ病テ六日六經盡故ニ七日以上至其

病イユ若イエサハ其邪七日ニ大陽カエリ又六經ニ傳是ヲ再經ト

云故ニ二日ノ足ノ陽明ニ鍼スハ其邪退テイユ是六經一遍スミテ

又始カエリト影迴ノヤウナル也世間此病アルヲ聞ス

大陽病欲解時從巳至未上

素問ノ例六經各其旺時ヲ以其病解トス大陽ハ巳午未ニ旺スル

故也是五行生旺イ本編ニ此說ナシ

風家表解而不了了者十二日愈

風家トハ中風ヲヤム人ト云フ也不了了トハサツリトセスト云フ也十二日

ハ六經ニマワリ也一マワリニテ病邪退キ又一マワリニテサツハリトス也

是モ素問ノ義也

病人身太熱及欲得衣者熱在皮膚寒在骨髓也身太寒及不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也

ノ發病ヲ舉故ニ其ハケレキヲ明ス是作者大ニ意ヲ用ル所也凡中風
 發病シ其鼻中ツリテ鳴咽喉和セバ此症アリテ或ハ發熱惡風
 汗出者及惡風汗出者及發熱惡風汗出者及惡寒惡
 風發熱乾嘔者皆下利腹脹ナリ裏症ナキ者也モ此症裏
 症アリテ又或ハ項背強リテ而鼻中鳴咽喉不和ノ症ナキ大陽病ヲ中
 風ニ非スイカトナレハ中風ハ大表症ナル故ニ裏症ナキハツ也モ中風
 ニ裏症アレハ表ト裏ト其病モト各別ニ一病ニ非ス故ニ其治法モ
 表ト裏ト別ニ方ヲ施ス也其法下ツミラカ也

桂枝湯

桂枝^三 芍藥^三 甘草^二 生薑^三 大棗^{十二}

右五味以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升
 服已須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許遍

身熱熱微似有汗者益佳不可令水流漓病必不除若一
 服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不
 汗後服小促其間半日許令三服盡若病重者一日一夜
 服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出者
 乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭惡等物
 吹咀口中ニテ茶種ヲカミクタク細ニスル也古ハ小刀ナキ故ニ口中ニテ
 カミクタクシ也遂ニ名目字トナテ後世ニテハ刀ニテキサムイ也微火ハ
 ソ火也適寒溫病人ノ飲カケヨキホトニスル也須臾ハシラク
 也熱稀粥ハウスキ粥ノアツキ也溫覆ハ卧具ヲ多クキテアタカニ
 ヲオウ也熱熱ハ小雨ノスル白ニテ汗ヲスコシ出也流漓ハ水ノ流
 白也周時ハ一時也一日一夜服ノ一時ホト茶ヲマテ容子ヲ見也生
 冷ハナナル物ヒエ物粘ハ子バル物滑ハナメラナル物肉ハ鳥獸魚肉麵ハ

此方ハナレ息惡ハワルクサキ物也右服已ヨリ以下ハ文章議論ニ本
編ト大異也後人ノ偽作也然レ服法禁物ハ此法ヨリテヨシ

凡桂枝湯ノ主所ハ外邪大表ニアリテ汗出脉浮弱ナル者ヲ目アテトス
也故ニ中風頭痛發熱汗出惡風ヨリ惡寒惡風發熱乾嘔
至レテ其症淺深アリトイエ氏汗出脉浮弱ナル者皆桂枝湯ノ主
所也モレ右ノ症ニモ脉浮緊ニ汗出サル者ハ麻黄湯ノ症ニ桂枝
湯ノ症ニ非ス又右ノ症ノ上ニ腹痛下利或ハ腹脹ナトノ症アル大陽
病ニ中風ニ非ス然レ汗出脉浮弱ナル者ハ桂枝湯ニ葛根ヲ
加テ與ル也モレ此症ニ汗出ハ桂枝湯ノ症ニ非ス葛根湯ノ
症也トカク桂枝湯ハ汗出ルト脉浮弱ナルヲ目アテトス也故脉浮緊
發熱汗出サル者ハ與フカラサル戒アリ且其汗出ルト云ハ頭

痛發熱惡風惡寒ノ汗出也又身ハ多クハ汗出又ハ少キ物ヲ食ス
レハ汗出又ハ暑氣時汗出ノ類也故ニ桂枝湯ハ汗ヲ發スル方ニアス
肌ヲ解ス方也肌ヲ解スルト云淺ク肌ニ入所ノ邪ヲ解ノ深ク肉中ニ
入タル邪ヲ發スル方ニ非サル也故ニ桂枝湯ヲ服スル法桂枝湯ヲ服
其上ニアルキ粥ヲスリテ卧具ヲ多クシテ汗ヲ發スル其病愈ル也又
桂枝湯ハ表ヲ和ス方也微邪アルカ為ニ肌表和セズ故ニ桂
枝湯ヲ与テ邪ヲ去リ表ヲ和スル也ヒツキウ和スルト云モ肌ヲ解ス
ルト云モ同シフニテ淺キ邪ヲ解ス也然レ後世ニテ風邪トイテ汗出
脉浮弱ナルモ汗出ス脉浮緊ナルモ問ス一概ニ敗毒散十神湯香薷
散ノ類ヲ与ヘ實症ナル人ハ自然ト陽氣發メ愈ルトイエ氏虛弱
ナル人ハ是ヨリ變症ヲ生ズ者多クイカトナレハ敗毒散ハ涼藥多
外ニ方ハ行氣ノ藥多ク專ラ發汗ノ方ニアス又解肌和表ノ方ニモ

アヲサレハ也學者深ク考ヘシ又汗出ルモ種々アリ陽虛ノ人ニ誤テ
發汗ノ方ヲ與テ汗出テ止サル桂枝加附子湯ノ症也又大汗
出テ遂ニ亡陽スル真武湯或四逆湯ノ症也又故ナク汗モレテ
止サル漏汗ノ症也コレヲ症ニ桂枝湯ヲ与レハ死症トナル慎ヘシ
凡某方ヲ解スルハ其方主ル所ノ場ト其症本タル所ヲ審ニ知ル肝要也
然タ吳崑カ方考ノ説ノ如ク麻黃ハ汗ヲ發シ芍藥ハ榮衛ヲ和スル
一味ニ能ヲ論スルクワシキニ似タレ實ハ某方ノ妙處ヲ知ルアタハス
カトナレ藥種ヲアツテ方ヲ立ル文字ヲアツテ詩ヲ作ル如クタイ
文字ノ義理ヲ一ニキワムルハ詩ノ意味ヲ知ルアタハス故ニ詩ヲ解スルハ
題意ヲ審ニ其情致ヲ迎ヘ知ニアリ方ヲ解スルハ其主ル所ノ場ト其
症ノ本タル所ヲ審ニ知ルアリ其場ト云ハ桂枝湯ハ大表ヲキリ葛根
湯ハ同症ノ場ヲ主ルノ類也間症ノハ葛根湯ノ下ニ見ヘリ

其症本タル所ト云桂枝湯ノ症ノ汗出脉浮弱麻黃ノ症ノ汗出ス脉浮
緊ノ類也傷寒論中ノ方ハ皆此主意備テ勿論也後世ノ方ニモ皆備
サレテ學者ヨク此意ヲ會得スル方ヲツカフノ變化自在モ自然ト出テ来
ルニ豈タ方ヲツカフノミナシヤ病ヲ診スモ此道ニ外ナスイカドナレハ凡病ハ
本症傍症ノ差別アリ故ニ病人ニノミ只其本症ヲヨクトシテ得テ傍症ノ
タメニ或ニサレテ肝要トスル也

大陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之

此章ハ大陽病ノ輕症ニ全ク中風ニ同キ者也頭痛發熱汗出惡風
ス者其邪大表ニアリテ桂枝湯ノ主ル所ノ場也故ニ中風ニ非ストイエ
桂枝湯ヲ用ル也仲景氏方ヲ使ノ道其病ハ異ナリトイエ其場ト其
症ト同キハ一方ヲ以治スルヲ見ルニ中風ハ桂枝湯大陽病ハ葛根湯
傷寒ハ麻黃湯ト柱ニ膠ニ瑟ヲ鼓スルノ類ニ非ス凡其病大表ニアリ

テ頭痛發熱汗出脉浮弱此症ハ萬病皆桂枝湯ヲ用テヨシ大陽病中風治法ノ別ハ下ノ章ニ見ヘタリ

大陽病項背強凡凡反汗出惡風者桂枝加葛根湯主之ヲ

此章ハ前章ヨリ一等深者也項ハウナキ背ハセナカ也凡凡項背ノ強自由ニ首ノマツル也反テ汗出ハ項背強テ凡凡法ニ於テ其邪頗フカレトス然レハ汗出ベカラサル者也而ノ今汗出故ニ反ト云也言大陽病項背強凡凡本ト及テ汗出惡風者ハ大陽病ノ前章ノ大表症ヨリ一等フカキ者也故ニ桂枝加葛根湯主之也

桂枝加葛根湯 桂枝湯加葛根二兩餘同本方

此方桂枝湯ニ葛根ヲ加ル者也故ニ其本症桂枝ノ症ノ如ク汗出惡風者又頭痛發熱汗出惡風ノ症アリテ其上項背強ル者ヲ目アテトス也又右ノ症アリテ下利ノ裏症アル者モ主之ヲイカントナハ其下利表

邪ハ反ス可也故也又桂枝ノ症ノ如ク下利アリテ項背強ルノ症ナキ

モ亦與フヘシ又桂枝ノ症似トイヘ惡寒惡風汗ナク項背強テ凡凡又下利者此方ノ症ニ非ス葛根湯ノ症也汗ナク惡寒アル其症フカク桂枝湯ノ場ニ非ル故也

大陽病及中風治方ノ別中風ハ陽浮陰弱熱自發汗自出ノ淺症ヨリ惡風惡寒發熱乾嘔ノ深症ニ至テ苟汗出者皆一桂枝湯ヲ以テ主之是ヨリ深症ハ直ニ麻黃湯ヲ以テ主之也大陽病ハ其最大表ニアル者桂枝湯主之又其深ト一等者桂枝加葛根主之又其深ト一等者葛根湯主之又其益深ト一等者麻黃湯主之ヲイカントナハ大陽病ハ其症一轉ニ深者其邪モ亦一轉ニ深シ故其治法症ニ隨テ移也中風ハ獨表熱ヲ主トス故ニ汗ノ有無ヲ以テ其治方ヲウス是其表熱ヲ解スルニ是

大陽病及中風治法ノ別也

大陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法若不上衝者不可與之

大陽病頭痛發熱汗出惡風或頭項強痛惡寒者云其氣上衝ハ氣腹中ニテ胸サキツキ上ル也用前法ハ桂枝湯ノ服法ヲスリ温覆ノ汗ヲ出ス云言ハ大陽病表症ノ者已發散ノ方ヲ用テ表症解セス其表症解セサル腹中和セサル故也故ニ是ヲ下ス是ヲ以腹中サワキテ氣發テ衝上ス其氣衝上スハ表症ノ解セサル故也故ニ夕桂枝湯ヲ用テ粥ヲスリ温覆ノ汗ヲ出スハ若衝上セサル者ハ與フヘカラスト也

此章本編治例知悉者也大陽病表症アル者ナイ腹中下スハ症アリハツ表症ヲ解ノ而後下スハ表ヲ解セスミツ下スハ表

熱更入益大病ト是一定ノ仲景氏ノ大法也然レ表ヲ解セスノ先下ス故ニ下ルトイエ表症解セス又腹中サワキテ氣發テ衝上ス也而医又此氣衝上ス下ス因テ致ス可ナラ知ス及テ表症解セサル致ス所ト復桂枝湯ヲ與フ温覆ノ汗ヲ出サト是本編ノ治例ヲ知サル者也イカトナレハ桂枝湯ハ大表症ヲ主ル方ナ裏症ヲカチ治スル方ニ非ス故ニ氣上衝ル者ニ用ル桂枝湯ノ主ル所ノ場ヲ知ラサル者也ニハ桂枝湯去芍藥湯ノ症也

大陽病三日已發汗若吐若下若温鍼仍不解者此為壞病桂枝不中與之也觀其脉證知犯何逆隨證治之桂枝本為解肌若其人脉浮緊發熱汗不出者不可與也常須識此勿令誤也

大陽病三日已發汗ハ汗ヲ發ス法始發病ノ日ニツ其汗ヲ發シ

若其症解^{セカハ}明日再汗^{アツキ}又解^{セカハ}明日二^ニ其汗^{アツキ}發^ス已^ニ三日汗^{アツキ}發^ス本症^{ナラ}解^{セカハ}者^ハ表症^{アリトイ}エ^ニ其^ニ大陽^ノ表^ニ症^ニ非^ス他症^{アル}者^{ナリ}子^ニゴロ^ニ其脉^{症ヲ}見^テ治法^ヲ處^スヘ^ニ變^シ症^ニ至^テ日數^ニカ^ハフル^{ナク}汗^ヲ發^スル^モアレ^ニ先^ニ三日^ヲ定^メ法^トス^故ニ三日^已發^汗ト云^也若^ハ吐^シ若^ハ下^ス表^ヲ解^スハ汗^ヲ發^スヨリ外^ハナレトイ^エ氏^{病人}胸^{中ノ}症^{アル}其^{タメ}汗^ノ出^{サル}アリ又腹^{中ノ}症^{アル}其^{タメ}汗^ノ出^{サル}アリ故^ニ其^{症ヲ}審^カ若^ハ吐^シ若^ハ下^ス也若^ハ溫^鍼ハ寒^ハ多^ク發^散ス^ニ鍼^ヲア^タメ^テ刺^ス也發^汗ノ藥^ヲ與^テ汗^出故^ニ又溫^鍼ヲ施^ス也壞^病ハ壞^ハクル^也治法^ヲ誤^リテ變^シ症^トナル^ハ藥^ヲ以^テ本^{症ヲ}ツ^キク^ス也故^ニ壞^病ト云^也言^ハ大陽^病表^症三日^已汗^ヲ發^シ解^セ或^ハ胃^{中ノ}症^{アル}故^ニ解^セト^モ吐^シ或^ハ腹^{中ノ}症^{アル}故^ニ解^セト^モ是^ヲ下^ス或^ハ寒^冷ノ症^トノ

溫^鍼ヲ施^シ其法^皆的中^{ナリ}其^症解^セ又右^ノ發^汗吐^下溫^鍼ノタ^メニ其^症變動^ノ種^々ノ^症出^来テ其^本症^消ス^ル何^ノ症^氏名^狀ス^ハカラサ^ル者^トナル^是發^汗吐^下溫^鍼ノタ^メニ其^本症^ヲ撫^クス^也是^ヲ壞^病ト云^也カク^ノ如^ク者^タトイ^挂枝^湯ノ症^{アル}似^レ挂^枝湯^ヲ與^フハカラサ^ル也中^ノ可^ト同^ニ不可^レ與^也觀^其脉^證トハ其^壞病^ノ脉^ト病^ト觀^也觀^ノ字^ハ諦^觀ノ義^ニテト^クツ^ツヒ^カニ見^ル也ザ^ツト^一通^見ル^ニ非^ス知^ル犯^何逆^トハ逆^ニ治^也脉^症ヲ誤^リ見^テム^リナル^癢治^ヲ施^シ變^シ症^出来^テ大^病トナル^云是^ハ汗^逆カ^吐逆^カ下^逆カ^溫鍼^逆カ^何ノ逆^ヲ犯^ス此^壞病^{ナリ}タル^ト知^也隨^證治^ス之^ハ其^證ノ陰^陽表^裏隨^テ治^ス也凡^大陽^病ノ壞^病其^變症^ヲ見^ス者^純陽^ノ表^症分^テ三^等ト^ス曰^大表^症挂^枝湯^ノ主^所也曰^間症^葛根^湯ノ主^所也曰^裏症^麻黃^湯ノ主^所也表^間併^症アリ表^裏併^症アリ表^多間^少アリ表^少裏^多アリ表

問裏ヒトキアリ又陰陽ノ症ヲ見スリ陽多ク陰少キアリ陽少陰多キアリ陰陽
ヒトキアリ故ニ其脉ト症トヲ諦ニ觀サハ其真症ヲ得ルカタシ忽略ニスヘカサル也且
大陽病ノ逆治ヲ舉トイモ凡萬病治法皆三言ニ盡（蓋）醫書萬卷ヲ讀ミ其
守ル此三言ニ過（ス）イカントナハ凡萬病ノ治法ニツ其症陰陽表裏上
下淺深ヲ觀又其脉ノ陰陽表裏ヲ觀而後ニ其病因ヲ定メ其本症
傍症ヲ分チサテ其純陽カ純陰カ陰陽ヒトシキカ陽多陰少キカ陰多
陽少キカヲ定メ其上ニ仲景氏ノ治法ト其處スル所ノ藥方ノ主治スル
所トニ照シ合セテ決斷スル也今此文ヲスカニ三言トイモ其法モルコナ
シ學者ヨク傷寒論ヲ熟讀シ此道ヲ得ルハ萬病ノ治法ニ於テ過スナ
カルニ是其言周悉全備（イ）醫聖ノ稱アルユエニ也初學慎テ三
復スニ桂枝本為解肌ナリト桂枝湯ハモト肌表ノ邪ヲ解スルモノ
方也深症ノ邪ヲ解スル方非也若其人脉浮緊發熱汗不出者

不可與也（ハ）脉浮緊發熱汗不出者是傷寒ニ麻黃湯或ハ
大青龍湯ノ症也且深症トス大表桂枝ノ症ニ非スモ誤テ桂枝
湯ヲ与ヘ六字ヲナス必不可與也常須識此勿令誤也（ト）識此ヲトハ
眼知也心知也眼ニ其症ヲ見テ汗出サレ者ヲ知リ心ニ其脉ヲ審ミ
浮緊ノ者ヲ知テ必桂枝湯ヲ與テ誤治スルナカレ若誤治スル及テ
病ヲ深カラレ也近年古方家ノ曰凡病因ヲセサスルハ後世事也
仲景氏ノ法非ス故傷寒論曰隨證治之（ト）アリ故ニ熱アレハ熱ヲ治シ
寒アレハ寒ヲ治シ腹脹ハ腹脹ヲ治スト云（リ）此言醫術ニ大害アリ且傷
寒論ヲ熟讀セサル過也此章ニ知犯何逆トハ病因ヲ審ニ知ル也大陽
病ノ壞病ナリハ汗ヲ發スル多キ故カ又ハ吐ス故カ又ハ下ス故カ又ハ溫鍼
ノ故カ其變症ノ因テ来ル筋ヲ審ニヨメテ其上ニ其症ノ陰陽表裏ニ
隨テ治ス也モ隨證ハカリナレハ知犯何逆トハ云フニ及ハタリ也コレ壞病

故ニ発汗吐下温鍼ノ逆ヲ以テ云フイエ此意ヲラレヒロメテ見レ凡萬
病ノ病因ヲ審ニス也初学ヨク考ヘ凡萬病證同因ハ異ナル者也
多トハ腹脹ノ病症アル其症皆同ク腹脹ナレ其因ハ積聚アリ血塊ア
リ虫アリ食アリ水アリ故ニツ其脉症ノ陰陽ヲ定メ其因ヲ審シ
テ治方ヲ施也其方大黃芒硝巴豆附子甘遂種ノ藥ヲ用テイエ其
積血虫食水ノ主藥ハ欠ヘカラス桃核承氣湯桃仁アリ大陷胸湯ニ甘
遂アルカ如シ是仲景氏ノ方其病因ヲキワム所也然ルニ今腹脹ノ症
治ス其病因ヲキワス其陰陽ヲ問ス承氣三黃厚朴七物湯ノ類ニテ
下ス胃中虛寒ノ變症生ス豈ヨク其病愈ヘケモ其下スヘキ病症
ハ一概ニ只下スノミナラハ傷寒論ニ大承氣湯一方ニテスヘ何シ三承
氣柴胡加芒硝大柴胡桃仁承氣抵當湯大陷胸湯ナトノ數多ノ方
ヲ立シ是皆病因ヲキワメ陰陽ヲ分テ表裏淺深輕重ノ別アル所也豈

タンド劑ノミナラハ萬病ノ治法皆然初学ヲカク察セヨ



右正文四章ハ大陽病中風治法ノ別ヲ明ス也始ノ一章ハ中風ノ易症ヲ明
其次ニ章ハ大陽病ノ中風ニ似テ最大表ニアル者ヲ明ス其次ノ一章ハ大
陽病ノ最大表ニアル者ヨリ深キ一等ナル者ヲ明ス終ノ一章ハ逆治誤
治ヲ審シ桂枝ノ位地ヲ明ス也是ハ大陽篇ナク其例大陽病ヲ先ニ
舉テ中風ヲ後ニ舉ヘキ也然ルニ中風ヲ先ニ舉ルハ中風ノ症最表
アリテ大陽病ハ中風ニ似トイエ其症ヤ深キヲ明ス也中風ノ治法ハ
表熱ヲ解スル主トス故ニ桂枝湯ニテサハ麻黃湯大青龍湯也大陽
病ハ其地位其症ニ隨テ深シ故ニ主方モ亦其症ニ隨テウツル也末章
逆治誤治ヲアル者ハ桂枝湯ノ位地ハ但解肌ノ為テ發汗ノ劑ニ
非ス故ニ其汗出ル者ヲ主トスルヲ明ス也

若酒客病不可與桂枝湯得湯則嘔以酒客不喜甘故也

酒客上戸ノ也上戸ハ甘菜ヲ好ミ故也然レ大食上戸ノ餅ヲ

喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳

喘家ハセシク持病アルノイ也是ハ喘ノク持病アル人ニ桂枝湯ヲ
與ルハ厚朴杏子ヲ加テ氣ヲ下カヨキト云フニ別ニ意味ナシ

凡服桂枝湯吐者其後必吐膿血也

凡ハスベテ也桂枝湯ハ温菜也故ニ桂枝湯ヲ服ノ吐ル者ハ胸中ニ熱
アル故ニ熱ト熱ト相コバミテ吐ル也又胸中ニ熱アル肺痿也故ニ必
膿血ヲ吐スト云也然レ桂枝湯ヲ服ノ吐ル者モ其因種々アリ
何必ニモ膿血ヲ吐セシ一概ノ言取ニ足サル也

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之

是太陽病頭項強痛發熱惡寒等ノ症アリテ医其汗ヲ發シ其汗ツ
イテ漏テ止ス遂ニ少シ陰症ヲ見ス者也小便難ハ小便通セサルニ非ス通
イテ漏ル也四支ハ手足也微急ハ少シ引ツル也難以屈伸ハ屈ハカ
ル伸ハノベル也人ハカメシカキ也言ハ大陽病表症者医其汗ヲ發シ
其汗ツイテ漏テ止ス其人惡風小便カク手足屈伸シカキハ汗漏
テ止サル故ニ表陽不足ノ和セス故ニ汗出テ惡風ハムハツナルニ及テ惡
風シ小便通シカク手足屈伸シカキ也故ニ桂枝湯ニ附子ヲ加テ陽ヲ
復シ表ヲ和スル也

此症モト帶陰ノ症ナルヲ医察セシ汗ヲ發スル因テ此變症ヲ生スル也
此所テ附子ヲ用サレハ亡陽トナル其上ニ又治法ヲ得サハ遂ニ死症ナル
者多シ凡發汗ノ菜ヲ施スニ其脉症ヲ審テ少シモ帶陰ノ症アル
者ハ慎テ主方ヲ選用ユヘシ

桂枝湯加附子一枚餘同本方

此方桂枝湯ノ表ヲ和スル者ニ附子ヲ加テ陽氣ヲタスル者也故ニ汗多
亡陽ノ汗ツツイテ出テ止ス及テ惡風惡寒手足指頭冷^{ヒエ}脉微ナトノ
症ニ用ユル也黃芪建中湯ニ附子ヲ加リハ大ニサル然レモ此症ニ
下利又ハ吐スル者或手足ヒユル者ハ四逆湯ノ症ニ此方ノ症ニ非ス誤テ
用ク^レ此方ハ但表ノ陽虛ヲタスル方也故ニ汗多亡陽ノ裏症ナキ
者ヲ自アテスル也故ニ痛風ノ症汗出ル者ニモヨレ又大陽ノ表症汗出
脉微^レ陰症ヲ帶ル者ニ活用ス^レ

大陽病下^レ之後脉促胸滿者桂枝去芍藥湯主之若微惡寒
者去芍藥方中加附子湯主之

脉促ハ脉一二来^ミ遲三四来^ミ數^ミナルヲ促脉ト云是表症裏症
^ハノ脉也胸滿^ハ下^ミ因テ客氣上滿^ル也此症大陽病表症ナラ

在^テ而下^ミ之ヲ故ニ腹中空^ミ氣上滿^ル故表症裏症俱ニアルノ促脉ヲ
見^テ表症ナリ在^リ故ニ桂枝湯ヲ用ユ胸中又滿^ル故芍藥ヲ去^ル也若微
惡寒^{スル}者ハ下^ミ因テ虛寒陰症見^テ故加附子^ヲ以陽ヲ復^ス也

桂子去芍藥湯

桂枝湯去芍藥餘同本方

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝湯去芍藥加附子一枚餘同本方

問曰前章桂枝加附子湯此章桂枝去芍藥加附子湯トモニ表虛
ヲ治^ス彼^ハ芍藥ヲ去^スコレハ芍藥ハ何^ノヤ曰カレハ汗大ニ出^ルニヨツテ表陽虛
ス故ニ陽ヲタス^テ表ヲ和^ス主^ス故ニ芍藥ヲサス^ル此ハ下^ミニヨツテ腹中虛
寒ス故ニ芍藥ヲサス^ル是^ハ芍藥一味ノ去留ニヨツテ其主症表裏ニ分^ル
ル也

太陽病得之八九日。如瘧狀發熱惡寒。熱多寒少。其人不可嘔。清便欲自可。一日二三度發。脈微緩者。爲欲愈也。脈微而惡寒者。此陰陽俱虛。不可更發汗。更下。更吐也。面色反有熱色者。未欲解也。以其不能得小汗出身。必痺。宜桂枝麻黃各半湯。

此章三段ニ分テ見ヘシ始ノ一段言大陽病始得テヨリ八九日ヲ寒熱ヲ發スル瘧ノ如ク其熱多シ寒少ク一日ニ二三度ツ發スル是解セシトスルノ兆也且其人嘔セサル心胸中無事也清便自可ナル腹中無事也其脉微テ緩テ其表裏和スル也是愈ント欲スル也中一段言若寒熱ヲ發スルナク其脉微テ惡寒スル者是陰陽俱ニ虛スル也更發汗吐下スラス終ノ一段ハ始ノ段ヲ受ル也言其脉微緩ノ者ハ愈ント欲ストイエ氏然レハ面色及テ熱色見者ハ小汗出ルヲ多ク其故ニ其熱鬱

滯メ解セサル也故ニ其身必スカユニ是其證也桂枝麻黃各半湯ヲ
以少シ汗ヲ發スヘシ

右瘧狀ノ如シト云テ病名ヲ以論スル本編ノ例ニ非スイカントナレハ病名
ヲ以論スル者ハ一偏ヲサトスノミテ全體ヲツクスコトア多ハス本編ノ文ハ至妙
テ無盡ノ病情ヲツクス故ニ病名ヲ以論スルナレ又清便ハ本編ノ例
清穀下利ノコトヲ食物化セテ下ル也此章ニテ清ハ固ノ字ノ義ニテカハ
ヤノコト也是本編ノ字例ニ非ス又清便欲自可コト句突然ト出テ上ヨリ
承ル所ナレ但欲字ヲ去レヨシ疑ヲ去レテ衍文ナシカ又陰陽俱虛ト云表
裏ノコトナレ裏ニ虛スルコトナレ真ノ陰陽ノ義ト云ハ本編ノ義ト合ス又脉
微テ惡寒スル者本編ノ例ニ依トキハ陽虛ノ症也又面色及テ有熱
色及ノ字通シカタシイカントナレハ寒熱如瘧ニ面色有熱色ハ常
コトナレ及ト云ヘカラス若又脉微而惡寒スル者已ニ陽虛ノ症ナリハ

クトイ反テ熱色アリ陽虛ノ治例ニ從テ方ヲ處スレ豈桂枝麻黃各半湯ノ症ヲ皆本編ノ例ヲ知ル也

桂枝麻黃各半湯

桂枝一兩十 芍藥一兩 甘草一兩 生薑一兩 麻黃一兩

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一升八合去滓溫服六合

此方桂枝湯肌解スト麻黃湯ノ汗ヲ發スト合セテ者也故ニ太陽ノ表症頭痛發熱汗多惡風惡寒或ハ身疼腰痛或ハ咳シ脉浮シテ緊オス弱オス者ニ用ヘシキヤウ麻黃湯ノ症ヲカク或ハ虛弱ノ症ヲ目アテトスレ然レ此方及ヒ下ノ桂枝二麻黃一湯桂枝二越婢一湯皆ニ方ヲ合セテ一方トスル者苟且ナラフ其後人ニ出ルヲ知ルヘシ

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府卻與桂枝湯則愈

煩ハイキレ也桂枝湯ヲ服テ煩ニ陽氣溢重シ汗ヲ得テ故ニ麻黃湯ノ位也桂枝湯ハ汗出シ主トス故ニ陽氣溢重ノ症ナレ是方某ノ位地ヲ知サレ也且本編湯藥論建テ鍼灸ニ及ス然ル處々ニ鍼灸ヲ舉ルハ一編ノ主意ニダカク後人ニ出ル者也

服桂枝湯太汗出脉洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧日再發者汗出必解宜桂枝二麻黃一湯

是大陽病表症者桂枝湯ヲ服シ大汗出ストイエトモ其脉洪大者ハ表症仍在者也故又桂枝湯ヲ與フヘシ如前法ト桂枝湯ノ服法熱稀粥ヲスル以下也若形如瘧日再發者汗出必解宜桂枝二麻黃一湯トハ若形如瘧寒熱日再發者餘邪出

トスル也桂枝二麻黃一湯ヲ以汗ヲ發スル愈
桂枝湯愈汗出ヲ以主トイエ凡太汗出ル症ナレ且其脉浮弱或
浮緩者也然レ今桂枝湯ヲ服レ太汗出テ其脉洪大者ハ是
逆治ヲ壞病トナレ也其脉症ニ隨テ治スヘシ然レニ夕桂枝湯ヲ
與ヘ前ノ服法ヲ用テ熱稀粥ヲスリ温覆セズ其變症ハカレハカス是本編
ノ治例ヲ知ラサル也

又本編ノ例ヲ服後ノ變症ヲ舉ル者其冒首本症ト方ホトヲ
並舉テ今ノ脉症ニ照シ合テ學者多其變症ノ由テ来ル所ヲ知テ治法
ノ變化ヲ得セシ能者也所謂冒首トハ大陽病少陽病或中風傷
寒ト章首ニ名ル者也是ヲ舉サレ病ノ大本ヲ知レハカス然レ此章冒
首ヲアケス但服桂枝湯太汗出ト云ノミナレ其本症中風カ大陽病傷
寒カヲ知レハカス是ヲ知ラサレ其變症ノ出ルエニヲ知レハカス

其ユエニヲ知ラサレハ其病因ヲ知ラス其病因ヲ知ラサレハ其
治方ハ處スヘカス故通篇冒首ナキ皆後人ニ出ル者也本編ノ例
ニヨルハ大陽病服桂枝湯又太汗出テ脉洪大者ト云ヘレ
桂枝二麻黃一湯

桂枝	七銖	芍藥	一兩	麻黃	十六銖	生薑	一兩
杏仁	十箇	甘草	二兩	大棗	五枚		

右五味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取
二升去滓温服

此方桂枝湯ノ方多麻黃湯ノ方多キ故前章ノ桂枝麻黃
各半湯ヨリモユルヤカナル方也虛弱人ノ發汗ニ用ユヘシ敗毒散ナ
トノ發散ニ比スレハ甚補ヲ發サシカモ亦ツヨシ

服桂枝湯太汗出後大煩渴不解脉洪大者白虎加人參

湯主之

大陽病表症桂枝湯ヲ服シ大汗出テ後其脉洪大者表症仍在
イエ然^ニ大^ニ煩渴^ヲ解^セ者裏症^モ亦盛也故^ニ白虎加人參
湯主之也

前章桂枝湯ヲ服シ大汗出テ脉洪大者表症仍在^ニ復桂枝湯
ヲ與^フ此章大汗出脉洪大^ハ前章ト同^ノ但大^ニ煩渴^ヲ解^セサル
一症ヲ加^ス因^テ白虎加人參湯ヲ與^フ也本編白虎加人參湯^ノ症
ハ熱結裏^ニ在^テ表症^ナキヲ以^テ主^ス者也又其表不^レ解者^ハ白虎
湯ヲ與^フヘカ^ニサ^ル戒^ムアリ今此症大煩渴不^レ解^トイ^エ口乾舌燥
水數升^ヲ飲^ミ下^ニ欲^シ脉滑等^ノ症有^サハ熱結裏^ニ在^ト云ヘカ^ニス其
脉洪大^者桂枝湯^ノ症^トス^ハ是表症仍在者也然^レ裏^ハ熱
結裏^ニ在^ノ症^ナキ表^ハ白虎湯ヲ與^フヘカ^ニサ^ル戒^ムヲ犯^ス白虎加人參

湯ヲ與^ル者^ハ本編ノ例ヲ知^ラサ^ルニ非^ス表裏モ且^ハ分^タサ^ル者也且大陽
病大汗出^後脉浮數煩渴^者本編五苓散^ノ症^トス學者考^ヘ
大陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者此無陽也^{不可}發
汗宜桂枝二越婢一湯

無陽^ノ二字通カ^レ成^ス無忌^本註ナ^レ五卷^ノ無陽^ノ註^ニ表症^ナキ
ト^アレ^モ無理^ナ註也無陽^ト云^ハ畢竟陽氣不足^ノナ^レケ^レモ字
義^ニ於^テ通^セ也唐人^モ文盲^{ナル}者多^クハ書人^ノ誤^{ナル}言^ハ大陽病
發熱惡寒熱多^ハ寒少^者汗ヲ發^スヘ^キ症^ナレ^モ病人脉微弱^者ハ
陽氣不足^故麻黃湯大青龍湯等^ニ汗ヲ發^スヘカ^ニス桂枝二
越婢一湯^ニ宜^キ也

微弱^ハ陰脉也故^ニ大青龍湯^ノ章^ニ曰若脉微弱汗出惡風^者
不可服也^然此症陽症陰脉^ハ陰症^ノ治例^ニ從^フヘ^シ此方

緩劑オトイエ麻黃石膏アルトキ恐ク変症ヲ生スヘシ

桂枝二越婢一湯方

桂枝^{十八}銖

芍藥^{十八}銖

甘草^{十八}銖

生薑^{二兩}銖

大棗^{四枚}

麻黃^{十八}銖

石膏^{二斤}銖

右七味咬咀以水五升煮麻黃一二沸去上沫内諸藥者取二升去滓溫服一升

此方桂枝湯ノ肌ヲ解スル者麻黃石膏ヲ加ヘ名者也故表症頭痛發熱惡寒惡風身疼腰痛シテ裏スデニ熱アリテ脉浮ヲ數或ハ舌胎火シ黃色ニナリ麻黃湯ヲ汗ヲ發スルニ遲ク柴胡桂枝湯ナトヲ与ニハ表症全アリ大青竜湯ヲ與ニハ煩躁ナクイカン氏スヘカサル症ニ與フヘシ石膏ヲ裏熱ヲ解シ麻黃桂枝ヲ汗ヲ發ス也表症ナラリテ裏モ亦ステニ熱アルヲ目アテトスヘシヒツキヤウ大青竜湯ノ

カロキ方也

越婢湯方傷寒論ニク金匱ニ出ツ是亦後人ニ出ル者也

右桂枝麻黃各半湯桂枝二麻黃一湯桂枝二越婢一湯ノ三方後人ニ出ルトイエ凡皆古方ヨリ變化ニ來ル者ヲ後世ノ敗毒散十神湯ノ類ニサルヲ遠シ學者桂枝湯麻黃湯葛根湯大青竜湯小青竜湯本方トシ右三方ヲ副方トシ合セテ八方ノ主意ヲヨク會得ン變化自在ニトリ過ナキ其表症ノ治法ニ於テ孔明ガ八陣ニモ同シカルヘシ

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之

是大陽病頭項強痛翕翕發熱者桂枝湯ヲ服汗出ス医ヲモテラク此汗出サル者腹中和セサル故ト是ヲ下ス故ニ水氣上衝テ

心下滿テ微痛ノ小便利_ス是表症仍在_トイ_エ表ヲ_ステ_先裏ヲ_治ス
ヘ_{桂枝去桂加茯苓白朮湯主之}

是逆治_ニ変症ヲ_生ス也此症水氣急也_トイ_エ表症仍全ク_解セサレハ
小青龍湯ノ例_ニ從テ表裏カ_子治スヘ_{五苓散ノ症汗已ニ出テ水氣}
主_スル者_ト大ニ_同也_是本編ノ例ヲ_知サル也

桂枝去桂加白朮茯苓湯

桂枝湯去桂枝加白朮茯苓各三兩餘同本方

此方桂枝ヲ_去スハ_{肌ヲ}解_スノ功ナク白朮茯苓ヲ_加スハ_{裏濕ヲ}去
「專也」芍藥モ亦裏ヲ_和ス也故ニ_{濕ニ}マ_フテ_{下利腹痛}スル者
或ハ_{小便利}セサル者_ニ用ヘ_レ

傷寒。脉浮。自汗出。小便數。心煩微惡寒。脚攣急。及與桂枝湯。
歌攻其表。此誤也。得之便厥。咽中乾。煩躁吐逆者。作甘草乾

薑湯與之。以復其陽。若厥愈足溫者。更作芍藥甘草湯與之。
其脚即伸。若胃氣不和。譫語者。少與調胃承氣湯。若重發汗。
復加燒鍼者。四逆湯主之。

是傷寒發病衆症混雜ノ大表症似テ大表症ニ_非陰症ヲ_帶
似テ陰症ヲ_帶ニ_非其本陽虛ノ症ナル者也心煩ハ胸中イ_キレル
也心藏ハ胸中ニ_在リ故ニ_心ト_イハ_{胸中}イ_也脚攣急ハ足ヒ_キ
ツル也厥ハ足ヒ_ユル也煩躁ハイ_キレ_苦ニア_カク也吐逆ハ_コミ_アゲ也言傷
寒發病脉浮テ自汗出テ惡寒スルハ大表桂枝症ノ如ク中風或ハ大
陽病ニ_似タリ然レ_{心煩脚攣急小便數}ハ其實陽虛ノ症ニ_大
表桂枝ノ症ニ_非ス然_レニ_医其因ヲ_キヲ_ス杜撰ニ_ヲモ_エラ_ク先大表症
ヲ_治セバ_{心煩小便數脚攣急}亦自愈乃桂枝湯ヲ_與テ其表ヲ
攻故ニ病人桂枝湯ヲ_得テ服スルハ直ニ手足厥冷咽中乾煩

躁吐逆是醫杜撰逆治因變症生也故曰及與桂枝湯欲攻其表此誤也イカトナク其脉浮自汗出小便數ハ皆陽虛ニシリアレキ也忠煩熱胸中入ル也脚掌急ハ陽虛ノ和利セサル也然レイタ陰症至ス陽虛ノ症也故ニ甘草干薑湯ヲ與ヘテ其陽ヲタスケ復ノ厥愈足温シ咽中乾煩躁吐逆モ亦愈テ但足掌急故ニ芍藥甘草湯ヲ與テ其足即伸也若甘草干薑湯ヲ與テ厥愈足温ナリトイユ又譫語ル者ハ甘草干薑湯ヲ與ル因テ其症陽熱ニ變シ胃氣不和也故少シ調胃承氣湯ヲ與テ胃氣ヲ和シ又芍藥甘草湯ヲ與テ其脚即伸也若重發汗復加燒鍼者四逆湯至之ハ燒鍼ハ鍼ヲアタメテ刺シ寒冷ヲ治ス者也是ハ反テ與桂枝湯ヲ欲攻其表此誤也云ニ受也言ハ医桂枝湯ヲ與テ其表ヲ攻ントスル是誤也然レ若其症變動セサル医イヨ悟テ又重テ其汗ヲ發ス而又變

動セバ益其誤ヲトケテ復燒鍼ヲ加フコニ於テ果シ其誤逆甚多陰症ニ變シ四肢厥冷スル四逆湯主之也此章始テ傷寒ノ發病ヲ舉ル也然レ中風大陽病ノ例ト同ク純陽正症ヲ舉テ規矩ヲ建ツヘキ也然レ陽虛ノ症ヲ舉ル何ゾ答曰傷寒ハ深症也故ニ發病トイヒ帶陰ノ症多シ且其深症ヲ以テ故疑似ノ症多シ陰陽ヲ辨スル至テカタル故ニ疑症多端者ヲ舉テ辨識ノ法ヲ示シ又調胃承氣湯四逆湯ノ症ヲ舉テ陰陽二症ノ治法ヲ示也然レ陽症ヲ誤テ陰症トスル猶可也陰症ヲ誤テ陽症トスル死症ニ至ル故調胃承氣湯ハ與ト云也凡與ト云姑此湯ヲ與テ其容子ヲ見ル辭也又少與ト云テ慎重スル意ヲ示ス是下劑ハ陰症ニ變マスキヲ恐ルノ辭也又四逆湯ハ主之ト云凡主之ヲト攻メテ疑サル辭也又芍藥甘草湯乾薑湯ニ與之ト云ハ疑症ヲ慎重スル辭也

右正文三章ヲ一節トス始ノ章ハ大陽病大表症陰症ト併在者ヲ明ス中ノ一章ハ大陽病ノ間症ト陰症ト併在者ヲ明ス終ノ一章ハ傷寒陽虛ノ症ト始章ト中章ト中間ニ在者ヲ明ス大陽病ト傷寒ト其症異也トイヒ苟其位地同クハ其治法同ク中風ト專ラ表熱ヲ解スルト同カラス傷寒ト中風ト其發病ハ相似トイヒ其治法同カラサルカク如シ故ニ中風ノ症辨識スル有（カ）サルヲ明ス也曰何以此三章傷寒ノ發病ノタメニ舉ヲ知ルヤ曰大陽病中風桂枝ノ症ヨリ小青竜湯ニ至テ皆發病ヲアル者也而此独大陽病發汗下後ノ症ヲアケテ而後ニ傷寒ニ及フ故ニ是傷寒ノ發病ノタメニ其位地ヲ舉ルヲ知也

右正文七章ノ一段トス是大陽病篇也先大陽病ヲ舉ヘキ者也然レト首章大陽ノ中風ヲ舉尾章ニ大陽ノ傷寒誤テ桂枝湯ヲ用ユル

者ヲアケルハ傷寒ハ深症ナカ故ニ其發病及テ中風桂枝ノ症ト相誤ル者アルヲ明ス又此七章ノ内其始ノ四章ニ中風ヲ次ニ大陽病ヲ舉ル者ハ中風ノ症最表アリ其治法表熱ヲ解スル外ニ大陽病ハ一症轉スル一症ヲカレ其治法亦隨テ移ルヲ明ス其終ノ三章ニ大陽病發汗下後ノ症ヲアケテ而後ニ傷寒發病ノ易ナルカ如キ者ヲアケテ傷寒ノ發病易ナルカ如トイヒ然レハ大陽病及ヒ中風ノ症ニ比スレハ大ニ深キヲ明ス故ニ大陽病中風桂枝ノ症ハ先其文ヲ結ニテ而後ニ傷寒發病ノ位地ヲアケテ大陽病發汗下後ノ者ト大數其位地ヲ同スルヲ明ス也

甘草乾薑湯

乾薑ニ兩

甘草四兩

右二味以水三升煮取一升五合去滓分溫再服

此方陽虛之諸症ヲ生スル目アトスル也凡陽虛ト云フ陽氣虛スト
イエトイテ虚寒ニ至ス但陽氣不足スル也故ニ虚寒ノ主方四逆湯ヲ
此方ハ四逆湯ノ附子ヲ去タル者也分量ノチカイニ意味ハレテ附子ヲ用イセ
ハ其虚ノ浅キヲ知レレ故ニ吐利スレトイテ虚寒セサル者ニ用ユレ又吐逆
ノ症瀉心湯ノ類ヲ用テ止サル者試用スレ

芍藥甘草湯

芍藥 兩四

甘草 兩四

右二味以水三升煮取一升五合去滓分温再服

此方ハユルル也故ニ手足ヒキツリ痛熱アル者ニ見合セ用ヘレ又ツカニ三腹
痛ヒキツル攻撃ヲ用テスス甚キ者ニ用ヘレ

調胃承氣湯

四逆湯

右二方後ニ出ス

問曰證象陽且按法治之而增劇厥逆咽中乾兩脰拘急
而識語師曰言夜半手足當温而脚當伸後如師言何以
知之答曰寸口脉浮而大浮則為風大則為虚風則生微
熱虚則兩脰攣病證象桂枝因加附子參其間增桂令汗
出附子温經亡陽故也厥逆咽中乾煩躁陽明内結識語
煩亂更飲甘草乾薑湯夜半陽氣還而足當熱脰尚微拘
急重與芍藥甘草湯爾乃脰伸以承氣湯微瀉則止其識
語故知病可愈

此章議論條理ヲ取ル足マ

傷寒論國字辨卷之二 終

其言雖多而實無幾也
蓋如所論之理
急重與輕之辨
清更難有草草
出則于品至十
地重限兩期
時之若曰
而此言
問曰
言二式對出



