



傷寒論國字辨 六

ヤ 9
1159
5



179
1159
5

傷寒論國字辨卷之八



陽明病篇

尾張

淺野微元甫

著

陽明病ハ胃中實物^{ガツ}アルヲ本トメ諸症ヲアラワス者也實物
トハ燥屎^{ソウシ}ヲサス也大陽病解^ゲセス表熱コトク^ク胃中ニ入リ其
胃中ニア^ニル^ル所^ノ糟粕^{ソウハク}熱ノタメニ熱^{イリ}アケラレテカク石ノ如クナ
ルヲ燥屎ト云也此物胃中ニアリテ久シク通セヌニ因テ其熱
益盛^{メス}ニナリテ是ヨリ種々ノ病症ヲ生スルヲ陽明病ト云
也又陽明病ト名ヅクルエ^ニ義ハ陽ハ陽病也陽病ハ實熱
病也明ハ隆^{リツ}赫^{カク}ノ義也隆ハ盛^{サカシ}也赫ハ炎^{モシ}赫^{カク}ノ赫^{カク}ニテ六月大旱^{カン}
ノトキ草木モカレ石モナカル、ホトニテ炎暑ノ照ノ火ノ如クナル
也故ニ陽明病トハ胃中ノ熱ノモエタツヤウナルノ名也問曰大

91-2044

陽病ノ解セサル者少陽ノ部ニウツリテ往來寒熱胸脇苦滿等ノ症ヲアラハス者多クシテ陽明部ニウツル者ハスナシ然レ大陽ノ次ハ少陽少陽ノ次ハ陽明ナルヘキハツナル今陽明ヲ先ラ少陽ヲ後ニスルハ何ツヤ答曰凡人ノ死スル陽病ヲ以死スルハナシ其死スルハ皆陰病也陽氣ハ人生ノ本タルエエ也故ニ大陽病少陽病ハ死症ナク少陰病厥陰病ハ死症多シ故ニ大陽病解セス或ハ少陽ニツタヘ或ハ大陰ニツタヘ解スルアリ又少陰厥陰ニツタヘテ解スルモアリ又少陽或ハ大陰ニテ解セサレハ少陽ハ陽病ナル故ニ死セス大陰ハ陰病ナレハ胃中ノ陰ニテ其外ハナヲ陽ナル故ニ死セストカク少陰カ厥陰ヘウツリテ死スル也又大陽ノ變症ニテモ其死症ハ皆少陰カ厥陰ヘウツリテ死ストカク陽病ニハ死症トシ

ヒトリ大陽ヨリ陽明ニ傳テ胃實ノ症トナル者死症アリ凡陽病ヲ以テ死スル者唯此一症ノミ也故ニ大陽ノ次ニ陽明ヲ以承ル者ハ大陽病ヲ結メ陽病ニ死症アルヲ知ラシム也此次序ノ一ハ明ノ戴元禮ナドモ疑惑セシナルニ靜齋先生ノ此説ヲ得テ其理甚明カ也學者察セヨ
問曰病有大陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰大陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃家實是也少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也
大陽陽明ハ大陽病其症已ニ解メ但大便難ノ症アル也脾約ハ其人脾ニ實熱アリテ胃中ノ津液ヲ約束メ一トカタテリトナシテ大便通セヌ也正陽陽明ハ陽明病ノ本症也胃家實トハ表熱皆胃中ニ入リ毒熱燥屎胃中ニ實滿スル也少陽陽

明ハ少陽病已ニ汗ヲ發シ小便ヲ利メ其症解メ但胃中ノ津液乾燥ノ大便難ノ症アル也此三章一章ハ其人モトヨリ脾氣強メ胃中乾燥スル者一章ハ毒熱胃中ニ入ル者一章ハ汗ヲ發シ小便ヲ利メ胃中乾燥スル者也此三章ヲ分メント欲ス故ニ此章アリ然レ是後人ノ加所シ仲景氏ノ本文ニ非ス仲景氏三陽三陰ヲ設ル萬病ノ地位ヲ明カラシ治法ヲ建ルエニ也故ニ大陽病陽明病少陽病及三陰病氏ニ皆其部コトニ脉症ヲ審カシ少モ彼ト此ト出入アルナシ故ニ學者六部ノ脉症位地ヲ詳明シ而後ニ萬病ノ治法ヲ知ルヘシ是治法ノ大本也然ルニ此章大陽陽明少陽陽明ト云者規矩ヲ乱ル大ナル者也所謂偽章ノタメニ仲景氏ノ規矩スサルト云者皆此類也且大陽陽明少陽陽明ノ二症皆津液乾燥ノ

症ニ蜜煎導脾約丸ノ類ノ治スル所ヲ陽明病毒熱燥屎ノ症ト天瀾ノチカヒ也

陽明之爲病胃家實也。

陽明之爲病トハ大陽之爲病ト同シニテ陽明ノ位地ニ於テ病ヲナスト云フ也胃家ノ家ハツケ字ニテ意ナシ胃中ト云フカ如シ胃家實トハ表熱皆胃ニ入糟粕ヲイリ立テ燥屎トナリテ胃中ニ充實スルヲ云是陽明病ノ總目章也言ハ陽明ノ位地ニ於テ病ヲナス者其病症多シトイエ氏其病ノ本因ヲ舉シハ胃中實物アリテ生スル也學者ヨリ此本因ヲ會得スル寸ハ其治法ヲ得ヘシ且他部ノ總目章ハ皆病症ヲアクル者ナルニ此章ハ独其病因ヲアクル者ハ陽明病其症多端ニメ一定ノ症ヲアゲガタシ故ニ其本因ヲアケテ示ス也

陽明病ノ諸症皆胃中實物アルノ所也然レモ胃實ニ非
ストイエ氏胃中ニアツカル症ハ亦陽明病ト云又大陽篇中ニ
散見スル者及少陰篇中ニモ陽明病ニ類スル者アリ故ニカ
リニ名目ヲ立テ初学ニ示ス

初陽明

一大陽ト陽明トノ合病葛根湯葛根加半夏湯ノ症

右表ハ大陽ノ初症ニ裏ハ胃中不和ノ輕淺ナル者故ニ
初陽明ト云

後陽明

一生姜瀉心湯甘草瀉心湯旋復代赭石湯ノ症

右ハ大陽病或傷寒表熱已ニ解メ独胃中不和ナル者故
ニ後陽明ト云

漸陽明

一傷寒脉浮自汗出ルノ章若胃氣不和譫語ル者少ク調胃
承氣湯及發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和
胃氣與調胃承氣湯ノ症也

右ニサニ胃實トナラン者也故ニ漸陽明ト云

正陽明

一本篇陽明病脉遲章及傷寒若吐若下後不鮮不大便五六日
上至十餘日章皆大承氣湯ノ主ル所也

疑陽明

右陽明病ノ本症燥屎毒熱胃中ニ實滿スル者故ニ正陽明云
一本篇三陽合病腹滿身重ノ章白虎湯ノ主ル所及二陽併病大
陽症罷章大承氣湯ノ主ル所也

右症候混雜ノ分別シカクキ者故ニ疑陽明トス
變陽明

一少陰病自利清水ノ章大承氣湯ノ主ル所及少陰病下利六七日ノ章猪苓湯ノ主ル所也

右少陰篇中胃實ト水氣トノ症也少陰病ハ虛寒ノ症也然レ氏陽病ヨリ少陰ニ傳ル者ハ熱症如此者アリ少陰已ニ虛寒ヲ以テ本トス而レ熱症アリ故ニ變陽明トス

傍陽明

一本篇陽明病發熱汗出ル章茵陳蒿湯ノ主ル所及食穀欲嘔章吳茱萸湯ノ主ル所及陽明病下之其外有熱章梔子豉湯ノ主ル所也

右陽明篇ニ出トイフ氏胃實ノ症ニ非ス瘀熱胃中ニアルニ因テ

其相類スルヲ以傍陽明トスル也

右七症ハ皆胃中ニアツカル病也故ニカリニ名目ヲ立テ初学ニ示ス然レ氏本篇陽明病トスルハ正陽明疑陽明ノ二症也傍陽明ハ瘀熱胃中ニアルヲ以陽明病トス初陽明モ亦位地同病ヲ以也變陽明ハ其實胃實ト同シ然レ氏其症異ナルヲ以少陰病トス其漸陽明後陽明ハ大陽病中ノ變症也但其位地胃中ニアルヲ以カリニ名目ヲ立テ類症ヲ示ス学者ヨク分別ノ會得スヘシ

問曰何緣得陽明病答曰大陽病若發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難者此名陽明也
汗モ小便モ胃中ノ津液ノ生スル所也故ニ汗ヲ發シ小便ヲ利スル津液カワク下スハモトヨリ津液カワク也更衣ハ更ニカワク也古人所カハ

ユク寸ハ衣ヲ更テユク故ニ更衣ハカワヤニユク也此方ニテキサラギ
更衣トカクハ誤也内實ハ胃中毒熱ニテ實滿スル也言ハ大陽病
トキ汗ヲ發スルカ又ハ下スカ又ハ小便ヲ利スルニ因テ津液ヲ亡シ胃中
乾燥スニ因テ陽明ニ轉屬ス轉移ニテウツル也屬ハ附屬ニテ其部ノ
病症ニツキナル也サテ其症ハ更衣セズ内實不大便也不大便ハ大便
通セヌ也此章ハ後人ノ加ル所ニ津液乾燥大便難ヲ以陽明病トス
内實ノ句アリトイヒ取ニ足ス

問曰陽明病外證云何答曰身熱自汗出不惡寒反惡熱也
身熱ハムスヤナル熱也惡熱ハ熱ニテ苦ム也

問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰雖得之一日
惡寒將自罷即自汗出而惡熱也

問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中主土也萬物所歸無所復

傳始雖惡寒二日自止此爲陽明病也

五藏ヲ五行ニ配ス肺ハ金心ハ火肝ハ木腎ハ水脾ハ土又四方ニ配ス
レ肺ハ西心ハ南肝ハ東腎ハ北脾ハ中央也陽明ハ胃經ニ脾ノ府也
故ニ陽明ハ居中主土也ト云也天地萬物人身禽獸アルトアラユル物
終リハ皆土中ニ歸ス故ニ萬物ノ歸スル所ト云也歸スル所ト云ハ萬物
皆落コム所ト云フ也萬物土ハ落コム土中ニテ盡故ニ又傳ル所
ナシ故ニ陽明病ハ惡寒ハヤクヤミ汗出惡熱ノ胃實ノ症ナリテ他經
ニシタヘヌ也
右始ノ問ヨリ是マテ一章ニテ後人ノ加ル所ニ本文ト大ニ異也本
篇ノ例ハ胃實ヲ以陽明病トメ外症ヲ以陽明病トスルヲナク惡
寒アルハ萬病皆大陽病也是表裏ヲ別ツノ大本也右ノ章ハ素
問家之說也

本大陽病初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明也

徹ハ物ノスケトル也故ニ不徹ハ汗ノトクト出ヌ也前章ハ汗出

テ津液乾燥メ陽明ニ轉屬スト云此章ハ汗出不徹陽明ニ轉

屬スト云後人ノ説法則トスヘカラサル皆此類也

傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濇々然者是轉屬陽明也

傷寒其邪深シ發熱メ汗ナク嘔メ食スルアタハハツ也然ル

反テ汗出ルハ濇々然タルハ是陽明病トナリタル也濇々然ハ水

ノ流ル貞汗多ク出ル也然レハ大陽病大小柴胡白虎湯ノ症

汗出ルハ多シ故ニ本篇汗多キヲ以陽明病トビズ

傷寒三日陽明脉大

本篇ノ例陽明ノ脉遲也且傷寒始ヨリ三日ニ陽明ニ傳フヘカ

ラス此章ハ素問ノ説也

傷寒脉浮而緩手足自溫者是爲繫在大陰大陰者身當發黃

若小便自利者不能發黃至七八日大便難者爲陽明病也

浮而緩ハ陽脉也大陰ハ陰症也浮緩ノ脉ハ大陰病トナスヘカラス

且大陰ハ胃中寒冷アルノ症發黃ハ胃中瘀熱アルノ症也又大

便鞭ノ一症ヲ以陽明病トスルニ足ス皆法則ヲ知ラサル人ノ加ル可也

傷寒轉繫陽明者其人濇然微汗出也

汗出ルヲ以陽明病トスルヲ取ルニ足スワシク下ニ論ス繫ハカハルト

ヨミテ轉屬ト同事也

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脉浮而緊若下之則

腹滿小便難也

中風ハ其脉浮弱頭痛汗出其症輕淺大陽大表ノ病也陽

明病ハ胃中ノ症也。是表裏ノ千カイ也。且口苦咽乾ハ陽明病
癰熱ノ症也。腹滿微喘ハ陽明胃實ノ症也。發熱惡寒脈浮
而緊ハ大陽ノ傷寒也。故ニ此章ノ内中風ノ症ハ一症モナシ。始メ
中風ト名ノリテ色々ノ症ヲアツメタル者也。世間カクノ如キ病人
アルヘカニス。

陽明病若能食名中風不能食名中寒。

中風ト名ク中寒ト名クト云ハ病ハ始メニ於テ名ヲ定メ法ヲ立ル
トキノ一也。陽明病ニ於テ名ヲ命スルアルヘカラス。且脈症ヲ以テ論
セスノ能食スルト食スルアタハサルヲ以テ論スル杜撰論ニ及ハス。
且傷寒ハ即中寒也。故ニ本篇中寒ノ名ナシ。又後世ノ方書ニ
所謂中寒ハ本編ノ少陰病也。

陽明病若中寒不能食。反不利。手足澀然汗出。此欲作痼瘕。

必大便初鞭後溏所以然者以胃中冷水穀不化故也。

痼ハ久病也。瘕ハ積聚也。痼瘕ハ積聚ノ久病也。不能食ハ胃中
冷テ穀ヲ化セサル也。小便不利ハ胃中冷テ水穀分利セサル也。周
身汗出ハ寒氣散ス。今手足ノミ汗出ル寸ハ寒氣散セス。今ニ寒
冷胃中ニ留結ノ痼瘕トナラントス也。故ニ大便始ハカタシトイエ
後必ス溏溏ス。是胃中冷テ水穀分利セサルヨリ生スル也。

右胃中寒冷ヲ以陽明病トス本篇ノ例ニ非ス。

陽明病初欲食。小便反不利。大便自調。其人骨節疼痛。翕々如有
熱狀。奄然發熱。澀然汗出而解者。此水不勝穀氣。與汗共併。脈
緊則愈。

食ヲ欲スルハ胃中ニ陽氣アリテ穀ヲ消スル也。然ルニ小便不利
ハ水穀分利セサル也。故ニ反ト云大便自調ハ水氣甚シカラサル也。

其人骨節疼ハ水気也翕々如有熱状奄然發狂澼然汗
出ハ穀氣陽ヲタスケテ發スルニ因テ水寒ノ氣汗トハニ併
セテ散スル也其人脉緊ナルハ寒實ノ脉故ニ汗ヲ得テ解スル
也此症ト前症トトモニ水寒ノ症ハ食シハ食セサルヲ以胃
中陽氣ノ強弱ヲ分ツ也
陽明病欲解時從申至戌上

土ハ申酉戌ニ旺ス故ニ其氣ノ旺スル時ニ解ス此素問ノ説
陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人
本虛故攻其熱必噦

不能食ハ胃中陽氣虛ノ穀ヲ化セサル也然ルニ医審カニヒズ
寒藥ヲ用テ其ワスカノ熱ヲセムレハ胃中益虛寒ノ噦ス噦ハ
サクリ胃中虛寒ヨリ生ス以其人二句贅語ナリ唐人ニモ力

外如キ拙キ者アリ

陽明病脉遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸
雖下之腹滿如故所以然者脉遲故也

遲ハ陽明病ノ本脉也然レ身重短氣腹滿喘等ノ諸症備リ
テ脉遲ナル者始テ胃實トスヘシ若諸症備ラスハ胃實トスヘ
カラス故ニ此章ノ遲脉ハ胃陽不足ノ遲ヲ胃實ノ遲ニ非ス食
難用飽飽則微煩頭眩スルハ胃陽不足穀ヲ化スルヲアタハス因
テ心下痞塞ノスル可也小便難ハ陽氣下降セサル也穀疸ハ胃中
ノ穀氣ト水氣ト相搏鬱滯ノ腹滿是穀疸トナラントス雖下
之腹滿如故所以然者脉遲故也トハ是小便カタク腹滿穀疸
トナラントスルハ實熱ノ症ニ似ルトイエ氏其脉遲ナルハ胃陽不足ス
小便カタク腹滿トイエ氏虛中ノ邪也故ニ寒藥ヲ以下ストイ

工氏腹滿愈ス故ノ如キ也

右五章中ノ一章ハ素問家ノ説也前後四章ハ胃中ノ症故ニ陽明病トス然レ本篇ノ例陽明病ハ胃實ノ症ニ胃中虛冷ハ大陰病也。是後人ノ加ル所也。然レ唐ニテモ虛ヲ以實トシ帶陰ヲ純陽トシ逆治ラスル医多キニ因テ是ヲ加テ戒トス初学ニ於テ大益アリ

陽明病法多汗反無汗其身如蟲行皮中狀者此以久虛故也。本編ノ例汗出ルト汗多キトヲ以陽明病ノ症トセス故ニ曰雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解也又曰若汗多微發熱惡寒者外未解也ト是汗出ルト汗多キト并ニイテ陽明病ノ症トセサル也又曰手足濇然ト汗出ル者ハ大便已鞭也大承氣湯主之ト是手足汗出ルト云フ寸ハ

其他ノ所汗ナキ也然レ此章陽明病法多汗ト云フモノ大ナルチカイ也大承氣ヲ用ルハ至テ大切ナルナルニ如レ此大ナル誤リヲ千萬年モ傳ル其罪ハカルカラス且陽明病ハ胃實ノ症也久虛ヲ以陽明病トスル杜撰甚シ

陽明病反無汗而小便利二三日嘔而咳手足厥者必苦頭痛若不咳不嘔手足不厥者頭不痛

陽明病但頭眩不惡寒故能食而咳其人必咽痛若不咳者咽不痛

右二章嘔咳頭痛頭眩咽痛皆陽明病ニ非ス陽明病無汗小便利心中懊懣者身必發黃

心中ハ胸中也懊懣ハ胸クルミクイカンニナスヘカサレ也是陽明病瘧熱ノ症汗出小便利スレハ其熱表裏ニ發散ス今汗

出ス小便利セス故ニ胸中クルシクノ發黃スル也發黃ハ黃疸也陽明病被火額上微汗出而小便不利者必發黃

被火ハ地爐ナトニ火ヲツヨクメシ立テ汗ヲ發セニースル也額ハヒタイ也陽明病發熱ノ症火ニテムシ立テ汗ヲ發セントスレハ汗出ス火ニ火ヲタキテ其熱ウツノ散セス額上少シ汗出テ其外ハ出ス又小便モ利セス故ニ黃疸ヲ發スル也

陽明病脉浮而緊者必潮熱發作有時但浮者必盜汗出

浮而緊者浮者皆大陽ノ脉ニテ陽明病ニ非ス

陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄

漱ハ口ヲツグ也衄ハ鼻血也水ヲ以口ヲツグキテ水ヲノマサル者ハ熱上部ニアリテ胃中ニアラス故ニ衄スト云然レハ水ニ口ヲツグ病人多シナラ必ス衄セン取ニタラサル也

陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尚微煩不了々者此大便必鞭故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞭當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今為小便數少津液當還入胃中故知不久大便也

微煩ハ胸中少シ煩悶スル也不了々ハサツハリトセヌ也此章津液乾燥ノ大便鞭ヲ以陽明病トスル者本編ノ例ニ非ス且文章碎煩至テイマシキ者也然レハ小便スクナク腸中潤ヒ大便自然ニ通スルヲ待テ大承氣ヲ以ミタリニ下サス當今杜撰ノ医ニナリ

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

嘔吐多ク大陽ノ症也故ニ下スヘカラス此章初学ノ心得トスヘシ陽明病心下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈心下鞭滿亦大陽ノ症也モトヨリ陽明病ニ非ス

陽明病面合赤色不可攻之必發熱色黃小便不利也。

合八通也面合八通面ト云フカ如シ通面赤色ナル表症也故不可攻也發熱色黃小便不利ハ黃疸也

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯。

陽明病モトヨリ吐下心煩ノ症ナシ若アレハ陽明病ニ非ス

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然而汗出者此大便已鞭也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下。

陽明病ハ大陽病及傷寒大陽ノ位地ニテ麻黃湯大青龍湯ヲ服ノ汗ヲ發シ或ハ小柴胡其外種々難治ノ解セス其熱コトコトク胃中ニ入テ胃實ノ症ヲアラワス也此症ハ純陽實熱ニテ少シモ帶陰ノ症

ナシ若帶陰ノ症アレハ陽明病ニ非ス學者熟察スヘシ此章陽明病人本症也此症ヲトリト會得スレハ陽明病ノ全體ヲ會得スヘシ脉遲トハ遲ハヨクキトヨミテ脉ノ數ノスクナキ也然レハ陽明病ハ實熱ノ症ナレ陰症ノ遲脉ニ非ス其症腹中實滿ナル故ニ其脉狀シツカリト丈夫ラ大陽表症ノ脉ノ浮數緊滑ノ類ニ非ル也雖汗出不惡寒者トハ汗出レハ陽明ノ本症ニ非ス然レハ汗出レハ惡寒セサルハ陽明ノ本症也大陽病小柴胡湯ヨリ白虎湯ノ症ニ汗出テ惡寒スル者アリ陽明ハ少シモ惡寒セサル也肝要ノ症也學者記得スヘシ其身必重短氣腹滿而喘トハ身重ハ裏ニ伏熱アリ故ニ身重シ短氣ハ息ツキノセワシキ也腹滿ハ腹中一ハイニ滿ル也喘ハ喘息ノ如ク息タワシク声アル也皆表熱胃中ニ入テスル所ノ症也必ハ十ノ内七八ヲ期スルノ辭也言ハ大陽病ヨリ陽明ニ傳ル者

十人ノ内七八人ハ其始ノ身重ク短氣ヨリオコルアリ十人ノ内
二三人ハ腹滿テ喘スルヨリオコルアリ此症アル寸ハ己ニ陽明ニ傳
フヲ知ルヘシ右ノ症ニヤウニキコユヌヤウナレト必ノ字ニテ右ノ通
リニキコユル也是ハ文法也右ノ潮熱者ハ此外欲解也トハ潮熱ハ
ウシヲノサスカ如ク日々時ヲトリテサス熱也多クハ申ノ時ニサス
モノ也外トハ外症也外症ハ汗出テ惡寒スルヲ云言ハ病人潮熱
アル寸ハ汗出テ惡寒ノ外症解スヘキ也可攻裏也トハ小承氣湯
ヲ用テ下スヲ云也言ハ病人汗出ツトイエハ惡寒セズ身重ク短
氣ヲ其脉遲ナル者及ヒ汗出ツトイエハ惡寒セズ腹滿テ喘シ
其脉遲ナル者は己ニ陽明ニ傳ル者ナレハ法ニ於テ調胃承氣
或ハ小承氣ヲ用ミ然レトイマタ汗出ル外症アリテ陽明ノ症
モイマタ甚シカラサレハ學者猶其症ヲ審ミメ其方ヲ處スヘシ

若汗出テ惡寒セズ身重ク短氣其脉遲ナル者ト或ハ汗出テ惡
寒セズ腹滿テ喘シ其脉遲ナル者ト其上ニ又潮熱アル寸ハ陽
明ノ症コトコトク備ル也タトヒ汗出ツトイエハ外症ニ非ス小承
氣湯ヲ以テ可攻裏也是治法也手足澀然汗出者此大便已
鞭也大承氣湯主之トハ澀然ハ水ノ流白也是マデ周身汗出ル
症ヤミテタ、手足ハカリ澀然トメ水ノ流如ク汗出ル者ハ是大便
己ニ鞭ノ症也大承氣湯ヲ用テ下スヘシ疑フヘカラサル也凡主之ト
云ハ此方此症ニ的中也疑フヘカラスト云フ也大便己ニ鞭シ大承
氣湯ニテ下スヘシト云フハ陽明病ハ表熱コトクク胃中ニハテ腹
中大ヒツホ爐ノ如クニナリテ津液ヲムシ立イリ立テ諸症ヲ生スル也
然レハ表熱コトクク裏ニハラス裏熱モイマタサカニナラス大便
モイマタカタマラス内ニ下ス寸ハ表熱イヨク裏ニハリ裏モ寒藥

ノタメニアテラレテ屈寒ニナル如此寸ハ病人ハ大ニツカレ病ハ益サカシ
ニナリテ遂ニ死症トナル故ニ表熱コトク裏ニ入裏熱十分ニサカ
シナリ大便モ熱ニイリ立ラレテカクナリタル寸大承氣湯ヲ以テ
下ス寸ハ裏熱サツハリト清クナリアトモ屈寒ニナラス表熱ノ入ル
モノモナク表裏トモニサツハリトスル也至テコ、ロヨキ治法也然レハ
但ムツカシキハ目利也少シニテモ表症アル者カ裏熱イマタサカシ
ナラス大便イマタカタマラス者ニ用ル寸ハ大害トナリテ死症ニ至
ル慎重スヘキノ至リ也若汗多微發熱惡寒者外未解也トハ若
汗出ル多キハ外症イマタサツハリトセサシ疑アリ其上ニ又少シニテ
モ發熱惡寒アレハ外症解セサシ疑ナシ慎テ攻ヘカラススヘテ
外症ノアルトナキハ惡寒ヲ第一ノ目アテトス也少シニテモ惡
寒アレハ外症解セス也其熱不潮未可與承氣湯トハ若汗出ル

多キ者少シニテモ表症ノ疑アル者又汗出ル多ク表熱ナラ
ル者タトヒ其裏身重ク短氣腹滿テ喘スルハ三承氣湯ヲ与
テ下スヘカフス況ヤ少シニテモ惡寒發熱アル者以メ下スヘカ
ス必ス其表熱變メ潮熱トナリテ而後ニ其症ニ隨テ三承氣ヲ
擇テ与フヘシ若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣カレ令
大泄下トハ毒熱胃中ニ大ニ滿テ胃氣フサカリテ通セサル者ハ藥
カモメクルアタハス故ニ小承氣湯ヲ与テ少シ胃氣ヲ和スヘシ和
ハ調和ノ義ニテ胃中毒熱ニチテフサカリ氣モ通セス故ニ少
シ下メ熱邪ヲ去リ胃中ヲ調和スル也然レハ少シニテモ外症ア
ルニ下ス寸ハ大害アルナル故ニ止ムヲ得サル治法也故ニ与フト
云フ也与フトハ先ツ此方ヲ与テ其ヤウスヲ見テ治法ヲ處スルノ
辞也小承氣湯ヲ与テ胃氣通メ外症イマタ解セサレハ其症

二隨テ外症ヲ解スル方ヲ處ス又外症已ニ解メ胃實ナヲアル寸ハ其症ニ隨テ大小承氣ヲ處スヘシ勿令大泄下トハ右ノ小承氣湯ヲ与ル止ムヲ得サルノ治法也故ニ少シ胃氣ヲ通スル寸ハヤムヘシ大ニ泄下メ大害ヲナスコナカレ勿ハ誠ノ辭也必ス慎ニテ大ニ下利セシムルコナカレ也泄下ハ下利也

大承氣湯

大黃 四兩

厚朴 半斤

枳實 五枚

芒硝 三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃更煮取二升去滓內芒硝更上火一兩沸分溫再服得下餘勿服

此方位地ハ陽明ヲ主トシ其症ハ傷寒表熱裏ニ入外症惡寒發熱ナク日晡潮熱ヲ發シ手足汗出大便通セス小便ヨシ利シ身重ク短氣腹滿喘息口舌乾燥舌胎黃黑少シモウルヲヒ

ナク口唇焦裂煩躁言牀ヲナテ衣縫ヲサグリ狂驚走ラントシ或ハ下利清水少モ糟粕ナク腹脹滿其脉沉遲或ハ沉弦或ハ沉ニ數ヲ帶ヲ主ル表熱胃中ニ入津液ヲイリ立大便モイリ立テ燥屎トナリテ諸症ヲ生スルヲ目アテトスル也其病裏ニアリ故其脉種々トイエ氏沉ニカアルヲ主トスヘシ浮大浮洪ノ者ハ脉ト症ト反スル也必用ユヘカラス其微細數ノ類スヘテカナキ脉モ用ユヘカラス又痢疾表症ナク裏急後重甚ク日夜百餘行ヨク食シ脉沉實ノ者ニ与フヘシ

小承氣湯

大黃 四兩

厚朴 二兩

枳實 三枚

已上三味以水四升煮取二升二合去滓分溫二服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服

更衣ハ^カ便ニ^ク也此湯ヲ服メ大便通シタラハ餘ハ飲スヘカラス此
方大承氣湯ニ芒硝ヲ去リ厚朴半斤ヲ二兩トス^{ハ錢ノ内六錢減メ二錢也但一斤十六錢二兩二錢}
^{ノツモリ}枳實二枚ヲ減シタル者也其煎法モ大承氣湯ハ水一斗ヲ
以先ツ厚朴枳實ヲ煮テ五升ヲ減シ其汁ニテ大黃ヲ煮テ三
升ヲ減シ芒硝ヲイレ二兩沸メ用ユル者也此方ハ水四升ヲ以テ三
味ヲ煮テ一升ニ合テ取ル者也是ヲ以テ^ク見レハ其方ノ^急
會得ナルヘシ芒硝ハ堅キヲヤハラケ燥ヲウルヲス者也故毒熱胃
中ニアリテ津液ヲイリ立大便モ燥屎トナルヲ目アテトメ用ユル也
厚朴ハ滿ヲモラシ氣ヲ下ス物也枳實ハ氣ヲ破リ痰ヲメクラス
大黃ト同ク毒熱ヲ下ス然ルニ厚朴枳實ヲ減スレハ瀉下ノカヨ
ワシ畢竟大承氣ハ熱毒サカニメ燥屎アルヲ目アテトス小承氣
湯ハ熱毒サカナリトイエモ津液イマタ乾燥セス大便通セスト

イエ氏イマタ燥屎トナラス只熱毒胃中ニ滿タルヲ目アテトス
ル也故ニ大黃ハ二方同ク四兩ヲ用ユル也調胃承氣湯ハ大黃四
兩甘草二兩芒硝半斤ヲ用ユ^{半斤ハ即八錢也宋板作半升ハ誤也}大承氣ニ厚朴枳
實ヲ去芒硝ヲ減ス^{大承氣ハ芒硝三合也即十三錢餘也但右ノ一升令ノ一合ノツモリ}而メ甘草二兩ヲ加
フ^{二兩ハ即二錢}小承氣ニ厚朴枳實ヲ去芒硝甘草ヲ加ル者也枳朴ヲ
サルハ脹滿ノ症ナシ故ニ大黃ノカヲ足スニ及ハス也芒硝ハ胃中ノ毒
熱ヲトラカス也甘草ヲ加ルハ大黃芒硝ノ勢ヲユルメク胃中ニト
トメテ毒熱ヲ除ク也大承氣ハ實物ヲ主トメ熱毒脹滿ヲカ子治
ス小承氣ハ脹滿ヲ主トメ熱毒ヲカ子治ス調胃承氣ハ脹滿實
物ニ及ハス但熱毒ヲ治スル者也凡古方ヲツカフハ方意ノ緩急ヲ審
ニセニ^ツヲ要ス是醫術ノ第一也故ニ初学ノタメニ二端ヲ示ス

陽明病潮熱大便微^カ者^カ可與大承氣湯不^カ者不與之若^カ不

大便六七日。恐有燥屎。欲知之法。少與小承氣湯。湯入腹中。轉失氣者。此有燥屎。乃可攻之。若不轉失氣者。此但初頭鞭後必溏。不可攻之。攻之必脹滿。不能食也。欲飲水者。與水則噦。其後發熱者。必大便復鞭而少也。以小承氣湯和之。不轉失氣者。慎不可攻也。

轉失氣。八放屁也。小承氣。藥力弱。故燥屎下。スアス。ス。ワスカニ氣通メ放屁スル也。又燥屎ナキ者ニ用ル寸ハ直ニ大便通シ初メカタシトイエ氏後必溏泻ス故ニ燥屎ナキ者ヲセメ下ス寸ハ胃中虛寒トナリテ腹脹滿メ食スルアタワス若客熱胸中ニアリテ水ヲ飲寸ハイヨク虛寒ヲマシテ噦スルニ至ル也。然レ氏其後發熱スル者ハ下後大便通セス胃中復熱アル也。小承氣ヲ以少シ下メ胃氣ヲ和スヘシ小承氣ヲ用テ轉

矢氣セサレ者ハ必慎テ大承氣ヲ以攻ヘカラス

虛實ノ目利ハ至テカタキ也。然ルニ大承氣ヲ誤リ用テハ大害アリ。故ニ此章ノ如キ目利ノレカタタシレノ後世ニ傳ル也。今時庸忽ニ下劑ヲ用ルトハ大ナルチカイニテ貴重スヘシ。然レ仲景氏ノ曰手足濇然トノ汗出ル者ハ大便已ニ鞭也。大承氣湯主之。ト是大便鞭ヲ知ルノ秘決也。是ヲ知ラスノ轉失氣ヲ誤ル

後人ノ加ル所也

夫實則譫語。虛則鄭聲。鄭聲重語也。

重語トハ語言ヲモクシブリグズクトノハツキサトセヌ也。譫語ハサリヤカニサツハリトスル也。實症ノウワコトハ譫語。虛症ノウワコトハ鄭聲也。是亦虛實ノ目利ノ一端也。直視譫語喘滿者死。下利者亦死。

直視ハ目ヲ見ツル也譫語ハウロコト也喘滿ハ息タワシク喘息ノヤウナル也如此者ハ死症也右ノ如クニテ下利スル者モ亦死也カヤウナル症ハ素人モ知ル也然ルニ仲景氏ノ語ナランヤ

發汗多若重發汗者亡其陽譫語脉短者死脉自和者不死。短ハミチカク上下ヘツカズ死症ノ脉也汗多亡陽譫語脉短ナル者ハ死ス同症ニテモ脉自和ス者ハ死セスト云フハ誰モ知リタルニテ教トスルニ足ス是皆後人ノカキ加タル審也然レ凡萬病汗多キ寸ハ陽氣忽亡テ死症ニ至者世間甚多シ是皆医人脉症ノ誤リ也医人ニ於テハモトヨリ專心ヲ用ズキニテ論ニ及ハス其病家ニ於テハ不案内ノナレハ如何ヒスヘキヤウナシ然レモ精力金銀ヲツクシ反テ誤策ノタメニ死スル悲ムヘキノ至也故ニ此心得ヲ病家ニ告シトス然レモ汗ノ善惡ハ傷寒論ヲ熟讀ノ陰陽

表裏ノ脉症ニクワシカラサレ詳ニ知ルカラス此事ハ医人サヘモウトキテ多ケレハニテ病家ノ一旦ニ會得ナルヘキニ非ス故ニ今至テ淺キ所ニテ目利ノシカタヲ示ス凡萬病汗スモ病人藥ヲ服シ汗ヲ發セシ後其病一等モ二等モ快ハ其藥の中也若汗ヲ發ノ後其病同シイカ又ハ一等二等アシクナルカ又ハ少シニテモ變症ノ出ル藥の中セスアマリアルヘキ也又ハ至テ難治ノ症ナルヘシ其脉モ汗後ニ弱ク靜ナルハ吉也強クサワカシキハ凶也其時ハ医ニトクト医案ヲ談判メ藥方ヲカエルカ又ハ医ヲカエルカスヘシヒタスラニ医ヲ信ノウカクトスル内ニ急變生スルハイカンモスヘカラス是病家第一ノ心得也

傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日。日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不

安。微喘直視脉弦者生。瀉者死。微者但發熱譫語者大承氣湯主之。若一服利則止後服。

傷寒若吐若下後不解不大便五六日ハ傷寒或ハ吐シ或ハ下シ其熱解セス吐下ニ因テ其裏虛メ表熱胃入不大便五六日也或吐後不大便五六日或下後不大便五六日也吐下ニ施シタルニハ非ズ上至十餘日トハ吐下後五六日吐下ノ前七八日モ大便トクト通セサル也日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀トハ日晡ハ申ノ時也潮熱ハウシヲノサスカ如ク時ヲトリテサス熱也不惡寒ハ少シモサヘケナキ也獨語ハヒトリゴトニテ譫語也如見鬼狀ハハケ物ヲ見ルワコトヲ云也若劇者發則不識人トハ劇ハ甚シキ也是二品ノ病人ヲトキタル也ハケ物ヲ見ルウハコトヲ云テコウニ正氣ナキモアリ又常ニ正氣ニテ發スル寸ハ人ノ差別モナキモアリ是ハサシヒキノアル也循衣

摸牀惕而不安微喘直視ハ循衣ハ衣ヲナデル也摸牀ハ子カヲサガル也惕ハ恐ル也恐レテ安臥スルヲナラヌ也微喘ハ少シ喘息ノ如ク息クルシキ也直視ハ目ヲ見ツメル也脉弦者生トハ弦ハ弓弦ヲオスカ如クツヨキ脉也上ノ症ニテ其脉弦者生トハ弦ハ弓弦ヲオ弦ハ其内急緊スル所アル脉也今胃實ニ腹中充實緊急メ脉ト症ト相應ス故ニ下セハ生ル也瀉者死トハ瀉ハシブリテウルヲイナクメクリアシク大虛ノ脉也症ハ陽ニテ脉ハ陰也故ニ死ス微者發熱譫語者大承氣湯主之トハ微者ハ至テ小キ脉也然レハ陰症ノ微脉ニ非ス是胃實ノ症ニテ胃氣通セサルニ因テ其脉微也故ニ下シ胃氣通スレハ其脉モ和メ生ル也言ハ傷寒若ハ吐シ若ハ下シテ後解セス或ハ吐スルカ或ハ下スニヨツテ其裏虛ニコレニ因テ表熱胃中ニ入津液ヲムシ立五六日大便通セス又吐下スル前モ

七八日已大便秘結通塞然其胃中燥屎アルヘシ是已
ニ陽明病ノ症因也又日晡ノ時潮熱ヲ發シ又少モ惡寒
セサレ其外症コトクノ解ノ陽明ノ症タル疑ナシ又獨語鬼怪
ノハケ物ヲ見方如ク又甚キ者サシヒキアリテ發スル寸ハ人ノ差
別ナク狂ノ如ク又衣ヲナデ牀ヲサグリ又恐レテ安臥スルナク
又息ルシク喘ヲナシ目ヲ見ツメルアリカクハ如キ者ハ陽明ノ甚
シキ也然レ其脈弦ナル者ハ大承氣ヲ以下セハ生クヘシ上ノ症皆
胃實純陽少シモ帶陰ノ症ナキ故也若上ノ症ニテ其脈濇ナ
者ハ大承氣ニテ下スル死スヘシ濇ハ大虛ノ脈ニテ陽症陰脈ナ
ル故也若上ノ症ニテ其脈微又其上ニ發熱譫語スル者ハ大承
氣ノ主ル所也其脈微ナルハ胃實ニテ胃氣通セサルニ因テ微ナ
ル者ニ陰脈ノ微ナル者ニ非ル故也此但發熱譫語ノ五字穩

カナラス疑ハ誤文アルヘシ

右正文ニ章始一章ハ陽明病ノ正病正脈ヲ拳テ大承氣湯
ヲ用正法ヲ明ス後ノ一章ハ陽明病吐下後大劇ノ症ヲアケテ
大承氣湯ヲ用ル脈症ヲヒロムル也

陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞭鞭則譫語小
承氣湯主之若一服譫語止更莫復服

本編ニ曰過經譫語スル者ハ熱アルヲ以テ也ト然レハ譫語ヲ發ス
ル因多シ此症大便鞭ノ證據トスルニ足ス且津液外出テ胃中
燥者ハ蜜煎或ハ猪膽汁ノ主症ニ小承氣湯ノ主症ト大ニ
異也此等ノ章治法ニ大害アル者也

陽明病譫語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之因與承氣
湯一升腹中轉氣者更服一升若不轉氣勿更與之明日又不

大便脉反微澀者裏虛也。爲難治。不可與承氣湯也。

本編曰陽明病脉遲ト是胃實燥結ノ脉何レモ沉遲沉實
沉弦沉微ノ類ニテ流利滑動ノ象アルヘカラサル者也然ルニ滑
ハ流利滑動ノ脉況ヤ滑ニ疾者豈胃實燥結ノ脉ナランヤ且
本編滑ヲ白虎湯熱結裏アルノ脉トス是表熱始テ胃ニ入
一々燥結セサルノ脉也今胃實ノ脉トスルハ大ナル杜撰也腹中轉
氣ハ腹中氣メグリテ下ル也マサニ下利セントスルノ候也此文成
無忌カ本ニ轉矢氣ニ作ル前ノ陽明病潮熱ノ章ト同ク放屁
一也宋本ハ轉氣ニ作ル又厥陰篇傷寒四五日腹中痛テ轉
氣起少腹者此欲自利也ノ文アリ是ハ宋本成無忌氏轉氣
ニ作ルヒツキヤウ轉氣モ放屁モ皆氣ノメクリテ下ルハ同シ事也
故ニ宋本ニ從フ一説ニ轉矢ヲ轉矢ニ作ルヘシト云ハ臆説也此章

已ニ胃實ノ脉ニ非ス又小承氣湯一升ヲ与ヘ其轉氣セサルニ因
再ヒ与ヘス然レモ明日不大便トイエ氏其脉微澀ナル者ハ承
氣湯ヲ服スルニ因テ胃中益虛寒ノ難治トナル是モトヨリ命ニ
非ス誤藥ノタメニト死スル也歎スヘキノ至リ也小承氣ヲ以燥屎
ヲ誅ル一後人ノスル所ニ仲景氏ノ法ニ非ス然ルニ正文トメ後世
ニ傳ヘ其害ヲ受ル者スナカラス歎スヘキノ至リ也

陽明病譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若
能食者但譫耳宜大承氣湯下之

食スルヲアタハサルヲ以テ燥屎アリトス危カナ且譫語潮熱二症ヲ
以テ大承氣ヲ用ユル一仲景氏ノ法則ニ非ス

陽明病下血譫語者此爲熱入血室但頭汗出者刺期門隨其
實而瀉之瀝然汗出則愈

此章鍼家ノ一本編ノ陽明病ニ非ス

汗出識語者以有燥屎在胃中此爲風也須下之過經乃可下之
下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之則愈宜大承氣湯
燥屎在胃中ハ已ニ是陽明病也又過經乃可下之ト云ハ何シ
フヤ又已ニ識語ノ症アリ而又下之若早語言必亂ト云又陽
明病ヲ以表虛トシ又此爲風ト云此章即語言亂者也
傷寒四五日脉沉而喘滿沉爲在裏而反發其汗津液越出大
便爲難表虛裏實久則識語

脉沉而喘滿ハ已ニ陽明ノ症也然ルニ其汗ヲ發スル表裏寒
熱ノチガヒ也其変症何シ津液越出大便難キノミナランヤ且
陽明病ヲ以表虛トス者陰陽ニ症モ知ラサル者ノ言也

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢識語遺尿發汗則

識語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之

三陽ハ大陽陽明少陽也合病ハ三陽ノ症混合メツトナル也身重
難以轉側トハ身重ラメアチラコチラ子カエリナラヌ也口不仁ハ食
事ノ風味ヲオホエヌ也面垢ハ顔面アカツク也遺尿ハ小便ヲオホ
エス通スル也額上ハヒタイ也手足逆冷ハ手足ヒエル也裏熱ツヨ
クメ手足ヒエルハ熱厥ト云是三陽ノ病症ニトカタマリニナリテ其主
症傍症ヲ分ツヘカラサル者也腹滿身重難以轉側ト識語トハ
陽明也口不仁ト面垢ト少陽也遺尿ハ大陽ノ熱サカニメ正氣
シマリナクノスル所也是衆症混雜メ何レカ主症何レカ傍症トシ
手ヲ下ス所ナキ者也然レ其治法ニ於テ先表裏ヲ分ツヘシマ
ニ於テ汗ヲ發スルハ裏熱サカンニナリテイヨク識語ス下スハ
表熱マシク裏ニ入額上汗出テ手足逆冷スルノ変症生ス若其

後自汗出テ惡寒發熱ナキハ表症ヤシテ熱結裏ニアル也白
虎湯主之也此章實ニ甚入クミタル症也クワキハ特鮮ヲ見ル
二陽併病大陽證罷但發潮熱手足熱々汗出大便難而譫語者
下之則愈宜大承氣湯

二陽ハ大陽陽明也併ハ併蒂ノ併ノ義ニテ物ノニツナラフ也二
陽ノ併病ハ二陽ノ症始ヨリ併ヒオクル也然レ併病ハ一部ハ淺ク一
部ハカク其位地ヲ異ニス合病ハ始メ一部ノ症オコリ後又一部ノ
症オクル而メ二部ニテモ三部ニテモ皆其病ノ淺深同ク混亂スル
也此二陽ノ併病大陽ノ症ハ發熱惡寒頭痛等也陽明ノ症
ハ腹滿身重譫語等也大陽證罷但發潮熱手足熱々汗出
ト摯々ハ小雨ノ負汗ノ出ル也言ハ大陽ノ症ハ已ニヤミテ是ヨリ前
ニ潮熱アラサル者此時ニ至テ潮熱ヲ發シ又手足汗アラサル者

此時ニ至テ摯々トノ汗出ツ大便難而譫語者下之則愈トハ此ヨリ
前ノ時已ニ大便通セスメ而又譫語ス故ニ而ノ字ヲ入テ其義ヲ
示ス又前章ニ曰キ足濇然トノ汗出ル者ハ大便已ニ難也ト又曰
其熱不潮未可与大承氣湯ト然ルニ今大陽表症已ニヤミ其上
ニ潮熱ヲ發シ手足汗出又是ヨリ前已ニ大便難メ又譫語スル
トナレバタシカニ胃實ニメ大承氣湯ノ症ナルト疑フ所ナシ故ニ下之
則愈也若此時ニ於テ恐レテ下サレハ又変症出ツヘシト云キ也
下之則愈トハ下シサスレハイユル也ト云氣味也宜大承氣湯
トハ宜ハ時ノ宜キヲハカラヒテ先ツ此方ヲ与ヘテ其後ノ症ヲ見
テ治法ヲ處スルノ辞也上ノ下之則愈ト云フト相反スル者ハ言
二陽ノ併病其始大陽ノ症ハ發熱惡寒陽明ノ症ハ腹滿身
重是大陽ノ症ハ淺ク陽明ノ症ハ深ク二陽其位地ヲ異ニスレ

ハ併病ニメ合病ニ非ス其治法先ツ大陽ヲ治メ而後二陽明ヲ
治スヘシ已ニ大陽ヲ治メ惡寒發熱ノ表症ヤミ陽明ノ症又
潮熱ヲ發シ手足熱タトノ汗出又是ヨリサキニ已ニ大便難
識語スル其胃實ニ大承氣ノ症タル疑ナシコレヲ下セハ愈ユ
ヘシ宜大承氣湯然レモ其症モトヨリ混雜スレハ二陽合病ノ変症
ナルモ猶或ハカス大承氣ヲ与テ其後症ヲ見ルヘキ也

右正文二章始章ハ合病混同メ其症分別シカタキ者ヲ舉
後章ハ併病ノ胃實一途ニ歸スル者ヲアケテ其治法ヲ示ス

陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱
身重若發汗則躁心憤々反識語若カ温鍼必怵惕煩躁不得眠
若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主
之若渴飲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之若脉浮發熱渴

飲飲水小便不利者猪苓湯主之

脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重
咽燥腹滿而喘發熱汗出身重ハ陽明胃實ノ症也二惡寒
反惡熱身重口苦ハ陽明熱毒發實ノ症也其脉浮而緊ハ大
陽傷寒ノ脉也然レハ此章二陽ノ併病ト云ヘキ者也而ノ陽明
病ト云ハ何ヲヤ曰其人惡寒メ其脉浮緊ナレハ大陽ノ表症也
今此症不惡寒反惡熱其脉緊ハ陽明發實ノ變脉ニ其浮
ハ陽明水氣ノ脉也已ニ猪苓湯ノ症ヲ伏スル故也故此章陽明
胃實發實水氣ノ三症合病トナル者也故ニ陽明病ト云也若發
汗則躁心憤々反識語トハ躁ハ煩躁ノ躁アカク也憤々ハ乱也医
誤テ浮而緊ヲ以大陽ノ表脉トノ其汗ヲ發スルハ裏熱イヨク
サカニナリテ病人アガキ苦ミ其正心乱レテ憤々トノ識語ス汗ヲ發

スレハ熱解スヘキハツナルニ反テウワコトヲ發ス故ニ反ト云也若カ
温鍼必休惕煩躁不得眠トハ温鍼ハ鍼ヲアタメテサシテ寒冷
ヲ發スル也休惕ハ恐レル也煩躁ハ胸中イキレ苦シテアカク也言ハ医
又誤テ温鍼ヲカレハ休惕煩躁ノ眠ルヲ得サル変症ヲ生ス
若下之則胃中空虚客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯
主之トハ客氣ハ主客ノ客ニテ邪氣ノニワカニ發スルヲサス心中ハ胸
中也懊憹ハ云フニイワスイカントモスヘカラサル苦ミヲ云言ハ若又
下ス寸ハ胃中空虚ニナリ客氣腹中ニ發メ膈ニシキ上リ胸中コレカ
タノニ懊憹ノ苦ミ舌上胎アル者ハ下スニ因テ胃中ノ痰熱上リツク
也故ニ梔子豉湯主之也若渴飲飲水口乾舌燥者白虎加人參
湯主之トハ言ハ若カ温鍼必休惕煩躁不得眠其上ニ若渴ノ水ヲ
飲ント欲シ口乾キ舌燥者ハ熱結裏ニアリテ此症ヲアラワス也是

白虎加人參湯ノ主ル所也若脉浮發熱渴ノ欲飲水小便不利
利者猪苓湯主之トハ言ハ緊脉去テ但浮發熱渴ノ水ヲ飲ント
欲シ小便利昇ル者ハ是陽明水氣ノ症也猪苓湯之主ル所也
猪苓湯

- 猪苓 茯苓 阿膠 滑石 澤瀉 各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓内阿膠烱消渾服七合
日三服

烱消ハ煮テトラカス也此方位地ハ陽明ヲ主トリ症ハ小便不利
ヲ主ル五苓散ハ表此方ハ裏也雜病裏熱小便利セサル者及
小便血淋疾ニ用ユヘシ

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥猪苓湯
復利其小便故也

陽明病汗出多而渴小便不利ノ症ナキハ胃中燥ク者ヲ
白虎加人參湯ノ症也又陽明病渴而小便利セサル者ハ水
氣裏ニアル者シ胃中燥ト大九千カイニ猪苓湯ノ症也
小便不利ノ症ニ猪苓湯ヲ用ヒ何ゾ胃中燥クイヲ恐シヤ
後人ノ加ル所取ニダラス

脉浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之

是少陰病裏寒外熱通脉四逆湯症ヲ少陰篇ニシタアリ
陽明病ハ胃實純陽也六部ノ例モ知ラサル者ノ加ル所也

若胃中虛冷不能食者飲水則噦

噦ハ胃中虛寒ノ症也故ニ已ニ虛冷ノ又水ヲ飲ム噦ス是大
陰病也

脉浮發熱口乾鼻燥能食者則衄

是亦太陽病ヲ陽明病ニ非ス且此症何ゾ衄セン

陽明病下之其外有熱手足温不結胸心中懊憹饑不能食但頭
汗出者梔子豉湯主之

陽明病下之其外有熱トハ是陽明病下後愈ス梔子豉湯療熱
ノ症ヲ見ノ大陷胸湯白虎湯ノ症トナラサルヲ辨ス其外有熱トハ
其外熱アルヲ以其裏熱ナキヲ知其外熱アルハ梔子豉湯ノ症也
白虎湯ノ症ハ熱結裏ニアル者也手足温不結胸トハ白虎湯ノ症ハ
熱厥ノ手足ヒエル梔子豉湯ノ症ハ手足温也大陷胸湯ノ症ハ結
胸ノ梔子豉湯ノ症ハ結胸セス心中懊憹饑不能食トハ心中懊
中也懊憹ハ云フニハレ又煩悶也此症ト饑不能食ト梔子豉湯
ノ本症也白虎湯ノ症ハ其病胃中ニアル者也大陷胸湯ノ症ハ
其本胃中ニ在テ其症ヲ心下心中ニ見ス者也梔子豉湯ノ症ハ其

本伏ノ胃中ニアリトイエ氏胃中空虛ヲ以因トノ其症ハ心中見
テ胃中ハ則無事ナル者也故ニ其症必ウチ食スルイアタハサル也
白虎湯大陷胸湯ハ食スルイアタハスニ饑ルナシ但頭汗出者梔子
豉湯主之トハ頭汗出ハ陽明熱熱ノスル所ヲ梔子豉湯ノ症也大陷
胸湯ノ症頭汗出トイエ氏結胸ノ出也^ト不結胸出ハ梔子豉湯主之也
陽明病發潮熱大便溼小便自可^ト胸脇滿不去者與小柴胡湯。
是陽明病惡寒セス脉遲身重短氣或腹滿而喘潮熱ヲ發ス
ル者遂ニ胸脇滿小便不利ヲ致也^ト是胸脇滿小便不利小柴
胡ノ症タリトイエ氏然レ氏胃實ノ症ヨリ施テ致ストコロナレ
ハ小柴胡湯ノ症ニ非ス故ニ先ツ大承氣湯ヲ与テ胃實ヲ治
ス^トハ已ニ大承氣ヲ与テ胃實ノ症去テ而シ胸脇滿去ス然
後ニ始テ小柴胡湯ヲ与ル也若先ツ胸脇滿小便不利^ト而

後ニ胃實ノ症ヲ見ス者ハ其表症必ス往來寒熱ス先小
柴胡ヲ与テ而シ後ニ大承氣ヲ与ル也^ト是治法ノ先後也陽
明病發潮熱トハ惡寒セス脉遲身重腹滿ノ喘スル症アリテ
又潮熱ヲ發スル也^ト是胃實ノ症疑ナシ大便溼トハ溼ハ溼汚
ニテ大便下ル也小便自可トハ小便利セサル者通利ノ藥ヲ用ヒ
スメ自然ニ通スル也胸脇滿不去ト云ハ胸脇滿ノ症愈去サル也言
ハ陽明病胃實ノ症備リ又潮熱ヲ發スル者ハ大承氣ノ症タ
ルイ疑ナシ故ニ大承氣ヲ与テ下シ胃實ノ症皆愈テ大便
溼汚シ小便利セサル者モ胃實ノ症イエタルニ因テ自然ニヨク
通スル也但胸脇滿不去者ハ小柴胡湯ヲ与テ治スヘシイカン
トナレハ小便不利胸脇滿^ト是胃實ヨリ施テ致所トイエ氏小
便不利其位地下ナル故ニ胃實ノ去ルニシテ去トイエ氏胸脇

満ハ其位地上ナル故ニサラス故ニ小柴胡ヲ与テ治スル也問曰
此文大承氣ヲ用ヒシ後症ナルヲ見ス何ヲ以大承氣ノ後症
トスルヤ答曰不去ノ二字ヲ以大承氣ノ後症タルヲ知ル也凡
不去ト云フハ去ヘクノサラスナル辭也言ハ大承氣ヲ用ヒテ胃實
ノ症去リ大便溏シ小便モ自然ト通ノ可ナルハ胸脇満モ亦
去ヘキハツナルニ而ノサラスナル也故ニ大承氣ノ後症タルヲ知也
若大承氣ヲ用ヒサル前ノ症ナラハ胸脇満者ト云テ不去者トハ
云ハシ此文陽明病發潮熱已下之大便溏小便自可胸脇
満不去者与小柴胡湯トスルハヨクスム也古文故ニ簡古也
陽明病脇下鞅満不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯上
焦得通津液得下胃氣因和身濺然汗出而解也
是上章ニ因テ小柴胡ノ主用ヲヒロル也脇下鞅満ハ脇下力

タクミツル也嘔ハ嘔吐也脇下鞅満嘔吐舌上白胎皆表邪陽
下ニ入テ結シ其症ヲ上ニアラス也是小柴胡ノ本症也其不
大便モ胃實ノ症ニ非ス表邪脇下ヨリ上上焦ニ結スルニ因テ津
液上ニアツマリ下降セサル故ニ胃氣和セスノ大便セサル也故ニ小
柴胡ヲ与テ結スル所ノ邪ヲ解スルハ上焦通利シ津液下降
ノ胃氣因テ和スルハ周身濺然ト汗出テ解スル也此章小
柴胡ノ症ノ肝要ヲ説得テ甚明カ也凡小柴胡ヲ用ルノ目
アテトスヘシ然レハ不大便ノ症ニ因テ陽明病トイエハ津液不
和ノ不大便ニ胃實ノ不大便ニ非ス故ニ少陽病ニ陽明病
ニ非ス

陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛又按之氣不
通鼻乾不得汗晝臥一身及面目悉黃小便難有潮熱時々噦

耳前後腫刺之小差外不解病過十日脉續浮者與小柴胡湯
脉但浮無餘證者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者不治。

中風太陽ノ表症ニ他ノ陽明少陽及ヒ三陰ニワタルナシ
陽明ハ胃實ノ症ニ表症ナシ是傷寒論病道ノ大例ニ若
此例ヲ乱ルハ陰陽表裏皆混亂ノ仲景氏ノ規則廢ノ一
部ノ傷寒論無益ノ書トナル古今ニ醫聖ノ大法明カナラサル
ハ是カタメノ故也其說上篇ニ詳也且此章症ヲ述ルノ條理ナ
シ取ニ足ス

陽明病自汗出若發汗小便自利者此爲津液内竭雖硬不可
攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及大猪膽汁
皆可爲導也

此症大病後津液カワキテ大便通シカタキ者ニ本篇胃

實ノ症ト大ニ異也

蜜煎導方

食蜜七合一味於銅器内微火煎之當須凝如飴狀攪之勿
令焦著候可丸餅手捻作挺令頭銳大如指長二寸許當熱
時急作冷則硬以內穀道中以手急抱欲大便時乃去之

食蜜ハ蜂蜜也食膳ニツカウ故ニ食蜜ト云挺ハ一枝也ト
註ノ本ノ枝ノ如ク細ク長ク作ル也穀道ハ肛門也此法ハムツ
カニ今作ルハ蜂蜜三タカリヲ瀨戸物ノ楮口ニ入レ火ニカケ
アハノタツホト煮テ火ヨリオロシ楮口ヲ水ニ入テ冷シ手ニテ指
ノ大サホトニツクリ肛門ニ入ル寸ハ大便自然トヨク通ス凡大
病後又ハ老人或ハ産後一切大便久シク通セズ然レモ寒藥
ヲ以テ下スヘキ裏熱ナク又ハ少シ裏熱アリモ病人虛弱

ニテ下スヘカラス然レモ通シタキ症アル寸此方ヲ用レハ忽
通ス奇妙ノ方也

大猪膽一枚瀉汁和少許法醋以灌穀導中如食頃當大便
出

大猪ハブタ也膽ハ井也法醋ハ酢也米酢酒酢ノ二品アリ米
酢ヲ用ユヘシ猪膽漢渡アリ和ハレ也大坂及西國ハ猪アル
ヨシ漢渡ナクハ野猪膽モ用ユヘシ猪ノシノ井也

土瓜根 玉ツサノ根也指ノ大サニケヅリテ肛門ニサス也

陽明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂枝湯
是本篇ノ文ヲキリ取者論ニ及ハス

陽明病脉浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯

陽明病表症ナシ説上ニアリ

陽明病發熱汗出此為熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑至
而還小便不利渴引水漿者此為瘀熱在裏身必發黃因陳高
湯主之

陽明病發熱汗出此為熱越不能發黃也ハ陽明病ト云ハ瘀
熱胃中ニアル故也胃實ニ非ストイエ氏其位地胃中ナルヲ以
陽明病トス熱越ハ熱發散スル也發黃ハ黃疸ヲ發スル也但
頭汗出劑頭而還トハ劑ハ齊也ヒトシキ也頭ハクビ也還ハグル
也頭汗出テ其汗頭ヲヒトシクグルリトマワリテ下ハ出サル也頭
頭ハカリニ汗出テ其他ハ出ス是ヲ以瘀熱發散セス小便不利
渴引水漿者ハ水漿ハコンズ米ヲ飯ニタキアツキ内ニ冷水ニ入レ
浸ス一五六日ナレバ白花ヲ生ノ味酸シ是ヲ水漿ト云渴スル
故ニオリク水漿ヲノム也此為瘀熱在裏身必發黃因陳

葛湯主之。トハ言ハ陽明病瘀熱胃中ニアル者若其人發熱、
汗出、寸ハ瘀熱發散、其症愈、若但頭汗出、周身ハ汗ナク、其
汗劑頸而還、リ又小便利セズ、渴、水漿湯茶ヲ多ク飲者ハ
是瘀熱發散セズ、裏ニアル故ニ其瘀熱一身ヲムシ立テ發黃
ノ症トナル、茵陳蒿湯ノ主ル所也。

茵陳蒿湯

茵陳蒿 六兩

梔子 十四枚

大黃 二兩

右三味、以水一斗二升、先煮茵陳、減六升、內二味、煮取三升、去滓、
分三服、小便當利、尿如皂莢汁狀、色正赤、一宿腹減、黃從小便去
也。

皂莢汁ハサイカチノサヤヲセシタル汁也、此方位地ハ陽明ヲ主リ
症ハ黃疸ヲ主トル、純陽ノ症ニヨシ、帶陰ノ症ニ用ルナカレ

陽明證、其人喜忘者、必有畜血、所以然者、本有久瘀血、故令喜
忘、尿雖鞭、大便反易、其色必黑者、宜抵當湯主之。

此症諸症愈テ後、但瘀血ノ一症アル者、ニ本篇ノ陽明病ノ
類ニ非ス、然レモ症ヲ説フ頗ルクワシク、後世瘀血ノ症ヲ云フ
者多クハ此ニ本ツク

陽明病下之、心中懊憹、而煩、胃中有燥屎者、可攻、腹微滿、初頭
鞭後必澹、不可攻之、若有燥屎者、宜大承氣湯。

下ノ後、心中懊憹、而煩ル者ハ本篇梔子豉湯ノ症トス、是
ヲ以燥屎ノ候トスルハイマ夕聞サル所也、又若有燥屎者、宜大
承氣湯ト云テ症ヲアゲズ取ニ足ス

病人不大便五六日、繞臍痛、煩躁、發作有時者、此有燥屎、故使
不大便也。

煩躁ハシモンアカク也發作有時ハ病人煩躁スル毎時
刻アル也常ニ靜ニテ其時刻ニナレハオコル也發作ハオコル
也是ヲ以燥屎ノ候トスル仲景氏ノ法ニ非ストイエモ亦一
擷トナスヘシ然レモ身重腹滿短氣潮熱譫語等ノ陽明ノ
諸症ヲ考ヘ合テ其症ノ輕重ヲ審ニシ而後ニ藥方ノ輕重
ニカケ合ヒテ治法ヲ處スヘシ此章冒首ト餘症ト藥方ト
ヲアゲス規則トスルニ足ス予治ス一男子年十六傷寒十五
六日惡寒已ニヤントシ獨熱往來舌胎黃燥腹脹臍ヲ
メクリテ痛發作スル寸ハ煩躁譫語頗ヨク食シ其脉沉
与、大柴胡湯燥糞ヲ下ス一二次ニモ安シ

病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脉
實者宜下之脉浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜

桂枝湯

汗一サニ出ントスル寸ハ煩モシ發熱シ而ノ汗出レハ其病解スト云ハ
キユタル也然レ上ニ其症ヲアゲズ突然トノ病人煩熱汗出
レハ則解ストバカリニテハ其本症ヲ知レカラス又如瘧狀トハ寒熱
ノサシヒキアル譬也然レ日晡所發熱ハ熱バカリナレ瘧狀ニ非
ス又日晡ニサス熱ハ潮熱ヲ發熱ニ非ス又桂枝湯ノ脉ハ浮弱
ニシ浮虛ニ非ス弱ト虛トハ大ナルチガイ也大承氣湯ノ熱ハ潮
熱ヲ發熱ニ非ス此章ハ素人ノ加タル者ナルヘシ

大下之後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以
然者本有宿食故也宜大承氣湯
病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥
屎也宜大承氣湯

喘冒ハ喘息鬱冒ニテ息クルシク逆上スル也此二章モ胃實ノ諸症アリテ其上ニ大承氣ヲ与フヘシ

食穀欲嘔者属陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者属上焦也

穀ハ穀食ニテ飯也此章茵陳蒿湯ノ章ト一章也然ルヲ後人其間ニ上ノ六章ヲ加フ故ニ章旨明カナラサル也茵陳蒿湯ノ症ハ瘀熱胃ニアル者也此症ハ久寒胃ニアル者故ニ此ヲ舉テ茵陳蒿湯ノ疑症ヲ辨スル也言ハ設黄ノ症頭汗出小便不利渴引水漿者ハ是瘀熱胃ニアル者茵陳蒿湯ノ症也又發黄ノ症穀ヲ食メ嘔セント欲スル者ハ是久寒胃ニ在テ穀ヲ安セサル者吳茱萸湯ノ症也属陽明トハ寒熱異也トイエ氏其病ハ同胃中ニ在テ陽明ニ附属スル也得湯反劇者属上焦也トハ言ハ若吳茱萸湯ヲ服シ得テ其病反テ甚キ者ハ久寒胃ニ在テ陽明ニ

属スル者ニ非ス是梔子豉湯ノ症ノ瘀熱上ニ在テ其位地上焦ニ属スル者也梔子豉湯ノ症ハ頭汗出心中懊憹而ノ嘔セント欲スル者也

吳茱萸湯方出少陰篇

大陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉属陽明也小便數者大便必鞭不更衣十日無所苦也渴欲飲水少少與之但以法救之渴者宜五苓散

此章症ヲ序スルヲ混雜解スヘカラス又強テ解スルモ益ナシ

脉陽微而汗出少者爲自和也汗出多者爲大過陽脉實因發其汗出多者亦爲大過大過爲陽絕於裏亡津液大便因鞭也此章論テ皆淺近ニテ取ニ足ス又解スルニ及ス且陽絕於裏トハ

汗多キニ因テ陽氣不足スル意也

脈浮而芤浮爲陽芤爲陰浮芤相搏胃氣生熱其陽則絶

此章註解ノ文ノ誤テ本文トナルナルヘシアトモサキモナキ也

跌陽脈浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便則難其脾爲約麻仁丸主之

跌陽ノ脈ハ足ノ跗上ニアリ脾胃ノ脈也浮ハ則胃氣強シトハ浮ハ熱アル脈也故ニ胃氣強シトス濇則小便數トハ津液カワク脈也故ニ小便數ナルヲ知ル浮濇相搏大便則難其脾爲約トハ熱アリテ又小便數ニ津液カワク是浮濇相搏也熱有テ津液カワク故ニ大便難シ約ハ約束ノ約脾ハ胃ノタメニ津液ヲメクラス者也今胃強フメ其津液ヲ約束メ脾ノクラスヲ得サル也

麻仁丸

麻子 二升

芍藥 半斤

枳實 半斤

大黃 一斤

厚朴 一斤

杏仁 一斤

右六味爲末煉蜜爲丸桐子大飲服十九日三服漸加以和爲度

此方大病イエテ後津液カワキテ大便通セサル者及老人症積大便久ク通セス腹脹痛スル症ナトニヨシ

大陽病三日發汗不解蒸々發熱者屬胃也調胃承氣湯主之

蒸々ハムシ立ルヤウナル熱也大陽病三日ノ内汗ヲ發シ汗出テ其症解セス其熱ムシ立ル如キハ已ニ陽明ニ入テ胃實トナルヘキ也故調胃承氣湯ヲ与テ胃中ノ結熱ヲ下スシト云フ也然レ大陽病ワスカ三日ニメイマタ胃ニ入ル時ニ非ス且本編ニ曰

柴胡ノ症仍在者ハ復与柴胡湯此雖已下之不爲逆必煎
煎振却發熱汗出解スト是煎々トノ發熱スル大陽病ニ
陽明ニ非ル明カ也

傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯

吐後腹脹滿スル者其症因種々也然ルニ毒熱胃中ニ在ヲ審
ニセズメニワカニ調胃承氣湯ヲ用ルハ人ヲ反掌ニ殺スノ術前
章ト異ナラス

大陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便因鞭者與小承
氣湯和之愈

津液乾燥ノ大便鞭者ハ蜜煎導ノ總ナルニシカス

得病二三日脉弱無大陽柴胡證煩躁心下鞭至四五日雖能
食以小承氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣湯一升

若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭鞭後必澹未定
成鞭攻之必澹須小便利屎定鞭乃可攻之宜大承氣湯

大陽柴胡ノ症ナク煩躁心下鞭之故ニ此ニツヲ以陽明ノ症ト
ノ小承氣ヲ用ル也然レニ二症ノ内煩躁ハ陽明ニアレ心下鞭ハ陽
明ニ非ス陽明ハ胃中ヲ以本トスル故ニ腹滿ヲ其症ト心下ハツ
カラズ然レ煩躁一症ヲ以小承氣ヲ用ル杜選甚シトス且己小
承氣ヲ以小シ安カラシメテ六日ニ至テ承氣湯一升ヲ与ル何ツヤ
又小便利屎鞭ハ津液乾燥ノ症也然レニ又大承氣ヲ用ル逆
治キワル亦前章ノ類也

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者
此爲實也急下之宜大承氣湯

目中不了了ハ眼中サワヤカナラサル也睛不和ハクロマナコハツキ

リトセサル也此症胃實ニ似タリ但大便難ナレハ下スヘキニ似タリ
然トモ脉狀ヲ審ミテ小承氣ヲ用ユヘシ
傷寒發熱汗多者急下之宜大承氣湯

傷寒汗多者恐ハ表症猶解セサルヲアルヘシ説上ニアリ然レニ急ニ下スト
云ツサシ甚シ

發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯
腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯

右二章脉狀陰陽ヲ論セス所謂隨症ノ治法又人ヲ殺ノ術
陽明少陽合病必下利其脉不負者爲順也負者失也互相尅
賊名爲負也脉滑而數者有宿食也當下之宜大承氣湯
陽明主少陽ハ木也木尅土ニテ其氣相和セズ陽明少陽
ノ合病必下利スルハ和セサル故也若陽明主少陽ノ木ニ不

負者ハ順也負者失也トハ木賊ニ尅セラレテ土氣ノ正ヲ失
スル也此章負也マテヲ一章脉滑ヨリ以下ヲ又一章トス且五
行ヲ以論ヲ建及脉ヲ以症ヲ論スル者皆本篇ノ例ニ非ス

病人無表裏證發熱七八日雖脉浮數者可下之假令已下脉
數不解合熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血宜抵當
湯若脉數不解而下不止必協熱而便膿血也

無表裏證トハ表ニ大陽ノ惡寒發熱身疼痛等ノ症ナク裏
ニ腹滿短氣等ノ胃實ノ症ナキ也發熱七八日雖脉浮數者可
下之トハカクノ如キ者ハ下スヘシト云フ也此一節杜撰ノ内ノツサン
也夫已ニ病人表裏ノ證ナシト云然レハ發熱ノ脉浮數ノ者ハ
表症也表症ナクハ此熱ト此脉トイツクシカアルヤ又已ニ裏症
ナシト云然ルニ又可下之ト云夫下スハ裏症アルカタメ也已ニ裏

症ナクハ何ヲ目アテトノ下サシヤ且發熱ノ脉浮數ナルハ顯
然タル表症也。是病表ニ在テ而ノ裏ヲ攻ル也。且是ヲ以其裏
虛トナリ表熱虛ニ乘ノ裏ニ入リ遂ニ難治トナル。論スルニ及
ハス後人ノ加章其害多キ。上篇以來論スルカ如シ然レハ此篇
五六章ニ至テハ實ニ人ヲ殺スノ術ヲ其害極ル。亂道ト云ヘシ
又熱則消穀善飢至六七日不大便ノ者何ヲ以テ瘀血ノ症
トシ抵當湯ヲ用ルヤ狂妄ノミ

傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕在裏不解故也。以爲
不可下也。於寒濕中求之。

於寒濕中求之トハ方書ノ寒濕門中ニ於テ藥方ヲ求テ治
スヘシト云フ也。匠書ノ病門ヲ分テ方藥ヲ列スル者ハ唐ノ孫
思邈カ千金方ヲ始トス。隋ノ巢元方カ病源候論病門ヲ

分ツトイエ氏方藥ナシ肘后方ハ晉ノ葛稚川トイエ氏ワスカ數
十方也。金匱要畧ハ仲景トイエ氏偽撰也。其他ノ匠書多シ
トイエ氏皆東晉以後ノ作也。然レハ於寒濕中求之ト云ハ唐
以後ノ人ノカキ加ル所ナルヘシコレニ由テ考レハ後人加章ノ至テ
バザナル者ハ唐以後ナルヘシ書物ヲ板行ニスルハ古代ハナク唐
ニテ始ル。唐ニテ始ルトイエ氏天下ニアマ子クナルハ年ヲ經テ一也。故ニ
唐以後マテモ多クハ寫本也。其寫本ニ自身ノオホエカキヲナ
シヲキタルガ後ニハ本文ト混雜シタルヲ後世ニ及ヒ校正スル人ハ
古ヲ存スルヲ專トメ不審ナル疑アリテモ敢テ非議セス終ニ
本文トナリタルナルヘシ然レハ匠書ハ大事ノモノニテ一章アヤマリ
アレハ天下後世其害ヲ受ルヲ限リナシ況ヤ傷寒論ハ古今ノ
尊信スル所也。匠人病ニノミ是ヲ以テ治法ヲ斷セハ誰カ敢テ

非議スル者アランヤ然ルニ其杜撰右ニ論スルカ如シ及ヲ以人ヲ殺
ニ異ナラス夫歷代ノ諸賢誰カ傷寒論ヲ讀サル者アラン況
註解ヲスル人亦多シ而一人ノ偽章ヲ議スルナシ條辨尙論
篇ハ編次スル一再三及ヘ氏終ニ偽章アルヲ知ラス皆以テ本文
トノ牽強ノ解ヲ作り杜撰ヲ後世ニツタエ其害ヲ受ル者イヨク
多シ長歎息スヘシ然レ氏古書ヲ芟刪スルハ容易ナラサル一也
古道ノ明カナラサルヲ多クハコレガタメ也且人心同カラサル一而
ノ知シ何シク一人ノ見ル所ヲ以古今ノ是非ヲ定メンヤ故ニ古書
ノ善惡ハ並傳テテ其取舍ノ如キハ後ノ人ニカスヘシ是古ノ道
也歷代ノ諸賢敢テ非議セサル一ハ或ハ此道ニヨルナルヘシ然リ
トイエ氏天下後世其害ヲ受ルヲ限リナシ是ヲ知テ告サルハ
不仁也故ニ予已ニ特解ヲ梓ニ施シ今又此書ヲ著メ明カニ世

間ニツグ同志ノ人熟察ヒヨ

傷寒七八日身黃如橘キツ子色小便不利腹微滿者茵陳蒿湯主之。
傷寒七八日トハサキノ茵陳蒿湯ノ章ハ瘧熱ノ症具ル故ニ陽明
病ト云此章ハ瘧熱ノカロキ者故ニ傷寒ト云七八日ハ其位地大
柴胡湯ト同シ身黃如橘キツ子色トハ橘キツ子ハミカン也夕チハナト云ハ
誤也如橘キツ子色ハ其身ノ色ミカンノ如ク也小便不利腹微滿ハ瘧
熱裏ニアル故ニ小便利セスノ腹少滿ル也頭汗出渴引水漿
ノ症ナシトイエ氏其瘧熱裏ニアルハ同シ故ニ茵陳蒿湯ノ主ル
所也

傷寒身黃發熱梔子蘗皮湯主之。

是瘧熱ノ輕症也

梔子蘗皮湯

梔子 十五箇 甘草 一兩 黃蘗 二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服
傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連軀赤小豆湯主之

此章註解ニ及ス

麻黃連軀赤小豆湯

麻黃 二兩 赤小豆 一升 連軀 二兩 杏仁 四十箇

大棗 十二枚 生薑 二兩 生梓白皮 斤 甘草 二兩

以上八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取三升去滓分溫三服半日服盡

潦ハニワダツミノ雨ノ庭ニタリタル水也梓ハ和名アカラカ

シハ一名三角カシハ一名テウシノ木賀一名サイモリバ

一名原桐一名ゴサイハ一名アカキリ一名アカノ美濃一名アカ

カシ濃梓ハ木王ニテ衆木ノ内ノ王也梓宅中ニアレハ雷オチズ
家内ニアレハ家内ノ雷ヨケ也生梓白皮ハ梓ノナマ皮ノ白キ所
也梓ヲ木サゲト云ハ誤也木サゲハ楸也此方位地ハ陽明
ヲ主リ其症ハ黃疸ノ汗ヲ發シ小便ヲ利シ氣ヲ下スヲ
主ル

右正文五章始ノ一章陽明病其症混雜ノ者三途ノ症ニ分
ルヲ舉ニ章ハ下後瘀熱ノ症トナルヲアグ三章ハ下後却テ
半裏ノ症トナルヲアグ四章ハ瘀熱ノ本症ヲアゲ五章ハ瘀
熱ノ輕症ヲアグ全篇十章種々變症アリトイヒ陰症及
帶陰ノ症ナシ是陽明ハ純陽劇症タルユエン也萬一少モ帶
陰ノ症アルハ即陽明病ニ非ス是學者ノ會得スヘキ所也

傷寒論國字辨卷之八

傷寒論國字辨卷之八
（以下為正文內容，因字跡模糊，無法完整辨識）

傷寒論國字辨卷之九

尾張

淺野徹元甫 著

少陽病篇

少^セハ^イ靜^{セイ}衰^{サイ}也陽ハ陽病也靜衰トハ其病勢ノオトロヘシツカナル也
陽病トハ實熱症ニテ陰症ナラサル也大陽病ハ陽病ノサカンナル
者也陽明病ハ陽病ノサカンナルノ至極スル者也少陽病ハ陽病
ノ勢少シオトロヘテ其症シツカナル者也夫大陽病ハ其脉浮緊^{キキ}
其惡寒^{シヨク}啻々其惡風^{セキ}漸々其發熱^{キウ}翕々其症皆サカンナル者
也然ルニ大陽病解セス少陽ニ入ル寸ハ浮緊ノ脉^{チン}沉緊^{キン}トナリ啻
啻ノ惡寒翕々ノ發熱^{モク}變^シメ往來寒熱トナル而^モ默々^{モク}トシ飲
食ヲ欲セス或ハ脇下^{カウ}鞭滿^{ビン}等其症皆靜衰ナル者也故ニ是
ヲ少陽病ト云也大陽病ハ其症表ニアリ故ニ其病狀サカン也

少陽病ハ己ニ半裏ニアリ故ニ其病狀シツカ也然レ氏其病己ニ裏ニ入ル故ニ其治法ハムツカシキ也又傳經ノ次序ハ大陽ヨリ陽明陽明ヨリ少陽ナレ氏大陽ヨリ陽明へ傳ル者ハ至テ少陽少陽へ傳ル者多シイカントナレハ大陽病或ハ汗ヲ發シ或ハ下利ニ其他種々ノ苦痛多シ因テ陽氣多クハ不足スル故ニ格別稟賦壯實ノ人ナラデハ陽明胃實ノ症ハナラズ多クハ少陽病トナル也然レ氏少陽病ハ陽病ニテ陰症ハ非ス但帶陰ノ症アリヤスキ也

少陽之爲病口苦咽乾目眩也
少陽之爲病ノ爲ノ字成本及ヒ坊間ノ小本トニナキハ誤也宋本及ヒ千金翼ニアリ故ニ今從之。口苦ハ口中ニガキ也咽乾ハノドウルヲヒナクカワク也目眩ハ目マヒ也

章ニテ少陽病ノ必スアル所ノ症ヲアケタル也凡少陽病ハ表熱胸脇心下ニ入テ其症ヲ上ニアラワス者也故ニ口苦咽乾目眩アルハ少陽病ノ本症也

少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚

中風ハ大陽病ノ表症也少陽病ハ表熱己ニ半裏ニ入ノ症也故ニ少陽ノ中風ト云フハ本編ノ例ヲ知ラサル也且兩耳無所聞目赤胸中滿而煩スルハ皆表熱胸脇ニ入テスル所ニ少陽病ノ症也中風ニハ以上ノ症アルナレ悸ハ動悸驚ハ驚馬狂此症ヲ吐下スルハ悸而驚スルノ變症ヲ生スト云フ也傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則譫語此屬胃不和則愈胃不和則煩而悸

頭痛發熱ハ大陽ノ症也但脉弦細ナルヲ以少陽病トス是肝
ハ木ニ属スルノ義内經ノ説ニ本編ノ例ニ非ス又大陽病ニ識
語アリ何シハ此一症ヲ以陽明ニ属ストセンヤ皆本編ノ例ニ非
ス

本大陽病不解轉入少陽者脇下鞭滿乾嘔不能食往來寒熱尚
未吐下脉沉緊者與小柴胡湯若已吐下發汗溫鍼識語柴胡證
罷此爲壞病知犯何逆以法治之

本大陽病不解轉入少陽者トハ大陽病ノトキ療治ヲスレモ其
病解セス遂ニ少陽ニ轉入スル也轉ハウツル也少陽ニ轉入スルハ大
陽病ノ頭痛發熱身疼腰痛等ノ症ヤムテ少陽ノ症ヲアラハス
ヲ云脇下鞭滿トハ脇下ハワキノ下也鞭滿ハカタクミツル也乾嘔
ハカラエツキ也往來寒熱ハ子ツトサムケノサレヒキ也言ハ大陽

病ノトキ其病解セス其邪少陽ノ部ニウツリ入ルハ其裏ハ脇下
鞭滿乾嘔ノ食スルヲアラハス其表ハ寒熱往來其脉ハ大陽ノ
浮緊ヤムテ沉緊トナルハ是表熱脇下ニ入テスル所ヲ少陽ノ
本症也然レモ已ニ吐シタリ下シタリタル上ニ右ノ症ヲアラハ
ス者ハ其吐下ノ逆治ヨリ来ルナレハ其由テ来ルユモノヲ察メ
治法ヲ處スヘシモシ尙未吐下右ノ症ヲアラハスハ少陽ノ
本症ニ疑ナシ小柴胡湯ヲ与フヘシ若已ニ吐下發汗溫鍼識語
柴胡證罷此爲壞病トハ柴胡ノ證ハ往來寒熱脇下鞭滿乾
嘔ノ不能食脉沉緊也壞ハクスル也吐下發汗溫鍼ノ其病ヲ
イヤス一アタワスカエツテ種々變症ヲ生スルハ吐下發汗溫
鍼ヲ以其本症ヲツキ壞ス也故ニ是ヲ壞病ト云知犯何逆
以法治之トハ何逆トハ何ノ逆治也古人ノ法ニヨツテ療治

ヲスルヲ順治ト云古人ノ法ニヨラスムリナル療治ヲ逆治ト云吐下
發汗溫鍼氏ニ其症ニ的中スル順治也其症ニ的中セズ反テ變
症ヲ生スルハ逆治也杞ハフレオカス也以法治之トハ本編ノ治法
ヲ以テ治スル也言ハモシ已ニ吐下發汗溫鍼ノ其症解セサルノミナラ
ス反テ其本症ヲツキクスレテ柴胡ノ證ヤムテ名狀スヘカラサル者
ハ是ヲ壞病トスカクノ如キ者ハ其脉症ヲ熟察メ吐下發汗
溫鍼ノ内何ノ逆治ナレ杞タルヲ知テ其脉症ノ陰陽表裏ヲ
審カニテ是ヲ本編ノ治法ニ合セテ治スル也問テ曰此章ノ脉症
ハ少陽病ノ本症也小柴胡湯ハ此脉症ノ主方也然レ此文
小柴胡湯主之ト云ヘキハ何ゾ也然ルニ與小柴胡湯ト云フハ何ゾ
ヤ答テ曰少陽病ノ脉症脇下鞭滿乾嘔不能食往來寒熱
ノ三症ノミナラス大陽病ヨリ少陽ニ轉入スル者大陽ノ症イマ

タヤサル者ハニセハニセ也少陽ノ症ニ三ヲアラワス者アリ或
ハ少陽ノ症已ニセハニセ大陽ノ症イマタニセヤサル者アリ故ニ
少陽ノ治法已ニ大陽篇ニ備ル此篇ハ但少陽ノ本症ノミヲ舉
テ法則ヲ示サントス故ニ右ノ三症ニトマル也學者少陽ノ治法
ヲ審ニセント欲セハ大陽篇ノ少陽ニ及フ者ヲ參考スヘシ故ニ
與ト云テ主之ト云サル也

三陽合病脉浮大上関上但欲眠睡目合則汗

三部ヲ以脉ヲ論ス本編ノ例ニ非ス且症ヲ序スル具ス又治
法ナシ取ルニ不足

傷寒六七日無大熱其人躁煩者此爲陽去入陰故也

無大熱ハ表ニ熱ナキ也躁煩スルハ熱裏ニ入ル也是其病三
陽經ヲ去テ三陰經ニ入ル故也是傳經ノ說也

傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此為三陰不受邪也

是亦傳經ノ説也其人反能食而不嘔ヲ以三陰邪ヲ受ストス然レ氏本編ノ例大陽少陽氏ニ嘔アリ是其例合サル所也傳經ノ義上篇ニ見ヘタリ

傷寒三日少陽脉小者欲已也 是亦同上
少陽病欲解時從寅至辰上 説見上

大陰病篇

大陰病ハ三陰ノ始也其病寒冷胃中ニ在ヲ本トノ諸症ヲアラハシ胃ノ外ハ猶陽ナル者也陽明病ト大陰病ト其位地ハ同ク胃中也而ノ陽明病ハ毒熱胃中ニ在テ内外皆熱夕トエハ烈夏火入日ノ如シ大陰病ハ寒冷胃中ニ在テ其外皆陽昼ノ月ノ天中

ニカ、ルカ如シ故ニ其症腹滿テ吐シ食不下或ハ腹痛下利スルノミヲ少陰病ノ内外皆寒ニ手足厥逆下利清穀等ノ症ノ如クナラス六部ノ順ハ大陽ヨリ陽明陽明ヨリ少陽少陽ヨリ大陰ナレ氏人ノ生質ニ強弱アル故ニ病ノ變化ハ定タルナシ陽氣ツヨキ人ハ大陽ヨリ陽明ニウツリ或ハ少陽ニウツル或ハ少陽ヨリ大陰ニウツルモアリ陽氣弱キ人ハ大陽ヨリ直ニ大陰ニウツルモアリ又逆治ヲ犯セハ大陽ヨリ大陰或ハ少陰厥陰ニモウツル也又始メヨリ大陰病少陰病アルモ勿論也トカク六部ノ次序ニハカ、ワラス其症ヲアラハセハ其部ノ病トメ治ヲ施スヘシ又四時外邪ノ腹痛下利又夏月冷物ニアテラレテ腹痛吐瀉ノ輕症ナトモ皆大陰病也又痢疾痲瘡ナトハ大陽ヨリ大陰ニウツルヲ殊ニ多シ凡大陰病ノトキハヤク溫藥ヲ用レハ少陰ノ死症ニ至ラス然レ氏モト陽病ヨリ変シ来テ熱症多

キ中ニテワスカノ陰症ヲ見出テ温藥ヲ用ルハ至テカタキ也
初学深ク察スヘシ
大陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸
下結鞭

大陰之爲病トハ大陰ノ位地ニ於テ病者ト云カ如シ腹滿而吐
食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結鞭トハ寒冷胃
中ニ在テ腹氣メラス故ニ腹滿又上ニ逆メ吐キ食ノドニ下ス
其上ニ自然ト下利ノ其病マズク甚ク時ニ腹痛スル也是皆
寒氣胃中ニアルヨリ生スル所也然ルニ医其病因寒ヨリオ
ユルヲ審ニセス陽症トシ寒藥ヲ以テ下スハ胃中マズク虚
シ客氣上逆メ必ス結鞭ス結鞭ハ結聚ノ堅鞭也腹中虚寒
ノ症ステ胸下結鞭スルヲ多シ陽氣虚メ運行セサル故也此章

大陰病ノ總目章也

大陰中風四支煩疼陽微陰澁而長者爲欲愈

大陰病ハ胃中寒冷ノ症也中風ハ太陽ノ表症也二症陰
陽表裏ノチカヒ也說前ニアリ

大陰病欲解時從亥至丑上

内經ノ説也

大陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯

大陰病ハ胃中寒冷アリテ諸症ヲ生スル也タトヒ表症アリ
氏先ツ裏ヲ救テ而後ニ表ヲ治スヘシ是仲景氏一定ノ大決也
若裏症ナクハ但桂枝ノ症ニ脉浮ナル者ハ太陽病ニシ大陰病
ニ非ス後人ノ如ル章本編ノ例ヲ知ラサルノニ非ス表裏陰陽モ
分ケル者也

自利不渴者屬大陰以其藏有寒故也。當溫之宜服四逆輩。
自利ハ自然ト其病ニテ下ル也オホエナシニ下ルハ非ス下利ノ
渴スル裏ニ熱アル也下利ノ渴セサルハ大陰病ニテ裏ニ寒アル
ヲ以テノ故也其治法アタムヘシ其藥方ハ四逆湯ノ類ニ宜キ
也輩ハ類也。是後人ノ加ヘテトイエ氏大陰病ノ陰病タルヲ
知レリ然レ氏裁ヲ以テ論スルハ本編ノ例ニ非ス

傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在大陰大陰當發身黃若小便
自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以
脾家實腐穢當去故也。

此章始ヨリ七八日ト云マテ已ニ陽明篇ニ出ツ誤文アルト見
タリ大陰ハ胃中寒冷ノ症ナレハ發黃スヘキ理ナシ陽明篇ニ
アルカ宜キ也脾家實シ腐穢當去トハ言ハ若小便自然ニ

ヨク通スル寸ハ濕熱サル故ニ發黃セス且病人暴煩モ下利
一日二十數行トイエ氏其下利自ラ止ヘシイカントナレ其入小
便自然ニヨク通スル已ニ水道ヨクメグル也水道ノ脾家ヨク
調フ也脾家トノヒ實スレハ腐穢ノ物ハ去ヘキ也腐穢サレハ
下利ハ自然ニ止ベキハツト云フ也此脾家實ノ腐穢去ト云ハタ
カハサル也凡傷寒雜病ハ脾胃虛寒ノ腹脹大便久ク通セ
ヌ症ニ附劑ヲ用レハ大便大ニ瀉シ腐穢ノ物浮ツキテ大便
調フ也予オリク治驗ヲ得タリ若此症ニ大黃ヲ用レハ不治ト
ナル也

本大陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬大陰也。桂枝加芍藥湯
主之。大實痛者桂枝加大黃湯主之。

本大陽病トハ大陽ノ表症發熱惡寒等アルヲ云医反下之トハ

凡大陽ノ表症アル者ハタトヒ裏症アリ氏マツ表症ヲ解メ而後ニ
下スシ是一定ノ法也然ルニ表ヲ解セズニツ下ス故ニ反テ下之ト
云也因雨腹滿時痛者属大陰也桂枝加芍藥湯主之トハ爾
而ト同シ誤テ下スニ因テ胃中虚シ微寒胃中ニアリ故ニ腹滿テ
時ニ痛也是大陰ノ位地也然レ氏是モト大陽ノ陽邪誤下ニ因
テ来リ且吐利等ノ陰症ナク但滿テ痛ノミナル故ニ大陰病ノ正ニ
非ス其位地同キニ因テ附属スル也是桂枝加芍藥湯ノ主ル所也
大實痛者ハ桂枝加大黃主之トハ反テ下スニ因テ表熱裏ニ入テ結
實ノ大ニ痛者ハ是陰症ニ非ス故ニ大黃ヲ加テ結熱ヲ下ス也大陰
病ハ陰症也然レ氏誤下ニ因テ表熱胃中ニ入實滿スルノ変症也
故ニ治法モ亦隨テ変ス猶少陰篇ニ大承氣湯アルカ如シスヘテ
陰陽二症ハ病ノ大綱也故ニ三陽ニ陰症アリ三陰ニ陽症アリ

治法ノ变化アルエシ也

大陰爲病脉弱其人續自便利。設當行大黃芍藥者宜減之。以
其人胃氣弱易動故也。

前章ノ註解アヤマツテ本文ニ混スルナルヘシ

桂枝加芍藥湯

於桂枝湯方加芍藥三兩

桂枝加大黃湯

於桂枝湯方加芍藥三兩大黃一兩

傷寒論國字辨卷之九
終
傷寒論國字辨卷之九
終



