

病回精義

三

ヤ 9

1161

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

79
1161
2

病因精義目次

卷之二 初篇下

原病第六

自然良能

卒中第七

豫防法

痲病第八

言語蹇澀

癰瘰第九

頭痛第十

病因精義

卷之二 初篇下



91-2022

病因精義卷之二

桃塢小森先生講述 男 桃郭義真筆記

原病第六

凡病以二生焉。由一見焉。生之謂機。見之謂證。機者所以成病也。證者所以徵機也。觀證而後察機。察機而後治法出。治法出而後療術定焉。處方立焉。是故辨二知一。醫之先務。而觀察詳明治療之本也。二者何因。與體之謂也。一者何。自然良能是也。○因有二等。曰遠因。曰近因。是也。遠因者。病之所由來。而近因者。所以生也。此有四種之別。



曰、内傷外傷稟質時運是也。近因者、遠因之所聚成而機之所起原也。機發而證出焉。治療之所標的、一在于此、不可不詳矣。

因ハ猶齒ノゴトシ。病ノ藉テ生ズル所ナリ。然ドモ因異ニシテ而テ證同キ者アリ。證異ニシテ而テ因同キ者アリ。誤リ見ルベカラズ。蓋シ此二ノ者ハ則稟賦ノ厚薄、受生篇及血液ノ性質、血液篇人人均キテ能ザルヨリ變化シ来ルナリ。○遠因ハ病ノ由テ来ル所ナレドモ。現ニ茲ニ在テ而テ認得ベキ者ニハ非ズ。但コレヲ問ヒ或ハ推テ而テ考知ベキナ

リ。○内傷トハ攝養不節若クハ苦神勞情等ヨリ来ルヲ謂ナリ。○外傷トハ打撲撞傷若クハ毒蟲咬傷等ヨリ来ルヲ謂ナリ。瘡毒ヲ傳染スルガ如キ亦類ナリ○稟質ニ凝固ト流動トノ二ヲ別ツ。凝固トハ藏府筋脈骨膜等ノ造成不良ナルカ。若クハ強弱ノ過不及アルヨリ来ルヲ謂ナリ。流動トハ血液ノ性質及虛實ニ由ルヲ謂ナリ。先天ノ遺疾モ亦類ナリ○時運ニ時候非節流行感應ノ四等アリ。時候トハ尋常ノ風寒暑濕ノ氣ニ犯サルルヲ謂ナリ。非節トハ不時ノ冷暖或ハ淫雨暴風等ヲ謂ナリ。流行トハ疫厲痘疹ナドヲ發スベキノ時

氣ヲ謂ナリ。感應トハ。飲食起居勞情過房等ニ因テ。元氣ノ運行失常スル所アルニ當テ。偶又時候ヲ犯シ。其時氣ガ其人固有ノ氣液ノ質ト。内外相感シテ而響應シ。相結ンテ病因トナルヲ謂ナリ。○近因ハ前ニ云所ノ諸因ノ為ニ。我體中ノ凝固質。或ハ流動質ヲ損害セラレテ。而テ某ノ病證ヲ著見スル。其機ノ在ル所ヲ指テ言。直ニ其患者ニ就テ認得ズンバアルベカラザル者ナリ。設者感冒ノ如キ。其遠因ハ則時運ナリ。然トモ其以テ頭痛發熱惡風寒鼻鳴テ清涕ヲ流シ。聲濁テ粘痰ヲ吐シ。或ハ嘔シ。或ハ欬ス

ル等ノ諸證ヲ發スル所ノ者ハ。則皆是其表發ノ蒸氣ガ閉塞セラレテ。モハヤ體外へ驅泄スベキ所ノ老敗無用ノ剩液ガ中ニ鬱溜スルトイフ近因ノ致ス所ナリ。而ノ治療ノ的候トスル所ハ則其閉塞セ_ル蒸氣ヲ開達スルニ在テ。香竈疏解ノ劑ヲ與ハ。或ハ薑酒蔥粥ナドヲ飲食シ。更ニ温覆シテ微汗ヲ取レハ則愈ユ而テ其遠因ノ如キハ。則敢テ拘ルベキニ非ズ。然トモ亦喻者喘家ノ如キ。其近因ヲ論スレバ。則肺及氣管ニ酷厲物が鬱滯畱著シテ所在ノ白脈ヲ刺戟スルニ出ルナリ。故ニコレヲ治スルノ要ハ。則其酷厲ヲ緩和シ。其鬱滯ヲ疏解スルニ

在ナリ。而テ其遠因ヲ推セバ。則風喘寒喘水喘火喘。腸實喘。肺燥喘。瘡毒喘ノ別アリテ。風喘ハ疏解ヲ主トシ。寒喘ハ溫散ヲ意トシ。水喘ハ利尿ヲ兼子。火喘ハ清涼ヲ專トシ。腸實喘ハ滌除シ。肺燥喘ハ潤滑シ。瘡毒喘ハ驅逐スル等ノ少異ナクンバ非ズ。後ノ諸條ヲ見テ其精微ニ入ルベシ。

體即固有之血液。而病之所依託。以作害也。蓋諸液皆自血中分利者。故總言之。則以血為病之全體。然有血質全體多少損敗者。或其所含蓄液質損敗。而血之本質則未被受害者。或此液不良。而彼液未損者。或既化為毒物。與血

質相離而混在者。或釀一二剩液。而容居彼此者。或虧一二要液。而殘血致變者。或閉塞通路。而良液反為害者。等之差別也。

血質全損スル者ハ。壞血病。或ハ腐敗熱病熱病ノ一種。見ノ類。此液損害シテ彼液未損セザル者ハ。膽液敗黑病。或ハ酸液留飲ノ類。化シテ毒物ト為テ而テ混在スル者ハ。諸瘡毒。或ハ老廢液ノ反流スル者ノ類。剩液客居スル者ハ。胸水病。或ハ經閉ノ類。要液ヲ虧テ而テ殘血變ヲ致ス者ハ。靈液虛耗。及膽液乏弱ノ類。良液反テ害ヲナス者ハ。多血聚攻。乳汁凝滯ノ類。

ナリ。茲ニ一二ヲ舉テ精義ヲ盡サズト雖ドモ百病
 コレニ由テ類推セバ則各屬スル所アラシク而テ治
 術ノ要ハ則コレヲ驅泄スルト復良スルト主意各
 異ナル所ナクンバ非ズコレヲ驅ルニ直ニ汗吐下
 スベキ者アリ。尿。或ハ蒸氣。
或ハ膿。或ハ涎唾等ヨリ導泄スベキアリ。復良ニモ
 亦制伏。甘和變易等ノ異アリ。精義神ニ入テ治ヲ處
 スルニ非ンバ。安ンゾ
 妙境ニ至ラフ得ンヤ

自然良能者天道自然所賦於人物生乎二氣妙合之間
 而成乎二質相因之動以致神之妙用平素則主保生避
 害之事病時則發排邪逐毒之機所以暗使有此命者也
 蓋病因生于中而邪勢漸滋長害機苟作焉則良能與此

相搏或發熱或吐下或咳嗽或腫起便化導其害物以為
 汗或為尿或為痰涎或為膿汁或嘔物糞穢之中包攝之
 而除去焉此機之見而可認者名之為證故曰由一見焉
 也若夫頭痛發熱身體疼痛等則出乎良能之與害物相
 搏之勢又發渴引飲或嗜異物則良能之欲賴此以和其
 銳鋒也自餘諸證之發壹是皆良能之所為也醫則觀其
 所為而察其機隨宜左右之以使終其功已故曰醫者自
 然良能之臣僕也蓋可承順而不可反逆之義也然而良
 能之所為或時乘勢致過若力不足敗績於是乎始有用
 意而輔佐之此猶臣之於君規諫強暴扶助幼弱一般其

為事不可不敬也。後學勉焉。

自然良能ノ物タル。天ニ在テハ則元亨利貞ノ妙機。
 萬物ヲ生育スルノ根元タリ。儒家ハ此ヲ指テ。或ハ性トシ。或ハ誠トシ。或ハ
就テ又直ニ指テ。良知良能ト稱スル者。彼ハ其才徳ニ
出ナルノミ。又老荘家ノ所謂ル真玄。或ハ自然。佛家
ノ所謂本覺法身。或ハ真如妙法等モ。亦皆此物ニ就
テ。或ハ其所由ヲ指シ。或ハ其本體ヲ認メ。或ハ其流
行ヲ論シ。或ハ其變化ヲ説ク者。畢竟異物ニハ非ル
リ。譬バ鳥獸ノ織テ衣ル。丁能ザルヤ。必ズ此ガ羽毛
鱗介ヲ造テ以テ其寒温ニ適セシメ。此ガ爪牙鬣角
ヲ作テ以テ其冠害ニ備ヘシメ。其手ヲ以テ食丁能
ザルヤ。則其口吻ヲ長ク尖ラシテ以テコレヲ取ベ

カラシメ。唯其生ヲ遂ル丁能ザラシム。是恐ル。凡
 萬物皆然リ。況ヤ人ニ於ルヲヤ。必ズ其生ヲ遂ルノ
 備アルトキハ。則又必ズ其害ヲ避ルノ機ナクンバ
 非ズ。凡人ノ呼吸以テ生氣ヲ引キ。化食以テ體質ヲ
 養ヒ。動作以テ事業ヲ為シメ。静睡以テ精力ヲ復ス
 ル等ヨリ。以テ血液ノ運行シ。諸器ノ官能ヲ為ニ至
 マテ。全身一切ノ動靜云為。皆是天機自然ノ良能ニ
 成リテ。毫モ人為ヲ假ルニ非ズ。其既ニ胎ヲ受ルノ
 始ヨリシテ。以テ數盡キ命終ルニ及ブマテ。久年晝
 夜常然不休ニシテ。妄ニ其度ヲ更ヘ易ル丁無キ者

ナリ。然ト雖モ若其體中ニ於テ。或ハ内因。或ハ外因
 ヲ論セズ。苟モ其生機ヲ損害スベキ者ヲ生ズル
 有レバ。則良能常度ニ違テコ、ニ奮起シ。或ハ熱ヲ
 發シ。或ハ汗ヲ出シ。或ハ吐下シ。或ハ腫起シ。或ハ膿
 ヲ釀シ。或ハ痰唾トナシ。其他種種奇巧ヲ盡シテ以
 テ害物ヲ泄除ス。此其病證ノ以テ發スル所ナリ。故
 ニ人ノ輕疾アルヤ。コレヲ療ズルニ非ト雖モ。大抵
 自然良能ノ力ニ賴テ復故ヲ得。古人ノ藥セザルハ
 中醫ヲ得トイヘルハ。蓋シコレガ為ナリ。然ドモ若
 其稍重キ者ニ至テハ。則良能或ハ勢ニ乘テ其度ヲ

過チ。過熱。過汗。暴或ハカタラズシテ敗績ス。或ハ熱
ザルトシテ而テ能ズ。或ハ汗ヲ欲シテ得是ニ於テ醫
 其機ヲ候ヒ。乃チ藥ヲ與ヘ術ヲ施シ。宜ニ隨テ其良
 能ヲ扶助シ。以テ毒物ヲ驅出スルナリ。故ニ其功ヲ
 成ニ及ンデ。醫ノ勳勞固ニ大ナリト雖モ。然ドモ其
 歸ヲ論ズレバ。則良能ヲ本トシ醫藥ヲ末トス。故ニ
 先哲此義ヲ論シテ而テ醫ハ自然良能ノ臣僕ナリ
 ト云ヘリ。必ス我意ヲ立テコレニ逆ト勿ルベシ。蓋
 良能既ニ衰ル者ニ至テハ。則醫千思萬慮シテ良術
 ヲ施シ。良藥ヲ用ユト雖モ。終ニ些ノ功績ヲ奏スル
 ヲナシ。コレヲ屋宅ヲ修理スルニ譬ルニ。良能ハ猶
 ヲ大匠ノ如ク。醫藥ハ猶ヲ傭作ノ如シ。匠若不在ズン

當^ハ。備多シト雖^モ。易傳ニ所謂ル地ノ道ハ成一無シ
 テ。代テ而テ終ル^ト有トハ。則臣道ヲ説者ニシテ。大
 ニ醫ノ意ヲ用ル所ニ合ヘリ。請フ斯語ヲ事トセシ

卒中第七

以下至第二十七
病屬頭部者

卒中之近因。毒著于腦髓。而壅塞其細管及諸脈也。蓋腦
 者元神之藏。意識之府。知覺運動之所由出也。故其為害
 也大。而其為證也重。生活之機殆廢絕。以發昏倒不遂。不
 省人事等也。

夫腦ヲ以テ精神意識ノ府トスル者ハ受生以下諸

篇及解剖諸書ノ説顯然。茲ニ贅スル^トヲ須ズ。蓋シ
 腦髓ノ質タルヤ。細白軟脆ノ薄膜管ヲ以テ造成シ
 タル脈狀物ヲ叢束シ疊回シ。其間ニ微細ノ泌胞ヲ
 著ケ^テ泌胞^ハ原名^ハ幾^リ爾^ル。諸液^ハ動脈ノ血ヲ承テ^テ腦^ニ説^キ輸
 スル^ト云^リ。殆^ハ全^ク血^ノ因^ニ由^リ察^スベ^シ。其中ノ精液
 ヲ泌別シ取り。吸氣ニ由テ天氣ヲ引キ。以テ靈液ヲ
 釀シ。蓋シ^ハ靈液^ハ精微^ノ靈妙^ノ液^{ナリ}。漢醫ノ未^ダ説^カザル^ル者^ニ。
 當^ル。然^レモ^ト翻^シア^リテ^ハ元氣^トスレ^バ亦^未タ^盡サ^ズ。且^ツソ
 通^シ難^キ所^{アリ}。故^ニ然^ク譯^セバ^ズ。詳^シ説^キ宇^氏ノ^醫範
 提^テ綱^ニコレ^ヲ白脈^ノ中^ニ傳^テ神^經ト^ナス^者是^ナテ
 リ而^テ一身^諸部^ニ灌注^シ。知覺運動ノ機ヲ發スル

ヲ以テ官トスル者ナリ。故ニ若シ物アリテコ、ニ
 充塞シテ。以テ夫細薄軟脆ノ管ヲ壓迫スレバ。則神
 氣發動ノ機ヲ障尋シテ。以テ本文論スル所ノ諸證
 ヲ發スルナリ。此時ニ當テ腦内ノ血脈水脈モ亦蓋
 皆閉塞ス。故ニ及ヒ諸脈ト云ナリ蓋
 其呼吸ニ鼾聲ヲ發スル者ハ。即循鼻白脈ニ鬱塞ア
 レバナリ。平生強健ノ人熟睡スレバ亦善ク鼾スル
 者ナリ。蓋シ睡眠スルトキハ。則必ス腦管
 ハ其自。然天機ニ因テ鼾聲ヲ發スルナリ。然トモ此
 ルニ因テ已テ其聲モ亦腦管ヲ閉ガレテ鼾スル者ト
 同カラズ。故ニ其聲モ亦緊強快發シテ以テ其熟睡
 ヲ美ムベキカ如ク。且其無病平安ナルヲ徴スルニ
 鼾大ニ此病ノ鼾聲ノ激迫澀鳴破輪ヲ軋ルガ如キ
 ニハ非屢欠スル者ハ。頸筋及舌筋等ヲ循行スル白

脈ノ抽牽スルニ由テ自テ其口ヲ放開スルナリ。四
 肢舉ラザル者ハ。延髓ヲ壅閉シテ脊髓白脈全身表
 部ヲ循
 ル者ノ根原ヲ支障スルナレバナリ。自餘諸證ノ
 如キモ亦皆コレニ準ジテ知ルベシ。然ドモ其閉塞
 スルナラバ未ダ極ラズ。唯其前腦ニノミ在テ。而テ後腦
 ハ猶開通スルナリ。血ノ腦ニ輸スル先、前腦ヨリ
 故ニ先、其到ル所ヲ閉塞シ
テ。而テ後漸ク後故ニ心肺等ヲ循行スル白脈第八
 腦ニ迫ルナリ
胸ナリ流通スルナレバ得テ呼吸脈動仍存スルナリ。
 若ソレ此等ノ白脈ガ次第ニ閉塞スレバ則漸ク死
 ニ瀕ス。

其證有寒熱之別其毒有多血黏液之異其因則種種不
一宜講究考索矣

熱證卒中ハ多血上攻ヨリ来ル故ニ其證顔色赤盈
シ浮絡緊脹シ脈動強實ニシテ而テ鼾聲甚シク又
其將ニ發セントスルヤ必先頭重強痛頭旋掉眩耳
鳴目赤舌硬言難四肢冷テ感觸ヲ減損シ常ニ睡ヲ
嗜テ而テ安眠シ難キ等ノ徵ヲ見シ且其平素肥滿
壯實ニシテ而テ酒漿ヲ好ミ逸居シテ而テ膏粱ヲ
貪ボル様ノ人ニ於テコレヲ得ルナリ○黏液卒中
ハ熱ヲ發スルナ鮮シ故ニ此ヲ寒證ト謂フ其候顔

色黯淡鼾聲甚カラズ脈緩弱若コレニ瀉血法ヲ施
セバ汚濁ニシテ帶粘或ハ鉛色ヲ夾メル血ヲ出シ
其血凝結セズシテ而テ上面ニ皮膜ヲ結ブナリ其
前徵モ亦頭重眩暈耳鳴嗜眠等相似タルナリ雖
モ強痛目赤及其他多血聚攻ノ徵ナク眠レバ則鼾
シテ而テ熟睡シ精神乏缺シテ記臆ヲ失ヒ頭面及
ビ諸部ノ彼此麻木シ暫ク其處ニ在テ亦移リナド
スルナリ此證ハ老人及ヒ虛家平素攝生良ナラ
ズ腸胃ノ運化損敗シテ而テ粘液留飲ヲ釀シソレ
カ血中ニ滯シテ傳テ腦ニ到リ腦ノ血絡ニ留滯シ

或ハ空間ニ滲漏シ漸次コ、ニ充塞セルガ。或ハ房
 勞。或ハ苦學。若ハ他ノ神氣ヲ勞スル事件ニ由テ良
 能涸衰スル。有ルガ為ニ。其粘液ヲシテ化ニ順ハ
 シメテ以テ便路ニ導泄スル。能ハズ。一箇ノコレ
 ヲ引動スベキ事件アレバ。則一時ニ跋扈シテ而テ
 腦内ニ滿溢壅塞スルナリ。又多血家ハ其血必濃稠
 ニシテ。其行動スレバ。輒チ遲滯シ易シ。肥滿家ニテモ白色柔質
 血薄クシテ粘液多キ人アリ。多血濃稠ノ人ト疑ヒ
 惑フベカラズ。又疲瘦ニ見ユル人ニモ。筋肉緊滿。血
 質稠厚。其脈管ノ度ニ過テ多シ。然ルニ一旦怒氣奮
 激シ。或ハ苦神勞力等ニ因テ急卒ニ血ヲ上逆セシ

ノ。或ハ精烈ナル諸飲ヲ用テ血勢ヲ激行セシガ其
 氣ノ醒ルニ臨テ俄ニ静止留滯スル者アリ。酒ハ其
 テハ。則其慄悍揮發ノ氣ガ血中ニ入テ。血ヲ騷擾激
 行セシムト雖モ。其醒ルニ當テハ。則揮發ノ氣既ニ
 散越シテ。而テ其酸收粘滯ノ質ノ殘留シ。血行ハ
 前ニ反シテ。轉遲滯スルナリ。宿醉ノ頭重ク。身タル
 キ者。此因ト同シテ。而テ輕キナリ。他ノ香竄辛辣ノ
 諸物ヲ用ルヨリ来ル者ハ。唯其血ノ衝逆スルニ因
 ル。若其醒後血行ノ遲滯スルハ。則其稟質ニ在テ。而
 テ外物ノ罪ニハ非ルナリ。故ニ其害ヲナスモ亦甚
 シ。鮮又二證トモニ。或ハ浴湯ノ蒸氣ニ中リ。或ハ炭火
 ノ酸收氣ヲ吸シ。或ハ寒冷濕蒸氣ヲ觸冒シ。此殊ニ粘液卒ニ
 中ヲ引。或ハ炎暑ニ中リ。日下ニ睡卧シ。此殊ニ多血
 動ス。或ハ驚快恐懼シ。驚恐甚キト雖モ亦絶氣昏倒スル

高麗精

卷之二

十

眩暈條下參考スベシ。或ハ打撲損傷ニテ腦中ノ脈絡ヲ破裂スル。或ハ多血上攻其血質酷厲ニシテ刺蓋シ舊他病アリテ血液腐敗シ。因テ脈管ヲ侵蝕シテ而テ腦内ニ崩漏溢滿スル者アリ。コレ必死ノ證シ等ヨリモ皆克コレヲ起發スルナリ。又其稟賦頭ノ異常ニ大。或ハ小。頸項ノ甚短ク。甚長キ者。以上因中頭ノ殊ニ此病ヲ發シ易シモ。或ハ胸部ノ甚狹窄ナル者。或ハ沈實家ニシテ手足毛多キ人。按ニ以上六因。多ヲ以シテ。而テ後ニ。或ハ膽液敗黑家。或ハ壞血病毒家。或ハ曾テ痛風ヲ患タル人。或ハ腦水腫ノ人。水腫考シス。或ハ諸般ノ中毒ヨリ發シ來ルナリ。右五因ハ皆以

前ニ其證アルシヲ又嗜眠。或ハ不寐。或ハ劇頭痛。腦焮腫等ヨリ此病ニ陷入スル者比比コレアリ。先哲ノ說ニ卒中ニテ死タル人ノ屍ヲ解觀セシニ。前腦室ニ血及ビ鹹渣粘液等充滿シ。尚腦ノ積穢様ノ間隙及膜間ニ布滿シテ腦ヲ圍包スルガ如ク。又腦ノ空間ニ白色。或ハ黄色ノ鹹渣及粘液等充滿シ。偶然膿スル者ヲ見。又脊髓ニ連ル脈管。及腦髓ノ脈管等ニモ鹹渣充滿シ。又鳥胃脈ニ鮮藏圖賦及心藏ノ複間動脈大幹甚延長遲緩シテ。而テ血充滿シ。又粘液塊瘤及腫瘍ヲ腦ニ生シ。或ハ腦膜ニ生ズル者アリト謂

病西精辨

卷之二

十一

リ参考シテ其因ヲ知ルベシ。○卒中ニ兩手固握シ
 牙關緊急シ。或ハ風氣ヲ魚テ腹中雷鳴膨脹スルハ
 此レ癰ヲ挾ムノ證ナリ。敗毒ノ液腦白脈ニ滲入シ。諸筋ヲ抽掣牽引スルニ由ル
 粘液塊癰ヨリ来ルハ。大率以前ニ心悸劇動シ。呼
 吸短促。頭旋振掉。烏胃外靜脈腫脹ス。蓋シ此證及瘧
 肉。中毒。脈管破裂ヨリ来ルハ。特ニ不起ノ證ナリ。凡
 呼吸平易ナルハ良トス。然ドモ多血證ニ刺絡後反
 テ呼吸重難ニ變ゼバ死證トス。其脈微細。急ニ虛大
 ヲ見ハス者。口中泡沫ヲ出ス者。呼吸重難ニシテ冷
 汗スル者。澀導法ヲ施シテ藥汁ノミ下ル者等ハ總

テ死證ナリ。

○治療ノ標的トスル所ハ。專ラ多血ト粘液トヲ辨別
 スルニ在リ。然トモ二證共ニ先ツ刺絡術ヲ施シ。澤
 委中。頸靜脈又發疱膏ヲ項窩。兩肩ノ或ハ兩脚ノ臑
 ニ貼シ。若ハ引降方ヲ足蹠ニ施シ。唯カメテ神識ヲ
 醒覺シ。閉塞ヲ開達セシムベシ。諸方劑スベテ泰西方鑑ニ集載ス。標用
 コレニ準ズ。○熱證卒中ハ。油鹽澀導方ヲ作テ一時
 半ゴトニコレヲ施シ。且再三刺絡シ。又繃布ヲ取テ
 兩足ノ膝上ヲ強ク卷クベシ。此ヲ以テ脚ヨリ上還
 へ轉輸セシム血勢湯藥口ニ入ルヲ得バ。則清凉下

劑ヲ與フ。或ハ未_レ度湯○寒證卒中ハ石鹼瀝導方ヲ施シ。刺絡ハ唯一次シテ少ク其結滯ヲ疏スルノミ。固ク再刺ヲ禁ス。内服劑ハ解粘疎通方ニ宜シ。コレヲ主ル。○諸病毒内攻ノ證ハ各其宜所ニ随テコレヲ導泄驅除スルノ術ヲ兼施スベシ。○癩ヲ扱ムノ證アル者ハ琥珀醇或鹿角精或鹿角鹽奇效アリ。○又總テ病者ノ頭ヲ高シテ卧シメ。徐徐ニ手摩導引シテカテ其上迫ノ勢ヲ折キ。順下スルノ策ヲ施スベシ。○卒中ハ一回治ヲ得ルヲアリト雖モ再發シ易キモノナリ。且其再發スルヤ必ず次第ニ危険ニ

進ム。慎テコレヲ防ズンバアルベカラズ。コレヲ防ノ法先食量ヲ減シ。殊ニ晚食ヲ食ハザルヲ佳トス。酒肉及一切辛熱ノ品ハ固クコレヲ禁シテ食ハシムルヲ勿レ。蔬菜果實及ヒ酸味ノ品ヲ撰ミ用ユベシ。○熱證卒中ヲ患シ人ハ殊ニ右件ノ攝養ヲ慎ミ。毎七日早天ニ酒石散一服ヲ用ユ。冷水ニテ送下スベシ。又一年ニ二三回。酸石湯ヲ用テ腸胃ヲ清滌スベシ。又日日ニ適宜ノ動作ヲナシテ血液ノ運行ヲ調シ。熱室及ヒ暑氣ヲ避ケ。早ク寐子早ク起キ。臥床ニ在ルヲ四時ニ過ルヲ勿レ。若シ血多ク腦へ逆衝

スルノ徵ヲ見バ速ニ刺絡シテコレヲ瀉スベシ。慎
 テ浴湯ニ入ルベカラズ。○粘液卒中後モ亦大率前
 ニ同ク調護スベシ。但服藥ヲ殊ニシ。刺絡ヲ用ヒズ
 毎七日早晨ニ紫茉莉散一服ヲ與フ。服法前ニ同シ
 ○凡卒中ノ前兆アル者豫防法右ニ準ジテ知ベシ
 ○昏睡嗜眠等ノ病モ亦皆腦ノ閉塞スルナリ。故ニ其
 因モ亦相近シ。但其毒ノ輕重微甚其毒性ノ厚薄酷
 和其中傷ノ頓漸緩急其病勢ノ劇烈寬舒一一同ジ
 カラザルカ為ニ種種其證ヲ異ニスルノミ。治術モ
 亦類推シテ知ヌベシ。但治ヲ誤テ以テ卒中ニ陷セ

西村正齋圖書

シノザルヲ要スルノミ。

痲病第八

痲之近因。白脈閉塞且痿弛也。白脈之為物脈狀而如實
 起乎腦及脊髓而經綸全身通靈液達神氣以供知覺運
 動之用者故靈液若黏凝則不易流行焉。或於此或於彼
 留滯壅塞而遏閉神氣乃頑麻不遂也。蓋此病自卒中變
 來者固多因及證共易知也。自餘輕重不均由是推之條
 理自分明矣。

痲ハ卒中ト同因ニシテ但微甚ノ異アルノミ。蓋シ

卒中ノ因トスル所ノ多血家及粘液家ハ則靈液ノ
質自ラ稠粘氣ヲ含ミ。動スレバ輒チ留滞ノ患ヲ將
来スルヲアリ。成シ。實シテ微細ノ空管ヲ聚メ東テ造
液者モ精微ナラザレ。故ニ痲ヲナスノ病毒増益ス
レバ。則直ニ腦髓ヲ閉塞セシメテ以テ卒中ヲ發シ。
又卒中ノ病勢減退スレバ。則其毒ヲ白脈中ニ驅逐
シテ而テ痲不遂ヲナスナリ。コレヲ驅逐スルハ即
チ良能ノ為ル所ナリ
其他痲瘓摺擲。此亦頭腦及白脈ノ病ナ或ハ燥熱ノ
地氣。按ニ脚氣麻痺若ハ寒濕ノ時氣ヲ受ケ。此粘液
卒中ノ
因シ。或ハ過酒。或ハ閑逸以テ身體ノ運動ヲ缺乏シ。

或ハ常ニ泄除スベキモノ、閉塞シ。或ハ驚怖シ。或
ハ茶ヲ過飲シ。茶ハ白脈ノ性アリ。損害。或ハ平常毒物ヲ持
アツカフヲ業トスル者。水銀。鉛。錫。砒。石等ヲ云フ。
其金石ノ毒氣ガ吸氣ヨ
ジリ。因テ此患ヲ將テ血中ニ入リ。腦ニ至テ靈液中ニ混
ムル非レドモ。其酷厲ナル氣ガ白脈ヲ衝動。攣急セシ
者ト甚相近シ。等ニモ亦此患ヲ發スルヲアリ。若
夫卒中ヨリ来ル者大概半身不遂ヲ見ハスハ。是脊
髓ニ中隔アリテ左右ヲ分別スルガ故ニ。其毒ノ驅
逐セラレ、ニ當テ。或ハ左或ハ右。便ニ就テ一方へ
逆射シ。乃チコ、ニ壅塞スルヲ以テナリ。脊髓ヨリ
出ル白脈

一、表部ヲ循行スル又腦髓或脊髓ノ金創若ハ隔皮
 傷及諸部白脈ヲ切斷シ折傷シ或ハ久ク緊縛^{ナシ}桎梏
 ヲ受テ押壓シ或ハ腫起後ニ硬結シ或ハ脱臼轉筋
 纏^レ戾スル等ニ由テ其一部分及ビソレヨリ傳次シ
 テ循行スル白脈ノ末梢ニテ麻痺スル者アリ其因
 同カラズト雖モ其白脈閉塞スルニ於テハ一ナリ
毒アリ此ハ其毒ガ其部ニモ亦唯一部分ノミ辨處置ス者
 凡^レ痲ノ所在刺痛ヲ覺ル^ルア^ルハ是其閉塞イ
 ヲ極ラズ靈液間ヲ窺テ突衝激行スルノ致ス所譬
 バ手ヲ枕ニシ若ハ久坐シテ各部ノ白脈ヲ壅閉麻

木セシノタルガ起テコレヲ緩舒スレバ則靈液俄
 然トシテ突衝激行シテ以テ酸痛ヲ發スルト同機
 ナリ又此病手足身體外表ノ知リ易キ部ニ於テス
 ルノミナラズ眼耳鼻口舌及内部心肺諸藏陰莖ノ
 直筋膀胱ノ括約筋等ノ麻痺スル^ルアリ然トキハ
 則各其部ノ官能ヲ廢ス察セズンバアルベカラズ
 又此病ノ一所各部ニ於テスル者諸疼痛或ハ他諸
 病ニ冒寒ヲ挾タル後ニ於テ發スル^ル多シ是冒寒
 毒ハ喜ンテ頭腦ニ滯シ白脈ニ流注スル者ナレバ
 ナリ

○凡面部諸筋ノ痲及身體全部頑痲シテ些ノ觸覺モ
 ナキ者ハ難治ナリ。金創打撲ヨリ来ルハ不治ナリ。
 緊縛押壓轉筋繆戾ヨリ来テ其部ノ養化煖氣等脱
 却シ或ハ甚熱シ緊張スル者及劇烈ナル搐搦ヨリ
 来ル者卒中後ノ痲及惡液質ノ人壞血質ノ人衰老
 ノ人等ニ發スルハ皆險證ナリ。

○治法多液質ノ壯年輩ニ於テハ多血ヨリ發スル卒
 中ト同ク調攝シ刺絡術發疱膏及浼導方或ハ下劑
 ヲ用テコレヲ療ズベシ。長老輩及痿弱弛廢或ハ精
 カ衰弱ヨリ起ル者ハ前法ニ相反シテ溫性芳烈ニ

シテ稀釋透竄スル食品及藥劑ヲ撰用スベシ。白芥
 子山薺菜コレニ宜シ。○凡患部ヲ溫手ニテ摩擦ス
 ベシ。大ニ良ナリ。又發疱膏ヲ貼シテ甚效アレドモ
 若其處ニヨリテ貼シ難キ者ハ揮發油ヲ擦シ或ハ
 篤耨香油或ハ蛤雅布的油ヲ塗ベシ。又毎日其部ニ
 越列紀的爾ヲ施シテ良ナリ。○癩瘰搐搦ヨリ来ル
 者ハ必ズ其本病ノ主治ヲ兼ヌベシ。金石毒ニ中タ
 ルヨリ来ル者ハ先其本因ヲ避ケ且其毒ヲ和スル
 ノ藥ヲ兼用スベシ。

舌痲

言語塞
澀ノ證

泥菖散ヲ含シ或ハ丁香油ヲ塗ルモ亦

良ナリ。諸方劑總テ泰西方鑑ニ集載ス。採用スベシ。

癩瘧第九

癩瘧之近因。毒攻腦髓。而白脈攣急。抽掣也。故其方發也。知覺運動共廢。顛倒而不省人事。見支體強硬。固握搖撼。眼目旋回。吐沫放溺等證。甚者間時亦所劫奪其精氣。而致痴騖昏迷。沈神鬱愁等證也。蓋其證有虛實。類似傍發等之區別。其遠因有遺毒自發。連及等之殊異。苟不用意察之。臨治安得適中。

腦髓ハ精神ノ府。白脈ハ靈液ノ路ナリ。如今毒コ、

ニ在テコレヲ攻ム。其發スル所ノ證。豈ソレ輕易ナルヲ得ンヤ。蓋シ其發作休止スル所以ハ。是其病毒漸ク滋長シテ。腦中ニ鬱積シ。時アツテ腦管ヲ刺戟スレバ。則カバ良能ナルモノ。コレヲ觸覺シテ。排斥驅逐センヲ欲シ。元運ヲ壯盛ニシテ。以テ其毒ヲ彈射スレバ。其毒直徑ニ白脈中ニ注射シ来リ。白脈モ亦其刺戟衝動ニ勝ズシテ。筋肉皮膚ノ枝末細織ニ至ルマデモ。一時ニ攣急短縮スル。譬バ片肉ニ巖醋ヲ注ケバ。則忽チニ緊縮スルガ如シ。此時ニ當テ腦管戸ヲ閉テ五官職ヲ廢スル。猶ヲ熟睡ス

ルガ如ク。稍其時ヲ經ルノ間ニ。腦髓モ亦其勞ヲ休復シ。且ツ再ビ新鮮ノ靈液ヲ釀シテコレヲ白脈中ニ灌注シ。病毒ハ則多少ニ口ヨリ。尿ヨリ。表發ノ蒸氣ヨリ。甚々蒸出スレハ則體外ニ驅出セラレテ。其銳鋒ヲ挫折シ。殘餘ノモノハ。已_レテ得ズ元氣ノ運行ニ隨順シ去テ始テコハニ醒覺スルナリ。然トモ痛ハ一日ノ證ヲ殘留ス爾後時日ヲ經過シテ。其毒復滋長スレバ。則發作スル_レ前ニ同シ。或ハ每年春秋至_リ或ハ每月望_ヲ期_トシテ發スル者アリ甚キ者ニ此正面癩病ノ情狀ヲ説クノミ。若夫類似傍發ノ世俗

謂ケルナリキノ證ハ其機相同ケレドモ。其毒性等シカラズ。故ニ其狀ヲ異ニスル所ナクンバ非ズ。又只搐搦痙攣スルハ。未_タ顛倒不省人事ノ證ニ至ラザレドモ。其毒却テ本病ト同シテ。稍輕微ナル者ナリ。○此病ノ遠因ヲ原ルニ。第一先天ノ遺毒。是レ其父母ノ攝生不良ニシテ。以テ酸敗酷厲ノ毒液ヲ生ジ。精液若ハ血中ニ含蓄シテ。コレヲ二世或ハ數世ニ流傳スルナリ。次ニハ妊娠ノ中其母大ニ驚駭スル_レアレバ。胎兒コレガ為ニ連累セラレテ。此病ノ因由ヲ生ズル_レアリ。自發ノ證ハ。此其兒ノ既ニ食スル

頃ヨリ愛養節度ナク。或ハ甘味厚烹ノ物ヲ過食セシメ腸内ニ酸敗鬱積シテ以テ血液ノ原化ヲ損シ乃チ血液ヲ變壞セシメテ遺傳ト同ク根結セル病因トナルアリ。長シテ後ト雖モ其攝養非度或ハ過酒等ヨリ来ルハ皆是同軌一轍ナリ又頭蓋骨ノ常ニ反シテ内へ突起シ。或ハ腦ノ造成異常ナル者。或ハ塊瘤様ノ物ヲ生ジ。或ハ骨狀ノ物若ハ小石ヲ結成シ。石淋ノ因ト参考スベシ或ハ小泡水囊狀ノ物ヲ生ジ。或ハ蟲ヲ生ズルヨリ發スル者アリ。蓋此皆不治ノ證ニシテ下ニ所謂ハ誘發ノ諸因アリ。則チ腦神コレガ為ニ抵觸感動シテ立地ニ此患ヲ將出リス又其稟賦血質酷厲ナル者尋常鼻衄痔血經

血等ノ通泄ニ由テ其有餘ヲ損セシガ一旦閉塞シテ。其閉塞ニ變セルハ蓋シ血質而テ滿溢上衝スレバ濃稠ニ變セルヨリ来ナリ而テ滿溢上衝スレバ則類癰ヲ發スルナリ。又憤怒失意凶禍憂愁等ニテ神思ヲ勞倦シ。或ハ房勞過極長病衰弱等ニテ腦髓虛損シ。諸部ノ運化健ナラズ。乃チ惡液ヲ釀成シ来アリ。又潰瘍若ハ頭瘡若ハ疥癬若ハ他ノ皮膚病ヲ急ニ不當ノ治ヲ施シテ以テ其毒ヲ内陷セシメ。或ハ癩瘡痛風等ノ酷厲毒頭腦ヲ上攻スルヨリ来アリ。故ニ又コレニ反シテ此等ノ諸瘡ヲ又脱血過多。或ハ吐下過甚等ニテ腦内血ニ乏ク。或ハ養液ヲ

缺キ。腦管白脈共ニ畏縮シテ以テ發癩スルアリ。又外傷金創破傷風。或ハ大ニ驚恠スルニ因テ發スルアリ。故ニ小兒ノ本此病因アル者ハ勿論ナリ。若否ル者モ屢驚恠スルトキハ。便誘シテ發癩シ。或ハ遂ニ真因ヲ釀成スルナリ。所謂驚風ノ名義ハ蓋シ小兒ハ元來腦質及白脈等モ統テ軟脆薄弱ニシテ。感觸尤速ナル故。但意識ハ他人ノ諸病殊ニ胎糞不。或ハ熱病痘疹等ニ嬰リ。或ハ齒牙將ニ生セントシテ齧痛呻吟スル者。及食滯腹痛。蛔蟲咬痛等ノ病アル者ハ。則チ誘シテ癩瘰搗ノ證ヲ兼發シ來ル

ナリ。此中熱病ハ直ニ腦ヲ攻メ。其他ハ則各部ノ白脈ヲ刺衝シ。遂ニ頭腦ノ根原ニ連及スルナリ。大人モ亦壞血病毒アル人。及肝脾ノ病アル人。婦人ノ子宮衝逆等ニ於テ連及傍發スル鮮カラズ。○凡此病ヲ發スル時。必ず頭旋眩暈耳鳴。或ハ踵或ハ臑ヨリ寒氣昇騰スルト覺テ。遂ニ意識ヲ失フテ而テ顛倒スルモノナリ。每發宜ク病人ヲシテ頭及身ヲ體ヲ損傷セザルヤウニ豫防スベシ。且大サニシテ綿布ヲ固ク卷キタルモノヲ又適宜ノ大サニシテ。舌ヲ固ク卷キタルモノヲ挿スベシ。但大ニ過テ呼吸ヲ障セズ。小ニ過テ嚥下ヲ要ス。故ニ高ニ登リ。欲セバ。當ニ繃帶ヲ取テ緊ク。膝上ヲ卷縛スベシ。能ク深ニ臨ミ。或ハ日氣及烈ク此病ノ發作ヲ防止ス。

望。若ハ久ク其氣ヲ受ケ。或ハ動搖スル物ヲ久視シ。或ハ劇ク動作シ。或ハ烟草ノ氣ニ中リ。或ハ精烈ノ諸飲ヲ服シ。或ハ苦學勞情等ノ頭腦ヲ虚耗スル事件等。皆ヨクコレヲ誘發スルニ足ル。宜ク慎テコレヲ避クベシ。○凡此病小兒ノ時ニ發シ。且深重ナラザル者ハ。大抵男子ハ精液ノ通シ。女子ハ月事ノ至ル頃ニ於テ治ヲ煩ズシテ自ラ愈ル者多シ。此年頃ニハ。血液大ニ成熟シテ。血中ニ揮發鹽ヲ生ズルヲ多ク。良能コレニ因テ以テ酸敗ノ害母ヲ制伏シ得ルガ若夫先天ノ遺毒等ニテ其根深ク。尙且神識既ニ精爽ヲ奪レテ痴騷昏迷ニ至ルガ如キモノ。及

既ニ二十五歳ヲ過テ瘡ザル者ハ治シ難シ。四十歳以後コレヲ發スル者ハ。生涯復故ヲ期望スベカラス。凡腦中ニ物ヲ生ズルノ類ハ。假令劇證ニ非ト雖モ不治ナリ。腦中虚損ヨリ來ルモ亦治シ難シ。瘡狀ノ熱後ニ發スルハ死兆ナリ。瘡後ニ瘡狀ノ熱ヲ發スルハ善兆ナリ。此ハ良能カ此熱ヲ發シテ以テ病毒ヲ排斥スルカ故ナリ

○治法發作ノ時ハ先ツ其急ヲ救フベシ。宜ク速ニ病人ヲ通氣新鮮ニシテ鬱滯ナキ處ニ移シ。冷水ヲ取テ顔面ニ喫キ。次ニ虚證ニ屬スル者ハ。鹿角精。或ハ硃砂精等ノ揮發透竅ノ品ヲ用テ鼻ニ嗅セ。或ハ顛

顛ニ擦シ。若ハ一二滴ヲ取テ水少許ニ和シ服セシ
メ。カテ醒覺セシムルヲ要ス。實證ニ屬スル者ハ
鎮痙散良ナリ。琥珀醇モ亦奇效アリ。固ク他ノ精烈
藥ヲ用テ熱ヲ發セシムルヲ勿シ。閉治ノ方ハ大率
吐劑下劑及強腦壯心劑ノ類ヲ撰用スベシ。又類癩
ノ病毒腦中ニ在ル者ハ設者多血家ハ。刺絡打膿貫
線法等ヲ施シ。衰弱ヨリ来ル者ハ。吉那健補ノ劑諸
病毒内攻ヨリ来ル者ハ。發疱膏。或ハ各其宜ニ随テ
コレヲ驅除ス。齒牙出ガタク。寒熱シテ發癩スル者。
鹿角精ニ宜シ。服法前又他ノ本病アル者。設者蚰蟲。

痘疹食滯。脾病。子宮病ノ類モ亦皆宜ニ就テ其根原
ヲ治スベシ。若夫レ治ヲ施シテ各其當ヲ得ルヲハ。
唯診察ノ精別ニ在ノミ。諸方劑總テ泰西方鑑
ニ集載ス。撰用スベシ

頭痛第十

頭痛之近因。於前腦後腦。厚薄腦膜。或頭蓋膜及筋肉等
諸部。惡液穿蝕刺衝。或白脈攣急。或血脈壅閉之所致也。
腦髓ハ本連屬シテ一物ナリト雖ドモ。分裂區別ス
ル所アリテ。自ラ前後ヲ分ツナリ。薄腦膜ハ下ニ在
テ腦質ニ附著シ。腦ノ積襞様ノ形ニ随テコレヲ區

包ス。厚腦膜ハ上面ニ在テ頭蓋骨内ニ布滿ス。以上
 部ト頭蓋膜ハ頭蓋骨ノ外面ヲ被布シテ筋肉ノ下
 ニ在リ。筋ハ即皮下ノ赤肉是ナリ。從來以テ筋ト
 則赤肉ノ首尾骨ニ附著スル所ニシテ其全體ニア
 ラス。詳説解剖諸書ニ見タリ。以上ヲ外部トス。
 凡ソ疼痛ハ何ノ部ニモセヨ。茲ニ一物アリテ其處
 ニ留滞シ以テ靈液ノ運行ヲ障導スレバ。則自然ノ
 良能コレト相抗抵シテ而テ突衝戰鬪スルヲ白脈
 ニ觸レ意識ニ覺ヘテ。而テ疼痛ヲ發スルナリ。
 其證有專發兼發。兼發作休止。持久不止之異。及滿頭痛偏
 頭痛。肩稜骨痛。耳上痛。卵點痛。如刺痛。牽張痛。押搾痛。鼓

動痛熱痛寒痛等之別

專發ハ主トシテ頭痛ヲ發シ来ルナリ。兼發ハ他部
 ニ病アリテ連及スルナリ。發作休止。或乍發乍止ハ
 其毒聚散シテ往來スルナリ。持久不止ハ其毒固著
 シテ移ラザルナリ。滿頭痛ハ毒彌滿スルナリ。其他
 ハ各部ニ著クナリ。如刺痛ハ酷厲液白脈ヲ刺衝ス
 ルニ因リ。牽張痛ハ攣急セシムル性ノ毒アルヨリ
 シ。押搾痛ハ收斂性ノ毒ヨリ来ル。鼓動痛ハ動脈ノ
 血ノ上衝過多ナルヨリ来リ。熱痛寒痛ハ各其毒ノ
 性ト其稟賦ノ殊異トニ從フナリ。又劇痛シテ處ヲ

移サズ持久シテ堪ベカラザル者ハ身體及精神ト
モニ衰弱シ。不寐不食。視力昏暗。耳中騷鳴。拘急搐搦。
或ハ發癇嘔吐シテ大便秘結シ。四肢微冷スル等ノ
證ヲ兼發ス。

其遠因有遺毒熱毒多血聚攻勞神勞役過飲過食或感
冒時氣暑濕燥氣香臭汚氣南風薰蒸或外部創傷隔皮
傷內外焮腫膿瘍硬結腫及諸部瘡毒丹毒痘疹癰毒疥
癬痛風毒等內陷者或脈外溢餘血水液腐敗液膽液敗
黑壞血病毒黏液痰飲鹹渣石灰性毒等種種不同矣又
兼發之因第一胃中疾病及肝脾腎病若子宮病等也因

證多端如是豈可徒認其標而施治哉

遺毒ハ父母ヨリ傳テ血液ノ性質不良ナリナリ。下
云フ癰毒或壞血家或膽液敗黑質等ニテ其父熱毒
母每時頭痛セシ者ニシテ其子モ亦然ルナリ熱毒
ハ必ス其熱ノ發作スルトキニ當テコレヲ得ルナ
リ其甚キ者ハ必是ヨリ譫妄發狂シ。或ハ昏睡病ニ
陷入ス。詳ニ熱病篇ニ載多血聚攻ハ多ハ稟質ニ由
ルナリ。又甚肥滿セ人ニ非ルモ其血稠厚ナルカ
或ハ平素鼻衄痔血經血等ノ有シガ一旦閉塞シテ
泄セザレバ則滿溢上衝シテ而テ焮痛シ。一處ニ留
滯スレバ偏頭痛。叩點痛等ヲ發シ。久キトキハ敗痰

百病清長 卷之二 三十五

シ。酷厲ニ變ズレハ刺痛シ。粘液ヲ兼レバ寒痛シ。鹹
渣ヲ夾スレバ膿潰シ。腐敗スレバ蟲ヲ生ジ。乾固ス
レバ硬結腫ヲ生ズ。凡ソ是ノ如ク變壞スルトキハ
則難治ノ頭痛ヲ發シ。或ハ遂ニ卒中若ハ癰瘰等ニ
陷入スルヲアリ。勞神スレバ腦髓虛損シテ。其部ノ
運行健ナルヲ能ズ。血液留滯シテ頭重ヲ發シ。遂ニ
疼痛ヲ發スルナリ。且ツ其精神ヲ過用スルガ為ニ
腦管漫爾トシテ哆開シ密閉セザルヲ以テ。無用ノ
諸液濫入シテ共ニ頭痛ノ因トナルナリ。不寐ヲ兼
ルモ亦同機ニ出ヅ。勞力度ニ過テ疲極セルヨリ來

ルモ亦同シ。但コレニ加ルニ血液上衝ノ勢甚キヲ
アルノミ。過飲ハ則血行ヲ激進上衝シ。其悍烈精微
ノ氣ハ遂散シ。酸收黏稠ノ氣ノミ殘留スルニ當テ。
血液忽然ト凝泣滯著シ。又其悍烈ノ氣ノ在シ時ニ
腦管ヲ衝開シテ。而テ諸液濫入ノ患ヲ致セシ者ト
併テ頭痛ノ因ヲ引クナリ。過食ハ胃ヲ病シノテ兼
發頭痛ヲ致シ。又其胃ヲ病シムルノ常常ニシテ休
ズ。以テ酸敗液腐敗液粘稠液等ヲ釀成スルニ至テ
ハ。則血中ニ入り靈液ニ混シ。刺痛寒痛牽張痛等ヲ
發シ來ルヲアリ。感胃スレバ。表發ノ蒸氣ヲ閉チ。粘

稠酷厲ノ液ヲ生ジテ上攻シ。且ツ流注シテ定ラザ
ル乍⁺發シ乍⁺止ム等ノ痛ヲ發ス。時行ノ氣ハ熱毒ヲ
釀シ。或ハ種種ノ腐敗ヲ致スヨリ來ル。暑濕燥氣ハ
血ヲ沸騰上衝シ。或ハ表發ノ蒸氣ヲ閉キ。或ハ酷厲
液粘稠液等ヲ釀シテ上攻頭痛シ。中ニ就テ炎天日
輪ノ氣ニ中レバ。腦焮腫ヲ發シテ劇烈ナル頭痛ヲ
發シ。遂ニ不起ニ至ル^レアリ。香臭汚氣ハ直徑ニ鼻
ヨリ入テ。頭腦ヲ突衝閉塞セシムルナリ。南風薰蒸
ハ血液ヲ上衝シテ。且ツ緩行鈍滯セシムルヨリ來
ルナリ。外ヨリ創傷シ打撲セルハ。或ハ白脈ヲ損傷

シ。或ハ死血滯著シ。腫痛スル等ナリ。又焮腫膿瘍硬
結腫等モ外部ニ在ルハ知易シ。若シ内部ニ在ルモ
同機ナリ。而レドモ診別シ難シ。但其痛尤モ劇ク且
ツ少時モ休^レナキノ患ヲ致スモノナリ。此證連綿
持久スレ
ハ。多クハ盲目。卒中。耳聾。諸瘡毒内陷上攻スル者ハ
謬矣。癩癩ノ類ニ陥入ス各其前證アリテ察知シ易シ。脈外溢餘ノ血液ハ其
始ハ良性ノ物ト雖モ。其道路ヲ離レテ留滯スルモ
ノナル故ニ。復ビ元運ノ化ニ隨去ル^レ難ク。乃⁺腦ノ
空間ニ泛濫シテ以テ腦髓ヲ壓迫シ。持久不止ノ頭
痛ヲ發スル^レアリ。若シ既ニ久ク經ルトキハ。則鬱

敗シテ酷厲質ニ變シ。刺痛劇痛熱痛等ヲ發シ。若シ
 粘凝質ナル者ハ。重痛押痛寒痛等ヲ發ナリ。凡血液
 行路ニ凡ソ身體中空間ノ處ハ。則居恆空氣ノ外ナ
 シ。故ニ凡ソ身體中空間ノ處ハ。則居恆空氣ノ外ナ
 物ノ茲ニ在ルニ去ル。若其血液或ハ脈外ニ漏泄シテ
 復其行路ニ順ヒ去ル。能ハザレバ。遂ニ其處ニ滯
 瀦腐敗スルニ至ルナリ。其機ノ例シテ知リ易以下
 キハ水腫病是ナリ。餘モ亦准ジテ察スベシ。易以下
 舉ル所ノ諸液モ。皆是血中ニ含蓄ンテ腦中ニ齎シ
 来リ以テ禍ヲナス。前註ニ謂フ所ト同機ナリ。但
 其毒ノ性質ニ随テ差異ヲ致スノミ。水液トハ水狀
 若溢溜夥多ナルトキハ。則腦水腫ヲ患フ。蓋此ハ
 小兒ニ於テコレアル病ナリ。腐敗液ハ液性ノ損敗
 七ル者。胃ヨリ齎シ来ル。又前註ニ論ズル是ノ如ク。滯
 質ノ液ヲ齎ル人アリ。又前註ニ論ズル是ノ如ク。滯
 液ニ由テ腐敗スルアリ。膽液敗黑。家ハ下ニ見ハス。病
 ニ見ハス。壞血病毒ノ。ハ本病ノ條下ニ見ハス。病
 液留飲ハ胃ヨリ来リ。或ハ感冒ニ由テ生ス。鹹渣ハ
 老敗無用ノ鹽質ヲ含メル液。尿トナリ汗トナル者
 是ナリ。石灰性毒ハ是ノ如キ性。又兼發頭痛ハ皆其
 ノ一種ノ惡液ヲ生ズルナリ。又兼發頭痛ハ皆其
 白脈ヨリ連及シ来ルナリ。中ニ就テ胃ハ後天資生
 ノ本ニシテ白脈ヲ賦スル。尤多ク。腦ト親交スル
 一他藏ノ比ニ非ス。故ニ胃ニ病アレバ。則頭痛シ。腦
 ニ患アレバ。則惡心嘔吐シ。或ハ化熟ノ機ヲ妨ク。醫
 提綱ト詳説アリ。就テ見ルベシ。又病。肺ト肝ト連及
 シ。脾ト肝ト交通ス。漢醫ノ所謂ル。藏府表裏ノ説ト
 大ニ異。詳ニ察セザレバ。其根何レニ在。トヲ辨シ難
 シ。又婦人ハ多ク子宮病ヲ患ルニ由テ頭痛ヲ發ス

ルニ由テ腐敗スルアリ。膽液敗黑。家ハ下ニ見ハス。病
 ニ見ハス。壞血病毒ノ。ハ本病ノ條下ニ見ハス。病
 液留飲ハ胃ヨリ来リ。或ハ感冒ニ由テ生ス。鹹渣ハ
 老敗無用ノ鹽質ヲ含メル液。尿トナリ汗トナル者
 是ナリ。石灰性毒ハ是ノ如キ性。又兼發頭痛ハ皆其
 ノ一種ノ惡液ヲ生ズルナリ。又兼發頭痛ハ皆其
 白脈ヨリ連及シ来ルナリ。中ニ就テ胃ハ後天資生
 ノ本ニシテ白脈ヲ賦スル。尤多ク。腦ト親交スル
 一他藏ノ比ニ非ス。故ニ胃ニ病アレバ。則頭痛シ。腦
 ニ患アレバ。則惡心嘔吐シ。或ハ化熟ノ機ヲ妨ク。醫
 提綱ト詳説アリ。就テ見ルベシ。又病。肺ト肝ト連及
 シ。脾ト肝ト交通ス。漢醫ノ所謂ル。藏府表裏ノ説ト
 大ニ異。詳ニ察セザレバ。其根何レニ在。トヲ辨シ難
 シ。又婦人ハ多ク子宮病ヲ患ルニ由テ頭痛ヲ發ス

ルモノナリ。知ズンバアルベカラズ。

○凡ソ頭痛尋常ハ大抵腦外ニ在リ。若其薄腦膜ニ在ル者ハ深ク裏ニ在テ且ツ眼病ヲ無ヌ。眼膜ト聯ルガ故ナリ厚腦膜ニ在ル者ハ腦ノ表面頭蓋骨下ニ抵觸ス。偏頭痛ハ胃中ノ汚物ヨリ發スルヲ多ク。癥毒ヨリ来ルモ亦少カラズ。而テコレヲ辨ズルニ。癥毒ハ喜テ骨ニ就キ以テ腦蓋ヲ潰亂侵蝕スルナリ。徵スベシ痘疹後ニ時ヲ定テ頭痛ヲ發スルハ。必ズ壞血病毒アルナリ。凡壞血家ノ頭痛ハ殊ニ愈ガタキ者ナリ。鼻涕閉塞ヨリ来ル者ハ額内麻スルガ如クニシテ

全頭重シ。胃病ヨリ来ル者ハ前頭ニ響キ。子宮病ヨリ来ル者ハ後頭ニ應シ。且ツ惡寒ヲ兼ヌ。其部ノ連交スルヲ以ナリ

○遺毒ハ根治シガタシ。然ドモ其毒性ヲ察シテ適宜ノ方ヲ處スベシ。多血聚攻。及内外焮腫ノ候アリ。痛ミ鼓動シテ顔色赤盈スル者等ハ。刺絡角法ヲ施シ。或ハ蠟鍼法ヲ顛顛若ハ耳後ニ施シテ血ヲ瀉スベシ。次ニ發疱膏ヲ領。或ハ耳後。或ハ痛處。或ハ舉頭ニ傳テ可ナリ。諸毒内攻スル者ハ。各其宜ニ随テコレヲ導泄スベシ。壞血病毒。膽液敗黒。粘液留滯等ヨリ

發スル者ハ大率下導スルニ宜シ。停食及胃中ノ腐
 壞物ヨリ来ルハ尤モ強ク下スベシ。或ハ先ツ吐劑
 ニ大黃劑ヲ與ヘテ克クコレヲ清滌シ。終ニ虛弱家ハ
 健胃劑ヲ與テ其再發ヲ防禦スベシ。則脚湯法及引降劑ニテ安靜スベシ。重證危篤ナル
 ハ。溉導方若ハ緩下劑ヲ與テ而テ后催睡藥ヲ用テ
 コレヲ鎮スベシ。若シ劇證ニ非ル其他熱毒感冒シ若
 鼻涕閉塞シテ頭痛ヲ發スル者ハ。硝砂時氣暑濕及
 精或ハ刺戟性ノ喘藥ヲ施シテ可ナリ。諸兼發ノ證ハ宜ク其本病ニ就テ處置スベシ。諸方
 載テ泰西方鑑ニ集
 載ス。採用スベシ

病因精義卷之二終

吉田屋治兵衛



西村正齋圖書

貽安齋藏



文政十年丁亥三月

北發兌書肆

京都二條柳馬場西入

吉田屋治兵衛

