



病
目
精
義

四

ヤ 9
1161
4



七九
1161
4

病因精義目次

卷之四 二篇下

眼病下

膿眼

眼星

眼釘

曇暗眼

昏暗眼

瞳子散大

瞳子縮小

流淚眼

內眦膿瘍

淚管癭

耳病第十八

騷鳴

耳痛

利聽

難聽

聾

鼻病第十九

失鼻
鼻中潰瘍

噴嚏

濁涕

衄

鼻痔

口舌脣齒病第二十

失味
脣裂

重舌
齒痛

蝦蟇腫

病因精義

卷之四目次



91-2024



病因精義卷之四

桃塢小森先生講述 男 桃郭義真筆記

眼病下

膿眼。膿汁繫著于角膜。或葡萄膜。或角膜與烏睛之間。或白膜與角膜之際也。其因係曾患焮腫痘毒外傷等也。或自他病毒浸淫于眼中亦來。其膿惡性若過多者難治。或作膿障。或作膿塊。以致昏也。膿汁寡少且不惡性者則自令利消散。或自氣孔滲漏而盡焉。

膿ノ始テ聚ルヤ。細小白點ヲ生シテ。玲瓏角膜ニ著

見スルヲ真證トス。若シ前室即角膜トノ間ナリ烏睛ニ白點
ヲ現ス者ハ形新月ノ如シ。或ハ全アリ掩蔽スル若シ葡萄膜
ニ著ク者ハ急ニ現ハル、ナシ然ドモ遂ニ水様
液中ニ溢出スルナリ。

○治法。其膿ヲ分利消散スルニ蒸藥及稀解利尿ノ方
ヲ施シ。或ハ癰毒焮腫眼ノ治法ヲ以テス。效ナキ者
ハ。則角膜ヲ截開シテコレヲ去ルベシ。法ハ醫障若
術ニ從フ若
癰毒淋疾等ヨリ來ル者ハ。治法焮腫眼篇ニ在リ。若
夫レ膿汁充滿スル者ハ不治ナリ。諸方劑泰西
方鑑ニ出ス

眼星有赤白兩種。凝血若鹹液點結于角膜而視鑿多少

蒙蔽也。其因打撲突衝久視日火及痘毒癰毒諸瘡毒侵
入等而多焮腫眼後之患也。

此證癰痕ト相似タリ。然ドモ癰痕ハ糙澀ナルガ如
クニシテ平滑ナラズ。此證ハコレニ反シテ平滑ナ
リ。又膿腫ト混ジ易シ。然ドモ膿腫ハ多少焮痛ヲ兼
ヌ。此證ハ些ノ疼モナシ。又赤白トモニ厚薄ノ差等
アリ。白シテ薄ハ雲霧烟霞ノ如シ。厚ハ黄色ヲ帶テ
劃然ト見ツベシ。赤シテ薄ハ尋常血色ナリ。厚ハ黦
色ヲナシ終ニ黑色ニ變ズ。蓋シ白眼ニ在テ且ツ薄
ハ治シ易シ。黑眼ニ在テ且厚ハ治シ難シ。然トモ小
兒ハ治ス

但甚シテ塊然ト硬結スル者ハ手術ヲ施スニア
ラザレバ終ニ治セズ。然ドモ全ク明ヲ失

○治法。耳後及項窩ニ發疱膏ヲ施シ。粘液ヲ稀解スル

緩下劑ヲ内服セシメ。慎テ膏梁美厚乾燥鹽藏ノ品

ヲ避テ禁シ。外ハ蓬砂水。硃砂散。硃醋湛。礬糖粉。膽礬水

阿片醇等ヲ施シ。甚キ者ハ汞劑ヲ用テ良ナリ。諸方劑

西方鑑ニ集載ス
撰用スベシ

眼釘。結膜之脈絡緩延也。蓋其始自外眥。或内眥。或上下

瞼際起。而蔓延於球上。遂至于角膜也。外因打撲撞傷等。

内因結膜焮腫。粟疹等。不適宜愈合。加有稠凝液之留滯

于此部而生之也。

此瘰癧。或ハ烏翼ヲ張ガ如キヲ以テ翅翳ノ稱アリ。

又其幅廣ク覆フ者ヲ眼爪トモ名ヅケリ。而テ其外

眥ヨリ来ル者最多ク。内眥ヨリ来ル者コレニ次キ。

上下ヨリ来ル者ハ甚寡シ。又其質ニ膜様ノ者アリ。

脂様ノ者アリ。肉様ノ者アリ。癩様ノ者アリ。コレ其

留滯スル所ノ液質各異ナル所アルヨリ来ルナリ。

凡白色。即膜様。或黄色。即脂様。ニシテ薄ク軟ニ。痛ナキ者

ハ治シ易シ。赤色。即肉様。或青色。或帶黑色ニシテ厚ク

硬ク。此等ハ其留滯スル所ノ液質。痛アル者ハ治シ

難シ。若既ニ瘡様ヲ成シ。或ハ眼心ヲ覆フ者ハ治セ
ス。ヲタトヒ裁斷法ヲ施スモ。癢痕ガ作テ明
ス。妨ダ。其用ヲ為ス。不能ザルガ故ナリ

○治法。硃乳散。泊乳蘆蓉水。或ハ腐藥ヲ施シ。或ハ裁斷
法ヲ行フベシ。○裁斷法。患者ヲ坐セシメ。傍人ヲシ
テ背ヨリ手ヲ廻シテ頭ヲ固持シ。且カ雙眼ヲ蓋閉シ。
餘指ヲ用テ上下ヨリ其病眼ノ瞼ヲ張開セシメ。醫
師前ヨリ進ミ。小鈎針ヲ執テ眼釘ノ正中ニ掛テ引
舉ゲ。サテ銳針ニ絲ヲ紉シテ。結膜即白ト眼釘トノ
交際ニ刺通シ。而テ後鈎ヲ去リ。絲ヲ執テ眼釘ノ全
體ヲ引舉ゲ。鈎針ノ首ノ少ク勾カミタルカ。或ハ鵝翮ノ

ソギタルモノヲ用テ膜ト釘トヲ別ワ離テ。而テ後小
剪刀ヲ以テコレヲ切り除キ。雞子白ニ蕃薇水ヲ合
シ樟腦少ヲ和シタルヲ巾ニ浸シテ眼上ニ被覆シ。
且時時眼瞼ヲ瞬動セシメ。瞼裏ニ生著セザル様ニ
スベシ。創口瘡テ後數日。鉛糖水ヲ點シテ功ヲ終フ。
曇暗眼之近因。水晶液乾涸也。其遠因。衰老自然。或細書
精工。以盡目力。或久視日火。以奪眼精。或曾病ア眼腫損傷
等也。一種角膜曇暗證。汚液或鹹渣等。滯于其部。細絡。或
纖絡相附著。而流行壅遏也。其因與角膜汚點同。即眼
此證ヲ發スル前ニハ。視識ニ雲霧様ノ物ヲ見ガ如

ク。或ハ眼底疼痛シテ顛顛ニ連及シ。一眼或ハ兩眼
 先ツ少ク曇暗シ。次テ水晶液淺蘭色ヲ為シ。增長ス
 レバ灰色ニ變ジ。遂ニ眼障ノ如クニ為テ。物ヲ辨シ
 難キニ至ル。但眼障ハ角膜ニ當テ瞳子ノ前面ニ現
 ハレ。此證ハ深ク後底ニ見ユ。又角膜曇暗ハ。則角膜
 直ニ其玲瓏タル質ヲ失テ曇暗色ヲ為シ。視鑿蒙蔽
 シテ雲霧ノ遮ルガ如ク。瞳子分明ナラザルナリ。若
 其甚キ者ハ。則角膜全ク黄色。或ハ白色ト為テ昏ス
 ルナリ。或ハ半分或ハ三分一ホド曇暗スルアリ。是
 得ヲ見。輕證ハ治スベシ。重證ハ治シ難シ。老人ハ不治

トス。蓋シ此證ハ都テ視力極ル者衰弱ナリ。雖モ全盲ニ至ラザルモ亦半分ノ一

○治法。打膿法。發疱膏良ナリ。又蒸漏劑ヲ施シ。且阿片
 醇ヲ滴入スル。一日ニ二三回。○角膜曇暗證ハ。大率
 眼星ト同ク治療スベシ。

昏暗眼之近因。腫白脈閉塞也。其遠因。過溢液。若溢餘血
 若腫瘍。若他病毒侵入。以抑壓之。或粘凝液灌入白脈。以
 使麻痺。或白脈衰弱。或靈液之缺。或腫瘍潰膿。以侵蝕白
 脈等也。

此病ハ。眼ノ照映鑑受スル所ノ諸液。及ヒ外面諸膜
 ニ在ニ非ズ。故ニ外候常ノ如クニシテ。但瞳子或散

大或縮小シ。且運轉セズ。而テ視力漸次ニ昏晦スルナリ。蓋司瞳白脈ハ前腦第二對白脈ニシテ。眼部ノ知覺運動一切ノ主宰タリ。而ルニ今本文ニ言フ所ノ如キ事件アリテ茲ニ在リ。故ニ前文述ル所ノ如キ證狀ヲ現ハスナリ。

○治法ハ因ニ随テ異ナリ。然ドモ要其白脈ノ閉塞セシムル所以ノ者ヲ導泄スルニ在ルニ。黃汞丸コレヲ主ドル。且刺絡下劑。角法。發疱膏。嚙鼻方等宜ニ随テコレヲ兼施スベシ。又奇驗酒ヲ用ヒ。粘魚須湯ヲ兼服シテ良功アリ。癩毒篇ニ見ハス 衰弱ノ證了

ル者ハ強壯劑ヲ與ベシ。他病ヨリ連及スルハナホ本病ノ上ニ就テ治ヲ議スベシ。凡先天ノ遺傳ト經久ナル者ハ不治ナリ。世醫此證ヲ誤認テソコヒトナシ。遂ニ針ヲ下シテ害ヲ作ス。考シテ其別ヲ知ルベシ。

肉障之近因。水晶液中生凝稠粘濁也。其遠因。眼焮腫不散者。過飲家。平素竭目力者。經時視光暉者。痛風歷節。冒寒熱病。癩瘡。及諸瘡毒。或腦間粘液等侵淫者。忿怒啼泣。打撲撞傷者。高年自然。若稟受遺毒等。以使輸養此液原醅稠厚者等也。又有稱膜障者。無他前證進下等。其凝稠粘濁液。經日化成膜狀爾。又有名毀障者。此為前文所論

打撲撞傷之甚以破裂諸液之包膜之所致也

内障ハ水晶液ノ小管閉塞スルナリ。水晶液ハ微細透明ナ
 ル。纖維ヲ以テ織成セル囊内ニ充實スル者ナリ。故
 ニ其液質稠濁ニナレバ。則汚滯壅塞ノ患ヲ將出シ
 来ラザルヲ得ズ。或又其纖維ヲ衝損シ。塵閉スレ
 バ。則其液質損敗凝結セザルヲ得ズ。共ニ障翳ノ
 因由トナシ。是ヲ以テ外影透徹シ難ク。其閉塞セル小
 管ノ條理ノ分折スル形狀ニ随テ。氣光ノ来射スル
 者ガ分散閃動シ。數十ノ蚊蠅眼前ヲ飛過スルガ如
 ク。或ハ一物兩個ニ見ヘ。又其液質ノ將ニ稠凝セン
 トスルヤ。物影盪搖シテ水中ヨリコレヲ見ルガ如
 ク。且種種ノ色ヲ現スヲアリ。而テ後鑒視漸ク蒙昧

シ。時日ヲ經テ遂ニ膜障ヲ成ストキハ。則全ク昏者
 トナリ。但昏明ヲ辨識スルノミ。凡ソ障アル者其眼
 ヲ摩擦シテ瞳子散大スル者ハ。則ナホ未夕全成セ
 ザルノ候ナリ。若瞳子自若トシテ舊ノ如クナル者
 ハ。則障膜全ク成レルナリ。大抵六月ニシテ全成人
 ノ時ニ直一トシテ一終年モ全成セザル者アリ。又
 輕證ハ服藥シテ治スベシ。重證ハ手術ニ非レバ能
 ハズ。既ニ膜障トナレルハ特ニ難治トス。凡ソ譫妄
 熱。肺焮腫。脇痛。頭痛等ノ後ニ發スル者モ亦治シ難
 ク。或ハ他ノ眼病及諸病ヲ兼ル者モ亦然ナリ。膜障

灰色。白色ナルハ治スベシ。青緑暗黒黄。若ハ水銀色ノ者ハ不治ナリ。衰老ノ人。及ヒ險惡ノ證ハ終ニ救療スルヲ得ズ。毀障ハ包膜破ル、ガ故ニ。水晶液ト硝子液ト混淆スルナリ。手術モ亦コレヲ何如トモスルヲ無キノミ。

○治法。内障初發ハ。下劑及強壯頭腦劑揮發滲透ノ品ヲ用ユ。貫線法。呼膿法。角子。浴藥等ハ禁ズベシ。服藥數日效ナキ者ハ。鍼ヲ入レテコレヲ壓下スベシ。此其障ヲ作ス者ヲ球ノ下底ハ押シ下シテ。照映スル部ニ當ラザラシムルナリ。鍼ヲ下シテ良久。鎮定シ居テ。而テ後鍼ヲ抜ク處ヘ。上浮スルナリ。舊既ニ膜狀ヲ作ス者ハ固著

シテ動シ難シ。然ドモ其膜小ニシテ採取ルヲ得ベキ者ハ。瞳ノ上部ニ小疵ヲ作り。缺鍼ヲ以テ引出シ去ルベシ。疵孔ヲ上部ニ作ルハ。他ノ眼液ヲ多ク漏セザルガ為ナリ。若其大ナル者ハ治セズ。

瞳子散大之近因。烏睛之曲纖維緩弱而直纖維緊急也。其遠因。外傷若内障鍼後。或焮腫眼後。或患昏暗眼等。使其虛衰。又嬰痲病。或過用澀眼劑等。使其麻痺。若嬰痲急病。使其拘攣。或於太頭痛。腦水腫。蚊蟲等兼發者也。又有水晶液。或硝子液過溢。而水樣液乏少。或水晶液緊縮。而附著于葡萄膜。以使失其常度者矣。○瞳子縮小之近因。

烏睛之由。纖維絡緊急。而直纖維絡緩漫也。其速自此亦痲病。若痲急病之所兼發。或焮腫眼。後之所為患也。蓋其毒之所著不同。以致與前證相反已。

烏睛ハ脈質膜ナリ。其纖維ニ曲直二様アリテ以テ經緯ヲ相ナス。而テ其收縮括約ハ。則曲纖維ノ主トル所ナリ。故ニ瞳子ノ散大縮小ハ。則曲纖維ノ常ニ違テ緩漫ナルト緊急ナルトノ變ヨリ生ズ。二證トモニコレヲ患ルノ未ダ久シカラザル者ハ治スベシ。習テ常トナリ。若ハ天稟然ル者ハ治セズ。

○治法。瞳子散大スル者ハ。先ヅ頭靜脈解穢圖賦ヲ刺

シ。次ニ下劑ヲ與ヘ。攝生ヲ慎ミ。項ニ烙鐵ヲ施テ甚良。又鉛糖玫瑰水。亞鉛薔薇水等ノ收瀋シテ。且強壯ニスル眼水ヲ施スベシ。麻痺スルヨリ来ル者ハコレニ反ス。宜ク硃砂末ヲ眼中ニ點シ。或ハ草耶普的油ヲ顛顛ニ擦シ。或ハ其氣ヲ嗅引スルモ亦效アリ。痲攣證ハ内服外用共ニ纈草飲ニ宜シ。其他兼發ノ證ハ治皆本病上ニ在リ。蓋シ腦水腫及水晶液過溢以下ノ證ハ治シ難シトス。

○瞳子縮小。脾病。子宮衝逆。及諸痲攣病等ヨリ来ルハ。鎮痲劑ニ宜シ。痲病及諸痲痺不遂ヨリ来ルハ。強壯

白脈割ニ宜シ。都テ人乳汁ヲ取テ屢コレヲ滴入ス
 ベシ。習常ノ證。細字ヲ書シ細エヲナス等ヨリ来ルハ。先ツ其因ヲ去リ。暗處ニ物ヲ探リ見ルヲ
禁シ。日庭内ニ道遙シ尺管
蒼樹青草等ヲ看スルニ宜シ

流淚眼之近目。淚泌胞衰弱。或近傍諸器衰弱。若焮腫。或淚液滿溢。若酷厲之所致也。或自角膜白膜等氣孔亦滲漏之。其速因。煙塵。烈風。香薰。或打撲損傷。或倒睫。或忿怒悲憂。或過酒。或咳嗽。或傷冷毒。痛風毒。痘疹癰瘡。諸毒液浸淫。或濕眼焮腫。或患他眼疾之後等也。

淚泌胞外管ヨリ内管ニ至ルハ。即淚液ヲ分泌スルノ器ナリ。故ニソレガ衰弱スレバ。則括約保有

ノ力ナクシテ。斷ヘズ淚ヲ泄シ。更ニ其分利ノ機ヲ誤レバ。則多少血ヲ交ルテアリ。諸器トハ眼瞼。及脂泌胞。淚點。眼瞼縁端ノ二小管ニ在リ淚囊。膜様ノ質ニシテ。鼻中裏部ノ包膜ニ連ル。此ニ夥ク細小泌胞ヲ具シテ内管ニ在リ淚管。淚囊ノ内管ニ通シテ等ヲ云ナリ。此等ノ器ガ焮腫スレバ。諸器自カラ狭窄シテ以テ淚液ヲ蓄ルテ能ハザルナリ。又淚液ガ過多ナレバ止テ得ズ溢泄シ。尋常刺カ故ニ。殊ニ滿溢スルニ非レバ。則此證ヲ為ス。ハキナリ無其質ガ酷厲ナレバ。則諸器ノ白脈ヲ刺傷シテ攣縮絞出セシムルナリ。諸膜ノ氣眼ヨリ滲漏ス

ル者モ亦其纖維絡ガ衰弱シテ緩漫ナルノ致ス所ナリ。此證ハ則角膜或ハ白膜ニ濕氣ヲ含テ赤色疼痛ス。煙塵烈風香薰等ハ以テ淚液ノ事ヲ司ドル諸器ヲ衝動スルヨリシ。傷冷毒以下ハ淚液酷厲ヲナスノ目タリ。又淚點或淚管等ノ諸器ヲ火傷シ。或ハ膿潰セシ後愈合シテ閉塞スルヨリ来ルアリ。此等ノ文然リ易シテ論ゼズ凡此證ヲ古人二種ニ分ツ。曰ク寒曰ク熱ト是ナリ。蓋シ熱ニ屬スル者ハ其淚熱ク且臉縁ヲ侵蝕シテ睫毛脱落ス。寒ニ屬スル者ハコレニ反ストナリ。



○治法。衰弱證ハ。強壯收溜スルニ鉛醋水。或ハ礬石水ヲ點シ。淚質酷厲證ハ。因ヲ辨ジテ適宜ノ導泄劑ヲ内服セシメ。外用膠漿。或ハ和酷眼水ヲ施スベシ。若夫諸器閉塞證ハ。則手術ヲ以テ截刺透通セシムルニ在ルノミ。諸藥劑總テ泰西方鑑ニ在ルノミ。集載ス。換用スベシ。

内眥膿瘍。焮熱疼痛者。淚囊及淚管腫痛也。内因酷厲毒癩毒。外因刺傷打撲。無焮痛者。淚液凝滯于淚泌胞而發小潰瘍也。

此病ハ膿腫ヲ眼眥ニ生ジ。兩臉ニ連リ。鼻ニ附キ。内眥ニ形見ス。其鼻ニ係累スル所以ハ。淚囊ノ膜ハ鼻

中裏面ノ膜ニ連リ。淚管ノ終末ハ鼻中ニ達スルカ
故ナリ。兩臉ニ聯ル者ハ。淚泌胞ノ所在ニ及ブナリ。
○治法。兼焮腫證ハ。瀉血下劑。鉛醋水。礬石水等ノ清涼
眼水ヲ換用スベシ。焮痛ナキ者ハコレニ反ス。宜ク
其毒液ヲ下導シ。且コレヲ和解スルニ膠漿ヲ外敷
スベシ。若熟膿スル者ハ。速ニ破決シ。且其近傍丁骨
等ノ腐蝕スルヲ防禦スベシ。又淚管癭若クハ惡性
潰瘍ニ變ゼンヲ恐ルベシ。

淚管癭者。膿樣液自淚管流泄也。或兼焮腫亦有之。其因
自稟賦惡液多。或壞血病毒。或痘瘡癩毒。諸瘡毒。或誤治

内眥膿瘍。打撲傷。流淚眼等漸也。

初發腫脹シテ微ク赤色ヲ見ハシ。コレヲ按スレバ
痛ヲ覺ヘ。尋常ノ膿樣ノ液汁流出シテ止ザルモノ
ナリ。此其稟賦惡液多キ人。コレヲ淚液ノ質中ニ含
蓄シテコ、ニ留滯シ。腐壞シテ潰瘍ヲ生ズルナリ。
此證モ亦内眥膿瘍ノ如ク。此病痘毒ヨリ發シ。丁骨
或上顎ノ腐蝕ヲ兼ル症ハ甚夕治シ難シ。壞血病毒
或癩毒ヨリ發スル者ハ。先其本病ヲ治スベシ。否レバ
終ニ治ヲ致ス。無キナリ。或此病ニ手術ヲ施シテ後。
流淚眼トナ
ル下驗ガ牽縮シ。或ハ

○治法。外術ヲ施スニ非レバ癒ル_レ無シ。_{法。瘍科摘要}
 自餘眼疾甚多。不_レ遑_レ枚舉也。欲_レ探_レ其因者。據_レ前諸證之例。
 推_レ之。則可_レ畧_レ知也耳。

凡、眼球瘦小ナルハ諸液ノ減耗スルナリ。治コレヲ
 滋補スルニアリ。又眼球_レ睜動。瞳子不定等ハ。諸筋ノ
 痙攣。或ハ各部ノ纖維ニ搐搦ノ運動ヲ發スルナリ。
 治コレヲ緩和スルニ在リ。鎮痙劑ニ宜シ。水腫眼ハ
 水様液ノ溢滿スルナリ。治外術ヲ施ザレバ癒ズ。然
 レドモ甚難治ナリ。赤眼ハ白膜ノ細絡ニ血ノ聚ル
 ナリ。治コレヲ瀉耗スルニ在リ。緑眼ハ硝子液ノ曇

暗ナルナリ。難治ノ症トス。視力乏弱ハ白脈ノ衰弱
 或ハ水様液ノ稠厚ナルナリ。強壯眼水ニ宜シ。斜視
 眼ハ六筋ノ中ノ一筋ガ_レ孿急スルカ。或ハ弛緩スル
 ナリ。_{頭ノ打撲。眼ノ刺傷。或ハ卒中ノ初發。癩病ノ惡キ}
 来_レル_ニ治。病因ヲ探知シテコレヲ除去ルニアリ。_{小兒}
 得_レザ_レル_ニヤ_レウ_ニ。假面ヲ作テ常ニコレヲ掛サセ置ク
 奇術ナリ。近視眼ハ眼球大ニシテ突出シ。且角膜ガ
 隆起スルナリ。遠視眼ハ眼球小ニシテ陷入シ。且角
 膜ガ_レ扁平ナルナリ。此二者ハ治療ノ能スル所ニ
 非ズ。羞明眼ハ白脈ノ觸覺敏捷ニ過ルナリ。強壯白

脈劑ニ宜シ。雞眼ハ時ヲ期シテ昏暗眼ヲ發スルナリ。眼疣ハ。臉縁ノ泌胞ニ凝液アルナリ。臉縁赤爛ハ。弓狀軟骨ノ部焮腫スルナリ。遠因ハ焮腫ト相同シ大率右等ノ如シ。善ク類推セバ。則百般ノ異證ト雖モ亦何ゾ知リ難カラシ。

耳病第十八

耳病者。騷鳴。疼痛。利聽。難聽。全聾等也。

耳ノ採聽スルヤ。外部ニ輪郭アリ以テ來聲凡聲ニハニ由テ起テ來ルコトヲ承受シ。中カ螺殼狀ノ竅裏其質ヲ柔

皮テ成リ。穿入スルニ隨テ塵埃ヲ防キ遮リ。皮裏ニ黃取聾ヲ出ステハ攝納シ。突起ト溝陷ト相襲テ以テ其響ヲ長シテ。而テ鼓膜ニ鼓膜ハ薄シテ透明。其形楕圓ルヲ觸搏スレバ。則内部ア鼓膜裏ニ一聴鼓ト名ク處ノ四小骨各其形狀異ナルニ就テコレニ應シテ響ヲ作シ。卵窓。鐙丸。二骨。容入ス。圓窓。下ニ云フ所ノ蝸等ニ入リ。迷路門。迷路。蝸牛殼。底ニ在リ。等ノ種種ニ宛曲轉回セル空洞管狀ノ中ニ滿ル所ノ空氣ハ此空氣ノ喇叭管ナル者アリ。剛骨。柔骨ト相接スル所ニ在テ上腭ニ循テ孔ヲ咽中扁桃核ノ後ニ開キ。コレヨリ出入シテ音調ヲ節スル。且餘響ヲ激動シ。其部ノ筋

肉諸器ニ布蔓セル聽聽白脈ノ枝條ヲ迫切觸感セシメテコレヲ其幹ニ傳ヘ遂ニ以テ腦ニ達シ神識ニ通ズルナリ。又一箇ノ水管アリ。迷路ヨリ起テ石膜ノ潤燥ノ度ヲ節スル器也。

騷鳴之近因有衝動鼓膜者之所致也。其遠因多血上攻。通血閉止蒸氣閉塞黏液鬱滯癥毒等也。

夫來聲ナクシテ而テ耳騷鳴ヲ覺ルハ是其内ヨリ鼓膜及諸聽具ヲ衝動スル者アルノ致ス所ナルヲ以テ知ルベシ。多血上攻ノ證ハ春秋血液變更ノ時ニ當テ發スル一多シ。諸通血婦人月經閉止ニ因ル

モ亦同機ナリ。蓋血液滿漲激行シテ而テ鼓膜ヲ撲テバ。則流水ノ石瀨ニ鳴ルガ如ク。其動至微ナリト雖モ其感觸スル所切ナルガ故ニ其響ク一甚大ナルヲ覺ユルナリ。又取聾乾燥或傷冷毒ノ如キ寒粘液ガ鬱滯スル等ニテ耳竅ノ蒸氣ヲ過閉スレバ。猶地氣鬱シテ震シ。或ハ動テ風トナリ。山鳴谷響ガ如ク一般。怒號騷鳴シテ鉦聲ノ如ク。打鼓ノ如ク。以テ外来ノ聲ヲ擾亂シテ聽ク一ヲ得ザラシムルナリ。上ニ證主客ノ勢ハ同カラズト雖モ。然下モ血液滿漲スレバ則必ズ鬱閉シ。諸液鬱滯スレバ。血行必ズ激逆シ。相兼テ以テ因ヲナスナリ。又ニ證トモニ鼓膜内ノ蒸氣多ク鬱シテ所在ノ諸聽具ヲ押壓シ。且

聽白脈 腦内ニ響動スルナリテ其他癩毒諸瘡毒上攻若ハ熱毒上攻者熱病聲スル等ヨリ来ルモ亦是其毒ガ血中ニ在テ血ヲシテ沸騰上衝セシムルノ致ス所或ハ白脈麻痺將ニ難聽ヲ發セントシテ先其部ノ運行留滞シテ而テ騷鳴ヲナスモノアリ其治ハ則各本病上ニ在テ單ニ耳鳴ヲ發スル者ニ同カラズト雖モ然ドモ其以テ耳鳴スル所ノ機ニ於テハ則多血上衝ニ因ル者ニ異ナルヲ無キナリ

○治法多血稠血焮腫等ノ候アル者ハ刺絡及清凉下劑消石飲等ニ宜シ粘液閉塞腦内多液留ヨリ来ル

者ハ則コレヲ稀解スルニ朱厘芝丸ヲ與フベシ且耳後發疱膏或呼膿法等ヲ施シ癩毒ニ由ル者ハ汞劑ヲ内服セシムルニ宜シ又皆隨宜ノ滴入劑ヲ施スベシ諸方劑總テ泰西方鑑ニ集載ス撰用スベシ

耳痛之近因有壓迫其部之諸膜及皮膚白脈等者之所致也其遠因焮腫膿瘍潰瘍泌胞腫或取聾性惡等也

蓋諸腫瘍ノ發スルヤ先鬱滯スル所ノ者アリテ腫脹シ而テ後ニ膿潰ス故ニ其始ノ鬱滯スルノ時ニ當テハ必先騷鳴ヲ發シテ以テ疼痛ノ前茅ヲナスモノナリ或ハ既ニ腫脹疼痛スルニ至テモナホ騷

鳴ヲ兼ル者アリ。耳後發ト耳後若ハ耳下ニ發スルヲ
 害シテ遂ニ譫妄狂躁ヲ發シテ死スル者鮮カラズ。
 其因ニ血或膽液或水或黒液ヨリ發スルノ四等アリ。
 リ。赤脹硬滿。指頭ヲ以テコレヲ按スレバ。則白色ヲ
 見ハシ。コレヲ放テバ。則復乍チ赤色ヲ作シ。呼吸重
 難。飲食下リ難カラズ。血ヨリ來ルナリ。刺痛大熱スレ
 ド。モ呼吸難カラズ。飲食異ナラザルハ。膽液ヨリ來
 ルナリ。熱セズ。赤カラズ。唯少ク痛アルハ。水ヨリ來
 ルナリ。大堅少痛。淺綠色ヲ見ハスハ。黒液ヨリ來ル
 ナリ。治法ハ。傷又既ニ潰瘍トナル者ハ。間蟲ヲ生シ
 科摘要ニ見ス。又耐ヘ難キ痛ヲ發スルナリ。又耳焮腫膿
 テ侵蝕シ。耐ヘ難キ痛ヲ發スルナリ。又耳焮腫膿
 瘍ハ。疫熱或ハ喉風ニ兼發スルナリ。又耳焮腫膿
 部。分ニ發スル者ハ。潰膿シ難ク。且其膿ガ泄除シ難
 シ。又瘰癧肉様ノ硬結腫ヲ生ズルトキハ。腐化切斷ニ難
 尤難レハ治セズ。疔疔性惡酷厲ナル者ハ。諸膜ニ滲透

シ。白脈ヲ刺傷シテ疼痛セシム。又乾固スル者ハ。歷
 痛ヲ發シテ聽ヘ難シ。凡耳痛劇證ハ。壯熱頭痛譫妄
 狂躁昏憤不寐搖擗癩瘰等ヲ誘發シテ死スルナリ。
 リ。輕忽ニ從事スルナク。意ヲ用テ速ニ治術ヲ施
 スベシ。
 ○治法。耳痛熱血焮腫ヨリ來リ。面赤シテ腫起シ。腦中
 鼓動ヲ覺ユル者ハ。其痛ム方ノ頭靜脈ヲ刺テ瀉血
 シ。婦人ノ溫乳汁ヲ取テ屢耳中ニ滴入シテ緩和ス
 ベシ。或ハ鷄子白ニ薑薑菜油。龍腦。各少許ヲ調和シ
 テ灌入スルモ亦良ナリ。内服劑ハ。答末林。度蕃薇煉

糖ヲ與テ腦ヲ潔スベシ。劇痛不寐等ヲ兼ル者ハ嬰
 粟煉糖ヲ間用シテ其痛ヲ和ラゲ。且睡ヲ催スベシ。
 膿腫ヲナス者ハ軟化熟膿ノ蒸藥ニ宜シ。若已ニ膿
 潰スル者ハ龍牙水加蜜醋ヲ灌注シテ清除スベシ。
潰瘍耳創老人ハ治シガタシ耳中ノ泌胞腫ハ痛ミ最モ甚ク采聽
 ヲ障碍ス扁桃油ヲ綿布ニ浸セルヲ挿入シ。且時ニ
 龍牙水ヲ注射スベシ。耳中ニ生ズル蟲及ヒ外入ノ
 細蟲等ニテ瘙痒疼痛スルハ蘆會ヲ水ニテ溶化シ
 桃仁汁少ヲ合和シテ滴入スベシ。良ナリ。耳痛取聽
 性惡ヨリ来ルハ乳汁或ハ扁桃油ヲ施シ。若乾燥固

著スル者ハ石鹼水ヲ射入シテ稀解シ且清除スベ

シ。諸方劑總テ泰西方鑑ニ集載ス。換用スベシ。

利聽之因。鼓膜緊張。來聲激抵。雖受微音。亦不耐聽也。或
 聽白脈緊急者。亦有嬰此患。

夫絃急ナレバ則絶へ。革緊ナレバ則破ル。此病モ亦
 此理ニ同シ。苟モコレヲ舍テ而テ治セザレバ。則不
 日ニ聾ヲ致ス。

○治法。石鹼水ヲ注射シテコレヲ緩和シ。且軟化蒸藥
 ヲ施セバ則愈ユ。

難聽及聾之近因。聽白脈之麻痺。閉塞。或被抑壓也。其遠

因稠血黏液及癥毒若迅雷烈風及諸般急劇之音聲又鼓膜之頑硬痿弱息肉疣贅腫脹刺傷污垢壅塞若自前諸證漸進者等也蓋其為曰也輕微則難聽甚重則全聾雖有等級畢竟是同病矣

聰聽白脈ハ腦髓第七對白脈ノ名ニシテ全耳ノ諸器ヲ經綸シ採聽ノ官能ヲ主ドル者ナリ故ニ此カ閉塞スレバ則聾ス蓋シ聽白脈ノ麻痺スル其因亦他ノ痲病ト同ク即チ粘凝血液アルノ致ス所ナリ
瞳白脈痺スレバ昏暗眼ヲ發シ舌白脈痺スレバ言語蹇澀陰莖ノ直筋頑麻スレバ陰萎シ肝及直腸則括約筋不遂スレバ又腦病ヨリ連及シ或ハ外傷

抑壓ナドニテ兼發スルアリ或ハ前ニ論ズル所ノ耳中ノ腫脹等ニ抑塞セラレ、アリ此等ハ皆外ヨリ白脈ヲ壓迫シテ閉塞セシムル者ニシテ手足ノ壓迫ニテ麻木スルト同機ナリ又頭部寒冷ヨリ来ルヲ覺ユル者アリ蓋シ亦稠血行カズ火氣布キ難キノ候一身溫暖皆血一所為ナリ或ハ寒粘液ノ凝滯スルノミ又鼓膜ノ頑硬甚キ者ハ化シテ軟骨様ニナルナリ此證ハ大率衰老ノ人全軀滋潤液ノ枯竭スル者ニアリ或ハ久ク乾燥氣ヲ受ルヨリモ亦来ル纖維痿弱ハ凡粘液留飲多キ人及久ク濕地ニ起卧シ或ハ

冒寒シ。或ハ雨露ニ中ル等ナリ。疣贅。焮腫。損傷等ヨ
リ来ル者。分理會シ易シ。又污垢閉塞トハ。即チ聾
ノ乾固附着スルナリ。コレ殊ニ輕證ナリ。若夫熱病
ニ由テ聾スル者ハ。本病治スレバ則癒ユ。別ニコレ
ガ為ニ術ヲ施ス。コトヲ須ズ。一種異聽ト稱スル者。ア
聽スルコトアリト雖モ。其真正ヲ
聞得ルコト能ハザルノ病ナリ

○治法。聽白脈ノ麻痺ヨリ来ル聾ハ。耳ノ周圍ニ草^カ取^ヤ
普^フ的^テ油ヲ擦シ。續草湯ヲ内服セシムベシ。稠血粘液
及ビ污垢閉塞等ヨリ来ル者ハ。内服ニハ疏解湯ヲ
與ヘ。外用ニハ石鹼水ヲ注テコレヲ稀解スベシ。癰

毒ニ由テ来ル者ハ柔耒散。或ハ瘡木飲ヲ與ヘ。耳後
ニ發疱膏ヲ貼シ兼テ克ク攝生ヲ慎ムニアリ。前ノ
諸證ヨリ漸進スル者ハ。其治トホ本療ニ随フベシ。
諸烈急音ニ由ル者ハ。利聽ヨリ来ルト理ヲ同スト
雖モ。其治ハ則白脈麻痺ノ證ニ從フベシ。鼓膜ノ頑
硬スル者ハ。軟化融解スル蒸藥ヲ射入スベシ。纖維
痿弛スル者ハ。收瀋強健ニスルニ玫瑰水ヲ蒸藥ト
ナシテ施スベシ。息肉疣贅鼓膜刺傷ハ治シ難シ。腫
瘍ハ。先リ飲食ヲ稀薄ニシテ其腫ヲ長セザラシメ。
且蜀葵膏。或ハ蕃蔽油。或ハ蜜醋煉等ヲ傳クベシ。

鼻病第十九

鼻病者。失臭。噴嚏。濁涕。衄血。鼻痔。潰瘍等也。

鼻ハ中隔スルニ鼻柱ヲ以テシ。左右ニ孔ヲ開テ大氣ヲ送迎シ。且香臭ヲ辨シ。又腦間ノ剩液ヲ漏スルコトヲ主ドル。鼻柱ノ上部ハ剛骨。下部ハ柔骨ヲ以テ造成シ。孔内ノ上部ハ厚キ泌胞質ノ膜ヲ以テ被包セリ。此膜ノ上部ニ鬆疏ナル海綿様ノ骨。及方隅アル空殼アリ。共ニ膜ヲ以テコレヲ包メリ。此膜ニ腦髓第一對循鼻白脈ノ細支別ヲ交錯シテ組織シ。

以テ其官能ヲ作シム。蓋シ其香臭ヲ辨ズルガ如キ。先ツ此細支別ニ感觸シテ而テ幹ニ傳ヘ。而テ腦ニ達スルナリ。

失臭之近因。ハ黏液若過溢液溜滯于鼻中泌胞也。噴嚏者。酷厲液刺戟鼻白脈之所致也。黏涕濁涕稀涼液等過泄者。驅除腦中之溢液也。以上諸證大率因冒寒傷冷來然。失臭或自乾燥。若煖熱。或白脈壅塞。若衰弱來。噴嚏自外物侵入發流涕。與淚液共過溢粘涕。因稟賦出者亦有之。不可概論也。

涕汁粘稠シテ鼻内ニ附着シ。或ハ泌胞膜ニ充盈シ。

以テ白脈ノ感觸ヲ障遏スレバ。則香臭ヲ失スルナリ。然ドモ亦コレニ反シテ滋潤ノ液ニ乏シク甚々乾燥スルトキハ。則白脈其香臭ヲ承ルノ和宜ヲ失シテ。以テ觸知スルコト能ハザルノ證ヲ致スコトアリ。焮熱ニ因テ失臭スルハ。血ノコ、ニ滿漲シテ白脈ヲ壅迫スルト。熱ニテ乾燥スルトノ二因ヲ兼テ来ルナリ。或ハ嗅膜鼻中ニ周被スル膜ノ潰瘍ヲ生スルモ亦善ク失臭ス。此ハ其惡液ノ浸淫スルガ爲ニ靈液ノ質ヲ損ゼシムルノ致ス所ナリ。又前ニ論スル所ノ粘液等ノ白脈内ニ滯シテ壅塞シ。痲不遂

ノ證ヲ發スルカ。若ハ鼻涕久ク過泄シテ白脈コレガ爲ニ弛緩痿弱スルカ。或ハ諸腦病ヨリ連及シテ白脈ニ事アル即チ壅塞。痲痺。痿弱。若ハトキハ。則皆靈液ノ損敗等ヲ言フ能ク失臭ヲ致スナリ。稟賦チ白脈脆弱ノ人。動モスレハ。輒チ感觸甚敏捷ニシテ。僅ノ香臭ニモ勝ザル者アリ。此ナホ眼ノ強視。及耳ノ利聽ナドノ如ク。其終リ必ス失臭ヲ致ス者ナリ。知ズカラズアル或ハ又適ニハ上顎ノ海綿様骨若ハ額骨中ノ鼻空。疏大ニ過キ。若ハ狹窄ニ過ルカ。或ハ茲ニ汚穢腐敗ノ毒ヲ聚蓄スル等ニテ多少失臭スル者アリ。蓋循鼻白脈ト循舌白脈トハ。親ク相交通スル者ナリ。故ニ又嗅味ノ識具孰レカ一方ニ害アレ

バ。則必ズ共ニ災ヲ承ルモノナリ。察セズンバアル
ベカラズ。○夫_レ白脈ニハ必ズ自然ニ害物ヲ知テコ
レヲ驅逐スルノ天機アル者ナリ。故ニ内因若ハ外
因ニテモ酷厲質ノ刺戟スル者アリテ。以テ嗅膜ノ
白脈ヲ衝動スル。譬バ撚紙ヲ以テ探鼻スルガ如
キ。アアレバ。則一種ノ痙攣様ノ運動ヲ發シテコレ
ヲ彈出ス。嘔トス。是固輕微ノ證ナリト雖モ。内因
若ハ他ノ重病アリテ久ヲ經ルノ後ニ於テ。數數コ
レヲ發スルハ。此其毒性酷厲ニ變ズルノ致ス所ナ
リ。然ドモ亦コレ良能ガ其毒ヲ驅逐スルノ候トス

ルトキハ。則畏ル、ニハ足ラザルナリ。尋常感冒ニ於
テ嘔ヲ發スルモ亦同ジ。○冒寒傷冷ノ毒ハ喜テ頭
腦ニ侵入シ。ソレヨリ白脈ノ循行ニ從テ流注スル
モノナリ。然ルニ鼻ハ第一對白脈ノ循ル處。且其孔
腦ニ通シテ以テ腦間ノ溢液ヲ泄除スベキガ爲ノ
道路タルガ故ニ。苟モ冒寒病ニ嬰ルトキハ則涕汁
ヲ出ス。多夥ナルナリ。蓋シ其始テ流出スルヤ。必
稀涼。次ニ濃濁。終ニ粘稠ヲナス。是其毒ノ漸ク減退
スルノ候ナリ。若夫常常トシテ粘涕ヲ出ス。多キ
者ハ。稟賦殊ニ腸胃ノ運化健ナラズ。粘液ヲ釀畜ス

ルノ致ス所ナリ。又泣涕ヲ出ス時ニ當テ必ず多ク涕汁ヲ流スハ。是淚管ノ鼻中ニ通ズルガ為ト。其情ノ感動ニ由テ白脈及腦管モ皆共ニ急縮シテ涕汁モ亦多ク絞出スルトノ故ナリ。

○治法。失臭ハ頻ニ薄荷油ヲ嗅シテ良ナリ。又硃砂精或ハ鹿角精等ヲ嗅スルモ亦佳ナリ。皆善ク溜滯ヲ驅逐シ。白脈ヲ強壯ニス。若癰毒ヨリ来ル者ハ。汞劑宜シ。失臭及流涕傷冷毒ヨリ来ル者ハ。表發ノ蒸氣ヲ催進シ。且粘液ヲ稀解スルニ在リ。惡液多ク或ハ壞血病毒アル者ハ。瘡木湯ヲ與フベシ。胃化健ナラ

ズ常常粘涕ヲ出ス者ハ。健胃醇ヲ用テ其根ヲ抜クベシ。諸方劑泰西方鑑ニ見ス自餘蘭方樞機鼻門ノ治方ヲ参考スベシ。

衄血之近曰。血質稠厚。若酷厲以突衝破裂鼻中細脈之所致也。其遠曰。酷烈諸飲。香竄辛熱之食料。或劇動身體。或經閉痔血閉。或熱毒騷擾。頭痛腦燉腫等兼發者也。凡血質ガ稠厚若ハ酷厲ナルカ。若ハ過多滿溢スレバ。時アリテ激行シ。身中何ノ處トナク外泄スベキ孔アル部ノ脈絡ノ造成脆弱ナル者ヲ突衝破裂裂シテ泄漏スルナリ。此ガ男子ハ痔脈ヨリシ。婦人ハ經

行ヨリシテ適宜ニ泄減スルハ。乃チ良能ノ為ル所。
有餘ヲ損シ。瘀滯ヲ去ルノ天然砭刺ト稱シテ可ナ
リ。若ソレガ下文ニ謂フ所ノ病因アリテ而テ上衝
スル一強ク。鼻中ノ脈絡ニ聚滯シテ。而テ脈管コレ
ガ為ニ弛緩シ破裂スレバ。則衄血ヲ將出シ来ルナ
リ。其破裂スル所ガ鼻中ノ膜ニ聯ル脈絡ニアレバ。
直徑ニコレヲ鼻孔ヨリ泄シ。若額ノ窪間ヨリ来ル
者ハ。則多ク嚙門ヲ經テ口内ヨリコレヲ泄スルナ
リ。盖シ酷烈慄悍香竄辛熱ノ飲食ハ。即チ血行ヲ衝
動激行セシムルガ故ニ能ク諸血證ヲ致スナリ。身

體勞動モ亦同ク血行ヲ激スルガ故ニ衄ヲ致ス。若
其稟賦虚弱ナル者ハ。則僅ノ勞動ニモ亦衄ス。經閉
痔血閉ヨリ来ル者ハ。他ナシ一二ノ原因アリテ平
常ノ機關ヲ失ヒ。其外泄ノ道ヲ易ヘタルナリ。或ハ
期ヲ定テ衄ヲ發シテ以テ有餘ヲ損スルアリ。此亦
天然刺絡ト稱スベキ者。慮ルニ足ザルナリ。又熱病
頭痛等ニ兼發スルモ亦皆血ノ騷擾上逆スルノ致
ス所。其因ハ種種ナリト雖モ。其衄スル所以ノ機ハ
一ナリ。凡少壯ノ人。經閉ノ婦。平常屢衄ヲ發スル者
多シ。是ソレコレヲ以テ血ノ溢餘ヲ減シテ。暗ニ病

患ヲ免ル、者ナリ。妄閉スベカラズ。若、衄家ニシテ居恒ニコレニ由テ血度ヲ調適セシモノ。日ヲ經テ久ク衄セザレバ。則眼障。齒痛。頭痛。耳嘯。及ヒ諸瘡瘍等ヲ競ヒ發スルヲアリ。速ニ刺絡シテ其血ノ稠凝ヲ稀解シ。且、酷厲質ニ變ゼザルヤウニ為スベキナリ。故ニ凡、多血。稠血。通血閉止ヨリ來ル諸病。及ヒ熾盛熱。焮腫類。頭痛。耳聾。頭腦諸病等ニ於テ衄スルハ良徵トス。又惡性熱。痘瘡。壞血病等ニ衄スルハ。皆惡徵トス。是其血質腐敗。渙崩スルノ候ナルガ故ナリ。若夫老人。虛弱家。時時衄ヲ發シ。衄後殊ニ神倦腦疲

ノ諸候ヲ見スハ。危險トス宜ク類推詳察スベシ。

○治法。虛家。壞血家。水腫家。及過泄シテ止ザル者等ハ。

澀瀋劑ヲ綿ニ摻シテ挿入シ。脚湯法ヲ施シ。或ハ冷水及醋ヲ用テ綿布ニ浸シテ額上ヲ卷キ。而テ後ニ適宜對證ノ内服劑ヲ與フベシ。經閉。痔血閉ヨリ來ルハ。引降劑ヲ蹠ニ貼シ。膈ノ靜脈ヲ刺スベシ。諸方方櫃機衄血門ニ就テ考察スベシ。

鼻痔者。鼻中之脈絡一二弛緩而生種種狀。瘰肉也。其遠因。鼻上打撲。或替留感冒。若多涕彌久等也。鼻中潰瘍。及腐蝕疽等。大率自癩毒來。雖然非無或自他惡液發者。宜

用意而診察也。

鼻痔ノ始テ生ズルヤ。脈絡ノ末端僅ニ延長セルガ。尋テ後日日粘稠ナル血液ヲ流注シ来テコレヲ養息シ。漸ク形狀ヲ成シテ下垂スルニ及テハ。則骨膜ガ海綿様骨ヲ離距シテ轉益下垂シ。且長大ニナリテ鼻外ニ挺出シ。或ハ嚙門ヨリ口内ニ宛出シ。以テ呼吸言語等ノ機ヲ妨害スルニ至ルナリ。○鼻痔ニ纖維質。柔骨質。肉様質ノ別アリ。是其養息スル所ノ液質ノ異ナルヨリ化シ来ルナリ。此ガ漸ク長大ニ成テ其部ノ脈絡ヲ壓迫シ以テ血液ヲシテ快通ス

ル。能^ハザラシムルトキハ。則腐敗ノ氣ヲ將出シ来テ。而テ鼻痔黒色。或ハ青色。或ハ鉛色ヲ見シ。或ハ瘡ニ變ズルナリ。其色白者ハ治シヤスシ。赤者ハコレニ次ク。黒、青、或ハ鉛色ニシテ。且瘡ノ如キ者ハ治シ難シ。惡性ノ鼻痔。痛瘡ニ變ズルハ。前ニ涕膜ノ泌胞中ニ凝固粘液腫ヲ患ヘテ而テ後ニ發スル者ナリ。此證ハ惡性ニシテ甚ク痛アルガ故ニ。手術モ行フナ能ズ。腐藥モ施スナ能ズ。但コレヲ緩和スベキノミ。別ニ一種鼻中肉腫ト稱スル者アリ。其狀婦人乳頭ニ似テ。柔骨ノ部ニ生ジ。其根意外ニ大ナルモノナリ。

○鼻中潰瘍ハ。多ク癩毒ヨリ發ス。然トモ適ニハ黑膽液。或ハ壞血病毒ヨリモ来ルナリ。若其惡臭太甚

シク毒液流テ止マザル者ハ。此ヲ腐蝕疽ト名ク。尤モ難治ノ證ナリ。凡腐蝕疽ハ必ズ腐骨ノ證ヲ兼ハ甚薄ク且海綿様ナルニ更ニ濕濡セル膜ヲ以テコレヲ被包ス。故ト甚タ治シ難キナリ此多ク尋常潰瘍ノ治ヲ誤リ。或ハ惡厲ナル潰瘍ヨリ漸進シ來ル者ナリ。凡小骨損傷ノ後。或ハ辰砂ヲ用テ薰嗅スルノ後。茲ニ轉ズルナリ

○治法。鼻痔ハ先、瘡木湯ヲ與ヘテ内服セシメ。外用礬石車前水ヲ射注シテ洗淨シ且、收斂スベシ。更ニコレヲ綿撒絲ニ浸シテ挿貼スル。一日ニ二三回。或ハ青礬膏八錢ニ綠礬油三錢ノ一ヲ加テ調勻シ。筆ヲ用テ塗擦スル。一日ニ二三回スレバ。漸次浸蝕シ

テ消除スルナリ。肉腫モ亦此法ニ從テコレヲ治ス

施シ又鼻痔ハ切斷法。括斷法。及ヒ引出シ除ク術。烙鐵ヲ用テ燒ク術等アリ。宜ニ隨テ施シ行フベシ。詳説

瘍科摘要

○腐蝕疽刺痛甚キハ。粘魚須湯蘭方樞機ヲ與ヘ。甘汞丸ヲ兼用シ。外ニ蕃薇蜜八錢ヲ取り。大麥水四十八錢ヲ用テ調勻シテコレヲ洗淨スレバ。則緩和收斂ス。辰砂薰法ヨリ來ルモ亦此方ヲ用テ洗淨スルニ宜シ。癩毒ヨリ發スル者ハ。甘汞猛汞ノ諸劑ヲ換用スベシ。諸方劑總テ泰西方鑑ニ集載ス

口舌唇齒病第二十

口失味者係乎津唾之稀稠及缺乏蓋諸病之所兼發也
 覺苦味者膽液之上溢也覺穢氣者胃中之腐液也覺酸
 味者酸敗液過多也覺鹹味者鹽氣稠厚也覺甘味者乳
 糜之混津唾也若其全不辨食味者則粘凝汚苔附着舌
 上而閉塞舌白脈也

口ノ味ヲ辨識スルハ凡飲食内ニ含蓄スル所ノ精
 微ナル氣味ガ津唾ニ和シテ而テ舌理ニ滲透シ腦
 髓第九對循舌白脈ニ觸知シテ以テ神府ニ達スル

ナリ。夫津唾ハ口舌及咽喉等ノ諸泌胞ヨリ湧出シ
 テ常ニ口舌ヲ滋潤シ。飲食口ニ入レバ則自然ニ多
 ク出テコレヲ迎ヘ其質内ニ和調シテ以テ其味ヲ
 得セシメ且以テ胃中へ導キ輸テ而テ其新舊殊品
 ヲ和調シ以テ乳糜釀熟ノ功用ヲ為スノ要液タリ。
 故ニ津唾ノ性質常度ヲ失ヒ稀淡ニ過テ水ノ如ク
 ナルカ若ハ粘稠シテ膠ノ如クナルカ或ハ粘膠十
 ラザルモ亦其湧出スルノ乏キトキハ則其飲食ス
 ル所ノ甘美ナルモ以テ舌理ニ滲透シテ而テ其味
 ヲ白脈ニ觸知セシムルヲ能ズ且コレヲ釀熟スル

ノ度ヲ失テ。而テ食ヲ欲スルノ常機ヲ誤リ。甚キト
キハ則コレヲ厭ヒ惡ムニ至ラシムルナリ。然トモ
此津唾ヲシテ其常性ヲ凶シテ而テ味ヲ失ハシム
ル所以ノ者。必ズ他ノ本病アリテ以テ然ラシムル
所ニシテ。而テ單ニ此證ノミヲ發シ来ルモノハ鮮
シ。今其一ニヲ舉テコレヲ例スルニ。喻ハ津唾粘稠
シテ膠ノ如ク以テ味ヲ失フ者ハ。必ズ是レ血質熱
燥シテ滋潤液ニ乏シキノ致ス所ニシテ。即チ熾盛
熱病ノ傍症。煩渴引飲ノ徵兆ナリ。若其甚キニ至テ
ハ。則食物ヲ得テ木屑炭砂ヲ啣ムカ如キヲ覺ユル

ナリ。津唾稀淡ニシテ水ノ如ク以テ味ヲ失フテ但
淡シキヲ覺ユル者ハ。血質稀薄ニシテ鹽土ノ氣乏
シキノ致ス所ナリ。タトヘバ感冒ナドニコレヲ得
ルハ甚恐ル、ニハ足サレドモ。若熱病ノ重證ニ嬰
リ荏苒トシテ日ヲ引ク者ニ於テコレヲ得レバ。白
脈衰憊ノ徵トスルナリ。漢醫ノ所謂津唾粘膠ナラ
ズシテ乏ク以テ味ヲ失フ者ハ。水液他ノ部へ輸ル
ト多クシテ口裏へ湧出スルト能サルカ。若ハ下利
發汗。ハ津液等ノ徵候ナリ。若夫何ノ異味ヲ食スル
トモナキニ種種ノ殊ナル味ヲ觸覺スルトアルハ。

是他ノ内因アリテ致ス所。必ズ津唾ノ關スル所ニ
 モ非ルナリ。膽液ハ苦辛烈透黄色ノ液。居恒十二指
 腸ニ注キ入テ以テ飲食ヲ克化スルヲ左右スル
 ノ要物タリ。若シ鬱熱アリテコレヲ薰灼蒸升スレバ。
 則其氣胃ニ臻リ。胃管ニ傳ヘ。口内ニ上溢シテ以テ
 苦味ヲ覺セシムルナリ。且其舌上ニ汚液ノ附着ス
 ル者アレバ。則コレヲ染漬シテ黄色ナラシメ。甚キ
 トキハ焦黒ナラシム。胃中ニ腐壞液ヲ蓄スルトキ
 ハ。則其氣口内ニ上溢シテ汚臭ヲ覺ヘ。且惡心ヲ催
 ス。アリ。若然ラズシテ口氣汚臭アルハ。全體血液
 中ニ腐敗毒ヲ夾有スルハ。癩毒家。或ハ瘡

血質ノ如キ類ナリ。或ハ酸敗液ヲ蓄ヘ。或ハ叢胞液
 餘ハ推テ知ルベシ。此レ膽液ト同ク十二指腸ニ灌注
 シテ食化ヲ左右スルノ要品タリ。過多ニシテ上溢
 スレバ。則凡、食スル所ノ物ヲ誘シテ酸味ナラシメ。
 且、居恒口内ニ酸氣アルヲ覺ユルアリ。又血中ノ
 鹽氣過多ナルトキハ。動スレバ輒チ津唾ニ交テ瀉
 出シ。鹹味ヲ覺セシムルアリ。若右等ノ因證アル
 一ナクシテ。而テ食味ヲ失スル者ハ。胃管ニ粘液ヲ
 蓄ヘ。或ハコレヲ熱ノ為ニ煎熬セラレテ轉々増益シ
 蒸升粘着シテ。而テ舌上ニ布滿シ。舌候ハ病診以テ
 要訣ニ出ス以テ
 食氣ノ白脈ニ滲透スルヲ妨害スルノ致ス所ナリ。

若又然ラズシテ舌色常ノ如ク。或ハ紅滑ニシテ而
テ食味ヲ失スル者ハ。多ハ是レ熱ノ為ニ白脈ヲ撲
レテ其官能ヲ過ラシメ。若ハ他病ノ為ニ白脈衰弱
シテ而テ自ラ其職ヲ失スル者ナリ。

○治法。失味他病ニ傍テ来ル者ハ。治各本病上ニ在リ。
茲ニ贅スルコトヲ須ズ。若膽液上溢シテ苦味ヲ覺ユ
ル者ハ。吐下劑ニ宜シ。胃中腐壞液アル者ハ。復良劑。
或ハ綠礬精ヲ與フベシ。或ハ良能ノ為ル所ヲ觀テ
吐劑ヲ用テ淨除スルモ亦佳ナリ。酸液多キ者ハ。牡
蠣末。茵陳鹽。麻偏涅。失亞。遏爾。拔等ヲ用テ驅逐スベ

シ。鹽氣稠厚ナル者ハ。脈及筋膜衣膜等ニ痛ヲ發ス
ルコト多シ。痛風類先其鹽ヲ食フコトヲ禁ジ。清稀滲淡
ノ湯藥。及罨蒸。發汗。下利導尿ノ諸劑ヲ撰用シテ。其
凝稠ヲ稀薄ニシ。漸ク以テコレヲ解スベシ。甘味ヲ
覺ユル者ハ。粘液ヲ驅除スルノ法ニ從テコレヲ治
ス。汚液粘着スル者ハ。先其因ヲ去ルノ藥劑ヲ與ヘ。
而テ後蜜酢水ヲ用テ含漱スベシ。諸方劑方
鑑ニ出ス
重舌。蝦蟇腫類者。舌下泌胞。弛緩延長也。其因有テ一種凝
液可留滯于此者之所致也。此液内若シ含鹽氣多ク則或生
結石矣。又壞血質。或膽液敗黑質之人發此病則其所留

滯之液性殊惡矣。自餘舌病舌痲腫大舌疽潰瘍等也。其因痲見于前腫大以下可就外科門而考索焉。

舌ノ質ハ筋肉血絡白脈等ヲ以テ合成シ外面三膜ヲ以テ襲包セリ。其用ハ言語ヲ調へ飲食ヲ承輸シ且其氣味ヲ辨シ冷熱好惡ヲ知ルヲ主ドリ。又痰唾ヲ聚テコレヲ吐納スルノ機ヲ兼ヌ。○舌下泌胞ハ津唾ヲ泌別シ出スノ器ナリ。然ルニ此泌胞ニ於テ瀉出スベカラザルノ液汁ヲコ、ニ齎シ来ルテアレバ則止ム。一ヲ得ズ其中ニ留滯シテ腫起スル一ヲナシ遂ニ重舌蝦蟇腫等ノ證ヲ發スルナリ。

胞泌

ハ血ヲ動脈ニ承テ諸液ヲ泌別スルモノ。蓋シ其在處ニ隨テ其精粗細大ヲ異ニシ。以テ其部應用ノ液ヲ瀉過シ由スル者ニモセヨ。其應用ノ液ヲ瀉出スルレノ部ニ在ル者ニモセヨ。其應用ノ液ヲ瀉出スルニ不便ナル液ヲ齎シ来レバ則留滯ノ患ヲ生ズルナリ。但シ其留滯スル所異ナレバ則留滯ノ患ヲ生ズル亦各同シカ。若其留滯スル所ノ液中鹽氣ヲ含ム一多ケレバ則結石ヲ生ズル一アル者ハ猶是レ齒ノ裏面或ハ腎及膀胱等ニ石ヲ生ズルト一理ナリ。壞血家膽液敗黑家等ニ於テコレヲ得ル者ハ多ク黒色ニシテ且堅硬ナリ。

○治法。詳ニ瘍科摘要ニ出ス。就テ見ルベシ。

唇裂或出血或生腫瘍者外寒風所搏内蒸氣升逆之所

致也。不則血中含有酷厲熱質之液。而常常炎焦之。或寒熱病之所兼發也。若無此等之口證而患之者。蓋因打撲撞傷已。

唇ハ飲食及言語ノ要門。且津唾ノ妄泄ヲ防キ。齒牙ノ暴露スルヲ蓋フノ戸帳タリ。而テ口鼻ハ全體ノ溫氣ヲ出入スルノ道路ナルガ故ニ。身裏ノ熱度苟モ常ニ過ルトキハ。則炎氣コ、ヲ衝テ必ズ鼻燥キ口乾ク。然ドモ他ハ是レ膜厚ク且内ニ在テ尚滋潤ノ氣ヲ帶フト雖モ。唯唇ハ殊ニ薄キ膜ヲ被テ而テ外ニ向ヒ加ルニ外氣ノ為ニ乾燥セラル、ヲ以テ。

動モスレバ輒チ破裂シ。或ハ血ヲ出スニ至ルナリ。況ヤ寒風ニ搏ル、ニ於ルヲヤ。況ヤ熱病ニ嬰ルニ於ルヲヤ。其因論スルヲ須ズシテ知ヌベシ。若夫本文ニ所謂ル酷厲熱質ノ液トハ。即鹽氣ヲ含夾セル粘液。或ハ胆汁ノ過烈ナル等ヲ云ナリ。此等ノ液ヲ含有スレハ。則前ニ謂フ所ノ身裏ノ熱度常ニ過ルノ因ナリ。腫瘍ヲ生ズルノ因ハ。則外科門ニ就テ考索類推スベシ。

○治法。唇裂及出血スル者ハ。茵陳煉糖。或花萵苣水等ヲ内服セシメ。膠漿ヲ外傳スベシ。唇ノ焮熱腫瘍ハ。

適宜ノ清涼飲ヲ與ヘ。阿利穢油ヲ塗ルベシ。良效アリ。
諸藥劑泰西方鑑ニ載ス

齒痛之近因。血液鬱滯于齦内。而侵刺白脈之所致也。甚者。則齦膜焮腫。齒牙腐敗。其遠因。多血稠厚。或傷冷毒侵入焉。或由食品誘發也。

凡多血稠厚ノ人ハ。動モスレバ。輒チ諸部ニ鬱滯シ。而テ白脈ヲ刺衝シ。以テ疼痛ヲ發スルナリ。蓋シ頭ニ衝逆スレバ。則頭痛シ。耳ニ著バ。則耳痛シ。齒齦ニ聚攻スレバ。則齒痛ヲ發スルナリ。甚キ者ハ。則齒齦焮腫シ。頰輔ニ連及シ。若瘥ズシテ替留スル者ハ。則

齒牙ヲ鬱蒸シテ腐壞脱落セシムルニ至ルナリ。此證

ハ氣息尤モ惡臭ヲ發ス。又其一齒脱落スレバ。則必ス其鄰齒ニ轉災シ。遂ニ漸ク腐蝕シテ而テ顎骨ニテモ連及ス。傷冷毒ヨリ來ル者ハ。則唯疼痛ノミヲ發シテ而テ腫起スルナシ。以テ其因ヲ徵スベシ。食品ニ堅硬ナル物ヲ食ヘバ。則其齒ヲ勞動スルノ甚キガ為ニ。齦内焮熱ヲ生ジテ而テ疼痛ヲ發ス。砂糖膠飴。及寒具生果ノ屬ヲ食フ。多クレバ。則甘味以テ齦肉ヲ緩怠シ。酸氣以テ血液ヲ凝泣シ。乃動搖疼痛ノ患ヲ將來スルナリ。鹽味ヲ食フ。多クレバ。則血質ヲシテ稠厚ナラシメ。且熱度ヲ増進スルガ

故ニ酸甘ノ品トハ相反スレドモ同ク齒痛ヲ發スルニアリ。又食穢ヲ潔淨スルニ怠レバ則齒間ニ齧敗シ。時トシテハ細蟲ヲ生ジ。因テ侵蝕疼痛ス。又血液甚シク聚攻スルニ非ズト雖モ常常ニ鬱滯蒸熱スレバ則齧齒ヲ生ジテ疼痛シ。其齒ヲ拔去ルニ非レバ愈ザルモノナリ。又居恒書籍涉獵ヲ事トシ。或ハ堅枕ニ卧ス者モ亦善頸項ノ白脈ヲ勞シ。血液ヲ凝滯セシメテ齒齦ニ連及シ。因テ疼痛ヲ發スルナリ。

○治法。少壯多血家脈弦強。發熱頭痛。面赤等ノ證ヲ兼

テ而テ齒齦焮腫シ。或ハ將ニ膿潰セシトスル者ハ刺絡ヲ施シ。脚湯ヲ行ヒ。消石散ヲ與フベシ。瘡後酒及温熱ノ品ヲ禁シ。房事ヲ慎テ。再發ヲ防クベキナリ。○冒寒傷冷毒ヨリ来ルハ脈弦強ナラズ。又口熱微ナリ。項若ハ肘ニ發疔膏ヲ貼シ。荊梅散ヲ用テ掃腹シ。而テ後粘魚須湯ヲ與ヘテ良ナリ。又煙草ヲ喫シテ效アリ。○齧齒腐蝕ノ證ハ丁子油ヲ綿撒絲ニ浸シテコレヲ其孔内ニ挿入スレバ則瘡ユ。或ハ阿片醇ヲ用ルモ亦良ナリ。若瘡ズシテ轉劇キ者ハ其齒ヲ拔去ルニ非レバ治セズ。若壞血質ヨリ發スル

齧齒ハ。硃砂五分橙汁一錢ヲ以テ研和シ。綿撒絲ニ浸シテ孔内ニ挿スベシ。○凡、齒痛下劑ヲ服シテ増劇スルハ。胃ノ衰弱ニ由ル。幾那散ヲ用テコレヲ健強ニスベシ。奇效アリ。○顎内劇痛ニハ。麵粉乳香ヲ研和シ。雞子白火酒ヲ調合シテ泥ノ如クシ。顎端ノ動脈鼓搏スル處ヲ探索シテコレヲ其上ニ貼スベシ。良效アリ。若頭痛ヲ兼ル者ハコレヲ顛顛ニ貼スベシ亦良ナリ。

病因精義卷之四 終

春和樓



貽安齋藏



文政十年丁亥五月

發兌書肆

京都二條通柳馬場西入
吉田屋治兵衛

