



病  
因  
精  
義

五

ヤ 9  
1161  
5





79  
1161  
5

病因精義目次

卷之五 三篇上

喉風第二十一 咽喉惡性焮腫 耳下涎胞腫

飲食難通第二十二 膈噎

喘急第二十三

咳嗽第二十四

胸脇痛第二十五

肺焮腫第二十六

病因精義  
卷之五



91-2025



疾因詳在目錄

卷之五

病因精義卷之五

桃塢小森先生講述 男 桃郭義真筆記

喉風第二十一 以下至第二十二

喉風之近因。咽喉及頸部之泌胞。諸脈等腫脹也。腭後肉部。或懸壅。扁桃核肉等腫起者。亦是類也。其遠因。熱毒丹毒稠血。惡血黏液。寒液等凝結焉。或冒寒風中。溼氣及時氣流行。金石毒氣。若強動。激聲刺戟。食品骨硬等。以誘發之也。

喉風ハ即咽喉焮腫ナリ。其喉頭ニ在モノハ。則呼吸



疾因精義

卷之五



困難ニシテ。諸證劇烈ナレドモ。嚥下ノ機ニ於テハ  
 甚シキ妨害ナシ。又口ヲ開カセ候ヘドモ。其腫處見  
 ヘ難シ。食道頭ニ在モノハ。則嚥下ニ妨害アリテ。而  
 シテ呼吸ハ甚苦ムコトナク。且口ヲ開ケバ。其腫ヨ  
 ク見ユルナリ。然ドモ其劇證ニ至テハ。則兩部トモ  
 ニ腫脹シテ。而シテ妨害ヲ相蒙リ。或ハ扁桃核肉。懸  
 壅。腭後。舌根ニ連及ス。其喉頭ニ在モノ。多ハ喉扇。或  
 ハ披裂柔骨ニ繫ル筋ノ内外面ニ在リ。甚モノハ氣  
 管ヨリ肺ニ至マテモ連及シ。呼吸重難煩悶窘迫シ  
 テ。速ニ死地ニ陷ルモノアリ。食道筋ニ在モノモ。亦

其内部外部ノ所在ヲ殊ニスルアリ。凡其外部ニ在  
 テ且皮上ニ腫ヲ現スモノハ。危險ニ陷ルコト鮮シ。  
 若ソレ喉頭ノ内部ニ向テ。腫起スル者ハ危急ナリ。  
 察セズンバアルベカラズ。蓋尋常大抵ハ扁桃核肉  
 ノ一方。或ハ兩方。及懸壅等ノ焮腫スル者多シ。然ド  
 モ此亦其甚シキニ至テハ。則上顎。舌根。若ハ全口  
 ノ上部ニ連及スルナリ。凡患者飲食スルニ。其固結  
 ル唾ノ筋ヲ運轉スルニ艱ムハ。是其津液ヲ送下ス  
 ルニ此病動スレバ。則居恒流涎シ。頰裏ノ膜皮剥脱ス  
 ドモ。惡證ニハ非ズ。若ソレ劇大抵其患ヲ兼アル方ノ耳  
 昏睡ヲ發スルハ。則惡證ナリ。大抵其患ヲ兼アル方ノ耳



中酷痛ナリナ○遠因ノ第一ニ舉ル熱毒ニ三種ノ別  
 スモ痛ナリナ○遠因ノ第一ニ舉ル熱毒ニ三種ノ別  
 アリ。其一ハ大抵初夏ノ頃ニ當テ。舊年以來地中ニ  
 鬱伏スル所ノ火氣ガ時ニ乗ジテ蒸騰浮漾スルニ。  
 其久シク鬱伏スルガ為ニ。ヤ、酷厲ノ氣トナリタ  
 ル者ヲ。氣息ニ連テ喻引シ。其氣ガ喉頭ニ傳著シテ  
 俄頃ニ此病ヲ將出シ来ルナリ。其二ハ先熱病ヲ患  
 テ。而シテ其熱毒ガ膿樣ニ化成シタル者ヲ此部ニ  
 輸送シ。喉頭ニ滯著シテ漸次ニ腫脹シ来ルナリ。此  
 證ハ大概其病末ニ於テコレヲ發シ。多ハ救ハレザ  
 ルニ至ル者ナリ。其三ハ尋常諸部ニ發スル所ノ焮

腫ヲ此部ニ發シタル者ナリ。次ニ舉ル所ノ丹毒モ。  
 亦是諸部ニ發スル所ノモノヲ將出シ来ル者ナリ。  
 先哲ノ說ニ。丹毒ハ屢處ヲ移シ。又速ニ内攻スルモ  
 ノナリ。蓋其内陷スルヤ。必惡心煩悶大熱ヲ發ス。此  
 時ニ當テ早ク外部ニ劇キ丹毒ヲ發スレバ。則治ヲ得。否  
 則死ヲ致ス。又頸ニ劇キ丹毒ヲ發スレバ。則咽腫  
 痛シテ而シテ死スルコトアリ。若其毒腦ニ襲入ス  
 レバ。則速ニ狂躁熱ヲ發シ。遂ニ昏睡熱ニ陥シテ死  
 シ。若肺ヲ侵セバ。則焮腫ヲ將來シテ速ニ死ス。若咽  
 喉ニ傳レバ。則焮腫ヲ將來シテ速ニ死ス。云ヘリ  
 稠血惡血ハ即焮腫丹毒等ヲ生ズルノ内因ニシテ。  
 尚其原ヲ推究レバ。則稟賦多血家。若ハ痔血經血等  
 ノ閉塞ヨリ来リ。或ハ居常刺絡角法等ニ慣タルガ  
 久シクコレヲ怠リ。或ハ荷負重擔ヲ業トセシ者が



俄ニ安逸休止スル等ヨリ来ルナリ。是其蒸氣ノ常ノ度  
 ヨリ少ク。由テナリ粘液寒液ヨリ来ルハ凡カクノ  
 如キノ惡液ヲ身體中ニ蓄ルモノハ。時ニ由テ咽喉  
 諸部ノ泌胞即津液ヲ滲出シテ諸部ニ溜滯凝結シ  
 テ。而シテ咽喉。及腭後。懸壅。扁桃枝肉等ノ腫起ヲ致  
 スナリ。然ドモ此證ニハ熱ヲ帯ルコトナシ。故ニ此  
 ヲ類喉風トナシテ真證ニハ算入セザルナリ。誘發  
 ノ諸因。風寒ニ冒スレバ。便チコレガ呼吸ニ入テ。直ニ  
 喉頭ニ抵觸シテ。而シテ其部ノ血液ヲ凝泣セシム  
 ルヨリコレヲ誘シ。溼氣ハ纖絡ヲ緩弱ニナラシメ

テ以テ血液ノ運行ヲ怠慢セシメ。加旃表發ノ蒸氣  
 ヲ壅遏セシムルヨリ来リ。凡表發ノ蒸氣ヲ塞テ以  
 テ熱ヲ發スルノ事件。皆ヨク誘シテ諸喉腫ヲ發シ。  
 或ハ寒液腫ヲ致スコトアリ。或ハ温室ニ起卧シ。烈  
 飲ヲ用ヒ。加ルニ高歌大音ヲ發シテ。而シテ急ニ冷  
 水ヲ飲ミ。若ハ酒後夜氣ヲ冒スル等モ亦ヨク喉風  
 ヲ誘發ス。時氣流行ハ。冬春ノ寒氣ヲ冒スルヨリ来  
 ルノ證ヲ言フ。即是熱毒第一種ニ論スルノ類ニシ  
 テ。此能傳染スルコトヲ致スナリ。金石毒トハ。信石。  
 鉛石及此ノ如キ類ヲ煨製スル蒸氣ヲ吸入スルヨ

病因精義

卷之五

三



リ發スルヲ言フ。強暴ナル運動。激烈ナル音聲ハ。俱ニ呼吸ヲ急激ニシ。喉頭諸筋ノ運用ヲ過甚ナラシメテ腫起スルナリ。刺激スル食品。及骨硬等ヨリ來ルモノハ殊ニ理會シ易シ。又一種壞血病ヨリ發スル喉風アリ。此證ハ初發微熱アレドモ不日ニシテ解シ。其腫ハ甚大ナラズシテ而シテ唯疼痛ヲ覺ヘ。其疼痛スル處ニ白點アリ。若コレヲ治スルコト速ナラザレバ。則彌蔓シテ鄰部ヲ侵蝕シ。氣息惡臭ヲ發スルニ至ルナリ。○凡此病ノ腫脹スル。其筋絡ニ

於ルヨリモ。泌胞ニ在コト尤多シトス。何トナレバ。此部所在ノ泌胞ハ。其津液ヲ滲出スルノ多キガ爲ニ。又多ノ大脈支ニ連テ而シテ夥ク血ヲ承テ以テナリ。若夫寒液腫ノ類ハ。則寒粘液ガ直ニ其泌胞中ニ留滯凝結スル者ナリ。○凡咽喉喉腫。進テ膿腫ニ至ルモノ甚多シ。或ハ硬結腫ニ變ジテ治シ難キモノアリ。又其焮熱劇盛。腫脹緊滿セルガ。一旦忽然トシテ減却シ。赤色變シテ黻淡色。或ハ青色。黑色等ニナリ。而シテ脈不齊間歇シテ。謔妄冷汗等ノ證ヲ見スハ。是即千壞疽トナルノ候ニシテ。必死不起ノ惡徵



ナリ。凡壞血病毒アル人。及他ノ血液腐敗ノ又其胸  
 中煩悶シテ呼吸ニ痛ヲ覺ユルハ。是肺焮腫ニ變ズ  
 ルノ候ナリ。解剖家ノ説ニ。此病ニテ死タル人ヲ解  
 觀セシニ。肺藏及膈膜。氣管等ノ諸部。或ハ肝藏マデ  
 モ連及シテ劇ク焮腫シ。彼此ニ熱壞疽ヲ發シテ焦  
 枯セル者アリト云リ。○顔面膨脹シ。咽喉俱ニ腫テ  
 飲食下ラズ。或ハ腦ニ連累シテ精神錯亂シ。煩悶シ。  
 呼吸苦難ナルカ。或ハ舌脹テ口外ニ出デ。息スルゴ  
 トニ鼻孔開煽スルカ。或ハ全頸ヨリ胸膈ニ至ルマデ  
 殊絶太甚ニ腫起スルカ。或ハ脈甚虚數且屢結代ス

ルカ。或ハ其人甚衰弱スル者ハ皆三日ヲ出ズシテ  
 死スルノ候ナリ。○内部ノ腫脹減少シテ外部へ轉  
 移シ。頸胸ノ皮膚紅赤疼痛スル者アリ。一等治シ易  
 キニ趣トス。或ハ又咽喉ノ腫脹消散シテ。腦或ハ肺  
 ニ轉移スルコトアリ。一等重證ニ陷スルナリ。急ニ  
 救ズンバアルベカラズ。

○治法。大率肺焮腫及脇痛ニ同シ。今其一ニヲ掲テ例  
 ヲ見ス。凡熱毒第一種ニ由ル者ハ。速ニ肘靜脈ヲ刺  
 テ瀉血スルコト再三。以テ其焮衝ノ勢ヲ挫折シ。凡  
 絡數回スル者ハ。每次必其左右ヲ易テ施スベシ。且  
 其血ヲ取ルコト。先五十錢許ニシテ而テ止ミ。後其

瘧疾精義

卷之五

五



脈動ト熱勢ヲ用テ診察シ。足ザルトキハ則復ルコトベシヲ  
 行フ。毎ト熱勢ヲ用テ診察シ。足ザルトキハ則復ルコトベシヲ  
 更ニ頸圍ヲ挑破シテ角法ヲ施シ。或ハ乾角子ヲ施  
 テ。以テ其逼迫ノ氣ヲ疏通シ。又布帛ヲ取テ頸部ヲ  
 包繞シテ温煖ナラシメ。且屢脚湯ヲ施テ降氣スベ  
 シ。内服劑ハ大黃消石散コレヲ主ル。其服量ハ年甲  
 強弱ニ應ジテコレヲ増減シ。大便快利ヲ以テ度ト  
 スベシ。或ハ苓麻林度湯ヲ與ルモ亦良ナリ。又朝夕  
 澆導法ヲ行ヒ。大麥煎ヲ閒用シ。礞礮硝石散ヲ咽中  
 ニ吹入ルベシ。礞礮硝石散ノ方。礞礮ニ上セテ蒸  
 氣ヲ散スル者ハ錢。明礮ニ錢五分。潔  
淨消石一錢。以上三味合末ヲス。又蘭方樞機  
 含漱方アリ。宜ニ隨テコレヲ採用スベシ。○小兒漱

藥モ施レ得ザル者ニハ。玫瑰花湯二百錢ニ蜜醋各  
 八錢ヲ和シ。接骨木枝ヲ以テ作レル小唧筒スヤイトヲ用テ  
 コレヲ咽中ニ射注スベシ。○熱病終末ニ於テ發ス  
 ル者ハ。其門ニ就テ考索スベシ。  
 丹毒ヨリ來ル者ハ。刺絡脚湯。及白芥子引降糊劑ヲ  
 躡ニ施シ。且發疱膏ヲ領或ハ耳後ニ傳ベシ。内服劑  
 ハ發汗方。及大麥消石飲ヲ與ヘテコレヲ主ル。尤モ  
 多クコレヲ用ルニ宜シ。  
 稠血ヨリ來ルハ。殊ニ刺絡ヲ緊要トス。内服ハ清涼  
 下劑ニ宜シ。收斂性。及刺戟質ノ藥食ヲ禁ズ。若酷厲

病因精義

卷之五

二



質ノ血アル人ハ。緩和清涼ノ方ニ宜シ。

寒粘液ニ屬スル證ハ。無葉花ノ煎汁ニ硃砂精數滴ヲ加テ含漱セシメ。且、其中些バカリヲ口内ニ留メオキ。徐徐ニコレヲ嚥下セシムレバ。則其咽喉ニ粘著スル所ノ寒液ヲ吐泄シテ良ナリ。且、輕下劑ヲ用テ腸胃ヲ疏シ。更ニ發疱膏ヲ頸圍ニ貼シテ其凝滯ヲ解バ則愈ユ。但、此證ハ刺絡ニ宜カラズ。

風寒ニ感シ溼氣ニ中リ。及時氣流行等ヨリ來ルハ。清涼發汗劑ヲ用テ蒸氣ヲ開達シ。或ハ大麥消石飲ヲ用テ利尿ヲ左右シ。兼テ脚湯法ヲ行フベシ。若其

重證ニ進ム者ハ。總テ熱毒ニ因ルノ治ヲ施スベシ。壞血質ノ患者ニハ。硫黃精。或ハ食鹽精三四十滴ニ。蕃薇蜜八錢ヲ和シ。筆ヲ以テ患處ニ塗リ。而シテ後蜀葵煉糖ヲ含マシムベシ。奇效アリ。若其腐敗甚キ者ハ。塗藥ヲ施スコト殊ニ數回シテ可ナリ。

膿腫ニ變ズル者ハ。身熱苦痛數日退除セズ。時ニ由テハ其患部ニ鼓動ヲ覺ヘ。脈勢初發ニ比スレバ微ク弱。齒齟頰裏唇ノ内外細小白疱ヲ發スルヲ徵スベシ。既ニ此等ノ證ヲ見サバ。時時白湯ヲ含テ湯氣ヲ吸入セシメ。且、軟化熟膿糊劑ヲ用テ頸圍ニ傳貼

病因精義

卷之五

五



シ。既ニ熟膿シテ自ラ破決セザル者ハ。鍼ヲ執テコレヲ刺破スベシ。膿汁夥シク流出スル者ナリ。其口カセ見ルニ。膿腫正中小白色アル者ハ則自ラ破決ス。勢カヲ須ザルナリ若其口ヲ開テ而シテ鍼ヲ承ルコト能ハザル者ハ。則藥汁ヲ取テ鼻孔ニ注グベシ。是ニ由テ一箇ノ咳。若ハ噴嚏ノ異常ナル運動ヲ機發シテ破決スルコトヲ得。膿既ニ泄除シテ而シテ後ハ。瘡創含漱劑ヲ施テ佳ナリ。○膿腫強大。呼吸ヲ妨害シ。煩悶シテ死セント欲スル者ハ。氣管ニ孔ヲ穿テコレヲ通ゼシムルノ外他策アルコトナシ。猶豫セズシテコレヲ行フベシ。法瘍科摘要ニ出ス

○膿腫變ジテ青黒ヲ見シ。齟舌滿口腐爛シ。氣息惡臭。體力衰憊。食道胃中胸内等煩熱苦痛スル者ハ危急ナリ。速ニ防腐。健補。清涼解散ノ藥劑ヲ投ジテコレヲ救フベシ。刺絡。下劑。含嗽藥等皆害アリ。コレヲ施スコト勿レ。食鹽精。或ハ薔薇蜜ヲ塗リ。幾那飲ヲ與ヘテ良ナリ。

○一種咽喉惡性癰腫ト稱スル者アリ。此證五六十年前ヨリ和蘭及歐羅巴諸國トモニ行ハレ。小兒及老人ニ多ク。且男子ヨリモ婦人ニ多ク。而シテ霖雨後及烈暑後等ニ於テ發シ。能ク傍人ニ傳染シ。甚キ時



ハ則闔村舉郡ニ流行スト云ヘリ。其因ハ則汚毒ノ  
 氣腐蝕ノ食。濕泥濁水等ニ中ルヨリ来レル者ナリ。  
 吾邦ニ於テモ間コレアルコトナキニ非ズ。予モ  
 亦比比見得セリ。證治方論。蘭方樞機ニ詳ナリ。就テ  
 考索スベシ。

○別ニ耳下泌胞腫ト名ル者アリ。此亦咽喉ニ連及シ  
 テ同ク腫痛シ以テ飲食送下ヲ妨ケ。又下顎泌胞ニ  
 連及シテ口ヲ開クコト能ザラシメ。且津液夥シク  
 流泄シ。殆ド喉風ノ如ニシテ。而シテ熱ヲ帶ルコト  
 少シ。此亦多ハ小兒ノ患ナリ。

治法。先止痛膏ヲ吮上ニ貼シテ。而シテ温布ヲ用テ  
 頸部ヲ絡ヒ。且諸液ヲ稀涼ニシ。蒸氣ヲ進發スルノ  
 飲劑ヲ撰テ多服セシムレバ則愈ユ。諸藥劑總テ泰  
 西方鑑ニ出ス。  
 撰用ス

飲食難通第二十二

飲食難通者。食道狹窄之所致也。其近因。食道筋膜麻痺  
 不遂。或瘰癧拘急。或生息肉。焮腫。硬結腫等也。其遠因。房  
 事過度。元氣竭乏。或癩。或脾病。子宮病。或癩毒等是也。  
 飲食ノ通シ難キモ。他病アリテ味ヲ失ヒ。或ハ胃ニ



事アリテ食ヲ欲セザル等ノ證ハ。コレヲ不食ト謂フ。此門ニハ算入セザルナリ。若夫嗜味變ゼズ。胃中事ナク。是ヨク食ント欲スレドモ。但其食道ニ妨害スル所アリテ。而シテ嚥下スルコトヲ得ザル者ヲ難通ノ證トハ云フナリ。蓋食道頭ニ三對筋塞咽筋。雙筋。頭筋。鍼狀アリテ開闔ノ用ヲナシ。以テ嚥下ノ機ヲ左右ス。若其運動常ニ反スル。又食道ノ裏膜ニ大小ノ泌胞トキハ嘔吐ヲナス。又食道ノ裏膜ニ大小ノ泌胞アリテ。而シテ津液ヲ滲出シ。送下ヲ便利ニスルナリ。然ルニ此食道筋ニ於テ麻痺不遂ヲ將來シ。痛快寒熱ヲ觸知セズ。且其部疲瘦シテ縮張ノ機ヲ失ス

西村正齋圖書

ルコトアレバ。則飲食ヲ送下スルコト能ザルナリ。此證多クハ房事過度シテ元運精氣ヲ竭乏スルヨリ來ル。若夫焮腫ヲ生ズル者ハ。猶喉風ナドノ如ク。疼痛及其他焮腫ノ諸徵候。一齊ニ副來ルガ故ニ察シ易シ。或ハ息肉。硬結腫。癌樣腫。泌胞腫等ヲ生ズル者ハ。難治ノ證トス。漢醫ノ所謂ル膈噎ナル者コレニ屬ス。其不治トスル所以ン知ヌベシ。又瘵癆拘急ニ因テ食道狹窄スルハ。癰。或ハ脾病。子宮病等ニ於テ間兼發スルコトアリ。然ドモ此證ハ久シカラズシテ愈ユ。所謂ル梅核氣ナル者モ。亦此類ノ輕證ナ

瘧疾精義

卷之五

五



リ。或ハ食道ノ泌胞衰弱シ。若ハ閉塞シテ津液ヲ泌別スルコト能ハズ。其部滋潤ヲ失シテ飲食ヲ嚥下シ難キ者アリ。及ヒ食道頭ヨリ胃ニ至ルマデノ泌胞悉ク閉塞シ。且腫脹シテ。而シテ飲食通シ難ク。遂ニ以テ死ヲ致ス者アリ。此證ハ多ク癥家ノ患トス。或ハ喉扇柔骨ノ造質良ナラズ。能閉ルコトヲ得レドモ。亦ヨク開クコトヲ得ザル者ハ。固食ヲ噎フニ飲料ヲ兼用セザレバ。噴逆シテ吞下シガタク。又能開テ適宜ニ閉ルコトヲ得ザル者ハ。固食ハ事ナク送下スレドモ。汁液ヲ用レバ。則噴咳ヲ發スルモノナリ。

此二證ハ難證ト云ニハ非レドモ速ニ治スルコトヲ得ガタキモノナリ。

○治法。食道ノ筋膜麻痺スル者ハ。日日鉛糖二三釐ヲ與ヘ<sup>多服ズル</sup>。且揮發衝動スル漱藥ヲ屢施シ。又勉テ項骨ヲ摩擦シ。養化ノ藥餌ヲ用ユベシ。若其藥餌モ通ズルコトヲ得ズシテ漸ク虛衰スル者ハ。養化強壯ノ液汁ヲ作テ肛門ヨリ射注シ。以テ生ヲ保ツコトヲ得セシムベシ。○食道ニ息肉硬結腫ノ類ヲ生ズル者ハ。管ヲ用テ食物ヲ送下スベシ。若又食道緊窄雁閉シテ危險ナル者ハ。養化ノ液汁ヲ肛門ニ



注キ入ルノ外他術アルコトナシ。若夫喉腫ヲ生ズル者ハ。喉風門ノ治法ヲ通考シテコレヲ施用スベシ。○瘧學拘急ニ由ル者ハ。鎮瘧散ヲ用ユベシ。若治セズンバ。阿芙蓉醇ニ麝香ヲ加ヘ與フベシ。或ハ日蘆薈七八釐ヲ與ルモ亦良ナリ。謾ニ多服セシムベカラズ。○癰毒家。食道ノ泌胞腫脹シテ。津液滲出セザル者ハ。汞劑ニ宜シ。用テ少ク涎沫ヲ吐咄セシムルヲ妙トス。及緩汞ヲ漱劑ニ加ヘ施シテ良ナリ。○喉扇ノ闊狹適宜ナラザル者ハ。燒酒ヲ漱劑ト作シ。日常數次コレヲ施スベシ。

喘急第二十三

以下至第三十二病屬胸部者

喘急之近因。胸肺之纖維瘳攣強拘。或弛緩痿弱而黏液壅滯之所致也。其遠因。黏痰寒液。酷厲液。稀涼液。瘡毒。多血滿餘。白脈衰弱。或胸内諸器。天造不良者。或緣肝。脾胃。子宮病。或腦之造成不減兼發者也。若夫外因。冒寒。冒溼。亦能誘發此病也。

肺ノ臟タル。自家一箇ノ運動ヲ為シテ。居恒氣息ヲ吐納スルヲ以テ官能トス。而シテ其運動ヲナス所以ノ者ハ。皆其纖維ニ由ラズンバアラザルナリ。故

病因精義 卷之五



ニ此カ常然ヲ失フテ。或ハ急縮シ。乾喘或ハ緩弱喘。因ニナルコトアレバ。必ズ氣息不利ノ病ヲ將出シ来ルナリ。夫風氣ハ能ク物ヲ乾燥セシムルノ性アリ。故ニ喉頭及氣管ニハ。其裏面一遍ニ津潤液ヲ賦與シテ。以テ其患ヲ防禦セシム。是自然ノ妙機ナリ。而シテ其液ノ流末ハ。居常血中ニ混化シ去テ。而シテ留滯スルコトアルコトナキモノナリ。然ルニ此潤液カ感冒。或ハ他因アリテ。而シテ粘凝質ニ變ズルコトアレバ。則其流末ノ肺ニ入ル者ガ。其細血脈ノ中ヲ流利スルコト能ハス。細篩ニ麤末ノ残留スル

ガ如ク漸次ニ肺中ノ細膜囊。及氣管梢ニ滯著溜瀝シテ。以テ吸氣ノ納ルベキ處及其道路ヲ障礙スルナリ。然ドモ肺ノ造質壯健ナル者ハ。則是モ亦自然ノ妙機ニ由テ。其粘物ノ残留スルニ随テ直ニコレヲ喉頭へ送輸シ。以テ效ヲ發シテ而シテ咯出セシム。若其肺ノ造質緩弱ナルカ。或ハ衰憊スルコトアレバ。則コレヲ泄除スルノ機關ヲ損シ。遂ニ其處ニ鬱積シテ以テ喘急ヲ將出シ来ルナリ。茲ニ至テハ設ヒ效ヲ發シテ粘痰ヲ吐スルコトアルモ。亦是充滿シテ后ニ止ムコトヲ得ズ溢出スル者ニシテ。コレヲ



彼喘スルコト無シテ而シテ歎スル者ニ比スルニ。相去ルコト遠シ。又體中ニ寒液水飲アリテ。ソレガ胸腔ニ鬱滯シ。甚キトキハ肺中及周圍四竟ニ汎濫シ。内外ヨリ障礙シテ以テ其氣ヲ容受スルノ地ヲ妨ゲ。或ハ以テ其縮張ノ機ヲ害シテ。而シテ喘息ヲ發シ来ルアリ。此證或ハ歎ヲ發スレドモ。然ドモ痰ヲ吐スルコトナク。且胸内重難苦悶シ。甚寒溼ノ氣俟ヲ恐レ。或ハ頸項及胸部腫脹シテ。灰白黯蒼色ヲ見シ。或ハ舉身腫脹スルコトアリ。而シテ其病勢ハ則緩慢漸遲以テ深重ニ至ル者ナリ。又一種酷厲質

ノ液アリテソレガ肺中ニ侵入スレバ。則白脈ヲ刺戟衝動シテ以テ痙攣拘急ヲ發シ。甚ダ暴ニ喘スルコトアリ。而シテ其復スルモ亦甚ダ速ニシテ。脱然トシテ忘ル、ガ如シ。然ドモ此ガ屢發シテ愈ヘザレバ。則白脈衰弱シテ遂ニ肺中ノ血行ヲ流利セシムルコト能ズ。因テ以テ荏苒タル喘息ニ陷入スルコトアリ。以上二因ハ或ハ復泌胞ノ分利ヲ損傷シテ。前ニ云ゴトキ粘痰濕喘ヲ將出シ来ルコトアリ。又胃ノ運化健ナラズ。乳糜ノ質熟成セズシテ而シテ稀薄不良ニナリタルガ来テ肺ヲ衝動スレバ。亦



此病ヲ發スルコトアリ。此證必、食後若、ハ強テ動作  
セル後ニ發シ来ルナリ。且、又其餘ニ必胃虚ノ證ヲ  
兼ルコトアルヲ以テ徵スベシ。又起居安逸美食強  
飲ノ人ハ、必其血多分ナル者ナリ。此ガ平常痔血經  
血衄血等ヲ發シテ、以テ有餘ヲ損シテ而シテ滿溢  
ノ患ヲ除キタルガ、時アリテ其通血ヲ閉止セルカ。  
或ハ否、モ亦盈實強盛ニシテ、而シテ心肺ニ衝逆ス  
ルコトアレバ、則肺截縮張ノ機ヲ妨害シテ、以テ此  
病ヲ發シ来ルコトアリ。凡熱病ニ於テ喘ヲ發スル  
者ハ、大抵血ノ騷擾衝逆ニ出デ、多血聚攻ノ證ト一

般ナリ。又肺ノ白脈衰弱シ、若、ハ麻痺不仁スレバ、則  
上ニ謂フ所ノ諸因ナキモ、亦必ズ其氣息ノ出入、血  
ノ循環ニ於テ不利ヲ致シ、因テ喘息ヲ發シ来ルナ  
リ。此證必ズ耐ヘガタキ懊懷苦煩ヲ發シ、不断意ヲ  
用テ呼吸スルニ非レバ、則氣息將ニ遏止セントス  
ルガ如キニ至ル最モ重證ナリ。又其稟賦胸中諸器  
造成不良ナル者ハ、固ヨリ肺ノ機關モ亦良ナラザ  
ルガ故ニ、僅ニ一因ノ至ルアレバ、即便ニ發喘シ、且  
持久シテ痊ザルモノナリ。又肝脾胃子宮病等ニ兼  
發スル者ハ、皆其脹滿拘急以テ橫膈ヲ突上シテ、而



シテ胸中ノ運動ヲ障礙スルヨリ来リ。腦ノ造成ア  
 シキヨリ来ルモ。亦是白脈ノ運行ニ障礙アルノ致  
 ス所ナリ。又胃寒ハヨク諸液ヲシテ粘凝ナラシメ。  
 胃濕ハヨク凝形ヲシテ緩弱ナラシメ。以テ諸液分  
 利ノ機ヲ愆ラシムルガ故ニ。乃此病ヲ誘發スルナ  
 リ。解剖家ノ説ニ。此病ノ屍ヲ解觀セシニ。或ハ肺心  
 肝脾胸内ノ泌胞等分外ニ大ニ。或ハ肋膜膈膜甚肥  
 盈シ。或ハ膨腫シ。又肺蔵ノ諸部敗化糜爛シ。或ハ水  
 液充滿シ。又肺蔵心胞膈膜肝脾ニ於テ嫩腫アリ。或  
 ハ心蔵ニ膈膜及肋膜ガ附著緊接シ。又肋ノ軟骨及

劍状柔骨ガ全ク剛骨ニ成リ。又劍状柔骨及脊骨ガ  
 内方へ屈曲セリ。或ハ腎ニ結石アリ。又肝蔵ガ胸内  
 へ挺出シ。或ハ右腎ガ肝ニ附著シ。或ハ動脈大幹及  
 心耳ニ塊瘤ヲ生ズル等ノ者アリト云ヘリ。

○治法。粘痰濕喘ハ。山蘿蔔草。纈草。薄荷等ノ分利疏解  
 スル和胸劑ヲ與ヘ。且時時吐劑ヲ兼用シ。或ハ下劑  
 ヲ投ジテ。以テ其粘液ヲシテ便路ニ就テ泄除セシ  
 ムベシ。若吐下劑ヲ服シ肯ゼザル者ハ。海蔥散ヲ與  
 ヘテ以テ疏解利尿シ。或ハ阿片龍腦等更ニ脛ニ打  
 膿法ヲ施シテ奇效アリ。凡喘家日日脚湯法ヲ行ヒ



適宜ニ動作セシメテ良。○寒液水飲ニ屬スル證ハ。海蔥酒石散。或ハ龍牙飲。若ハ硫黃煉ヲ兼用シ。脚間ニ發疱膏ヲ貼シテ良ナリ。○風鬱水液ヲ載テ悍氣ヲ生ジ。衝逆煽動シテ壅迫短促スル者ハ。杜松子。茴香。乾薑等ヲ用テ疏解シ。兼ルニ橙皮水。或ハ橙皮醇。或ハ消石精等ヲ以テ風氣ヲ驅逐スベシ。○酷厲液ノ為ニ痙攣ノ運動ヲ發シテ急迫喘鳴シ。初發惡寒シ。後自汗シテ而シテ解スル證ハ。麝香三釐許。砂糖少ヲ研和シテ。一時ゴトニコレヲ與フベシ。奇效アリ。或ハ鎮痙散ヲ與ルモ亦良ナリ。○胃化健ナラザ

ルヨリ來ル者ハ。龍膽。茵陳。橙皮。土木香等ノ苦味健胃劑ニ宜シ。又幾那加鐵劑ヲ用テ纖絡ノ弛弱ヲ強健ニシ。以テ全切ヲ收ムベシ。○安逸美食性素多血ノ人ハ。先攝生ヲ慎テ以テ其因ヲ去リ。屢刺絡ヲ施シテ有餘ヲ損シ。掃腸丸。或ハ消石劑ヲ撰用シテ以テ其血ヲ清涼稀薄ニスルコトヲ務ムベシ。則愈ユ。○肺ノ虛弱ニ屬スル證ハ。沒藥煎熬劑。或ハ纈草飲。或ハ礞砂精。或ハ阿魏丸。或ハ玫瑰醇加石蜜等ニ宜シ。○胸肺ノ造成不良ニシテ。經久難治ノ證ハ。幾那沒藥飲コレヲ主ル。○諸藏壅塞スルヨリ胸肺ニ連

高麗精義

卷之五

五



累牽擥シテ荏苒持久ノ喘ヲ發スル者ハ。著草丸コレヲ主ル。○腦ノ造成惡キヨリ來ル者ハ。肺藏虛弱ノ證ト同ク治療スベシ。無ルニ頭部ニ打膿法ヲ施シテ良ナリ。○大便秘結ニ因ル者ハ。溉導法。或ハ掃腸丸。其他隨宜ノ下劑ヲ用テコレヲ通利スベシ。○肺藏乾燥スルヨリ來ル者アリ。蜜醋煉。或ハ甘草膏。或ハ蘭苔甘草湯以テ涸燥ヲ潤シ。急迫ヲ緩ルニ宜シ。○外寒ヨリ來ル者ハ。先蒸發氣ヲ催進スルノ策ヲ施シ。而シテ後其乾濕ニ證ヲ辨ジ。或ハ疏解。或ハ緩和。宜ニ隨テコレヲ療ズベシ。○前ニ疥癬。若ハ諸

瘡ヲ患ヒ。或ハ痘疹。或ハ痛風等ニ嬰リテ後。其毒肺ニ陷入シテ喘スル者モ亦多シ。硫糖散。黃白丸。金硫散ノ類ヲ與ヘテ偉功アリ。諸藥劑總テ泰西方鑑ニ集載ス撰用スベシ

咳嗽第二十四

咳嗽之近因。有物侵刺喉頭及肺。以使其部筋膜及所連接之諸部。變急牽引之所致也。其遠因。感冒。若瘡毒內陷。或熱毒黏液。膿液。酷厲液。稀涼液。不熟乳糜。及外襲惡氣。侵入諸物。若胃。肝。脾。腸間膜。婦人子宮等。有故而連及者也。蓋咳之與喘。同肺病。而彼此互相乘相變。故其因亦不甚



相遠也。宜參考通會矣。

天ノ人身ヲ造成スル神妙精微ニシテ。個ノ自然良能ナル者ヲ賦與シ。體中苟モ妨害ヲナス者アレバ。則人爲ヲ假借セズシテ。而シテ自ラコレヲ排擯スルノ機ヲ具シタルコトハ。既ニコレヲ原病篇ニ於テ説テルガ如シ。中ニ就テ效ノ如キハ。其較著ニシテ辨シ易キ者。猶腦ノ嚏ヲ發シテ惡液ヲ驅泄シ。腸ノ下利シテ滯物ヲ泄除スルガゴトシ。蓋喉頭ニハ五柔骨ナル者アリテコレヲ圍成シ。每骨各筋アリテコレヲ開闔シ。居恒呼吸ヲ出納シテ以テ此生ヲ保

有セシムル第一ノ要門タリ。故ニ白脈ノ茲ニ循行スルコト甚多ク。以テ其機ヲ作シ成スガ故ニ。其觸覺感動ノ敏捷ナルコト。固ヨリ他部ノ比ニ非ス。是ヲ以テ一種ノ害物。譬バ一二ノ汁液ノ如キ。惡性ノ物ニ非ズト雖モ。若過テ一滴コ、ニ漏スルコトアレバ。即便噴嗽シテ以テ其物ヲ排出シ了ラザレバ。則止ズ。以テ此病ヲ發スルノ大要ヲ見ベシ。且、效ヲ發スルニハ。其部ノ諸筋必一縮一張シ。激撥シテ以テコレヲ作シ得。故ニ本文ニ云カ如ク。擗急牽引ノ運動ヲ發シ。若シ唯喉頭諸筋ノカノミニテ克スル



コトヲ得サレバ。則其連接スル所ノ諸部。食道。横膈。及腹部ノ諸器ニテモ皆共ニ連及牽引スルナリ。若夫氣管ノ筋麻痺スルコトアレバ。則兼ルニ聲嘔ノ證ヲ以テス。蓋其效ヲ發セシムルノ病毒ハ第一ニ邪氣。賊風。凍寒。冷濕等ノ為ニ表發ノ蒸氣ヲ閉塞セラレ。廢液。鹹渣體中ニ鬱積シテ酷厲粘凝ノ液トナリ。以テ肺蔵ニ流注シ。又那ノ喉頭氣管等ニ滲出スル所ノ天賦固有ノ津液ニ混淆シ来ル者是ナリ。又此證ヲ發スル機ト同ジク。痘疹其他皮膚ニ發スル諸病ヲ誤治スルトキハ。則其毒内陷シテ咳嗽ニ變ズ

ルコト甚多シ。是其皮膚ハ肺蔵ト相表裏シテ。同ク氣息ヲ吐納スル者ナル故ニ。其機ノ關係スル所アレバナリ。次ニ諸般ノ熱病效嗽ヲ兼ル者ハ。是其熱毒ガ咽喉氣管等ノ津液ニ混淆シテ。喉部裏膜ノ白脈ヲ侵刺スルノ致ス所。蓋其毒ガ膿様液ニ化成シ。其效シテ泄除スル所ノ痰沫ノ中ニ包攝セラレテ。而シテ體外へ出去ルナリ。又其熱勢熾盛ナル者諸部乾燥スルニ因テ。喉頭氣管モ亦乾燥シ。津液ハ脱シテ吸氣直ニ裏膜ヲ抵觸シ麻痺シテ。乾咳微喘ヲ發シ来ルコトアリ。又吐血後效嗽ヲ發スル者ハ。是



其殘血膿壞シ。肺蔵ニ溜滯變敗シテ酷厲質トナリ。以テ肺中ヲ刺戟スルノ候ナリ。加ルニ胸中温熱。口内甜味ヲ覺ル者ハ。是其血復將ニ溢泄セントスルノ候ナリ。宜ク瀉血法ヲ施シテ又胸脇痛。或ハ肺焮腫等ニ於テ咳嗽ヲ發スルモノハ。是其焮腫ガ膿壞シテ。而シテ其膿ガ肺中ニ滴瀝溜滯スルノ候ナリ。若其膿ガ蔵外腔間ニ溢溜スルトキハ。則咳セズト雖モ呼吸不利。氣息惡臭アリ。甚難治ノ證ナリ。又咽喉諸部ノ滋潤液。時アリテ酷厲質トナリ。咳ヲ發シテ稀涼液ヲ吐出シ。或ハ時ニヨリテ濃稠凝固シ。時

時一團ノ凝痰ヲ吐出シ。其凝痰ノ固著シテアリシ部ガ剥露シテ吸氣ノ為ニ痒痒セラレ。續テ乾欬ヲ將出シ来テ殆ド止ニ難キ等ノ證アリ。又胃ノ運化健ナラズ。酸敗不熟ノ乳糜ヲ釀シ。此ガ運行シ来テ肺中ヲ衝動スレバ。則經久不止ノ乾欬ヲ發ス。此證必ス食後間モナク劇發シ。且腸胃ニ連及シテ牽擗シ。因テ嘔吐ヲ誘發シ来ルモノナリ。此證殊ニ小兒ニ於テ發スルコト多シ。又外襲惡氣諸物侵入トハ。水氣。火氣。烟氣。塵埃。震氣。瘴氣。及辛烈苛厲。胡椒ノ如キ物。或ハ多鹽ノ食物。或ハ醋。或ハ粉末等ガ吸氣ニ



連テ侵入シ。若ハコレヲ飲食スルノ際。誤テ氣管内  
 へ侵入スル等ヲ言フ。此類但一旦發シテ而シテ即  
 時ニ止ムハ。則算レテ病トスルニハ足ズ。然ドモ若  
 コレヨリ繼發シテ愈へザル者ハ。宜ク其因ヲ探テ  
 救療スベシ。其他兼發ノ諸證ハ。或ハ肺ノ縮張ヲ妨  
 ゲ。或ハ擊急ノ運動ヲ移シ。或ハ惡液ガ滯シ來ルニ  
 因テ歎スル等ナリ。治モ亦本病ノ上ニ在ルトキハ。  
 宜ク其門ニ就テ考究スベシ。尚一種肺ノ天造不良  
 ニシテ。著キ病因アルニ非レドモ。動モスレバ輒テ  
 嗽ヲ發シ來ル者アリ。此等ハ殊ニ其飲食攝生ニ意ヲ

用テ救治スベシ。凡嗽ノ響キ甚シク。吸氣困難。夜  
 ニ入テ轉増劇スル者ハ。其原殊ニ肺及氣管ニ在リ。  
 又其響キ少ク。且其發スルコト深ク底ヨリ來ルガ  
 如クニシテ。而シテ嘔吐ヲ兼子。或ハ胃ノ部ニ當テ  
 壓迫スルヲ覺ルコトアルハ。是其起原胃及食道ニ  
 連ル者ナリ。又衰老痰咳ノ證。俄ニ乾咳ニ變ズル者  
 ハ。是津潤ヲヒスルノ兆。死ニ瀕スルノ候トス。○凡  
 咳ハ喘ト因ヲ同シテ。酷厲ナル毒ガ肺臟ノ白脈ヲ  
 侵刺攪痒スルニ由テ發スルナリ。其毒ノ性質種種  
 ナリト雖モ。畢竟火血ノ悍厲ナルト。水寒ノ嚴酷ナ



ルトノニ、ヲ出デズ。第其毒ノ微ナルハ咳トナリ。稍強キハ喘ヲ發シ。太甚シキハ喘滿ヲ致ス。故ニコレヲ治スルノ要モ。亦唯悍厲ヲ鎮撫スルト。嚴酷ヲ和解スルト。水ヲ乾スト。火ヲ潤ストノ兩塗ニ在ルノミ。若夫蓐勞骨蒸ノ久嗽。ハ血虛家ノ乾咳。久病ノ篤喘等ニ至テハ亦其比ニ非ズ。蓋此等ノ證ハ其因大ニ體中ノ機器ヲ虧損シ。或ハ殆下血液ノ性質ヲ敗壞スル等ニ起原シテ。所謂ル水火ノ酷厲ナルモ。其源深重ニシテ。一時鬱滯スルノ類ト異ナル所以ナリ。然ルニ妄ニ溫燥ノ劑ヲ投ジ。遂ニ津液ヲ涸竭シ

テ漸ク疲斃セシムルモ亦甚多シ。皆是病因ヲ明ニセザルノ過ナリ。省セズンバアルベカラズ。又咳嗽ハ其初重證ニ非ルモ。若纏綿持久シテ愈ヘザルトキハ。或ハ水腫。勞瘵等ニ陷入スルコト鮮カラズ。輕忽ニ從事スルコト勿レ。

○治法感冒ヨリ發スル咳嗽ハ。疏解劑ニ宜シ。○痘疹及諸瘡毒内陷ヨリ發スル者ハ。硫糖散。或黃白丸ニ宜シ。或兼ルニ引疱膏ヲ適宜ノ部ニ施シ。復タビコレヲ外部ヘ誘發シテ良ナリ。○熱毒ニ由ル者ハ。莖菹菜湯。或甘麥果菊飲ヲ與ヘ。多血家ハ。兼テ刺絡ヲ



行フベシ。○咽喉氣管肺藏等ヲ滋潤シ。酷厲侵刺ノ  
 惡液ヲ甘和シ。痰ヲシテ吐シ易カラシムルニハ。度  
 祿布。或甘草膏ヲ用テ奇效アリ。胃感咳嗽。聲啞喘急  
 等モ亦コレニ宜シ。○粘痰多キ者ハ。山蘿蔔湯良十  
 リ。硃砂精モ亦奇效アリ。○膿液ヲ排シ。腐敗ヲ止メ。  
 血液ノ惡質ヲ復良スルニハ。玫瑰醇ニ乳糖ヲ加ヘ  
 用テ甚效アリ。咳シテ血ヲ吐スル者ニモ亦良ナリ。  
 ○酷厲液ノ肺ヲ侵刺スルヨリ咳スル者。及表發ノ  
 蒸氣壅遏ヨリ發スル者モ。共ニ硫糖散ニ宜シ。○稀  
 涼液ヨリ發スル者ハ。護謨和胸飲ノ類ヲ採用スベ

シ。○胃中ノ汚液ヨリ發スル咳ニハ。煉糖。脂油。及粘  
 滑ノ劑ハ皆害アリ。苦味神效飲ヲ用テ其害根ヲ淨  
 除スベシ。○腹内諸藏ノ壅塞スルヨリ寧急ノ運動  
 ヲ致シ。因テ乾咳ヲ發シテ久シク治セザル者ハ。著  
 草丸コレヲ主ル。○婦人經閉。血液衝逆シテ胸肺ニ  
 聚攻シ。以テ咳嗽ヲ發スル者ハ。宜ク先其經閉ヲ通  
 スベシ。則愈ユ。凡諸通血痔血。衄血。閉澀ヨリ來ル者  
 皆同例ナリ。或刺絡スルモ亦良。諸藥劑總テ泰西方  
 鑑ニ集載ス。採用ス



胸脇痛第二十五

胸脇痛之近因。血液鬱滯于胸肋膜。而焮熱腫脹也。若其在骨外者為類證。其遠因。中寒。冷飲。過酒。勞動。通血閉止。瘡瘍內攻。時行惡氣。熱病毒。及傷冷毒等也。

凡此病ハ血質稠厚凝結スルヨリ發ス。或ハ寒氣ニ中テ其酸收氣ヲ吸引シ。以テ胸肺ノ血ヲ凝泣セシメ。或ハ炎熱ニ當テ汗出若ハ強動ヲ作シテ汗ヲ發シ。尋デ俄ニ寒涼ヲ取り。若ハ冷飲ヲ貪リ。因テ以テ其血ヲ凝滯セシメ。遂ニ他ノ諸液モ亦共ニ其處ニ留滯シ。乃鬱蒸焮熱シテ。而シテ膨腫起脹スルナリ。

又過酒ニ因テ發スル者ハ。蓋酒客ハ大抵多血ナル者ナルニ。其酒ヲ飲ムニ當テハ。則其血ヲ沸騰騷擾セシメテ。而シテ激シク心肺ヲ衝動シ。胸血滿溢シテ。其部ノ纖維勞憊スルニ。彼酒中ノ燒酎トナルベキ慄悍ノ氣ハ。蒸氣ト共ニ漸ク諸竅ヨリ迸散シ。其醒來ルニ及デハ。但其甘緩鈍滯ノ氣ト酸收凝結ノ氣トノミ血中ニ殘留テ。以テ其血ヲ凝泣セシメ。勞憊セル纖維運營怠慢シテ。終ニ其部ニ滯著セシムルノ致ス所ナリ。諸通血閉止スレバ。則血質稠厚滿溢スルガ故ニ。些ノ縁故アレバ即其部ニ留滯シテ。



諸カクノ如キ類ノ病ヲ將出シ来ルコト固リ多シ。瘡毒内攻ハ。爾前ノ患アルガ故ニ知リ易シ。時行惡氣ハ。其質ナホ寒氣ノ如キ血ヲ凝結セシムル者ニ。他ノ惡氣ヲ含蓄シ来ルナリ。此證ハ人人多クコレニ嬰ルコトアルガ故ニ亦甚。知リ易シ。熱毒ハナホ喉風ヲ發スルガ如ク一般。第其著ク處ヲ殊ニスルノミ。傷冷毒ハ。前章毎ニ説ク所ノ蒸發氣閉塞ヨリ釀シ来ル者是ナリ。以上數因アリテ。療法モ亦各異ナルコトアリト雖モ。コレヲ診辨スルノ法ヲ知ザレバ。則コレニ從事シ難シ。蓋其第一因ニ論ズル所

ノ稠凝ノ血ヨリ来ル焮腫ノ證ハ。其部劇痛鼓動シテ壯熱腫起シ。脈強實ニシテ數駛ナリ。而シテ寒熱往來ヲナス。蓋其寒熱ノ發作スルヤ。必ズ前次ノ痛過去ルノ後ヲ承テ發シ。且後次ノ痛モ亦漸ク催来ルモノナリ。又呼吸ゴトニ痛甚シク。短氣以テ息スルニ耐ヘズ。又咳嗽ヲ誘發スルコト多シ。若其腫甚大ナル者ハ。以テ心肺ノ運動ヲ障礙シ。其脈反テ微弱ニシテ數。且懊懷苦煩スルナリ。既ニ發シテ四日許諸證増劇シ。白痰ヲ吐シ。及尿中ニ白渣ヲ見スコトナキ者ハ。病毒泄除スル所ナリ。將ニ膿腫トナラ



ニトスルナリ。或ハ復諸證減退シテ脈弱閒歇アリ。且精神錯亂シ。眼目陷リ。冷汗出デ。其部麻痺スル者ハ。死肉トナルナリ。死證トス。又諸劇證減退スト雖モ。面色青慘ニシテ。眼睛旋轉シ。脈動微弱ナル者ハ。病毒腦内へ移轉スルノ候ニシテ。必死トス。發斑。其他壞血ノ諸證ヲ發スルモ。亦死證ナリ。或ハ硬結腫トナル者ハ。諸證減ジテ後。其部重滯スルヲ覺ユ。且凡焮腫ノ候ハ。刺絡シテ其血ヲ見ルニ。上面ニ粘稠ナル薄膜ヲ結ブ。左ニ舉ル諸證ニハコレナシ。以テ一徵ト為スベキナリ。又寒冷及其他ノ因ニテ蒸氣

ヲ閉ヂ。稀涼酷厲催熱スル丹毒様ノ惡液ヲ醸シ。此ガ胸脇ニ著テ痛ム者ハ。其證大抵前證ニ似タリト雖モ。腫脹寒熱咳嗽等稍少ク。且其痛遷移シテ彼此互ニ微甚ヲナシ。而シテ劇烈ナラズ。脈數駛ナレドモ強實ナラズ。小水赤カラズ。又白渣アルコトナシ。是ノ如キハ膿腫ニ變ズルコト稀ナリ。此證以下ヲ一ニ假證トス。又熱病毒ヨリ来ルモノハ。初尋常熱病ヲ得。後此證ヲ兼發シ来ルナリ。初ヨリ痛アルニ非ズ。且其痛寒熱ノ輕重ニ從テ微甚ヲ致ス。若夫傷冷毒ノ茲ニ流注スルヨリ来ル者ハ。痛劇シカラズ。



又熱アルコトナク。而シテ脈状尿色常ニ異ナラズ。凡此病ニ肺焮腫ヲ兼ル者ハ。呼吸重難ニシテ胸内絞痛シ。顔色甚赤シ。又横膈膜焮腫ヲ兼ル者ハ。痛脇肋末端ニ及ビ。效シテ痰少。且謔妄ヲ發スルコトアリ。縦膈膜焮腫ヲ兼ル者ハ。痛胸骨下ニ連ル。此等ノ證徴ヲ諦認シテ内因ヲ察シ。以テ治術ニ從事スベシ。若夫類證ハ則外部ニ發見スルヲ以テコレヲ認得易シ。故ニコレヲ贅セズ。

○治法。胸脇焮腫。脈強ニシテ數。乾咳シテ血ヲ交ル痰少許ヲ吐スル證ハ。消石適應ス。一日ニ三四錢マデ

モ用ユベシ。脈力衰へ焮衝減ズルニ随テ其量ヲ減スベシ。○腐敗膽液アリテ其毒胃腸ニ鬱蓄スル證ハ。前法ニ随テコレヲ療シ。後輕下劑ヲ多ク用ユベシ。

○凡胸脇痛ニ芥子泥ヲ作テ肩胛ノ間ニ貼スベシ。甚佳ナリ。○一種白脈胸脇痛ト名クル證アリ。此證ハ初同ク焮衝ヲ發スレドモ。幾ホドナク精力虧損シテ虚候ヲ見スナリ。故ニ初發ハナホ消石ヲ與ルニ宜シト雖モ。虚候ヲ見スニ至テハ速ニ強壯劑ヲ與フベシ。其他療法肺焮腫ノ條ト参考スベシ。



肺焮腫第二十六

肺焮腫之因。大率與脇痛同。但以其呼吸發聲。此臟所司。或有強動勞息。若叫喚激音。若久吹笛管等。以誘發之。或大勞動情。意後發。此病亦有之。蓋其為病。比之於脇痛。尤重。而其所病部位相接。若不知其所別。則共為胸痛而已。耳宜用意診察之。

肺焮腫ハ。肺蔵ノ腫痛スルナリ。其因。中寒。冷飲以下。大抵脇痛ト異ナラズト雖モ。本文ニ云ガ如ク。呼吸及ヒ音聲ヲ出スノ事件。皆此蔵ノ主ル所ナルガ故ニ。騎馬。奔走。或ハ踊力。重擔等ニテ。大ニ身體ヲ勞動

シテ氣息ヲ激クシ。或ハ高歌大音。若ハ笛類ヲ吹ク等ニテ強ク氣ヲ張り。以テ肺白脈ヲ勞後シ。且其血ヲ留滯セシムルカ。或ハ大ニ情意ヲ勞動シテ腦ノ運動ヲ衰憊セシメ。循胸白脈ノ運行常度ヲ愆リ。胸膈結滯シテ。肺臓縮張ノ機ヲ損害スル等ノ後ヲ承テ發スルモ。亦甚少カラズトス。蓋肺ハ居恒縮張シテ須臾モ休止スルコトナキノ臓ナルヲ以テ。運使ヲ主ル白脈最多シテ。而シテ意識ヲ司ル白脈甚寡シ。故ニ其痛ヲ識覺スルコトモ亦輕微ナリ。是ヲ以テ其呼吸困難痰咳等ノ證ニ據テコレヲ認レバ。則



喘息ト混同スルコトアリ。コレヲ辨別スルニ。此病ニハ初發必惡寒シテ。而シテ發熱シ。爾後稽留熱。脣舌乾燥。及ビ皮膚失潤。小便短少ニシテ燒クガ如キ等ノ證アリテ添来ルナリ。而シテ彼病ニハコレナシ。又其痛外。縱膈膜。胸肋膜等ニ蒙被連及スルトキハ。則胸背肩胛マデモ牽掣疼痛スルユトアリテ。亦彼胸脇痛ト混同スルモノナリ。然ドモ此病ニハ胸中大熱。懊懷煩悶。呼吸短息。倚坐シテ卧スコト能ハズ。然ドモ初發輕證ハ。唯横臥スルコトヲ得ルナリ。或ハ時大息得ザルノミニシテ。ナホ仰臥ヲ得ルナリ。或ハ時大息シ。或ハ息セザル者ノ如クニシテ。意ヲ用テ而シテ

後僅カニ呼吸スル等ノ證アリ。又其氣血ヲ鼓動シテ行レムルノ常度ヲ失フカ故ニ。其脈濡弱不齊ニシテ。脇痛ノ強實ナルガ如クナラズ。此病イマダ重ニハシモ然又痰咳交血。頰顴赤色。眼球腫起等ノ證モ。脇痛ニ比スレバ甚シク。而シテ頭痛シ。或ハ痛マズシテ重ク。或ハ睡眠ヲ嗜ミ。或ハ夢多クシテ熟睡ヲ得ズ。或ハ譫妄ヲ發シ。或ハ昏冒恍惚等ノ證アリ。是等ノ證候ニ據テコレヲ求メバ。則自ラ其辨別ヲ知ン。若夫病因ノ殊異ヲ辨ズルコトハ。則各種ノ常徴アルカ故ニ。一十茲ニ贅セザレドモ。宜ク脇痛篇ヲ



参考シテコレヲ推シ知ルベシ。凡此病ハ危険ナリ。若  
 其腫痛速ニ愈ザレバ。則膿ヲ釀シ。潰瘍トナリ。死肉  
 トナリ。硬結腫トナリ。其證胸中重滯ヲ覺ヘ呼吸不  
 利シ。微動ニモ堪ヘガタクシ  
 テ昏倒シ。但仰臥ヲ得テ  
 ハ。更ニ乾咳ヲ發シテ聯綿トシテ止ズ。但坐睡ヲ得  
 ミノ勞瘵トナル。又此病ハ其毒必痰沫。或ハ小水ヨ  
 リ泄除スルヲ常證トス。故ニ諸證劇盛ニシテ痰咳  
 ナク。尿中微赤ノ塗。若ハ膿様ノ塗ヲ得ルコトナキ  
 ハ危シ。或ハ痰ヲ吐泄スルコトアルモ。白色黄色。泡  
 沫様。膿様ニシテ惡臭アリ。吐痰ノ良ナルハ。稀稠適  
 宜ニテ殆ド感胃ノ終  
 スニ吐スル痰ノ如シ。然ラドモ漸ク減少支節厥冷。自汗。

盜汗。爪曲リ。下利シ。小便不熟。發斑。崩血等ノ證アリ。  
 或ハ咽喉。脇肋。横膈膜等ノ焮腫ヲ兼ルハ皆必死ナ  
 リ。腐敗熱後。或ハ熾盛熱後。或ハ癩毒家。或ハ血液甚  
 粘稠ニシテ留滯シ易キ者。或ハ甚稀薄ニシテ苛厲  
 質ノ者。或ハ壞血。及諸敗液性ノ人。此患ニ嬰ルトキ  
 ハ皆危険ナリ。  
 初起苦煩。噎氣ヲ發スレバ稍輕快ヲ覺ル者アリ。是  
 ニ於テ麤工。或ハ驅風劑ニ宜トシテ。安ニ辛熱ノ品  
 ヲ與ヘ。大ニ危険ニ陷セシムルコトアリ。知ラズンバ  
 アルベカラズ。焮腫氣管ニ連及スレバ。飲食シテ胃



管ヲ壓スルゴトニ疼痛ヲ増劇スルモノナリ。凡肺  
 焮腫ノ順症ハ大抵三四日ニシテ輕快ヲ覺ヘ痰唾  
 吐シ易ク七日或ハ九日或ハ十一日ニシテ寒熱止  
 ム。或ハ其間日ニ於テ小便快通シ甚白微赤ノ塗ヲ  
 泄シ始テ漸ク快路ニ趣ク者アリ。或ハ次テ汗ヲ發  
 シテ愈ル者アリ。初發汗アル者ハ害アリ

○治法。肺焮腫大熱頭痛痰唾血ヲ交ヘ血液稠多ナル  
 者ハ先刺絡術ヲ行フベシ。其血ヲ瀉スルコト患者  
 ノ稟賦ニ從テ斟酌シ。一次ニ四十八錢ヨリ九十六  
 錢ニ至ル。尤モ其痛アル方刺後ナホ輕快ヲ覺ヘザ

ル者ハ再三コレヲ刺スベシ。大率刺絡ニ回ニシテ  
 轉盛ニシテ痰唾出ルコトナク或ハ多ク血ヲ交ヘテ  
 吐スル者ハ幾回モコレヲ刺シテ病勢ノ減少スル  
 ニ至ルベシ。蓋其刺絡ニシテ薄ナル血ヲ良候トス兼テ  
 皮膚膜。毎次漸ク軟ニシテ薄ナル血ヲ良候トス兼テ  
 輕證ハ大麥飲扁桃乳等ノ清涼稀血ノ劑ヲ與ヘ重  
 證ハ更ニ消石ヲ服スルコト。日ニ二錢ヨリ三四錢  
 ニ至ルベシ。良效アリ。渴ストモ冷飲ヲ與ルコト勿  
 レ。血ヲ凝泣シテ大害アリ  
 頭痛甚シク或ハ夢多ク或ハ譫妄ヲ發スル者ハ清  
 涼瀉導方ニ宜シ。日ニ二三回モ施スベシ。胃腸汚滯  
 アル者モ亦此方ニ宜シ。慎デ吐下ノ劑ヲ用ルコト  
 勿レ。煩悶劇甚乾咳シテ痰出ザル者ハ熱湯ニ醋適



宜ニ加ヘ。口狹キ壺ニ入レ。屢其蒸氣ヲ吸入セシム  
 ベシ。以テ病毒ノ分利ヲ促シ。痰ヲシテ吐シ易カラ  
 シム。良效アリ。既ニ十分ニ放血シ瀉スル所ノ血皮  
 スト應證ノ劑ヲ與ヘ。病勢ナホ劇シク。呼吸窘迫シ。咳  
 痰出デガタク。或ハ毒腦ヲ攻テ譫妄シ。或ハ癲急ヲ  
 發スル者ハ。引降糊劑ヲ蹠ニ貼シ。或ハ發疱膏ヲ蹠  
 ニ貼ス良ナリ。初發ニハ病毒將ニ分利シテ尿塗ヲ  
 作ントシ。或ハ發汗セシトシテ。反テ煩悶心悸。呼吸  
 重難。痙攣搐搦。脈不齊等ノ畏ルベキ證ヲ發シ来ル  
 コトアリ。是ニ於テ麤工ハ強壯收瀦ノ劑ヲ與テ大

ニ害ヲ引コトアリ。唯宜ク軟化瀉導方ヲ施シ。兼テ  
 溫湯ヲ蒸セル綿布ヲ用テ腰腹ヲ溫ムベシ。則漸ク  
 輕解シテ睡ニ就ク。然ドモ虛弱家ニシテ其劇證ニ  
 堪ヘズ。衰弱セシコトヲ恐ル、者ハ。白葡萄酒ニ。石長  
 生糖適宜ニ和シテ一ニヒヲ與ルモ亦佳ナリ。虛  
 弱家ニシテ血質稠多ナラザル者ハ刺絡スベカラ  
 ズ。唯是清涼。緩和。導痰ノ藥劑ヲ撰用シ。時時脚湯ヲ  
 施シ。他宜ニ随テ前ニ舉ル所ノ外用法ヲ兼施スベ  
 シ。大抵是ニ據テ消散スルコトヲ得。凡肺焮腫前ノ  
 諸方法ヲ施シテ愈ズ。ナホ持久スル者ハ。則必膿ヲ







