

病  
曰  
精  
義

六

ヤ 9  
1161  
6



1161  
6

病因精義目次

卷之六 三篇下

肺癆第二十七

勞瘵第二十八 及類證

膈膜焮腫第二十九

胸膿病第三十

胸水病第三十一 支飲

病因精義  
卷之六  
目次



91-2026



病因精義卷之六

桃塢小森先生講述

男 桃郭義真筆記

肺癆第二十七

肺癆在肺中各處膜樣之部。其膿遂溜瀦于細囊中而鬱沸焉。壞爛所在則真勞瘵也。其因以前喉腫者。或有壞液者之所患也。凡其所在連及于肺管。則咳而吐汚痰。不則乾咳而無吐膿。流瀦于臟外腔間。遂為胸膿病也。

肺癆ハ。即肺癰ナリ。此ヲ發スルノ前。既ニ喉腫ヲ患テ。而シテ刺絡スルノ度ニ及ザルカ。或ハ復度ニ過

病因精義

卷之六

一



テ血ヲ放シ。以テ良能ヲ衰弱セシメテ。而シテ病毒  
 分利ノ機ヲ妨ゲ。肺ニ鬱スル所ノ毒ヲシテ。卻テ解  
 散スルコト能ハザラシムルカ。或ハ誤テ熱藥ヲ投ジ  
 テ膿熟ヲ促セシ等ノ事件アル者ハ。則コレヲ診察  
 シ易シト雖モ。若其以前癰腫甚輕微ニシテ知カタ  
 ク。或ハ壞液ノ茲ニ鬱滯スルヨリ来ル者トハ。初證  
 甚辨明シ難シ。蓋肺瘍ノ證候ハ。必持續シテ歇ザル  
 ノ咳嗽ヲ發シ。胸内壓ガ如クニ重ク。又何ヤウニ身  
 體ヲ安シ易テモ呼吸易カラズ。且氣息惡臭。汚痰血  
 ヲ交ル等ノ證アリテ。而シテ荏苒タル内伏熱所謂

熱蒸ヲ發シ。或ハ時時微シク惡寒シ。或ハ渴シ。又全身  
 漸々瘦削シ。後ニハ飲食減耗シテ進ガタク。唇燥キ  
 頰赤ク。盜汗脈弱。或ハ屢結代シ。日晡所潮熱ヲ發シ。  
 折頰及掌蹠煩熱シ。腹脹滿シ。眼球及顛顛深陷リ。爪  
 曲ル等ノ諸證ヲ發シテ。即真ノ勞瘵トナルナリ。此  
ニ當テ。其癰腫脹レテ膿囊ヲナスコト。猶外部ニ發  
スル諸腫瘍ト異ナラズ。其イマダ潰破セザル者ヲ  
閉肺瘍ト云フ。已ニ潰破既ニ潰瘍トナレバ。則夥シ  
ク膿ヲ吐シ。蓋コレヲ吐スルニ漸次咯出シテ適宜  
ハベシ。若一類ニ致スコトアリ。又其潰破スル者  
ニハ必ズ口内ヨリ流出スルヲ以テ知ルベシ。或ハ

病因精義

卷之六

三

乾咳シテ吐セス。胸内ノ腔間ニ淋漓シテ。煩悶昏冒  
 シ。膈膜重滞ヲ覺ユルアリ。又既ニ溜瀦スルコト多  
 キ者ハ。則膿ノ動揺スルヲ覺エ。膿アル方ノ脇ヲ下  
 ニシテ卧シガタク。或ハ反テ膿ナキ方ヲ下ニシ難  
 キ等ノ證ヲ將出シ来ルナリ。此ヲ胸膿病トス。此病  
 重キ者ハ但肺ニ膿瘍アルノミナラズ。尚其近傍ノ  
 諸藏諸器ニ至ルマデモ膿潰ヲ致スナリ。或ハ肺瘍  
 ノ膿一方ニ充滿シテ。而シテ膿ナキ方ヲ壓迫シ氣  
 息コレガ為ニ壅塞セラレテ。而シテ煩悶シ死スル  
 者アリ。凡胸内膿瘍ハ甚險證ナリ。然トモ幸ニシテ

其瘍輕少。其人身體惡液ナク。膿液良性ナル者ハ。則  
 其膿ヲ近傍ノ喻收管エ喻引シ。通流導泄シテ自然  
 ニ愈ル者アリ。蓋此ノ如キ者ハ必ス尿中ニ包攝シ  
 テ皮上ノ污垢ト為リ去ルナリ。或ハ表發ノ蒸氣ニ混シ  
 體中ニテ消滅スルニハ非ズ。又呼吸促迫シテ胸  
 脇ニ痛ヲ發シ。小粒ヲ為タル粘痰ヲ吐シ。コレヲ磨  
 スレバ惡臭アル者ハ。甚急ニ死スルコトアリ。又凡  
 テ小便ニ泡沫多ク。粘テ油ノ如ク。或ハ飲食進マズ。  
 煩渴シ。身體諸部脣頰等消削シ。滲淡色ヲ見シ。足脚  
 腫起シ。大便溇泄シテ泡沫多ク。惡臭アリテ且粘リ。  
 又鵝口瘡ヲ發スル等ハ。都テ死ニ近キノ候ナリ。

病因精義

卷之六

三

○治法。肺瘍既ニ熟膿シテ久ヲ經レバ。則膿質漸ク酷厲ニシテ侵蝕シ。元運漸ク衰憊シテ振ハス。遂ニ諸惡證ヲ引出シ来リ。肺ノ外部エ潰破スレバ。則胸膈病トナル。故ニ此時ニ先<sup>チ</sup>テ務テ速ニ潰破セシメ。且其潰口ヲ肺ノ内部エ開テ。其膿ヲ吐泄シ得ルヤウニ為サシムベシ。第一病人ヲシテ居恒温湯ノ蒸氣ヲ吸<sup>ハ</sup>シノテ。其内部ヲ軟和セシメ。更ニ大麥飲。或ハ扁桃乳。或ハ輕味ノ肉羹汁。或ハ乳汁ニ水ヲ和シ。多ク與ヘテ胃ニ滿<sup>シ</sup>ムレバ。則大ニ肺ヲ推テ其膿ヲ推シ上ルノ機ヲナスコリ。是ニ於テ兼ルニ接骨木

花醋。或ハ尋常ノ醋ニ水ヲ和シ。小<sup>ス</sup>唧筒ヲ用テ喉ニ注射シテ以テ咳嗽ヲ誘發セシメ。或ハ時ニ大笑セシメ。或ハ高歌大音ヲ發セシメ。或ハ舞蹈騎馬等ニテ身體ヲ盪揺セシムレバ。則コレガ為ニ破開ヲ致スコトヲ得ルナリ。○肺瘍潰破シテ多ク膿ヲ吐シ。因テ暈倒ヲ發スル者ハ。醋ヲ嚙セシムルニ宜シ。○肺瘍既ニ潰破シ。咳シテ膿液ヲ吐スル者ハ。勉テコレヲ催進シ。以テ肺中ヲ清除スベシ。乳汁。大麥。亞<sup>ト</sup>刺<sup>ク</sup>末<sup>ト</sup>。亞<sup>ト</sup>護<sup>ク</sup>。甘草膏。白蜀葵。石長生等ニ宜シ。或ハ煎劑トシ。或ハ煉糖トナシテコレヲ用フ。膿出ルコト漸

ク減シ。當ニ其創ヲ愈合スベキ者。及膿中血ヲ交ル  
 コト多キ者ハ。愈創湯コレヲ主ル。方蘭方柜機  
 勞察門ニ出膿盡  
 テ熱ナキ者ハ。乳香丸コレヲ主ル。每服一分。愈創湯。  
 或ハ龍牙玫瑰湯ヲ用テ送下スルコト日ニ五六次。  
 ○吐膿過多ナル者。及惡臭アル者ハ。前ニ舉ル緩和  
 排膿劑ノ外ニ。幾那。或ハ水楊皮ヲ間用シ。或ハ合劑  
 トナシテコレヲ與ヘ。以テ諸液腐敗ノ災ヲ防クベ  
 シ。甚良トス。綠礬湛モ亦此證ニ奇效アリ。○乾咳シ  
 テ痰ナク。膿尿中ヨリ外泄スル者ハ。海葱蜜。甘消石  
 精。霸王鹽等ヲ換用シ。幾那ヲ加ヘテ其排泄ヲ扶ク

ベシ。若其膿尿中ニ下ルノ候ナク。又吐痰ニ出ルノ  
 候ナキ者ニハ。幾那ヲ與ルコト勿レ。大ニ害アリ。○  
 吐膿快然タラズ。澀滯ノ候アル者ハ。穩カナル吐劑  
 ヲ與テコレヲ導クベシ。吐根ニ宜シ。尚快吐ヲ得ザ  
 ル者ハ。結糖散ニ宜シ。○乾咳劇ク夜卧安カラザル  
 者ハ。毎夕扁桃乳ニ嬰粟煉糖ヲ加ヘ與フベシ。○膿  
 熟シテ潰破セズ。病人大ニ衰弱シテ後稍ク破開シ  
 来ル者ハ危シ。蘭苔甘草湯。幾那和胸蜜煉劑等ヲ與  
 テ萬一ヲ希望スベキノミ。○肺瘍ノ周圍。若ハ鄰部  
 ニ於テ更ニ焮腫ヲ發スル者アリ。證ノ輕重ニ隨テ

病目書

卷之六

五

適宜ニ刺絡シ。清凉劑ヲ與フベシ。肺熱腫滿シ○初時力ナホ勝ユベキ者ハ。宜ク適宜ノ運動ヲナサシムベシ良ナリ。又宜ク居室ノ氣ヲ清爽ニシテ。以テ腐敗ノ氣ヲ避ケシムベシ。凡治法勞瘵門ト通考スベシ。

勞瘵第二十八

勞瘵之近因。肺藏膿潰。且全身血液亦腐壞也。故肺癆及腸肋焮腫等。終末見此證者。則其當然固不足恠也。然他内部諸藏膿瘍。若硬結腫。諸泌胞閉塞。及外部諸腫瘍瘰癧。

癧。耳後發腫。癩瘡。癭瘡。痘疹等。以誘敗全身血液。而膿液來留于肺。則皆共陷于勞瘵也。又有禾稟勞瘵質人。一二遠因以誘之。便發此病者。又有血液稀薄。靈液缺乏。而諸液自敗。或胃化不健。乳糜不熟。以損壞諸液。雖不必吐膿痰。而發瘦削。肉伏熱等。一般證治歸于同塗者。又有諸久病終末。與此病同趣。不得證治不關涉者。故此病雖畢竟與肺癆末證一也。然其初所由來異者。則證治固不能同矣。况復類證傍發等種種多端乎。此其所以不得不別立一門而詳論也。

勞瘵ノ病タル。人人難治タルヲ知ザル者ナシ。然ド

病區辨義

卷之六

三



モ亦其難治タル所以ヲ知ル者鮮シ。是他ニアラズ  
 其因ヲ明ニセザルガ故ノミ。蓋勞瘵ノ因ハ本文ニ  
 舉ル所ノ如ク。性命關係一大緊要ノ器タル肺藏ニ  
 於テ膿潰ヲ生ジ。加之<sup>カクミナス</sup>全身血液ヲ誘引シテ。コレヲ  
 腐敗セシムルガ故ニ。假令少壯進盛ノ元氣モ。終ニ  
 コレヲ保合シテ以テ其命ヲ存シ得ザルナリ。夫肺  
 ハ新氣ヲ引テ枯血ヲ潤ホシ。天地生生ノ活氣ヲ得  
 テ以テ其敗ヲ開グ所ノ者ナリ。然ルニ肺瘍及胸肋  
 膿瘍ノ如キハ。却テコ、ニ於テ腐壞ノ氣ヲ聚蓄ス  
 ルトキハ則。全身ノ血液精爽ヲ致ス所ナク。遂ニ相

延テ腐敗ヲ將來スルコト。更ニ論ヲ須ズシテ知ヘ  
 シ。若夫他ノ内部諸膿瘍。所謂ル喉風。肝。脾。腎。脬。胃。腸。  
 子宮等ノ焮腫潰瘍。若ハ硬結腫。或ハ叢胞。及腸間膜  
 ノ泌胞。其他諸藏ノ泌胞閉塞。又外部ノ諸腫瘍。及瘰  
 癧。此外部ノ泌胞閉塞ヨリ來ル者ナリ。内部ノ耳後發  
 腫。諸泌胞閉塞ノ狀モ。亦以テ類推スベシ。耳後發  
 腫。癰瘡。痘疹等ヨリ來ル者ハ何ゾヤ。蓋内部焮腫ノ  
 中ニモ比、ハ腸癰ノ如キ其膿ヲ外泄スベキ道アル  
 者ハ則外部諸腫瘍ノ如ク必シモ勞瘵ニ陷スルニ  
 ハ非レドモ他ノ膿瘍ノ如キハ終ニ是其膿ヲ排泄  
 スベキ道ナク比、ハ胸肺諸瘍ノ腔内ニ向テ潰破シ

瘡疽辨義

卷之六

三

胸膿病トナルガ如ク。所在ノ空間ニ留瀦シ。遂ニ諸部ヲ侵蝕シテ全身血液ヲ誘ヒ敗リ。流テ肺ニ来ルトキハ。則肺管ヲ刺傷潰爛シテ咳嗽ヲ發シ。且膿樣液ヲ吐シテ。終ニ肺ヨリ起原スル者ト其趣ヲ同スルナリ。是故ニ此等ノ證ハ其本元氣ノ虛實ニ拘ラス。終ニ皆勞瘵ニ陥入スルナリ。若夫外部ノ諸腫瘍。及癰瘡痘疹等ヨリ来ル者ハ。其人必元氣之弱。排毒ノ良能ヲ缺損スルヨリ。自ラ其膿ヲ血中エ引入レ。遂ニ内部諸膿瘍ト趣ヲ同シテ。而シテ此病ニ陥入スルナリ。但疹ヨリ来ル者ハ。猶傷冷毒氣ヲ以テ肺者ノ如ク。其酷厲刺戟性ノ毒氣ヲ以テ肺

中ヲ衝動シ。先咳シテ漸ク此病ヲ將テ止ス。乃胸又所謂  
 勞瘵質ナル者アリテ。而シテコレニ二品ヲ別ツ。一種ハ則其生ヲ稟ルノ始メ。凝固質ノ結成スルコト全良ナラズ。胸肺ノ形狀匾隘ニシテ。而シテ頸部細長ク。肩胛高聳。音聲細甲ナル人是ナリ。一種ハ則先天ノ血液全良ナラズ。世族コノ病ヲ患ル人。若ハ乳媪ヨリコレヲ傳ユル等ナリ。前種ハ即其肺截ノ狹隘ナルヲ以テ。血液常ニ快行セズ。動モスレバ輒チ留滯ノ患ヲ將出スルヨリ来リ。後種ハ即血液ノ質留滯シ易キヲ以テ。動モスレバ輒チ癰瘰樣ノ泌胞腫

癩因精義

卷之六

七

ヲ生シ。否レハ則肺囊ニ留滯シテ。便チ此病ヲ將出  
 シ来ル。此二種ハ共ニヨク其屬類ニ蔓延スルヲ以  
 テ。乃傳尸病ノ目ヲナス所ナリ。或曰。流動質ニ由ル  
 理ナリ。若夫凝固質ニ由ル者。豈ヨクコレヲ傳尸  
 トヲ得ンヤ。曰。否。夫同種ノ人ハ。容貌態度ニ至ル  
 テ。多少必相似ルモノナリ。故ニ其胸肺ノ形狀モ。亦  
 必相類セザルコトヲ得ズ。タトヒ相似ガハルモ。亦  
 同氣相求ルノ理ニシテ。必傳染シ易キナリ。故ニ同  
 氣ノ少草感觸シ易キ人ヲシテ。此病ヲ看侍セシム  
 ルコト以上大別三等コレヲ勞瘵ノ真證ト云フ。○  
 血液稀薄ニ過ルトキハ。其質内ニ精氣ヲ含ムコト  
 少ク。固ヨリ腐壞シ易キモノナリ。加之血中ノ精氣  
 少ナレバ。則靈液モ亦缺乏シ。白脈ノ運化健ナラズ



シテ。遂ニ諸液ノ運行ヲ怠漫セシメ。便チ自敗ノ變ヲ  
 致ス。又乳糜ハ後天血液ノ原酪ナルニ。若胃化健ナ  
 ラズシテ。而シテ乳糜酵熟セザレバ。則全身ノ血液  
 其稀稠ヲ論ゼズシテ。皆漸ク不熟質トナリ。遂ニ亦  
 自敗ヲ致スナリ。此二種究竟塗ヲ異ニシ歸ヲ同シ  
 テ。終ニ勞瘵ノ諸證ヲ見シ来ル。蓋此證ノ血液既ニ  
 腐壞シテ。而シテ其常性ヲ失フ所以ノ者ハ。即真證  
 ニ殊ナラズト雖モ。然ドモ腐壞シ来テ其質ヲ同セ  
 サルガ故ニ。或ハ咳ヲ發シ。或ハ發セズ。自餘諸證ニ  
 至ルマデ。盡ク真證ト一ナルコト能ズ。故ニ此ヲ類

病因精義

卷之六

六

證トスルナリ。○又彼諸經久病ニ於テ此病ニ陥入  
スル者ハ。是亦血液漸ク無力ニナリテ自敗シ。其ニ  
勞察ト内趣ヲ同スルニ至テ。而シテ外證相類スト  
雖モ。然ドモ終ニ其本病ノ主證ヲ失ハザルナリ。故  
ニ此ヲ傍發勞ト謂フ。○前文論列スルガ如ク。真證  
ノ近因スラナホ多端ニシテ。證治皆盡ク肺瘍ト一  
ナルコト能ズ。其餘類證。傍發等亦是種種ニシテ一  
致ス所以ナリ。學者當ニ意ヲ用テコレヲ熟讀スベ  
シ。

其遠因。凡生胸肺膿瘍之事件。所論於前諸篇者。其餘不  
除盡熱病毒。或閉澀之。以生粘稠惡液者。或婦亂。縱酒。晝  
情夜行者。或情動苦學。諸般坐業。且用力於胸以上。居恒  
支障肺之運動。而使失其常機者。或吸石炭之烟氣。傘石  
之蒸氣。及他不良惡氣。若留滯氣等者。或遇不慣風氣。若  
受濕氣夜氣。若衣衾之寒燠不適等。皆能緣起此病也。又  
彼類證之遠因。凡過汗吐下。及失血過多。若久續乳養。婦  
人及諸損胃化事件是也。若夫傍發諸證。則不遑枚舉也。  
夫勞瘵ハ。肺藏膿潰ヲ以テ本原トス。故ニ彼中寒。冷  
飲。過酒。勞動。通血閉止。瘡瘍内攻。時候惡氣。熱病毒。及

傷冷毒。又叫喚激音。若ハ吹笛等。凡脇肋焮腫。及肺焮腫等ヲ發セシムルノ事件ハ。皆此ガ遠因タリ。宜ク前ノ諸篇ヲ通考シテ其害由ヲ探ルベシ。中ニ就テ傷冷毒ノ咳嗽頑固ニシテ愈ガタキ者。此病ニ轉スルコト特ニ多シ。世俗ノ所謂風勞是ナリ又前文ニ論ズル所。他ノ内部諸焮腫ヲ發スル事件モ。亦此カ遠因タルトキハ又當ニ通考スベキ者ナリ。然ドモ既ニ其内蔵焮腫ヨリ来ルコトヲ察シ得レバ。則治療ニ從事シ得ベキガ故ニ。一一茲ニ贅セザルノミ。又本文ニ舉ル所ノ熱病毒ヲ除盡サズ。或ハコレヲ閉澀シテ粘

稠惡液ヲ生ズル者ト云ヘルハ。即前文ニ所謂ル内部諸閉塞ヲ来スノ因ニシテ。瘧母ナドヲ生ズル類ヲ謂フナリ。世俗ノ所謂瘧勞ノ類是ナリ。凡熱病後ハ於テ勞瘵ヲ發スル者。推考スベシ彼喉風。胸脇痛等ノ因トスル所ノ。直徑ニ其部ヲ攻衝シテ焮腫ヲ發セシムルガ如キ。熱毒初起ノ勢盛ナル者ト一様ノ看ヲ作スコト勿レ。又縱酒。淫亂。晝惰夜行ノ如キハ。居恒血液ノ運行ヲ錯誤セシメテ。以テ諸般ノ病因トナル者ナリ。是他ナシ其人稟賦ノ差異ニ因テ。化シテ以テ種種ノ病ヲナス者ナルガ故ニ。若天稟勞瘵質ノ人ニシテ。苟モ此等ノ所行

アレバ。即便本病ヲ誘發シ来ルナリ。又憂苦悲哀。困  
 學ノ如キハ。腦神先コレガ為ニ衰憊シテ而シテ循  
 胸白脈ノ常行ヲ愆リ。以テ胸膈ヲ逼迫煩悶セシメ  
 テ。而シテ血液留滯ノ患ヲ致シ。動スレバ輒チ心痛  
 ヲ發シ。或ハ胃化ヲ愆テ循胸白脈ハ胃ニ蔓延シテ  
ノ所謂ル事件アレバ。必心不熟乳糜ヲ生ズル等ヨ  
下苦悶ノ證ヲ見ス者ナリ。遂ニ此病ニ漸入スルナリ。故ニ此因。或ハ類證ヲ將  
出ス。世俗ノ所謂ル勞又彼諸般ノ坐業。胸以上ニ力  
 用ル者ハ。直徑ニ肺機ヲ妨害シテ。血液ヲ留滯セ  
 シムルヨリ来ルトキハ。其理殊ニ辨シ易シ又石炭

ノ烟氣。金石ノ蒸氣等ハ。其酷厲質ヲ以テ直ニ肺管  
 ヲ刺傷シ。他ノ不良惡氣。若ハ留滯氣等ノ性質モ。亦  
 上ノ二氣ニ相類スル者ヲ吸スレバ。使同ク肺ヲ刺  
 傷シ。共ニ止ザルノ咳ヲ誘發シ来テ。遂ニ此病トナ  
 ルナリ。習慣セザル所ノ風氣。及濕氣。夜氣若ハ寒燠  
 ノ節アラザル等ヨリ来ル者モ。亦是稟賦ニ從テ化  
 スル所。若勞瘵質ニ非ザル人ハ。必シモ此病ヲ發ス  
 ルニハ非ズ。若夫類症ノ遠因。過汗。吐下。及失血過多。  
亦此類ナリ。若ハ久ク續テ乳養スル等ヨリ来ルハ。  
 則血液ヲ稀薄ナラシムルノ因ナリ。諸ノ胃化ヲ損

スル事件ハ。即不熟ノ乳糜ヲ將來スルノ因ナリ。前  
ニ所謂ル腸間膜ノ泌胞閉塞ヨリ發スル真證モ亦  
此因ヨリ來ル。小兒ノ疳疾モ亦此類ナリ。宜ク唾科  
ス。蓋ベシ参考。傍發諸證ハ則各各其本病アルガ故ニ。茲  
ニ贅スルコトヲ須タズ。解剖家ノ說ニ。此病ノ死尸  
ヲ解觀セシニ。肺ノ一方。或ハ兩方ニ多少ノ膿瘍ア  
リ。甚キ者ハ全藏潰爛ス。又肺囊ニ惡臭液充滿シ。或  
ハ肺ト肋膜ト膜纖維ニテ附着シ。或ハ胸腔ニ膿ア  
リ。或ハ腹部諸藏ノ造成惡ク。腫瘍。若ハ潰瘍ア。或  
腹腔ニ膿液留瀦スル者アリト云フ。  
蓋勞瘵最難治之病。少壯死之者十居於其七。以是醫者

終為不起之證。而徒與無害無效之藥。以俟其自斃。已豈  
不亦悲乎。若夫苟志於仁者。尚盡心致思。而詳證察。因撰  
方究術。而開活路于死地。實濟世之大功。學者所當用意  
也。

此病肺瘍ヨリ來ル者ヲ最第一トシ。胸脇肋膜等ノ  
焮腫潰膿セシヨリ來ル者ヲ其屬證トス。此種類ハ  
真證中ノ主タル者ナリ。故ニ勞瘵ノ前兆ヲ知ント  
要セバ。先此二門ニ於テ標的ヲ取ルベシ。此二證ハ  
其人稟賦ノ虛實。及勞瘵質ノ有無ニ拘ラズ。若潰膿  
シテ而シテ治シ難キ者ハ。逸不得此病ニ陷入スル

ナリ。第二種ハ即所謂ル勞瘵質ヨリ来ル者是ナリ。此質ノ人ハ。則胸肺焮腫ノ候アル時ハ論勿シ。其他感冒。若ハ輕キ熱病ヲ患テ後。或ハ痘疹。若ハ疥癬。頭瘡等ノ皮膚ニ發スル諸病ニ嬰テ後。其毒除キ盡サズ。或ハ此等ノ事件ナクトモ。若止マザルノ咳嗽ヲ發シ。咳ノ微甚ニ抑ヲ云フ。經日持續スル者ヲ云フ。口中津唾苦ク。或ハ鹹ヲ覺エ。時ニ微熱ノ往来アル者ハ。其終リ將ニ勞瘵ニ陷入センコトヲ恐レテ。豫メコレヲ防クニシ。咳嗽漸ク繁ク。而シテ食後即便ニ嘔吐ヲ催シ。熱モ亦漸ク強ク。而シテ胸膈微痛シ。或ハ重滯ヲ覺エ。食後殊

ニ甚シク。咳唾或ハ時ニ血線ヲ交ヘ。精神何トナク乏缺シテ。世ノ勞碌ニモ任ヘガタク。且憂鬱悲悶シ。食欲漸ク減損シテ。而シテ斷ヘズ煩渴シ。腕前拍根ノ肉滋養ヲ失テ何トナク枯瘦シ。及一身殊ニ關節ノ肉稍瘦削シテ。而シテ全軀ニ萎黃色ノ帶ビ。脈數ニシテ虛細。或ハ時ニヤ、強實ナル等ノ證ヲ見スハ。即勞瘵ノ初發トスルナリ。前ニ舉ル諸證次第ニ增長シ。咳嗽夕夜ニ當テ更ニ甚シク。且脇側ニ臥シガタク。帶緑或ハ白色ノ粘稠膿様ノ痰ヲ吐シ始メ。其血線ヲ交ユルモ亦漸ク多ク。口中味ヲ失ヒ。且惡

病因精義

卷之六

四



臭アルヲ覺エ。漫然内伏熱發作時ナシト雖モ。食後  
 殊ニ甚シクシテ頰額ニ赤色ヲ呈シ。漫然内伏熱ハ血液將ニ腐敗  
セント腐壞ヲ催スルノ致ス所。譬ハ梅雨ノ頃。瘧疾  
坑ニ止ルガ如シ。又食後ニ當テ殊ニ甚シキハ。是  
其新来ノ乳糜升騰シテ。以テ血行ヲ進ムルノ致ス  
所。譬ハ梅雨偶晴テ。日光塵芥坑ヲ又時時胸内煩熱  
照セバ。蒸熱益甚シキカゴトシ  
 シ。或ハ胸ノ前後。若ハ脇間ニ刺痛ヲ覺エ。呼吸促迫  
 季脇下牽掣シ。手掌足蹠煩熱シ。身體日ヲ逐テ瘦削  
此皮下ノ脂肪微 脈急疾不齊ニシテ弱ナリ。此ヲ勞  
 瘵進悉ノ候トス。既ニ深重ニ至ルトキハ。甘味粘臭  
 ノ膿痰ヲ吐シ。日晡ヨリ夜ニ至テ熱甚シク。且睡中

夢多シテ安カラズ。更ニ自汗盜汗出テ。粘テ惡臭下  
 リ。又下利惡臭。沫ノ如クニシテ粘膠ナリ。小便過多  
 ニシテ赤ク。粘滑ニシテ油ノ如ク。粘濁ナル滓塗ア  
 リ。凝脂ノ如キ浮膜アリ。此皆血液溶解。滲漏スル  
以スル所。尋テ指細ク。爪勾リ。髮脫シ。鼻尖リ。齒牙色澤  
ヲ失ヒ。足脚浮腫シ。四肢微冷シ。眼目及顛顛陷リ。骨  
立シテ枯木ノ如ク。精力減極シ。既ニ死ニ瀕スレド  
モ。意識知覺ハ猶實正ニ。脈極メテ細數。虛微ナリ。此  
ヲ勞瘵終末ノ候トス。 ○他ノ内部諸藏ノ閉塞。腫瘍  
 硬結腫等ヨリ来リ。或ハ外部ノ諸腫瘍。瘰癧等ヨリ

來ル者ハ。爾前ニ各其的證アリテ。而シテ均キコト能ハズ。又其將ニ勞瘵ニ陷セントスルヤ。胸中疼痛。若ハ重滯。及咳痰交血等ノ證ナシ此其既ニ他部所ニ於テ釀成スル所ニ以テ膿液ヲ血中ニ齎ラシテ。漸ク肺ニ留滞シ。藉ニ於テ腫起蒸熱スルト雖モ。然ドモ。其漫然内伏熱ヲノ事ナキガ故ナリト發シ。且神身衰弱ノ諸證ヲ發スルコト。胸肺膿瘍ヨリ來ル者ト同シク。此其全身血液腐敗ノ勢其既ニ異ナルコト無ガ故ナリ勞瘵ニ陷スルニ及テハ。則肺藏潰爛シテ。咳痰臭膿ヲ吐シ。其他諸脫證ニ至ルテ。悉皆一般ナルガ故ニ。其來ル所ノ内外部屬ヲ問ハズ。總テコレヲ以テ

真證ノ第三種トスルナリ。○類證。血液稀薄ヨリ來ル者ハ。凡テ痰咳。及胸肺ニ關スルノ諸證アルナク。熱モ亦輕微ナリ。但是自汗盜汗等々ヘズ出テ。而シテ漸次虛羸瘦削シ。終ニ骨立シテ斃ルコト。都テ真證ト一般ナリ。不熟乳糜ヨリ來ル證モ。亦是痰咳及胸肺ニ關スルノ諸證アルコトナク。或ハ咳ヲ吐スルレドモ。終ニ膜ヲ顏色。及全身灰白萎黃色ヲ見ハシ。神意不了。肢體懈惰シ。必ズ胃部鬱悶シテ食ヲ欲セザルノ證アリ。初發ハ大概熱ナク。後ニハ蒸熱ヲ發スレドモ。亦是真證ノ如ク劇キコトナシ。他ノ

病日精義

卷之六

三

虚羸瘦削等ノ證ハ。則真證ト一般ナリ。○別ニ一種  
 縱酒嬉亂。血中精氣乏缺シテ。而シテ鬱滯蒸熱スル  
 ヲリ来ル者アリ。此證其熱ノ強キヲ以テスレバ。則  
 真證ニ疑似スルコトアリ。其咳ヲ發セザルヲ以テ  
 スレバ。則類證ニ疑似スルコトアリ。然トモ此證ニ  
 ハ。必ず腰部虚弱ノ證ヲ兼ルナリ。此ヲ以テコレヲ  
 徵スベキナリ。此證稟賦薄弱ナル者ハ。其終血液稀  
 薄ノ類證ト趣ヲ同レ。稠血家ハ。則其  
 血ノ留滯スルガ爲ニ却テ真  
 證ヲ將出シ来ルコトアリ

○治法。凡勞瘵ハ。真證類證ヲ論ゼズ。先攝養法ヲ慎ム  
 ヲ以テ要トス。藥劑コレニ次グ。故ニ定テ此病タル

ヲ診決スルトキハ。速ニ居ヲ轉ジテ。風氣開通清爽  
 ニシテ。光景目ヲ悅バシムベキノ地。汚濕鬱滯ノ氣  
 ナク。煩囂厭フベキノ事ナキ處ニ住マシムベシ。更  
 ニ毎朝性温ナル良馬ヲ撰テ徐徐ニ騎行セシメ。或  
 ハ逍遙緩歩セシメ。勞セザルヤウニシテ身體ヲ運  
 動セシムベシ。或ハ情ヲ慰ムベキホドノ旅行ヲナ  
 サシムルモ亦良ナリ。午後ハ起臥行止適宜ニシテ。  
 情友ノ好話。若ハ歌舞管絃等。意ニ適シ情ヲ慰メテ  
 倦マザラシメ。以テ神氣ヲ養フベシ。食ハ粳米大麥  
 等ニ。生蔬蘿蔔。松菜。牛房  
 根。蒿。苣。等ノ類。熟果櫻子。梅子ノ  
 橙。蜜柑。葡萄ノ砂糖漬。杏

輕味ノ肉牡蠣最良ナリ。雞類ヲ添用シ。時ニ輕酒一  
 小盃ヲ飲マシメ。又人乳汁ヲ用テ神效アリ。服度六  
日ニ三四次。若胃ニ停滯スルヲ覺ユル者ハ。燒酒。若  
ハ薄苛露少ヲ加ヘ服スベシ。若乳汁多ク大便ニ下  
ルコトアラバ。玫瑰花糕ノ陳久ナル飲ハ大麥煎ニ  
者。或ハ蝟蝟石末少ヲ加ヘ用ユベシ。飲ハ大麥煎ニ  
 良。茶湯モ可ナリ。或ハ漣麥飲ヲ作テコレヲ與フベ  
 シ。良效アリ。方。蘭方樞機凡飲食共ニ少ツ、幾回モ  
 用ルニ宜シ。一時ニ多食スレバ。乳糜升騰ノ勢強ク。  
 肺ニ逼テ煩熱セシム。又衣衾ノ寒暖ニ意ヲ用テ適  
 宜ナラシムベシ。○肺焮腫。胸脇焮腫ヨリ漸スル者  
 初發ノ治ハ。各其門ニ就テ考索スベシ。凡初發乾咳、

焮衝ノ候アル者ハ。刺絡一過スベシ。諸通血閉止。若  
客ノ病ハ。殊ニコレニ宜シ。過泄左則善ク痰ヲ吐シ  
弱ヨリ來ル者ニハ。用ルコト勿レ則善ク痰ヲ吐シ  
 來ル。若應ゼズンバ。罌粟煉糖ヲ與フベシ。刺絡スベ  
 カラザル者ハ。甘消大麥煎コレヲ主ル。虛家乾咳。焮  
 衝ノ候ナキ者ハ。扁桃罌粟卵黃護謨漿コレヲ主ル。  
 ○傷冷毒咳嗽ヨリ漸スル者ハ。脚間ニ發疱膏ヲ施  
 シ。焮腫ノ候アラズ者。薰蠟方ヲ吸引セシムベシ。此方。稟賦  
薄弱者ニシテ。肺藏罷勞シ。咳嗽。喘急。吐血。聲啞等ヲ發  
スル者ニ皆良ナリ。方。黃蠟適宜。松香。或ハ乳香。沒藥  
ヲ等分ニ加ヘ。小鍋ニ内レ。文火内服ニハ。石長生。莖  
上ニ焙解シテ。其蒸氣ヲ吸ス。  
 莖菜煉糖ニ甘扁桃油四分ノ一。冰糖適宜ヲ加ヘテ

温用スベシ。○疥癬。浸淫瘡。痘疹毒等ノ内攻ヨリ来  
 ル者ハ。硫黃花八錢。蕃薇煉糖十六錢ヲ和シ。一錢ヲ  
 服スルコト。日ニ三次。愈瘡木湯一茶盃ヲ用テ送下  
 ス。若ク焮衝ノ候ナキ者ハ。腹間ニ發疱膏ヲ貼シテ良  
 ナリ。○癩毒ヨリ漸スル者ハ。柔汞丸ヲ與ヘテ緩下  
 シ。扁桃乳ヲ用テ其惡液ヲ甘和導泄シ。更ニ土茯苓  
 湯ヲ用テ微微發汗セシムベシ。或ハ欬冬葉。亞麻仁。  
 錦葵。蜀葵。梔梔仁。淫  
菖。土木香。地榆等ノ一  
 和胸藥ヲ加ルモ亦良 ○房勞過度ヨリ来ル者ハ  
 甘乳清。或ハ酪。或ハ鹿角膠ニ。他ノ和胸ノ飲劑ヲ兼  
 用シテ良ナリ。○熱病後。瘧勞ノ類。及内蔵泌胞閉塞。

或ハ諸液稠凝等ヨリ来ルハ。コレヲ分利疏解スル  
 ニ。土茯苓。蒲公英。欬冬葉。野菊等ノ煎湯ニ。香橙汁。及  
 消石少ヲ加ヘ用ヒ。橙皮酢ヲ兼用シ。間亦苜蓿煎熬  
 ヲ與フベシ。病毒既ニ疏解セバ。剛鍈劑ヲ用テ内蔵  
 ヲ強壯ニシ。苦味ノ瀉利鹽此消酒石ノ類ヲ用テ導泄ス  
 ベシ。若腸胃内ニ惡液ヲ蓄ル者ハ。 ○鬱怒憂愁ヨリ  
 来ル者ハ。先ニ和性吐下劑ヲ用テ鬱滯セル膽液ヲ驅  
 泄シ。而シテ後ニ螭蛄消石散。及粘魚須蜀羊泉湯ニ。  
 紫堇煉糖ヲ加ヘ與フ。更ニ甘乳清。扁桃乳等ヲ兼用  
 スベシ。○内蔵諸膿瘍。及硬結腫等ヨリ来ル者ハ。治

畧。肺癆。及硬腫ニ同シ。尚各門ヲ参考シテ處置スベシ。外部諸腫瘍ヨリ來ル者ハ。先コレヲ開破淨除シテ。而シテ内托愈合スベシ。否ザレバ則徒ニ勞瘵ノ治ヲ施ストモ亦效ナシ。○虛弱家。及困學勞神等ヨリ來ル者ハ。健補酒。或ハ幾那桂橙散。蘭苔甘草湯ニ宜シ。○酷厲侵襲ノ氣ヨリ來ル者。其他遠因劃然タラザル者。凡テ此病ニ決定スルトキハ。土茯苓。龍芽菜。款冬葉。玫瑰花。金盞花。地榆等ヲ適宜ノ煎劑トナシ。稠血家。或ハ焮熱ノ候アル者ニハ。潔淨消石少ヲ加ヘ。兼テ薔薇。蜀葵。甘州等ノ煉糖ヲ加ヘ用ユベシ。

又甘扁桃油。蜀葵煉糖ニ。雞子黃ヲ合シテ煉藥トナシ。與フベシ。○粘痰吐シ難キ者ハ。香椽蜜糖煎ニ宜シ。コレ善ク熱ヲ清シ渴ヲ止ム。方蘭方樞機ニ出ス粘痰多キ者ハ。沒藥苗香水ニ宜シ。良效アリ。○胃ヲ強クシ。食ヲ化シ。血性ヲ復シ。粘液ヲ稀釋スルニハ。連錢草。益智。龍膽。野菊等ノ苦味飲劑ニ宜シ。○肺已ニ潰膿スル者ハ。務テ其膿ヲ排泄シテ。而シテ其創ヲ瘡シ。且強壯滋養シテ。以テ衰弱ヲ復スルニ在リ。既ニ此ニ至テハ。亦甚遠因ニ拘スベカラズ。下ニ數方ヲ列擧ス。雖モ。尚復肺癆門ヲ参考シテ隨宜斟酌スベシ。

○凡勞瘵及類證。凝固質衰弱シ。流動質敗壞シ。漫然タル内伏熱時ヲ期シテ往來シ。精神乏缺。身體羸瘦シ。脈細數。虛弱ナル者ハ。皆幾那ノ主治スル所ナリ。單味煎湯トナシ。或ハ隨宜ノ藥品ヲ加ヘテ其功ヲ左右ベシ。奇驗アリ。凡此病ニハ。必ず甘草。若ハ煉糖ヲ加ヘテ肺ノ擊急ヲ緩ルノ。痰ヲシテ吐シ易スカラシムベシ。良ナリ。○凡勞瘵。夥シク膿痰ヲ吐泄スル者ハ。速ニ幾那甘草湯ヲ與フベシ。否ザレバ則頻ニ衰弱シテ救ヒガタシ。時ヲ失フテ後悔スルコト勿レ。○效劇シテ痰稀ク。或ハ身體乾涸シテ痰出デ

難キ者ハ。幾那甘草湯ニ亞刺未亞護護。或ハ白芨ヲ加ヘテ與フベシ。○幾那甘草湯ヲ用テ熱減シ。脈數漸ク減シ。呼吸稍易ク。痰ヨク出ル者ハ。幾那末ヲ煉糖ニ和シ。或ハ日常飲料ニ和シ。每一時半。四五分ヲ用テ良ナリ。或ハ幾那乳香丸ヲ用ルモ。亦良ナリ。○汗出ルコト多キ者ハ。幾那飲ニ綠礬湛少ヲ加ヘテ殊功アリ。胃弱羸極ノ者ハ。依蘭苔ヲ加ヘテ良ナリ。○幾那劑ヲ用ルノ間。冷氣ニ感シテ吐痰俄ニ止ミ。煩悶ヲ發スル者アリ。蜀葵甘草湯コレヲ主ル。肺氣和シ。痰ヨク咯出スル者ハ。復幾那湯ヲ用ユベシ。○

凡幾那ヲ枝シテ吐痰減シ。熱反テ劇シク。湯ヲ發シ。呼吸短促シ。自汗甚レキハ。害アルノ劇シク。湯ヲ發シ。コレヲ止。凡幾那ニ功アル證ハ。水楊皮モ亦功アリ。缺乏スルトキハ代用スベシ。蘭方極機ニ水楊皮湯アリ。功カヲ扶クベシ。蓋木楊幾那性功相近シト雖。固リ幾那ノ俊逸ナルニ如ス。况今洋船夥齎シト雖。然。日用ニ供スベキトキハ。宜クコレヲ使用スベシ。ノ品。慮テ。為ニ代用。○凡勞瘵及類證。羸瘦虛脫シ。下利漏汗等ノ證アル者。咳ノ有無ヲ論ゼズ。依蘭苔奇效アリ。蘭苔甘草湯。蘭苔幾那湯。加蜀葵煉糖。蘭苔甘草蜀羊湯ノ數方アリ。隨宜撰用スベシ。依蘭苔ハ。石上帶白ニシテ薄キ木耳狀ノ者ヲ採用スルニ功相近ノ品。以テ。此名アリ。今和產ノ者ヲ採用スルニ功相近

シ。勞咳。虛熱。傷冷。毒。麻疹。後。及諸頑固經久。然。トモ。效アリ。故。此病ニハ。初發ト雖。モ用スベシ。然。トモ。效キ。熱。及閉塞ノ證アリ。又。泄除勿スレ。○膿血混出スル者ニハ。玫瑰花糕子良效アリ。和胸ノ湯劑ニ和シテ久服セシムベシ。○顔色滲澹灰白ニシテ熱ナク。血液沸騰ノ候ナキ者ハ。石蜜加沒藥煎熬劑ニ宜シ。○精カヲ補充シ。神志ヲ愜慰スルニ。忽弗滿名鎮痛液ヲ用テ效アリ。○類證。過汗吐下後。及脫血。漏精。白帶下。乳養過分等ヨリ來ル者。及即今凝固質衰弱シテ漏脫ノ證アル者。又乳糜不熟ヨリ來ル者。皆幾那。及依蘭苔ニ宜シ。若其腸胃鬱滯ノ候アル者ハ。宜ク先ツ



和カニコレヲ下導シテ。而シテ後ニコレヲ用ヒ。諸  
 藏壅閉ノ候アル者ハ。疏解シテ而シテ後ニコレヲ  
 與ノベシ。皆效驗アリ。更ニ苦味ノ健胃浸ヲ兼用シ  
 テ益佳ナリ。又剛鋏酒。及綠礬湛モ奇效アリ。隨宜兼  
 用スベシ。但小兒ノ羸瘦病ハ。多ク内藏壅塞スルニ  
 因ル。幾那蘭苔トモニ害アリ。此證ハ石鹼質ノ解凝  
 劑ニ宜シ。海一 掘ノ 温子 失シテ 過ル ○久病虚羸。傍發勞ノ屬  
 モ。亦幾那蘭苔ニ宜キ者アリ。本病ヲ考勘シ。斟酌シ  
 テコレヲ用ユベシ。○凡諸證退テ後ハ。專ヲ攝養ヲ  
 慎ミ。胃化ヲ左右スルニ在リ。苦味健胃劑コレヲ主

膈膜焮腫第二十九

膈膜焮腫之因。與胸肺諸焮腫不異。而以其部位相接。謾  
 認為胸痛。或以其熱勢猛烈。誤認為熱病。反以其痛為傍  
 證。因以誤治者亦不少。從事於療術者。宜用意詳其證。勿  
 致妄投暗殺之戾矣。

横膈膜ハ。胸下腹上ニ在テ。前ハ胸骨末端ニ著キ。後  
 ハ腰脊椎骨ニ著キ。左右周圍ハ季肋骨ノ下面ニ附  
 著シテ。以テ胸腹ヲ分界スルノ器ナリ。此膜ニ焮腫

ヲ發スルトキハ其部即胸骨下端劍狀柔骨内ニ當  
 テ太甚、焮熱刺痛シテ。而シテ一身壯熱ヲ發シ。吸氣  
 及便通等ノ如キ。此膜一上一下昂低ノ機ヲ作ス事  
 件ニ於テハ其痛必増劇シ。又此膜ノ連綴互接スル  
 所。胸脊背腰脇肋等ノ諸部ニ於テ。悉ク鼓動スルコ  
 トアルヲ覺フ。夫焮腫ハ血ノ茲ニ聚攻スルガ為ニ。必其發スル處ニ於テ激搏鼓動ヲ作ス者ナリ。然ドモ此膜ハ。膈ハ天幕ヲ張タルガ如ク。四方四隅ヨリ維持スルモノナリ。故ニ天幕或ハ蚊帳ノ上ニ石ヲ投ジテ見ルガ如ク。其激搏鼓動ノ勢ガ。其腫痛スル處ヨリモ。却テ其維持附着セル部ニ能應ユルコト又肺ニ氣ヲ含テ盈張スレバ。則膈膜ヲ強ク押下シテ。直ニ其焮腫ヲ壓迫スルガ故ニ。其

痛ニ耐ズシテ。即テコレヲ滿張スルコトヲ得ズ。肺  
 ノ纖維コレガ為ニ緊縮シテ。而シテ音聲銳利。呼吸  
 短急ノ證ヲ見スナリ。又此膜ハ腹上ヲ蓋覆シ。呼吸  
 ニ由テ昂低シ以テ腹部諸器ノ官能ヲ成シムルモノ  
 ナリ。而ルニ今茲ニ妨害アリテ以テ其職ニ怠リ。  
 且、此ヨリ以下ニ循ル白脈ノ運行十分ナルコトヲ  
 得ザルガ故ニ。其劇證ニ至テハ。胃白脈痙攣シテ止。  
 カタキノ呃逆ヲ發シ。或ハ膀胱及直腸ノ枯約ヲ失  
 ヒ。大小便自利ノ證ヲ致スコトアリ。又内外ヲ問ズ。  
 凡焮腫アル者ハ。血行激抵シテ急疾ナルモノナリ。

症因考

卷之六

三十三

而ルニ此焮腫ハ直ニ心蔵ノ下面中下分界ノ器ニ在ヲ以テ血ノ下行ヲ妨障シテ而シテ上部ニ衝逆セシムルコト多ク。腦中是ガ為ニ攪擾セラレテ而シテ謔言妄語。及他ノ發狂熱ノ諸證ヲ兼見スコトアリ。甚キハ腦焮腫ヲ兼發スト云ヘリ又橫膈白脈ハ項椎白脈ノ枝別ヨリ来リ。而シテ其連枝カ面部ノ外筋ニ循行シテ交通スルガ故ニ上下顎筋ニ痙攣ヲ發シテ笑カ如キ狀ヲナスコトアリ。凡此病ニ胃肝脾腎等ノ焮腫ヲ兼ルハ危篤ナリ。且右等ノ諸蔵焮腫ト證候相混シ易シ。意ヲ用テコレヲ診別スベシ。凡内部焮腫

潰瘍。若ハ壞疽トナル者ハ總テ死證ナリ。又此焮腫潰膿シテ。口ヲ上部ニ開<sup>テ</sup>バ。則胸膈病トナリ。下方ニ開<sup>バ</sup>則腹中ニ漓ルナリ。甚<sup>キ</sup>者ハ膈膜ノ全質腐爛洞破シテ。胸腹二腔ノ分界ナキニ至ル。豈其救療スルコトヲ得ンヤ。但初發及其焮腫小ニシテ。而シテ脈實數。總身發汗シ。或ハ尿多ク。或ハ大便多ク通ジ。時ニ血ヲ交<sup>テ</sup>下ス等ノ證アル者ハ良徵トス。皆以テ救療スルコトヲ得ベシ。若夫衰弱ノ諸證ヲ見シ。脈振盪シテ微細。且結代スル者ハ。死旦夕ニアリ。

○治法。要務テ速ニコレヲ消散セシムルニ在リ。刺絡

角法。及清涼劑ヲ用ヒ。下劑及澀導方ヲ施ス等。總テ  
 胸肺焮腫ト一般ニ從事スベシ。殊ニ此證ハ。軟化澀  
 導方ニ利アリ。宜ク屢コレヲ施スベシ。此ニ由テ腸  
 胃ヲ疏通シ。  
患部ノ諸液又マサニ胸背周圍ヲ蒸滷温散シ。且軟  
 化糊劑ヲ傳貼スベシ。

胸膿病第三十

胸膿病者。膿液溜瀦于胸腔之下方。或兩方。或縱隔膜重  
 複之間也。其因。肋膜。膈膜。肺藏及他胸内諸器焮腫而膿  
 潰者是也。或自打撲外傷來亦有之。凡此病不治者。其終

皆陷于勞瘵也。宜速救療之。勿遲疑致死矣。

此病ノ證候ハ。爾前ニ於テ必本論ノハ所ノ諸焮  
 腫ヲ患ヘ。大率初發ヨリ十四五日ヲ經テ。而シテ痰  
 唾ニ膿ヲ交ヘテ泄出スルノ候キトキハ。逃不得  
 此病ニ陷入スルヲ恐ルベシ。蓋將ニ此病ヲ成セント  
 スルヤ。其諸焮腫ガ既ニ熟膿シテ。而シテ其膿胞ガ  
 破ルニ當テ。必其部ニ於テ一箇ノ鳴動ヲ覺エ。然  
 出スル者アリ且屢眩暈ヲ發シテ。而シテ煩悶退キ。  
 一二日所モ稍快キ方ニ思ハレ。而後漸ク胸内困重。  
 呼吸不利ノ證ヲ發シ。多少疼痛ヲ兼子。膈膜ヲ強ク

押ガ如クニ覺エ。或ハ膿ノ動搖スルヲ覺エ。連綿々  
 ル乾咳。及氣息惡臭ヲ發シ。尋テ勞瘵内伏熱ノ諸證  
 ヲ見レ。微微自汗。殊ニ頭面。或ハ項上。及胸部ニ出ル  
 コト多ク。手腕。或ハ足脚浮腫シ。頰顴赤色ヲ呈シ。或  
 ハ胸上ニ小疱ヲ生シ。總身漸次骨立ス。又其膿一方  
 ニ在モノ。或ハ其病アル方ヲ下ニシテ臥ガタク。或  
 ハ反テ其無方ヲ下ニシ難キコトアリ。且其膿下ル  
 方ハ。患者必重迫スルヲ覺エ。或ハ滿張シ。酸痛シ。大  
 熱ス。且試ニ濕布ヲ取テ胸上ニ安スルニ。夕夕晨  
 ル部ヨリ乾キ始ムルモノナリ。若其兩胸ニアル者

ハ横臥スルコトヲ得ズ。必仰臥シ。或ハ起坐ス。又縱  
 膈膜重複ノ間ニ在ル者ハ。本證ノ外。胸骨押壓疼痛  
 シ。壯熱ヲ兼子。心悸動シ。時時洒淅惡寒シ。乾欬煩渴  
 シ。脈緊ニシテ。身體急ニ枯瘦ス。若心囊ニ膿ヲ蓄ル  
 トキハ。顔色滲淡。苦悶煩躁。數失氣昏厥ヲ發シテ。而  
 テ死ス。若肺ニ在ル者ハ。則肺瘍篇ニ出セリ。参考ス  
 ベシ。○胸膿病。日ヲ經ルトキハ。膿質次第ニ變惡酷  
 厲ニナリ。所在ノ輸尿管ヨリ傳ヘテ血中ニ入レバ。  
 則血質ヲ誘敗シテ勞瘵熱ヲ發シ来ルナリ。其人煩  
 悶。裏熱外寒。痰沫惡臭。綠色。或ハ帶黑色。コレヲ銀ニ

著レバ黒色ヲナシ。或ハ黃銅色ヲナスハ皆惡徵ナリ。又大便秘閉。不食シ。食後掌中熱シ。音聲嘶啞シ。頭髮脫落シ。後ニハ大便泄利シ。鵝口瘡ヲ發スル等ハ。死期近キノ候トス。○其人若温煖適度。呼吸容易。疼痛寡少。飲食味アリ。痰唾能出テ。膿ヲ交ヘ。此ガ白色ニシテ溶解シ易ク。且惡臭ナク。小便多シテ能熟シ。且白塗アリ。大便平常ノ如ニシテ。食後催熱ノ候ナキ者ハ良徵ナリ。快復ヲ庶幾スベシトス。○又胸膿ガ横膈膜ヲ腐蝕シテ。腹内ニ漏滴スル者アリ。尤不治ノ證トス。又此ニ反シテ肝藏ノ上面横膈膜ニ附

着スル部ニ膿瘍ヲ生スレバ。則横膈ヲ侵蝕シテ上方ニ絞出シ。遂ニ胸膿病トナルコトアリ。凡胸膿病ハ最難治ノ證ニシテ。百中二三ヲ救得ベキノミ。若必當ノ治ヲ處シテ。而シテ救得ザルトキハ。亦コレヲ如何トモスルコト無ノミ。麤診漏察シテ。誤治促死ノ責ヲ得ルコト勿レ。

○治法。既ニ胸膿ノ證ヲ認得バ。先導痰龍牙草。石長生。蜀葵根。罌粟子。亞麻仁。甘草等ノ煎湯ニ。扁挑油。蜂蜜等ヲ調勻セル者。或乳沒卵黃丸。煇龍蒲。罌羅甘湯。乳沒蕃菴。湛子。女嬰粟湯。通尿大麥。消石。霸王鹽。及子類。ノ劑ヲ與ヘ。且時時輕下劑ヲ兼用シテコレヲ導泄シ。前文所謂良徵

ヲ得バ則佳ナリ。持續シテコレヲ用テ以テ其功ヲ  
 終成ベシ。或ハ腿ニ腫瘍ヲ生ズルコトアラハ。宜ク  
骨木花等ノ煎汁ニ。荏子末。或ハ時蘿子末。松香等ヲ  
加テ蒸湯シ。強テ熱膿セシムベシ。コレニ由テ治ヲ  
得アルコ ○前法效ナク。良徴ヲ得ガタキ者ハ。速ニ肋  
 間穿孔術ヲ施レテ。以テ其膿ヲ瀉去ルベシ。則救得  
 ルコトアリ。若既ニ衰弱シ。且勞瘵證備ル者。及心囊。  
 若ハ縦隔膜重複ノ間ニ聚膿スル者ハ。不治ナリ。施  
 スコト勿レ。穿孔法。醫先其人ノ稟受胸腔ノ形狀ヲ  
 熟觀シ。上肺及心囊ヲ侵テ。下横膈膜ヲ傷ザル様ニ  
 精意ヲ用テ。而シテ其膿アル方ノ季肋骨ヨリ數テ。

第三肋ト第四肋トノ間。若ハ第四肋ト第五肋トノ  
 間。若ハ第五肋ト第六肋トノ間。多ハ此處ニ胸骨ヨ  
 リ四五指横徑。脊骨ヨリ六七指横徑バカリノ處ニ  
 於テ。假ニ點墨シ。患者ヲレテ倚子ニ靠テ正坐前屈  
 セシメ。或云稍共體ヲ斜ニシテ。骨間且十分ニ氣息  
 ヲ呼セシメテ。肺ノ縮小スル様ニ為シ置キ。醫披鍼  
 ヲ執テ。直ニ其點墨セシ肋間ノ下骨ノ上際ヨリ斜  
 ニ刺テ小孔ヲ作り。孔ノ深ハ。肋膜ヲ裁テ内胸腔ニ  
他器ヲ毀テ来ルモ勿レ。凡白脈及血脈ノ循行。每骨ノ  
下。面ニ沿テ来ルナリ。故ニ上骨ノ下際ニ針スノ  
斷スル。則コレヲ裁銀管ヲ執テコレヲ挿シ。此ニ紐カフ

合<sub>ト</sub>胸外<sub>ニ</sub>檢<sub>ヲ</sub>縛<sub>シ</sub>置<sub>キ</sub>管<sub>口</sub>ニ毎日二次十二三錢ヨリ  
 二十錢<sub>ハ</sub>デノ膿ヲトリ除<sub>キ</sub>盡<sub>シ</sub>テ而<sub>シ</sub>テ已<sub>ム</sub>。或<sub>ハ</sub>初<sub>ハ</sub>  
 將<sub>ニ</sub>開<sub>ロ</sub>口<sub>セ</sub>ン<sub>ト</sub>欲<sub>ル</sub>匙<sub>ニ</sub>先<sub>ニ</sub>腐<sub>藥</sub>ヲ貼<sub>シ</sub>。若<sub>ハ</sub>灸<sub>ス</sub>  
 ル<sub>コ</sub>ト敷<sub>壯</sub>。以<sub>テ</sub>皮<sub>ヲ</sub>破<sub>テ</sub>。而<sub>シ</sub>テ後<sub>コ</sub>レ<sub>ヲ</sub>刺<sub>ス</sub>。  
 若<sub>其</sub>膿快出<sub>セ</sub>ザルトキハ患者ヲレテ孔<sub>ヲ</sub>下<sub>ニ</sub>シ  
 テ躬<sub>ヲ</sub>傾<sub>ケ</sub>咳聲<sub>ヲ</sub>作<sub>シ</sub>ムベシ。則<sub>出</sub>グ。若<sub>膿</sub>稠凝<sub>ニ</sub>  
 シテ出<sub>ガ</sub>タキ者<sub>ハ</sub>。其管<sub>口</sub>ヨリ解<sub>膿</sub>愈<sub>瘡</sub>方<sub>或</sub>ハ大  
 十錢<sub>ニ</sub>。蓄<sub>薇</sub>蜜<sub>ハ</sub>錢<sub>ヲ</sub>和<sub>シ</sub>用<sub>ユ</sub>。若<sub>ハ</sub>ヲ射<sub>注</sub>シ。少<sub>時</sub>開<sub>了</sub>  
 白酒<sub>ハ</sub>錢<sub>ニ</sub>。蜜<sub>六</sub>錢<sub>ヲ</sub>和<sub>シ</sub>用<sub>ユ</sub>。若<sub>ハ</sub>ヲ射<sub>注</sub>シ。少<sub>時</sub>開<sub>了</sub>  
 リテコレヲ瀉<sub>ス</sub>ベシ。則<sub>快</sub>出<sub>ス</sub>。然<sub>ド</sub>モ偶<sub>ニ</sub>ハ肺<sub>藏</sub>  
 膿<sub>ガ</sub>下方<sub>エ</sub>下<sub>リ</sub>来<sub>ル</sub>トス。凡<sub>此</sub>術<sub>ヲ</sub>施<sub>ニ</sub>ハ。預<sub>メ</sub>膿<sub>ノ</sub>  
 得<sub>ザ</sub>ル者<sub>下</sub>リ。不<sub>治</sub>トス。凡<sub>此</sub>術<sub>ヲ</sub>施<sub>ニ</sub>ハ。預<sub>メ</sub>膿<sub>ノ</sub>  
 多少<sub>ヲ</sub>計<sub>テ</sub>。其量<sub>ヲ</sub>増<sub>減</sub>シ。大<sub>抵</sub>二旬<sub>以</sub>内<sub>ニ</sub>此<sub>ヲ</sub>取

盡<sub>ス</sub>ベシ。否<sub>レ</sub>バ則<sub>管</sub>口<sub>愈</sub>難<sub>ク</sub>。漏<sub>瘡</sub>トナル<sub>ト</sub>アリ。

○内服劑ハ。收斂強壯防腐愈瘡ノ藥品ニ宜シ。前ノ

蒲<sub>葶</sub>蜜<sub>醋</sub>。硫<sub>仙</sub>甘<sub>油</sub>煉<sub>等</sub>ヲ兼<sub>用</sub>シ。或<sub>ハ</sub>七<sub>味</sub>土<sub>茯苓</sub>。  
 湯<sub>モ</sub>亦<sub>佳</sub>ナリ。若<sub>膿</sub>多<sub>キ</sub>者<sub>ハ</sub>。更<sub>ニ</sub>芙蓉<sub>長</sub>生<sub>飲</sub>ヲ兼<sub>用</sub>スベシ。  
 若<sub>膿</sub>特<sub>ニ</sub>多<sub>キ</sub>者<sub>ハ</sub>。更<sub>ニ</sub>芙蓉<sub>長</sub>生<sub>飲</sub>ヲ兼<sub>用</sub>スベシ。

咳嗽甚<sub>キ</sub>者<sub>ハ</sub>。コレヲ和<sub>ス</sub>ベシ。子母粟<sub>煉</sub>。或<sub>ハ</sub>乳<sub>液</sub>。薔<sub>薇</sub>。  
 滋<sub>ニ</sub>。緩<sub>和</sub>劑<sub>粘</sub>痰<sub>吐</sub>シ難<sub>キ</sub>者<sub>ハ</sub>。コレヲ稀<sub>釋</sub>スベシ。

消<sub>蜜</sub>龍<sub>蒲</sub>。麥<sub>藤</sub>。蒜<sub>蜜</sub>醋<sub>等</sub>ニ宜<sub>シ</sub>。大<sub>渴</sub>スル者<sub>ハ</sub>。コレヲ  
 清<sub>解</sub>スベシ。始龍<sub>蒲</sub>。蜜<sub>醋</sub>等<sub>ニ</sub>宜<sub>シ</sub>。大<sub>渴</sub>スル者<sub>ハ</sub>。コレヲ

者<sub>ハ</sub>。コレヲ收<sub>斂</sub>スベシ。飲芙蓉<sub>長</sub>生<sub>食</sub>進<sub>ニ</sub>難<sub>キ</sub>者<sub>ハ</sub>。  
 胃<sub>化</sub>ヲ左<sub>右</sub>スベシ。湯胃<sub>和</sub>胸<sub>以上</sub>ノ方法<sub>ヲ</sub>施<sub>シ</sub>テ。



次第ニ衰弱シ来ル者ハ不治ナリ。膿ニ惡臭ナク。且  
精神衰弱セズ。身體虛憊セザル者ハ治スベシ。

### 胸水病第三十一

胸水病者。胸腔之下方。或兩方。鹹渣。或寒液。少混血而聚  
滿也。其曰久咳。或喘息。或心藏木脈幹損傷。或打撲傷等。  
以使胸部脈絡衰弱。而漏滴血中所含之稀液。或以使  
收管衰弱。而剩液漫爾淋瀝。若蒸氣發越之機。衰弱而漸  
次濕沾滴瀝之所致也。

此病ノ證候ハ。甚胸膿病ト相似タリ。然ドモ胸膿病

ニハ。其以前必膿ヲ齎シ来ルベキノ諸因證アリ。此  
病ニハコレ無し。又此病ニハ。必胸内ニ水ノ流ル  
ガ如キ音アルコトヲ覺エ。彼病ニハ。コレアルコト  
無し。又此病ハ。即從來所謂支飲ノ證ニシテ。必喘ヲ  
兼ルガ故ニ。喘息篇中ニモ亦コレヲ算入シテ。以テ  
發喘ノ因トシ。又喘ノ終末。此病ニ轉シ来ルトキハ。  
則喘ヲ以テ。此病ノ因トス。彼此参考スベシ。尚此病  
ニハ必乾咳ヲ兼テ。顔色淡白。食少ク。脈不齊。時ニハ  
或ハ足。或ハ手腫起シテ。而シテ胸部ハ稍易キヲ覺  
エ。手足ノ腫消スレバ。復胸ニ聚リ。或ハ陰囊腫脹シ

テ。而後ニハ睡中甚苦悶シテ急ニ興起シ。小水白色不熟。後ニハ寡少ニシテ甚赤色。又稀ク泡沫ノ如キ痰ヲ吐ク等ノ證アリ。此等ノ事件ヲ以テ診的トスベシ。蓋此病ノ来ルヤ。漸ヲ以テス。故ニ其始ハ患者亦自ラコレヲ知ズ。正ニ危篤ナルニ至テ。而後ニコレヲ覺知スルガ故ニ。其溜瀕スル所ノ水液腐敗シテ。多クハ救ハレザルニ至ルモノナリ。宜ク速ニコレヲ救療スベシ。若其顔色急ニ青鉛色ヲ見スハ。則死ニ臨ムノ徵ナリ。

○治法。若胸水確的ノ證ヲ認得バ。患者ノイマダ衰弱

セサルニ先テ。早ク茉莉甘汞散。或ハ茉莉酒石散等ノ峻下劑ヲ二三日間ニ一次。少クハ與テ其水ヲ下導シ。其間ニハ。鼠婦四錢末トシ。篤耨香適宜ヲ以テ丸トシ。每一時半ニ其丸子一分五釐ヲ取テ。他ノ利尿藥ノ煎湯一茶盃ヲ用テ。コレヲ送下スベシ。若下劑ヲ用テ胸熱氣急等却テ強ク。其人衰弱スル者ハ。宜ク單ニ利尿劑バカリヲ與ヘ。或ハ山爺菜精。硃砂精。迷迭香露。霸王鹽等ヲ兼用シ。或ハ十品愈瘡木湯ヲ與ヘ。兼テ呼膿法。貫線法術蘭方櫃等ヲ。股膀ノ筋肉多キ部ニ施シ。若ハ呼膿法ヲ陰囊ニ施スベシ。右

件ノ方法ヲ施テ效ナキ者ハ速ニ肋間穿孔術ヲ施  
 テ。コレヲ泄除スルノ外。他術アルコトナシ。法一ニ  
 胸臆病篇ニ舉ルガ如ク從事スベシ。施術ノ中モ猶  
 前件ノ方劑ヲ撰テ兼用ユベシ。蓄水瀉シ盡シテ後  
 ハ。緩性收滯ノ藥品ニ。強壯補充ノ劑ヲ調シテ終功  
 スベシ。若足腫テ胸易キヲ覺ユル證ハ。燒酒ヲ燃シ  
 テ。足ヲ其上ニ加テ薰蒸シ。其部ニ強ク發汗セシム  
 ベシ。奇效ヲ得ルコトアリ。若コレニ由テ其腫消シ。  
 胸部却テ不快ヲ覺ユルコトアリトモ。恐レズシテ  
 コレヲ施スベシ。終ニ良驗ヲ得。又胸上ニ白瑞香皮

ヲ傳貼シテ效アリト云ヘリ。

病因精義卷之六終

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

春和樓



貽安齋藏



文政十年丁亥五月

護兌書肆

京都二條通柳馬場西二入

吉田屋治兵衛

