



94
1161
8



1161
8

病因精義目次

卷之八 四篇下

惡心嘔吐第三十九

嘔血第四十

呃逆第四十一

胃痛第四十二 胃脘腫

腹痛第四十三 腸脹腫

霍亂第四十四

病因精義

卷之八



91-2028

者等是也。此亦真證之屬。以為病毒泄除之證者也。

凡食道ノ運行ハ上胃管ヨリ中胃腸ヲ經下肛門ニ至マデ蠕蠕トシテ動キ以テ順下傳送スルヲ常トス。然ニ今卒爾トシテコレニ反シ上ニ逆テ嘔泄スルハ何ゾヤ。他ナシ胃中ニ害物アリテ以テ所在ヲ攪亂スレバ則胃ノ白脈コレニ觸感シ立地ニ其常機ヲ變シ便ニ就テコレヲ驅泄セント欲スルノ致ス所ナリ。凡病毒胃ニアレバ嘔吐シ腸ニアレバ下汗出シ。若ハ瘡疥トナシテ外出スルヲ驅泄ス。此其病毒ノ在ル所ニ隨ヒコレヲ外ニ驅泄ス。便ナル道ヲ求テ。然コレヲ逐ノ為者所謂ル人身内ニ具スル所見ベシ。

此說已ニ初篇ニ具スト雖モ世醫多ク此理ヲ知テコズ。殊ニ嘔吐ニ於テハ徒ニコレヲ鎮セシクテ欲テコレヲ助益スルヲ為サズ。乃自然良能ニ逆テ以テ其利者亦コレニ準ズ。蓋其將ニ嘔セントスルヤ其胃ニ在ル所ノ不良ナル質ノ物が胃ノ裏面ノ膜ニ抵觸シ所在ノ白脈コレニ勝ヘザレバ則一齊ニ牽擣シテ上方エ急縮シ胃ノ全體ガ窄少ニナリ。下口ハ自ラ緊閉シテ其内ニ在ル所ノ物ヲ上口エ溢出シ来レバ則上胃管ノ白脈ニ抵觸シテ茲ニ惡心ヲ催スナリ。故ニ曰フ。惡心嘔吐ハ輕重ノ別ナリト。凡不良ノ食物ノ養榮ニ害アル者及諸般ノ毒物ヲ食ヒ

若ハ吐劑ヲ服シ。或ハ劇下ノ劑ヲ用テ反テ嘔スル者。其機皆一般ナリ。又其食服スル所。敢テ害アル品ニ非スト雖モ。或ハ香臭甚ク。或ハ氣味屬キ者ヲ用レバ。其白脈質脆弱ノ人ハ。其感觸ニ勝ヘズレテ。亦能悪心嘔吐ヲ發ス。其機同ジト雖モ。其因同カラズ。又其食物不良ナルニ。非レドモ。詳ニ下文ニ論說ス。又其食物不良ナルニ。非レドモ。若其用度。胃ノ分量ニ過越スルトキハ。則鬱滯腐敗シテ害物トナリ。前ニ同シク惡心嘔吐ヲ發シ来ルコトアリ。又其食度過分ナルニハ非レドモ。胃弱ノ人ハ。時ニコレヲ化スルコト能ズレテ鬱滯腐敗シ。遂ニ數嘔吐ヲ發スル者アリ。此等ノ證ハ。其原近ク飲食ニ起テ。專ラ胃ノ所業ニ出ヅ。故ニ此ヲ真證ト

謂フ。又胃中自然ニ害物ヲ生ズト云ハ。所謂酸敗液。酒客及留飲家ノ嘔吐。若ハ小兒ノ吐粘濁液。痰飲家乳等。諸酸臭物ヲ吐出スル者。是ナリ粘濁液。又嘔噎家。及他粘稠物ヲ及蛔蟲。結石等ナリ。此等ナホ其遠吐スル者。是ナリ。因ヲ推セバ。亦皆攝養不度。若ハ胃ノ薄弱ナルヨリ来ル。腐敗膽汁ヨリ来ルハ。所謂霍亂ノ類。及苦味汚臭ノ物ヲ吐スルハ。皆是ナリ。他部ヨリ浸淫シ来ル者ハ。熱病毒。痘瘡毒。丹毒。傷冷毒。痛風毒等ノ胃ニ入ル者。是ナリ。此ガ熱毒。痘毒等ハ。多ハ津唾ニ混シテ来リ。傷冷毒。痛風毒等ハ。大率諸脈ノ末梢ヨリ淋漓シ来ルナリ。又其良液ナルモ。溜瀦スルニヨリテ腐

病日精義

卷之八

三

敗スルハ。下篇ニ所謂嘔血ノ如キ是ナリ。以上諸證ハ。其因大ニ逕庭アリト雖モ。其胃ニ在ルノ害物タルヤ同シテ。而シテ其發嘔スル所以ノ機ハ一ナリ。故ニコレヲ真證ノ屬トシ。又病毒泄除ノ證ト謂フ。又有胃及其所交通之諸部有他病以連累逼迫而惡心發嘔者。此謂兼發之證。又有自意識感動身體妄動及外部創傷等來者。此謂雜證。別有稱乾嘔者。是曰唯有嘔狀而無物多於兼發雜證等發之。然胃口緊閉有物不得吐者。亦有之。尤為重證。凡惡心嘔吐及乾嘔共有宜鎮者。亦有宜促者。不能詳其因焉。得施至當之治哉。

兼發ノ證ハ。第一胃ノ燃腫。次ニ膈膜。腸及腹部諸藏ノ燃腫。膿瘍。諸疼痛。損傷。或ハ癰疽。大便閉。子宮病。又白脈病。頭痛。咳嗽等ニ於テ發嘔スル者是ナリ。此等ハ皆其疼痛ニ因テ。白脈牽掣スルノ運動ヲ轉移連累シテ。胃ヲ攪亂スルノ致ス所ニシテ。本來其吐スル所ノ物ニ因テ發スルノ嘔ニ非ルガ故ニ。既ニ胃ニ在ルホドノ物ヲ吐シ盡セドモ。其勢ナホ止マズ。數、乾嘔ヲ致スモノナリ。但、其膿ヲナシテコレヲ胃ニ齎シ來ル者ハ。此例ニ非ズ。又其甚者ニ至テハ。則腸部ニ在ル所ノ乳糜。腸小糞失。大腸及澀道。瀉劑直マデモコレヲ吐出スルコトアリ。

唯癩疝ト。大便閉トヨリ来ルハ。其順下傳送ノ機ヲ
 失スルノ致ス所ナルノミ。又泄瀉早ク止ミ。或ハ居
 恒通泄セシ所ノ者。閉塞スル痔血閉。經血閉ノ類モ亦ヨク嘔
 吐ノ因ヲナスナリ。○禱證ノ意識ノ感動ニ因ルト
 云ハ。汚物ヲ見。若ハ身氣ニ觸レ。或ハ嫌惡ム所ノ食。
 若ハ曾テコレガ為ニ發嘔セシコトアル所ノ物品
 ヲ見テ。忽ニ惡心ヲ催シ来リ。或ハ怒氣ニ因テ發嘔
 スル者等皆是ナリ。又藥品ノ氣味ニ由テ。コレヲ嫌
 惡ムヨリ發嘔スルモ亦此類ナリ。身體ノ妄動ニ因
 ルト云ハ。乘船。騎馬。疾走等ニ由テ来ル者ヲ謂ナリ。

外傷ニ兼發スルハ。特ニ頭部ノ創傷ニ於テコレヲ
 誘發スルモノナリ。コレヲ要スルニ此三因ハ皆是
 其因ノ為ニ。神府腦頭ヲ攪亂レ。昏冒眩暈スル等ニ因
 テ。白脈攣急シ上方エ畏縮スルガ為ニ。劍狀柔骨ヲ
 内方エ撓屈シテ。胃ノ下口ヲ壓閉シ。且胃ヲ攪亂シ
 テ。其中ニ在ル所ノ物ヲ上口エ絞出スルノ致ス所
 ナリ。胃ノ理。頭痛篇ニ説ケリ○乾嘔ノ吐物ナキハ。
 前文ニ所謂ル病勢ニ逼迫セラレテ。止ムコトヲ得
 ス。嘔機ヲ作ス者はナリ。物有テ吐スルコト能ザル
 ハ。所謂ル乾霍亂ノ類是ナリ。蓋嘔ハ本来逆機ナル

病因精義

卷之八

四

ガ故ニ。或ハ白脈質強實ニ過ギ。其攣急スルコト甚
 シケレバ。則啻ニ其下口ヲ閉ルノミナラズ。上口モ
 亦閉塞シテ。反テ嘔スルコト能ザル者アリ。或ハ白
 脈質虚弱ナルニ。其嘔セント欲スル所ノ物。涸泥質
 ニシテ重滯シ。滑脱スベキ水様液ニ乏シケレバ。則
 コレヲ逆出スルコト能ザルヨリ来ル者アリ。乾嘔
 ノ目ハ。大率此三等ニ過ルコトナキナリ。

○凡惡心嘔吐。胃中ニ害物アルノ候ハ。必心下痞悶シ。
 甚者ハ苦煩疼痛シ。或ハ噯氣嘈襍。口苦腐臭等ノ證
 ヲ兼ヌ。膽汁酷厲ヨリ来ルハ。胸膈燒ガ如ク。煩悶懊

惱シ發熱ス。腹部諸藏ノ焮腫ハ。必其部ニ於テ移動
 セザルノ疼痛アリ。且多ハ呃逆ヲ兼ヌ。胃ノ裏膜剝
 脱蝕爛此證ハ諸般ノ毒物ヲ食ヒ。若ハ酷厲腐敗ス
 ル等ヨリ来モ。亦呃逆ヲ兼ヌ。又頭ノ創傷ニ嘔アル
 ハ。死徵ナリ。真吐後。食欲ナク。唯熱飲ヲ欲スルハ。胃
 ノ積穢様ノ膜衰弱ノ徵ナリ。肩胛痛ニ嘔アルハ。良
 徵ナリ。病毒泄除ノ證ハ。都テ此ヨリ快路ニ趣ク者
 多シ。又總テ純一無襍ノ物。及純清鈔色惡臭ノ物ヲ
 吐スルハ。惡徵ナリ。凡病ノ初ニ黑膽液ヲ吐スルハ。
 死兆ナリ。耳聾ニ黑膽液ヲ吐スルハ。良兆ナリ。吐糞

病ノ初ニ。膽液ニ粘液ヲ混シ吐スルハ。死兆ナリ。凡
赤色物ヲ吐シ。劇痛ヲ兼ルハ。死兆ナリ。吐後眼華ヲ
現シテ。音聲變ズル者ハ。腦焮腫ノ前兆ナリ。

○治法。胃中害物アルノ證ハ。總テコレヲ促スニ宜シ。吐
根散コレヲ主ル。更ニ微温湯。或鹽湯。或野菊浸等ヲ
多ク飲シ。以テ快吐ヲ得セシムベシ。但胃兼弱ノ
者ニハ。芳香
健胃ノ劑。香橙。桂。肉豆蔻。益智。已ニ快吐ヲ得テ後ハ。
藿香。木香等ヲ調シ。與ベシ。各其病目ニ隨テ。適宜ノ治法ヲ施スベシ。例スルニ
食用不良。若ハ非度。若ハ胃弱等ヨリ来ルハ。殊ニ攝養
ヲ慎ミ。適宜ノ健胃劑ヲ換用スルニ在リ。痘毒。丹毒。

痛風毒。傷冷毒等ノ内陷シ。或ハ通血閉止等ヨリ来
ルハ。復ビ發泄スルニ宜シ。刺浴。下劑。脚湯。呼膿法。發泡
膏等ヲ換用スベシ。熱毒ヨリ来ルハ。其本病ニ隨フベシ。
○兼發ノ證ハ。大率コレヲ鎮スルニ宜シ。蓋各其本
病ノ治ニ從ニ在リ。但熱ニ屬スル者ハ。清涼劑ニ宜
シ。白脈孳急スル者ハ。香竈ノ藥。麝香。肉桂。丁香。品ニ宜シ。
外用ハ。燒酒温蒸法ヲ施スベシ。○感動ニ因テ發スル
者ハ。先其因ヲ去テ而シテコレヲ安静ニシ。冷水ニ
阿片醇一二滴ヲ加ヘ與レバ則愈ユ。○乾嘔ノ病勢
ニ因テ止ガタキ者ハ。香椽飲ニ宜シ。凡嘔吐當ニ鎮

スベキ者皆コレヲ主ル。方。蘭。方。樞。機。嘔。吐。セ。ン。ト。欲。吐。門。ニ。出。ス。シテ吐セズ。急迫スル者ハ。一。等。烈。劑。ヲ。用。テ。速。ニ。コレヲ湧越セシムベシ。諸。藥。劑。泰。西。方。鑑。ニ。出。ス。

嘔血第四十

嘔血謂自胃出血也。其近因動脈靜脈或門脈等末梢破裂而滲漏溜瀦焉也。其遠因大率喜飲烈酒熱酒若用辛辣苛厲之飲食藥劑若服峻劇吐下之藥品者或壞血病癥瘡諸腐敗病及經閉痔血閉肝脾閉塞病等兼發者若目打撲撞衝來者也。

胃血ノ候ハ。爾前多ハ心下急結シ。季肋下牽張シテ此ハ大概諸閉塞而シテ其發スルヤ。必悪心。煩悶。眩暈。胃痛等ノ證アリテ傍來リ。且其吐スル所ノ血大率凝塊黯赭色ニシテ。而シテ肺血ノ鮮紅ナルニ同カラズ。又多少食物若ハ粘液。酸液。膽液等ノ胃中ニ在ル所ノ者ヲ雜出シテ。而シテ氣泡アルコトナシ。此等ノ證ヲ以テ其肺血ト異ナル所ヲ辨ズベシ。其遠目烈酒以下吐下後等ニ於テ來者ハ。此皆コレガ為ニ胃ニ循行スル動靜脈ノ末梢ヲ破裂セシメテ血滴淋漓シ。漸ク溜瀦セシメ嘔シ來ナリ。壞血病。癥瘡。

病因精義

卷之八

八

腐敗熱病等ヨリ来ハ。其腐壞酷厲ノ氣質ヲ以テ。内
 ヲリ脈管ヲ侵刺腐蝕シテ。而シテ透漏スルナリ。此
 ヲ最惡證トス。經閉。痔血閉。肝。脾ノ閉塞等ヨリ来ハ。
 是其血胃ニ蔓延スル所ノ門脈ノ枝別ヨリシテ瀉
 出スルナリ。門脈ハ他部ノ靜脈ノ如ク。腹部諸藏ニ
 循ル動脈ノ末梢ヲ受テ血ヲ滲會シ。以
 テ肝ニ輸送經閉スレバ則腹部ノ血ガ一同ニ盈滿
 スル者ナリ。又痔血ハ此脈ノ枝別ノ肛内兩側ニ
 在ルモノヨリ瀉出スルナリ。故ニ痔血アリシ者ガ閉
 塞スレバ。則此脈溢滿シ。肝。脾閉塞スレバ。此脈ノ血
 稠結スル等ヨリ来ナリ。或ハ肝脈直ニ破裂シ總管ヨ

リ傳テ溢来者アリト雖モ。此證ハ必下血ヲ兼發ス
 ルヲ以テ徵スベシ。蓋門脈ヨリ来ル血ハ。其色殊ニ黯
 赭ニシテ。其質ハ反テ濃稠ナラズ。又胃痛スルコト
 ナシ。若夫外傷ヨリ来ハ知リ易シ。論說スルヲ須ズ。
 ○治法。脈實緊ナル者。及胃部焮熱鼓動スル者ハ。先刺
 絡術ヲ施スベシ。若痔脈腫脹スル者ハ。蟻鍼法ヲ行
 シ。且先其身體ヲ安静ニシテ。謾ニ震動セシムベカ
 ラズ。而シテ軟化溉導方ヲ施シ。二根湯。梅麥二石飲
 等ノ清酸藥ニテ。徐徐ニ下導スベシ。決シテ麻澀劑
 ヲ與ベカラズ。然ドモ血ノ出ルコト甚多ク。衰弱ヲ致

ス者ニハ。三味礬精煉。四味石脂煉等ヲ與ヘ。醋水綿
 ヲ胃部ニ貼シ。胃ト季肋トノ際ニ乾角子ヲ施スベシ。
 然ドモ胃中ニ溜血アル限リハ。尚前藥ヲ兼テ淨除シ
 盡スベシ。前次ノ血既ニ盡テ復吐セントスル者。或ハ
 煩燥シテ睡コト能ハザル者ハ。三味礬精煉。清和飲。扁
 桃乳合。罌粟煉糖等ヲ與フベシ。嘔血後衰弱。面青浮腫。
 心惕苦悶スル者ハ。滋養ノ食品ヲ與ヘ。每一時ニ幾
 那糖桂飲ニ乳汁少ヲ和シ服セシムベシ。尚復シ難
 モノハ。鐵幾沒蘇煉コレヲ主ル。凡嘔血止ザルノ時
 後。決シテ固食ヲ與ベカラズ。止シテ外傷ヨリ来ル嘔血
 後。ト雖モ。尚柔軟ノ品ヲ撰用スベシ。

ハ殊ニ難治ナリ。諸腐壞ヨリ来ル此證ニハ。石梅接骨
 飴。或消接嬰亞煉飲等ヲ與フベシ。溉導。放血モ亦兼施
 スベシ。愈後日ヲ經テ强壮ナラシムル藥浴ヲナサ
 レムベシ。諸藥劑總テ泰西方鑑ニ集載ス撰用スベシ

呃逆第四十一

呃逆之近因。胃管橫膈白脈有所支障。而拘急牽連乎
 喉頭。少害呼吸也。其遠因。食物硬澀。風氣急張。或釀腐敗
 乳糜。或生蛔蟲。或服食有毒諸品。或冷物所傷。或寒氣所
 侵。或酷厲毒留著于胃。若胃管或刺戟物。刮削胃及胃管

之滑液。若剝脫裏膜。或熱毒侵入。或胃及諸藏。癰腫。或諸般脫泄。及朱血。或寒熱壞疽。殊發下部者。或內部創傷。及截切石淋。若腸破傷者。兼發等也。

呃逆ハ胃及胃管横膈等ノ白脈運行支障スル所アリテ。一種ノ痙攣様ノ運動ヲ作シ。喉頭ニ連及シテ共ニ牽引スルナリ。是ヲ以テ頻ニ異常ノ音ヲ發ス。大率老人及虛弱家食後胃中飽滿シ食物固泥シテ。白脈ノ運行ヲ支障スル者ニ發スルコト多シ。又壯實ノ人ト雖モ。貪食暴食シ。或硬塊難化ノ物ヲ食テ。或腐敗乳糜ヲ生シ。或風氣ヲ生シ。或蛔蟲ヲ生スル

者モ亦能此病ヲ發スルコトアリ。又毒物ヲ食ヒ。或夾毒ノ藥（摺謨ノ如キ物）ヲ服シ。或酷厲刺戟スル物ヲ服食シ。或冷物ヲ食ヒ。或寒氣ニ中レルヨリモ。亦コレヲ發スルコトアリ。蓋毒物ハ直ニ以テ白脈ヲ刺傷シテ拘攣セシメ。或麻痺セシメテ。而シテ靈液ノ運行ヲ妨害スルヨリ来リ。甚トキハ則胃ノ裏膜ヲ剥脫スルニ至ル。若毒物ナラザルモ酷厲刺戟質ノ物ハ。亦ヨク胃及胃管ノ裏膜ニ布所ノ天賦ノ滑液ヲ奪去シ。其感觸ニ耐ガルヨリ白脈攣急ノ運動ヲ發シ来ナリ。冷物ヲ食ヒ。寒氣ニ中ル者ハ。以テ靈液

癩因精義

卷之八

七

ヲ凝泣シ。白脈ヲ畏縮セシムルヨリ来ナリ。又内ニ
 酷厲ナル膽液様ノ毒。或ハ傷冷毒。壞液毒。腐敗毒。膿様
 液ノ如キ惡物ヲ生ジ。ソレガ胃及胃管ニ来テ留著シ。
 以テ所在ノ白脈ヲ衝動スルヨリ来者アリ。熱病ニ殊
 瘧熱正。發動スルニ當テ其勢ニ及胃。腸焮腫。或ハ膈膜。或
 觸動セラレテ發スル者多シ。及胃。腸焮腫。或ハ膈膜。或
 肝藏。及諸藏焮腫。硬結腫。癌瘡等ニ於テ發スルハ。猶
 諸毒物ノ如ク。白脈ヲ刺戟拘攣セシムルノ致ス所ナリ。
 然ドモ加ニ靈液虛耗コレニ抵當スルコト能ハザル
 ノ因ヲ併テ。而シテコレヲ發シ来ナリ。嘔吐。下利。赤
 利。乳糜利。殄泄。失血等甚ク。或ハ吐下劑ヲ過用シテ頓

ニ滋養液ヲ込奪シテ靈液ヲ損乏シ。因テ白脈拘急
 スルヨリ發シ来ナリ。壞疽。及内部創傷。中ニ就短肋
 或ハ劍狀柔骨
ノ損傷。及頭蓋骨ノ打撲 若ハ截切法ヲ施スニ由テ来
創傷ニ於テコレヲ發ス 若ハ截切法ヲ施スニ由テ来
 モ。亦是靈液虛憊。白脈畏縮スルノ致ス所。皆死徵ナリ。
 ○治法。食物硬泥。風氣急張。或ハ冷物ヲ食ヒ。寒氣ニ中ル
 等ヨリ發スル者ハ。醇酒。或ハ燒酒。或ハ丁香油。一二滴 或ハ苗
 香。藿香。香橙。薄荷等ノ露水ヲ與ベシ。若シ急甚者ハ
 忽弗滿鎮痛液十五滴ヨリ砂糖湯ニ和シ與ベシ。但
 寒氣ニ中ル者ハ。外ニ温暖強壯ノ香油ヲ胃部ニ塗リ。
 或ハ膏藥ヲ貼スルモ亦良。蛔蟲。或ハ便秘ヨリ發スル者

病因精義

卷之八

三

ハ適宜ノ下劑ニ宜シ。中毒ニ因ル者ハ。油及乳汁ヲ與テコレヲ和シ。且吐スルニ宜シ。藥毒ニ中リ。或粘液。膽液。及諸惡液留滯ノ候アル者モ。亦コレヲ吐スベシ。吐根散胃ノ粘滑液ヲ奪去セラル、者ハ粘滑滋潤ノ劑ヲ與ベシ。裏膜ヲ剝脱セラル、者ハ粘滑愈創ノ劑ニ宜シ。○熱病。及諸癩腫等ニ兼發スル者ハ。龍消散ヲ兼用スベシ。或甘消石精二三滴麥酒一盃ニ和シ與ルモ亦良。癩腫ハ更ニ乳汁蒸湯法ヲ各其部ニ施スベシ。○諸般ノ脱泄ヨリ來ル者ハ。健補滋養劑ニ宜シ。寒熱壞疽ニ兼發スルハ。幾那加防腐劑ニ宜シ。

内部創傷。及截切法ヲ施スニ因ル者。及諸呃逆止カタキ者ハ。麝香煉コレヲ主ル。諸藥劑總テ泰西方鑑ニ集載ス採用スベシ

胃痛第四十二 并胃癩腫

胃痛之近因。胃中有害物攪亂所在。使白脈拘急也。或上迫于胃口。甚則牽引乎胃管。而連及乎心部也。其遠因。大率同乎嘈雜及嘔吐。而一等劇烈者。蓋亦攝生不良。而食物鬱滯。若生酸液。黏液。腐敗液。蛔蟲。風氣等。或膽液變壞。或諸病毒浸淫。或胃熱病。或經閉。痔血閉。或子宮病。脾病。肝病。石淋。兼發者等也。若夫胃癩腫者。疼痛尤甚。且有盛

熱傍來也。或成潰瘍。或變硬腫者。皆其痛劇。且連綿不休。最為難證也。

胃痛ハ心下刺痛。心腹痛。胃脘痛ナド稱スル者皆是。ニシテ。其證胸下ヨリ心部ニ連テ疼痛シ。甚者ハ上突急迫シテ呼吸短促シ。四肢厥冷シ。冷汗絞出スルニ至ル。蓋胃痛ノ必心部ニ連及スルコトアル者ハ。胃ノ白脈ハ胃管ヨリ連屬シテ。共ニ循胸白脈ノ管領スル所ナルガ故ナリ。又其痛輕微ナルハ。唯胃膜ノ細支白脈ノミ攣急シテ。胃ノ全質ガ繆結スルガ如ク。覺痛處低キ者ナリ。俗言ト云。是ナリ。其ガ漸強ナレ

バ。則其本ニ逼テ胃ノ上面ヨリ胃口及胃管ニ至ルナリ。胃ノ白脈叢ハ上面ニ在テ而シテ。胃口ノ周圍ニルヲ覺コ、ニ至バ胃ノ全體ヲ引絞テ狭窄ナラシメ。且上方ニ引舉テ。其半ハ胸骨内ニ迫入シ。胸下ハ石ノ如ク堅硬ナルモノナリ。然ドモ其毒甚多カラズ。胃機ナホ其常ヲ失ラニ至ラズ。子ウ子ト痛テ。而シテ下口ニ促リ。胃ノ右方ヨリ漸ク腸部ニ往キ雷鳴シ下。其遠因ハ本文ニ謂所ノ如ク。大率嘈雜。噯氣。吞酸。惡心。嘔吐等ヲ發スルニ同キガ故ニ。稟賦胃弱ニシテ日常右等ノ證ヲ患ル人ハ。亦必毎時胃痛ヲ兼發シ來モノナリ。又其毒ノ區別ヲ知ルニ。

食滯ハ必其以前食所ノ多カ。若ハ化レ難キ物カト言
テ聞テコレヲ察シ。酸液ヲ生ズルハ。面色滲淡灰白。
或ハ吞酸スルヲ以テ知リ。粘液ヲ生ズルハ。其以前必心
下鬱悶冷重スルヲ以テ推シ。風氣ヲ生ズルハ。其噯氣
放屁ヲ發シテ微快ヲ覺ルヲ以テ別ツ。腐敗液。蛔蟲。
膽液變壞。各其徵アリ。前後諸篇ヲ通考シテコレヲ
詳ニスベシ。若夫中毒ノ胃痛ハ尤劇烈ニシテ堪難
ク。甚者ハ胃ノ裏膜剝脱赤爛スルニ到リ。諸病毒浸淫
ヨリ来者ハ。第一寒氣迫入スル者ハ。每時卒然トシ
テ發ス。邦俗所謂ヒヘハラ是ナリ。痛風四肢ノ痛。俄

ニ止。胃ニ内陷シテ劇痛ヲ發スルコトアリ。壞血様
ノ病毒アル人。胃部ノ脈絡ニ鬱滯シテ胃痛ヲ發ス
ルコトアリ。動スレバ痙攣様ノ病ヲ患人。其病毒ガ
胃ノ白脈ニ侵入シテ發スル者アリ。此等ハ皆其毒
胃中ニ在ニ非ズ。而シテ胃ノ體質ニ在ナリ。故ニ其
拘攣スルコト尤甚ク。自ラ前證ト區別スル所アリ。
邦俗所謂サレコミナル者是ナリ。又熱毒胃ニ入テ
疼痛スルアリ。胃中鬱毒アリテ發熱スル者アリ。此
ヲ胃熱病ト謂。此亦時時胃熱ヲ兼發スルモノナリ。
此二證ハ熱病篇ト参考スベシ。又諸通血閉留シ。門

病區精義

卷之八

十四

脈及腹部ノ諸脈ニ鬱滯シ。胃ニ迫テ擗痛スルアリ。
 子宮病此證ヲ胃ニ其部痙攣衝逆スルヨリ脾病等ニ
 兼發スルモ。亦皆稠血留滯スルヨリ来俗ノ所謂血
 積是ナリ。又肝。脾。或腸間膜ニ硬結腫様ノ者ヲ生ジ。
 白脈及血脈ノ運行留滯スルヨリ。胃ニ連及シテ擗
 痛スルアリ。從來所謂五積六聚七癥八瘕ナド。皆此
 類ヲ誤認種種ノ名ヲ命ズル者ノミ。又石淋腎痛ニ
 於テ兼發スルアリ。此亦白脈ノ連交スルヨリ来十
 リ。凡諸病毒浸淫。及兼發ノ諸證ハ。宜各病門ヲ参考
 シテ詳ニ其因證ヲ察シ知ルベキナリ。凡寒氣迫入者。

且惡心嘔吐等ノ證ヲ以スレバ。尤劇烈ナル痛ヲ發シ。胃中ノ鬱滯毒ニヨルノミニ非ルトキハ。既ニ吐シ或ハ下シテ胃中潔淨スト雖モ。其痛ナホ休スルコトナク。且必其本病ノ證アリテ傍来者ナリ。宜意ヲ用テコレヲ察シ。誤治妄投ヲ致スコト勿ルベシ。

○胃焮腫ノ候ハ。胃部硬滿シテ熱痛シ。其痛處ヲ定テ
 動ズ。猶外部腫物ヲ生スルガ故ナリ食スルゴトニ必痛ヲ益
 且多ハ嘔逆シテ容受セズ。煩悶大渴。呼吸不利。脈緊
 數ニシテ沉伏シ。病漸進トキハ乾嘔。呃逆。煩躁。不寐。
 顔色青白。四肢厥逆。或冷汗出。或昏暈シ。或拘急搐搦
 シ。脈結代。或築動不齊。診シ得ガタシ。若潰瘍ニ變ズ
 ル者ハ。痛止テ快ヲ覺ラレドモ。元氣頓ニ脱シテ不日

高内精義

卷之八

三

ニ死ヲ致ス。若硬結腫ニ變ズル者ハ。熱漸減ズレドモ痛持久シテ止ズ。終ニ死ニ陥スルナリ。

○凡胃痛ニ劇キ吐下。失氣昏冒等ヲ數發シ。厥逆搐搦ヲ兼ハ大危證ナリ。又胃痛ニ熱ヲ兼ハ。往往惡徵ナルヲ見。又數胃痛及腸痛ヲ發シ。腸鳴噯氣ヲ兼者ハ。動スレバ輒鼓脹ヲ發スルコトアリ。胃及近傍諸藏ニ硬塊ヲ生シテ胃痛シ。コレガ消散セザル者ハ。遂ニ不治ノ水腫ニ陥スルコトアリ。解剖家ノ說ニ。劇キ胃痛ニテ死セル者ヲ解觀セシニ。胃口ニ腫瘍潰瘍ヲ生ジ。或胃内ニ黃或綠色ノ膽液。或黑膽液アリ。

或結石。或膜様ノ瘤アリ。或叢胞。或腸間膜。或肝藏等ニ硬結腫アリト謂リ。

○治法。停食。或腐敗液等ノ胃中ニ在アリテ。腐臭ヲ噯シ。惡心ヲ催シテ。而シテ胃痛スル者ハ。コレヲ吐セシムベシ。吐根散コレヲ主ル。或吐酒石ヲ與モ亦可ナリ。既吐シテ尚愈ザル者ハ。大黃。或酒石皮等ヲ用テ和ニコシテ下セ。腐敗酷厲ノ膽液アルヨリ來者ハ。石梅接骨脂コレヲ主ル。悍烈鹽液アルヨリ來者ハ。甘消石精ヲ與ベシ。或酪清大麥煎等ニ多。酸味果汁ヲ加。與モ亦良。或前方ヲ與モ亦可ナリ。酸敗液ア

ルヨリ来者ハ。牡蠣散。蜥蜴散。麻屈涅_{マクヰ}失亞_{シア}等ニ大黃
ヲ和_カ與_マベシ。邦俗所謂_ル留飲_ル痛_ル粘液_ルアルヨリ来者ハ。
將王散コレヲ主ル。終_ニ野菊煎。橙皮末等ヲ用テ收
功スベシ。風氣痞滯ヨリ来者ハ。茴香酒。桂露。綠礬_レ湛
等ニ宜シ。凡大便秘閉スル者ハ。溉導方。或緩下劑ヲ
用テコレヲ通スベシ。胃弱ニシテ數。胃痛ヲ發スル
者ハ。發作時應用藥劑ヲ投シテコレヲ治シ。間時ハ
前ノ諸篇ヲ通考レテ。隨證健胃劑ヲ與_テ全功ヲ收
ベキナリ。○中毒ノ治ハ。嘔吐篇ニ出_ツ。蛔蟲ノ治ハ。本
條ニ由_ルベシ。○中寒胃痛。惡心嘔氣アル者ハ。停食ヲ

兼_ルナリ。宜_ク先コレヲ吐セシムベシ。吐根散。或_ハ苦味健
胃浸ニ宜シ。吐盡テ後芳香温煖ノ健胃劑コレヲ主
ル。藿香。肉桂。薄荷。木香。肉豆蔻。
茴香。香橙。宿砂。山奈。良薑等。○壞血様ノ病毒ヨリ
来_ル者ハ。没蘆醇コレヲ主ル。○痛風毒内陷ヨリ来_ル者
ハ。醇酒。燒酎等ニ宜シ。麝香少ヲ加テ益佳ナリ。若嘔
氣アル者ハ。宜_クコレヲ促_スベシ。○屢_ク搐搦_ル瘧_ルヲ患_ル人。
及軟弱ノ婦人。數。胃痛ヲ發スル者ハ。忽_チ弗_レ滿_ル。鎮痛液
ニ宜シ。○諸通血閉止ヨリ来_ル者ハ。刺絡術ニ宜シ。次
ニ和性下劑ヲ用テコレヲ下セ。婦人經止テ後數。胃
痛スル者ハ。肘脚等ニ呼膿法ヲ施_スベシ。○胃及近傍

諸藏ノ硬結ヨリ来者中ニハ甚小ニシテ深ク知レ難ク得ハ。休作時ナク持續シテ愈ガタシ。先牛香湯或ハ茅苴開壅湯ヲ與。石鹼丸。霸王鹽等ヲ兼用シ。更ニ軟和蒸漏法或ハ塗藥等ヲ施シ。且時時按腹摩擦シ。又騎馬乘車或ハ緩歩逍遙シテ血液ノ運行ヲ調和スベシ。則愈。○凡胃痛。胃腸ニ留滯物ナクシテ。頑固愈難者ハ。阿片醇コレヲ主ル。桂露或ハ他ノ芳香藥湯ヲ用テ和シ服スベシ。又他病ニ兼發スル者ハ。各本病ト互考シテコレヲ治スベシ。○胃焮腫ハ。速ニ刺絡シテ其人微暈ヲ發スルニ至ルベシ。外軟化藥湯ヲ用テ胃部

ヲ蒸シ。或ハ菝葜膏ヲ貼シ。又時時脚湯ヲ施シ。蹠ニ温性糊劑ヲ貼シ。亞麻油。阿利襪油等ヲ大麥水ニ和シテ澀導方トシ。數コレヲ施シ。次ニ大麥煎ニ潔淨消石三五釐ヲ和シテ時ニコレヲ與。間亦乳酪清。甘草。蜀葵。粘魚須等ノ湯劑ヲ作。與ラベシ。若吐止サル者ニハ。時ニ清和飲或ハ緩睡和調劑ヲ一ヒツ、用ルベシ。但此證ハ内服劑ヲ用ニ微微順調シテコレヲ服セシメ。以テ嘔吐ヲ促サザルヲ要ス。他ノ治法ハ肝焮腫門ト通用スベシ。諸藥劑總テ泰西方鑑ニ集載ス擬用スベシ

腹痛第四十三 并腸焮腫

腹痛之近因。厚腸。薄腸。腸間膜等。白脈。攣急也。其遠因。自攝生不良。食物不好。以生酸液。黏液。蛔蟲。風氣等。來亦猶胃痛一般。或酷厲膽液。或瘵。攣拘急。或胃寒。傷冷。熱毒。浸淫。或稠血。聚滯。脾病。子宮病。腎痛。兼發等。亦復然。但異乎其毒之所著。已特白脈。衰弱。或大便秘結。或感金石毒。或泄瀉。痢疾。後疼痛者。則胃痛之所無也。又腸焮腫疼痛者。所謂腸癰之初證。而人略知其趣者。不須敢辨之。然亦有其所發不一。或終不能下膿者。則復不無所以生惑也。學者詳焉。

腹痛ノ起原ハ厚大薄小二腸ニ互テ所在ヲ定ムカ
 ラズト雖モ攝生不良以下酷厲膽液以上ノ因ヨリ
 來者ハ大抵薄腸ニ在リ膜管ニシテ上ハ連四襲ノ長
 二接シ下ハ肛門ニ至ル以テコレモ其部位ニ由テ差其
 形狀主用ヲ殊ニスルヲ以テコレヲ別テ六部トス
 第一テ以テ乳糜ヲ指腸ト謂フ胃ノ糜爛スル所ノ食ヲ
 承テ以テ乳糜ヲ釀熟スルコトヲ主ル膽液。叢胞液
 共ニ茲ニ入ル第二部ヲ滓ハコレヲ下部ニ送り空虛
 ノ時多ク以テ名ルナリ第三部ヲ回腸ト謂フ此部
 最長ク轉回重疊スルガ故ニ名ク回腸ト謂フ此部
 成シテ滓屎全成テ下ニ傳フ以上三部ヲ小腸トシ
 又薄腸トス其膜薄ク其管狹キヲ以テ十部ヲ四部トシ
 盲腸ト謂フ其終末ハ第五部ヲ縮腸ト謂フ第六部ヲ直腸ト
 謂フ其傳送スル厚ク其管太キヲ以テテナリ皆コレ滓屎
 腸トス其膜厚ク其管太キヲ以テテナリ皆コレ滓屎

前^ニ居^リ。大腸^ハ其^三居^ル。其^位上^ル。所^小腸^ハ大半^ニ。
 其^大體^ヲ領^知シ^テ。而^キシ^テ。後^然ドモ亦^細ニ其^情状^ヲ。
 診^腹ノ術^ニ從^事ス^ベキ^ノ。後^然ドモ亦^細ニ其^情状^ヲ。
 區^別ス^ルニ。食^傷ニ因^ル者。胃^ニ在^テハ其^コレ^ヲ。
 糜^爛ス^ルコト能^ズシ^テ。停^滯ス^ル者ナルガ故^ニ。未^ダ。
 其^形状^ヲ失^ハガ^ル者多^シ。既^ニ腸^ニ至^テハ則^チ大^抵糜^爛。
 シ^テ。而^シテ腐^敗敗^所謂^腐ス^ル者ナリ。而^シテ其^痛ヲ。
 發^スル處^ハ。則^チ薄^腸ノ初^次ニ在^リ。酸^敗液^モ亦^同シ。
 又^其痛^ヲ糞^スルノ状^ハ。其^腐壞^若ハ酸^敗セル酷^厲。
 ノ氣^ヲ以^テ。腸^白脈^及腸^間膜^ノ白^脈ヲ刺^戟攣^急シ。
 絞^ルガ如^クニシ^テ。而^シテ冷^痛ス^ルナリ。粘^液ハ薄^腸ノ

裏^面。吸^收管^ノ口。乳糜脈ノ若クハ乳糜脈ノ若^クハ乳^糜脈^腸間^膜ノ泌^胞ニ。
 滯^シ。以^テ諸^液ノ流^行ヲ妨^ゲ。痞^滿膨^脹シ^テ。
 冷^痛ス^ルナリ。蛔^蟲ハ其^居處^ニ隨^テ咬^傷シ。所^在ヲ。
 定^ムベ^カラザ^ルナリ。然^ドモ諸^腸殊^ニ攣^急ス^ル者^ハ。
 組^滕蟲^{ヨリ}來^ル者多^シ。尚^本篇^ト參^考ス^ベシ。風^氣ハ。
 諸^腸痛^コレ^ヲ兼^ル者多^シ。其^故何^ゾヤ。蓋^腸ハ飲^食ヲ。
 烹^熟シ^テ乳^糜ヲ釀^成ス^ルノ官^舎ニシ^テ。而^シテ物^ヲ。
 ノ烹^釀ス^ルヤ。必^菌ノ風^氣ヲ生^セザ^ルハ十^キガ故^ニ。
 其^攣急^スルニ當^テ。腸^ノ滕^理ヲ緊^急閉^合シ。
 テ以^テコ^レヲ漏^泄セ^ザレ^バ。則^チ已^コト^ヲ得^ズコ^トハ。

ニ鬱滯ノ患ヲ將出シ来アリ。又物ノ腐壞スルモ亦同ク風氣ヲ生ジ。酸敗液。腐壞液。壞液。毒。及腐敗膽液。腐敗脂膏等ヲ因トスル者皆コ、
 スニ屬又空囊状ノ物形ヲ牽擰縮張スレバ。則囊筋ノ機ヲ作シテ自然ニ風氣ヲ生ズル者諸腸痛皆此機
疝瘕。瘵ノ病。及子宮衝逆病。脾病ナルガ故ナリ。然ドモ此等ハ皆其因彼ニ在テ此ニ在ラズ。風氣ヲ以テ主トシ論ズベカラズ。但夫乾食ヲ食テ多津唾ヲ費シ。急ニ烹釀沸泡シテ夥ク風氣ヲ生ズル者。及殊ニ風氣ヲ生ズル食品譬バ薯蕷汁。納豆汁。及諸豆。芋。ヲ用ルヨリ来者ハ。則コレ風氣吹張シテ以テ擰痛ヲ作

シムルナリ。宜コレヲ以テ治術ノ標的トスベシ。蓋氣ノ生スル壞液様ノ腐壞毒ノ服絡ニ鬱滯シテ發スル者。及瘵擰拘急ノ為ニ發スルガ如キ其始甚精微ノ風氣ニ從テ腸間ニ在ル所ノ飲食ノ褻氣。及温暖氣カ褻テ漸粗テ上下ニ為リテ。而シテ痛モノ漸緩解シ。遂ニ噯屁トナリ粗テ上下ニ發泄スルモノ漸細シ。天地間ノ氣ニ比スルニ。初生ノ風氣ハ。猶高山峻嶺ノ氣ノ粗大ノレガ漸平地ニ至レバ。則萬物ノ氣褻合シテ漸粗大ニナリ。コレヲ人ノ身ニ受。酷厲膽液即腐敗膽液。トコニ甚差等アルガ如シ。屬スニ因者ハ殊ニ甚ク滿腹熱痛ス。而シテ其極吐下ヲ發セザレバ則止ガルナリ。瘵様ノ運動ヲ腸ニ發スル者ハ。其痛倏忽トシテ来去シ。遷移シテ處ヲ定ズ。常テ癩疾アル人。及脾病。子宮病等アル者ニ於テ

コレヲ得ナリ。冬時ノ寒氣ヲ胃シ。或夏日冷水ヲ過
 飲スルヨリ来ルモ。亦其痛速ニ来速ニ去。且コレヲ按
 シテ痛ヲ増ス。又其部位ハ大抵臍傍ニ在リ。熱毒浸
 淫。稠血聚滯。或壞血毒。或腎痛ニ兼發スル者等ハ胃
 痛。及各病本篇ヲ照シテコレヲ知ヘシ。煩クコ、ニ
 贅セズ。蓋世間疝痛ト稱スル者。多ハ是稠血留滯ノ
 腸痛ナリ。然ドモ壯年ノ人ハ多血ニ屬シ。衰老ノ人
 ハ涸血ニ屬ス。知ズンバアルベカラズ。又粘液痛。瘰
 癧痛。組。腸。蟲
 痛。或大便秘痛モ亦皆混レテ疝痛トスル者アリ。因
 テ以テ大抵類似ノ方ヲ以テコレヲ治ストス。宜ナ
 難キ功ヲ得大便秘結ヨリ来ルハ。縮腸ノ部位ニ當テ

痛ニ。且其人多日快通ヲ得ザルト。其累累然トシテ
 重積スルトヲ以テ知ルベシ。金石毒ニ感ズトハ。鉛粉。
 水銀。信石等ヲ扱フコトヲ業トスル人ニ於テ。頑固ノ
 腸痛ヲ得者是ナリ。然ドモ時ニハ藥食ノ中ヨリコ
 レヲ得ルモ亦コレアリ。其證先胃傍。或臍部ニ起リ。其
 初ハ勢鈍シテ。久モ續ス。漸劇ナリ且久續シ。其人食
 氣ヲ失ヒ。且噎氣ヲ發シ。又嘔シ。大便通レガタシ。腹
 絞急シテ背ニ著ク如ク。後ニハ臍及肛モ内ニ引入レ。
 羸瘦漸甚ク。終ニハ四肢殊ニ上肢麻痺スルナリ。此證
 或ハ半熟ノ葡萄酒ノ如キ泡沸スル飲ニ。痛瘰瘻ノ病ヲ食フヨ
 リモ亦コレヲ發スト謂フ。○又按ニ。痛瘰瘻ノ病ヲ食フヨ

レリ發スル腸痛。及運動血滯難キヨリ來ル腸痛。共ニ動モス
 ル風流注痛。是四肢ニ在リ。醋毒ガ轉ジテ。腸痛トナ
 ス。枝ノヲ甚親ヲ以テ。相交。久瀉。痢疾後等ノ腸痛ハ。尚
 其前病ノ腸内ニ在リ。毒物ヲ絞出セシ機勢ガ留殘
 スル者ニシテ。必裏急後重ノ状ヲ兼ルモノナリ。復コ
 レヲ辨ズルコトヲ須ズ。○腸焮腫ノ候ハ。他諸焮腫
 ト同ク。盛熱劇痛シテ而レテ動セス。些モコレヲ按
 スベカラズ。舌乾胎白。大渴。便秘。尿赤短少。脈緊ニシ
 テ數ナリ。若愈ザレバ則潰瘍トナル。所謂腸癰ナリ。
 其發スル處。腸ノ内面ニ於スル者ハ。則終ニ膿汁ヲ

下スニ至ト雖モ。若外面ニ向テ潰破シ。膿汁腹腔ノ
 間ニ出レバ。則コレヲ泄除スルノ道ナク。遂ニ勞瘵
 ニ陷入スルナリ。故ニ内部諸焮腫ハ。其初ニ於テ熟
 察シ。速ニコレヲ消散セシムルヲ要トス。
 ○凡腸痛一時頓發スル者ハ治シ易シ。經久ナルハ
 復シ難シ。又此病數發シテ而シテ風氣ヲ兼ル者ハ。動
 スレバ輒鼓脹ニ變ズ。凡寒痛ハ治シ易ク。熱痛ハ治
 シ難シ。殊ニ焮腫ハ若愈ザレハ則元氣遂ニ衰ヘ。不
 寐。譫妄。呃逆。冷汗等ヲ發シ。終ニ昏睡シテ死ス。
 ○治法。酸液。粘液。風氣。腐敗乳糜。泡沸スル飲。化シ難キ

食等ヨリ来者。若惡心嘔氣アラバ。先多ク微温湯ヲ
 與、テコレヲ吐セシメ。而シテ後麻偏^ハ湿^ハ刺^レ亞^ハ。霸王鹽
 蝟^ハ蛄^ハ大^ハ黄^ハ散^ハ。將^レ王^ハ散^ハ。若^クハ概^ニ導^ニ劑^ヲ等^ヲ撰^ル用^シテ。和^カ
 コレヲ下^シ。滯物既^ニ除^テ痛尚^レ休^{ザル}者^ハ。緩^ニ睡^ニ和^ニ調^ニ
 劑^ヲコレヲ主^ル。定^ニ痛^ニ和^ニ調^ニ劑^ヲモ亦^ニ佳^{ナリ}。若^ク其^ノ滯^ニ積^ニ物^ヲ
 甚^ク多^クラズ。風^ノ氣^ヲ多^クシテ雷^ノ鳴^ル走^ル痛^{スル}ハ。先^ニ燒^ク酒^ヲ。或^ハ杜
 松^ノ酒^ヲ。苗^ノ香^ノ酒^ヲ。橙^ノ皮^ノ精^ヲ。野^ノ菊^ノ煎^ヲ等^ヲ與^テ其^ノ痛^ヲ和^シ。次
 ニ定^ニ痛^ニ利^ニ毒^ニ飲^ヲ與^テコレヲ下^セ。又^ハ凡^テ寒^ノ痛^ハ温^ニ
 湯^ヲ。或^ハ温^ニ石^ヲ用^テ腰^ノ腹^ヲ蒸^シ煖^テ良^シ。脚^ノ湯^モ亦^ニ佳^{ナリ}
 リ。○腐^ニ敗^ニ膽^ニ液^ヲ。腐^ニ敗^ニ脂^ニ膏^ヲ等^ヲヨリ来^ル熱^ノ痛^ハ。石^ノ梅^ノ接^レ骨^ヲ

飴^ノ酒^ヲ石^ノ皮^ノ散^ヲ等^ヲ或^ハ阿^ノ片^ノ醇^ヲ與^テコレヲ下^シ。若^ク嘔^レ吐^ス
 止^ムガタキハ。鎮^ニ嘔^ニ飲^ヲ。或^ハ定^ニ吐^ニ飲^ヲ兼^テ用^シ。或^ハ適^ニ宜^ニノ^ノ概^ニ
 導^ニ劑^ヲ阿^ノ片^ノ醇^ヲ加^テコレヲ施^シ。或^ハ腹^ノ部^ヲ温^ニ蒸^シ
 テ可^{ナリ}。腸^ノ胃^ヲ淨^ニ除^シテ痛^ヲ止^ムザル者^ハ。安^ニ睡^ニ止^ム痛^ノ
 諸^ノ劑^ヲ撰^ル用^シベシ。○擊^ニ急^ニ牽^ニ引^ヲヨリ来^ル者^ハ。及^ハ中^ノ寒^ノ傷^ノ冷^ノ
 冒^ニ濕^ニ等^ヲヨリ来^ル者^ハ。阿^ノ片^ノ醇^ヲ十^ニ三^ニ滴^ヲ桂^ノ露^ヲ一^ニ盃^ニ
 和^シ服^シテ良^シ。或^ハ接^レ花^ノ錦^ノ葵^ノ浸^ヲ。或^ハ野^ノ菊^ノ煎^ヲ等^ヲ與^テ兼^テ
 野^ノ菊^ノ煎^ヲ亞^ノ麻^ノ油^ヲ合^勻シテ概^ニ導^ニ方^トシ。或^ハ定^ニ痛^ニ利^ニ毒^ニ
 飲^ヲ與^テコレヲ下^シ。外^ノ苗^ノ香^ヲ以^テ薰^シタル毛^ノ布^ヲ
 ヲ用^テ。腹^ノ部^ヲ温^ニ包^スベシ。若^ク痛^尚休^ズンバ。二^ノ水^ノ雙^ヲ

精飲。或前ノ定痛緩睡ノ和調劑ヲ與フベシ。脾病。子宮
 病等ニ兼發シテ。若_レ嘔吐止_ムザル者ハ。大麥湯ヲ多_ク與_テ
 テ快吐ヲ得セシメ。而シテ後一二說所ノ方法ヲ施
 シ。痛稍和スル者ハ。阿魏丸。或麝香醇ヲ取_リ薄苛露ヲ
 用テ服セシムベシ。又足部寒濕ニ傷ル、ヨリ来_ル者
 ハ。故_ラニ脚湯法ヲ兼施スベシ。○熱毒浸淫。壞液病毒腎
 痛等ニ兼發スル者ハ。治本病上ニ在リ。稠血聚滯ヨ
 リ来_ル者。酒客。及少壯多血家ナラバ。先刺絡シ。尋_テ世
 消_ス末_ニ林_ニ度_ニ刺_ス蜜湯ヲ與_フベシ。老人涸血家ハ。寬痛滋
 養飲コレヲ主ル。頑固愈_ガタキハ。忽_チ弗_レ滿_シ鎮痛液コ

レヲ主ル。此藥ハ諸症頑固アノ疼痛皆コレヲ淨除シテ。而シテ後與_フス。但腸胃鬱滯物アラハコレヲ淨除シテ。熱アル者ニハ用_フベカラス。又外_ニ温湯。或藥湯ヲ用_テ
 腰腹ヲ温蒸スベシ甚良ナリ。又山萸菜精モ亦ヨク
 粘血寒疝ヲ治ス。○白脈衰弱腸痛ヲ發スル者ハ。龍
 腦散ヲ白湯ニテ送下シ。或_ハ幾那散_ヲ酒ニテ服シ。
 或_ハ朝夕ニ橙葉散_ヲ用_フモ亦良效アリ。○大便硬結
 ヨリ来_ル者ハ。軟化既導方ヲ施シ。牛香湯。或蜀葵加蜜
 鹽湯ヲ與_フ。和_ニ按腹シテコレヲ下導スベシ。若尚
 快通ヲ得ザル者ハ。蜜石旃那浸。或_ハ將玉散ヲ與_フベシ。
 愈後再硬ヲ豫防シテ是可ナリ。○金石毒腸痛ハ。先

蜀葵加蜜鹽湯。或。蜥蜴大黃散。茉莉酒石散。蜜石旃那
 浸。四味霸王飲等ヲ與ヘ。緩和瀉導方ヲ兼施スベシ。若
 效ナキ者ハ。麝香ヲ服セシメ。或。瀉導方ニ加シ施スベシ。
 良驗アリ。鹼鹽瀉導方。煙旃瀉導方。薰煙法等ヲ施スモ
 亦良ナリ。此等ノ方法ニテ便通軟可ナルトキハ。則
 復前ニ舉。緩和ナル劑ニ易テ久用スベシ。若劇痛止
 ガタキ者ハ。緩和調劑。芙蓉扁桃油等ヲ與ヘシ。若
 疝證ヲ兼見サバ。直ニ鹿角精。硃砂精等ヲ脊椎上ニ
 塗擦スベシ。都テ一切堅硬粘稠膨脹難化ノ食ヲ禁
 ス。諸證畧退テ治ヲ希望スベキハ。纈草飲加橙皮煉

腐敗膽液。腐壞脂膏。或腐敗停食。或腐壞酷厲諸液。或酷
 厲侵蝕毒物等也。若夫中暑中寒。情意急動。及肝脾叢胞。
 腸間膜等。造成不完者。亦為誘發其毒之因也。別有稱乾
 霍亂者。腸胃急痛。四肢厥冷等。同乎本病。而無吐下物。但
 泄風氣於上下。已其因。諸生風氣之事件。是可參考前諸
 篇矣。

腸胃諸病因。大抵同軌一轍ニシテ。但其毒ノ多少。其
 性ノ寬猛。其純雜ノ差異。加ニ各人稟賦ノ同カラザ
 ルヲ以レテ。而レテ後發レテ輕重諸證ヲ見ス。未。此
 病ノ如。急迫猛烈ナル者ハアラス。以テ其毒ノ猛烈

過多ナルヲ知ベシ。蓋此病其腸胃劇痛シテ而シテ吐下交来ヲ以テ徵候トス。然ドモ其因同カラザルコトアルガ故ニ。其證モ差等ナキコト能ハズ。仍テコレヲ別テ三證トス。曰、真。曰、類。曰、雜。是ナリ。真證ノ因ハ即腐敗膽液ナリ。膽液ノ物タル。烈苦熱性。以テ飲食ヲ尅化スルノ資トナル者ナリ。故ニ此液ヲ有スルノ過多重厚ナル者ハ、必強壯勇猛ニシテ。而シテ動スレハ輒熾盛熱ニ嬰モノナリ。夫然ガ故ニ此液若腐壞スルトキハ、必猛烈強暴ノ病ヲ發ス。此ニ至テハ則其

多少稀稠 蓋其腐壞セル所ノ膽液ガ靜脈ヨリ傳テ

血中ニ入レバ。則惡性腐敗熱ヲ發シ。若膽管ヨリ總管ニ傳テ腸胃ニ入レバ。則此病ヲ發スルナリ。蓋此兩道ニ交通スル者故ニ。何レヘ傳ルニモセヨ。其一方ヘモ亦多少浸淫セザルコトヲ得ズ。故ニ惡性熱ニハ必惡心ヲ兼子此病ニハ必此證ハ大率六七月ノ交。炎熱蒸發熱身痛ヲ兼ヌ。 此證ハ大率六七月ノ交。炎熱蒸暑ノ時ニ當テ。血門脈中ニ鬱滯腐敗スルコトアレバ。則腐敗セル膽液ヲ釀シ。以テ此病ノ原ヲナスナリ。若コレヲ救フノ速ナラザレバ。則必日ヲ出ズレテ死スルニ至ル。諸證ノ中。唯此證ヲ危險トス。類證ノ因ハ。即腐敗脂膏ナリ。是其膏梁美味ヲ貪リ。重滯腐敗スルニ係ル。其他生冷粘滑難化ノ食品ヲ食テ。重滯

腐敗スル者モ。亦同證ヲ發スルコトアリ。此二因ノ者ハ。其鬱滯スル所ノ者ヲ吐下シ盡セバ則愈。以テ真證ニ別所ナリ。第其中腐敗脂膏ニ因者ハ。則其證劇烈。殆ト真證ニ同ト雖モ。他ノ食滯ニ因者ハ。則稍輕シ。是亦類證中ノ區別ナリ。窠證ハ。右ノ諸目無シテ。而シテ腹痛吐下スル者ヲ謂フ。其因ハ他ノ諸ノ腐敗液。或酷厲膽液。此唯其性ノ過烈ナルノ者ニ指シテ。其質イマダ腐敗セザル者ナリ。此様ノ人ハ屢劇カラザル。或悍烈鹽液。或有毒ノ品腹痛吐下ヲ發スル者ナリ。或他病アリテ其毒ガ腸胃ニ浸滲シ。或近傍ヲ食者。或他病アリテ其毒ガ腸胃ニ浸滲シ。或近傍ノ諸藏造成惡キ等ヨリ。腹痛吐下ヲ將出シ来モノ是

ナリ。蓋真類二證ハ。其痛ヲ發スルコト。大率臍圍ニ起ル。襍證ハ必シモ然ラズ。而シテ其證モ亦自輕重差等アリ。又誘發ノ因。中暑ハ多。真證ヲ將出シ。中寒ハ多。類證ヲ將出シ。情意ノ急動ハ。大抵襍證ノ酷厲膽液ノ證ヲ將出シ。肝脾等ノ造成惡キ者ハ。時ニ随テ何ノ證ヲモ將出シ来モノナリ。若夫乾霍亂ノ因ハ。則諸ノ風氣ヲ生スル食物。烹釀沸溢スル飲液ヲ用ル等ヨリ来。前ノ諸篇ヲ通考シテコレヲ知ルベシ。又吐セント欲テ吐スルコトヲ得ズ。乾霍亂ニ似タル者アリ。誤認ベカラズ。說嘔吐篇ニ出。解剖家ノ說ニ數

回真證ニテ死タル者ヲ解觀セシニ。肝。脾。腎。腸間膜ノ造成惡。又結石。硬結。及潰瘍等アル者アリ。又總テ膽管甚廣闊弛引シ。胃腸ニ夥。膽液アリ。棄證ニハ胃及腸ニ酷厲惡臭ノ液アリテ。磨鐵ニ觸レバ忽黑色ヲナシ。且腸中ニ風氣充滿セル者アリト云

○治法。真證ハ。先、輕吐劑ヲ與ヘ。更ニ酪清大麥水雌雞羹或、雞羹ノ如キ稀液。或、苜蓿煉糖。莖莖菜。馬齒莧。芥用テ吐シ易カラシメ。且清緩瀉導方或、前ニ云稀液類ヲ用テ施。尋テ雙藿鹿黃和調劑。或、蒼虎接骨湯ヲ投シ。適宜ニ導泄スベシ。安ニ強吐下劑ヲ與テ元氣ヲ伐。或、熱

藥ヲ投シテ其毒ヲ資ベカラス。其吐下スル所ヲ察テ腐敗物既盡タルヲ知バ。則藿桂嬰煉和調劑ヲ與。或、石鹽清涼飲。酸瑰清涼飲等ニ阿片醇十滴許ヲ加。コレヲ與テ以テ鎮靜スベシ。或、麥餅煎。蜆蛤石。白堊。赤石脂等モ亦良。類證。腐敗脂膏ヨリ發スル者ハ。初、真證ト同ク救療スベシ。他ノ食滯ヨリ來ル者ハ。稍強吐下劑ヲ與ベシ。若其吐下物ニ酸氣アルハ。吐王散。吐下散ノ類ニ宜シ。又二證トモ緩和瀉導方ヲ兼用シ。腹部ヲ温蒸シテ良ナリ。吐下已テ後。適宜ノ健胃劑ニ阿片醇ヲ加テコレヲ與フ。○真類トモニ脈緩弱虛候アル者ハ。

桂露 = 阿片醇 十五滴ヨリニ至テコレヲ與ベシ。酒好
モ 四肢微冷スル者ハ。温湯ヲ用テコレヲ温ムベシ。
愈後久ク食養ヲ慎。阿片醇少ク、ヲ用。又幾那醇ヲ
飲シテ良ナリ。○雜證ハ。各其毒性ヲ診別シ。随宜
救療スベシ。乾霍亂ハ。破氣驅風劑合鎮痙劑ニ宜シ。
共ニ前後諸篇ヲ通考セバ。則其從所ヲ知シ。
諸藥劑
總テ泰西
方鑑ニ集載ス
採用スベシ

病因精義卷之八 終

孝和樓



貽安齋藏



文政十年丁亥三月

叢兌書肆

京都二條柳馬場西入

吉田屋治兵衛

