




# 刪補要方

自尙至卯

卷一

虛損 房極	氣 血	勞倦 飲食 傷	中 風 暑	傷 風 寒
陰虛 火乾	痰飲 癖	溼 燥 火	中 寒	時 疫

ヤ 9  
1163  
1



病門頌一百二十。漢張仲景先生藥方治論。其外至唐宋元明清。名醫之良方。研究而載之。凡而二千百餘方。

好生子著

# 刪補方要

全部五冊

安永四年夏五月校正發行

浪速書肆

星文堂  
定榮堂  
合刻



## 刪補方要序


韓子曰人皆寐則盲者不知皆  
默則喑者不知覺而使之視問  
而使之對則喑盲者窮矣今醫  
皆自言我能詳病論精藥性然

其書不出則喑盲者不知其書  
一出而后喑盲聰明判然分矣  
提要既出則其聰明著矣故病  
家亦使病者投喑盲者冀於其  
偶中不如依聰明者縱死之無

悔為我感此書之所為務而繫  
數言於卷端云

皆貞享三季季夏日

雒陽閔甫子



和解湯 是桂支湯ノ變方ニ又虛人ノ感冒初發ニ用ル  
 葉ナリ表氣薄キ者ニ見合ニ加減シテ四時可通用  
 勞後ノ感冒日ニ用テヨシ 此茶海内ニ弘マル古屋丹  
 水翁自制表ナリ  
 夫多輕症去之或以  
強沙參代之桂折各  
一匙餘眞七守粒五苓完七耳煖蒼蒼糖唐  
香者和永燒干  
七分  
 右姜朮水煎初感咳嗽加麻杏貝倍永桂常用矣  
 表去參苓

凡例

一 凡醫之執方雖不可專拘古方而不知其所  
 以立之所以用之則無以得臨時制宜之妙  
 故提掇古今之要方俾后學知所以規矩識  
 所以準繩云

一 凡立門者先外感內傷氣血痰鬱虛實寒熱  
 此百病之所因來也故明之足以貫通諸病  
 次內科雜病自頭至足從類分卷以便搜覽  
 次婦科只經候妊產詳之其餘症候悉於內

科取法次小兒脆質弱形異乎成人故頗詳諸症其缺者亦於內科取用以權輕重次外科聚總方於前分細例於後次雜科耳目口鼻之病繁故輯爲一卷以終其編

一凡言治者皆是名哲格言以拘韻括不許繁言且有補不足殺有餘而縱刪述者故不盡著其所採姓名也

一凡採方者本病有因有症如風寒暑溼燥火氣血痰食鬱滯虛損蟲積疝瘕則皆因也故

乃詳其症以繫方法如頭身喉膈心腹關竅有患則皆症也故亦明其因而錄藥劑矣

一凡諸方分量有太過不及甚不均齊今欲盡改正之非不才之所及故存舊而直記唯要用者之在斟酌故記所採之書名於方首以欲人之知之便於考時世醫方上也

一凡有雖古方採今方者如中寒門理中湯小建中湯則長沙先生之方也然其出霍亂篇出陽明篇而不言其治中寒故以正傳綱目

爲出處他皆倣之

一凡用生姜者聶氏異述云生姜二片爲引約重二錢依此說則一片之重六分六釐餘也然異述所用藥劑一服之重大抵七八錢也姜大抵一片唯發表之劑用三片宜依此折衷云

一凡用水者陶氏別錄云大畧二十兩藥用水一斗煮取四升爲准然利湯欲生少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁雷氏炮炙論

云凡方中云以水一鎰者每鎰秤之重十二兩爲度虞氏正傳云水一盞約計半斤之數也李氏綱目云陶氏所說乃古法也今之小湯劑每一兩用水二甌爲准

一凡用銖兩者李氏綱目云十釐曰分二分半曰字四分曰銖十分曰錢二錢半曰分去聲四分曰兩十六兩曰斤今古異制古之一兩今用一錢可也陳氏三因云漢唐所用每兩則古文六銖錢四个至宋廣秤以開元錢

每重

八  
銖十個為兩今之三兩得漢唐十兩又曰漢  
銅錢質如周錢文曰半兩重如其文則知漢  
以二半兩錢為兩重十銖明矣今漢方當用  
半兩錢二枚為一兩○案和劑等方用去聲  
分字與平聲分字混而難別故今悉改云二  
錢半只存平聲分字而已類經云權以量為  
率古一兩今六錢  
一凡用升合者李氏綱目云十撮為勺十勺為  
合十合為升十升為斗五斗曰斛二斛曰石  
古之一升即今之二合半也陳氏三因曰二

十四銖為合今以錢準則六銖錢四個也升  
斗斛皆壘而成數漢唐同用至宋紹興升容  
千二百銖則古文六銖錢二百個以紹興一  
升得漢五升類經云量以三為率古  
之一斛即今之三斗也  
一凡方云巴豆一枚者二分五釐餘也○附子  
烏頭一枚者半兩也○枳實一枚者一錢二  
分半也○棗一枚者三錢三分餘也○半夏  
一升者五兩也○蜀椒一升者三兩也○吳  
茱萸一升者五兩也○桂一尺者半兩也○

十斤一尺者二兩也。○云某州一束者三斤  
爲正云一把者二兩爲正。○蜜一斤者有  
合皆以已脩治者言之。此梁時所定而今市  
異制用者宜斟酌之  
一凡丸藥用蜜者陳氏蒙筌云每藥末一斤則  
用蜜十二兩文火煎鍊掠去

好生子小傳

埜氏謙亨字利誨號好生子又號三友齋其先  
和州人也從乃父居勢州龜山矣幼而不伍群  
兒常習文字好讀書乃八歲而始受孝經小學  
於叔父十歲而授大學於邑長皆能曉誦焉既  
而四書六經不資講習於師而自能通句讀粗  
知大義矣其聰慧也如斯十有五年之冬嬰恙  
久不起而缺定省於父乃憾世醫之淺功且  
色之橫於庸手因思爲子者不可以



誠哉是言也遂志於老醫因乃於  
氏回春則取讀之週歲而悉透徹焉治病稍  
効也叔父壽軒玄通子善醫在於東武寄書示  
曰必勿取雜駁之書宜宗於素問靈樞本艸劉  
張朱李之書以李氏醫學入門為歸約云爾以  
降日誦夜記恒砭砭躬年凡三春而漸通其義  
乃悟回春之行於世其謬論妄劑實多而雖入  
門亦不免其承誤傳疑焉且愠世之昏昏素靈  
本艸懵懵四診八要而唯便小徑之書以治人

病足焉者於是博涉於諸氏百家之書而訂其  
優劣撰其是非造次思救民病顛沛欲正醫謬  
乃閉戶不接俗子九易裘葛而辛螢苦雪銳管  
城利楮國編集為醫方提要約要弗畔矣誠是  
迷廣博縛捷徑者之雷震也且治病求其因  
辨其症以經為常以權為變輯為醫方經權  
二十卷又所著本朝方技傳三卷四診要訣二  
卷韞匱而未出於世云予交會已數載顧夫  
丁耆器局沉厚居家篤靜淡而好古嗜

崇信於虞夏殷周之道洞視乎瀛洛間

書且頡頏於典籍之林縱橫於綴述之場及

於本朝之羣書無不備歷覽之日乾夕惕勉

焉未已焉儒而醫也恣力於仁孝吁其天錫爾

類矣哉天錫爾類矣哉

時維

貞享丙寅之歲孟夏上浣之日蒙養軒黑遠德

謹書

目錄

卷之一外感部

感冒風寒

傷寒傷風

中寒

疫癘時行

卷之二

中風

暑

溼

燥

火

卷之三內傷部

卷傷

飲食傷

目錄

卷之四

氣

血

痰飲

鬱

虛損勞極

陰虛火動

卷之五總身科

發熱

惡寒

瘧疾

汗

斑痧

黃

寒熱

卷之六頭心科

頭痛

眩暈

瀉

癲狂譫妄

邪祟

暴厥卒倒

驚悸怔忡健忘

虛煩不寐

卷之七喉胸科

咳嗽

喘吼

飽逆

噎氣吞酸嘈雜

痞滿

嘔吐惡心

膈噎反胃

霍亂

消渴

卷之八心腹科

胸痺

心腹痛

腰痛

脇痛

疝氣

積聚

諸蟲

水腫

脹滿

卷之九前竅科

淋瀝

閉癢

關格

溺數

濁

溺血

遺溺

遺精

卷之十後竅科

泄瀉

痢

下血

秘結

脫肛

卷之十一四支部

麻痺木

痛風

脚氣

鶴膝風

痿躄

厥逆

瘞瘞

卷之十二婦人科

經候

經閉

崩漏

帶下

卷之十三

妊娠

產育

產後

乳汁

卷之十四小兒科

初生

撮口噤口臍風

胎驚夜啼

諸驚

痲痘客忤天釣內釣

龜胸龜背顛顛顛

五軟五硬

丹毒

卷之十五

外感

喘嗽

熱

吐瀉

痢

疴

諸積癖疾

腹脹痞結

腹痛

五藏調理

卷之十六

痘瘡

麻疹

卷之十七外科

瘡疽總方

卷之十八

大頭腫

癰癧

癭瘤結核

乳病

肺癰痿

腸癰

便毒

痔漏

卷之十九

疥癬

癩風

湯海瘡

疔瘡

折傷

破傷風

卷之二十雜科

面

眼

耳

鼻

口舌脣

牙齒

咽喉

目錄終

引用姓氏

長沙先生

華氏

唐孫氏

唐王氏

仲陽先生

朱氏

嚴氏

許氏

張機字仲景東漢長沙太守

著傷寒卒病論金匱要畧

陀字元化沛國樵人

著中藏經八卷

思邈字存心華原人

著千金方三十卷

壽外臺秘要四十卷

錢乙字仲陽宋錢廣人

著小兒方三卷

肱號無求子宋吳興人

著南陽活人書二十卷

用和濟生方

鶴溪陳氏

成氏

臨川陳氏

河間先生

金張氏

易水先生

東垣先生

海藏王氏

羅氏

言字無擇 宋青田鶴溪人

無傷寒論 宋聊攝人

自明字良甫 外科精要

劉完素字守真 金河間人 著傷寒直格二卷 宜明論二卷

從政字子金 考城人

張元素字潔古 金易州人

李杲字明之 鎮定人 著脾胃論辨惑論秘藏發明試效方

好古字進之 趙人 著此字難知 醫壘元戎十二卷

天益字謙甫 真定人

文江孫氏

平江葛氏

丹溪先生

齊氏

崑山王氏

劉氏

陶氏

熊氏

楊氏

允賢 著醫方集成五卷

乾孫字可久 藥神方一卷

朱震亨字彥脩 金華人 著格論局方發揮後人集心法纂

德之外科精義 醫令

履字安道 明崑山人

純字宗厚 關中人 著玉機微義 醫經小學六卷

華字尚文 餘杭人

宗立號道軒 建陽人

著醫書大全 恒齊長安人

孤竹王氏

盧氏

節齋王氏

虞氏

薛氏

趙氏

婁氏

茨山吳氏

徐氏

璽 諱韶

著醫林集要十卷

和字廉夫東陽人

著集丹溪纂要六卷

倫字汝言慈溪人

著明醫雜著五卷

搏字天民花溪人

著醫學正傳八卷

已字新甫號立齋吳郡人

著書十六種

繼宗 慈溪人

著儒醫精要

英字全善

著醫學綱目

球 著活人心統諸症辨疑

春甫字汝元號思鶴新安人

著古今醫統

著醫學入門九卷

時珍 號東壁

著本艸綱目五十二卷

南豐李氏

著醫學方考六卷

蓬溪吳氏

著醫方考六卷

金溪龔氏

著七部書

江西南金溪人

損菴王氏

肯堂 錢唐人

著證治準繩產寶百問

萬氏

全 羅田人

著保命歌括廣嗣紀要

崇川陳氏

實功 科正宗

著外科正宗

田氏

著銀海精微二卷

哀氏

著淵武夷人

著眼科全書五卷



新安孫氏

一奎 著赤水玄珠婦人全書

東井翁

玄朔 號延壽院

岡本氏

玄冷

古林氏

見宜 號正溫子 播州人

森氏

著醫家傳習錄

長澤氏

道壽 號柳菴 土州人

中山氏

著醫方口訣 號華陽軒

埜氏

謙亨 號三友齋 著醫方提要醫方經權二十卷 本胡方技傳

萬安散 治感冒

香蘇散 加半量

梗白芷

胡葛根

本善煎

消風散

治四時感冒

惡寒發熱

以痛重

赤廣假

藥黃各

姜末

和解湯

治全無惡

寒惡爪食

短少年三

刪補方要卷之一

感冒風寒

無汗 感寒無汗香蘇散冬月嚴令用十神

香蘇散

治四時瘟疫傷寒

香附

紫蘇

陳皮

甘艸

每三錢水一盞煎七分熱服 ○熊氏大全加姜

葱頭疼加芎芷 ○龔氏壽世發汗加麻黃蒼朮

咳嗽加杏仁桑皮 ○身痛加羌活烏藥 ○飽

悶加桔梗枳殼 ○有痰加半夏 ○嘔吐加藿香

口渴加葛根 ○夾食加山楂神麴

豐溪吳氏曰南方風氣柔弱傷于風寒俗稱感冒感冒者受邪膚淺之名也內經曰鬼下



此而以痛  
甚微汗明  
且却快  
參多枝各  
一兩餘脾玉  
名之赤乾名  
方之年少  
善

和解散  
治傷風鼻塞  
寒咳喉痛  
留帶痛發  
契口渴  
桂甜黃  
玉前粉  
葛粉圖  
桑姜老  
葱

感旨疎邪湯  
春其秋感冒  
非時小寒脈尺  
寸浮及冬時輕  
傷寒或老弱久  
病虛怯傷寒者  
及婦人產前後  
皆用之  
桔梗 羌活  
蘇葉 陳皮  
防風 黃芩  
胡蘆 細辛  
川芎 芍藥  
姜 棗

之地春氣常在故東南卑下之區感風之症  
居多所以令人頭痛發熱而無六經之症可  
未者所感人也由鼻而入實於上經不在六  
經故令頭痛發熱而正氣甘州之甘平所以和  
辛芬所以疏邪而正氣甘州之甘平所以和  
中而輔正爾

方局  
○十神湯 治時令不正瘟疫妄行此藥不問陰  
陽兩感或風寒濕痺皆可服之  
陳皮 麻黃 川芎 甘州 香附 紫蘇  
白芷 升麻 赤芍 兩 葛根 兩  
每三錢水一盞半姜五片煎七分熱服○發熱  
頭痛加葱白○中滿氣實加枳殼○傷寒不分  
表裡以此導引經絡不致變動  
豐溪吳氏曰此治外感風寒之奪劑也古人  
治風寒必分六經見症用藥然亦有只是發  
熱頭痛惡寒鼻塞而六經之症不甚顯者故  
亦總以疎表利氣之藥主之而芎藭麻升

有汗風邪侵衛分冲和八解要平勻  
芷蘇香陳皆辛香利氣之品故以解感冒  
氣塞之症乃赤芍者所以和陰氣於發汗之  
中而甘草者所以和陽氣於疏利之隊也○  
南豐李氏曰內乾葛專解陽明入陽明多發  
太陽傷寒發熱用之是引賊入陽明多發  
疹今世藥用誤哉○聖氏曰麻黃紫蘇發太  
陽傷寒乾葛升麻解陽明經病川芎白芷止  
頭痛陽陳及香附利氣甘草赤芍和榮衛此益  
痛鼻塞者宜用之

防風冲和湯 治傷風有汗脉浮緩  
防風 白木 生地 羌活 黃芩  
白芷 甘州 川芎 分五  
水煎溫服○李氏入門汗未止加黃芪芍藥  
芩調榮此以防風羌活解肌散風芎藭止頭痛也  
甘草和衛氣而止汗若時在冬月去地芩加  
炒芍藥柴胡半夏良

巨長一 或言 二

八解散 治感風多汗頭痛壯熱咳嗽喘乏嘔逆惡心飲食無味四肢疼倦

人參 陳皮 半夏 甘州 白木 茯苓 藿香 厚朴

每二錢水一盞姜三片棗一枚葱白三寸同煎七分溫服

中山氏曰虛症感外邪者雖香蘇散參蘇飲恐泄表氣若用補中益氣恐補住於是用之則外邪解散而正氣調和也○荃氏曰參苓補脾胃木甘保衛氣陳藿和氣半朴順痰胎胃盛則肌肉堅衛氣強則痰理密氣和則胎去痰順則病除此乃蒲坐君子之劑也

痰粘咳嗽參蘇飲肌熱芩蘇十味珍

快膈不傷脾兼治中脘痞滿嘔逆惡心

咳 痰粘

方 參蘇飲

治感冒發熱頭疼痰飲能解肌寬中

陳皮 枳殼 桔梗 甘州 木香 半夏 紫蘇 葛根 前胡 人參

茯苓 錢各七半

每四錢水一盞半姜七片棗一箇煎六分微熱服易簡方不用木香只十味○熊氏大全主咳嗽聲重滄唾稠粘或勞瘵潮熱往來並能治之

○李氏入門內因七情痰壅胸潮熱等症主之

○肺熱去參加芩木肺燥去陳半加瓜婁杏仁

荃氏曰紫蘇乾葛解散風邪半夏桔梗止咳嗽木香陳皮下逆氣前胡枳殼痰粘參苓甘草補肺氣乃肺虛而胃風咳嗽痰粘氣逆者宜之故吳山甫云勞倦感冒妊娠感冒主

全大 十味芩蘇散 治四時傷寒發熱頭痛

清肌羌活散  
專治傷寒客  
熱咳嗽痰喘  
和裏藥也  
和裏藥也  
和裏藥也

壯熱  
身疼

壯熱身疼宜敗毒氣愈吐利藿香正均

人參敗毒散

治傷寒時氣頭痛項強壯熱惡

寒身體煩疼及痰壅欬嗽聲重鼻窒嘔噦寒熱

人參 茯苓 甘州 前胡 川芎

羌活 獨活 桔梗 柴胡 枳殼

每二錢水一盞生姜薄荷各少許煎七分溫服

○龔氏醫鑒咳嗽加半夏○熱毒加芩連○風

藿香正氣散  
雪潭居治  
霍亂依本  
方去大腹  
皮白木加  
蒼朮赤茯苓

氣散  
吐利  
方局

熱加荊防○酒毒加葛根黃連○瘡毒加連翹  
金銀花○回春治四時瘟疫熱毒頭面腫痛痢  
疾發熱諸般瘡毒小兒驚風痘疹熱毒等症隨  
病加減用之

藿香正氣散 治傷寒頭疼憎寒壯熱上喘欬

嗽膈氣及胃心腹冷痛嘔惡氣瀉霍亂山嵐瘴  
瘴遍身虛腫等疾

大腹皮 茯苓 白芷 紫蘇 陳皮

桔梗 白木 厚朴 半夏 甘州

藿香 兩三

每二錢水一盞姜三片棗一枚煎七分熱服○

李氏入門曰寒入腸胃者霍亂轉筋洞泄下利

膈氣  
古今醫統所謂  
憂膈思喜  
怒悲  
憂  
也  
為五膈

五膈

成身

四

乾嘔吐逆主之

豐溪吳氏曰風寒客于皮毛理宜解表四時不正之氣由鼻而入不在表而在裏故不用大汗以解表但用芬香利氣之品足以正之氣木苓半其則甘平之品耳所以培養中氣而樹中營之職者也

人參養胃兼傷食勞倦補中益氣真

傷 狹內方局

人參養胃湯 治外感風寒內傷生冷憎寒壯

熱頭目昏疼肢體拘急兼治飲食傷脾發為咳

瘧或中脘虛寒嘔逆惡心或寒瘧寒疫山嵐瘴

氣四時瘟疫乃平和之劑溫中解表不致妄擾

厚朴 蒼朮 半夏 藿香 草果

茯苓 人參 陳皮 甘州

每四錢水一盞半姜七片烏梅一箇煎七分熱

服○有寒加附子名十味不換金散

世壽 補中益氣湯

惡風寒鼻流清涕寒禁噴嚏此脾肺氣虛不能

實滕理依本方加麥門冬五味子

挾溼頭蒙神木散暑兼香葛合方新

挾溼方局

神木散 治四時瘟疫頭痛項強發熱惡寒身

體痛及傷風鼻塞聲重咳嗽頭昏並治之

藁本 羌活 細辛 白芷 川芎

甘州 蒼朮

每三錢水一盞薑三片蔥白三寸煎七分溫服

挾暑門入 香葛湯

感冒挾暑者主之即香茹散合升麻葛根湯



桂枝湯  
治上衛以  
痛發熱  
汗之惡  
風者  
上衛上  
逆上二氣  
逆上七故  
及痛之  
發熱汗  
出上八壁  
傷寒傷  
凡者寒  
ケ毛有  
飛出

活蒼朮頭痛如槌加姜葱或加藁本蔓荊咳嗽  
加半夏桔梗喘加桑皮紫蘆子  
成氏曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛麻黃  
甘草開肌發汗桂枝杏仁散寒下氣許氏  
曰寒傷榮則寒邪入陰居脈中是以汗不出  
而熱以麻黃發其汗以桂枝助其發散○薑  
溪吳氏曰麻黃之形中空而虛麻黃之味辛  
溫而薄空則能通腠理辛則能散寒邪故令  
為君佐以桂枝取其解肌佐以杏仁取其利  
氣入甘草者亦辛甘發散謂也

有汗太陽風衛氣桂枝臘月解肌先

桂枝湯 太陽病頭痛發熱汗出惡風鼻鳴乾  
嘔者主之 ○太陽病外證未解脈浮弱者當以  
汗解宜之 ○傷寒不大便六七日頭痛有熱者  
與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當  
須發汗若頭痛者必衄宜之 ○陽明病脈遲汗

陽寒人命日  
大陽病下之  
後其氣上  
衝者可與  
桂支湯方  
居前方若  
不上衝者不  
可與之汗  
此湯逆者  
日當上汗  
止十レハ不用  
唯逆上計  
三反痛每  
不用其  
以若其  
二味皆  
逆上スハ  
逆上スハ

出多微惡寒者表未解也可汗宜之 ○太陰病  
脈浮者可發汗宜之

桂枝 兩三 芍藥 兩三 甘草 兩二 生姜 兩三  
大棗 枚十二

水七升煮取三升適寒溫服一升服已須臾飲  
熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許通身  
熱熱微似有汗者益佳不可令如水流漓若一  
服汗出病瘥停後服不必盡劑若不汗更服依  
前法 ○桂枝本為解肌若其人脈浮緊發熱汗  
不出者不可與也 ○若酒客病不可與之得湯  
則嘔以酒客不喜甘故也 ○喘家作桂枝湯加  
厚朴杏子佳 ○脈浮自汗出小便數心煩數

逆上スハ  
要卷一  
氣逆  
傷寒  
七

男子... 寒脚... 加黃芪... 胸中飽悶... 加枳桔... 陶氏加防風川芎羌活... 藁本姜棗節... 治法同... 汗多加白木防風汗不止

寒脚... 陶氏加防風川芎羌活... 藁本姜棗節... 治法同... 汗多加白木防風汗不止... 加黃芪... 胸中飽悶... 加枳桔... 成氏曰... 發散風邪... 內經曰... 風淫所勝... 辛甘之劑也... 所以... 甘以緩之... 酸以收之... 是內以桂枝為主... 芍藥為臣... 是陰經也... 榮氣使陰氣... 此湯桂味辛熱... 衛虛也... 又曰... 仲景治表虛... 製... 發散助陽... 體輕本乎天... 者親上... 故為君... 乃製... 小建中湯... 以芍藥為君... 桂枝為臣... 一則急痛... 乃製... 虛則傷寒... 論有當發汗... 凡數處皆用... 桂枝湯... 此乃調其營則衛自和... 風邪無所容... 遂自汗... 而解非桂枝... 能開腠理... 發汗... 其汗多則... 自止非桂枝... 能調和... 榮衛則邪從汗... 出而汗... 母故用桂枝... 同甘草外散風邪... 以救表內伐

難病... 桂枝湯... 治至支湯... 便不利... 是方... 是方每効

傷寒發汗已解... 半日許復煩... 脈浮數者... 可更發汗... 宜桂枝湯主之... 服桂枝湯... 大汗出... 脈洪大者... 與桂枝湯... 如前法... 服桂枝湯... 或下之... 仍頭項強痛... 翕翕發熱... 無汗... 心下滿... 微痛... 小便不利者... 桂枝湯去桂... 加茯苓白朮湯主之... 夫飲水... 頭痛... 不須攻表... 但宜逐飲... 飲盡則病

易長



汗多者 迫者 與桂枝湯 便厥咽中乾 煩燥吐逆者 作甘艸乾

姜湯與之以復其陽 若厥愈足溫者 更作芍藥 甘艸湯與之 其脚即伸 ○發汗後 身疼痛 脉沉

而心下痞 或心下痞者 桂枝加芍藥 生薑各一兩 人參二兩 新加 此方心下痞 痞者 用之 湯主之

乾嘔 下痞 乾嘔者 用之 湯主之 下痞 乾嘔者 用之 湯主之 下痞 乾嘔者 用之 湯主之

桂枝甘草湯主之 成氏曰 此胸中之陽氣不足 桂枝之辛走肺 而益氣 甘艸之甘入脾而緩中

發汗後 其人臍下悸者 欲作奔豚 茯苓桂枝甘 艸大棗湯主之

成氏曰 此心氣虛而腎氣發動也 茯苓以代 腎氣 桂枝能泄奔豚 甘棗之甘滋助脾土 以 平腎氣 煎用甘爛水 者取不助腎氣也

湯主之 成氏曰 此榮衛俱虛也 芍藥之酸收斂津液 而益榮 附子之辛溫固陽氣 而補衛 甘草之 辛溫固陽氣 而補衛 甘草之

太陽病 下後 其氣上衝者 可與桂枝湯 方若不 上衝者 不可與之 ○太陽病 先發汗 不解而復

下之 脉浮者 不愈 宜桂枝湯主之 ○太陽病 下 之 微喘者 表未解故也 桂枝加厚朴杏仁湯主

之微喘者 表未解故也 桂枝加厚朴杏仁湯主 之微喘者 表未解故也 桂枝加厚朴杏仁湯主

汗多者 迫者 與桂枝湯 便厥咽中乾 煩燥吐逆者 作甘艸乾

姜湯與之以復其陽 若厥愈足溫者 更作芍藥 甘艸湯與之 其脚即伸 ○發汗後 身疼痛 脉沉

而心下痞 或心下痞者 桂枝加芍藥 生薑各一兩 人參二兩 新加 此方心下痞 痞者 用之 湯主之

乾嘔 下痞 乾嘔者 用之 湯主之 下痞 乾嘔者 用之 湯主之 下痞 乾嘔者 用之 湯主之

桂枝甘草湯主之 成氏曰 此胸中之陽氣不足 桂枝之辛走肺 而益氣 甘艸之甘入脾而緩中

發汗後 其人臍下悸者 欲作奔豚 茯苓桂枝甘 艸大棗湯主之

成氏曰 此心氣虛而腎氣發動也 茯苓以代 腎氣 桂枝能泄奔豚 甘棗之甘滋助脾土 以 平腎氣 煎用甘爛水 者取不助腎氣也

心下痛... 傷寒若吐若下後心下逆滿氣

○傷寒若吐若下後心下逆滿氣... 則頭眩脈沉緊發汗則動經身為振振者... 桂枝湯主之... 芍藥湯主之... 傷寒脈浮醫以火迫劫之... 太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四支

微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之

成氏曰此陽氣益虛故加附子以溫經復陽

春秋夏月從輕劑羌活冲和易水傳

九味羌活湯易水先生方經曰有汗不得服麻

黃無汗不得服桂枝若差服則其變不可勝數

立此方使不犯三陽禁忌解利神方

羌活 治太陽肢節痛... 防風 治一身盡痛... 蒼朮 治風濕下氣

細辛 治足火陰... 川芎 治腦陰頭痛

白芷 治陽明頭痛

痛在額 痛在腦 痛在頭

痛在額 痛在腦 痛在頭

文加芍藥大黃湯... 治支支加芍藥湯... 而有停滯者... 時二拘挛急者... 芍藥湯... 大便秘... 者三... 治支支加芍藥湯... 而有停滯者... 時二拘挛急者... 芍藥湯... 大便秘... 者三...

痛在額 痛在腦 痛在頭

加桂枝湯以目的氣必脈引以心ヲ衝之後改醫

衛生地 治以內心 熱在內

黃芩 治太陰肺 熱在胸

陶氏瓊言用羌蒼各一錢半防芩芍芷地草各

一錢細辛五分名羌活冲和湯不問四時但有

頭痛骨節疼發熱惡寒無汗脈浮緊者宜用此

湯以代麻黃為穩當如惡風自汗脈浮緩者宜

用防風冲和湯即羌活冲和湯中去蒼辛加白

朮防風是也○李氏入門曰此方發春夏秋三

時表症代桂枝麻黃青龍各半四方并治四時

感冒疫癘晚發等症○有痰去地加半夏○肌

熱加柴胡葛根○惡風自汗加桂枝夏去桂加

至支加附子湯 治本方症而西寒 或支節微痛者 至支湯ノ症ニテ寒ケテ 痛ニ用至支湯症 元ヨリ自汗出トイフ 惟ニミク出ナリトイフ 用ユクニ惡寒 芍藥

入疝症備身 体強脈却泥 導

本方加瓜萎 根啜粥微汗 之

海藏治柔 產前方加 川芎防風

勞力傷寒尤勿發調營養衛節菴全

調營養衛湯 治勞力內傷氣血外感風寒頭

疼身熱惡寒微渴自汗身體酸軟無力

即益氣湯去升加生地川芎細辛羌活防風

姜棗葱水煎溫服○元氣不足者加升麻少許

以升之○汗不止去莘加芍○丹溪先生曰傷

寒挾內傷者十居八九經云邪之所發其氣必

薑溪吳氏曰藥之為性辛者得天地之金氣 於人則為義故能匡正而黜邪羌防蒼辛芍 芷皆辛物也分經而主治而防風者又諸藥 之卒徒也用生地所以去血中之熱而甘草 者又所以和諸藥而除氣中之熱也○南豐 李氏曰三時暄熱傷寒則不敢用冬月麻黃 而發表故代以羌活蒼朮傷風則不敢用冬 月桂枝而實表故代以防風白朮芍芷辛發 表以代杏仁地黃救而以代 芍藥加黃芩以順天時也

要卷一 勞力

虛補中益氣湯從六經所見之證加減用之氣  
虛甚者以加附子以行參芪之氣○盧氏曰如  
見太陽症加羌活藁本桂枝陽明加葛芷升麻  
少陽加芍苓半夏太陰加枳實厚朴以陰加甘  
艸苦萸厥陰加川芎

陽明經病升麻葛根湯

考方○升麻葛根湯

傷寒目痛鼻乾不眠無汗惡寒發熱者陽明經  
症也主之○埜氏曰頭額痛加白芷身疼加蒼  
朮胸膈痞滿加桔梗枳殼咳嗽加杏仁有痰加  
半夏表熱倍葛根

豐溪吳氏曰藥之為性辛者可便達表輕者可便去實升葛辛輕者也故用之達表而去

大渴引飲實寒邪之傷人也氣血為之壅滯佐以芍藥  
口乾舌燥用和血也佐以甘草用調氣也○易水先生  
下欲飲水數升若大陽初病未入陽明而頭痛者不可便  
水好之升麻葛根發之是反引邪氣入陽明為引  
三升之

書○柴葛解肌湯 治症如前

葛根 芍藥 甘草 芫胡 黃芩

羌活 石膏 白芷 桔梗

薑水煎服本經無汗惡寒去苓加麻黃夏秋換

蘼葉

仲景○白虎湯 服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈

洪大者白虎加人參湯主之○傷寒無大熱口  
燥渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯主之○  
傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不可與白虎

此本方証心下痞  
 乾口苦燥水  
 飲下欲吐胸  
 苦痞按之鞭  
 者二用  
 保命大白木湯  
 和解四時傷寒  
 混解六經不犯  
 禁惡  
 伽膏略三芸  
 羌芎略一井  
 知母  
 正兩細三秋

湯渴欲飲水無表症者白虎加人參湯主之  
 傷寒脈滑而厥者裏有熱也白虎湯主之  
 陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫  
 語遺尿發汗則譫語下之則額上生汗手足逆  
 冷若自汗出者白虎湯主之  
 知母 六兩 石膏 一斤 甘草 二兩  
 粳米 六合 人參 三兩  
 水一斗煮米熟湯成去滓溫服  
 ○傷寒若吐若  
 下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡  
 風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加  
 人參湯主之  
 ○陽明病下後若渴欲飲水口乾  
 舌燥者白虎加人參湯主之  
 ○朱氏活人溼溫

和調  
 石食積委傷寒  
 有表症氣口緊  
 盛但身不痛也  
 平胃散加木薑  
 洞菓連乾陶氏方  
 磨木香服姜  
 柴胡百合湯  
 百合病者非寒  
 非熱欲食不食  
 欲行不行欲坐  
 不坐服藥則吐  
 小便赤如血云  
 之百合病  
 柴胡黃連人參  
 母百合生地黃  
 手

症熱不退而大便溏加蒼朮  
 ○局方曰治夏月  
 中暑毒汗出惡寒身熱而渴此藥立夏後立秋  
 前可服春月及立秋後並凶血家並不可服  
 ○王氏難知曰陽明傳入少陰白虎加桂湯主之  
 ○老幼及虛人傷寒五六日昏冒譫語或小便  
 淋或澀起臥無度或煩而不眠者白虎加梔子  
 湯主之  
 ○虞氏正傳曰陽明症下後大便不硬  
 熱不退者加蒼朮  
 ○龔氏醫鑒曰無汗脈浮表  
 不解而陰氣盛雖渴不可用白虎湯汗後脈洪  
 而渴裏有熱乃可用  
 成氏曰熱淫所勝佐以苦甘母膏之苦甘以  
 散熱熱者傷氣甘以緩之草米之甘以益氣  
 ○又曰自虎西方金神也應秋而歸中熱甚  
 于內者以寒下之熱甚于外者以涼解其

五卷一  
 傷寒

宋明飲  
治半表半裏  
蒿竹多條朽  
略軍枯會各  
兩加梅毒并水  
煎

有中外俱熱內不得泄外不得發非是湯則  
不能解暑腸之氣得秋而止故曰處暑是湯  
以白虎名謂能止熱也○東垣先生曰身受  
前胃之經也胸胃肺之室也邪在陽明肺受  
火制故用辛寒以清肺所以為白虎也○  
豐溪吳氏曰石膏大寒清胃知母味厚生津  
大寒之性行恐傷胃  
氣故用草米以養胃  
書○如神白虎湯 治陽明身熱渴而有汗不解或  
經汗過渴不解者脉微洪即前方加入參麥冬  
五味山梔薑棗竹葉

少陽半表小柴和解劑

景仲○小柴胡湯 本太陽病不解轉入少陽者脇下  
鞭滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脉沉緊  
者與之○傷寒中風五六日往來寒熱胸脇苦  
滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔

小柴胡  
苦瀟或寒熱往來  
或嘔者  
曾服苦瀟目的  
人寒熱往來毛  
皆好見トス  
滿十ヶハ方効  
毛ノ  
活人云灸後燒針  
後症与火邪狂  
者同小柴胡湯加  
龜骨斷治之  
灸汗後不解作  
躁乍靜直視口  
燥與熱往來脈  
絳者阳成風症  
因本方加防風  
沫胡防風湯

加腹脹或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不  
利或不渴身有微熱或欬者主之○傷寒四五  
日身熱惡風頸強脇下滿手足溫而渴者主之  
○傷寒中風有柴胡症但見一證便是不必悉  
具○傷寒差後更發熱者主之○婦人中風寒  
熱發作有時經水適斷者此為熱入血室主之  
○傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿  
口不欲食大便鞭脉細者此為半在表半在裏  
可與之○陽明病發潮熱大便溏小便自可胸  
脇滿不去者主之○陽明病脇滿不大便而嘔  
舌上胎滑者與之○陽明病脉弦浮大而短氣  
腹滿脇下及心痛又按之氣不通鼻乾不得汗

柴胡加芒硝湯  
治小柴胡湯症  
主支湯症相合者  
名取苦瀉之  
逆頭痛

柴胡加芒硝湯  
即小柴胡湯  
苦瀉解  
用二升

當歸飲子  
治傷寒病後  
餘熱不退或  
日哺潮熱等  
症  
飯芍柴銅  
芍加耳畫  
疎姜灯心  
煩加竹葉  
門冬  
和解散  
治四時傷寒  
發汗後經中  
餘熱不解  
蒿枯  
前菝玉  
芍腹營  
葛芍  
分耳少

嗜臥一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦  
耳前後腫刺之以差外不解病過十日脈續浮  
者與之○厥陰病嘔而發熱者主之  
柴胡 半斤 黃芩 三兩 人參 三兩 甘草 三兩  
半夏 半斤 生薑 三兩 大棗 十三枚

○胸中煩而不嘔去半參加括蕞實一枚○渴  
者去芍加芍藥三兩○腸下痞鞭去棗加牡蠣  
四兩○心下悸小便不利者去芍加茯苓四兩  
○不渴外有微熱者去參加桂三兩○欬者去  
參薑棗加五味子半升乾薑二兩

○凡柴胡湯病証而下之若柴胡症不罷者復  
與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解○得  
病六七日脈遲浮弱惡風寒手足溫醫二三下  
之不能食而脇下滿痛面目及身黃頸項強小  
便難者與柴胡湯後必下重本渴而飲水嘔者  
柴胡湯不中與也○傷寒六七日發熱微惡寒  
支節煩疼微嘔心下支結外症未去者柴胡加  
桂枝湯主之○傷寒十三日不解胸脇滿而嘔  
日晡所發潮熱已而微利此本柴胡症下之而  
不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也  
潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡  
加芒硝湯主之○傷寒八九日下之胸滿煩驚

類藥加麥  
石寒、實結、胃、魚  
痛、急、煩、躁、木、症  
理、中、湯、加、潤、腹

小便不利，譫語，一身盡重，不轉側者，柴胡加龍骨牡蠣湯主之。○丹溪活套曰：若兼腹滿自利，已見太陰證，而少陽証尤未除者，本方中加五苓散，名柴苓湯。○龔氏醫鑒曰：嘔加陳皮、竹茹、薑汁。○脇痛加青皮。○飽悶加枳桔。○本經與陽明經合病，加葛芍。○熱入血室，男加生地，女加當歸、紅花。○壞症加鼈甲。○內熱甚，錯語心煩，不得眠，合黃連解毒湯。○內熱甚，惡熱煩渴，飲水者，合白虎湯。○血虛發熱，夜甚，加四物湯。○活人書曰：若過經無表症，又無裏症，小柴胡湯隨症加減用之。○陶氏曰：凡治傷寒尺脈弱而無力者，切忌汗下，寸脈弱而無力者，切忌發

柴胡桂姜湯  
治小柴胡湯症而  
不吐不瀉，上衝而渴  
胸中痞者  
會服苦酒下金魚  
其苦痛入心，口乾舌燥，唯  
逆上，口乾舌燥，唯  
動悸，凡者，三月

吐俱宜，小柴胡和之。○凡傷寒汗下後不可便

用參芪太補宜，用小柴胡加減和之。  
成氏曰：熱淫于內，以苦發之，此芩之苦以發  
傳邪之熱，裏不足者，以甘緩之，參草之甘以  
緩中，和之熱氣，邪半入裏，則裏氣逆，辛以散之  
半夏以除煩，嘔邪半在表，則榮衛爭之，辛甘  
解之，薑棗以和榮衛。○王氏難知曰：此以陽  
散太陽之陽明，參太陰，草太陰，薑棗辛甘，陽  
以平木，吳氏曰：柴胡辛溫，辛者，金之味，故用之  
傷人，常乘其虛，用參草者，欲中氣不虛邪  
入裏，取

仲景  
柴胡桂枝乾薑湯 傷寒五六日已發汗而復  
下之，胸脇滿微結，小便不利，渴而不嘔，但頭汗  
出，往來寒熱，心煩者，此為未解也，主之  
柴胡 半斤 桂枝 三兩 乾薑 三兩 栝婁根 四兩



六柴胡湯  
治小柴胡湯而心  
下痞鞭腹滿拘  
亦或吐者  
皆服苦酒  
皆服苦酒  
皆服苦酒  
皆服苦酒

黃芩 三兩 牡蠣 三兩 甘草 二兩  
水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服  
成氏曰內經云熱淫於內以苦發之柴芩之  
苦以解表之邪邪以辛散之牡蠣之辛以  
以散表之邪邪以真之牡蠣之辛以固陽  
之滿辛以潤之乾薑之辛以固陽虛之汗津  
液不足而為渴以生津液

陽明帶表太柴瘥  
仲景○大柴胡湯 傷寒熱結在裏復往來寒熱者與  
之○傷寒發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐而下  
利者主之

柴胡 半斤 黃芩 三兩 芍藥 三兩 半夏 半斤  
生薑 五兩 枳實 四枚 大棗 十二枚 大黃 二兩  
水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服○太陽

病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡在  
仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微  
煩者為未解也與大柴胡湯下之則愈○朱氏  
活人曰若過經無表裏症但大便鞭者用太柴  
胡下之○局方曰若身體疼痛是表症未解也  
不可服之○陶氏曰大柴胡湯則有表邪尚未  
除而裏症又急不得不下只得此湯通表裏而  
緩治之猶有老弱及血氣兩虛之人不宜用此  
成氏曰柴芩之苦入心而折熱枳芍之酸苦  
湧泄而扶陰辛者散也半夏之辛以散逆氣  
辛甘和也薑棗之辛甘以和營衛又曰方有  
緩急輕重當臨時斟酌如大滿大實堅有  
燥尿者非重劑則不能惟邪熱甚而攻下者  
之喉承氣湯之至大堅滿惟輕緩之劑乃大柴  
胡湯用以逐邪熱也○海藏王氏曰表裏俱

傷寒 十七

調胃承氣湯  
治秘閉急迫者  
大便通中塊  
甚持若三三  
甚者用三三

裏症

傳經裏實三陰症承氣三方察滿堅  
景仲 調胃承氣湯 太陽病三日發汗不解蒸蒸發

熱者屬胃也主之。○傷寒吐後腹脹滿者與之  
○陽明病不吐不下心煩者可與之。○傷寒不  
大便六七日頭痛有熱者與之其小便清者知  
不在裏仍在表也。○發汗後惡寒者虛故也不  
惡寒但熱者實也當和胃氣與之

大黃 四兩 甘州 二兩 芒硝 半劬

水三升煮取一升去滓入芒硝更上火微煮令  
沸溫服。○傷寒十三日不解過經譫語者以有  
熱也當以湯下之若小便利者大便當鞭而反  
下利脉調和者知醫以丸藥下之非其治也若  
自利者脉當微厥今反和者此為內實也主之  
○太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中  
痛大便反澹復微滿鬱鬱微煩先此時自極吐

下者與之若不爾者不可與  
成氏曰內經云熱淫於內治以鹹寒佐以苦  
甘平助二物推陳而後緩中○海藏王氏曰調  
胃承氣湯而失氣實而不滿者腹狀如仰瓦  
陶氏曰邪在中焦則有燥實堅三症故用調  
胃承氣湯以甘草和之焦虛無氤氳之輕清之  
不用枳朴者以傷上焦虛無氤氳之輕清之

小承氣湯  
治腹滿大便鞭者  
腹脹りて大便秘景  
結之又大便通ス  
凡カク者用腹  
脹り有目的  
用之

元氣調胃之  
名於此立

小承氣湯

陽明病腹大滿不通者可與之微

和胃氣○陽明病不大便六七日恐有燥屎欲

知之法以與之湯入腹中轉失氣者此有燥屎

乃可攻之○陽明病多汗胃中燥大便鞭謔語

者主之○陽明病謔語發潮熱脉滑而疾者主

之○下利謔語者有燥屎也宜之

大黃 四兩 厚朴 二兩 枳實 三枚

水四升煮取一升二合溫服

成氏曰大熱結實者與大承氣湯小熱微結者與小承氣湯以熱不大甚故於大承氣湯去芒硝又以承氣湯至堅故亦減枳實也○海藏王氏曰小承氣湯治實而微滿心下痞大便或通熱甚可下者宜此○丹溪先生曰大黃之寒其性善走佐以厚朴之溫善行帶氣

大承氣湯  
治腹堅滿者下利  
臭穢若燥屎  
腹脹堅滿而大便  
不通又臭穢物  
下之又燥屎者  
二用之燥屎入膈下  
ヲ按シテ堅クシテ  
シタル物手ニサワリ  
血塊ナトノ手サワリ  
トハ各別ノ違イニ

大承氣湯

陽明病汗出不惡寒身重短氣腹

滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇

然而汗出者此大便已鞭也主之若汗多微發

熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯

○傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏症

大便難身微熱者此為實也急下之○病人小

便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥

者有燥屎也宜之○陽明病謔語有潮熱反不

能食者胃中必有燥屎也宜之○少陰病自利

要卷一 傷寒 十九

清水色純青心下必痛口乾燥者急下之○**火陰病**六七日腹脹不大便者急下之○**下利脈反滑當有所去下之乃愈**

大黃 四兩 厚朴 半斤 枳實 五枚 苡硝 三合

水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取二升去滓內苡硝更上火微一兩沸溫服得下則已○**大下後**六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也宜之○**傷寒吐下後**不解不大便五六日上至十餘日晡潮熱不惡寒獨語如見鬼狀劇者不識人循衣摸狀者主之○**陽明病下之**心中懊憹而煩胃中有燥屎者可攻○**朱氏活人**曰手足逆冷大便秘小便赤脈沉而

麻子仁丸  
治平日大便結者  
平常持病三天  
便秘結之苦  
用二

滑者陽症似陰也輕者白虎湯重者承氣湯傷寒失下血氣不通令四支逆冷此是伏熱痰故厥亦浚速以大承氣湯加臑粉下之

成氏曰內經云燥淫所勝以苦下之黃枳之苦以潤燥除熱又云燥淫於內治以苦溫厚朴之苦下以結燥又云熱淫所勝治以酸寒芒硝之鹹以攻蘊熱○海藏王氏曰厚朴去痞積實泄滿苦硝軟堅大黃泄實必痞滿燥實堅四症全者方可用之○南豐李氏曰見其病之大熱大滿太實者宜之

仲景麻子仁丸 跌陽脈浮而濇浮則胃氣強濇則

小使數浮濇相搏大便則難其脾為約主之

麻子仁 二升 芍藥 半升 大黃 一升 厚朴 一斤

枳實 半斤 杏仁 一斤

為末煉蜜為丸桐子大飲服十九以和為度

要卷一 傷寒 十九

成氏曰內經云脾欲緩急食甘以緩之麻杏  
之甘緩脾而潤燥津液不足以酸收之芍藥  
之酸以收津液腸燥胃強以苦泄之  
枳實大黃之苦下燥結而泄胃強也

六乙順氣湯 治傷寒熱邪傳裏大便結實口

燥咽乾怕熱譫語揭衣狂妄揚手擲足斑黃陽  
厥潮熱自汗胸腹滿硬遠臍疼痛等症是以代  
大小調胃三乙太柴太陷等湯之神方也

大黃 枳實 厚朴 苡硝

柴胡 黃芩 芍藥 甘州

煎法同大承氣湯臨熟入鐵秀水三匙調服立  
效取鐵性沉重最能墜熱開結故也

仲景○蜜煎導法 陽明病自汗出若發汗小便自利  
者此為津液內竭雖硬不可攻之宜導之

蜜七合內銅器中微火煎之稍凝似飴狀  
之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如  
指長二寸許當熱時急作冷則硬以內穀道中  
以手急抱欲大便時乃去之○龔氏醫鑒曰加  
皂莢末少許更妙

仲景○厚朴生姜甘州人參半夏湯 發汗後腹脹滿

者主之○成氏曰發汗後邪氣已散也腹脹知  
非裏實由脾胃津液不足氣滯不通壅而為滿  
內經云脾欲緩急食甘以緩之用苦泄之厚朴  
之苦以泄腹滿參州之甘以益脾胃薑夏之辛  
以散滯氣

吐劑豉枳瓜蒂末

梔子豉湯  
治心中懊懣者  
曾中煩熱  
持苦  
者三用  
梔子耳草豉湯  
治本方症而急  
迫者  
梔子豉湯  
氣息  
大心二月

仲景○梔子豉湯 發汗吐下後 虛煩不得眠劇者必

反戾顛倒心中懊懣主之○發汗若下之而煩  
熱胸中空者主之○五六日大下後身熱不去  
心中結痛者主之○陽明病脈浮而緊咽燥口  
苦若下之胃中空虛客氣動膈心中懊懣舌胎  
者主之○陽明病下之其外有熱手足溫不結  
胸心中懊懣饑不欲食但頭汗出者主之○下  
利後更煩按之心下濡者為虛煩宜之

梔子 十四枚 香豉 四合

水四升先煮梔得二升半內豉煮取一升半溫  
服得吐而止○凡用梔子豉湯病人舊微溇者  
不可與○若氣少者梔子甘州豉湯主之○其

嘔者梔子生薑豉湯主之○下後心煩腹滿臥

起不安者梔子厚朴枳實湯主之○醫以丸藥

大下身熱不去微煩者梔子乾薑湯主之○王

氏難知曰若有宿食而煩躁梔子太黃湯主之  
成氏曰酸苦湧泄為陰若以湧此寒以勝熱  
梔豉相合吐劑宜矣又曰吐症亦自不同如  
不經汗下邪氣蘊鬱于膈則謂之實也應以  
瓜蒂散吐胃中之實邪也若發汗吐下後邪  
氣乘虛留于胃中則謂之虛煩應以梔子湯  
吐之此吐胃中虛煩也○海藏王氏曰煩者  
氣也躁者血也氣主肺血主腎  
梔以治肺煩豉以治於腎燥

瓜蒂散 病如桂枝症頭不痛項不強寸脈微

浮胸中痞鞭氣上冲咽喉不得息者此為胸有  
寒也當吐之○病人手足厥冷脈乍緊者邪結  
在胸中心中滿而煩飢不能食者病在胸中當

要卷一  
傷寒

吐之○少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不吐始得之手足寒脉弦遲者此胸中實當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也○病胸上諸實胸中鬱鬱而痛不能食欲使入按之而反有涎唾下利且十餘行其脉反遲寸口脉微滑此可吐之

瓜蒂一分

赤小豆一分

各為散一錢匕以香豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與

成氏曰其高者越之越以瓜豉之苦在上者湧以赤豆之酸內經云酸苦湧泄為陰○吳氏方考曰傷寒胸中多痰而頭痛者此方吐之

滲方猪苓五苓研

○猪苓湯 陽明病下後若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者主之○少陰病下利六七日欬嘔渴心煩不得眠者主之

猪苓 茯苓 甘膠 滑石 澤瀉 各一兩

水四升先煮四味取二升去滓內下阿膠烱消溫服○陽明病汗出多而渴者不可與之

成氏曰甘甚而反淡淡味滲泄為陽猪茯苓之甘以行小便鹹味湧泄為陰澤瀉之鹹以泄伏水滑利穀阿膠滑右之滑以利水道○薑溪吳氏曰四物滲利則又有下多亡陰之懼故用阿膠佐之以存津液於決瀆爾

○五苓散 太陽病發汗後大汗出胃中燥煩躁不得眠若脉浮小便不利微熱消渴者與之○

猪苓湯 治小便不利若淋瀝若渴欲飲水者小便通之兼又小便便之陰莖中痛血或膿上出也目的トスヘ小便洗リ渴シテ欲飲水計ハ五苓散主テトスヘシ

要卷一

傷寒

二十三

中風發熱六七日不解而煩有表裏症渴欲飲水水入則吐者名曰水逆主之。○本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者主之。○病在陽應以汗解反以冷水喫之其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與之。

猪苓

十八銖

澤瀉

一兩六銖半

茯苓

十八銖

桂

兩半

白朮

十八銖

為末以白飲和服方寸匕凡三服多飲暖水汗出愈。○虞氏正傳曰或加薑棗水煎服。○朱氏活人曰脈浮而大為表煩渴尿赤為裏五苓散主之。○王氏難知曰五苓散乃太陽裏之下藥

大青龍湯治喘及咳或欲飲水上衝或身疼惡風者金匱曰渴而欲飲者當發其汗大青龍湯主之。所謂病狀皆飲家二屬者。渴而上煩燥。上目。小青龍湯。兩傷。目的。大青龍。目的。

也太陽高則汗而發之下則引而竭之渴者邪入太陽本也當下之使從膀胱出也。○中山氏曰有太陽症小便如常口不渴者邪在經也宜汗而發之有太陽症小便不利口渴者邪入本也當溲而竭之。

成氏曰猪苓水苓之甘淡潤虛燥而利津液澤瀉之鹹以泄伏水桂枝之辛以和肌表。○豐溪吳氏曰桂性辛熱辛熱則能化氣經曰膀胱者州都之官津液藏之氣化則能出矣此用桂之意也。

兩傷煩躁青龍大輕者桂麻各半方

○大青龍湯 太陽中風脈浮發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者主之。○傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰症者發之。



勞力感寒 陶華  
曰勞力內傷元氣  
外感風寒 頭疼  
身熱惡寒 微渴  
自行身熱 酸軟  
血力如元氣不足  
者升麻升之喘  
嗽加杏仁則依補  
中益氣湯去升  
麻加生川芎細  
辛羌活防風名  
調榮養食衛湯

要卷一

三四

麻黃 六兩 桂枝 二兩 甘州 二兩 杏仁 四十箇  
生薑 三兩 大棗 十二枚 石膏 如雞子大  
水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取  
三升溫服取微似汗汗出多者溫粉撲之一服  
汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠  
也○若脈微弱汗出惡風者不可服  
豐溪吳氏曰此症傷寒見風傷風見寒故二  
方併而用之風寒外盛則陽氣鬱為內熱此  
石膏之所謂加也名曰大  
青龍其發表之尤者乎  
仲景○桂枝麻黃各半湯 太陽病八九日如瘧狀熱  
多寒少面有熱色身必痒者主之○許氏本事  
方曰青龍一症尤難止用此治之蓋慎之也○  
陶氏曰青龍湯非風寒俱盛又加煩躁不可與

王機曰  
治虛損潮熱  
身體倦怠  
道遙散合小柴  
胡湯加葛根  
人參柴胡散  
前方去苓

之今改羌活冲和湯尤穩也

兩感陽多羌活解冲和靈寶未分嘗

知難○大羌活湯 解利兩感神方 易水先生方

防風 羌活 獨活 防已

黃芩 黃連 白朮 甘州

蒼朮 細辛 知母 川芎

地黃 各一兩

每服半兩水二盞煎至一盞半熱服

曹溪吳氏曰氣薄則發泄故羌獨防蒼芎辛  
之氣薄者以升發其傳經之邪養其受傷之  
陰以升散諸藥而君臣佐散以寒涼則升者不  
寒涼諸藥而君臣佐散以寒涼則升者不  
草脾家藥也○南豐李氏曰此方  
營之懺爾○陽症多者宜服

要卷一

傷寒

三五

葛根湯  
治項背強急發熱惡風或喘或身疼者

六書

○冲和靈寶飲

治兩感頭疼惡寒發熱口舌燥

羌活

防風

生地

川芎

細辛

黃芩

柴胡

白芷

乾葛

石膏

甘州

薑棗煎臨服加荻荷十片煎一沸熱服○冬月去荻膏加麻黃○南豐李氏曰陶氏冲和湯為陰陽未分者設

合病

太陽合病陽明者用葛根湯療二陽合病少陽成嘔利黃芩加半夏生薑

仲景

○葛根湯

太陽與陽明合病者必自下利主之

葛根

四兩

麻黃

三兩

桂枝

二兩

芍藥

二兩

甘州

二兩

生薑

三兩

大棗

十二枚

王氏柴胡湯  
柴胡黃芩人參當歸生地芍藥  
交門知母黃柏酸  
連仁  
治夜睡盜汗  
傷寒盜汗黃表  
抵雜病黃陰虛

水一斗先煮麻葛減二升去沫內諸藥煮取

升去滓溫服取微汗○太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之

成氏曰輕可去實麻葛之屬是也此以中風表實故加二物于桂枝湯中也

○黃芩湯

太陽與少陽合病自下利者與之

黃芩

三兩

甘州

二兩

芍藥

二兩

大棗

十二枚

水一斗煮取三升溫服若嘔者加半夏半升生

薑三兩

成氏曰虛而不實者苦以堅之酸以收之芩芍之苦酸以堅斂腸胃之氣弱而不足者甘以補之甘棗之甘以補固腸胃之弱

反熱

以陰反熱麻黃附甘州細辛二味詳發熱脉沉宜四逆太陽反症有頭強

要卷一

傷寒

二十六

麻黃附子細辛湯  
若麻黃附子甘草湯  
湯症而不急迫者  
即後方之變者  
迫者方之變者  
痰之變者  
重者之變者  
麻黃附子甘草湯  
治喘急自汗或自  
汗或不汗又惡寒  
又身微痛者  
金匱要略曰水之  
為病其脈沉小屬  
少陰浮者即為水  
水虛脹為氣水發  
其汗則愈

○麻黃附子細辛湯  
沉者主之  
火陰病始得之反發熱脈

麻黃 二兩 細辛 二兩 附子 一枚  
水一斗先煮麻黃二升去上沫內藥煮取三升  
溫服

成氏曰內經云寒淫於內治以甘熱佐以辛  
辛以辛潤之麻黃之甘以解少陰之寒辛附  
之辛以溫之麻黃之甘以解少陰之寒辛附  
邪在表而當汗又兼脈沉屬陰而當溫故以  
附子溫經麻黃散寒而細辛是汗劑之重  
者加甘草是汗劑之輕者也○豐溪吳氏曰  
有太陽之表熱故用麻黃以發汗  
有少陰之裏寒故用附子以溫中  
麻黃附子甘草湯 火陰病得之二三日此微  
發汗以二三日無裏症故微發汗也  
麻黃 二兩 甘草 二兩 附子 一枚

麻黃附子甘草湯  
水病自發  
用之  
治咳喘上衝頭痛  
金匱要略曰乾咳者  
自心不得卧者  
之方也謂之  
利小便謂之  
主治三陽  
十一日留飲  
時八日飲  
此症之從  
治之

水七升先煮麻黃一兩沸去沫內諸藥煮取二  
升溫服

成氏曰麻黃之甘以散表寒附子之辛以溫  
寒氣○趙嗣真曰此既無裏寒之可溫又無  
裏熱之可下求其所以用麻附之義則是在  
亦沉方之可名曰少陰病身亦發熱方行發汗  
故不重言脈症而但曰微發汗所以去細辛  
加甘草是汗劑之輕者也

病發熱頭痛脈反沉若不差身體疼痛當救其  
裏宜四逆湯○趙嗣真曰四逆生附配乾姜補  
中有發前二湯熟附配麻黃發中有補

表家水氣宜攻表為用青龍小劑囊裏水可下十  
棗七少陰真武北方望  
○小青龍湯 傷寒表不解心下有水氣乾嘔發

熱而咳或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者主之

麻黃 三兩 芍藥 三兩 半夏 半升 乾薑 三兩

甘艸 三兩 桂枝 三兩 細辛 三兩 五味子 半升

水一斗先煮麻減二升去沫內諸藥煮取三升

溫服○渴去半加栝蒌根三兩○噎去麻加附

子一枚○小便不利少腹滿去麻加茯苓四兩

○喘去麻加杏仁四兩○局左又治溢飲身體

疼重及欬逆倚息不得安臥或因形寒飲冷內傷肺經咳嗽喘急嘔吐涎沫

成氏曰寒邪在表非甘辛不能散之麻桂甘  
草之辛甘以發散表邪水停心下而不行則  
腎氣燥內經云腎苦燥急食辛以潤之薑辛  
半夏之辛以行水氣而潤腎欬逆而喘則肺

十棗湯  
治毒有胸腹而  
掣痛者  
曾引背三四推  
入心引引引  
之咳ナト出ル角

○十棗湯 大陽中風下利嘔逆表解者乃可攻

乏其人掣掣汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏

未和也主之

芫花 甘遂 大戟 大棗 十枚

各等分爲散以水一升半先煮棗取八合去滓內藥末強人服一錢七贏人半錢溫服得利後

糜粥自養

成氏曰辛以散之芫花之辛以散之欲苦以泄  
之遂載之若以泄水者腎所主也甘者脾  
之味也大棗之甘者益土而勝水○薑吳  
氏曰三物皆峻利故用大棗以益土此我衣

之後而發，使水氣自大小便而洩，乃內經湯驅逐裏邪，使水氣自大小便而洩，乃內經所謂潔淨府也。

○真武湯 少陰病四五日腹痛小便不利四肢

沉重疼痛自下利者，此為有水氣，其人或咳或小便利，或下利，或嘔者，主之。 ○太陽病發汗汗出不解，仍發熱，心下悸，頭眩，身瞶，動振振欲擗地者，主之。

茯苓 三兩 芍藥 三兩 生薑 三兩 白朮 二兩

附子 一枚 炮

水八升，煮取三升，溫服。○欬者，加五味半升，細辛、乾薑各一兩。○小便利者，去苓。○下利者，去芍，加乾薑二兩。○嘔去附，加生薑五兩。

成氏曰：脾惡溼，甘先入脾。苓、朮之甘，以益脾。逐水寒溼，所勝平以辛熱溼淫，所勝佐以酸。平附芍生薑之酸，辛以溫經散溼。○又曰：真武，北方水神也。水氣在心，寸外帶表而屬陽。必應發散，故治以真武湯。主少陰病。

上焦瘀血宜輕劑，犀角、地黃、主地黃、中部、桃仁、承

氣逐下焦，抵當有丸湯。

○犀角、地黃湯 治傷寒應發汗而不發，內有瘀

血，鼻衄吐血，面黃大便黑，此方主消瘀血。

犀角 丹皮 芍藥 生地

水煎溫服。○有熱如狂，加黃芩。○李氏入門表熱，加芫荽。○衄加梔。○內熱甚，加黃連。○龔氏鑿鑿曰：傷寒頭痛發熱，口乾，口鼻血出，腹脹，午後昏沉，聲啞，耳聾，脇痛，俗云血汗病也。犀角、地

黃湯合小柴胡湯血盛加芎根韭汁汗出如雨  
隨痿○海藏王氏曰犀角地黃湯乃陽明經聖  
藥如無犀角以升麻代之二物性味相遠何以  
代之蓋以升麻能引地黃及餘藥同入陽明也  
又曰衄唾嘔吐血在上也主之涼膈散加生地  
亦可○陶氏曰犀角地黃湯治上桃仁承氣湯  
治中抵當湯丸治下也

○陶氏六書加當歸桔梗甘艸陳皮紅花生薑水  
煎臨服入藕汁三匙調服

<sup>景仲</sup>桃仁承氣湯 太陽病不解熱結膀胱其人如  
狂血自下下者愈其外已解但少腹急結者乃  
可攻之宜之

桃核仁 五十箇  
甘艸 二兩  
桂 二兩  
大黃 四兩 芒硝 二兩

水七升煮取二升半內硝微沸溫服○朱氏活  
人曰傷寒外症已解小腹急大便黑小便利其  
人如狂者有蓄血也主之○海藏王氏曰漱水  
不咽胸滿心下手不可近者主之

<sup>景仲</sup>抵當湯 太陽病六七日表症仍在脈微而沉  
也取之甘下以緩之辛以散之少腹急結以  
中取之熱甚搏血故加二物於調胃承氣湯  
也血大黃行藥也日能推陳而致新也  
也桂枝堅而潤燥甘草平劑也  
而助熱行性矣之利血而熱君以桃  
斯其下行之意乎

要卷二 傷寒 三十一

反不結胸其人發在者以熱在下焦少腹當鞭  
滿小便自利者下血乃愈主之○太陽病身黃  
脉沉結小腹鞭滿小便不利者為無血也小便  
自利其人如狂者血症諦也主之○病人無表  
裏症發熱七八日雖脉浮數者可下之假令下  
之脉數不解合熱則消穀善飢至六七日不大  
便者有瘀血宜之○陽明病喜忘屎雖鞭大便  
反易其色必黑有畜血宜下之

水蛭 三十箇 蜜 三十箇 桃仁 二十箇  
大黃 三兩

水五升煮取三升溫服不下再服

成氏曰苦走血鹹勝血蜜蛭之鹹苦以除畜血甘緩結苦泄熱桃黃之苦以下結熱

枳實丸 傷寒有熱少腹滿應小便不利今反  
利者有血也當下之不可餘藥宜之

水蛭 二十箇 蜜 五箇 桃仁 二十箇 大黃 三兩

右四味杵分為四丸以水一升煮一丸取七合  
服之晡時當下血若不下者更服

海藏王氏曰抵當湯丸藥味同劑如何是二法蓋喜忘發狂身黃尿黑者疾之甚也但小腹痛滿硬小便利者輕也故有湯丸之別桃仁大黃等分蜜蛭多者作湯三之二者作丸九之名取其數少而緩也

四逆 真陰厥逆如陽症四逆湯方入白蔥四逆散能治

熱麻黃連解毒出倉公 景○通脉四逆湯 少陰病下利清穀裏寒外熱手

足厥逆脉微欲絕身反不惡寒其人面赤色或

腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者主之○  
下利清穀裏寒外熱汗出而厥者主之○  
出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之○  
下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裡四逆湯攻表桂枝湯○  
嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯主之○  
少陰病膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急溫之宜四逆湯○  
陽明病脉浮而遲表無裡寒下利清穀者四逆湯主之

甘艸 三兩 附子 生一枚 乾薑 三兩

水三升煮一升二合溫服其脉即出者愈○面色赤者加葱白九莖○腹痛加芍○嘔加生薑

咽痛加桔梗○利止脉不出加入參○局方曰傷寒自利不渴嘔噦不止或吐利俱發小便或澁或利或汗出過多脉微欲絕手足逆冷者凡傷寒有此症候皆由陽氣虛裏有寒雖更覺頭痛體疼發熱惡寒四支拘急表症悉具者未可攻表先宜服此藥助陽救裏

海藏王氏曰薑附加甘草為脉沉細而遲茲薑附以治寒甘以緩之

○下之後復發汗盡日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表症脉沉微身無大熱者乾薑一兩附子一枚湯主之

○發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之



茯苓 六兩 人參 一兩 甘州 二兩 乾薑 一兩半  
附子 一枚 生用

仲景○四逆散 少陰病四逆其人或欬或悸或小便

不利或腹中痛或泄利下重者主之

甘州 枳實 柴胡 芍藥

各十分揚篩白飲和服方寸七日三服○欬加

五味子乾薑○悸加桂枝○小便不利加茯苓

○腹中痛加炮附○泄利下重加薤白

成氏曰內經曰熱淫於內佐以甘苦以酸收之  
以苦發之枳實之甘苦以泄裡熱芍藥之  
酸以收陰氣柴胡之苦以發表熱○氣逆則  
欬五味之陰氣收逆氣乾薑之辛散肺寒○桂  
猶圭引導陽氣○茯苓味甘而淡用以滲泄  
○裏虛過邪則痛加附子以補虛○泄利下  
重者下焦氣滯也加薤白以泄氣滿○陶氏  
曰邪傳少陰則手足逆冷乃傳經之邪輕則

活承氣湯下之  
治傷寒大熱乾嘔呻吟錯語不  
得眠者

黃連 黃芩 黃藥 各半兩 山梔 二兩

羅田萬氏保命歌括曰此方太倉公之火劑湯  
也○火甚者必炒過或以酒炒

陽毒 三黃陽毒狂斑爛巨勝石膏裏通

書○三黃巨勝湯 治陽毒發斑狂亂妄言大渴呬

喊目赤脉數大便燥實上氣喘急舌卷囊縮難  
治姑以此湯劫之

黃芩 黃連 黃藥 山梔 石膏  
芒硝 大黃

山梔升麻黃芩  
芍藥柴胡知母杏仁  
石杏  
仁  
節煩痛死班

薑棗水煎臨熟入泥漿水二匙調服

三黃石膏湯 治瘟疫發狂大便泄者

黃芩 黃連 黃礬 石膏 三錢 蘇黃 一錢 豆豉 半合 山梔 五枚

水煎溫服○墊氏曰此方乃與前方相反前方宜裡熱便閉者此方宜表裡俱有熱而便泄者用者宜詳之

陰盛格陽宜返本戴陽虛火益元充

回陽返本湯 治陰盛格陽陰極發躁微渴而

赤欲坐井池脉無力欲絕

附子 乾薑 甘艸 麥門冬 人參 五味子 陳皮 茗

益元湯 治無頭疼有身熱躁悶面赤飲水不

得入口乃氣弱無根虛火泛上名曰戴陽症

甘艸 二錢 附子 乾薑 人參 各一錢 五味子 二十粒 麥冬 黃連 知母 各七分 艾 三分 蔥白 九莖

薑棗煎臨熟入童便三匙冷服

如狂 如狂挾血當歸活沉重昏迷似祟蒙精采不當無

熱躁桂苓飲子最精工

當歸活血湯 治無頭疼無惡寒但身熱發渴

溺利便黑口出無倫不可誤為熱症乃瘀血內

傳心脾三經使人昏迷沉重如見祟症名挾血 當歸 赤芍 甘艸 紅花

桂心 乾薑 枳殼 生地  
人參 柴胡 桃仁

生薑一片水煎入酒三匙調服服三貼後去桃紅薑加木苓

○桂苓飲 治初得病無熱狂言煩躁不安精采不與人相當誤為發狂下者死殊不知熱結膀胱名曰如狂症血自下者愈不愈者宜此

茯苓 桂 猪苓 白朮  
澤瀉 黃蘗 知母 山梔  
滑石 生薑

神昏越經 導赤涼心火散火升陽治撮空

○導赤各半湯 治傷寒後心下不硬腹中不滿二便如常身無寒熱漸變神昏不語或睡中獨語目赤唇焦舌乾不飲水稀粥與之則嚥不與則不思形如醉人乃熱傳手少陰心也心火上逼肺所以神昏名越經症

黃芩 黃連 山梔 甘州  
知母 犀角 麥冬 礞石  
茯神 人參

薑棗煎加燈心一握煎沸熱服

○升陽散火湯 治撮空症乃肝熱乘肺元氣虛弱不能主持以致謔語神昏不省人事溺利者可治不利者歎

頭... 作...

人參

當歸

芫胡

芍藥

黃芩

甘州

白朮

麥冬

陳皮

茯苓

薑棗水煎服○有痰加半夏薑汁○大便燥結  
譫語發渴加大黃○泄瀉加升麻炒白朮

陽再造宜陽不汗

○再造飲 治陽不能作汗誤用重湯火劫取

汗者死

人參

黃芪

桂枝

甘州

附子

細辛

羌活

防風

川芎

煨姜

棗二枚水煎再加炒芎一撮煎沸溫服

蛇厥安蛇療胃冷蛇攻

○安蛇理中湯 治蛇厥

即理中湯加

茯苓

烏梅

花椒

大便閉加大黃○渴加枯蘆根

壞症參胡芍藥尤良劑壞症傷寒起死躬奪命獨參元

氣返鼻梁有汗是其功

門○參胡芍藥湯 治傷寒十四日外餘熱未除脉

息未緩大便不快小便黃赤或渴或煩不能安

睡不思飲食此邪氣未淨正氣未復當量虛實

以調之

人參

芫胡

芍藥

黃芩

知母

麥冬

生地

枳殼

參飲子 治傷  
寒病後餘熱不退  
或日暈潮熱不  
消 柴胡 芍藥  
滑 姜 燈  
心 參

要卷一

傷

三六

甘艸 三分

薑三片水煎溫服○胸滿腹脹便硬去參加厚朴枳椇○小便頻數加茯苓澤瀉○嘔加竹茹○血弱加當歸○虛煩加竹葉粳米○二便自利胸腹不飽形羸脉弱去枳椇倍參○不眠加酸棗茯神○宿屎未淨腹滿或痛便硬量加大黃○奪命散又名復脉湯凡傷寒時疫不問陰陽誤服藥餌因重垂死脉沉伏不省人事者人參一兩水煎服少頃鼻梁有汗出脉復立瘥

食復

新瘥復熱多因食枳實豉梔大黃劑  
仲景枳實梔子豉湯 大病差後勞復者王之一○若

有宿食者加大黃

枳實 三枚 梔子 十四枚 豉 一升

以清漿水七升空煮取四升內枳椇煮取一升下豉五六沸溫服微汗○李氏入門曰內熱加芩○腹脹加朴○傷肉加椇○傷麩飯加神麩豐溪吳氏曰枳實能奪胃中之食枳椇能祛胸中之熱

勞復

勞復石膏煎竹葉湯 傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐

者王之一

竹葉 二把 石膏 一觔 半夏 半升 人參 三兩  
甘艸 二兩 粳米 半升 麥門冬 一升  
水一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟

服

成氏曰辛甘發散而除熱石草之甘辛以發散餘熱甘緩脾而益氣麥粳米之甘以補不逆氣者散也氣逆者欲其散半夏之辛以散逆氣○薑瀉吳氏曰竹石門冬之甘以熱參草之甘補不足用曰竹石門冬之甘以脾胃用之以和中氣也○聖氏曰案勞而復者脾胃已虛恐非石膏大寒之所堪則從輕換滑石尤良然胃虛而煩熱燥心津液非常例守禁之限乎○又案兩後更熱宜小柴有胃寒宜理中丸胃熱宜此方皆各見本方下

春○益氣養神湯

治勞復發熱

人參

當歸

芍藥

知母

麥冬

炒梔

陳皮

甘艸

升麻

茯神

棗一枚水煎溫服○聖氏曰表熱加苳葛去知不眠加竹茹酸棗炒○心下痞滿加黃連

枳

易病

陰陽易病當歸朮鼠屎燒視可索尋若但女勞成復熱逍遙散加入人參

活人○當歸白朮湯

治男婦病未平復因犯房事則小腹急痛連腰膝四支不能舉任身無熱者

當歸

附子

生薑

白朮

桂枝

甘艸

人參

黃芪

芍藥

水煎溫服○聖氏曰加燒視鼠屎為良○龔氏濟世曰燒君散不應用參附湯良

門入

○人參逍遙散 治女勞復虛弱者

聖氏曰此方宜有熱者

心煩口乾加味冬○陰虛火動加知藥牡蠣

和解湯 是桂支湯之變方也虛人之感冒初發宜用之

表氣薄者加減而四時可通用勞後感冒亦宜也

參證去之或以桂折各餘鎮七守粒五苓完七乾完蟬好耳好

蒼唐嫌香者右姜東水煎初感咳嗽加麻杏貝母倍

乾桂泄瀉食味不化加附倍蒼苓乾泄瀉數加沢肉菘砂

仁頭痛甚加麻芷老人瘦實者頭痛加水苛肥人只加麻常用

發表去參苓以方用勞後夾陰等証益妨也又風邪後咳

嗽不為勞咳誠風寒初發可用之良劑也

### 中寒

太陰太陰寒中中脘痛為用理中小建中

正傳理中湯 治即病太陰自利不渴寒多而嘔腹

痛下利鴨糖虻厥霍亂等症長沙先生方

人參 甘艸 乾薑 白朮

水二盞煎八分溫服○如腹滿下利脉沉遲而

微者加炮附子二錢○李氏入門曰內虛腹痛

合小建中湯○陶氏加桂苓陳皮薑棗水煎臨

服入炒陳壁土一匙以助胃氣治同

成氏曰脾欲緩急食甘以緩之用甘補之參  
木甘草之甘以緩脾氣調中寒淫所勝平以  
辛熱乾薑之辛以溫胃散寒○鶴溪陳氏曰  
太陰屬脾中州土也性惡寒溼非乾薑白朮

景仲  
溫燥不能

○附子湯 火陰病得之一二日口中和其背惡

寒者當灸之主之 ○火陰病身體痛手足寒骨節痛脉沉者主之

附子 二枚 茯苓 三兩 人參 二兩 白朮 四兩  
芍藥 三兩

水八升煮取三升溫服

成氏曰辛以散之附子之辛以散寒甘以緩之參苓白朮之甘以補陽酸以收之芍藥之酸以扶陰所以然者偏陰偏陽則為病火欲實水當平之不欲偏勝也

綱目  
○小建中湯

治傷寒腹痛惡寒手足踈而溫長

桂枝 半一錢 甘草 一錢 芍藥 三錢 生薑 半一錢

六棗 一枚 飴 八錢

水煎去滓下飴再煎服 ○去飴加芪名黃芪建中湯治傷寒汗後身疼脉遲弱者 ○傷寒論曰傷寒二三日心中悸而煩者主之 ○傷寒陽脉澁陰脉弦腹中急痛先與之不差與小柴胡 ○嘔家不可用之 ○活人曰傷寒尺脉遲者如芪

成氏曰建中者建脾也內經云脾欲緩急食甘以緩之飴棗甘之甘以緩之桂薑之辛以行之散也榮衛不足潤而散之也桂薑之辛以行之榮衛酸收也泄也正氣也東垣先生曰芍藥之酸衛以收也君氣也東垣先生曰芍藥之酸

少陰臍痛少陰宜四逆回陽救急辱陶公



仲景○四逆湯 少陰病脈沉者急溫之宜之○既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者主之○自利不渴者屬太陰藏有寒當溫之宜之

甘草 二兩 乾薑 一兩 附子 一枚

水三升煮一升二合溫服○少陰病下利脈微者白通湯主之○惡寒脈微四逆加人參湯主之○栞氏曰寒甚無脈加好酒薑汁尤良先用葱熨法隨用之

成氏曰內經云寒淫於內治以甘熱又云寒淫所勝平以辛熱甘草薑附相合為甘辛大熱之劑乃可發散陰陽之氣

六書○回陽救急湯 治傷寒初起無頭痛無身熱便

就怕寒四肢厥冷或過於肘膝或腹痛吐瀉或口吐白沫或流涎或戰慄面如刀刮引衣踈臥不渴脈沉遲無力即是寒中陰經真寒症不從陽經傳來

附子 乾薑 甘草 人參

桂 半夏 五味子 茯苓

白朮 陳皮

薑棗水煎服○無脈加豬胆汁○嘔吐不已加薑汁○泄瀉不已加升麻黃芪○嘔吐涎沫或有小腹痛加吳萸

厥陰 當歸四逆茱萸劑可療厥陰少腹痛

仲景○吳茱萸湯 厥陰乾嘔吐涎沫頭痛者主之○

少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者主之

藥黃一升人參三兩生薑六兩大棗十二枚

水七升煮取三升溫服○李氏入門曰如陰逆

厥冷脣青面黑舌卷卵縮加細辛附子

○當歸四逆湯 厥陰病手足厥寒脈細欲絕者

主之

當歸 桂枝 芍藥 細辛

甘州 木通 棗 二十

水八升煮三升去滓溫服○若其人內有久寒

者當歸四逆加吳茱萸湯主之

成氏曰內經云脈者血之府也諸血者皆屬

若以助心氣肝苦急食酸以收之芍藥之酸以收心氣肝苦急食酸以收之芍藥之酸以收心氣肝苦急食酸以收之

飲食內傷寒外感堪求五積熟生功

○五積散 治外感風寒內傷生冷

心腹痞悶頭目昏痛肩背拘急肢體怠惰寒熱

往來飲食不進調中順氣除風冷化痰飲及婦

人血氣不調心腹撮痛經候不勻或閉不通等

症

蒼朮 桔梗 陳皮 枳殼

麻黃 芍藥 川芎 當歸

甘州 茯苓 半夏 桂

醫家入門熟料五局  
桂外餘一十三  
果用燉火炒令  
色變攤冷入芷  
和勻云按入  
門除白芷忍火  
炒壞其香氣而  
枳殼喜火炒熟  
以緩其性意謂  
和劑之誤欵又  
既云除二果外  
二十三果同為粗  
則當有桂芍也

入門曰積寒積  
食積氣積血積  
積痰五者之  
積可散也

白芷各三兩厚朴

炮薑各四兩

右除桂槲外一十三味同炒黃色攤冷入桂槲  
令勻每三錢水一盞半生薑三片煎一盞熱服

○傷寒發熱入蔥三寸豉七粒○惡寒厥冷入  
吳萸七粒鹽少許○婦人產難入醋煎○活人

日寒中陰經胸膈不快脣青手足冷腹痛脉沉  
細者尤妙○陶氏曰此方通解表裏之寒尤妙

楚氏曰此為除寒溼之主劑故方中有平胃  
二陳之味皆為溼也麻黃湯溫散寒氣也寒  
凝血故用四物之三品且夫寒邪著三陰故四物為引入陰經

全大

○生料五積散

治感寒頭身痛惡寒嘔吐或感

寒溼腰脚酸痛

即前方去乾薑外餘薑蔥水煎服

李氏入門曰體薄有汗去蒼朮麻黃

龔氏醫鑿曰按此方氣味辛溫開鬱行氣發  
表溫裏大有回生起死之功溫寒燥溼之聖  
藥也夫寒溼屬陰燥熱屬陽人之有病不遇  
二散而已善用藥者以苦寒而洩其陽以辛  
溫而散其陰病之不愈者未之有也其常以  
防風通聖散治熱燥之藥也生料五積散治  
之寒溼藥

疫癘初病三日發汗方 羌活乾葛 紫蘇 葛根 蒼朮 防風 香附 白芷 川芎 陳皮 甘草 生薑 水煎服 不可大汗 此方不命虛實 俱用此發汗 後則易愈

發汗後清解方 前胡 芍藥 枳殼 連翹 桔梗 葛根 黃芩 乾葛 柴胡 枳殼 升麻 半夏 甘草 少虛弱者加人參 去連翹 口渴煩燥者去半夏 加麥冬 花粉 知母 黃連 小便不利者加赤茯苓 茵陳 豬苓 沢瀉 木通 車前子 知大便溏者亦同加此 六果大便便秘者加酒炒大黃 微利之 右其方疫癘解表湯 桔梗 升麻 蘇子 防風 柴胡 黃連 牛房子 給一蘇葉 升麻 芍藥 水煎

郭子升麻牛房子散 治時毒瘡疹脈浮洪有表者瘡發於頭面 曾高之間 連翹 升麻 牛房子 枳殼 葛根 玄參 麻黃 沖和湯 治此毒脈浮在半表半裏者 葛蒲 牛房子 川芎 羌活 防風 漏芦 荊芥 桑門 前胡 耳中各一分

疫癘時氣

溫疫 葛根敗毒治溫疫消毒石膏極熱狂

升麻葛根湯 治時氣瘟疫頭痛發熱肢體煩

疼及瘡疹已發及未發疑似之間並宜服之

升麻 葛根 芍藥 甘草 各一兩

每服三錢水一盞半煎一盞稍熱服 李氏綱

目曰此乃發散陽明風寒藥也用治陽氣鬱遏

及元氣下陷諸病時行赤眼每有殊功 丹溪

先生曰凡瘧痘已見紅點不可用此恐表虛反

增瘧爛也 熱芍藥和榮甘草和衛

敗毒散

三

敗毒散

三

春復初時 山谷蒸氣 胃弱者感 之面腫 寒者先用 平胃散加 羌活防風 荊芥 吉更 不微散之後 加酒苓連 以降火 消風散 治風濕癩 疥瘡疥癬 荊芥防風 再草陳皮 厚朴蟬退 人參茯苓 羌活 羌活 羌活

各末以煎  
 湯下茶  
 亦可  
 犀角消毒飲  
 治發斑癩  
 多內梗盛  
 者  
 犀角午房  
 子荊艾防  
 瓜草  
 解毒防瓜湯治  
 癰疽及瘡多痒  
 痛者  
 防瓜 羊地骨  
 黃芪芍藥荊  
 艾枳壳生犀子  
 各七分半

治傷寒溫疫風溼風眩頭痛增寒壯熱初虞世  
 究其方知出道藏乃叙云自非異人傑出志與  
 神會則莫敢為良可歎服煙瘴之地或溫疫時  
 行或人多風多痰多氣或處卑溼脚弱此藥不  
 可缺也○龔氏醫鑒曰治四時瘟疫鄉村相類  
 加葛根

清暑消毒飲 溫暑之月民病天行瘟疫熱病  
 治宜清熱解毒兼治內外

- 酒芩 酒知母 升麻 乾葛 各一錢
- 石膏 白芍 人參 黃連 酒炒
- 生地黃 各五分
- 羌活 二錢 生薑 三片

水一盞半煎七分食前熱服○胸膈痞悶痰涎  
 壅塞加枳實半夏各一錢○脾胃不實加白朮  
 一錢半○薛氏曰按前症若邪在足陽明表裏  
 不解者宜用本方和解之若疎通過度胃氣虧  
 損而發熱煩渴者用竹葉黃芪湯以生津液若  
 悞汗出陽而發熱煩渴者用升陽益胃湯若悞  
 下出陰而發熱煩燥者用理中湯

考方  
 ○三黃石膏湯  
 瘟毒表裏俱盛五心煩熱兩目如火鼻乾面赤  
 大渴舌燥者王之

寒疫 應夢人參寒疫劑陽氣抑遏大青龍光切  
 因 應夢人參散 治傷寒體熱頭疼及風壅痰嗽

咯血

白芷

乾葛

青皮

桔梗

白朮

人參

各七錢半

甘艸

一兩半

乾薑

一錢三字炮

為末每二錢水一盞薑三片棗二枚煎七分通服

考方 ○大青龍加黃芩湯

春分以後至秋分節前天有暴寒抑遏陽氣不得泄越頭疼身熱無汗惡風煩躁者為時行寒疫主之  
表有風寒故見大陽症裏有濕熱故見也辛以解風燥麻黃桂枝甘草杏仁薑棗辛甘物也寒以清溫熱苦以治煩躁

冬溫冬溫即病升麻葛根湯  
考方 ○升麻葛根湯

冬月應寒而反大溫民受其溫癘之氣名曰冬溫無汗發熱口渴者主之  
升葛辛涼而發散者酸能養陰而退熱甘草味甘能調榮而益衛

醫鑿 ○敗毒散 冬應寒而反煖者春發瘟疫主之

春清 春清葛根宜即病夏時鬱發太柴良

六書 ○升麻葛根湯

春應暖而清氣折之則實邪在肝主之  
醫鑿 ○大柴胡湯 春應溫而反清者夏發燥疫主之

夏寒夏寒五積治秋發即病用藳附二香

門入 ○二香散 治四時感冒冷溼寒暑嘔惡泄利腹痛瘴氣飲冷當風頭疼身熱傷食不化

紫蘇

陳皮

蒼朮

厚朴

扁豆 各五  
香附 一錢  
香薷 一錢

生薑木瓜各二片 蔥二莖 水煎服

醫鑒 五積散 夏應熱而反寒者 秋發寒 薑王之王

秋溫 白虎加蒼秋即病至冬鬱發 五苓行

活人 白虎加蒼木湯

秋應涼而太熱 折之則實邪在肺 主之

醫鑒 五苓散 秋應涼而反淫雨者 冬發溼疫 主之

風溫 風溫 萎蕤治寒熱 白木防風汗後膏

活人 萎蕤湯 治風溫兼治冬溫及春月中風傷寒

發熱頭眩痛喉咽乾舌強胸內痛痞腰背強

萎蕤 半二錢 石膏 三錢 葛根 二錢 羌活 自薇 杏仁 木香 川芎

甘州 各一錢 麻黃 二分

水煎溫服 李氏入門曰汗後身猶熱加黃芩

知母赤芍 汗多去麻加桂枝防風 氣弱加

人參 有痰加南星 渴甚加天花粉 肝火

熱加草龍胆

薑 溫熱未除更遇於風 病為風溫 表有邪故 寒熱裏有邪故 口渴風溫也 頭暈先受之 故頭眩 風盛則氣壅 辛能散之 故用石薤佐以 能平之 故用芍藥 寒能勝之 故用石薤佐以 杏仁取其利氣而木香 者清熱下氣之物也

墊氏曰傷寒論曰發汗已身灼熱者此為風溫

不可發汗故海藏王氏改萎蕤湯而用白木防

風用者宜詳之

卷之二 支屬 四十七

史考一

溼溫重感溼溫兩脛重乃投白虎加蒼朮方

人活白虎加蒼朮湯 溼溫憎寒壯熱口渴身痛脉

沉細者主之 ○孫尚藥曰溼溫症用五苓散大

利小便則腹減白虎解利邪熱則病愈

暴溫暴溫寒伏調中用表裏實邪入太黃

人活調中湯 治夏秋暴寒疫癘折於盛熱熱結於

四支則壯熱頭疼及肚腹不和等症

葛根 黃芩 芍藥 蒼朮

藁本 桔梗 茯苓 甘州

水煎溫服 ○李氏入門曰肌熱煩渴加麥門冬

○表裏邪盛或便閉脉數者加大黃

聖氏曰案夏月宜行熱令而反有暴寒折之  
則熱氣伏於內外與寒戰而成病故用寒涼  
中湯之熱則內外通利而病愈此蓋朱氏立調  
散外寒則本指也而伏今世之醫以爲用二香散  
治非時暴溫寒伏此用朱氏之方而不用朱  
氏之意也

溫病春月病溫宜敗毒黃芩加入乃清涼

敗毒加黃芩散 壯熱不惡風寒而渴者溫病

也主之 經曰治溫以清入曰開之發之適事爲

故用之以故羌獨此熱用前川芎皆輕清開發之劑也

利氣也培其參苓甘草者實其中氣使溫毒不能

山嵐瘴氣君神木羌活升麻可酌量

傳正 太無神木散 治四時瘟疫頭痛項強憎寒壯

熱身痛專主山嵐瘴氣之妙劑也

史考一

史考一



陳皮 二錢 蒼木

厚朴 各一錢 古州

石菖 錢各半 藿香

薑三片 棗一枚 水一盞 半煎一盞 溫服

薑 溪吳氏曰山嵐瘴氣謂山谷間障霧溼土  
敦阜之分爭陰勝則憎寒陽勝則壯熱流於百  
邪則正分爭陰勝則憎寒陽勝則壯熱流於百  
節則正分爭陰勝則憎寒陽勝則壯熱流於百  
其障霧之邪用厚朴之苦以散之陳皮調  
胃藿香辛香補中而泄氣內經云谷氣通於脾  
魄物也辛香補中而泄氣內經云谷氣通於脾  
故山嵐瘴氣之毒則壞人脾胃太無此方但用  
脾之劑而解瘴毒之妙其在其中使非淺得  
經之真不能主此方也其高識若此誠不愧  
為師矣

雜著

升麻蒼木湯 春秋時月人感山嵐瘴霧毒氣  
發寒熱胸膈飽悶不思飲食此毒從氣鼻口入  
內也治當清上焦解內毒行氣降痰不宜發汗

黃連

黃芩

厚朴

枳實

干夏

桔梗

柴胡

川芎

木通 各一錢

升麻 半一錢

蒼木 半一錢

生甘州 七分

木香 一錢

生薑五片 水一盞 半煎七分 熱服

雜著

羌活蒼木湯

寒溫不節 汗身脫衣 感冒風寒

發熱頭疼 此傷寒類也 但嶺南氣溫易出汗 故  
多類瘧重則寒熱不退 輕則為瘧 南方氣升 故  
胸滿痰壅 飲食不進 與北方傷寒只傷表而裏  
自和者不同 治當解表 清熱 降氣 行痰 此方用  
於寒涼時 月及雖在溫暖時 而感冒風寒者  
羌活 半一錢 蒼木 柴胡 黃芩

橘紅 半夏 枳實 甘州  
川芎

薑五片水盞半煎七分食前溫服

氣行正氣愈行正氣散冲和九味病身康

不換金正氣散 治時氣瘴疫頭疼壯熱腰背

拘急咳嗽痰涎喘乏或霍亂吐瀉下痢赤白等症若四方之人不伏水土宜服之

厚朴 藿香 陳皮 半夏

蒼朮 甘州各等分

每三錢水一盞半薑三片棗二枚煎八分食前

稍熱服○龔氏壽世日有溼加木苓○頭痛加

芎正○潮熱加芫苓○口燥加芫葛○咳嗽加

杏 桔梗 ○腹痛感寒加乾薑肉桂

○九味羌活湯 四時不正之氣憎寒壯熱頭疼身痛口渴人人相似者此方主之

○荆防敗毒散 治天行時疫發散瘟邪傷寒蘊要方

荆芥 防風 羌活 獨活

前胡 枳殼 人參 茯苓

菝葜 甘州 川芎 桔梗

各等分水煎服內熱加黃連渴加天花粉

卷之一

竹瀝姜汁  
日之飲之  
金瘡中  
口噴欲死  
半外微之  
廣利

委中風八症 大虛濕寒 暑氣食惡  
火中 涼膈散 小柴胡湯 六果地黃丸 貝母瓜蒌散 治  
痰多口眼喎斜 手足麻木 貝母瓜蒌散 南星 荊芥 黃柏 附  
風 羌活 黃芩 今黃連 陳皮 白朮 羊隻 薄荷 荷耳 中威 吳天  
花粉 絡生 生薑 片 虛中 六君子湯 六果地黃丸 補  
中益氣湯 濕中 麻沉 淡或沉而細 清燥湯 治  
氣虛 濕熱 肺金受邪 絕寒 水生化之源 小便赤少 大便不  
實 腰膝痠軟 口乾 作渴 體重 麻木 頭目眩暈 飲食不思  
自汗 盜汗 倦怠 氣促 黃芪 羊 棗子 枳 黃連 神曲  
猪苓 柴胡 牛 中 鎔 蒼朮 安 門 生地 沢 澤 芎 藭 夜 苓 人 參 當  
歸 升 麻 鎔 黃 柏 一 分 滲 濕 湯 治 食 生 冷 水 濕 之 物 或  
厚 稷 醇 酒 停 三 焦 濕 從 中 養 榮 衣 冬 一 分 陳 皮 沢 芎  
猪 苓 鎔 白 朮 粉 香 附 梅 芍 砂 仁 厚 朴 乾 姜 片 燈 心 十  
寒 中 身 體 強 直 口 噤 不 語 四 肢 軟 掉 卒 然 昏 倒 身 汗  
者 羊 附 湯 附 子 麻 黃 湯 治 中 寒 昏 冒 口 眼 喎 斜  
六 黃 白 朮 人 參 耳 中 炮 附 子 乾 姜 各 一 分

卷之二

中風

謙亨編

獨活湯  
治風虛昏  
憤痰癱或  
為痰血虛  
引自汗

通關  
竅之  
劑

率倒通關吹待嚏開關頻擦透牙床  
治卒中不省牙關緊急用此有嚏可

王芫葛片  
白微各等  
再交半姜  
保元湯

濟

治無嚏者吹  
細辛 皂角 各等分  
為末吹入鼻內○薛氏加菝芎等分

中風素日  
罕虛不勝  
凡寒卒昏  
口不省人

○擦牙開關散 治中風不省牙關不能下藥  
用烏梅肉 檫和南星 細辛末 以中指蘸藥 頻  
擦牙上 自開○薑溪吳氏曰中風口噤不  
便以鐵物開之恐傷其齒宜用烏梅肉擦其牙

此藥生藥七分久病用... 易動燥者加... 黃芩... 加乾

自或原氣

痰

黃芩王

亮圖前

火加涼茶二

三果心氣

化痰一功氣

病

仙品本方

多凡茶非

右外邪雜

加果句氣散

本方去象耳

加陳又因本

方加王亮沉

日本方去沉

用蜜養來

吐痰之劑

關牙關酸軟則易開矣此酸先入筋之故也

稀涎瞋眩風痰湧和劑碧霞熱吐方

急救稀涎散 治卒中昏倒形體不收風涎潮

于上胸膈氣不通 孫用和家傳秘寶方

皂莢 四挺 白礬 一兩 加半夏

為末每用半錢重者三字溫水調灌微微吐涎

待惺乃用藥調治 寇氏曰此法用皂莢一兩

生礬半兩膩粉半兩水調一二錢過咽則吐涎

思礬者分膈下涎也 丹溪先生曰痰壅盛者

口張喘者不能言語者皆當用吐法一吐不

已而虛者不可吐 能吐涎沫皂角之味辛鹹辛能利氣竅鹹能

去汚垢各名之曰稀涎固奪門之兵也師曰凡

痰中風之痰使咽喉疏通能進湯液便止若

盡其痰則無液以養筋能

全人率急偏枯此大戒也

聖氏曰案醫林集要無礬石而有半夏醫學

入門合有二三味故加之

氏○瞋眩散 吐風痰 麝香 少許

藥蘆 一錢 為末薑汁調下若吐過多者煎蔥湯解之

局○碧霞丹 治卒中痰壅牙緊及五癰涎潮搐搦

石綠 十兩 附子尖 川烏尖

蝎稍 十箇 為末麪糊丸鷄頭大每服用菝葜汁半盞化下

一丸更以酒半合溫服須臾吐出痰涎然後隨

症治如牙關緊急灌之 婁氏曰凡吐痰用寒

木香煖氣散 治氣運倒 蜜縮五分 每菝葜青玉 黃烈壳各 三分毒氣 不轉口 沉香 加果二陳湯 治痰二運倒 手足冷 麻痺眩暈 脈沉細 本方加斤 洞圖 分餅 蜜 結 蜜 圭

風

犀角散

治肝中風流注四肢上攻

頭面疼痛

言諸瘧疾

上焦風痰

口眼喎斜

脚膝軟痛

犀膏名

兩卷各七錢

羊參手

菊粗茵

芍如芍

定壳斤

酸毒防芷

各名姜

五片

牛黃散

治心藏中

風光忽恐

懼悶亂不

得眠以諸

言錯亂

導痰之劑

劑累累吐不透者必用熱劑吐之方透  
六味導痰加減用三生飲也省風湯

良方

導痰湯

治痰涎壅盛胸膈痞塞咳嗽惡心

半夏

二錢

南星

枳實

茯苓

陳皮

各一錢

甘艸

五分

薑十片水煎服○李氏入門加木香香附名順

氣導痰湯○加芩連名清熱導痰湯○加羌活

防風名祛風導痰湯○加遠志菖蒲名寧心導

痰湯○龔氏壽世日面赤身熱手足溫暖脉緊

盛宜清熱導痰湯

易簡

三生飲

治卒中不知口眼喎斜半身不遂咽

喉作聲痰氣上壅六脉沉伏兼治痰厥氣厥眩

運

燕星

兩生

川烏

生

附子

半生

木香

二錢

薑十片水煎溫服○薛氏日上症此真氣虛而

風邪所乘以本方一兩加入參一兩煎服即甦

若遺尿手撒口開鼾睡為不治用前藥亦有得

生者三生飲乃行經絡治寒痰之藥有斬關奪

旗之功每服必用人參兩許以祛其邪而補助

真氣○王氏準繩曰痰涎壅盛者每服加全蠍

大省風湯治中風痰涎壅盛口眼喎斜半身

不遂不省人事

半夏

防風

甘艸

白附子

生川烏

木香

南星

生各

二錢

蝎稍

一箇

百病

中風

三

防風散

治早瘕中  
瓜手足緩  
弱舌強諸  
痰胃膈煩  
胸志意光  
忽身體沉

防麻參  
芎附桂  
棗赤苓  
桑薑獨  
雞羊角  
七豕羊  
方每服五  
毒五片

五味子湯  
治肺瘕中  
瓜多汗惡  
瓜收咳短  
氣登瘕夜  
甚偃臥曾  
滿息促鼻  
兩邊下至  
口色白反  
肺命百壯  
若色黃黃  
怖已化為  
血不治  
會杏仁  
桂心各  
防耳芳  
芎各兩

順氣之劑

諸方順氣先疏氣一劑消風善止痒

薑十片水煎溫服

薑溪吳氏曰風湧其痰于於面部則口眼喎僻塞於胃中則痰涎壅盛是方也防附蝎烏可以活經絡之風痰而開壅塞方名曰省風者以療胃次之風痰而開壅塞方名曰省風者之謂也

後進風藥

人參 白朮 茯苓 白芷  
青皮 陳皮 烏藥 各二 甘艸 一錢  
水煎食遠服○龔氏醫鑒曰或加南星木香以甦痰氣或痰盛加半夏生薑○李氏入門曰嘗服疎風散火豁痰等藥不開者用此行氣甚捷

○吳氏方考曰中風正氣虛痰涎壅盛者王之經云邪之所湊其氣必虛故用四君子以補氣治痰之法利氣為先故用青芷烏陳以順氣矣此標本兼施之治也

方局

○烏藥順氣散

治男婦一切風氣攻注四肢骨

節疼痛遍身頑麻頭目旋暈及癱瘓語言蹇澀筋脉拘挛又治脚氣步履艱難脚膝軟弱婦人血風老人冷氣胸脅刺痛心腹脹膨吐瀉腸鳴  
麻黃 陳皮 烏藥 各二  
枳殼 白芷 川芎  
桔梗 各一 炮薑 半兩  
每三錢水一盞薑三片棗一枚煎七分溫服○憎寒壯熱頭痛加蔥白○閃挫疼痛溫酒調服

要卷二

中風

四

獨活散 治胃截 中爪膠背 痿弱頭昏 耳聾耳諸 音渾濁四 肢沉重  
 獨附斤 防定桂 各一芍菊 兩一葉 荳丹參 荳解并 細葛加 各五毒 五斤

○瘡痒加菝葜○孕婦不可服○龔氏回春曰  
 臂痛加羌活桂枝○腰痛加牛膝杜仲○四支  
 冷痺加附子官桂○虛汗去麻加黃芪○楚氏  
 日有熱去乾薑加苓○拘挛加木瓜續斷○挾  
 溼加蒼朮樛榔○骨節走注疼痛加木瓜沒藥  
 蘇木

豐溪吳氏曰遍身麻痺表氣不順也治以芎  
 麻語言寒澁裏氣不順也治以烏陳枳只眼  
 喘斜面部氣不順也治以芷薑喉中氣急甘  
 艸可緩肺部氣上逆桔梗可下痰之為物寒則  
 結滯熱則流行佐以乾薑  
 行其滯也此治標之劑也  
 局  
 ○人參順氣散 治風虛氣弱榮衛不和肢節疼  
 痛身體沉重頭暈拘急手足冷麻半身不遂口  
 眼喎斜痰涎不利言語蹇澁或脾胃不和心腹

稀涎散 治中爪口瘡 草蠟双蛾 江子仁 六粒 皂牙 三錢 明卷 兩 每用三分吹入  
 清阳湯 治口眼喎斜 煩頭緊急 胃中火盛 汗不出小便

刺痛胸膈痞滿霍亂轉筋吐瀉不止等症  
 荆芎 白木 麻黃 厚朴  
 桔梗 陳皮 甘艸 白芷 各四兩  
 乾薑 人參 各一兩 乾葛 三兩  
 每二錢水一盞薑三片棗一枚菝葜五葉煎八  
 分服

祛風通氣散 治同前  
 烏藥 半錢 川芎 白芷 甘艸  
 桔梗 陳皮 白木 各一錢 麻黃  
 枳殼 人參 各五分  
 薑棗水煎服○楚氏曰按人參順氣宜氣虛兼  
 過酒者祛風通氣宜氣虛有熱者烏藥順氣宜

紅花 柏桂 各一錢 蘇木 生薑 各五分 中風

星香白湯  
治中凡疾  
成服抵藥  
不得者  
南豆一四錢  
木香五分  
生薑十片

小續命湯  
古今錄驗方  
有伽藍末  
救急方每  
芍木香只十味  
四散加減方  
春夏加膏  
知母芍秋  
父加生附

氣實無熱者

方局

消風散 治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩疼肌肉蠕動目眩旋運耳鳴蟬鳴眼澁好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻瘙痒癢疹又治婦人血風頭皮腫痒眉稜骨痛旋暈欲倒痰逆惡心

茯苓 川芎 羌活 人參

荊芥 防風 藿香 蟬蛻

疆蚕 甘州各二兩 厚朴 陳皮各半兩

為末每二錢茶清下寒熱頭痛荊芥茶清下小兒急慢驚風乳香荊芥湯下○南豐李氏曰風眼要藥也○埜氏曰加天麻白芷當歸茯苓為血風虛風之妙方○婁氏曰凡中風多有痒甚

發表之劑

不收者局方消風散類主之

方局

小續命湯 治卒暴中風不省人事漸覺半身不隨口眼喎斜手足顫掉語言蹇澀肢體麻痺精神昏亂頭目眩重痰涎併多筋脉拘挛不能屈伸骨節煩疼不得轉側及脚氣緩弱

麻黃 人參 黃芩 芍藥

川芎 甘艸 杏仁 防已

桂 各一兩 防風 半兩 附子 半兩

每服三錢薑五片水一盞半煎一盞食前稍熱服○機要曰中風外有六經之形症者先服之解表○無汗惡寒者倍麻杏有汗惡風者倍桂

中風



暑中  
種香合丸 來復  
丹香需而散  
右撰用併皆暑月  
癸散劑傷傷其氣  
如火益損矣世多  
不知而混用故特表  
而出之慮人用其味  
香而需飲  
大須散 治納涼  
大過飲食甚多將  
胃受寒至霍亂吐  
浮此捨時從症劑  
也 耳中乾毒  
杏仁肉桂 各四  
養木白虎湯  
本方加赤

氣中  
八味順氣散  
本方加香附子  
有痰加南星半  
隻  
蘇合香丸  
木香順氣飲  
白豆蔻丁香檀  
香木香略 碎仁  
薄荷香略 碎仁  
四兩  
養生香散  
養正丹

芍此二症太陽中風也○身熱無汗不惡寒者  
加知母石膏去附子身熱有汗不惡風者加葛  
芩此二症陽明中風也○無汗身涼者加附子  
乾薑此一症太陰中風也○有汗無熱加桂枝  
附子此一症少陰中風也○無已上四症六經  
混淆繫于少陽厥陰或肢節痠痛或麻木不仁

加羌活乾薑

花溪虞氏曰附子雄壯而有斬關奪將之勢  
能引入參輩並行十二經以追復其散失之  
元陽又能引麻防本仁輩發表開腠理以養  
散表之風寒引歸芍芩輩入血分行血養  
血以滋養其虛損之真陰或加石膏分以  
降胃火或加黃芩以清肺金看所挾見症與  
時減施治  
加減施治  
葛根黃杏仁麻黃湯也仲景以之  
葛根黃杏仁麻黃湯也仲景以之  
治太陽傷寒桂枝芍藥桂枝湯也仲景以之

治太陽中風如此言則中風而有頭疼身  
熱二也強者皆在所用之必用也人參甘  
之也局方用之以補氣芍藥川芎四君子  
而二也局方用之以養血如此言則中風  
故佐以附風溼淫腹疾故佐以用也風溼  
疾故佐以附風溼淫腹疾故佐以用也風溼  
病不單來雜揉而至故其用藥亦兼該也

陽明秦艽升麻湯

治風寒客手足陽明經口眼喎

秦艽升麻湯

治風寒客手足陽明經口眼喎

- 升麻 葛根 甘艸 芍藥
- 人參 秦艽 白芷 防風
- 桂枝 蔥白

水煎熱服得微汗而止○升麻湯乃陽明經藥  
白芷亦行手陽明經之藥秦艽治口噤防風散

食中  
正氣散  
攻裏  
之劑

惡中  
調氣平胃散  
木香烏藥茶檀  
香白豆蔻砂  
仁路霍香蘇  
蒼朮枳厚朴  
陳皮枳其  
生薑片二又加北  
奴

風邪桂枝實表而固榮衛使邪不再傷也

攻裏古方三化有風虛滋潤乃通腸

要机 ○三化湯 中風內有便溺之阻隔者用此導之

大黃 厚朴 枳實 羌活

各等分水煎溫服以利為度

春回 ○滋潤湯 治中風大便閉結

枳殼 厚朴 大黃 當歸

生地 杏仁 麻仁 枳櫛 各一錢

羌活 七分 紅花 三分

水煎空心溫服如元氣虛弱用蜜導法導之○

墊氏曰按丹溪先生曰大腸風秘有風熱有風

虛一方不可治也乃三化去風熱滋潤潤風虛

者乎

表裏通和通聖散麻黃硝石可商量

河間 ○防風通聖散 治一切風熱大便閉結小便赤

澀舌強口噤謔妄驚狂並皆治之

防風 川芎 當歸 芍藥

連翹 荜芎 麻黃 石膏 各四分

桔梗 黃芩 白朮 山梔 各八分

荊芥 滑石 芒硝 甘州 各三分 二分錢 四分 一錢

大黃 四分

薑水煎溫服自利去硝黃自汗去麻黃○李氏  
入門曰內科一切風熱及飲酒中風或便閉或  
風熱上壅不言等症雜科耳目口鼻唇舌咽喉

中凡寒痔口噤不  
以雞矢白一  
酒三升攪  
甚氏方也

風熱風痰等症外科癰疽瘡癤發斑折撲跌傷等症小兒驚疳積熱諸風潮搐痘出不快等症婦人諸疾凡屬風熱之疾無不治也

葦溪吳氏曰防風麻黃解表藥也風熱之在皮膚者得之由汗而泄荊芥藜苳清上藥也風熱之在顛頂者得之由鼻而泄太黃芒硝通利藥也在風熱之在腸胃者得之由後而泄滑石梔子水道藥也在風熱之在肺胃受邪石膏桔梗清由溺而泄風淫于鬲肺胃所以祛諸經之遊火肺胃也而連翹黃芩又所以祛諸經之遊火風之為患肝木主之胃氣而健脾劉守真氏長於治火此方之旨詳且悉哉

養血之劑

養榮脉弱雲林製脉實秦尤太劑良

養榮湯 治中風四支不舉痰迷心竅不省人事舌強不能言口眼喎斜半身不遂

雲林製

當歸

川芎

芍藥

生地

陳皮

烏藥

枳實

菖蒲

麥冬

羌活

黃連

防風

秦尤

茯苓

甘艸

半夏

南星

遠志

各等分

薑三片竹茹一團水煎入童便竹瀝薑汁同服

要机

大秦尤湯 中風外無六經之形症內無便溺之阻隔知血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言語宜養血而筋自榮此方主之

秦尤

甘艸

川芎

當歸

芍藥

石膏

獨活

茯苓

細辛

二分

羌活

防風

黃芩

各一錢

厥用和日中風  
不火皆以六  
清油灌之先通  
其開則後免諸  
透癰瘕之症而  
他藥亦有効也  
身珍白但不用

巨活愈風湯  
 治肝胃虛弱  
 弱語言難  
 復去肢體  
 在冬思健忘  
 老活防風丹草  
 黃芪川芎蔓  
 荆子独活細辛  
 枳實六黃地骨  
 人參知母菊花  
 薄荷白芷枳  
 當歸杜仲秦  
 半復厚朴柴胡  
 前胡地黃石  
 兩白茯苓  
 膏生地黄石  
 膏蒼朮  
 菜各四兩  
 調理  
 之劑

官桂每服一兩水  
 煎服大寒後加  
 半夏人參柴胡  
 木通迎風集  
 明氣也余其加  
 白木茯苓勝牌  
 上濕大暑後加  
 八地霍香桂迎  
 而集大阴之氣  
 霜降後加當歸  
 桂附陽少阴之  
 氣

白芷 白朮 生地 熟地  
 水煎溫服如天陰加薑心下痞加枳○岡本氏  
 曰此方有黃芩石膏則宜脉浮大數而有力者  
 養榮湯宜脉微細者也○虞氏正傳曰加竹瀝

薑汁 妙  
 薑溪吳氏曰中風虛邪也許學士云留而不  
 去其病則實故用驅風養血之劑兼而治之  
 用秦芩為君者以其主辛去一身之風石膏所  
 以去胃中諸風藥中羌活去風去濕去風  
 邪防風之細辛三陰內之軍卒去風去濕  
 厥陰經之風則有川芎去風去濕去風  
 白芷獨活熱干氣清以黃芩去風去濕去風  
 地肺乃當歸芍藥者所以養血於蹀風邪上逆  
 于肺以濟風藥之燥一使手得  
 血而能握足得血而能步也

愈風湯 治一切風症用此調理

人參 白朮 當歸 川芎 各一分  
 芍藥 半夏 茯苓 陳皮 各一分  
 枳實 防風 羌活 各七分 甘艸 三分  
 薑二片 棗一枚 水煎入竹瀝薑汁磨木香調服  
 ○埜氏曰加秦芩天麻杜仲熟地黃療肝腎虛  
 筋骨弱語言難精神昏半身不遂偏枯麻痺者  
 卽羌活愈風湯之變方也○冷痺加附子官桂  
 ○汗多加黃芪○熱盛加黃芩石膏  
 世濟  
 五論湯 治中風諸病之總司也  
 人參 五分 白朮 茯苓 三分  
 當歸 一分 川芎 熟芩

中風

半夏各一錢 陳皮七分 南星一錢 天麻一錢

防風各一錢 羌活各一錢 獨活各六分 生地一錢

黃芩各八分 黃連各八分 黃檗四分

水煎入竹瀝薑汁溫服○左癱血虛外血加秦

芫桃仁紅花○右癱氣虛溼痰加黃芪木香烏

藥○痰迷心竅舌強不言加遠志菖蒲枳實瓜

婁○口眼喎斜加白芷疆蚕○痰盛加枳實瓜

婁○肢體頑麻加烏藥疆蚕桂枝○筋骨疼痛

加桂乳香沒藥○頭目眩暈并頭痛加白芷蔓

荊藁本○癱瘓加牛膝瓜

荊藁本日此方論氣虛而用此瓜  
四物論痰而用二陳南地論風而用二活防  
風天麻論熱而用芩連生地黃藥方調治氣  
血痰熱風五者無有偏勝此所以為調理之

良劑也

左癱血虛在左半身緩桃紅四物最宜嘗

丹溪○四物湯加桃仁紅花竹瀝薑汁

半身不遂在左屬氣血少血宜之○龔氏醫案

日中風滿身刺痛四物湯加荊芥防風蔓荊蠅

退麥門冬○薛氏摘要加釣藤鈎

○加減潤燥湯 治左半身不遂手足癱瘓語澀

筋痛痰火熾盛眩暈心悸醫鑒名愈風潤燥湯

當歸一錢 芍藥二錢 川芎一錢 熟地八分

桃仁六分 紅花四分 生地八分 陳皮八分

半夏一錢 茯苓一錢 南星各一錢 甘艸四分

羌活一錢 防風一錢 薄桂各六分 白朮一錢

天麻一錢 黃芩八分 黃藥三分 牛膝

酸棗仁各八分

水煎入竹瀝薑汁溫服○手不遂倍苓桂○足不遂倍藥膝

楚氏曰四物生血桃紅活血好血生血活則血燥自潤二陳南星去痰去風生地液生而納血無如風熱去則潤藥涼熱燥物無如風熱去則潤酸棗補心主血也白木補脾心之乃薄桂走手牛膝下足為上下使也此以

右煥

氣虛身右兼痰溼乃用六君子竹瀝薑

溪丹○四君子湯合二陳湯加竹瀝薑汁

在右屬痰與氣虛宜之○肥人多溼少加附子行經○薛氏加釣藤鈎

丹

補中益氣湯

治肥人憂思氣鬱右手癱口渴

有痰加半夏瀝汁○楚氏曰立齋薛氏常治中

風諸症用補中益氣湯兼六味地黃丸補脾肺

肝腎培其本而戒疎散攻下之峻劑誠中風治

法之王道也後學宜諳之○龔氏醫鑒曰中風

面目十指俱麻乃氣虛也益氣湯加木香附子

羌活防風烏藥

春回

加減除溼湯

治右半身不遂手足癱瘓醫鑒

鄭中山方

人參八分 白朮二錢 茯苓一錢 甘艸五分

陳皮 半夏 烏藥 枳殼

當歸 芍藥 川芎 蒼朮

白芷 九分 桔梗 八分 羌活 一錢 防風 八分

黃芩 黃連 各一錢 生薑 三片

水煎溫服 ○身痛加薑黃 ○脚痛加牛膝防已

葳靈仙 楚氏曰此方四君補氣二陳去痰蒼芷除溼羌防桔梗解風芩連涼熱乃氣虛溼痰而中於風熱之方也然補氣而不順則有壅滯之患故用烏枳氣虛則血不行故歸芍芎行之

氣血兩虛癱左右十全大補乃能康  
俱左  
春回  
○加味太補湯 治左癱右瘓年久不愈大補虛寒之劑也

人參 黃芪 白朮 茯苓  
川芎 當歸 芍藥 地黃 各一錢  
木香 烏藥 沉香 牛膝 各三分

杜仲 木瓜 薏以仁 防風  
羌活 獨活 各五分 附子 桂

薑棗煎服

楚氏曰四味補氣四味補血三味順氣二味走骨二味走筋三味去風二味溫內甘州和諸藥此乃萬寶回春湯之變方

五瀝 言語澀難轉舌散地黃飲子腎虛傷

○省風清痰轉舌湯 治口眼喎斜舌強難言

防風 七分 天麻 八分 防已 黃芩 各一錢  
蝎稍 七分 蟬蛻 八分 陳皮 半夏 各一錢  
枳殼 各一錢 茯苓 八分 甘州 五分 南星 五分  
薑三片 竹茹一團 水煎服

舌瘡

世

○河間地黃飲子

治腎虛弱舌瘡不能言足廢

不能行

熟地黃

巴戟

山茱萸

肉蓯蓉

石斛

大附子

五味子

白茯苓

石菖蒲

遠志

桂心

麥冬各等分

每一兩入菝荷少許薑棗水煎服

口喎

貝母瓜蒌湯 治肥人中風口喎麻木左右俱

中風不語舌根

作痰治

瓜蒌

南星

荊芥

貝母

羌活

黃蘗

黃芩

防風

陳皮

白朮

半夏

黃連

瓜蒌

白朮

半夏

中風不語舌根硬三羊便醫合相和研以生

桂

甘州

葳靈仙

天花粉各等

卒不得法者人乳羊合美酒方

○壅氏曰案中風口喎斜無他症者主之

集要為貝母瓜蒌湯而標名故從之○心法曰

多食溼麩加附子竹瀝薑汁酒一匙行經

○牽正散 治口眼喎斜半身不遂者

楊氏家藏方

白附子

僵蠶

蝎稍

並生用為末每服二錢酒調下

其治也星夏之輩足以治溼土之痰而虛風之痰非也星夏之輩足以治溼土之痰而虛風之痰非也

所謂衰之以屬也

中風

一四



世壽。○天仙膏。治口眼喎斜用艸烏南星白及疆蠶  
為末薑汁調塗如歪向左塗右向右塗左正即  
洗去。

考。○改容膏。治口喎。蓖麻子一兩龍腦二分共搗  
為膏塗如前法如寒月加乾薑附子各一錢。

風氣侵筋安保散。頭風入絡愈風。攘首風。附子。摩  
頭妙。附子。麋街酒與房。

筋。○舒筋保安散。治左癱右瘓筋脉拘挛身體不  
遂。脚腿少力。乾溼脚氣及溼滯經絡久不能去。  
宜導諸氣。

- 木瓜 五兩 萹薹 五靈脂 牛膝
- 續斷 疆蠶 松節 白芍

烏藥 天麻 葳靈仙 黃芪  
當歸 防風 虎骨 各一兩  
右用無灰酒一斗浸二七日緊封扎取出焙乾  
搗末每二錢用浸藥酒半盞調下酒盡用米湯  
下一方加狗脊一兩

- 蒼朮 酒浸 白芷 川烏 艸烏 炮四兩
- 天麻 當歸 防風 荊芥
- 何首烏 炮 麻黃 石斛 酒洗 甘艸 各一兩
- 川芎 五錢

為末蜜丸。彈子大。每服一丸。臨臥清茶下。勿見  
風忌。三白。○墊氏曰。血風疼痛。加乳沒五靈脂。

頑風。回春。

苻菜根○常用去艸烏麻黃換黃芪白花蛇尤

妙

首風

附子摩頭散 治因沐頭中風多汗惡風當先

風一日而病甚頭痛不可以出到日則火愈名

曰首風 出金匱要畧方

大附子 炮一箇

鹽 等分

為散沐了以方寸七摩痰上令藥力行

瘧風

瘧街湯 治因醉中風惡風多汗火氣口乾善

渴近衣則身熱如火臨食則汗流如浴骨節懈

惰不欲自勞名曰漏風

澤瀉

白朮 各一兩 瘧街 半兩

為末每二錢酒飲任調下食前服

內風

附子湯 治房室竟中風惡風多汗汗出沾衣

口乾上瀆不能勞事身體盡痛名曰內風

附子

人參 各半 茴香 茯苓

山藥 各二錢半 甘艸 乾薑 炮各七錢半

每四錢水二盞薑三片鹽少許煎至七分去滓

食前服

華陽隱君每用左半身不遂者以四物湯加羌活防風紅花  
桃仁入竹瀝姜汁右半身不遂者以六君子湯加南星枳實烏  
菜羌活入竹瀝姜汁左右俱不遂者以大全大補湯杜仲午  
膝木瓜薏苡仁羌活獨活烏菜沉香木香附子相消息而  
月之命詳病家要覽  
華陽君曰中風每汗惡寒統命湯加廣防風杏仁依本方一倍  
名桂黃統命湯有汗惡風桂支芍藥杏仁加一倍名至聖統命  
湯右二症大凡至中風也陽明至症每汗身熱不惡寒其根

傷暑

桂支黃芩依本方加一倍名白虎續命湯大阴至症每行身凉也  
附子倍乾姜加丹草名附子續命湯少阴至症有汗無漿  
桂支炮附子及井中本方加一倍名桂支續命湯六至混濁係于  
少阴用或散節牽痛或麻木不仁加羌活連芫于本方  
羌活名羌活連芫續命湯  
三年中凡松葉一斤細切以酒一斗煮取三升頓服汗出立愈  
千金方

傷暑中暑者為患菜下即甦一切暑者菜不及此人所不知  
半夏一兩醋五碗煮乾耳少用  
吳茱萸湯治胃暑或傷冷物或忍飢或大怒乘舟車傷動胃  
氣轉筋逆冷  
吳茱萸木食鹽各等分同炒焦水三升煮取一升  
沸合茶煎至二升服如無茶用鹽撮強者罇耳十三醋鐘煎令服  
暑月感冒或吐或泄濕熱浮利等症用之  
菜候桂赤  
厚朴湯治乾霍亂厚朴枳殼良姜枳即朴硝各七兩水煎  
冬葵子湯治乾霍亂二便不通煩熱回亂冬葵子清石香薷諸

木瓜一枚去皮剉末每服五錢

暑

頭疼 煩熱

傷暑頭疼煩熱渴香薷散劑入黃連

方○香薷散 治吐利心腹疼痛霍亂氣逆發熱頭  
痛轉筋煩悶昏重而欲死者

香薷 一斤 扁豆 厚朴 各半

右末每三錢水一盞酒一分同煎七分去滓水  
中沉冷服○活人書方不用扁豆加黃連四兩  
劉薑汁同炒黃色名黃連香薷飲○丹溪心法  
曰交痰加南星半夏○虛加人參黃芪○龔氏  
回春曰暑風搐搦加羌活○瀉利加白朮茯苓  
○脉虛弱合生脉散○虛汗不止加黃芪白朮

○心煩加山梔黃連硃砂 ○胸脹加枳殼桔梗  
 小便不利加茯苓滑石 ○嘔吐加藿香陳皮薑  
 汁 ○渴加葛根天花粉  
 蓬溪李氏曰香薷乃夏月解表之藥如冬月  
 用麻黃氣虛者尤不可多服  
 黃連之苦入心却熱而治煩心暑邪結胸中  
 非厚朴不散暑邪陷脾胃非扁豆無以和之  
 然必冷服者經所謂治溫以清涼而行之是  
 也

六和療嘔而便瀉天水五苓溺赤煎  
 瀉利 間河

- |    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 人參 | 白木 | 茯苓 | 甘艸 |
| 香薷 | 厚朴 | 扁豆 | 縮砂 |
| 杏仁 | 木瓜 | 藿香 | 半夏 |

薑棗水煎服  
 薑棗水煎服  
 之總司故凡六和者不和之病先於脾胃而調  
 之能散逆氣故用半杏淡能開胃竅故用藿香  
 甘能利溼調下氣故用厚朴夫開胃去弱故用  
 除利溼平蓋脾則二便治治則水精四布五經並  
 行雖百疾於六府乎  
 和矣况於六府乎  
 治伏暑身倦神昏吐利  
 選百乙方

十味香薷飲  
 香薷 二錢  
 人參  
 白茯苓  
 白扁豆  
 黃芪 各一錢  
 木瓜  
 厚朴  
 甘艸 各半錢  
 水二盞煎至一盞去粗溫服  
 薑溪吳氏曰暑能傷氣故身體倦怠神思昏  
 沉暑邪陽邪故併於上而頭重暑邪干胃故

五卷之二

既吐且利火熱橫流肺氣受病人參黃芪益  
肺氣也肺為子脾為母肺虛者宜補其母木  
苓豆皆補母也火為母土為子火實者宜  
瀉其子厚朴陳皮平其敦阜即瀉子也香薷  
消香散暑邪而破溼熱木風之酸收陰氣而  
消脾溼脾氣調則吐利自息肺氣復則倦怠

渴燥  
潮赤

本

○益元散

又名天水散太白散六乙散解中暑

傷寒疫癘煩熱吐瀉淋瀝止渴

滑石 六兩 甘州 一兩

為末每三錢蜜少許溫水調下實熱新汲水下  
○五苓散 中暑頭痛惡心煩躁心下不快主之

○局方日神思昏悶加硃砂名辰砂五苓散  
止是內傷生冷物理中麩藥縮砂駢

傷生冷

醫

理中湯加神麩麥芽蒼朮縮砂

李打散子

治伏

治外不受寒止是內傷冰水冷物腹痛泄瀉或  
霍亂吐逆者此專治內溫中消食也

縮脾飲 解伏熱除煩渴消暑毒止吐利霍亂  
之後服熱藥太多致煩躁者並宜服之

扁豆 葛根 烏梅

每四錢水一大碗煎八分以水沉冷服

薑溪吳氏曰夏月伏熱為酒食所傷者此方  
主之破仁艸果所以消肉食烏梅乾葛却暑  
而除煩扁豆甘州助脾而益胃

過涼

○五積散 治人避暑於房室之內為陰寒所遏

陽氣頭痛惡寒身形拘急肢節痛而煩心肌膚

小兒宿口婦人患  
夏疾午後較而  
有泉黃柏  
共陳皮當歸  
蒼木生耳中

大熱無汗者宜用辛溫之劑以解表散寒主之  
藿香正氣散 治夏月取冷之過外感風寒內  
傷生冷頭疼身痛發熱惡寒或惡心嘔吐泄瀉  
腹脹○依本方外感重加蒼木羌活去木內傷  
重加縮砂神麩

○參歸益元湯 治注夏病頭疼脚軟食少體虛  
者

- 人參 五分
- 茯苓 一錢
- 甘艸 三分
- 當歸 三分
- 芍藥 熟地 各一錢
- 麥冬 各一錢
- 五味子 十粒
- 知母 黃檗 陳皮 各七分

棗一枚烏棗一箇炒米一撮水煎服○飽悶加

縮沙白薏○瀉加白朮山藥○虛汗加黃芪白  
木○憂遺加牡蠣山藥

炎熱 金干 生脉散 治夏月熱傷元氣汗大出欲成痿厥  
人參 五味子 麥門冬 各等分

水煎服○東垣先生曰六七月溼熱方旺人病  
骨乏無力身重氣短頭旋眼黑甚則痿軟故孫  
真人以生脉散補其天元真氣脉者人之元氣  
也人參之甘寒瀉熱火而益元氣麥冬之苦甘  
寒滋燥金而清木原五味之酸溫瀉丙火而補  
庚金兼益五藏之氣也又曰夏月服生脉散加  
甘艸黃芪令人氣力湧出○李氏入門曰不得  
服人參與五味者白朮烏棗代之

長夏溼蒸方盛體虛困清暑補中益氣全

治長夏溼熱蒸人四支困倦精神減少懶於動作胸滿氣促肢節疼痛或氣高而喘身熱而煩心下飽悶小便黃而數大便溏而頻或利或渴不思飲食自汗體虛

黃芪 蒼朮 升麻 人參 澤瀉 神麩 陳皮 白木 麥冬 當歸 甘艸 青皮 葛根 五味子

黃芪 二分或三分 蒼朮 各一錢 升麻 各一錢 人參 各五錢 澤瀉 各三錢 神麩 各五分 陳皮 各五分 白木 各五分 麥冬 各三錢 當歸 各五分 甘艸 各三錢 青皮 各五分 葛根 二分 五味子 九枚

水煎溫服

論曰暑邪干衛故身熱自汗以黃芪甘溫補之為君參歸艸陳甘微溫補中益氣為臣二木澤瀉滲利而除溼升葛甘苦平善解肌熱又以風勝溼也溼勝則食不消而作痞滿故

益氣加減汁多  
老津用也加五果  
子粒栢方知母方  
濕熱乘胃則則痔  
弱每方加知栢大便  
秘法加當級生地  
九仁麻粒

轉筋者兼凡木 建中加木瓜湯柴胡湯或平胃散加木瓜 一厥冷唇  
香兼寒氣建中加附子乾姜湯 身熱煩渴氣厥兼暑熱桂枝湯  
木散香需散 體重骨節煩疼兼濕化除濕湯或二木厚朴陳皮  
厚荻荈栢荈之荈凡暑合病石膏理中湯暑濕相搏二香散多  
食寒者六和湯倍霍香煎調糗香圓情志鬱結七氣湯轉筋  
逆冷吳茱萸湯或通脈四逆湯 邪在上者宜吐魚已自吐利乃當吐之  
以撮其氣吐利不止元氣耗散病勢危篤或口渴喜冷或惡寒逆冷  
或發熱煩燥去衣被此陰盛格陽不可以其喜冷欲去衣被為據理中  
湯甚者加附子四逆湯并宜冰冷服之 霍亂已透餘吐餘瀉未已腹  
有餘痛宜口不報秋豆葉煎服乾者尤佳 大霍香散 治脾胃虛  
寒吐霍亂心腹撮痛如泄瀉不已最取効 霍香散 陳皮厚朴香  
皮木香人多肉荈荈神曲麥芽訶子白茯苓炙甘草各二兩炮姜為  
末右孫東宿

內科摘要清暑益氣湯 治元氣弱暑熱大乘之精神困倦會滿  
 氣促肢節疼痛或小便黃數大便溏頻又暑熱浮刺瘧疾之良  
 劑也 升麻黃芪 益氣 蒼朮 陳皮 神曲 枳殼 芍藥  
 乾葛 各三五味 王節 齊曰夏月傷暑發熱汗大出每氣力  
 脈虛細而邊此暑傷元氣也 人參 黃芪 麥門 白芍 陳皮 茯  
 苓 芩 王連 耳 少 白木 殘 知母 香 需 解 夏暑如在途中常  
 服壯元氣 身暑免中暑 霍亂吐利等症 人參 麥門 白芍  
 茯苓 五果 子 粒 白木 殘 耳 少 知母 陳皮 香 需 解 七 黃 苓 三 方  
 夏秋暑熱因過飲食冷物傷內又取涼風傷外以致惡寒發熱胸  
 膈飽悶飲食不進或吐泄浮此內外俱傷寒冷也 人參 黑 姜  
 杜 陳皮 羌活 枳實 白茯苓 白木 殘 耳 少 三 方 俱 入 姜

病者一身疼痛發熱日晡所劇者名風濕以病傷於汗出  
 當風或久傷取冷所致也可與麻黃杏仁薏苡甘草湯  
 凡濕相搏骨節疼痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小  
 便不利惡風不欲去衣或身微腫者耳草附子湯主之

溼

裡溼溼邪在裏成諸病溼溼五苓作總司  
 春回 滲溼湯 治一切溼症

- 陳皮 澤瀉 猪苓 白木
- 茯苓 蒼朮 川芎 香附子
- 厚朴 縮砂 甘艸
- 薑一片 燈心 一團水煎服

表溼風溼并來侵表者除風溼防已黃芪

風溼 除風溼羌活湯 風溼相搏一身盡痛者主之  
 羌活 防風 升麻 柴胡  
 藁本 蒼朮



水煎溫服

金匱

防已黃芪湯 治風溼脉浮身重汗出惡風

防已 一兩 黃芪 錢一兩二

甘艸 半兩

白朮 七錢

每五錢薑四片棗一枚水盞半煎八分溫服

喘加麻黃○胃氣不和加芍藥○氣上衝加桂

枝○下有沉寒加細辛

花溪虞氏曰溼勝身重陽微中風則汗出故用芫艸以實表防朮以勝溼

寒溼局方溼祛寒溼甘艸附湯五積宜

局方

溼溼湯 治寒溼所傷身重腰冷如坐水中小便或澁或出大便澇泄腰下重疼兩脚疼痛腿

膝或腫或不腫小便利反不渴者王之

炮乾薑

茯苓 各二兩

蒼朮

甘艸

白朮 各一兩

陳皮

丁香 各二錢半

每四錢水一盞半棗一枚薑三片煎七分溫服

壽世

五積散 治寒溼客於經絡腰脚酸疼渾身麻

木

金匱

甘艸附子湯 風溼相搏骨節煩疼掣痛不得

屈伸若汗出短氣小便不利惡風微腫者王之

甘艸 二兩

附子 二枚

白朮 二兩

桂枝 四兩

水六升煮取三升溫服○若不嘔不渴脉浮虛

者去朮加薑棗名桂枝附子湯○若小便自利

大便堅者去桂加薑棗名白朮附子湯○朱氏

活人曰身腫者加防風悸氣小便不利加茯苓

溼熱 成氏曰桂枝之甘辛發散風邪而固衛附木之辛甘解溼氣而溫經

奇效 溼熱求奇效 溼熱相搏

黃礬 二錢 黃連 茯苓 澤瀉 各一

蒼朮 白朮 各一 甘州 五分

水煎服

氏 芩連除溼湯 治溼熱傷上焦頭重苦痛目赤

耳聾鼻塞浮腫黃疸等症

黃芩 黃連 蒼朮 茵陳

羌活 蔓荊

薑五片水煎熱服取汗

脾溼 脾虛受溼煎平胃正氣六君擇用治

王 對金飲子 治脾胃受溼腹脹不食身重皮膚

微腫肢節酸痛

平胃散 一兩 桑白皮 一兩

薑水煎服

丹溪先生曰平胃散治溼上焦之藥也經云

而止又云溼在上宜以微汗而解

不欲汗多故不用麻黃乾葛輩

傷寒門名曰對金飲子案局方出平胃散方於

桑白皮劉氏取之特為加桑白皮之名也蓋

取脾藥而對肺藥有子母相生之妙也

繩 除溼湯 治寒溼所傷身體重著腰脚酸疼大

便瀉泄小便或澀或利 白朮 茯苓

即不換金正氣散加

氏堃 六君子湯加蒼朮厚朴  
脾胃虛而溼甚者主之

腎溼獨活寄生湯并腎著腎虛受溼最能夷

因腎著湯 治身重腰冷痺如坐水中形如水狀  
反不渴小便自利食飲如故病屬下焦從身勞  
汗出衣裡冷溼久而得之腰以下冷痛腰重如  
帶五貫錢

甘艸 白朮 各二兩 炮乾薑 茯苓 各四兩  
每四錢水盞半煎七分食前服

薑溪吳氏曰乾薑辛熱之物辛得金之燥熱  
得賜之令燥能勝溼陽能曝溼故象而用之  
木艸甘溫之品也甘得土之味溫得土之氣  
土勝可以制溼故用以佐之自茯苓淡之品  
也甘則益土而以防水淡則開其  
竅而利之此圍師必缺之義也

燥

表燥表燥皮枯潤膚飲

正傳 生血潤膚飲 治體膚虛弱血少皮膚拆裂手  
足枯燥搔之屑起血出痛楚

當歸 生地 熟地 黃芪 各一錢  
天門冬 半錢 麥門冬 錢一 五味子 九粒  
黃芩 瓜蒌 桃仁 紅花 各五分  
升麻 二分

水二盞煎一盞溫服○如大便結燥加麻仁郁  
李仁各一錢

裡燥裏燥生津消渴甚

門入  
活血潤燥生津飲 治禪病消渴

當歸 生地 熟地 天門

麥門 五味 瓜婁 麻仁

甘艸 天花粉

水煎溫服

腸燥大便腸燥潤腸湯陰虛火燥滋陰降火品

火

實火實火瀉之宜白虎黃連解毒乃輕方

○黃連解毒湯 治三焦實火內外皆熱煩渴小

便赤口生瘡

黃連 黃芩 梔子 黃礞

連翹 芍藥 芫胡

水煎食後服

甲山氏曰苦者瀉火黃芩味苦而質枯所以  
瀉上焦之火黃連味苦而潤所以瀉下焦之火  
仁味苦其性屈曲而能下行所以瀉五藏之  
火黃礞瀉腎膀胱火黃連瀉脾胃火柴胡瀉  
心小腸之火

肝胆火山梔瀉三焦屈曲火而夫火盛熾則  
陰血受傷故芍藥益榮血收陰氣而泄邪熱  
此方乃五藏六腑表裏  
上下為水劑之主藥

便堅裡實求承氣防風通聖表裡盪

虛火補之分氣血補中益氣氣虛常血虛四物加

知榮加味逍遙散用必當

火動陰虛滋陰降火湯人中白散甚神良

陽虛火衰如真火附子理中冷服康

鬱火發之分表裏表邪羌活沖和湯與麻黃湯少陽

半表柴胡小在裏升陽散火湯涼

肝火可清龍會劑清肝溫膽小柴神

傳○當歸龍會丸 瀉肝火大盛之要藥因內有溼  
熱兩脇痛甚伐肝木之氣肝實宜之河間先生方

當歸

龍膽

盧會

山梔

黃連

大黃

青黛各五錢

木香二錢半

麝香五分

為末麪糊丸梧子大每二十丸薑湯下○一方

加青皮一兩熱甚者烘熱服○一方加苓朮各

一兩蜜丸小豆大廿三

摘○柴胡清肝散 治肝胆二經風熱怒火頸項腫

痛結核不消或寒熱往來嘔吐痰又治婦人暴

怒肝火內動經水妄行胎氣不安等症

芫胡

黃芩各一錢

黃連

山梔各七分

當歸

川芎六分

芍藥

牡丹皮各一錢

升麻

甘艸三分

火

二七七

水煎服若脾胃弱去苓連加茯苓  
溫胆湯 胆熱嘔痰氣逆吐苦夢中驚悸主之  
方考 要小柴胡湯 治肝胆風熱或寒熱往來或肺熱  
潮熱或怒火口苦耳聾咳嗽瀉利腸腹作痛諸  
症○加牡丹皮山梔名加味小柴胡湯

心火三黃三補涼心火

千金○三黃丸 瀉五藏火

黃芩 黃連 大黃

為末蜜丸烏豆大米飲下

曹溪吳氏曰心膈實熱狂燥面赤者此方主  
之味之苦者皆能降火黃芩味苦而質枯黃  
連味苦而氣燥大黃苦寒而味厚質枯則上  
浮故能瀉火於膈氣燥則就火故能瀉火於  
心味厚則喜降於道水流溼火就燥之義也  
親上親下之道水

丹溪○三補丸 治上焦積熱泄五藏火

黃芩 黃連 黃礞 等分

為末蒸餅丸梧子大每白湯下二三十九丸

曹溪吳氏曰心火無物不生非火之火  
無物不耗內經云壯火食氣是也故壯火則  
氣得其生血得其養而三焦皆受益矣故曰  
三補

肺火 涼膈上焦肺火鎮

方局 涼膈散 治藏府積熱煩躁多渴面熱頭昏唇

焦咽燥舌腫喉閉目赤鼻衄口舌生瘡痰實不  
利涕唾稠粘睡臥不安譫語狂妄腸胃燥澀便  
溺祕結一切風壅並宜服之

大黃 芒硝 甘草 各二兩 連翹 四兩

東垣加減涼膈散  
本方去大黃芒硝  
加桔梗竹葉治六  
主搜及傷寒餘  
保命名桔  
梗散治身  
多渴者  
是也  
焦

山梔

黃芩

菝葜

各一兩

竹葉

七片

每二錢水一盞入竹葉七片蜜少許煎七分食後溫服。○王氏難知曰易老法涼膈散去硝黃加桔梗同為舟楫之劑浮而上之治胸膈中與六經熱名曰加減涼膈散。○龔氏壽世曰咽喉痛加桔梗煎茶。○酒毒加葛根黃連。○咳嗽加半夏生薑。○衄嘔血加生地赤芍。○小便淋瀝加滑石茯苓。○風眩加防風川芎。○斑疹加荊芥赤芍。○咳嗽加桑皮杏仁。○結胸加桔梗枳殼。○譫語發狂加生地赤芍。○眼生翳膜赤澁流淚加菊花木賊。

蔓溪吳氏曰荊梔味苦而無氣故瀉火于中連翹薄荷奇味薄而氣薄故清熱於上太黃芒

脾火

胃火中焦投芍藥

硝鹹寒而味厚故諸實皆瀉用此州者取其性緩而戀膈也

春回

芍藥湯

治脾火或消穀易飢或胃熱口燥煩渴或脣生瘡

芍藥

山梔

黃連

石膏

連翹

菝葜

甘州

水煎服

○加味清胃散

瀉胃火

方見牙齒

腎下

下焦腎火通關

丸珍

方滋腎丸

腎火起於湧泉之下者主之。○熱自足心直衝股內行人腹者謂之腎火起於湧泉之下知藥

苦寒水之也故能滋益腎水肉桂辛熱火之屬也故能假之反佐此易所謂水流濕火就燥也

丹溪○大補丸 治陰火

黃檗一味酒炒為末粥丸或水丸煎四物湯送下氣虛四君子湯下

豐溪吳氏曰腎非獨陰也命門之火寄焉腎水一虧則命門之火無所養而自熾矣故龍雷之火從腎下動也折之者制其衝逆也味苦而厚為陰中之陰故能制其衝逆也火去則陰生故曰大補丸云壯水之主以制陽光則陰之謂也氣虛下以四物湯助其滋其寒涼而壞脾也血虛下以四物湯助其滋陰而制火也

三焦實火黃連解毒湯 六府益元六九勻

方考○益元散 六府有實火上煩渴下有便秘赤澁者主之 滑石性寒故能清六府之熱甘州性平故能緩諸火之勢

氣分氣分火患投白虎清心蓮子飲主虛人苓連四物

血分清涼飲血分火患兩劑論





卷之三

勞倦傷

勞力勞倦內傷初發熱補中益氣乃君方

初傳脾  
熱中胃

補中益氣湯 治脾症初得則氣高而喘身熱而煩其脉洪大而頭痛或渴不止皮膚不任風

寒而生寒熱

黃芪一勞甚 甘艸炙各五分 人參三分 當歸二分

陳皮二分 升麻二分 或

柴胡二分 白朮三分 或

水二盞煎一盞溫服○以手捫之而肌表熱表症也口以益氣湯一二服得微汗則已非正

發汗乃除 妨氣和自然汗出也。○若更煩亂如  
腹中或周身有刺痛皆血澁不足加歸身。○脇  
下痛或縮急加柴胡甘州。○精神短少加人參  
五味子。○春初猶寒少加辛熱之劑以補春氣  
之不足為風藥之佐益智州蔻是也。○春月太  
溫加佛耳州款冬花。○夏月加苓連。○秋月加  
柝榔子州豆蔻白豆蔻縮砂仁。○冬月加益智  
州蔻。○頭痛加川芎蔓荊。○頂痛腦痛加藁本  
細辛。○頭痛有痰沉重懶倦者乃太陰痰厥頭  
痛也加半夏生薑。○夏月嗽加五味子麥門冬  
○冬月嗽加不去根節麻黃。○久病痰嗽肺中  
伏火去人參以防痰嗽增益耳。○食不下乃胸

中胃上有寒或氣澁滯加青皮木香陳皮。○口  
乾噤乾者加葛根升胃氣上行潤之。○心下痞  
忤悶者加芍藥黃連。○如痞腹脹加枳實木香  
砂仁厚朴天寒少加乾薑桂心。○不能食而心  
下痞加生薑陳皮能食而心下痞加黃連枳實  
○腹痛加白芍炙甘草冷痛加中桂熱痛加生  
苓。○腹痛在寒涼時加半夏益智州蔻之類。○  
臍下痛加熟芩如不已者大寒也加肉桂五分  
○丹溪先生曰氣虛甚者必少加附子以行參  
芪。○氣。○挾痰者加半夏更以竹瀝薑汁傳送  
○龔氏。○鑿曰或少加黃蘗以救腎水而瀉陰  
中之伏火。○和花三分入心養血。○回春曰有

卷三  
三  
二

用心太過神思不寧或怔忡

神遠志石菖蒲○虛火上炎加知母

黃蘗○夢遺加牡蠣龍骨○下部無力加牛膝

杜仲

論曰夫脾胃虛者因飲食勞倦心火亢甚而  
乘其土位其脾次虛者因受邪氣先絕其元氣  
以益其毛而閉腠理不令自汗損其元氣上  
喘以氣短火人參而補之令自汗損其元氣上  
甘以太瀉火熱而補脾宜多用之氣若脾胃急痛  
光以太瀉火熱而補脾宜多用之氣若脾胃急痛  
之氣在木虛腹中急縮者宜多用之氣若脾胃急痛  
甘溫之下必加甘溫升麻柴胡以引之散解而實其  
表也又緩氣味上升能補衛氣之散解而實其  
陰中之陽引清氣上升也氣亂於胃中為清  
濁相干用引去白陳皮以理之氣助於胃中為清  
升以散胃滯氣助諸甘辛為用也口乾益乾如  
之氣榮血大虧榮氣不營陰火熾盛是血中

伏火熾盛日漸前熱血氣日減心包與心主  
之血者則心惑而煩不致不安也故加辛溫何能  
悅血者則心惑而煩不致不安也故加辛溫何能  
之血者則心惑而煩不致不安也故加辛溫何能  
生血者則心惑而煩不致不安也故加辛溫何能  
能瀉陰血中之火以當歸和之參補之甘溫何能  
補腎水以鎮固之心火則愈○降如氣浮心亂以  
砂安神丸鎮固之心火則愈○降如氣浮心亂以  
損氣此元氣則喜傷也益氣則愈○降如氣浮心亂以  
是飲此元氣則喜傷也益氣則愈○降如氣浮心亂以  
若未傳為寒中則不可節始病主之脾夫土人勞倦則  
其病如參五藏六府百骸九竅皆若飢困於脾  
溪吳氏曰五藏六府百骸九竅皆若飢困於脾  
胃而後治故曰五藏六府百骸九竅皆若飢困於脾  
傷其脾胃則甘溫之品以受氣而皆病是方也  
參其味甘則甘溫之品以受氣而皆病是方也  
之氣味甘則甘溫之品以受氣而皆病是方也

物皆从觀乎天

升降而用升麻柴胡之

白東垣以凡五藏六腑之方而更其論何也余衆體之母是發東垣此方惟上焦痰嘔中焦氣更論南豐李氏曰此未發而廣其意耳豈溼熱及傷食膈滿者不宜

惑辨

參木調中湯

瀉熱補氣止嗽定喘和脾胃

人參 三分

黃芪 四分

白朮 五分

甘州 三分

陳皮 二分

桑皮 三分

麥冬 三分

青皮 三分

地骨皮 各二分

茯苓 各二分

五味子 二十箇

水二盞煎一盞溫服

論曰內經云火位之主其瀉以甘以黃芪甘溫瀉熱補氣桑皮苦微寒瀉肺火定喘故以爲君肺欲收急食酸以收之以五味子之酸收耗散之氣止咳嗽脾胃不足以甘補之故

脾胃

調中益氣湯

四支滿悶肢節煩疼難以屈伸

身體沉重煩心不安忽肥忽瘦四支懶倦口失滋味腹難舒伸二便清利而數或上飲下便或大便澁滯不行一二日一見餐泄米穀不化或便後見血見白膿胸滿短氣膈咽不通或痰嗽稠粘口中沃沫食入反出耳鳴耳聾目中流火視物昏花努肉紅絲熱壅頭目不得安臥嗜臥無力不思飲食脉弦洪緩而沉按之一澁者主之

黃芪 一錢

人參

甘州 各五分

柴胡

各五分

柴胡

柴胡

陳皮 升麻 各二分 蒼朮 五分 木香 一分或

水二大盞煎一盞帶熱宿食消盡服之○時顯

熱躁是下元陰火蒸蒸發也加生地黃藥○大

便虛坐不得腹中逼迫血虛血澁也加當歸身

○身體沉重雖小便數多亦加茯苓蒼朮澤瀉

黃藥○胃氣不和加半夏生薑

豐溪吳氏曰脾胃不調而氣弱者此方主之

脾胃不調者腸鳴泄瀉膨脹之類也氣弱者

語言輕微手足倦怠也補氣可以去弱故用參

苓甘州甘溫之性行則中氣不弱升柴足不

矣蒼朮辛燥能平胃中敦阜之氣升柴去胃

能升胃家陷下之氣木香陳皮辛香能去胃

中陳腐之氣夫敦阜之氣乎○長澤氏曰補

腐之氣去寧有不調之氣乎○長澤氏曰補

中益氣宜脾胃虛弱而腸內不調也補調之二

當歸

味

春加 菴智 秋 芩 芍 夏 藥 知 冬 月 附 薑

春加 菴智 秋 芩 芍 夏 藥 知 冬 月 附 薑

升陽順氣湯 治因飲食勞倦腹脇滿悶短氣

遇春則口淡無味遇夏雖熱猶有惡寒飢則常

如飽不喜食冷物

黃芪 一兩 半夏 三錢 州 薹 二錢 神 麩 一錢

升麻 芫 胡 當 歸 陳 皮 各 一

甘 州 炙 黃 藥 各 五 人 參 三 分

每三錢水二盞薑三片煎一盞溫服食前

論曰脾胃不足之症須用升芫苦辛味之薄

者陰中之陽引脾胃中之清氣行於陽道及

諸經生發陰陽之氣以滋春氣之和也又引

參芫甘州而為固也凡治脾胃之藥多以升

陽補氣名之者此也○豐溪吳氏曰清氣在

下濕氣在胃飽脹大便溏泄者此

方主之此皆由於飲食傷其脾氣不能升清

夏加脾胃知藥

○黃芪人參湯

脾胃虛弱上焦之氣不足遇夏

天氣熱盛傷元氣精神不足兩脚痿軟煩熱嘔  
噦自汗頭痛痰嗽心脇腹痛胸中閉塞小便頻  
數大便難而閉結皆熱傷肺之所致也當先助  
元氣理治庚辛之不足主之

黃芪

加一分汗多

升麻 六分 人參

橘皮

麥冬

蒼朮

白朮 各五分

黃礫

神麩 各三分

歸身

炙甘 各二分

五味子 九箇

水二盞煎一盞食前稍熱服○如行步不正脚  
膝痿弱兩足欹側者已中痿邪加酒洗知藥令  
二足湧出氣力也

論曰夫脾胃虛弱遇六七月間身重短氣其  
則四肢痿軟行步不正眼黑欲絕此腎水與  
胸膈俱竭當急救之滋肺氣以補水之源又  
使庚大腸不受邪熱不少令汗大泄也故以人  
參之其補元氣瀉邪熱火也麥冬之苦寒補水  
之源而清肅燥金也五味之酸瀉火補庚太  
腸與辛肺金也

○清暑益氣湯

治長夏溼熱成病詳見暑門

即益氣湯去柴加蒼朮澤瀉葛根神麩青皮

○升陽益胃湯

脾胃虛則怠惰嗜臥四支不收

時值秋燥令行溼熱火退體重節痛口舌乾食

長夏加寫  
秋加  
藥

無味大便不調小便頻數不嗜食食不消兼見  
肺病洒瀉惡寒慘慘不樂面色惡而不和乃陽  
氣不伸故也

黃芪 二兩 半夏 人參 各一

防風 白芍 羌活 獨活 各五

橘皮 四錢 茯苓 澤瀉 芫胡

白朮 各三 黃連 二錢

每三錢薑五片棗二枚水三盞煎一盞溫服

服藥後小便利而病加劇去茯苓澤瀉

論曰何故秋旺用參木芍藥之類反補肺為  
脾胃虛則肺最受病故因時而補易為力也  
一薑溪吳氏曰溼淫於內體重節痛口乾無  
味大便不調小便頻數飲食不消洒瀉惡寒  
面色不樂者此方主之溼淫於內者脾土虛  
弱不能制溼而溼內生也溼流於節故令體

冬加薑附

○神聖復氣湯 治氣乘冬足太陽寒氣足少陰

腎水之旺子能令母實乎太陰肺實又來侮土  
火木受邪腰背胸膈閉塞疼痛善噫九竅不利  
欬嗽痰沫上熱如火下寒如水頭痛惡風寒喜  
日陽夜臥不安風痺麻木筋牽肩痛等症皆是  
寒水來復火上之讎也

重節痛脾胃虛衰不能運化精微故令口乾  
小便頻數而飲食不消也酒新惡寒者溼邪  
勝也溼為陰邪故令惡寒溼淫於內體重節  
痛也伸屈不能方也水夏能燥溼而搜百節  
獨風柴能升舉清陽之氣而搜百節之溼黃  
連苦而燥可用之於瀉溼熱陳皮辛而溫可  
用之以平胃氣乃參以和榮甘草用之益氣  
白芍之性收用之以和榮氣而協羌附柴獨  
辛散之意古用辛散必用酸收  
和榮之意古用辛散必用酸收  
所以防其峻厲猶兵家之節制也

要考

勞傷

人參 當歸 升麻 甘草

陳皮 五分 黃芪 五分 芫胡 各一錢 附子 五分

乾薑 各三分 艸薳 羌活 各一錢 防風 五分

栝李 五分 半夏 七分 藁本 八分 葵花 五朵

生地 黃檗 黃連 枳殼 各三分

細辛 二分 川芎 蔓荊子 各三分

石二十三味水煎服

未傳 寒中

論曰凡脾胃之症調治差悞或妄下之末傳  
寒中復過時寒則四支厥逆而心胃絞痛冷  
汗出舉痛論云寒氣客於五藏厥逆上泄則  
氣竭夫六氣未入故卒然痛厥不知人氣復則  
生矣故也聖人以辛熱散之復其陽氣故曰  
寒邪客之得是則  
痛立止此之謂也

勞心脾弱勞心傷血者黃芪倍入建中湯

門入 黃芪建中湯 治勞心兼傷乎血而有汗者方

見汗症

聖氏曰黃芪甘州益氣治勞力芍藥肉桂益  
血治勞心乃建中氣使其生有榮衛通行  
津液之劑尤能  
止自汗盜汗也

雙心勞

雙勞心力傷氣血和劑雙和急可嘗  
辨 雙和散 大病後氣乏者以此調治

黃芪 川芎 當歸 熟苧 各一錢

肉桂 甘州 各七分 白芍 二錢

薑棗水煎服 南薑李氏曰治心力俱勞氣血  
俱傷或房室勞役等症 局方曰調中養氣益  
血和胃進食補虛損止盜汗之方也

五卷

勞傷

局方



東垣曰脾胃氣實則黃連枳實浮之虛則白朮陳皮補之平故不食能  
屬脾虛四君子補中益氣補之不効當補其母八味地黃二  
神一夾痰宜化六君子一夾鬱宜開音氣湯仇木宜安異功加香  
沉香子金宜顧肺金虛則盜竊土母之氣以自救而得益虛耳枯參苓  
之類 三錫許學吉有人全不思飲食補脾無効授二神丸服之頓能  
進此即補母法 丹溪曰惡食者胃中有物導導疾補脾二陳加三末  
香附川芎主之病久胃敗惡聞食氣大劑人參類之

論飲酒過傷

夫酒者大抵有毒氣味俱陽乃無敵之物也若傷之止當發散汗  
出則愈矣其次莫如利小便二者凡上下分消其濕今之酒病者往往  
服酒癥凡大抵之藥下之又有用牽牛大黃下之者是無敵元氣  
受病反下有形陰血無誤甚矣酒性大熱以傷元氣而復重浮之况  
亦損腎水真陰及有形陰血俱為不足如此則陰血愈虛真水愈弱  
陽毒之抵大旺反增其陰火是以元氣消止折人長命不然則虛損  
之病成矣酒瘳下之久已為黑瘳慎不可犯以葛花解醒湯主之  
食魚中毒煩亂或以癥積燒灰魚鱗水服二支時珍方

飲食傷

傷酒傷飲如輕宜解散葛花解醒日陽斜

輕散

葛花解醒湯 治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩  
亂胸膈痞塞手足戰搖飲食減少小便不利

- 葛花 白蔻 砂仁 各五錢 青皮 三分
- 木香 五分 陳皮 人參 楮苓
- 茯苓 各一錢半 神麩 澤瀉 乾生薑
- 白朮 各二錢

為細末每三錢白湯調下得微汗酒病去○  
氏曰酒性溼熱實而傷之者去參朮青香加蒼  
朮黃連枳椶子棗豆半夏烏梅尤良○酒痰隔

滿加瓜婁青黛

蔓溪吳氏曰葛花之寒能解中酒之毒，芍藥之淡能利中酒之溼，砂仁豆蔻木香青陳之辛能行酒食之滯，生薑所以開胃止嘔，神麩所以消磨炙膩而參朮之甘所以益被傷之

甚醒石葛寒之醒四物補中氣血邪

重

世壽

石葛湯

飲酒過多太醉難醒服之解之

石膏

五錢

葛根

生薑

各五分

水煎溫服

世壽

紫雪

傷酒太熱在亂者以取許葛粉湯調灌

立醒

傷血

致格

酒製四物湯

加炒片苓茯苓陳皮生甘艸酒

紅花生薑水煎調五靈脂末飲之氣弱者加酒

黃芪治多酒之人酒氣薰蒸面鼻得酒血為

極熱熱血得冷為陰氣所搏汗濁凝結滯而不

行成紫黑色須融

化滯血使之得

流滋生新血可以運化

上

傷氣

世壽

益氣湯

加葛花半夏枳殼芍藥神麩麥芽

治飲酒人元氣虛弱四支無力飲食減少面紅

如粧○小便閉加麥門冬○大便閉加桃紅澤

瀉

傷食

傷食輕消平胃散雲林龔氏用香砂

輕

方局

平胃散

治脾胃不和心腹脹滿刺痛化消宿

消

食

陳皮

厚朴

各五兩

蒼朮

八兩

甘艸

一兩

枳朮丸 治痞滿 每二錢水一盞薑二片棗二枚煎七分熱服○

食強胃 胃弱 脾胃論曰小便赤澁加茯苓澤瀉○米穀不化

右同極細末荷葉 食飲多傷加枳實○胸中痞氣加枳殼木香○

裏燒飯為丸如梧 枳子大每服五十丸多 枳氏曰案醫方考因粉傷者當加杏仁○瓜果

用白湯下 傷加糯米○魚肉傷加橄欖○糯米傷加白麩○

治老幼元氣虛弱 穀積加芽茶他加減法詳後平胃方後

飲食不消胸膈不調 丹溪先生曰蒼朮性燥氣烈行溼解表甚為

心下痞悶 實 橘 氣用之厚朴性溫散氣非脹滿實急者不用承

加二 右細末荷葉 氣太過日裂耗散之劑實無補土之甘經謂土

燒飯為丸如梧桐子每多氣多過日裂耗散之劑實無補土之甘經謂土

服五丸溫水送下食 使平便須却藥謂之平者非補之謂其氣

遠夫內傷用茶之大法 常服平實也又曰厚朴屬土有火其氣溫能瀉

所貴服之強人胃氣令 胃中平實也又曰厚朴屬土有火其氣溫能瀉

胃氣益厚金縷食 非謂溫補脾胃也習以成俗皆謂之補良哉

食重食而不傷此也 則生治腹脹者因其味辛以提其滯氣滯氣

用食藥者有也此藥之 則生治腹脹者因其味辛以提其滯氣滯氣

益胃氣令不復致傷 可寬中故用蒼朮若者下氣故用厚朴甘

也 用神麩麥芽 用甘其會造變化者能消食故

年夏枳朮丸 回 香砂平胃散 治傷食

治因冷食內傷春 砂仁七分 甘艸 木香各五分 枳殼

加芩連太黃少許

堃氏曰傷食者輕則腹脹滿痛嘔吐瀉利... 脾中胃也脾寬則宿食易化矣脾降胃寬則... 脹滿自退矣中不和則脾胃自調而無餘滯矣尤... 可為消食之主方也

重而除下寒備急熱者枳實大黃加

枳實大黃湯 治傷熱物胸腹痞脹大便不通

者

枳實 厚朴 大黃 枳榔

甘州

水煎空心熱服以利為度○腹痛甚者加木香

或瀉而腹不寬是也此方也枳枳黃枳俱

重而除下 傷熱

冷醫 傷

痛方見邪崇

備急丹 治胃中停滯寒冷之物及諸心腹卒

豐溪吳氏曰飲食自倍填塞至陰上焦不行... 故用大黃巴豆奪命之將軍以主之佐以辛

氣立孤危是也今人腹痛欲死經云升降息則... 故用大黃巴豆奪命之將軍以主之佐以辛

利之乾薑則其性... 益速而効益捷矣

附子理中湯 口食冷物客寒犯胃中焦痛甚

脈沉遲者急以此方主之

考曰凡吞冰飲泉及一切冷物食之過其分... 量則寒氣凝于中焦故令肚腹大痛脈來沉... 溫者為裏寒遲者為寒是方也薑附之辛熱所以... 傷中散寒參木甘草之甘溫所以益胃於積

重而除下 在中治已盡又如在上吐能瘥

蜜麥參和木凡 閉胃進食 乾姜二錢 實兩 九法同前 溫水送下 前忌飽食

去則吐

○鹽湯探吐法 飲食自倍胸膈飽脹宜以此方

吐之

燒鹽 四合

溫湯 二升

和勻飲之以指探吐

考曰經云陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味故飲食過之則胸膈飽脹者勢也其在五味而傷生孰若吐而去之疾故用鹽湯之賦以裏堅復使探喉以令吐也

要○瓜蒂散 宿食在上脘當吐之 方見傷寒

東垣先生曰難經云上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死此飲食內傷填塞胸中食傷太陰風木生發之氣伏于下宜瓜蒂散吐之素問所謂木鬱之氣發之也吐上焦有形之物則木得舒暢天地交而萬物通矣若不吐則絕者不宜用此瓜蒂散性急能損胃氣復者宜以他藥代之日病後產後尤宜戒○南豐李氏曰食滯脹氣逆噫氣吞酸惡心欲吐不吐冷傷

熱傷

兼外感七情 鑿醫 內傷飲食外邪併行氣香蘼散 三山陳氏方 治內傷生冷厚味堅

情 鑿醫 行氣香蘼散 三山陳氏方 治內傷生冷厚味堅

和中凡虛弱厭食不思食惡寒遍身酸痛七情氣逆嘔吐洩瀉飲食不下

而臟府或秘或澀

服則和中利氣消痰 紫蘼 一錢 柴胡 陳皮 各八分 香附 一錢

去濕厚腸胃 烏藥 八分 川芎 羌活 枳椇

蜜蠟守 芥子 蒼朮 各八分 麻黃 一錢 甘州 三分

貴錢 薑三片水煎溫服 ○外感風寒加蔥白 ○內傷

右細末生薑自然 飲食加神麴山盧子 ○回春日溼勝者加蒼朮

浸蒸餅子 每服 以上東垣方

痾子

一錢

中山氏曰紫蘇羌麻所以散外邪也香陳烏  
芎枳槁所以順氣行滯也甘草助脾胃和諸  
氣也夫生以厚味鬱于中焦而不順化則  
腹脹滿疼痛用之則以順化則寒熱不止或  
于皮膚痛而不用之則以順化則寒熱不止  
木疼痛用之則以順化則寒熱不止或風溼  
順化則肩背胸膈沉重疼痛  
飲食難下用之以順化之

脾胃不和成痞悶香砂養胃健坤家

兼傷 倦傷

痞悶不舒

治脾胃不和不思食口不知味

人參五分 白朮一錢 茯苓八分 木香五分

甘艸 香附子 砂仁 蒼朮

厚朴 陳皮 各八分 白豆蔻 七分

薑棗水煎服 脾胃寒加薑桂 壽世曰胃熱

加山梔黃連 吐痰加半夏

岡本氏曰此方四君子湯合香砂平胃散加  
白蔻大香者也平胃除脾胃之溼痰消食滯  
四君補脾虛進食乃治脾虛冷不食  
胸冷胃中有寒痰者能和脾胃藥也

調理 病瘥後調和脾胃和劑參苓白朮

局方 參苓白朮散

治脾胃虛弱飲食不進嘔吐泄

瀉多困少力

白扁豆 一斤 人參 茯苓

白朮 甘艸 山藥 各二 蓮肉

桔梗 薏苡仁 縮砂仁 各一

為末每二錢棗湯下 花溪虞氏曰大病後補  
助脾胃此藥極妙家傳治噤口痢加石苜蒲或  
有氣加木香

薑溪吳氏曰脾胃喜甘而惡苦喜香而惡穢喜燥而惡溼喜利而惡滯是方也參草扁豆味之甘者心也木苓藥蓮薏苡甘而微燥者也砂仁辛香而燥故可以開胃醒脾枳梗其而微苦其則性緩故為諸藥之舟轉脾則喜降乃能通天氣于地道矣

論脾胃湯 專治服寒藥多致脾胃虛弱胃脘痛

人參 益智 砂仁

厚朴 乾生薑 澤瀉

薑黃 陳皮

每三錢水一盞煎至半盞溫服食前

四十九葉曰飲食勞倦則傷脾又云飲食自倍腸胃乃傷腸胃為痔夫脾胃者行胃津液磨胃中之穀主五味也胃既傷則飲食不化口不知果四肢困倦心腹痞滿元氣欲吐而惡食或為嘔泄或為腸澼此胃傷脾亦傷脾則大抵傷飲食其治不同傷飲食者益形之氣也宜參汗利小便以導其濕傷飲食者有形之者也輕則消積或損其穀此最為妙也童則方可以吐下合立

要卷之四

氣證

氣虛益氣四君湯氣脫獨參奪命丹

四君子湯 治榮衛氣虛藏府怯弱不思食腸

烏泄瀉嘔噦吐逆心腹脹滿

人參 茯苓 炙甘草 白朮

每二錢水一盞煎七分服 〇 楚氏曰案醫學綱

目虛實門載海藏方無茯苓而有黃芪此專於

補氣者也

薑溪吳氏曰失面色痿白則望之而知其氣無矣言語輕微則聞之而知其氣虛矣脈來虛弱則切之而知其氣虛矣如此則宜補氣是方也人

入門加減 痰加陳皮 竹瀝姜汁 有批合四物湯內 傷停飲目眩去 參吐加官桂 草吐加黃芪 霍香泄浮 訶子豆蔻 附子脾胃 桂當飯 參加丁香 仁解困氣 香破仁人 不思食加 枳實破仁 急加枳實 夏咳加 木倍 口渴倍 不定相





正傳

木香 檳榔 九 金張氏方 此藥流溼潤燥推陳致新滋陰抑陽散鬱破結活血通經治男婦嘔吐酸水痰涎不利頭目昏眩併一切酒毒食積及米穀不化或下痢膿血大便秘塞風壅積熱口苦煩渴涕唾稠粘膨脹氣滿等症

木香 檳榔 青皮 陳皮

黃檗 莪朮 枳椇 黃連

大黃 黑丑 香附子 各一

當歸 一兩

為末滴水為丸梧子大每服五七十九丸溫水下以利為度

豐溪吳氏曰內經云溼淫所勝平以苦熱故用木香熱者寒之故用黃連芩檗抑者散之

鬱氣

正氣天香湯

河間先生方

治一切諸氣作痛或

上澹心胸或攻築脇肋腹中結塊發渴刺痛日

水因之而不調或眩暈嘔吐往來寒熱等症

烏藥 二錢 香附 八錢 陳皮 紫蘓

乾薑 各一錢

水煎熱服

中山氏曰香附陽中陰血中之氣藥也凡氣鬱血滯必用之為君烏藥紫蘓辛溫香竄用之散諸氣鬱夫氣得寒則易滯得熱則易流乾薑辛熱可順陳皮氣薄味厚可升可降用下之氣

痰

因三

七氣湯 治七氣鬱發致陰陽反戾揮霍變亂

吐利交作寒熱眩暈痞滿咽塞  
半夏 五兩 厚朴 桂心 各三  
芍藥 各四 紫蘓 陳皮 各二 茯苓 一兩  
人參 一兩

薑棗水煎服

楚氏曰氣溼則滯半苓之辛淡可滲之氣寒  
則凝桂枳之苦辛溫可溫之氣鬱則結紫蘓  
陳皮之辛芳可散之滲溫散之藥隊則軍令  
太過故用參芍之補收以監制之乃氣鬱之  
也主方

邪外兼

七情外感兼來者乃用分心氣飲方

分心氣飲 治一切氣不和多因憂愁思慮怒  
氣傷神或事不隨意使鬱抑之氣留滯不散停  
於胸膈之間不能流暢致心胸痞悶脇肋虛脹

噎塞不通噫氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩四肢  
倦怠面色萎黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦

大腹皮 赤芍 木通 半夏  
桑白皮 茯苓 肉桂 甘艸  
陳皮 青皮 羌活 紫蘓 四錢

每三錢水一盞薑三片棗二枚燈心五莖煎七  
分溫服○雲林龔氏曰加枳椇檳榔香附治氣  
百病最能升降陰陽調順三焦○性急加柴胡  
○多怒加黃連○楚氏曰氣虛而鬱甚者專解  
鬱則氣愈虛又復補之則鬱愈劇者合四君子  
湯服之則尤妙○古林氏曰此方見為氣結之  
症則先投之譬如有客而先掃席也不可久服

氣登

逆氣

久則氣愈耗鬱益甚也

中山氏曰陳皮青皮腹皮辛溫可以利氣可  
以破鬱木通茯苓甘淡可以導滯羌活紫蘓  
所以解散半夏桑皮所以導痰官桂赤芍  
破血滯甘草和諸氣益鬱病之聖劑也

氣逆上衝蘓子降三和氣秘最宜嘗

方局蘓子降氣湯 治虛陽上攻氣不升降上盛下

虛痰涎壅盛膈壅不利喘促

當歸 甘州 厚朴 前胡 各二兩

蘓子 五兩 陳皮 官桂 各三兩 神麩 五兩

每二錢水一盞半入薑二片棗一枚紫蘓五葉

煎八分熱服○南豐李氏曰虛喘加人參五味

杏仁○虛煩加知母人參

中山氏曰蘓子厚朴前胡陳皮半夏共能治  
痰下氣之品也當歸肉桂辛溫熱炙甘州之

秘氣

甘溫收斂虛  
陽之品也

○三和散 治五藏不調三焦不和心腹痞悶脇

肋膜脹風氣壅滯頭面虛浮手足微腫肢節煩

疼腸胃燥澁大便秘難又治腳氣上攻胸腹滿

悶

枳櫚 甘州 木香 陳皮

川芎 白朮 各七 腹皮 羌活

紫蘓 木瓜 沉香 各一

每二錢水一盞煎六分溫服○李氏入門曰秘

甚加枳櫚萊服子皂角

中山氏曰沉木陳蘓腹皮枳櫚皆順氣開滯  
破鬱之品也川芎散血滯而入厥陰以陽經  
所以和脇痛也羌活逐風溼而入足太陽經  
所以除背痛也木瓜酸溫能利筋脈治脚氣

腫氣

并轉筋木州甘苦溫助胞氣和心腹夫氣也  
鬱滯則筋脈不利三焦不和用此湯則鬱  
滯解而三焦和也  
以有三和之名也

○木香流氣飲 治諸氣痞滯不通胸膈膨脹口

苦咽乾嘔吐火食肩背腹脇走注刺痛及喘急  
痰嗽面自虛浮四支腫滿大便秘結水道赤澀

- 陳皮 二斤 厚朴 紫蘓
- 青皮 香附 木通 八兩 腹皮
- 丁香 枳榔 官桂 枳實
- 菝葜 藿香 木香 各六兩 木瓜
- 人參 白朮 麥冬 石菖蒲
- 茯苓 白芷 各四兩 半夏 二兩

每四錢水一盞半薑三片棗二枚煎七分熱服  
○婦人血氣癥瘕入艾醋煎○去菖藿加沉香

○四七湯

治氣結成痰涎狀如破絮或如梅核

豐溪吳氏曰寒則氣收收則氣不流矣故用  
下桂州果之屬溫而行之熱則氣亢亢則氣  
不流矣故用麥冬木通之屬清而導之怒則  
氣逆逆則氣不流矣故用枳實枳殼之屬  
而香我之患則氣積積則氣不流矣故用  
腹香我之患則氣積積則氣不流矣故用  
流矣故用參朮甘州之屬補而益之憂則氣  
沉矣故用參朮甘州之屬補而益之憂則氣  
浮之愁則氣鬱鬱則氣不流矣故用白芷  
夏首藿香之屬利而開之或問七氣之來豈能  
道至方以二利而開之或問七氣之來豈能  
日氣症與諸症不同諸症示人以弗精專也余  
有夫七情之氣屬于無形上下左右散聚無  
常故集辛香之品而流動之雖二十四味  
不厭其繁譬之韓侯之兵多益善云爾

冷氣

在咽喉而咯不出，嘔不下，此冷氣之所為也。或中脘痞悶，氣不舒快，痰飲喘急，惡心嘔吐等症。  
 半夏五又 茯苓四又 厚朴三又 藜蘆二又  
 每四錢水，蓋半薑七片，棗一枚，煎六分，熱服。○  
 若因思慮過度，陰陽不分，清濁相干，小便白濁，用此下。青州白丸子為切當。○壽世加甘桔枳。  
 ○埜氏曰：梅核氣加香附、陳皮、瓜蒌、貝母、尤良。  
 冷氣相沖為痛者，鹽煎散劑。主良薑。  
 ○鹽煎散 治一切冷氣攻沖胸脇疼痛及脾胃虛冷不思飲食成諸症。  
 青皮四錢 蒼朮 良香各一兩  
 桂 丁香各二錢 砂仁 茴香各五錢

瘕挾

氣停血分，成疼痛為用，復元通氣漿。  
 傳正 復元通氣散 治一切氣不宜通，瘕血凝滯，身走痛，併跌墜損傷氣滯，血分作痛等症。  
 陳皮 白芷 甘艸 玄胡索各一錢  
 茴香 穿山甲 木香 當歸各一錢半  
 乳香 沒藥各五分  
 為末，每二錢熱酒白湯任下。  
 藜蘆合香丸 治氣中無痰，身冷脈沉詳。  
 方見邪崇。  
 陳皮 一兩 甘艸 六錢 山藥 八錢  
 每二錢水一盞，半入鹽一字，煎八分，空心食前服。

良薑

氣登

龔氏壽世曰治男婦中虛氣牙關緊閉  
眼喎斜不省人事一切危急之證尤能順氣  
化痰神效。○劉氏曰中氣即七情內火之動  
氣厥逆由其本性如摧枯拉朽  
絡其決烈之性如摧枯拉朽  
務恐氣血虛者非所宜也

明人按順劑

治吐血咯血虛火旋治方

連竟知母山炮子黃連

當飯桔梗耳前胡柴胡牡丹皮灯心姜

三錫曰血症脈洪實有力精神不倦或覺胃痛滿痛或血是

紫血塊者用生地赤芍當飯牡丹荊艾阿膠滑石大黃玄明粉桃

仁泥之屬從大便導之此釜底抽薪去也今人不知從事苓連

厄栢輔四物使氣血兩傷早胃但傷百無一生悲哉

丹溪曰諸失血過多休倦食少及血不止扶正氣為急人參

黃芪或湯氣所薰致斂者皆著湯加川芎葛根

傷酒血理中湯加川芎葛根

### 血證

血虛血虛四物八珍湯血脫獨參益氣方

方。四物湯 血虛者主之方論見婦人門

韓氏悉曰四物湯以當歸為君芍藥為臣地  
黃為佐芎藭為使也。○豐溪吳氏曰歸芍地  
黃味厚者也味厚為陰中之陰故能生血。川  
芎味薄而氣清為陰中之陽故能行血。中  
氣然草木無情何以能生血所以謂其生  
血者以歸芍地黃能養五臟之血所以謂其  
營中之氣五臟和而血自生。取師云血不  
者以此方調之則可若上下失血太多氣  
幾微之際則四物禁勿與之。所以然者四  
皆陰陰者天地開塞之令非所以生萬物者  
也故曰禁勿與之。

氣虛

○八物湯 即前方合四君子湯。○李氏入門曰

有痰合二陳湯名八物二陳湯

豐溪吳氏曰血氣俱虛者此方王<sub>之</sub>四<sub>君</sub>世  
溫之品也所以補氣也四物<sub>之</sub>潤<sub>之</sub>品也  
以補血氣則百散資<sub>之</sub>以生血<sub>之</sub>則百散  
養以養形體既充則百邪不入故人樂有藥

血脫考方

獨參湯

凡上下失血過多脉微欲絕者急以  
此方主之○血者氣之守氣者血之衛相偶  
而不相離者也一或失血過多則氣為孤陽  
亦幾於飛越矣故令脉微欲絕斯時也有形  
之血不能速生幾微之氣所宜急固故用甘  
溫之參以固元氣所以權輕重於緩急之際  
也故曰血脫益氣古聖人之法或者不達此  
理見其失血而主四物湯則川芎之香竄能  
散幾微之氣而歸芍地黃皆滋陰降下之品

不能生血于一時及以失救外之權而遺人  
天殃矣醫云乎哉○東垣先生曰人參甘溫  
能補肺中元氣肺氣旺則四藏之氣皆旺精  
自生而形自盛肺主諸氣故也仲景云病人  
汗後身熱亡血脉沉遲者下痢身凉脉微血  
虛者並加人參古人血脫者益氣蓋血不自  
生須得生陽氣之藥乃陽生則陰長血乃旺  
也若單用補血藥血無由而生矣素問言無  
陽則陰無以生無陰則陽無以化故補氣須  
用人參血虛者亦須用之

氏莖

參歸六乙湯

人參六錢

治同前

當歸一錢

五參四

血登

水煎溫服

血實桃仁承氣湯下抵當峻劑下焦盪

桃仁承氣湯

治中焦盪血妄言見鬼昏迷如

狂及久病胃脘疼痛等症○丹溪先生曰吐血

覺胸中氣塞上吐紫血者桃仁承氣湯下之

○抵當湯

治下部畜血臍下結痛滿硬等症上

兩方俱見傷寒門

失血吐紅血熱流行錯犀角地黄必勝常

醫鑒

犀角地黄湯

治上焦有熱口舌生瘡發熱或

血熱妄行或下血及不嗽血自來者

烏犀角一錢

生地黃二錢

赤芍藥一錢

牡丹皮一錢

加

黃芩一錢 黃連一錢

水煎溫服○肝經血加條芩○心經血加黃連

麥門冬○脾經唾血加白芍百合○肺經衄血

加天門冬山梔百部○腎經血加玄參知藥○

三焦湧血加連翹地骨皮○膽經血加柴胡淡

竹葉○胃經吐血加太黃乾葛○心胞血倍牡

丹皮加茅根○大腸便血加炒梔炒槐花○小

腸溺血加炒梔木通牛膝茅根○回春入茅汁

磨京墨調服○凡吐紫黑血塊胸中氣塞者加

桃仁大黃○丹溪先生曰治吐血衄血犀角地黄

湯入鬱金同用加芩升麻犀角能解毒

豐溪吳氏曰火逆于中血隨火上升火者心之所主故用生犀生地以涼心而去其熱心者



肝之所生故用丹皮芍藥以平之  
而瀉其母此窮源之治也  
必勝散 治男婦血妄流溢成吐衄嘔咯血

人參

炒蒲黃

小薊

地黃

當歸

烏楮

川芎

每五錢水一盞半煎七分溫服

撲打

因三

加味芎窮湯 治打撲傷損敗血流入胃脘嘔吐黑血或如豆羹汁

川芎

當歸

白芍

百合

荊芥穗

各等分每四錢水一盞酒半盞同煎七分服

積熱先痰投解毒陰虛後痰降火涼

積熱

方考

黃連解毒湯

陽毒上竅出血者主之 治病

必求其本陽毒上竅出血則熱為本血為標能去其熱則血不必治而自歸經矣故用芩連梔檉苦寒解熱之物以主之然惟陽毒實火用之為宜若陰虛之火則降多上陰苦從火化而出血益甚是方在所禁矣

春回

清肺湯

先吐痰而後見血者是積熱也主之

方見咳嗽門

火虛

滋陰降火湯

先吐血而後見痰乃是陰虛火動也主之

血虛見血三黃補氣逆蘇子降氣康

血虛

垣東

三黃補血湯

治六脉俱大按之空虛心而赤善驚上熱乃手少陰心脉也此氣盛多而亡血

以甘寒鎮墜之劑大瀉其氣以墜氣浮以甘辛  
溫微苦峻補其血

當歸一錢 川芎二錢 熟地黄二錢 芍藥五錢  
黃芪一錢 生地黄三錢 芫胡一錢 升麻一錢

牡丹皮一錢

每五錢水二盞煎至一盞食前熱服○堊氏曰

加人參蘓木尤良

○蘓子降氣湯 勞心氣壅者主之

○四物加木香枳榔湯 失血後被七情者主之

清胃膏梁成積熱枇杷暑毒犯心堂

○清胃散 治胃經膏梁積熱吐血方見雜科

○枇杷葉散 治暑攻心嘔血

枇杷葉 陳皮 厚朴 黃連各五分

香薷七分 麥門冬 木瓜 茅根各一分

甘艸二分

薑棗水煎溫服或為末水調服○堊氏曰此方

即和劑枇杷葉散去丁香加黃連

考方  
○人參飲子 東垣先生方 暑月衄血此方主之○

秘藏曰治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血

吐血

人參 黃芪各一錢 麥門冬 當歸

甘艸 白芍各一錢 五味子九箇

內經云必先歲氣無伐天和故時當暑月胃肺

金受尅令人乏氣之時也理宜清金益氣清金

心勞

用麥冬五味益氣用艸芩芍藥之酸所以收其陰當歸之辛所以歸其血此亦虛火可補之例也

勞心脾損歸脾主無汗補心擇用良

門入 歸脾湯

虛損

治思慮傷脾不能攝血致妄行方見

胃傷

因三

○茯苓補心湯 治心氣虛耗不能藏血以致面色痿黃五心煩熱咳嗽唾血

理中湯 病者因飲食過度傷胃或胃虛不能消化致翻嘔吐逆物與氣上衝蹶胃口決裂所傷吐出其色鮮紅心腹絞痛自汗自流名曰傷胃吐血此方能止傷胃吐血者以其功最理中

傷肺

腕分利陰陽安定血脈也

肺傷成咳嘔雞藕大薊可商量

生濟 雞藕散

治勞傷肺經咳嗽有血

拔荷

黃芪

生地黄

阿膠

貝母

茅根

桔梗

麥門冬

蒲黃

甘艸

錢各一

薑水煎服

門入 大薊飲子

犀角

升麻

蒲黃

桑白皮

杏仁

桔梗

甘艸

大薊

薑水煎服

門入 二灰散

治肺疽吐血并妄行

紅棗 和核燒

百藥煎 煨

各等分爲末每二錢米湯調下

而不止宜收斂葛氏十灰藕汁常

門入十灰散 平江葛氏方

大薊

小薊

側柏葉

荷葉

茅根

茜根

大黃

山梔子

牡丹皮

櫻櫚皮

各一錢俱燒存性爲末用藕汁或蘿蔔汁磨京

墨調服其血立止

調理

止後早投調理劑補營湯內芍歸望

春補榮湯

諸失血止後宜調理也

當歸

芍藥

生地黃

熟地黃

人參

茯苓

梔子

麥門冬

陳皮 各等分

甘艸

減半烏樛

一箇棗二枚

水煎溫服

聖氏曰失血之後脾心肝三藏擾亂不安令  
故參苓和甘棗補脾而調心肝生血之藏  
補心而和血出之藏而調心肝生血之藏  
血之藏然又出之藏而調心肝生血之藏  
涼生陰長之陽有參苓之質潤散之甘溫  
之血有當歸熟地之質潤散之甘溫  
藥烏樛酸之味收乃陳皮之妙劑調血之  
滯和甘棗之味收乃陳皮之妙劑調血之  
此即驚悸之門四味尤補神湯也或調血  
血之症驚悸之門四味尤補神湯也或調血  
理三藏而遺二血屬肺安神湯也或調血  
主三藏而遺二血屬肺安神湯也或調血  
脾腎者而遺二血屬肺安神湯也或調血  
六味丸之立論自可療之故道與肝理之  
藥芍藥烏樛棗之藥也何藥地黃歸麥腎之  
其云不調理二藏乎

新製利金湯

治氣壅之疾

桔更貝母陳皮各三錢  
貝母糯米拌炒  
天花粉各三錢  
桔更一錢

并五方姜五片

新製潤肺飲

貝母糯米拌炒  
天花粉各三錢  
桔更一錢

五飲湯 心下留飲 脘下癖飲 胃中痰飲 膈上溢飲 腸間留飲

此五飲酒後及傷寒飲冷過多故有此疾 人參旋覆花陳皮

枳實白朮茯苓厚卜半夏沃浮楮苓前胡肉桂芍藥各三錢

茯苓飲子 治痰飲蓄心胃怔忡 赤苓半夏茯苓神陳皮麥門

各三錢 沉香耳中枳殼即略半張路玉 玉竹飲子 治痰火延湧盛咳

逆喘滿 葶藶紫苑貝母生薑各三錢 耳中枳殼更橘皮各三錢 茯苓二錢

橘皮蜜煎 右長流水煎入熟白蜜二匕分二服 氣虛加人參

虛火加肉桂 羶容邪加細辛三錢 香豉三錢 咽喉不利唾膿血加阿

膠三錢 藕汁鮮頭額痛加葱白二莖 便溏加伏龍肝擊碎煎湯澄

痰飲

溼痰溼痰色白輕消可為製一陳總玉焉

消輕

方局

一陳湯 治痰飲成患或嘔吐惡心或頭眩心

悸或中脘不快或發寒熱或因食生冷脾胃不

和

陳皮 五兩 茯苓 三兩 半夏 五兩 甘艸 一兩

每四錢水一盞薑七片烏梅一箇煎六分熱服

○丹溪先生曰此方治一身痰之要藥也欲下

行加引下藥欲上行加引上藥○風痰加防風

南星○熱痰加芩連○溼痰加蒼朮南星○寒

痰加乾薑附子○氣痰加木香香附○食積痰

用山檀神麩麥芽。○老痰用蛤粉五倍子。○痰在四支及皮裡膜外非竹瀝薑汁不行。○痰在腸下非白芥子不達。○南豐李氏曰血虛心四物湯氣虛合四君子湯。○此方惟酒痰燥痰不

宜

慈谿趙氏曰丹溪言二陳湯治一身之痰世醫執之凡有痰者皆用夫二陳內有半夏其性燥烈若風痰寒痰用之反能燥食痰則相宜至于勞痰失血諸痰用之反能燥血痰則相宜至于可不甘淡能滲溼吳氏曰痰無由以生所謂治痰必求其本也陳皮辛溫能利氣則痰無能病必求其本也陳皮辛溫能利氣則痰無能留滯益脾益胃則利氣治痰之標也又曰有痰而渴半夏非宜其本利氣治痰之標也又曰有痰而渴而潤余曰尤有誤焉渴而喜飲水者宜半夏易為本熱為標故見水者雖渴猶宜半夏也此溼之化實非真像也惟明者知之氣弱加人參

白木名六君子湯

重吐下

治者吐之瓜帶散從輕用救急稀涎裡痰欲下控涎劑神祐滾痰効最速

因○控涎丹 治痰唾稠粘夜間喉中如鋸聲多流唾涎手脚重痛冷痺走注等症

甘遂 大戟 白芥子 各等分

為末糊丸梧子大晒乾食後臨臥淡薑湯或熟水下五七丸至十丸如疾猛氣實加丸數不妨

蓬溪李氏曰痰涎之為物隨氣升降無處不到入于心則迷竅而成痰涎稠粘喘急背冷入于肺則塞竅而成痰涎稠粘喘急背冷入于經絡則伏麻痺聚而成痰涎稠粘喘急背冷入于手足則牽引隱痛並以筋骨則頸項向腰而為痰為飲為涎為涕為淚大戟能泄藏府

之水溼，甘遂能行經隧之水溼，白芥子能散皮裏膜外之痰氣，惟善用者能收奇功也。丹溪先生曰：痰在腸下及皮裏膜外，非白芥子莫能達。古方控涎丹用白芥子，正此義也。

門入

○三花神祐丸

金張氏方

治風痰喘嗽氣血滯

不通及一切溼熱積結痰飲懸飲變生諸病，或水腫大腹實脹喘滿，或風熱燥鬱肢體麻痺走注疼痛等症，入壯氣實者可暫服之，蓋輕粉治水腫或脹之藥，以其善開溼熱佛鬱故也。或去輕粉牽牛亦好。

甘遂

大戟

芫花

各醋炒五錢

黑丑

二兩

大黃

一兩

輕粉

一錢

為末水丸，小豆大，每初服二丸，漸加三丸，日三服，溫水下，至便利即止，多服頓攻轉加痛悶損。

入纂要劉氏曰：神祐丸牽牛大黃大瀉血氣之溼熱而輕粉又去涎積也。芫遂大戟之解見十棗湯下。

棗湯下

蓋溪吳氏曰：甘遂能達痰涎窠匿之處，芫戟能下十二經之飲，黑丑亦逐飲之物，大黃乃推蕩之劑，佐以輕粉者，取其無竅不入且逐風痰積熱而解諸藥之辛烈耳。此大毒類聚為丸，善用之則能定禍亂於昇平，不善用之則虛人真氣慎之。

傳正

○滾痰丸

王隱君方

治溼熱食積成窠囊老痰

大黃

黃芩

沉香

五錢

礞石

硝礮

黃金

色

為末滴水為丸，梧子大，每三五十丸，量人加減。○王氏准繩有百藥煎五錢，用二黃各八錢，此方得之方外秘傳，蓋此丸得此藥乃能收效。

周身頑涎聚于一處然後利下甚有奇効

曹溪吳氏曰大黃能推蕩黃芩能去熱沉香能下氣礞石能墜痰是方乃攻擊之劑必有實熱者始可用之若與虛寒之人則非其矣又礞石由煅煉必陳久為效若新煅火毒未除則不宜服

風痰青有光風痰木色三生導痰能驅蠲

傳正導痰湯 治風溼痰等症○堊氏曰風虛痰人

參三生飲加白付子桔梗竹瀝薑汁風熱痰宜

薑溪吳氏曰風痰者溼土生痰痰生熱熱生風也半陳芍州前之二陳湯耳加南星以治去痰如倒壁

寒痰如灰色者寒痰至五積新方半夏先

門入五積散 寒痰主之

方局新法半夏湯 治宿寒留飲停積滯氣嘔吐痰

水憶氣吞酸

青皮 乾薑 各六兩 陳皮 桔梗 各一斤

丁子 四兩 甘州 十二兩 半夏 二兩

為末每一錢入鹽一捻沸湯點服○一方加苓

熱痰稠濁熱痰黃紫色調中大小主黃連

門入小調中湯 治一切痰火及百般怪症

黃連 煎水 瓜婁 煎水 浸夏

半夏 煎水 浸夏

各炒水乾為度四味各等分薑煎溫服或薑汁糊為丸服尤妙○堊氏曰此方治酒痰尤妙



即前方加人參白朮茯苓

歸生地

堃氏曰加青黛山梔桔梗黃蘗亦良○湯加天花粉

燥痰瓜婁枳實治痰燥破絮氣痰四七湯煎入

春○瓜婁枳實湯治痰結咯吐不出胸膈作痛或

寒熱氣急及痰迷心竅不能言者

黃芩 梔子 陳皮 瓜婁

桔梗 茯苓 貝母 當歸

縮砂 木香 各五分 甘州 三分 枳實 一錢

薑水煎入竹瀝薑汁同服○痰迷心竅加菖蒲

去木香○氣喘加桑白皮紫菀子○堃氏曰渴

加麥門冬青黛○痰難開加五倍子蛤粉甚加

苳補少許

中山氏曰諸痰為患者除寒痰外皆主之夫痰雖有風溼燥熱寒氣食諸痰之別飲有懸留支痰諸飲之異大都皆主熱故內經曰諸氣噴鬱皆屬肺之金丹溪釋之言火之時清冷醫精要云譬諸金中之水無火之時清冷矣人身無病則津液澄清若一病焉則津液不和身不和則經絡壅塞而成痰矣是方也瓜婁枳實枳梗茯苓山梔竹瀝陳皮薑汁皆消却痰飲之劑也黃芩山梔竹瀝所以清痰熱熱清則痰自收木香宿砂辛溫所以散痰滯滯散則痰不聚當歸甘草甘溫一以和血脈一以和諸氣血氣和則痰不生矣

門入順氣導痰湯治痰因氣動者方見中風

食痰消食化痰自食小調中劑酒痰專

考○消食化痰丸 飲食生痰胸膈悶者主之

半夏 南星 神麩 杏仁

要

方

方

要本四  
○ 痰傷  
○ 十九

陳皮 萊服子 葛根 山楂

青皮 紫蘘子 麥芽 香附子

星夏之辛能燥溼痰，葛根之清能解酒熱，山杏麩芽之消能療飲食之痰，青陳蘘杏萊苳之利能行氣滯之痰，痰去則胸膈之膨悶亦去矣。

酒痰入 小調中湯 治酒痰臂脇痛。○ 埜氏曰加葛根

青黛蒼朮茯苓尤良。

陽虛 陽虛八味冷痰見六味陰虛火動煽。

○ 八味丸 治陽虛腎寒不能收攝邪水冷痰溢上或昏暈夜喘上氣者。○ 鶴溪陳氏曰八味丸治失志腎虛鬱而生涎短氣喘吸當從小便去之中有茯苓故。○ 薛氏曰若因命門火衰不能

生脾土者急用八味丸。又曰若腎氣虛寒痰上湧用八味丸。

陰虛

○ 二陳湯合四物湯去芎夏加貝母麥冬瓜婁桔梗治陰虛腎火炎上肺燥者潤而降之。○ 埜氏

日加青黛人中白妙。

○ 六味丸 薛氏曰腎經敗液而為痰者主之又曰因肝經血燥而生痰者用之。又曰腎虛陰火炎上用之。

氣血兩虛宜八物脾虛不運六君賢。

脾虛

○ 六君子湯加竹瀝薑汁 治脾虛不能運化者宜補中燥溼。○ 薛氏摘要曰脾氣虛寒而不能主涎用六君子湯加附子脾虛而痰滯氣逆

本方加木香因脾胃虛弱而肝木乘侮依本方加柴胡若肺氣虛弱不能清化而有痰者依本方加桔梗

長澤氏曰痰氣多而兼氣虛者主二陳加四君氣虛甚而兼痰氣者主四君而加二陳量病之輕重為藥之多寡此六君子之辨也

摘要歸脾湯加柴胡半夏 治脾氣鬱而痰滯者  
補中益氣湯加半夏竹瀝薑汁 治勞役傷脾

失升降者薛氏曰脾氣虛弱不能消溼加茯苓半夏

八物二陳湯 氣血虛之痰客中焦閉塞清道者宜溫中燥脾二陳湯氣虛合四君血虛合四物 墊氏曰凡痰用四物者其歸芍地黃俱用

氣血 痰虛

薑炒佳

飲家肌表在為用小青 龍湯 科在裡投玄武甚時

十棗瘥庸醫憚峻劑欲換有冲和九味名羌活五苓滲溼多

十棗湯 纂要劉氏曰芫花之辛以散飲二物之苦以泄水甘遂直達水氣所結之處乃泔水之聖藥然有毒不可輕用

三錫曰人身中下有塊不痒不痛或作麻木名敗痰失道宜隨處用藥消之無得亦必不治如結于咽喉耳前後危為難治氣血和暢則無病以補養為主切忌針力日久不作膿毒屬虛如腐肉用針多而不去者白者朴硝二果等分為末傳自化為水內服大補茶又曰服後上下如煤黑者痰也

六鬱

氣血不和多鬱結丹溪六鬱總司方

傳○六鬱湯丹溪先生方解諸鬱

陳皮

半夏

蒼朮

川芎

茯苓

山梔

香附子

甘艸

砂仁

薑煎溫服○氣鬱加木香檳榔○溼加白朮○

熱加黃連○痰加半夏○血加桃紅牡丹皮○

食加山楂麩芽○埜氏曰氣虛鬱合四君血虛

鬱合四物春加防風夏加黃芩秋冬加吳萸

長澤氏曰氣鬱香附川芎溼鬱蒼朮茯苓熱鬱梔子痰鬱半夏血鬱川芎

要卷四

乃解之可方也

氣鬱 木香調氣和調氣血鬱當歸活血湯

春同 木香調氣散 治氣鬱腹脇脹滿刺痛不舒脉

沉

木香 砂仁各五分 肉桂 甘州各三分

烏藥 香附 枳殼 青皮

厚朴 陳皮 川芎 蒼木各一錢

薑煎服

血鬱 當歸活血湯 治血鬱能食便紅或暴吐紫血

痛不移處脉數瀉也

紅花五分 牡丹皮 香附子 烏藥

枳殼 青皮 官桂 乾薑炒黑

甘州各三分 當歸 芍藥 川芎

桃仁各一錢

薑水煎服 〇血結硬痛加大黃 〇埜氏曰加

汁尤妙

食鬱消之平胃散 瓜婁枳實鬱痰

〇香砂平胃散 治食鬱噎氣作酸胸腹飽悶作

痛惡食不思右關脉緊盛

方見飲食加麩芽炒黑乾薑

鬱久成塊去乾薑加大黃 治痰鬱喘滿氣急痰嗽不出胸

脇痛脉沉滑也

升陽散火治因熱淫鬱滲之滲淫

六鬱

火鬱

○火鬱湯

汗熱鬱小便赤澀五心熱口苦舌乾

脈數即火鬱也

方見發熱門

溼鬱

○參溼湯

治溼鬱周身骨節走注疼痛遇陰則發脈沉細而濡也

則發脈沉細而濡也

五鬱

木鬱腸疼其脈大壅湯探吐連煩寃

升陽散火湯能升散火鬱外寒內熱存

土鬱痞脹堅實燥脈強奪之太承氣湯論

脈浮喘滿名金鬱欲泄麻黃葛根湯用根

水鬱腰疼兼足熱折之太補丸作丸吞

長景岳左飯丸壯水之劑也凡命門之陰虛陽勝者宜用此飲加減主之熱地自二三錢可加至二兩隨輕重用之山茱萸二錢山茱萸二錢易酸者少用之炙甘草二錢在妙此果杓杞二錢相火盛者去之茯苓二錢水二鍾煎七八分食遠溫服

虛損勞極

右飯丸壯水之劑也凡命門之陰虛陽勝者宜用此飲加減

色白氣虛主四君半陳加上六君分

○四君子湯

治脾胃虛弱飲食少思或大便不

實體瘦面黃或胸高虛痞痰嗽酸或脾胃虛

弱善患瘧痢等症易水先生曰四君子湯治

脾損而皮聚毛落益氣可也

龔氏曰按此方治氣分之聖藥也用人參三錢白朮三錢茯苓三錢甘草一錢

○六君子湯

治證同前屬虛火須加炮乾

其功甚速○長澤氏曰脾胃衰弱有溼者用淡

滲則虛有礙用補益則溼不流且用此方蓋四

要卷二

五負勞

二六

知三二附子二隨宜七分食遠服

補血湯  
 精神頭眩目昏  
 虛氣短驚悸  
 當歸 川芎  
 白芍 生地  
 人參 白朮  
 熟地 黃芪  
 炙甘草 五味子  
 此子灸耳中絡

君甘溫不用，二陳辛溫燥溼。  
 ○香砂六君子湯 卽前方加香附子藿香砂仁  
 血虛四物爲司劑加上梔丹血熱殷  
 ○四物湯 治血虛發熱或寒熱往來或日晡發  
 熱頭目不清或煩躁不寐胸膈作脹或脇作痛  

 龔氏曰按此方治血分之聖藥也凡當歸引  
 血歸心經川芎引血歸肝經芍藥引血歸脾  
 經地黃引血歸腎經惟心生血肝納血脾統  
 血肺行血腎藏血男子化而爲精女子化而  
 爲血月水血乃有形之物  
 屬乎陰故名四物湯
 
 ○加味四物湯 卽前方加柴胡山梔牡丹皮  
 氣血兩虛宜八物十全大補桂芪蘊  
 ○八珍湯 治肝脾傷損血氣虛弱惡寒發熱或  
 煩躁作渴或寒熱昏憤或胸膈不利大便不實

補血湯  
 精神頭眩目昏  
 虛氣短驚悸  
 當歸 川芎  
 白芍 生地  
 人參 白朮  
 熟地 黃芪  
 炙甘草 五味子  
 此子灸耳中絡

改飲食少思小腹脹痛等症。○易水先生曰治  
 心肺損及胃飲食不爲肌膚益氣和血調食  
 ○十全大補湯 治諸虛不足時發潮熱夜夢遺  
 精面色痿黃脚膝無力一切病後氣不如舊憂  
 愁思慮傷動氣血脾腎氣弱五心煩悶喘嗽中  
 滿補虛損大有神效  
 人參 白朮 茯苓 甘艸  
 黃芪 當歸 川芎 白芍  
 熟地黃 肉桂 各等分  
 每二錢水一盞薑三片棗二箇煎七分溫服  

 農氏曰十全大補實爲諸虛之關鍵也凡  
 補血以甘草以補氣虛用芍藥歸地肉桂以  
 補血以氣血兩虛之劑或血虛而氣虛以  
 或氣血尚充者其可下何施乎受如心

五  
 五  
 五

新定清寧  
 不礙肺餘新  
 吐血必不可  
 功驗  
 生地  
 橘香  
 梗  
 加蒼  
 薄荷  
 俱為極細  
 勻節膏  
 置口中嚼

脾虛損當以茯苓補之而無及  
 水短火者服之有功虛而久服損真氣者當以  
 淡而利竅也又肺氣弱及元陽虛者當以  
 黃芪補之然肥人腎氣有餘而未甚虛者服  
 必功若蒼黑入腎氣有餘而未甚虛者服  
 脾補中及瀉火除煩之良劑然嘔吐與中滿  
 及嗜酒之人多服必斂膈不行而嘔吐增劇  
 以其氣味之甘緩也川芎為補血行血清利  
 頭目之聖藥然骨蒸多汗及氣弱人久服則  
 真氣走散而陰愈虛甚以其氣味之辛散也  
 生地黃能生血脈然胃氣弱者服之防損胃  
 不食熟地黃補血養脾然痰火盛者服之恐  
 不行人參為潤肺健脾之藥若元氣虛損者  
 不可缺也然久嗽喘勞嗽咯血鬱火在肺分  
 服之必加嗽增喘不寧以其氣味之甘溫滯  
 氣然也自芍藥為涼血益氣之劑若血虛腹  
 痛者豈可缺然形瘦氣弱稟賦素虛寒者  
 服之恐伐生氣發之氣以其氣味之酸寒也  
 不足頭每痛日晡微熱少食力倦精氣時脫腰

遠志飲子  
 清心勞虛寒夢  
 寐驚悸  
 飯脾湯去  
 白朮木香  
 加肉桂是

新酸服之者每得良效

- 人參 山藥 當歸 黃芪 各一錢
- 熟地 白朮 澤瀉 山茱 各一錢
- 補骨脂 五倍子 黃檗 各五分
- 陳皮 白茯苓 杜仲 炙甘草 各七分

水煎服  
 孤竹王氏曰門冬地黃雖於滋陰久則滯胃  
 滯經致生瘰癧又或多服金石右桂附助陽久  
 則積溫成熱耗損真陰痰火妄動消渴肺痿  
 症作惟此方備五味中辛已上之人可以常  
 服

心脾血虛歸脾思脾肺氣虛益氣云  
 歸脾湯 治思慮傷脾不能攝血致血妄行或  
 健忘怔忡驚悸盜汗或心脾作痛嗜臥少食或

要摘  
 虛負



進食  
即異功故加黃  
芪粟米炒知姜  
束煎服加扁豆  
石八珍散再加砂  
心枯更五味子名  
十珍散  
石出統易簡

大便不調或肢體腫痛或患瘧疾大凡懷抱鬱  
結而患諸症或因用藥失宜尅伐傷胃變成諸  
症者宜之

- 遠志 一錢
- 酸棗仁 二錢
- 木香 五分
- 白朮 五分
- 當歸 五分
- 人參 五分
- 黃芪 二錢
- 茯苓 二錢
- 龍眼肉 二錢

薑棗水煎服

薑 漢吳氏曰內經云五味入口甘先入脾參  
苓 苓木甘州皆甘物也故用之以補脾虛則  
補其母龍酸遠志所以養心而補母脾氣喜  
快故用木香脾黃土血故用當歸此主脾傷  
之方也

○加味歸脾湯 即前方加牡丹皮山梔各一錢  
治脾經血虛發熱等症

○補中益氣湯 治中氣不足或誤服尅伐四支

倦怠口乾發熱飲食無味或飲食失節勞倦身  
熱脉洪大而無力或頭痛惡寒自汗或氣高而  
喘身熱而煩脉微細軟弱自汗體倦少食或中  
氣虛弱而不能攝血或飲食勞倦而患瘧痢或  
元氣虛弱感冒風寒不勝發表宜用此代之或  
入房而後勞役感冒或勞役感冒而後入房者  
急加附子

- 人參 黃芪 白朮 甘艸 各一錢
  - 當歸 一錢 陳皮 五分 芫胡 升麻 各三分
- 薑棗水煎服 ○南豐李氏曰只是虛症全不挾  
外感氣其下陷者升芫俱用酒炒若有汗者用

蜜炒斂而降之。○楚氏曰東垣先生之方八味  
分量多相近故宜初病熱中者與不甚虛及元  
氣下陷者挾外感者立齋之方分量甚相遠也  
宜補脾肺元氣與虛甚者用者詳之

和門陳氏曰人參補中黃芪實表凡內傷脾  
胃發熱惡寒吐泄急臥脹滿痞塞神短脈微  
者當以人參為君黃芪為臣若表虛自汗  
陽潰瘍疔疹陰瘡者當以黃芪為君人參為  
臣不可執一也

肝腎虛羸丸六味水虛火亢有功勳

○六味丸 治腎虛作渴小便淋瀝氣壅痰涎頭  
目眩暈眼花耳聾咽燥舌痛齒痛腰腿痿軟等  
症及腎虛發熱自汗盜汗便血諸血失音水泛  
為痰之聖藥血虛發熱之神劑又治腎陰虛時

津液不降敗濁為痰或致欬逆又治小便不禁  
收精氣之虛脫為養氣滋腎制火導水使機關  
利而脾土健實

牡丹皮 茯苓 澤瀉 各三兩 地黃 八兩

山茱萸 山藥 各四兩

龔氏壽世曰加麥冬五味名八仙長壽丸。○腰  
痛加鹿茸木瓜續斷。○淋瀝倍茯苓澤瀉。○渴  
加五味子。○老人夜多溺加益智去澤瀉減茯  
苓。○虛火耳聾加知藥遠志石菖。○小兒遺尿  
加破故紙益智人參肉桂。○腎氣熱加知藥

豐溪吳氏曰腎非獨水也命門之火並焉  
不虛則水足以制火虛則火無所制而熱症  
生矣今人足心熱陰股熱脊痛是也熟地  
山萸味厚者也經曰味厚為陰中之陰故能

此甫先生曰... 詳而... 意有唯補水而... 八兩地黃月... 附桂唯取於... 應化引至而已... 此說實可也

火虛八味能生土甚者鹿茸大補欣

○八味丸 治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少思大便不實或下元冷憊臍腹疼痛夜多漩溺

即前方加桂附各二兩經云益火之源以消陰翳即此藥也

滋火陰補腎水澤蔞味... 從水化寒從陰化故能入水藏而為水中之... 火丹皮氣寒味苦辛寒能勝熱苦能入血辛... 能生木故能益火陰平虛熱山藥茯苓味甘... 者也甘從土化土能防木之故用之以制水... 之邪且益脾胃而培萬物之母也○蓬瀉李... 氏日地黃丸思茯苓澤瀉者乃取其瀉勝邪... 之邪氣非引接也古人用補藥必兼瀉邪邪... 去則補藥得力一關一闔此乃玄妙后世不... 知此理專一勝千補所以久服必至偏勝之... 也害

丹溪先生曰八味丸用附子以為少陰嚮導後世因以附子為補藥誤矣附子走而不守取其健悍走下之性以行地黃之滯可致遠爾○昆山王氏曰八味丸用澤瀉寇氏謂不過接引桂附等歸就腎經別無他意思謂八味丸以地黃為君餘藥佐之非止補血兼補氣也氣者血之母東垣所謂陽旺則能生陰血也地黃山藥茯苓丹皮皆腎經之藥附子官桂乃右腎命門之藥皆不待澤瀉之接引而至也則八味丸之用此蓋取其瀉腎邪養五藏益氣力起陰氣補虛損五勞之功而已雖能瀉腎從于諸補藥群象之中則亦不能瀉矣又曰其用地黃為君者犬

補血虛不足與補腎也用諸藥佐之者山藥強陰益氣山茱強陰益精而壯元氣白茯苓補陽長陰而益氣丹皮瀉陰火而治神志不足澤瀉養五藏益氣力起陰氣而補虛損五勞桂附補下焦火也又曰仲景八味丸兼陰火不足者設仲陽六味丸為陰虛者設附子乃補陽之藥為行滯也○蔓溪吳氏曰腎間水火俱虛者此方主之地黃丸以益火陰腎水桂附益命門相火水火得其養則二腎復其天矣

方局  
 ○鹿茸太補湯 治諸虛不足  
 即太補湯去川芎加鹿茸杜仲菴蓉五味子附子薑棗煎服

陽氣暴虛參附王陰虛降火節齋勤

生○參附湯 治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈等症

人參 半兩 附子 一兩

薑水煎服○堃氏曰加黃芪半兩大妙○長澤氏曰此方根本未盡衛氣散解者宜也若陰虛陽暴絕者宜獨參湯中和之味益元也如附子勇烈之氣恐敗喪根本矣

黃芪益損湯 治男女性弱潮熱婦人產前產後最為要藥  
 肉桂熟地石解當歸川芎黃芪白朮略耳中丸  
 昔葉子麥浮麥百粒每服七匙 一方有人參牡丹山茱麥門茯苓  
 苓共十六果姜末烏梅肉每浮麥治諸虛  
 酸棗仁湯 治心腎不交怔忡恍惚夜以不安精血虛耗脾胃地  
 浮酸棗仁桂遠志肉黃芪蜜水炒蓮肉人參當歸酒炒白茯苓  
 茯神 陳皮 枳實 山茱 芍藥 黃芪 麥冬 熟地 白朮 白芍 白芍 白芍

七損大怒損肝逆衝氣目暗如味逍遙要平方見發

飲食太飽成脾損善臥黃歸脾湯薛氏仁

思慮憂愁心損到驚恐不睡用朱砂安神

形寒飲冷尤傷肺附子理中湯欬喘伸

溼地坐多仍損腎腰疼厥逆脈微四逆湯入蔥真

風寒雨溼傷形者皮槁膚枯防木論湯即白木防風

大怒恐惶傷志意恍惚不樂升陽益胃橘皮陳

五勞

肺勞短氣皮毛槁乃與黃芪脈緩遲黃芪湯方參

薑棗七味也。有熱加麥冬五味子。參治此症用長沙先生復脈湯尤良。喜忘心勞形忽忽口生瘡便難夢授天王補心忠

脾勞瘦弱慵言語為用補中益氣治

面綠肝勞喜恐畏乃木枸杞酒貽之

腎勞淋瀝囊滲溼小腹裏急便赤黃六味丸中加

藥知

轉筋數到名筋極爪痛猪膏作酒膏

脉極喜忘眉髮落面顏火色人參養榮湯

肉肌消瘦皮枯槁肉極十全大補膏

氣極喘多言語少千金生脉散尤良

不能行動疼腰脊虎骨酒治骨極方

精極遺精肌消瘦造膠龜鹿二仙漿

王肯堂曰予常用苡仁百合天門麥門桑白皮地骨皮牡丹皮枇杷葉五果子酸棗仁之屬佐以生地黃汁藕汁乳汁童便等如咳嗽則多用桑皮枇杷葉不有痰則增貝母有血則多用苡仁百合阿膠抵所則多用地骨皮食少則用苡仁至七八錢而麥門冬常為之主

以保肺金而滋生化之源無不應手而効

黃芪散 治婦人勞氣食後身痛倦怠夜間盜汗此因失血損

單衛也 黃芪二兩防風當歸白芍藥乾草各七斗少許善寒

雪澤居清肺散 生地 貝母白芍蒲黃炒八分阿膠天門黃芩

熟地 麥冬 山茱萸 牡丹皮 知母 炙甘草 各六分 全左歸丸 熟地 白芍

全桂附神湯 治腎氣大虛下元冷極白帶腥臭自下每

度多悲少樂兩足膝冷 熟地黃 附子 肉桂黃柏 知

母八分右作三劑如食少腹脹痛加茯苓白芍 各五分 陳皮五分元氣

虛極加人參 瑞 柴前梅連散 治風勞骨蒸久而不愈咳

嗽吐血盜汗遺精脈來弦數者 蒿泝梅胡黃芩 猪胆 一枚

猪膽 一條 韭白 童便 柴苑散 治咳唾中有膿血虛勞

肺痿 參 苑 芍 治肺痿咳嗽有痰午後熱 參 芍 膠 栝

人參養肺湯 治肺痿咳嗽有痰午後熱 參 芍 膠 栝

栝 栝

七珍散 治勞瘵咯血 即四君子湯加山茱萸黃栢粟米姜棗煎

### 陰虛火動

陰虛火動多難救為製滋陰降火湯

同滋陰降火湯 治陰虛火動潮熱咳嗽吐痰喘

急盜汗口乾此方與六味丸相兼服之

當歸 芍藥 生地 熟地

天門 麥門 白朮 陳皮 七分

知母 黃蘗 甘州 各五分

薑棗水煎服入竹瀝薑汁童便少許同服

骨蒸加柴胡地骨皮如服藥數劑熱不退加炒

黑乾薑三分 盜汗加黃芪酸棗仁 痰火咳

嗽加桑白皮紫苑黃芩 咳血加阿膠黃芩山

梔牡丹○乾咳嗽喉痛瘧聲嘔加瓜婁貝母  
 五味子杏仁○痰火作熱煩躁不安怔忡嘈雜  
 加酸棗仁黃連竹茹辰砂○腰痛加牛膝去天門○夢遺  
 ○腳腿痿弱加黃芪杜仲牛膝去天門○夢遺  
 泄精加山藥牡蠣杜仲破故紙去天門○小便  
 淋濁加萹薹車前子去芍○小腹痛加茴香木  
 香去麥冬○足心熱加山梔牛膝去麥冬○李  
 氏入門曰氣虛血火加人參黃芪○有痰加瓜  
 婁貝母○咳嗽加五味子阿膠○夢遺加芡實  
 蓮肉○有熱加秦艽地骨皮○唾吐咯血加茜  
 根藕汁○墊氏曰此方出慈溪王氏明醫雜著  
 其方原有川芎無麥冬雲林龔氏去之加之愚

亦製加減降火湯方去天門生地加人參青黛  
 貝母人中白降陰虛火亢攻上焦者如神

慈溪王氏曰凡酒色過度損傷肺腎真陰陰  
 虛火動勞嗽吐血等症服參芩甘溫  
 之劑則病且增服之過多則愈消惟宜苦甘  
 溫助氣氣屬陽旺則陰愈消惟宜苦甘  
 之藥生血降火世人不知往往服參芩  
 而病者多矣○朴聖王曰節齋之說本於  
 海藏但綸又過于矯激丹溪言虛火可補須  
 用參芪又云陰虛潮熱喘嗽吐血盜汗等症  
 四物加人參藥知又云  
 好色之人肺腎受傷

效嗽不愈瓊玉膏主之又云肺腎虛極者獨參  
 膏主之是知陰虛勞瘵之症未嘗不用人參也  
 古今治勞莫過於葛可久其獨參湯保真湯何  
 嘗廢人參而不用耶今世甘受苦寒雖至上嘔  
 下泄去或不遠亦不悟悲哉○李言聞曰東垣

言生脉散治暑益氣湯乃三伏瀉火益金之聖藥而海藏言人參補陽泄陰脾寒宜用肺熱不宜用節齋因而和之謂參芪能補肺火陰虛火動失血諸病多服必死二家之說皆偏矣夫參能補元陽生陰血而瀉陰火東垣之說也明矣長沙言亡血血虛者並加入參又言肺寒者去人參加乾薑無令氣壅丹溪亦言虛火可補二家不察三氏之精微而謂人參補火誤哉夫火與元氣不兩立元氣勝則邪火退人參既補元氣而又補邪火是反復之小人矣何以與甘艸苓朮謂之四君子耶雖然三家之言不可盡廢也惟其語有滯故守之者泥而執一凡人面

白面黃面青顴悴者皆脾肺腎氣不足可用也面赤面黑者氣壯神強不可用也脉之浮而芤濡虛大遲緩無力沉而遲濇弱細結代無力者皆虛而不足可用也若弦長緊實滑數有力者皆火鬱內實不可用也潔古謂喘嗽勿用者痰實氣壅之喘也若腎虛氣短喘促者必用也仲景謂肺寒欬勿用者寒束熱邪壅鬱在肺之欬也若自汗惡寒而欬者必用也東垣謂久病鬱熱在肺勿用者乃火鬱于內宜發不宜補也若肺虛火旺氣短自汗者必用也丹溪言諸痛不可驟用者乃邪氣方銳宜散不宜補也若裡虛吐利及久病胃弱虛痛喜按者必用也節齋謂



陰虛火旺 用者乃血虛火亢能食脉弦而數  
涼之則傷胃溫之則傷肺不受補者也若自汗  
氣短肢寒脉虛者必用也如此詳審則人參之  
可用不可用思過半矣○李時珍曰古書言知  
母佐黃蘗滋陰降火有金水相生之義黃蘗無  
知母猶水母之無蝦也黃蘗能利膀胱命門陰  
中之火知母能清肺金滋腎水之化源故潔古  
東垣丹溪皆以為滋陰降火要藥上古所未言  
也蓋氣為陽血為陰邪火煎熬則陰血漸涸故  
陰虛火動之病須之然必少壯氣盛能食者用  
之相宜若中氣不足而邪火熾甚者久服則有  
寒中之變近時虛損及縱慾未嗣之人用補陰

藥往往 此二味為君日日服餌降令太過脾  
胃受傷真陽暗損精氣不暖致生他病蓋不知  
此物苦寒而滑滲且苦味久服有反從火化之  
害故葉氏醫學統旨有四物加知母黃蘗久服  
傷胃不能生陰之戒○中山氏曰歸芍兩地可  
滋陰益血黃蘗知母可滋陰降火火動則金衰  
天門麥門可以救金火盛則氣耗白木甘州可  
以養氣陳皮所以消痰利氣也童便何也丹溪  
曰凡陰虛火動熱蒸如燎服藥無益者非童便  
不能故加竹瀝何也丹溪曰經云陰虛則發熱  
竹瀝味甘性緩能除陰虛之熱者寒而能  
補與薯蕷寒補義同故加又云竹瀝滑痰非

以薑汁不行故加

○六味地黃丸

治形體瘦弱

人多困腎氣久

虛寢汗發熱五藏齊損遺精血消渴淋濁等

症此藥不燥不溫補左尺腎水兼理脾胃火半

水虧火旺陰虛之症最宜服之○治心腎不交

消渴引飲加五味子二兩麥門冬三兩各腎氣

八味丸○如過傷於陰致相火勝者加黃蘗知

母各三兩

世壽

○加減益氣湯

治虛勞發熱口乾咳嗽吐痰喘

急自汗四支困倦無力不思飲食大便泄瀉肚

腹脹滿六脉浮數無力

蜜芪

人參一錢

白朮一錢

白茯苓一錢

陳皮

分

當歸

一錢

酒芍

山藥

蓮肉

錢各

炙甘

三分

薑棗水煎服○痰盛加半夏麩○嗽盛加五味

子○口渴加麥門冬○腹脹加厚朴○胸痞加

枳實○泄瀉加炒黑乾薑○嘔吐加薑炒半夏

○腫滿加楮芩澤瀉木通○憎寒發熱加羌胡

○元氣下降加升麻○元陽虛憊加熟附子肉

桂○埜氏日案王節齋云此病屬火大便多燥

然須節調飲食勿令泄瀉若胃氣復壞泄瀉稀

唐則前項寒涼之藥難用矣急宜服藥理脾胃

俟胃氣復然後用本病藥如

火熾五心煩

者人中白散乃良

傳人中白散 治陰虛火盛五心煩熱等症

人中白 二兩

黃礬

甘州

青黛

右四味為末每二錢童使調服

古人服藥活法

在上則不厭頻而少在下則不厭頓而多少服則滋榮於上多服則峻補於下

古人服藥有法

病在心上者先食而後藥 病在心下者先藥而後食 病在四肢者宜飢食而在且病在骨髓者宜飽食而在夜

要略卷之四



察病輕

凡欲療病先察其源先低其機五臟未虛六腑未竭血脈未亂精神未散服藥必効若病已成可得半愈病勢已過命將難存自非明醫聽聲察色至於診脈孰能知未病之病乎

五宜

毒藥攻邪

五穀為糧

五果為助

五畜為益

五菜為充

肝色青宜食耳粳米牛肉束葵皆耳  
心色赤宜食酸犬肉麻李韭皆酸  
脾色黃宜食鹹大豆豕肉栗藿皆鹹  
肺色黑宜食辛黃黍雞肉桃葱皆辛  
腎色白宜食甘小麥牛肉杏薤皆甘  
凡藥合而服之以補精益氣此五者在辛酸耳苦鹹又有所利  
或苦或收或緩或急或堅或軟四時五臟 五味所宜也

