



外科精義

上  
卷之一・二

ヤ 9  
1177  
1



79  
1177

武母之方

外科精義序

七一

掌聞名臣奏疏對策每

及治為必取喻于醫云

保身者肉而元神宜固

外而癰疥宜防相因之



91-2397

理也。未有元神虛而癩  
疥。有無虞者。未有癩疥  
得象而元神不至。斷者  
此。謂是善喻也。予又以  
治是喻鑿。夫內治修而

外治。亦。南。則。夷。裔。得。勿  
干。之。內。治。修。而。外。治。南。  
高。輒。棗。克。蚩。尤。而。奏。垂。  
裳。虞。牽。征。有。苗。而。臻。恭。  
已。是。鑿。有。內。外。科。六。然。

昔神農嘗學。黃帝作經。  
靈蘭秘典。暨學之源。嗣  
後名醫。代化推本。二聖  
人遺義。發其所未發。以  
啓來學。至系御暨齊。共

邃于鑿。而於外科尤精。  
手祕。古人醫說之要。亦  
其平日治法之驗者。題  
曰外科精義。屬于訂正。  
因讀之。三復而恍有得。

焉。夫醫之為義實難矣。脈候雖有訣而者乎。入微方書雖有傳而艱于對病。茲集欲博而約。汰粗為精。皆古名家雜著。

辨脈論。診一以虛實為據。乘而用之。具曰的驗。種在脈。察脈証之。虛實實其虛。其實在傳義也。第時醫。少知其義。于凡

癰疽疔腫諸危證。生  
外察虛實。局守方藥。而  
槩以試之。于人鮮不為  
其以誤。則此篇不可不  
傳于世文。一篇止鑿上

二二卷。其起死回生。亦  
帝每扁。羊秘書。修肉攘。  
外默。穿經。世之神功。原  
如要終。備舉活人之妙。  
用醫人治。國理。同予異。

起。沉。疴。于。原。又。而。震。壽。  
高。之。源。者。豈。止。是。身。已。  
哉。蓋。尹。子。肥。身。民。物。視。  
天。下。之。震。疴。疾。痛。殘。疾。  
瘦。癯。若。痲。痺。乃。身。皆。有。

以。惕。于。中。而。動。其。心。忍。  
雖。髮。膚。身。體。苟。可。以。用。  
吾。老。者。且。求。以。濟。之。而。  
無。所。屬。將。使。斯。世。其。躋。  
壽。域。無。一。不。樂。生。彼。澤。

者。勿。何。有。乎。札。瘵。短。折。  
之。患。語。云。尔。為。良。相。昂。  
為。良。醫。首。志。是。義。可。其。功。  
詎。小。禮。也。至。于。先。子。防。  
患。所。謂。藥。鑒。于。未。病。在。

此。又。齊。尹。鑿。方。云。外。之。  
深。義。也。循。此。義。以。為。治。  
是。則。夷。氣。靖。而。虜。韻。消。  
外。攘。之。績。好。內。修。之。要。  
務。耶。君。之。仁。民。愛。物。自。



蜀子天壤亦朽云。  
宣授保全郎陝西等路  
暨局提舉馬雲瑞祥題



外科精義目錄

卷之一

論瘡腫診候入式法

論榮衛色脉參應之法

論持手訣消息法

論三部所主臟腑病證

論脉證名狀二十六種所主病證

論三部脉所主證候

論三部脉所主雜病法訣

論診候肺疽肺痿法  
論將護忌慎法

卷之二

論瘡疽腫虛實法

辨瘡腫淺深法

辨膿法

辨瘡疽癰腫證候法

辨瘡疽善惡法

砭鎌法

貼燻法

湯漬瘡腫法

針烙瘡腫法

灸療瘡腫法

內消法

追蝕瘡疽腫法

托裏法

止痛法

用藥增損法

療瘡腫權變通類法

論五發疽

論癰疽

論附骨疽

論陰瘡

論時毒

論諸瘡

論丁瘡腫

辨丁腫十三種形色禁忌

論療癰治法

論痔瘻

卷之三

漏蘆湯

化毒丹

內消丸

五利大黃湯

內消升麻湯

五香連翹湯

牡礪大黃湯

和血通氣丸

地黃煎丸

槐角煎丸

皂角煎丸

苦參散

苦參丸

肺風丸

連翹散

竹葉黃芪湯

枳殼丸

五香湯

托裏黃芪湯

托裏茯苓湯

托裏當歸湯

托裏散

托裏玄參散

內托散

內補散

內塞散

香粉散

止痛當歸湯

黃芪茯苓湯

內補防風散

伏梁丸

溫經丸

木香濕腫湯

升麻濕腫湯

濕腫升麻湯

猪蹄湯

甘艸大豆湯

濕腫湯

洗毒湯

浴毒湯

何首烏散

八仙散

消毒湯

熨風散

應痛丸

黃芪丸

梔子仁湯

葛根牛蒡子湯

通氣散

白丁香散

金銀花散

皂蛤散

十香膏

犀角膏

乳香膏

白龍膏

消毒膏

磨風膏

天麻膏

善應膏

靈應膏

翠玉膏

追毒散

廻瘡錠子

射膿丸

替鍼丸

治療癰 并馬老鼠瘡

翠霞散

搜膿散

引膿散

乳香散

釣苓散

截疔散

抵聖散

青金錠子

白龍散

桃紅散

檳榔散

外科精義

金黃散

生肌散

水澄膏

拔毒散

金露散

消毒散

卷之四

大檳榔散

天麻散

決効法

水銀膏

平肌散

神黃散

博金散

金傷散

完肌散

定血散

碧霞錠子



漏蘆湯

土粉散

香礬散

紫金散

通耳丹

菖蒲錠子

寸金錠子

薰痔散

通靈丸

三神丸

玉芝飲子

平和飲子

玄參丸

犀角散

防風散

烏金散

劉守真瘡論

沒藥膏

必效散

烏金散

抵聖丸

應效散

白金散

如聖散

天蛾散

必效散

蛤粉散

治小兒丹瘤

治小兒疳口瘡

治破傷風 并洗頭風藥

烏龍丸

紫參丸

萬靈丸

治眼

治吹妳

治痔瘡

洗痔

寸金丹

牙疳藥

迴瘡蟾酥錠子

乳香托裏散

四聖旋丁散

天丁散

萬應膏

治小兒面湮瘡

治赤白口瘡

治乾濕疥癬

治湯火燒燙瘡

治破傷風

治破傷

治風狗咬破傷風

論炮製諸藥及單方主療瘡腫法

目錄終

東垣十書

目錄

十一

外科精義卷之一

醫學博士選充御藥院太醫齊德之篋  
宣授保全郎陝西醫局提舉馬雲卿技

○○論瘡腫診候入式法

夫醫者人之司命也。脉者醫之大業也。蓋醫家苟不明脉。則如冥行索途。動致顛覆矣。夫大方脉。婦人小兒風科。必先診脉。後對證處藥。獨瘡科之流。多有不診其脉候。專攻治外。或有證候疑難。別召方脉診察。於瘡科之輩。甘當淺陋之名。噫。其小哉。如是原夫瘡

腫之生。皆由陰陽不和。血氣凝滯。若不診候。何以知陰陽勇怯。血氣聚散耶。由是觀之。則須信療瘡腫。于診候之道。不可闕也。歷觀古今治療瘡腫方書甚多。其間診候之法。略而未詳。比夫諸科。甚有滅裂。愚雖不才。輒取黃帝素問。難經靈樞甲乙。及叔和仲景扁鵲華陀千金外臺聖惠總錄。古今名醫諸家方論之中。診候瘡腫之說。簡編類次。貫成篇帙。首載診候入式之法。次論血氣色脉參應之源。後明脉之名狀。所主證候。及瘡腫逆從之方。庶使爲瘡腫科者。覽此。則判然可曉。了無凝滯於胸次。一朝臨疾。診候至此。則察逆從。決成敗。若黑白之易分耳。

○論榮衛色脉參應之法

夫天地之道曰陰與陽。陰陽在人曰血與氣。蓋血者榮也。氣者衛也。榮者榮於中。衛者衛於外。所以榮行脉中。衛行脉外。脉者血氣之先也。血非脉。則焉能榮於中。氣非脉。則焉能衛於外。二者相資而行。內則通於五臟六腑。十二經絡。外則濡於九竅四肢百節。萬毛晝夜循行。如環無端。以成其度。會於寸口。變見於

脈故曰氣血者人之神也。脈者氣血之神也。所以治病之始。五決爲紀。蓋五決者五臟之色。脈也。脈應於內。色應於外。其色之與脈當相參應。故曰能合色脈。可以萬全也。凡爲醫。先須調明色脈。况爲瘡科。若於此不精。雖聰惠辨博。亦不足委也。

○○論持手訣消息法

夫診候之脈法。常以平旦爲紀。陰氣未散。陽氣未動。飲食未進。氣血未亂。經脈未隆。絡脈調勻。故乃可診。有疾之脈。若遇倉卒病患。不拘此論。內經所謂持脈

有道。以虛靜爲保。但可澄神靜慮。調息凝心。視精明。察五色。聽音聲。問所苦。方始按寸尺。別浮沉。以此參照。決死生之分矣。復觀患人身形長短肥瘦。老少男女。性情緩急。例各不同。故曰形氣相得者生。三五不調者病。謂如室女。尼冠。脈當濡而弱。嬰兒孺子之脈。細而疾。三四歲者。呼吸之間。脈當七八至爲平。比夫常人。特不同耳。大抵男子先診左手。女子先診右手。男子左脈大則順。女子右脈大則順。大凡診脈。先以中指揣按掌後高骨。骨下爲關。得其關位。然後齊下

兩左右二指若臂長人疎排其指若臂短人密排其指。三指停穩先診上指曰寸口。浮按消息之中按消息之重按消息之上竟消息之下竟消息之推而外之消息之推而內之消息之然後先關後尺消息一類此。若診得三部之中浮沉滑澁遲疾不調何病所主。外觀形色內察脉候。參詳處治以忠告之不可輕言談笑。亂說是非。左右瞻望舉止忽略此醫之庸下也。

○論三部所主臟腑病證

夫診候之道醫者之難精也。若非燈下苦辛勤於記誦。參師訪友。晝夜不遑。造次顛沛。寤寐仰俯。存心於此。安能知神聖之妙哉。古人曰。按其脉知其疾。命曰神。以悟其探頤索隱之妙也。又曰。切其脉治其病。謂之巧。以明其指別之功也。蓋三指相去毫釐之近。主病若千里之遠。觀夫指別之功。世人固以為難。命曰神。豈容易可至哉。常考於經脉有三部。寸關尺。一從魚際至高骨却行一寸曰寸。從寸上一分曰魚際。從寸至尺曰尺。澤寸後尺前為關。關前為陽。即寸口也。

關後爲陰。卽尺脉也。陽出陰入。以關爲界。寸主上焦。頭手皮毛。關主中焦。腹及腰。尺主下焦。小腹及足。此三部所主大略也。又有左右兩手三部爲之六脉也。又有人迎氣口神門所主。又各不同。蓋左手關前曰人迎。右手關前曰氣口。兩關之後一分卽曰神門。故脉法讚曰。肝心出左。肺脾出右。腎爲命門。俱出尺部。魂魄穀神皆見寸口。所謂左手關前心之部也。其經手少陰與手太陽爲表裏。小腸合爲府。左手關上肝之部也。其經足厥陰與足少陽爲表裏。膽合爲府。左

手關後腎之部也。其經足少陰與足太陽爲表裏。膀胱合爲府。右手關前肺之部也。其經手太陰與手陽明爲表裏。大腸合爲府。右手關上脾之部也。其經足太陰與足陽明爲表裏。胃合爲府。右手關後命門之部也。其經手厥陰與手少陽爲表裏。三焦合爲府。此謂六部所主臟腑十二經之義也。又脉要精微論曰。尺內兩旁則委脇也。尺外以候腎。尺裏以候腹。中附上左外以候肝。內以候膈。右外以候胃。內以候脾。上附上右外以候肺。內以候胸中。左外以候心。內以候



亶中前以候前後以候後上竟上者胸喉中事也下竟下者小腹腰股膝脛足中事也粗大者陰不足陽有餘爲熱中也來疾去徐上實下虛爲厥顛疾來徐去疾上虛下實爲惡風也故中風者陽氣受也有脈俱沉細數者少陰厥也沉細數散者寒熱也浮而散者爲恂忭諸浮不躁者皆在陽爲熱其有躁者在乎陽諸細而沉者皆在陰則爲骨痛其有靜者在足數動一代者病在陽之脈也洩及便膿血諸過者切之滑者陽氣有餘也滑者陰氣有餘也陽氣有餘爲身

熱無汗陰氣有餘爲多汗身寒陰陽有餘則無汗身寒推而外之內而不外者有心腹積也推而內之外而不內者身有熱也推而上之上而不下者腰足清也推而下之下而不上者頭項痛也按之至骨脈氣少者腰脊痛而身有痺也已上諸疾若非指明心了烏可得而妙也又平人氣象論曰一呼脈再動一吸脈亦再動呼吸定息脈行五動爲以大息不大不小不長不短不滑不澀不浮不沉不遲不數命曰平人平人者不病也蓋平人之常氣稟乎胃胃氣者平人

之常氣也。所以人常稟氣於胃。故脈以胃氣爲本也。正理論曰。穀入於胃。脈道乃行。合靈樞經云。胃爲水穀之海也。又曰。脈應四時曰平信。夫四時之脈。皆以胃氣爲本。謂春弦夏洪秋毛冬石。春之胃脈微弦曰平。餘皆倣此。逆四時有病。具若診婦人之脈。妊身則慎勿亂投湯散。其婦人之脈。診得少陰脈動。甚則有子也。又曰。陰搏陽爲有子也。又曰。身汗而無脈者。卽有妊也。蓋重身者。問其月事。觀其體貌。然後主治。不可忽也。又經曰。察色按脈。先別陰陽。蓋陰陽者。天地

之道也。是以治病者。必求其本。本於陰陽。寒暑四時。五臟之根也。以脈言之。則浮沉也。以部言之。則尺寸也。故經云。脈者陰陽之法。以應五臟。是謂呼出心與肺。吸入腎與肝。呼吸之間。脾受穀味。其脈在中也。以浮沉論之。則曰浮者陽也。沉者陰也。應在臟腑。則浮而大散者心也。浮而短濇者肺也。所以心肺俱浮也。牢而長者肝也。按之而大舉指來實者腎也。所以肝腎俱沉也。遲緩而長者脾也。脾爲中州。所以脈在中也。仲景曰。大浮數動滑皆陽也。沉濇弱弦微皆陰也。

陽者熱也。陰者寒也。所以寒則脈來沉而遲。熱則脈來浮而數。故曰諸數爲熱。諸遲爲寒。無如此驗也。脈經曰。諸浮爲風。諸緊爲痛。諸伏爲聚。諸弦爲飲。芤者失血。長則氣治。短則氣病。濇則煩心。大則病進。浮爲在表。沉爲在裏。遲爲在臟。數爲在腑。又形壯脈細。少氣不足以息者危。形瘦脈大。胸中氣多者斃。形氣相得者生。三五不調者病。三部九候皆相失者死。此先聖診脈之大法也。故曰凡治病則察其形氣色澤。治之無候其時也。所以形氣相得者生。色澤以浮者病。

易已脈從四時者可治。脈弱似滑者是有胃氣。此皆易治也。若形氣相失。或色天不澤。及脈逆四時。或脈實益堅。皆不可治。經所謂必察四難而明告之。又若病熱脈靜。泄而脈大。脫血脈實。汗後脈躁。此皆難治也。若瘡疽之人。膿血大泄。脈滑數者難治也。凡瘦膿多。或如清泔。脈滑大散。寒熱發渴者。治之無功也。若患肺瘡者。咳嗽膿血。脈見洪滑。治之難痊矣。大凡診脈見浮數。應當發熱。而反惡寒。雖頭項拘急。四肢煩痛。或復戰慄渴甚者。但有痛處。欲發瘡腫也。

○論脉證名狀二十六種所主病證

夫脉之大體二十六種此診脉之紀綱也。細而論之毫釐少差舉治必遠。總而言之逆從虛實陰陽而已。兩者議之以要其中。謹於諸家脉法中。撮其機要。翦去繁蕪。載其精義。

○浮脉之診。浮於指下。按之不足。舉之有餘。再再尋之。狀如太過。瞥瞥然見於皮毛間。其主表證。或為風。或為虛浮。而大散者。心也。浮而短濇者。肺也。浮而數者。熱也。浮數之脉。應發熱。其不發熱而反惡寒者。瘡疽之謂也。

○洪脉之診。似浮而大。按舉之。則泛泛然滿三部。其狀如水之洪流。波之湧起。其主血實積熱瘡腫。論曰。脉洪大者。瘡疽之病進也。如瘡疽結膿未成者。宜下之。膿潰之後。脉見洪大。則難治。若自利者。不可救治也。

○滑脉之診。實大相兼。往來流利如珠。按之則累累然滑也。其主或為熱。或為虛。此陽脉也。瘡疽之病。膿未潰者。宜內消也。膿潰之後。宜托裏也。所謂始

爲熱而爲虛也。

○數脈之診。按之則呼吸之間。動及六至。其狀似滑而數也。若浮而數則表熱也。沉而數則裏熱也。又曰。諸數爲熱。仲景曰。脈數不時見。則生惡瘡也。又曰。肺脈俱數。則生瘡也。診諸瘡。洪數者裏欲有膿結也。

○散脈之診。似浮而散。按之則散而欲去。舉之則大而無力。其主氣實而血虛。有表無裏。瘡腫膿潰之後。而煩痛尚未痊退者。診其脈洪滑粗散。難治也。

以其正氣虛而邪氣實也。又曰。肢體沉重。肺脈大則斃。謂浮散者也。

○芤脈之診。似浮而軟。按之中央空兩邊實。其主血虛。或爲失血瘡腫之病。診得芤脈。膿潰後易治。以其脈病相應也。

○長脈之診。按之則洪大而長。出於本位。其主陽氣有餘也。傷寒得之。欲汗出自解也。長而緩者。胃脈也。百病皆愈。謂之長。則氣治也。

○牢脈之診。按之則實大而弦。且沉且浮。而有牢堅。

之意若瘰癧結腫診得牢脈者不可內消也

○實脈之診按舉有力而類結曰實經曰邪氣勝則實久病則虛人得此最忌瘡疽之人得此宜急下之以其邪氣與臟腑俱實故也

○弦脈之診按之則緊而弦其似緊者為弦如按弦而不移緊如內繩而轉動以此為異春脈浮弦而平不時見則為飲為痛主寒主虛瘡疽論曰弦洪相搏外緊內熱欲發瘡疽也

○緊脈之診似弦而緊按之如切繩而轉動其主切痛積癖也瘡腫得之氣血沉滯也亦主痛也

○瀦脈之診按之則散而復來舉之則細而不足脈瀦則氣瀦也亦主血虛瘡腫潰後得之無妨也

○短脈之診按舉則不及本位內經曰短則氣病以其無胃氣也諸病脈短皆難治也瘡腫脈短真氣短也

○細脈之診按之則縈縈如蜘蛛之絲而欲絕舉之如無而似有細而微其主亡陽衰也瘡腫之病脈來細而沉時直者裏虛而欲變證也

○微脉之診按之則軟小而極微其主虛也真氣復者生邪氣勝者危瘡腫之病潰後脉微而勻舉自差也。

○遲脉之診按舉來遲呼吸定息方得三至其狀似緩而稍遲痼疾得之則善新疾得之則正氣虛憊瘡腫得之潰後自痊。

○緩脉之診按舉似遲而稍駛於遲仲景曰陽脉浮大而濇陰脉浮大而濇陰陽同等謂之緩脉見長緩百疾自瘳凡諸瘡腫潰後其脉濇遲緩者皆易

愈以其脉候相應是有胃氣也

○沉脉之診舉之不足按之方見如爛綿其主邪氣在臟也水氣傳之則逆此陰脉也瘡腫得之邪氣深也。

○伏脉之診此沉而伏舉之則無按之至骨方得與沉相類而邪益深矣。

○虛脉之診按之不足遲大而軟輕舉指下豁然而空經曰脉虛則血虛血虛生寒陽氣不足也瘡腫脉虛宜托裏和氣養血也。

○軟脈之診按之則如帛在水中極軟而沉細亦謂之濡其主胃氣弱瘡腫得之補虛排膿托裏

○弱脈之診似軟而極微來遲而似有仲景曰微弱之脈綿綿如瀉漆之絕其主血氣俱虛形精不足大抵瘡家沉遲濡弱皆宜托裏

○促脈之診按之則去數來時一止而復來仲景曰陽盛則促主熱畜於裏也下之則和瘡腫脈促亦急下之

○結脈之診按之則往來遲緩時一止而復來仲景曰陰盛則結經曰促結則生代則死

○代脈之診按之則往來動則中止不能自還因而復動者曰代脈也代者氣裏也諸病見之不祥大凡瘡腫之病脈促結者難治而況見代脈乎

○動脈之診見於關上無頭尾如豆大厥厥然而動搖者是也脈經曰陰陽相搏故謂之動動於陽則陽氣虛而發厥動於陰則陰氣成而發熱是陽生於尺而動於寸陰生於寸而動於尺不可不辨也

○論三部脈所主證候



○夫寸關尺者。脉之位也。浮沉滑濇者。脉之體也。奠位分體。指文語證者。診脉之要道也。脉經曰。大凡診候兩手三部脉。滑而遲。不浮不沉。不長不短。去來齊等者。無病也。

○寸口脉浮者。傷風也。緊者。傷寒也。弦者。傷食也。浮而緩者。中風也。浮而數者。頭痛也。浮而緊者。膈上寒。脇下冷飲也。沉而緊者。心下寒而積痛。沉而弱。者。虛損也。緩而遲者。虛寒也。微弱者。血氣俱虛也。弦者。頭痛。心下有水也。雙弦者。兩脇下痛也。偏絕

者。不遂也。俱絕者。不治也。漉漉如羹。土肥者。陽氣微也。連連如蜘蛛絲者。陽氣衰也。

○關主中焦胸腹中事。去來徐而緩者。無病也。浮者。腹滿而不欲食。胃虛脹也。滑者。客熱在胃也。數者。熱結中焦也。沉伏者。中焦水氣。或嘔逆而吞酸也。弱者。胃氣虛也。雖有虛熱。不可大攻。須防熱去則生寒也。牢而實者。腹滿嚮嚮。噎塞而不通。或復大痛澀者。氣逆也。芤則瀉血。濇堅太實。按之不減。而有力者。中焦實。有結伏在胃也。微浮者。積熱不消。

虬動心悸也。

○尺主下焦腰腎膝脛足中事也。尺脉浮者風熱小便難也。沉者腰背痛而腎氣不足。數者臍下熱痛。小便赤色而惡寒也。逆者下焦寒而陰虛也。緊者臍下小腹急痛也。緩者脚弱下腫而痿痺也。弱者下冷而腎氣衰也。軟者脚不收而風痺小便難也。伏者小腹痛而疝瘕穀不化也。細者溏泄而下冷也。乳者小便瀝血而下虛也。牢而小者足膝寒痺。脚下隱隱疼痛也。細而急者筋攣不能行也。來而

斷絕者男子小腹有滯氣也。婦人月水不利也。

○論三部脉所上雜病法訣

夫三部之中俱見一脉所主雜病略而言之。脉經曰。陽邪來見浮洪。陰邪來見微細。水穀之邪來見實堅。寒癖之邪來見弦小。又曰。浮而滑者宿食也。短而滑者酒病也。遲而滑者脹滿也。洪而大者傷寒也。浮而數者傷風也。浮而急者飲食不消。脾不磨也。沉而弦者寒氣結而陰痛也。浮而緩者皮膚不仁也。滑而散者癰瘰也。遲而瀉者寒瘕也。浮而瀉者霍亂也。弱而

瀦者。反胃也。緊而滑者。吐逆也。短而數者。心痛也。弦而數者。爲瘧也。緊而急者。尸遁也。實小而堅者。病在內而冷也。浮滑而緊者。病在外而熱也。短而急者。病在上也。長而緩者。病在下也。長而弦者。病在肝也。滑而洪者。病在心也。微而軟者。病在脾也。浮而瀦者。病在肺也。沉而緊者。病在腎也。又訣曰。諸浮爲風。或爲虛也。諸緊爲痛。或爲積也。諸瀦爲痺。諸弦爲飲。諸數爲熱。諸遲爲寒。芤則爲失血。軟則爲虛。若脈沉沉澤澤。四肢不仁者。亡祟也。或大而懈懈者。社祟也。若脈來乍大乍小。乍短乍長者。鬼祟也。

○ ○ 論診候肺疽肺痿法

夫肺者。五臟之華蓋也。處于胸中。主于氣。候于皮毛。勞傷血氣。腠理虛而風邪乘之。內感于肺也。則汗出惡風。咳嗽短氣。鼻塞項強。胸膈脹滿。久久不瘥。已成肺痿也。風中於衛。呼氣不入。熱至於榮。則吸而不出。所以風傷皮毛。熱傷血脈。風熱相搏。氣血稽留。蘊結於肺。變成瘡疽。診其脈候。寸口脈數而虛者。肺痿也。數而實者。肺疽也。肺痿之候。久嗽不已。汗出過度。重

東垣十書 卷一  
亡津液。便如爛瓜。下如豕脂。小便數而不渴。渴者自愈。欲飲者欲瘥。此由肺多唾涎沫而無膿者。肺痿也。其肺瘡之候。口乾喘滿。咽燥而渴甚。則四肢微腫。咳唾膿血。或腥臭濁味。胸中隱隱微痛者。肺疽也。又聖惠曰。中府隱隱而微痛者。肺疽也。上肉微起者。肺瘡也。中府者穴也。在雲門下一寸六分。乳肋間動。脈應手陷中也。是以候始萌則可救。膿成則多死。若欲知有膿者。但診其脈。若微緊而數者。未有膿也。緊甚而數者。已有膿也。又內經曰。血熱則肉敗。榮衛不行。必

將爲膿。大凡肺瘡當咳嗽短氣。胸滿時唾膿血。久久如粳米粥者難治。若嘔膿而不止者亦不可治也。其嘔膿而自止者自愈。其脈短而濇者自痊。浮大者難治。其面色當白而反面赤者。此火之尅金。皆不可治。

○論將護忌慎法

大凡有瘡疽生。皆只如黍粟粒許。大其狀至微。人多不以爲急。此蘊大患。宜速辨之。不可自忽。若能防之於未形。理之於未成。或朝覺而夕治。求治於良醫。則必無危困矣。若因循慢忽。詢於庸醫。致令膿血結聚。

委之於命。束手待斃。不以去道遠乎。以致筋骨敗遺。穿通臟腑。死者十有八九矣。可不慎歟。蓋患瘡疽之人。托命庸醫。任意措置。危殆立至。若用良醫。則可保痊愈。用醫之際。不可不擇。辨之何難。若能飽讀經書。久諳證候。湯藥熟閑。洞明色脉。性情仁善。孝義忠信。臨事不惑。處治有決。方爲良醫。委用勿疑。然後要在病人自克。不可恚怒悲憂。叫呼忿恨。驕恣情性。信任口腹。馳騁勞役。惟宜清靜恬澹。耐煩爲宜。於患人左右。止息煩雜。切忌打觸器物。諸惡音聲。爭辨是非。呪

罵鬪毆。及產婦姪男。體氣不潔。帶酒腥羶。鷄犬乳兒。孳畜禽獸。並須遠離。設或親友重意。問疾者可以預囑。徐行低聲。欵曲伺候。禮畢躬退。勿令嗟呀。驚怪話舊。引其遊賞宴樂。遠別親戚。牽惹情懷。但恐病人心緒淒愴。尤不可亂舉方藥。徒論虛實。惑亂患人。凝滯不決。祇合方便省問。不可久坐多言。勞倦病人。深不長便。夫侍患者。宜須壽近中年。情性沉厚。勤謹耐煩。仁慈智惠。全在調以粥藥。無失時節。勿令於患人左右。彈指嗟咨。掩淚竊言。感激病人。甚不利便。飲食之

東垣十書 卷一  
間忌慎非細。不可不載。畜中勿食驢馬駝騾猪狗牛  
殺羊等。并雜魚龜鱉蝦蟹及淹泥臭陳自死病倒之  
類。慎勿嘗啖。飛禽之中忌食鵝鴨鴻鷹雀鶴鴛鴦鷺  
鷯鳩鴿鴉鷄雉。及能學人言者。慎勿食之。野獸之中  
忌食獐鹿狐兔虎豹熊豺。及爪牙害人。有毒蟲獸。并  
父母自本命生屬。忌慎勿嘗啖。菜蔬之中忌食黃瓜  
茄子蘭香芸薹胡荽生菜蓼芥茵瓠韭蒜葱薤。慎勿  
食之。果木之中忌食桃杏棗栗李奈梨梅。軟棗紅柿  
櫻桃胡桃榛松林檎。及諸虫蚋未熟之果。慎勿食之。

若其瘡疽膿潰腫消。氣血虛弱。則可食羊肉鵪鶉蔓  
菁薑醬瓜薺蘿蔔。及黃白糧米細米稀粥。軟飲。若至  
肌肉漸生。思想滋味。則宜食白熟酥餅。薑粥羹湯。熟  
軟溫和。稀稠得中。製造如法。勿令太飽。此時猶忌饅  
頭蒸餅。餚飩餛飩。肉角煎餅。及炙燂煨煨煎炒。鹹酸  
油膩。脂肥魚肉。若至肌膚欲平。惡肉去盡。瘡口收斂  
之際。尚忌起立行步。揖待賓客。房酒宴會。嗔怒沐浴  
登陟臺榭。運動肢體。寒暑勞倦。正宜調節飲食。保攝  
以待瘡癩平復。精神如故。氣力完全。方無所忌。百日

內慎勿觸犯之。

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 內、外、科、精、義、卷、之、一]*

外科精義卷之一

外科精義卷之二

醫學博士選充御藥院太醫齊德之纂

宣授保全郎陝西醫局提舉馬雲卿校

○○論瘡疽腫虛實法

夫瘡疽膿潰。腫毒浸展。證候危惡者。須辨虛實。況夫虛者難補。實者易瀉。補瀉之法。不可輕用。若或少差。利害甚大。然而虛實證多端。不可不辨。有瘡之虛實。有臟腑氣血。上下真邪。各有虛實。故不同也。分而言之。則腫起堅硬。膿稠者。瘡疽之實也。腫下軟慢。膿稀

者。瘡疽之虛也。瀉痢腸鳴。飲食不入。嘔吐無時。手足  
竝冷。脉弱皮寒。小便自利。或小便時難。大便滑利。聲  
音不出。精神不爽者。悉臟腑之虛也。大便硬。小便澀。  
飲食如故。腸滿膨脹。胸膈痞悶。肢節疼痛。口苦咽乾。  
煩躁多渴。身熱脉大。精神昏塞者。悉臟腑之實也。凡  
諸瘡疽膿水清稀。瘡口不合。聚腫不赤。肌寒肉冷。自  
汗色脫者。氣血之虛也。腫起色赤。寒熱疼痛。皮膚壯  
熱。膿水稠粘。頭目昏重者。氣血之實也。頭疼鼻塞。目  
赤心驚。咽喉不利。口舌生瘡。煩渴飲冷。睡語咬牙者。

上實也。精滑不滯。大便自利。腰脚沉重。睡卧而不寧  
者。下虛也。肩項不便。四肢沉重。目視不正。睛不了了。  
食不知味。音嘶色敗。四肢浮腫者。真氣之虛也。腫焮  
尤甚。痛不可近。積日不潰。寒熱往來。大便秘澀。小便  
如淋。心神煩悶。恍惚不寧者。邪氣之實也。又曰。真氣  
奪則虛。邪氣勝則實。又曰。諸痛為實。痒為虛也。又曰。  
診其脉洪大而數者。實也。微細而軟者。虛也。虛則補  
之。和其氣。托裏也。實則瀉之。疎利而自導其氣。內經  
謂血實則決之。氣虛則掣引之。



○○辨瘡腫淺深法

夫瘡候多端。欲辨淺深。直須得法。若不素知方論。而妄生穿鑿者。如大匠捨其繩墨。以意度量。安能中於規矩哉。嘗聞古人有言曰。多則惑。少則得。簡而論之。則瘡疽槩舉有三種。高而軟者。發于血脉。腫下而堅者。發于筋骨皮肉。色不相辨者。發于骨髓。又曰。凡瘡瘡疽。以手按揉。瘡腫根牢而大者。深也。根小而浮者。淺也。又驗其人初生瘡之時。便覺壯熱惡寒。拘急頭痛。精神不寧。煩躁飲冷者。其患瘡疽必深也。若人雖

患瘡疽。起居平和。飲食如故。其疾浮淺也。惡瘡初生。其頭如米粟。微似有痛痒。誤觸破之。卽煖展。覺有深意。速服犀角湯。及漏蘆湯。通氣丸等。取通利疎暢兼用。浴毒湯。漏漬之類。若浮淺者。紙貼膏求差。以此推之。淺深之辨。始終之次者也。

○○辨膿法

夫瘡腫之疾。毒氣已結者。不可論內消之法。卽當辨膿生熟淺深。不可妄開。視其可否。不至于危殆矣。凡瘡疽腫大。按之乃痛者。膿深也。小按之便痛者。膿淺

東垣十書 卷二  
也按之不甚痛者未成膿也。若按之即復者有膿也。不復者無膿也。非膿必是水也。若發腫都軟而不痛者血瘤也。發腫日漸增長而不大熱時時牽痛者氣痛也。氣結微腫久而不消後亦成膿。此是寒熱所爲也。留積經久極陰生陽寒化爲熱以此潰必多成癰。宜早服內塞散以排之。諸癰瘤疔贅等至年衰皆自內潰若干年壯可無後憂也。又凡癰疽以手掩其上大熱者膿成自軟也。若其上薄皮剝起者膿淺也。其腫不甚熱者膿未成也。若患癰疽結核寒熱發渴經久不消者其人面色痿黃被熱上蒸已成膿也。至於臟腑腸胃內瘡內疽其疾隱而不見目既不見手不能近所爲至難可以診其脈而辨之亦可知矣。有患胃脘癰者當候胃脈人迎者胃脈也。其脈沉細者氣逆則甚甚則熱聚胃口而不行胃脘而爲癰也。若其脈洪數者膿已成也。設脈遲緊雖膿未就已有瘀血也。宜急治之不爾則邪毒內攻腐爛腸胃不可救也。又肺癰論曰始萌則可救膿成即死不可不慎也。久久咳膿如粳米粥者不治嘔膿而止者自愈也。又

東垣十書 卷二 四  
腸癰論曰。或遠臍生瘡。膿從瘡出者。有出臍中者。惟大便下膿血者。自愈也。

○辨瘡疽癰腫證候法

夫瘡疽癰腫。其名甚多。載之紛紜。方書百緒。及至臨疾治之。無據。不知所以內經曰。知其要者。一言而終。不知其要者。流散無窮。愚雖不才。姑揣其要而言之。熱發於皮膚之間。是以浮腫根小。至大不過二三寸者。癰也。六腑積熱。騰出於外。肌肉之間。其發暴甚。腫皮光軟。侵展廣大者。癰也。五臟風積。熱攻。熾于肌膚。

七四

風毒猛暴。初生一頭如痞。癰白焦枯。觸之應心者。疽也。夫癰發於六腑。若燎原之火。外潰膚肉。疽生五臟。沉澀難療。若陶室之燧。內消骨髓。癰則易療。惟難將息。而遲瘥。疽則難療。易得痊復。夫癰與瘡初生。並宜灸之。謂其氣本浮達。以導其熱。令速暢也。疽則烙不宜灸。謂其氣本深沉。須達其原也。凡瘡疽生於外。皆由熱毒蘊於內。明乎三者。腫毒丹癰。可以類推矣。蓋皮膚微高起。而肌厚。或痛或痒。移走無常者。謂之腫。有因風而得之者。有因風熱相搏而得之者。腫硬色。

東垣十書 卷二  
白因熱而得之者腫焮色赤因風熱相搏而得之者  
久久而不消熱勝於風若不卽治血不流通與氣乘  
之以成膿也又曰風多則痒熱多則痛此爲驗也又  
有丹毒者謂人身忽然變赤如塗丹之狀故謂之丹  
毒世俗有云赤瘤或因有瘡誤而相觸四畔焮赤謂  
之瘡瘤凡丹瘤之疾皆遊走不定狀如雲氣者是也  
小兒得之最忌百日之內謂之胎瘤以其氣血嫩弱  
臟腑柔脆難任鎌針所以忌也又頸腋之間而生結  
核初如豆粒或如梅李核累累相連歷歷三五枚久  
久不消以漸長大或發寒熱者謂之瘰癧有風毒者  
得於風熱毒者得之於熱氣毒者得之於氣悉由風  
熱邪氣蘊經所成證候不同治之者亦各異矣

○辨瘡疽善惡法

夫瘡疽證候善惡逆從不可不辨從來醫瘡槩舉五  
善七惡殊不知此特謂腸胃之內臟腑瘡疽所論之  
證也發背腦疽別有善惡之證載之於後蓋七惡者  
煩躁時嗽腹瀉渴甚或泄痢無度或小便如淋者一  
惡也膿血既洩腫焮尤甚膿色敗臭痛不可近二惡

也。目視不正。黑睛緊小。白睛青赤。瞳子上看三惡也。喘。麤短氣。恍惚嗜卧。四惡也。肩背不便。四肢沉重。五惡也。不能下食。服藥而嘔。食不知味。六惡也。聲嘶色敗。唇鼻青赤。面目四肢浮腫者。七惡也。動息自寧。飲食知味。一善也。便利調勻。二善也。膿潰腫消。水鮮不臭。三善也。神彩精明。語聲清亮。四善也。體氣平和。五善也。病有證。合七惡。皮急緊。而如善者。病有證。合五善。而皮緩。虛如惡者。夫如是者。豈淺識之所知哉。只知五善。併至。則善無以加矣。七惡。併至。見惡之極矣。愚意裁之。凡患瘡疽之時。五善之中。乍見一二善。證瘡事治也。七惡之內。忽見一二惡。證宜深懼之。大抵證候瘡疽之發。虛中見惡。證者不可救也。實證無惡候者自愈。大凡膿潰之後。而煩疼尚未痊者。診其脉洪滑。麤散者難療。微濇遲緩者易痊。此善惡之證。於診候之中。亦可知也。發背腦疽。及諸惡瘡。別有五逆之證者。白睛青黑。而眼小。服藥而嘔。傷痛渴甚。膊項中不便。音嘶。色敗者。是爲五逆。其餘熱渴痢嘔。蓋毒氣入裏。臟腑之傷也。當隨證以治之。

○○砭鎌法

夫上古制砭石大小者。隨病所宜也。內經謂針石砭石。鑱針其實一也。今時用鎌者。從聖濟總錄丹毒論曰。法用鎌割出血。明不可緩也。合扁鵲云。病在血脉者。治之以砭石。此舉素問血實宜決之。又氣血形志論曰。形樂志樂。病生于內。治之砭石。蓋砭石者。亦東方來。爲其東方之民。其病多瘡瘍。其法宜砭石。砭石之用。自有證候。非止丹瘤也。但見腫起色赤。遊走不定。宜急鎌之。先以生油塗赤上。以鎌鎌之。要在決洩其毒。然而此法不可輕用。忌其太深。內經所謂刺皮無傷肉。以其九鍼之用。而各有所宜也。砭鎌之法。雖治瘡疽。不可輕用也。

○○貼燻法

夫瘡腫之生於外者。由熱毒之氣蘊結于內也。蓋腫於外。有生頭者。有漫腫者。有皮厚者。有皮薄者。有毒氣深者。有毒氣淺者。有宜用溫藥貼燻者。有宜用涼藥貼燻者。有可以乾換其藥者。有可以濕換其藥者。深淺不同。用藥亦異。是以不可不辨也。若瘡腫初生。

似有頭者。卽當貼溫熱藥。引出其熱毒。火就燥之義也。於四畔赤燉處。搗生寒藥貼燔之。折伏其熱勢。驅逐其邪惡。撲火之義也。夫生寒藥。勢氣力精全。性味雄健。或有療者。不本物理。皆通用藥艸膏之類。有勢力微。欲使疔瘡者。敵其勇夫。不亦難乎。又有龕工。不審逆從。便用寒藥敷貼。趨逐邪毒。復入于內。歸于肝心。十死八九矣。大抵敷貼之法。欲消散腫毒。血脉疎通。寒熱逆從。斷其去就焉。慎不可執方無權。安能散于鬱結。不成膿乎。其腫皮厚者。以故輒布。或以紙花

子塗藥貼燔之。待其藥乾。換腫皮薄者。卽用疎紗。或薄紙塗藥貼燔之。其藥未乾。卽當換之。若至膿潰之後。卽貼溫肌生肉膏藥。要在逐臭腐排惡汁。取死肌生良肉。全藉溫熱膏劑之力也。切勿用寒涼之藥。水調貼之。夫血脉喜溫而惡寒。若著冷氣過理。卽血滯難瘥矣。

○ ○ 漏潰瘡腫法

夫漏潰瘡腫之法。宣通行表。發散邪氣。使瘡內消也。蓋湯水有蕩滌之功。古人有論瘡腫初生。經一二日

不退。卽須用湯水淋射之。其在四肢者。湯漬之。其在腰腹背者。淋射之。其在下部委曲者。浴漬之。此謂疎道。腠理通調。血脈使無疑滯也。且如藥二兩。用水二升。爲則煎取一升半。以淨帛或新綿蘸藥水。稍熱。湯其患處。漸漸喜湯。淋浴之。稍涼。則急令再換。慎勿冷用。夫血氣得寒則凝澀。得熱則淖澤。日用五七次。病甚者。日夜不住。或十數次。腫消痛止。爲驗。此治瘡腫神良之法也。

○針烙瘡腫法

夫瘡疽之疾。證候不一。針烙之法。實非小端。蓋有淺有深。有遲有疾。宜與不宜。不可不辨。蓋疽腫皮厚。口小。腫多。膿水出不快者。宜用針烙。瘡皮薄。惟用針以決其膿血。不可烙也。如其未成膿。已前。不可以諸藥貼。爛湯漬救療。以待自消。久久不消。內潰成膿。卽當棄藥。從其針烙。當用久針。如似火筋。磨令頭尖。如棗核樣。圓滑。用燈焰燒。須更作炬。數搵油。燒令赤。于瘡頭近下烙之。一烙不透。卽須再烙。令透。要在膿水易出。不解。按抑近代良醫。倉卒之際。但以金銀鐵鋌。其



東垣十書 卷二  
樣如鍼者可通用之。實在泄其毒也。或只以木炭熟火猛燒通赤。蘸油烙之。尤妙。烙後實者。撚髮爲絛。虛者以紙爲絛。于絛上蘸藥。絛之上以帛攤溫熱。軟粘膏藥貼之。常令滋潤。勿令燥也。夫瘡疽既作。毒熱聚攻。蝕其膏膜。肌肉腐爛。若不鍼烙。毒氣無從而解。膿淤無從而泄。過時不烙。反攻其內。內既消敗。欲望其生。豈可得乎。嗟乎。此疾針烙取差。實爲當理。然忌太早。亦忌稍遲。嘗見僦工不審其證。淺深妄施。針烙之法。或瘡深針淺。烙毒氣不得泄。以致內潰。或瘡淺烙深。誤傷良肉。筋骨腐爛。或抑擦掀動。加益煩痛。或針之不當。別處作頭。或卽時無膿。經久方潰。遂使痛中加痛。真氣轉傷。詳其所由。不遇良醫也。以此推之。凡用醫者。不可不擇。縱常醫療之。得痊者幸矣。

○ ○ 灸療瘡腫法

夫疽則宜灸。不宜烙。癰則宜烙。不宜灸。丹癰腫毒。宜湯漬之。腫皮光軟。則鍼開之。以洩其毒。治瘡之手法。迨不過此。而各有所宜。故聖惠方論曰。認是瘡疽。便宜灸之一二百壯。如菉豆許大。灸後覺似焮痛。經一

宿。乃是火氣下徹。腫內熱氣被火導之。隨火而出。所以然也。若其瘡痒宜隔餅子灸之。其餅須以椒姜鹽蔥相和搗爛。捏作餅子。厚薄如折三錢。以來當瘡頭。或餅子上灸之。若覺太熱。卽擡起。又安其上。餅子若乾。更換新者尤佳。若其瘡痛。卽須憑灸。壯數多爲妙。若其膿已成者。慎不可灸。卽便針開之。卽得瘡也。若諸瘡經久不瘥。變成癭者。宜用硫黃灸法灸之。其法。硫黃一塊。可瘡口大小安之。別取少許硫黃于火上。燒用釵尖挑起。點硫黃令著三五遍。取濃水乾差

爲度。若其發背初生。卽宜上餅灸法灸之。初覺背上有瘡。疼痒頗異。認是發背。卽取淨土水和捻作餅子。徑一寸。厚二分。貼著瘡上。以艾作炷灸之。一炷一易餅子。其瘡粟米大時。可灸七七炷。其瘡如錢許大。日夜不住灸。以瘡爲度。已上數法。並依本方。一一親驗。所以載之。愚謂瘡醫自幼至老。凡所經驗。必須寫之。嘗記。疔癭惡瘡。諸醫不驗者。取蟻螬剪去兩頭。安瘡口上。以艾灸之。七炷一易。不過七枚。無不効者。又法用乞火婆虫灸之。同前法。累驗之神效。人皆祕之。往

往父子不傳。又法赤皮蒜搗爛。焊作餅子。一如豆豉餅子炙法炙之。彌佳。

○○內消法

夫瘡疽丹腫之生。皆由陰陽不調。榮衛凝澀。氣血不流之所生也。古人有言曰。陽滯於陰則生瘡。陰滯於陽則生疽。瘡疽之生。有內有外。內生于臟腑胸腹之中。外則生于膚肉筋骨之表。發無定處。夫鬱滯之本。則因氣血不流。蒸氣不能外達。留滯而成內熱。瘡疽所生焉。若初覺氣血鬱滯。皮肉結聚。腫而未潰。特可

疎滌風熱。通利臟腑。一二行。徐次諸湯。湯瀉。卽得內消矣。不然則治之稍慢。毒熱不散。反攻其內。致令膿血之聚也。內經謂治病必求于本。蓋瘡疽本乎中熱之鬱結不通也。其風邪寒氣所聚也。治之宜溫熱之劑。和血令內消也。辨之有法。須認風寒則腫硬色白。熱毒則焮腫色赤。以爲異也。如其氣已結聚。不可論內消之法。宜用排膿托裏之藥。此者先後之次也。

○○追蝕瘡疽膿法

夫瘡瘍生于外。皆由積熱蘊于內。內經謂血熱肉敗。

榮衛不行必將爲膿。留于節腠。必將爲敗。蓋瘡疽膿潰爛之時。頭小未破。瘡口未開。或毒氣不出。疼痛難任者。所以立追蝕膿之方法。使毒氣外泄而不內攻。惡肉易去。好肉易生也。若其瘡維其血出不止者。則未可維。于瘡上糝追蝕之藥。待其熟。可維方維。若其瘡維之痛應心根者。亦不可以強維之。誤觸其瘡。其焮痛必倍。變證不無。不可不慎也。若瘡癰膿成未破。于上薄皮剝起者。卽當用破頭代鍼之劑。安其上。以膏貼之。膿出之後。用搜膿化毒之藥。取効如神矣。若膿血未盡。便用生肌斂瘡之劑。務其早愈。殊不知惡肉未盡。其瘡早合。後必再發。不可不慎也。

○托裏法

夫瘡疽丹腫。結核癰癰。初覺有之。卽用內消之法。經久不除。氣血漸衰。肌寒肉冷。膿汁清稀。毒氣不出。瘡口不合。或聚腫不赤。結核無膿。外證不明者。並宜托裏。膿未成者。使膿早成。膿已潰者。使新肉早生。血氣虛者。托裏補之。陰陽不和。托裏調之。大抵托裏之法。使瘡無變壞之證。凡爲瘡醫。不可一日無托裏之藥。

然而寒熱溫涼煩渴利嘔臨證宜審其緩急耳

○止痛法

夫瘡疽之證候不同。寒熱虛實皆能爲痛。止痛之法。殊非一端。世人皆謂乳沒珍貴之藥。可住疼痛。殊不知臨病制宜。自有方法。蓋熱毒之痛者。以寒涼之劑折其熱。則痛自止也。寒邪之痛。以溫熱之藥熨其寒。則痛自除矣。因風而有痛者。除其風。因濕而痛者。導其濕。燥而痛者。潤之。寒而痛者。通之。虛而痛者。補之。實而痛者。瀉之。因膿鬱而閉者。開之。惡肉侵潰者。引

之。陰陽不和者。調之。經絡祕澀者。利之。臨機應變。方爲上醫。不可執方而無權也。

○用藥增損法

古人用藥。因病制宜。治不執方。隨病增損。療積聚補益。可用丸藥以從舊。不改方增損。蓋瘡疽危要之際。證候多種。安有執方之論。固可臨時加減以從其法。只如發背腦疽惡疔腫膿潰。前後虛而頭痛者。於托裏藥內加五味子。恍惚不寧。加人參茯苓。虛而發熱者。加地黃瓜蒌根。往來寒熱者。并潮熱者。加柴胡地

骨皮渴不止者加知母赤小豆大便不通者加大黃  
芒硝小便不通者加木通燈艸虛煩者加枸杞子天  
門冬自利者加厚朴四肢厥逆者加附子生姜嘔逆  
者加丁香藿香多痰者加半夏并陳皮膿多者加當  
歸川芎痛甚者加芍藥乳香肌肉遲生者加白欬官  
桂有風邪者加獨活防風心驚悸者加丹砂口日瞶  
動者加羌活細辛愚雖不才自幼及老凡治瘡疽常  
依此法加減用藥取効如神後之學者宜細詳焉

○ ○ 療瘡腫權變通類法

夫瘡疽之病治療多方總而論之各有所宜補瀉淋  
濁及敷掃貼熨鍼鎌灸烙用之不同蓋知其道也舉  
治必効昧於理者利害不無嘗見以寒療熱以熱療  
寒古今之通論也又有檢方療病妄製加減以意裁  
之自以爲可殊不知病有逆從治有緩急法有正權  
方有奇偶用有輕重夫醫者意也得其意然後能變  
通也達其變通者悟其道而省其理也則左右逢其  
源矣愚雖不才略陳萬一嘗見治寒以熱而寒彌甚  
治熱以寒而熱彌熾者何也蓋不知五臟有陰陽之

性。其可因其類而取之也。假如心實生熱者。當益其腎。腎水滋。熱將自除。腎水虛生寒。當補心。心火既降。寒將自除。此所謂寒之而熱者取之。陰熱之而寒者取之。陽也。又寒因熱用。熱因寒用。要在通其理類而已。又聞微者逆之。甚者從之。何謂也。蓋治寒以熱。必涼而行之。治熱以寒。必溫而行之。此亦欲其調和也。其間有正有權者何也。蓋病有微有甚。微者逆。治理之。正也。甚者從。治理之。權也。然爲瘡科。於補瀉汗下。標本逆從。正權之理。烏可闕而不知也。太凡治療瘡。

疽之要法。曰。初覺熱毒發。熱鬱結而作瘡。疽一二日。宜先服五利湯。蕩滌邪氣。疎通臟腑。令內消也。古今湯法。謂切剉咬咀。如麻豆大。以猛火。惡煎。無令過熟。欲其速利也。次有丸散。宣導血脈。漸次消磨。令緩散也。助以淋瀝。調和榮衛。行經絡也。更當膏潤。溫養兼磨。傳四畔。貼熯之藥。順其陰陽也。追蝕托裏。汗下調補。臨時製宜。淺深緩急。自有等差。男女貴賤。亦當別論。晉尚書楮澄曰。寡婦尼僧。異於妻妾。雖無房室之勞。而有憂思之苦。此深達其情者也。又仲景云。物性。

剛柔餐居亦異。治亦不同也。所以黃帝興四方之問。岐伯舉四治之能。况病之新舊。刑志樂苦。豈可執方。無權以求其愈疾哉。亦有瘡疽腫痛。初生一二日便覺脉沉細而煩悶。臟腑弱而皮寒。邪毒猛暴。恍惚不寧。外證深沉者亦宜。即當用托裡散。或增損茯苓湯。及溫熱之劑以從治之。

○○論五發疽

夫五發者。謂癰疽生于腦背眉鬚是也。大槩論之分為三等。一者疽也。二者癰也。三者癰也。夫疽初生

如黍米大。痒痛有異。誤觸破之。即熈展四畔赤腫。沉悶牽引。脇肋疼痛。數日之後。漸覺肌膚壯熱。惡寒煩渴。腫暈侵展。膿漿汁出。積日不潰。抑之則流血者。謂之發背疽也。其發於腦者。為腦疽也。其發於鬚眉鬚者。以類呼也。又有初生其狀無頭。腫濶三四寸。始覺注悶疼痛。因循數日。皮光微輒者。甚則亦令人發熱。惡寒。頭痛煩渴者。謂之發背癰也。又有初生一頭色浮赤而無根。腫見于皮膚之間。大小一二寸者。癰也。三者之候。惟疽最重。此疾初生。皆曰滋味與厚衣。衣



服厚暖則表易招寒。滋味過多則五臟生熱。臟腑積熱則血脈不流。而毒氣凝滯。邪氣伏留。熱搏於血。血聚則肉潰成瘡。淺則成癰。實則爲癰。深則爲疽矣。亦有因服金石發動而患此疾者。亦有平生不服金石藥而亦患此疾者。蓋由上祖曾服餌者。其毒氣流傳子孫。此病初生。認是疽。則宜速療之。若氣實之人。急服五香連翹湯。漏蘆湯。若年幾未五十。少壯實者。可服五利大黃湯。化毒丸。取通利臟腑一二行。瘡頭上用追毒能之類。貼溫熱膏劑。更湯腫湯。潰毒湯。淋湯。

七五

之。如此調治。以待膿成。已前不可以諸藥救療。以安患人之心。慎勿惱觸著。至膿成敗潰。宜服五香湯。及內托裏散。茯苓湯。當歸托裏散之類。渴不止者。服竹葉黃芪湯。乳香散。勿爲大熱服大黃。硝磺苦寒之藥。若因服利藥而利不止者。死矣。若瘡中惡肉未退。膿水不快者。卽用追蝕之藥。或錠子絛之。上用鹿角散。以醋熬爲糊貼之。惡肉退去。好肉漸生。卽用搜膿散。翠霞散之類。絛之。若瘡中毒氣未盡。慎勿早斂。忌早上生肌之藥。縱得平復。必再發。其間調理次第。臨時

制宜將護忌慎之法耳

○○論癰疽

夫瘡腫之患莫大乎癰疽。然而癰疽何以別之。經所謂榮衛稽留于經脈之中。則澀不行。血脈不行。則陽氣鬱遏而不通。故生大熱。熱毒之氣騰出于外。畜結爲癰。久而不散。熱氣乘之。腐化爲膿。然而骨髓不焦。枯腑臟不傷敗。可治而愈也。何爲疽。五臟風毒積熱。毒熱熾甚。下陷肌膚。骨髓皆枯。血氣涸竭。其腫色天。堅如牛領之皮。故命曰疽。癰者。其腫皮薄以澤。此其

候也。癰疽之生。有內有外。內生胸腹臟腑之中。外生膚肉筋骨之表。凡此二毒。發無定處。而有常名。夫鬱滯之本。始於喜怒憂樂不時。飲食居處不節。或金石草藥之發動。寒暑燥濕之不調。使陰陽之不平。而蘊結外。使榮衛凝澀而腐潰。輕者起於六腑。浮達而爲癰。氣行經絡而浮也。重者發于五臟。沉澀而爲疽。氣行經絡而沉也。明乎二者。腫毒丹疹。可以類推矣。

○○論附骨疽

夫附骨疽者。以其毒氣深沉。附著于骨也。此疾與賊

東垣一書 卷二  
風相類而不同。人不能辨治之悞矣。蓋附骨疽者。由秋夏露卧爲冷折之。風熱伏結。附骨成疽。賊風之候。由風邪之氣搏於骨節。故其痛深徹骨髓。遇寒則痛甚。附骨疽痛而不能轉。初按之應骨。皮肉微惡。洪洪如肥狀者是也。其賊風皮骨不甚熱。而索索惡寒。時復汗出。常欲熱熨動處。卽得少寬。其附骨疽初時。但痛無時。乍寒乍熱。而無汗者。經久不消。極陰生陽。寒化爲熱。而潰也。賊風不治。久而變爲彎曲偏枯。所以不同也。認是賊風。則服引越脾。治風之劑。卽得差矣。

認是附骨疽。急宜服漏蘆湯。或五香連翹散。踈下之。次用內消升麻湯。及湯漬膏貼之類。縱不能消。亦得浮淺。及有緩疽。石疽。與附骨疽亦相類矣。何者。蓋緩疽。石疽。皆寒氣所作。深伏于骨髓之間。有腫與皮肉相似。若疼而堅硬如石。故謂之石疽。緩疽其熱緩慢。積日不潰。久乃亦紫黯色。皮肉俱爛。故名曰緩疽。此二者。其治初覺。便宜補虛托裏溫熱之劑。以取消矣。其次調治。臨疾制宜。故不復具載矣。

○○論陰瘡

夫陰瘡者。大槩有三等。一者濕陰瘡。二者妬精瘡。三者陰蝕瘡。又曰下疳瘡。蓋濕瘡者。由腎經虛弱。風濕相搏。邪氣乘之。瘙痒成瘡。浸淫汗出。狀如疥癬者是也。妬精者。由壯年精氣盈滿。久曠房室。陰上生瘡。赤腫作白。妨悶痒痛者是也。陰蝕瘡者。由腎臟虛邪熱結下焦。經絡痞澀。氣血不行。或房勞洗浴不潔。以致生瘡。隱忍不醫。焮腫尤甚。袖瘡在裏。措手無方。疼痛注悶。或小便如淋。陰肉腫痛是也。或經十數日潰爛。血膿肌肉侵蝕。或血出不止。以成下疳。若身體壯熱。

煩渴惡寒。宜急治之。以大豆甘草湯漬之。漬毒湯等洗浴之。服五香連翹湯。漏蘆湯等。疎之。更以截疳抵聖散乾糝之。四畔用磨風膏溫潤之。後以將護忌慎之。渴不止者。服竹葉黃芪。大便軟者。宜服托裏茯苓調治之。夫如是。則無不差矣。

○○論時毒

夫時毒者。爲四時邪毒之氣。而感之于人也。其候發于鼻。面耳項咽喉。赤腫無頭。或結核有根。令人增寒發熱。頭痛肢體痛。甚者恍惚不寧。咽喉閉塞。人不識。

東垣十書 卷二  
者將爲傷寒。便服解藥。一二日腫氣增益。方悟始召  
瘡醫。原夫此疾。古無方論。世俗通爲丹瘤。病家惡言  
時毒。切恐傳染。考之于經。曰。人身忽經變赤。狀如塗  
丹。謂之丹毒。此風熱惡毒所爲。謂之丹瘤。與夫時毒  
特不同耳。蓋時毒者。感四時不正之氣。初發狀如傷  
寒。五七日之間。乃能殺人。治之宜精。辨之先診其脉。  
滑數浮洪。沉緊弦濇。皆其候也。蓋浮數者。邪氣在表  
也。沉濇者。邪氣深也。認是時毒。氣實之人。急服化毒  
丹以攻之。熱實以不利。大黃湯下之。其有表證者。解

毒升麻湯以發之。或年高氣軟者。五香連翹湯主之。  
又於鼻內嚙通氣散。取十餘嚏作効。若嚙藥不嚏者。  
不可治之。如嚏出膿血者。治之必愈。如左右看病之  
人。日日用嚙藥嚏之。必不傳染。切須忌之。其病人每  
日用嚏藥三五次。以泄熱毒。此治時毒之良法也。經  
三四日不解者。不可大下。猶宜和解之。服犀角散連  
翹散之類。至七八日。大小便通利。頭面腫起高赤者。  
可服托裏散。黃芪散。宜針鎌砭割出血。泄其毒氣。十  
日外不治自愈也。此病若五日已前。精神昏亂。咽喉

東垣十書 卷二  
閉塞。語聲不出。頭面不腫。食不知味者。必死之候。治之無功矣。然而此疾有陰有陽。有可汗。有可下。嘗見龕工。但云熱毒。只有寒藥。殊不知病有微甚。治有逆從。不可不審矣。

○論諸瘡

夫諸瘡之生。其類甚多種。大小方書載之紛紛。以要而論。槩舉四等。一者因于氣血稽留而結于內者。謂腸胃之中癰疽是也。二者因于氣血稽留而結于外者。謂十疔九癩五痔之類是也。三者不因氣血而爲

瘡。謂墮仆并金刃湯火炙烙而傷皮肉之類是也。四者不因氣血而骨肉損傷者。謂虫獸爪牙所害之類是也。然而四等皆不難損於肌膚。害於筋骨。不必具載。今於隨方條下。該說治證。以法附之。爲治之者。臨疾制宜。適事爲故耳。

○論丁瘡腫

夫丁瘡者。以其瘡形如丁蓋之狀者是也。古方論之。凡有十種。華元化載之五色丁。千金方說丁瘡有十三種。以至外臺祕要神巧萬全。其論頗同。然皆不離

於氣客於經絡。五臟內蘊毒熱。初生一頭。凹腫痛。青黃赤黑。無復定色。便令煩躁悶亂。或增寒頭痛。或嘔吐心逆。以針刺瘡。不痛無血。是其候也。其候本因甘肥過度。不慎房酒。以致邪毒啗結。遂生丁瘡。內經曰。膏粱之變。足生大丁。此之謂也。其治之法。急于艾炷灸之。若不覺痛者。針丁四邊。皆令血出。以迴瘡。錠子從針孔。緝之。上用膏藥貼之。仍服五香連翹湯。漏蘆湯等。疎下之。爲効。若或針之不痛無血者。以猛火燒鐵針。通赤。于瘡上烙之。令如焦炭。取痛爲効。亦緝前錠子。用膏藥貼之。經一二日。膿潰根出。服托裏湯散。依常療之。以取平服。如針不痛。其人眼黑。或見火光者。不可治也。此邪毒之氣入臟腑故也。養生方云。人汗入肉食。食之則生丁瘡。不可不慎也。

○辨丁腫十三種形色禁忌

凡療丁腫。皆刺瘡心。至痛處。又刺四邊十餘下。令血出去。血傳藥。藥力得入。針孔中則佳。若不達裏。藥力不到。又看口中頰邊舌上。有赤黑如珠子者。是也。瘡上按之。礮痛。應心者。是秋冬寒毒久結。皮膚中變作

東垣十書 卷二  
此瘡不急療之。日夜根長。流入諸脉數道。如箭入身。顫掉不已。若不慎。口味房室。死不旋踵。經五六日。不差。眼中見火光。心神昏昧。口乾心煩。嘔吐不定。宜速治之。

○一曰麻子丁。其狀肉起。頭如黍米。色稍黑。四邊微赤。多痒。忌食麻子。油衣布衣。并入麻田中行。

○二曰石丁。其狀皮肉相連。色如黑豆。甚硬。刺之不入。肉微痛。忌瓦礫。搏石之屬。

○三曰雄丁。其狀炮頭黑靨。四畔仰炮。漿起有水出。

色黃。大如錢孔。形高者。忌房室。

○四曰雌丁。其狀瘡稍黃。向裏靨。亦似炙瘡。四面炮漿起。心凹。色赤。如錢孔者。忌房室。

○五曰火丁。其狀如湯火燒灼。瘡頭黑靨。四邊有烟漿。又如赤粟米者。忌火燒烙。

○六曰爛丁。其狀色稍黑。有白斑。瘡中潰。有膿水流。出。瘡形大小如匙。面者。忌沸熱食爛物。

○七曰三十六丁。其狀頭黑浮起。形如黑豆。四畔起。赤色。今日生一。明日生二。及至十。若滿三十六。藥



所不能治未滿三十六可治。忌嗔怒畜積愁恨。  
○八日蛇眼丁。其狀瘡頭黑皮浮生。形如小豆。狀似  
蛇眼。大體硬。忌惡人看。并嫉妬人見。忌毒藥。  
○九日鹽膚丁。其狀大如匙面。四邊皆赤。有黑粟粒  
起。食鹽大忌。

○十日水洗丁。其狀大如錢形。如錢孔。瘡頭白裏黑。  
靨汁出。中硬。忌飲漿水。水洗渡河。

○十一日刀鎌丁。其狀濶狹如薤葉大。長一寸。左側  
肉黑如燒烙。忌刺及刀鎌切割。鐵刃所傷。可以藥

治。不可亂攻。

○十二日浮漚丁。其狀瘡體曲圓。少許不合。長而狹。  
如薤葉大。內黃外黑。黑處刺之不痛。黃處刺之痛。

○十三日牛拘丁。其狀肉色。炮起拍不破。

右十三種丁瘡。初起瘡心先痒後痛。先寒後熱。熱定  
則寒多。四肢沉重。心驚眼花。若大重者則嘔逆。嘔逆  
者難治。其麻子丁一種。始末惟痒。初錄忌者不得觸  
犯。觸犯者發作難治療。其浮漚丁牛拘丁。兩種無所  
禁忌。縱不療亦不能殺人。其狀寒熱與諸丁不同。皆

東垣十書 卷二  
宜將護依法治療。禁忌勿得觸犯。若或觸犯脊強瘡痛極甚不可忍者是也。又云丁腫初發時突起如丁蓋。故謂之丁。令人惡心惡寒四肢強痛。一二日瘡變爲焦黑色。腫大光起根硬。刺之不覺痛。皆其候也。在手足頭面胸背骨節間最急。其餘處則可。毒入腹則煩悶恍惚似醉。如此者三二日死矣。皆不可不速治也。

○○論瘰癧治法

夫瘰癧之病其名甚多。巢氏病源載之三十九種。千

金聖惠所論瘰癧九漏總論說有風毒熱毒氣毒之異。瘰癧結核寒熱之殊。其本皆由恚怒氣逆。憂思過甚。風熱邪氣內搏於肝。蓋怒傷肝。肝主筋。故令筋畜結而腫。其候多生於頸腋之間。結聚成核。初如豆粒。後若梅李核累累相連。大小無定。初覺增寒壯熱。咽項強痛。腫結不消者。當便服五香連翹湯。或牡礪大黃湯。疎下三兩行於上。貼十香膏。烏犀膏。及用淋瀝腫湯。潰毒湯。時復淋瀝。如此救療。卽得消散。若未消散。可服內消丸。或皂角丸之類。漸以求差。若腫結深

硬在再月日不能內消者久必成膿若腫高而稍軟其人面色痿黃皮膚壯熱上蒸膿已成也可以針決核中令其潰散則易愈也治法如瘡法于瘡口中用追毒蝕內錠子維之於上用烏犀十香膏等貼之及托裏之劑和之經久不差或愈而復發或別處自穴膿水透出流津不止肌體羸瘦者變成九瘻內經曰陷脉爲瘻留連內廕卽此病也可用蒜餅子炙之然後瘡口上用紫金散翠霞散等于上維貼膏藥求差其將護忌慎治療用法無造次焉

○○論痔瘻

夫痔瘻之候其名有五一曰牝痔二曰牡痔三曰氣痔四曰血痔五曰酒痔又曰腸風痔脉痔雌雄痔皆五痔之別名也其狀初生悉在肛邊或如鼠乳或結小核痒痛注悶甚者身熱惡寒諸方論之皆由房酒過度久嗜甘肥不慎醉飽以合陰陽勞擾血脉腸癖滲漏衝注下部肛邊生瘡變爲痔疾治法始覺痔作便服通氣丸槐角丸熱實者服諸利湯疎利臟腑及浴洗薰熨以取內消切忌酒麪辛熱房室肥膩稍縱

嗜欲腐潰膿血或逗流淫汁歲月已深旁穿竅穴卽  
變痔漏卽須用寸金錠子三五次痊愈若能味無味  
之味五味足矣事無事之事百事備矣其次服餌調  
節謹慎合宜未有不差者也

外科精義卷之二

終



