

泰西熱病論

二

特別
1187
2



79
1187
2



泰西熱病論卷二

泰西 玉函夫古撒謨 著

加賀醫官 言田成徳直心 譯

笹山侍醫 足立世茂松父

門人 沼津侍醫 程田國道玄悦 校

長府侍醫 松岡士藏道遠

固形質篇第三

固形質トハ人身中ノ實形結成シテ捉摸スベク身體ノ
幹立共ニ倚頼スベキ諸物ヲ云フ凡ソ身體ノ強弱固形

泰西熱病論 卷二
固形質篇第三

99-1317

諸物ノ剛柔ハ人身ノ元始渾形ノ初ノニ基造ス此基造
 織成ノ強弱ニ因テ身體ノ利害得失悉ク關係ス此稟質
 ノ等差且ツ纖維ノ強弱ハ皆天然ニ出スル者ナリ其缺
 損アル多少皆是レヲ疾病ト名付ク其缺損スルハ或
 ハ年行ノ衰老ニ因リ或ハ飲食起居動止ノ失常其他百
 般ノ諸因ニ由ル故ニ醫タル者豫メ此ニ注意シテ精密
 ニ考索スベシ

○纖維ノ質寧張柔撓相協ヒテ中和ヲ得テ健康ニメ偏
 倚ナキヲ全無病ノ人ト為ス

○纖維大イニ強拘牽張ナル者ハ速ニ營養液ヲ費耗シ

テ消瘦ノ病ヲ生シ易シ又纖維諸管大イニ軟薄脆弱ナ
 ル者ハ營養ノ諸液重滯シテ粘液病及ヒ水腫ヲ生シ易
 シ

○蓋シ纖維ノ強拘牽張ナル者ハ元運ノ靈液成德云靈
 及ヒ脊髓ヨリ出ツ其質ハ清稀ニシテ其性ハ竄透ナリ其
 中ノ自然ニ神氣ヲ含ミ神經ニ流通シテ全身ニ彌満ス
 然レモ腦ハ靈液ノ宗源ナレハ常ニ腦中ニ充盈シ
 テ神明不測ノ妙用ヲ致シ万物ニ應感シ衆務ヲ總理シ
 百骸ヲ主宰ス是レ即精神ナリ又腦髓ノ靈液ヲ造ル
 ハ心臓常ニ血ヲ動脈ヨリ精神ナリ又腦髓ノ靈液ヲ造ル
 ヲ必別シテ精液ヲ取リ白髓ニ滲入シ漸ク煉熟メ純ラ
 靈妙ノ液トナシ其中ニ蓄ヘテ神經ニ流注ス其粗滓ノ
 血ハ復タ静脈ニ輸リ心臓ニ輸ス是レ其略ヲ費後消耗
 ナリ猶詳ナルハ解體諸書ニ見ヘタリ其略ヲ費後消耗
 スルヲ甚シク又自餘營養ノ諸液ハ成德云諸液ト

泰西熱病論 卷二

等是レナリ皆身命ニ混和ノ充盈結成ノ勢ヲ為スニ足
ヲ養護スル液ナリニ混和ノ充盈結成ノ勢ヲ為スニ足
ラサレ者ナリ

○總テ纖維諸管共ニ充張勢力ノ性甚タ壯ナル者ハ其
裡ニ容ル、處ノ血液ニ大過ノ運動ヲ增加メ強ク推蕩
摩擦ヲ為シ此レニ因テ壯熱ヲ生シ其勢ヲ以テ間斷ナ
ク精微水様ノ稀液ヲ費耗消散ス因テ血球夥多累積シ
稠厚ヲ成シ其究リ遂ニ充填壓迫シ諸液盡ク粘凝スル
ニ至ル常人ト雖モ強ク勞力ヲ事トスル産業ノ者ハ其
血液皆此ノ如キ弊ヲ致ス是レ其証ナリ

○此ノ如キ人身自然ノ究理法ヲ以テ辨識分定スルニ

上件ノ如キ稟受ノ者ハ必ス蓄留熱ヲ發シ遂ニ身體ノ
營養ヲ失ヒ全ク銷鑠ニ歸スル者ナリ又熾盛熱ノ諸病
ヲ患ヘ速ニ退キ難キ者ハ皆此弊アルガ故ナリ是以テ
其固形質ノ強拘血液優多稠厚ノ者ハ纖維軟弱血液稀
淡乏弱ノ者ヨリハ却テ危篤ノ症ニ至ル者ナリ此體質
ノ者ハ一失一得アリ是ヲ譬フルニ芳香ノ玫瑰ニ刺棘
アルカ如シ其刺戟ノ失ハ從來勢力強ク壯健ノ極ヨリ
出ル者ナリ

○此等ノ稟質ノ人ハ和緩柔軟ノ効アル粉麵ノ物品大
イニ良ナリ又數溫浴法成德云ク附録ニ載スヲ施シテ佳ナリ也

毛寒列乾燥ノ時ニ施スヲ佳トス

○此質ノ者多クハ熱病兼焮衝熱ノ患ニ嬰ル即チ肺焮衝熱腸焮衝熱等ノ類ノ如シ此症ニハ緩和融解スル水様ノ潤灌劑ヲ微々繼續シテ用フベシ此劑ノ温氣ニ因テ患處及ヒ肺藏中ノ諸管弛緩シ因テ血液ノ運行快利シ次テ痰唾夥シク快泄スル者ハ是レ血液ノ最モ稀解渙流スル徵ナリ又手足上腹胸肋ノ部分ニ緩和稀解スル蒸溺劑寒温中ヲ得テ用フヲ施スベシ一大奇効アリ此術古今通用ノ一良法ナリ時師或ハ纖維強拘ノ人ニ冷水浴法ヲ施ス者アリ是レ甚タ錯誤ニ屬ス此法ヲ冒セハ纖維

愈強拘ヲ成シ牽縮ノ勢增多スレハナリ凡ソ冷水浴法ハ纖維弛緩ノ者ニ用ヒテ強拘充張セシメンカ為ナリ
○往年一貴客體質瘦薄然レ凡神志活潑日常能ク動作シ逸居セス此人寒冷ノ日ト雖モ動モスレハ海水ニ浴ス是レニ因テ漸ク肌肉脱削シ神思乏弱沉重ス予案スルニ是レ其浴水ニ因テ纖維強拘ヲナシ精微竄透ノ稀液及ヒ靈液等蒸氣孔ヨリ漏洩シ耗散スルニ因テ然リ其故ハ患者飲食過不及ナク却テ二便秘溢スレハナリ此時ニ當テ緩和營養ノ食物ヲ與ヘ浴水ヲ禁ス後チ將愈ノ期ニ及ニテ又浴水ヲ為サシム爾來精神欣暢シ肌

本草綱目卷二

廣濟堂

肉再生シテ快復ス

○纖維ノ緩弱ヲ強實ニスルニハ浴水ヨリ善ナルハナシ故ニ虚脆緩弱ノ佻儂ノ小兒ハ此法ヲ用ヒテ速ニ快復シ健強ニ至ルナリ

○邏媽都中ニ一寺アリ奸媚ノ法徒相黨メ愚者ヲ欺ク其事ハ飛泉ヲ以テ人ノ疾病ヲ除ク其奇効アルヲ以テ神授ト稱シ衆モ亦信受ス然レモ浴水ノ効アルハ皆前説ノ如キ者ニシテ敢テ神意ノ關ル所ニ非ス

○古昔私多利古都謨及ヒ刺古修謨能ク醫學ノ原理ヲ建定ス時師皆崇信尊奉ス然レモ其説紛雜適從シ難キ

ト多シ後子普兒華黒出テ、許多ノ究理ニ因テ纖維ノ強拘ト緩弱トニ就テ病因ヲ辨識ス是レ醫學療法ノ要鍵ニメ後進ノ者皆此標準ニ倚ラサルハナシ

○強弱纖維ノ外ニ一種ノ纖維アリ是レハ固形諸部ノ質甚タ感觸シ易キ者ナリ凡ソ喜樂悲憂ノ事皆速ニ感動スルト最モ甚シ殊ニ纖維ノ質モ薄弱ナル者ハ僅ノ疾患ニモ毀傷スルヲアリ

○身體嬌嫩其色純白形質脆柔ノ者ハ其人極メテ賢慧敏疾ニメ殊ニ聰明ナル者ナリ然レモ肌肉軟弱ナルカ故ニ肺血或ハ其他失血ヲ生シ易ク且ツ肺傷勞瘵ヲ發

素問百病論 卷之三 論

シ易キ者ナリ故ニ此等ノ稟受ヲ勞瘵質ノ人ト名付ルナリ

○以上固形質ノ強拘緊張ノ害ヲ論ス以下ハ其柔緩弛弱ノ害ヲ論ス

○今夫レ纖維諸管ノ軟弱ナル者ハ其裡ニ包容スル血液ヲ適宜ニ運管スルニ足ラヌ又人身營養ノ根基タル

乳糜ノ成徳云ク腸ヨリ乳糜ハ飲食消化シテ成ル處ノ純白精粹

ノ血ニ混シ心ノ肺ヲ經テ動脈ニ流注ス其間ニ漸ク化シテ血トナル凡ソ血ノ性質ヲ養テ致シ諸液ヲ分利スルハ皆

合融和ノ各々其功用ヲ為スニ因ル故ニ藥ヲ服シテ効驗アリテ諸部ニ其分布ニ頭巔ヨリ四肢ニ普達スルニ性

ヲ精微揮發ニ變スルニ足ラヌ又血液中ノ慄悍銳尖ノ鹽氣ヲ分利スルヲ常度ノ如クナルヲ能ハズ又自ラ圓

形ヲ成シテ全ク結成セル血液ニ化熟スルヲ能ハズ是ニ加フルニ飲食ヲ消化スル諸器モ亦全善ノ乳糜ヲ製

造スルヲナシ蓋シ諸管纖維常度ノ如ク健強ナレバ胃中ニ賦在スル所ノ胃液

成徳云胃ノ裏面ノ膜ヨリ常ニ津唾ノ如キ稀液ヲ滲出ス是レ

ヲ胃液ト云フ此液飲食ニ混和シ能ク酸熟ス等ニ力ヲ加ヘテ能ク健運ス然ル時ハ食後

消化ス故ニ血中ニ未熟ノ乳糜不良ノ汚液ヲ生スルヲナシ虚弱粘液病質ノ人ハ此機ニ及ヌ然ル者ハ時月ヲ

泰西醫學論 卷二

六

廣濟堂

費シ血球及ヒ鹹渣ヲ良性ニ復治スルニ在リ

○又纖維軟弱ノ人ハ血ヲメ充分ニ揮發有力ノ性ヲ成
 シ尤張進輸シテ活潑ノ温暖氣ヲ保持シ常度ノ如ク運
 行スルヲ能ハス又鹽氣硫氣油氣等ヲ稀解メ中和ノ度
 ニ混和シテ生活ノ自然ニ使用スルヲ能ハス今夫レ血
 球ハ生活温暖ノ淵源ナリ然ルニ血液常度ノ如ク包充
 スルヲ能ハス且ツ圓形全成スルヲ無キ時ハ其血自ラ
 纖維諸管ニ充填シ鹹渣及ヒ水液皆粘膠ヲ為シ元運ノ
 靈液衰微シテ諸般ノ分利ヲ為ス所ノ機關衰頹シ遂ニ
 顔面ヨリ全軀ニ彌テ色澤ヲ亡シ翁傑達安篤竭意度成

云其病因症候治方共ニ内科選
 要其他諸書ニ出ス併考フヘシ
 粘液病水腫等ノ諸症ヲ

發ス或ハ發作次序ナキ間歇熱或ハ稽留熱或ハ遷延神
 經熱等ヲ發ス是皆血液腐敗ヲ為シ適宜ナル運行ノ常
 度ヲ失シ其血液ハ細絡末梢ニ凝滯留結スルニ因テ暫
 モ間斷ナク閉塞シテ休マズ又脈管轉輸ノ勢力衰エテ諸
 液快流スルヲ能ハサルニ因ル

○諸液凝滯ノ弊ハ體中ニ在テ輒ク腐敗シ且ツ酷厲ノ
 性ヲ成シ動モスレバ險惡ノ熱病ヲ發ス凡ソ血及ヒ諸
 液共ニ流瀉運行ノ微弱ナルハ皆脈管進輸ノ勢ノ衰弱
 ニ因ル其血液ノ酷厲ヲ以テ頻頻ニ刺動攻衝スレバ壯

泰西疾病論 卷二 良醫堂

熱ヲ羨ス處女病成德業スルニ處女病ハ漢醫ノ所謂五積六聚中ノ屬症ニ在リ其因症治方其

科書ニ詳ナリ内ヨリ轉スル熱病ハ海ニ惡性危険ナル

ヲ以テ證スベシ又足部腫起シテ殆ト水腫ノ如ク其始

ノ寒冷ナリト雖疔後千羅思注成德云羅思ハ考フ第一篇ニ或

ハ熱燥疽成德云燥疽ハ原名燥疽也

ニ此スルニ其害稍輕ク又燠熱燠熱ニ部腐敗蝕蝕シ

ノ中間ニ在リ其症候先ツ柔軟ノ部腐敗蝕蝕シ

ニ生シ熱ヲ羨シ漸ク四邊ヲ侵濬ス此毒皮膚所絡神經等

ヲ神氣共ニ循流スルテ能ハズ然レ凡自然良知能ノ妙用

ヨリ死敗焦燥スル故ニ其用ヲ經フスルニ能ハズ

テ近傍ノ諸部ヲ擦亂シ靈液衝突ノ勢ハ覺ク能ハズ

熱メ烙ガナリ猶細論スル外トキハ必此因ハ一ハ其部ニ水氣

多ク充溢スルニ因リ一ハ管養ノ缺ハ諸般ノ毒アル部

燠熱スル極ノ因リ一ハ管養ノ缺ハ諸般ノ毒アル部

獸等ノ咬螫ニ因リ一ハ管養ノ缺ハ諸般ノ毒アル部

テ成ル者ナリト又云冬時鼻等腐敗凍落スルテ氷雪

是レ初熱燥疽如キ手足等ノ燥敗

此症ノ候初熱燥疽

張スルトキハ汗孔壅塞蒸氣連セテ

ト雖モ經絡ハ其氣連セテ

ニ因ル物ノ入身ニ在テ相保ツテ減ス

其說クテ取テ暇アスナリ僅ニノ類ニ變ス

素問熱病論 卷二

○固形質ノ鑿法ハ醫家ノ家ニ要事ニメ特リ遷延持久ノ疾病ノミナラズ酷厲諸病モ亦是レニ因テ懸斷ス其故ハ固形質ハ流動質ノ根基ナレバナリ是以テ體質強實纖維強硬ニメ常ニ動作ニ習ヒ血液優多ナル者ハ血液必ズ粘稠ニ傾キ或ハ焮衝熱ヲ發シ又其他ノ熱性ノ諸病ヲ發シ易シ此質ノ者ハ速ニ刺絡ヲ施シ其滂溢ヲ防制シテ可ナリ又體質虛弱脆軟ニシテ血液モ亦稀淡乏少且ツ水氣多キ者ハ慎テ刺絡及ヒ驅泄劑成德案スニ便并ニ汗唾吐等ヲ強クヲ用フル勿レ勿レ催進スル劑ヲ云フ

○固形質ヲ詳明ニスルハ刺絡ノ可否ヲ分別スル一

大緊要ナリ殊ニ酷厲熱ノ初發ノ時并ニ痘瘡及ヒ其他ノ熱病ニ發瘡有ル者等ニ最有用ナリ

○譬へハ一男子アリ稟賦強實脈亦實洪此人若シ痘瘡ニ嬰リ諸症劇發スルアランニ痘瘡見ノ前ニ當テ速ニ刺絡スベシ若シ刺瀉セサレバ其熱轉險惡ニ進ムヲ待ヨリ他ナケレバナリ又虛弱ノ者ハ急迫ノ諸症ニ非ルヨリハ刺絡スルヲ錯誤トス又平常ニ刺絡或ハ嘔吐ニ慣レタルモノハ痘瘡ヲ患ヘンニ見點ノ時ニ臨ンテ速ニ刺絡スベシ精氣ノ衰弱ヲ恐レテ此術ヲ闕クトキハ焮衝熱ヲ發シ死ニ至ラシム是等ノ失アルハ病毒

ト症候トヲ分明ニ辨識セサル弊ニ因ル

○凡テ患者ヲ鑒察スルニ能ク其稟賦ヲ辨識スル時ハ其症ヲ區別スルヲ甚々難カラズ大抵身體壯熱シ皮膚乾燥面目赤色煩渴引飲氣息熱シ大劇痛脈浮數疾實其他強實ノ諸徴ヲ備ヘ纖維ノ充張勢力強盛ナルハ是✓熾盛熱兼厥衝熱ノ候ニメ其人元來強實ノ質ナリ又脈軟弱大熱及ヒ赤色ナク渴少ク小便黯淡皮膚潤澤肌肉柔軟惡寒スルヲ幾作時ナク遷延メ休マズ汗多ク懈惰困重煩悶甚シク疼痛寡ク舌上苔アリト雖モ潤滑ニシテ清白色是皆虛弱質ノ徴ナリ然レモ今醫タル者逐一

ニ先哲ノ教示ノミニ拘泥センヨリハ親ク自ラ試験シテ詳明センニハ若カズ故ニ證據ヲ煩引セズ醫家偏ニ苦心焦志シ自餘ノ事實ヲ辨明セントヲ冀望ス

流動質篇第四

此篇血質ヲ鑒察スルヲ論ス前編ニ説クカ如ク血液ハ專ラ固形質ニ管統スル者ナリ

○第一ノ血質ハ甚々粘稠ニメ細血球過多累積シテ充填ス其中ニ含蓄スル處ノ鹹渣モ亦同ク粘凝ヲ成スナリ緊メ云ヘバ血液粘稠ニメ增多シ固形中ニ充填盈満スルナリ

○體質強壯纖維強拘緊張平生動作シテ善ク食スル者ハ常ニ上件ノ血質ヲ成ス

○細血球増益充填シ諸脈管モ亦甚ク強拘且ツ充張ノ勢力實盛ナル時ハ血液ノ進輸スルノ大過急疾ニメ壯熱ヲ生ズ以上兩件ノ因ニ由テ血中ノ稀潤液費耗シ粘稠ノ弊轉増進ス是レ以テ殘餘ノ血液殊ニ稠厚膠着シ細動脈ノ未稍毫管ノ纖維ニ通達スル頃宜ク失ヒ閉塞凝滯ノ弊衝熱ヲ生ズ其熱至テ熾盛ナル時ハ鹹渣亦凝固ス其熱度尋常ノ稽留熱ノ度ヨリ過クル者ハ血中ノ鹹渣變メ恰ヒ膏ノ如シ是レヲ徵スルニ熾盛熱兼煖衝熱

ノ患者ヲ刺絡スルニ其瀉シタル所ノ血ハ甚ク粘稠ニシテ必ス薄膜ヲ被フ又脇煖衝熱ノ人ヲ瀉血セシニ其瀉スル所ノ血中ニ鹹渣一拇指ノ如クニ凝結スル者ヲ見タリ是レ其熱ニ由テ然ルヲ明徵又試ニ熱病ノ初發ニ當テ刺絡スルニ其第一回ハ血稍稠厚ニシテ色鮮紅ナリ爾後施スル二三回其熱猶稽留メ解セズ漸ク増盛ノ極ニ至テハ其血甚稠厚粘膠尤モ厚キ膜皮ヲ被フ故ニ其熱愈熾盛ナリ殊ニ體質強實ノ者ハ刺ス處ノ血液極メテ粘稠ナル者ナリ

○熱病兼刺痛ノ症ハ脇煖衝熱及ヒ聖京健成德云前ニ注ス

ノ類ナリ其劇痛ノ起由ヲ檢スルニ血液ノ運行大イニ
 増益シ且ツ壯熱ヲ羨シ從テ血中ノ鹹渣滲稠固スルガ
 故ナリ此機ノ微甚ニ從テ痛モ輕重アリ又其激衝ノ病
 毒諸膜ノ纖微ナル細絡中ニ滯積壓迫シ非常ニ其部分
 ヲ引展牽張スル時ハ其處必ス激衝疼痛ヲ生ス然レテ
 猶血中ノ病毒相次テ常ニ循行シ來テ止ス攻壓ヲ為ス
 トキハ其狀殆ト稟受強壯ニシテ血液稠厚ナル人一時
 大イニ動作勞カスレハ脈強實疾數ニメ頓ニ熱ヲ羨シ
 猶増盛ノ極ニ至レバ遂ニ劇症ヲ發スルト同一機ナリ
 此時ニ當テ速ニ刺絡或ハ清涼劑潤灌劑和緩ノ飲煎ヲ

用ヒサレバ忽チ危險ノ症ヲ發メ死ニ至ルナリ

○平全ノ良血液ト雖モ體中ニ充填滿刺ナル時ハ亦善
 ク危篤ノ疾病ヲ生ス詳ニ候ト加刺的私ノ書ニ見ユ設
 兒修私モ亦其事ヲ説ケリ並ニ其書ニ就テ見ベシ今聊
 カ此ニ約言センニ凡ソ血液滿刺ナル時ハ動脈管牽張
 ス故ニ血液實滿シテ其究リ脈管ヲ破裂スルニ至ル猶
 且ツ鹹渣及ヒ水液ヲ輸ル細動脈ノ管口ヲ展開ス此因
 始メハ僅僅ニ起リ漸ク脈管口ニ壓入シ遂ニ頓路ヲ失
 フテ結滯閉塞ス爾後漸次ニ腦及ヒ肺ニ波及ス是以テ
 此症ハ刺絡ヨリ善ナルハナシ然レ過度ニ刺絡スル

勿レ唯其刺血ヲ減損シ脈管ト血液ト相適ノ常度ヲ得セシムルヲ要トス

○故ニ此ノ如キ人ハ飲食起居平常ニ異ナラズ疾病無キニ似タリト雖モ血ノ滿盈スルヲハ既ニ病アルニ齊シ

○又稟賦柔脆虚弱ニメ性多血ナル者ハ飲食時有所ツテ減シ時有所ツテ倍ス是レ其徵ナリ毎時何レノ部カ失血

ヲ患フルヲアリ其失血ノ期必ス時ヲ以テスルヲアリテ婦人ノ月經適來スルト正ニ同シ然レモ婦人月經ノ

常規ニ類セス皆虚脆ヨリ發スル者ニメ是レヲ凶兆ト

又

○葛布温雄雞軍九ヲ裁ヲ養フニ油膩膏粱ノ食ヲ以テ

肥腴ナラシムレバ鬪難ニ用ヒテ甚夕剛勇ナリ是レ脂

肪ヲシテ異常ニ衆多ナラシムレバナリ然ルニ鬪抗ノ

後子養養スルヲ一晝夜ナラサレバ勢力頓ニ脱スルヲ

實ニ怪シムヘキカ如シ其理詳ニ堙兒貌藜安魯概私洪

カ書中ニ論又就テ見ルベシ成德業スルニ其全文ヲ引

雞ノ多脂多血ナル者鬪フニ因テ熱ヲ生シ血液ノ運行

大過急疾ヲ成シ血中ノ稀液能散ニテ其血液稠厚ヲ為

シ脈管ニ充填滯瘀ス其充填ヲ減セサレハ血液運行ノ

強壯人多血ノ人ノ熱ヲ患ルモ此理ト同一致ナリ故ニ多

泰西熱病論 卷二

醫學堂藏

ナラニカ見ル者指考究セヨ
 設兒修秘モ亦云ク凡ソ血液優多ナルト
 キハ必ス諸脈管ニ充填シ其部ヲ壓迫ス其理ハ血ノ滯
 澁甚多衆多ナレバ脈管ノ末梢ニ至テハ皆膠固シテ流
 滯スル道ナシ故ニ逆行メ大管ニ還流シ遂ニ引テ心臟
 ニ及ブナリ

○第二ノ血質ハ前説ト相反シ其血固ヨリ球ヲ為ス
 少ク且ソ脈管中ニ包容スルヲ鮮ナシ其含蓄スル惡ノ
 鹹渣モ稀淡ニメ水ノ如シ或ハ又粘膠ヲ成ス者アリ是
 ノ如ク稀淡ニ少ニメ且ソ汁ノ如クナル血質ノ者ハ
 常度ノ如ク血中ヨリ諸液ヲ分利泌別シ化成ヲ遂ル

能ハズ又活潑揮發ノ勢ヲ專ニスルヲ能ハズ是レニ加
 フルニ膽液ノ勢力少ク元運ノ靈液乏弱缺衰メ人命ヲ
 資給スルニ足ラズ津唾ハ清淡ニシテ粘滑ナリ其餘ノ
 症候皆是等ノ類ナリ是以テ飲食諸液トモニ常度ノ如
 ク消化熱成スルヲ能ハズ神氣乏弱ニメ常ニ寒冷ヲ苦
 シミ且ソ皮膚淡白ニメ滑澤無ク常ニ惡液ヲ生シ又水
 腫等ニ罹ルヲアリ粟メ言ハハ是等ノ人ハ諸液ノ運行
 遲緩ニメ終ニ適宜ノ運行ヲ缺損シ凝滯滿盈ノ質ニ傾
 クナリ因テ各處ノ脈管閉塞シ血液モ亦各部ニ留積鬱
 滯シ漸ク腐敗ヲ生シ終ニ酷厲ノ性トナリ欲テ惡性危

泰西醫病論 卷二

醫學堂

險ノ熱病ト為ル是レ他ナシ脈管ノ充張勢カト血中ニ
 含蓄スル元運靈液ト大イニ減衰スルニ嬰ル凡テ粘膠
 ニシテ運行遲緩ナル血ハ能ク心室ニ成德業スルニ心
 リ其形チ未開紅蓮ノ倒ニ懸ルカ如シ上頭ヲ豐頂ト云
 ヒ下端ヲ尖尾ト云フ其内ハ空虚ニメ縦ニ中隔アリ故
 ニ分レテ兩室トナル是レ右ノ室ト云フ其體質ハ
 悉ク筋ヲ以テ織成ス血ノ出納ニ從ヒ常ニ動テ縮脹ス
 縮ム時ハ左室ノ血ハ動脈幹ニ射出シ右室ノ血ハ肺動
 脈ニ射シ兩室空シ張ルトキハ靜脈幹ノ血ハ右室ニ
 射入シ肺靜脈ノ血ハ左室ニ射入シテ兩室盈ツ此ノ如
 ク互ニ盈虚出納シテ須臾モ休ムナク常ニ全身ニ環
 流ス猶解體諸緒留スル者ナリ又腐敗ノ惡液ハ好シテ
 書ニ詳ナリ
 體中ノ最モ柔軟ニメ觸知シ易キ貴要ノ部分ヲ腐蝕損
 敗ス故ニ殊ニ腦髓ノ部ニ甚シ總テ生路ニ最モ貴要ナ

ル部分ハ諸液ノ運動最モ遲緩ニメ其諸脈管ノ質モ甚
 タ柔脆ナルヲ以テ或ハ血液ノ運行太過急疾ナル時ハ
 直ニ微細ノ纖維破裂メ其血液脈管外ニ溢出ス此溢出
 スル者ハ運行甚夕遲緩ニメ留滯鬱滯シ因テ腐敗シ終
 ニ侵蝕ノ性ヲ為シ漸漸ニ脈管ヲ穿破スルナリ
 ○以上兩件ノ血質其本源ヲ云ヘバ全ク固形質ニ關係
 ス其壯實優多ノ者ハ必ス脈管ノ充張勢カノ強實ナル
 ニ因リ其匱淡弱少ノ者ハ體質ノ軟弱脆薄ニ因ルコノ
 兩弊人身中ニ在テ何レカ過不及ノ大甚ヲ為セバ皆疾
 病ヲ生ズ是以テ日常此機筭ニ專心シテ諸病ノ起衰ス

ル條理ヲ研究スベキナリ

○譬へハ暫留熱兼嫩衝熱ノ症ハ纖維ノ充張勢力強實ニ過キ因テ血液甚々稠厚粘膠ヲ成スヨリ萎ス又遷延神經熱ハ脈管大イニ脆弱勢力不足ニ因テ血液匱乏淡稀ナルヨリ萎ス諸般ノ疾病此ニ因ヨリシテ萎スル者ナリ殊ニ傳染ノ諸疾ハ皆此兩件ニ關聯セザルナシ是以テ諸般ノ疾病ヲ鑑斷シ處療ノ方法ヲ定ムルモ皆是レヲ準據トシテ研究考定スベキナリ

血液焔崩腐敗篇第五

成德素スルニ此篇論スル患ノ症ハ世ニ直中傷寒或壞症

ト稱シ不治ノ症トスル者ナリ

前篇兩種ノ血質ノ外ニ猶危險惡性ノ血質アリ前ノ二質ニ對メ是レヲ第三等ノ血質ト名付ク

○此血質ハ非常ニ焔解渙崩メ腐敗ニ傾ク者ナリ是レ

敗血病 成德云和蘭ニ是レヲ失敬兒儻ト云フ内科選要其他ノ諸書ニ因症治方アリ漢人ノ所謂青腿

牙疔ハ此類ナリ敗血病ノ名ハ予力新定ニ出ツ 質ノ人ニ係ル此症ハ從來病患

ノ明カニ識辨スベキナク多ハ唯疲倦勞憊困重等ヲ

發ス然テ其人ノ皮膚俄ニ輕紫色或ハ青色ト為リ全軀

ニ黑色或ハ青色ノ斑點ヲ發シ爾後卒爾トシテ大イニ

失血シ猶其他危險ノ惡症ヲ發ス故ニ患者モ自ラ何ノ

故ナルヲ解セズ或ハ他ノ一箇ノ疾病ニ罹ルカト疑

フ此症ハ小兒大人ヲ論セズ失血有ルヲハ預メ察知ス
 ベシ○婦人此ノ如キ黒色青色ノ斑點ヲ發シ其狀或ハ
 縱條ヲ成シ或ハ廣闊ニメ宛モ打撲傷ノ如クニメ外ニ
 失血ノ患無キ者ハ必ズ大イニ崩漏ヲ發ス○前説ノ症
 ニメ或ハ兩症ヲ兼子發スル者ハ僅ニ創傷スト雖モ必
 ス多ク滴血ス其狀連綿トシテ迸出セズ或ハ創傷ナシ
 ト雖モ齒衄或ハ便血尿血等ヲ發スルヲアリ

○此症ノ患者ヲ刺絡スルニ刺絡ヲ施ス者ハ血ノ失脱ヲ遏止セシカ爲メナリ然レレハ錯誤ニ屬ス其血凝結シテ塊ノ如ク平全ノ血
 ノ如ク稠血ト鹹渣ト分利セズ半ハ凝結シテ塊ヲ為シ

テ鬆散セズ其色大抵紫色或ハ黯黒色ナリ或ハ暫時鮮
 紅ナリト雖モ多クハ速ニ腐敗スルナリ

○患者發斑スル前ヨリメ口氣甚タ惡臭ヲ為シ小便モ
 亦腐穢ノ臭アリ此ノ如キ症ハ血液既ニ腐敗シ稍酷厲
 ノ性ヲ成シ終ニ脈管ヲ腐蝕スル顯徴ナリト知ベシ其
 故ハ此種ノ失血アル人嘗テ多血ノ徵候ナク脈亦強實
 ナラズ又疾數ナラズ熱微ク或ハ全ク熱ナク又平生劇
 シク身體ヲ勞動スルヲナキニ今脈管破綻スル者ハ是
 レ其腐敗ノ酷厲液ニ因テ穿破スル者ニシテ彼ノ血液
 ノ運行大過急疾ニ因テ發スル失血トハ異ナリ然レモ

體質脆弱ノ者ハ血ノ運行纔ニ衝激スレバ微細ノ尿管ヲ破綻スルアリ然ル時ハ時時肺血ヲ糞シ或ハ僅僅タル事件ニ因テ衄血ヲ糞スル等是ナリ然テ此症ノ失血ハ紫斑等ヲ糞スルナシ故ニ多血ノ候ナシト雖厄少シク刺絡スルヲ善トス此術ニ因テ軟弱ノ尿管中ニ大イニ血液充填シ衝激スルヲ減セシム然レバ失血自然ニ止ム

○以上ニ論スル失血ハ大抵血液酷厲ノ性ヲ成シ中和ノ性毀損敗類シ動脈ノ末梢ヲ腐蝕スルヨリ糞ス又考ルニ其血球甚タ膠固メ聚滯シ心及ヒ動脈等ノ勢力ヲ

以テ包括維持シテ輸送スルニ足ラサルヨリ致ス處ナリ人身平生完全ノ血球齊整ニ運行スベキニ今缺損不整ノ血球泛濫妄行スルニ因テ常度ノ如ク固充セス直線ノ運行ヲ缺ク者ナリ○試ニ上件ノ血球ヲ檢セント欲セバ先ツ顯微鏡ヲ以テ其人ノ透視シテ見ルベキ部分ヲ日輝ニ映シ細血球ノ動脈末梢ノ纖絡ニ流滴スルヲ觀察スベシ其血液圓球ヲ成サズ悉ク細長ノ態ニ變ス是レ其最モ細微ノ小管スラ既チ然リ況ヤ自餘ノ大管ニ緩滯留緒スル血球ハ凝塊殊ニ大ナレバ尿道中ニ通利シ難ク遂ニ尿管ヲ損破スルニ至ル其勢先ツ細薄

ノ脈管ヲ破傷シ次テ脈外ニ溢出シ其血ハ自ラ滲透管
(滲透管ハ古ヘ云フ處ノ脈管ノ衣膜ナリ) ○成徳云動脈ノ末梢ニ厚キ衣膜アリ其質ハ靜脈水脈脂肪脈及ヒ其
 他許多ノ脈管集結會組スル者ナリ其官能ハ一ハ營養
 ノ液ヲ分利シ一ハ無用ノ廢液ヲ驅逐スト猶解體諸書
 ナリヨリ 滲泄スルナリ是以テ此症ノ失血ハ疼痛ニ關
 ルナク又過劇ノ動作疾患無フメ大小便ニ血ヲ交フ
 ル等ノフアリ ○予嘗テ惡性熱ノ血液運行ノ甚々急疾
 ナルニ因テ腋下ニ血汗ノ類ヲ發スル者ヲ見ル其相液
 ハ宛モ博兒^ボ臥^レ泥^ニ亞^リ蒲桃酒ヲ以テ染ムルカ如シ又忽度^ト
 傑^ク私^ハ云ク疫熱ニ紫汗或ハ血汗ヲ發スル者アルヲ見ル
 ト ○此症ノ失血ハ鼻衄ト為テ出ル時ハ其血稀淡ニメ

水ノ如ク或ハ血ニ水ヲ交ヘタルカ如ニメ凝固スル
 無シ平常ノ人ノ衄血及ヒ熱病兼燉衝熱ノ血ハ是レニ
 反メ甚々稠厚ニメ光澤アリテ且ツ鮮明ナリ ○又少婦
 ノ處女病^{前ニ}有ル者ハ好シテ衄血ヲ患フ其血白キ
 殆ント白布ノ如シ然メ身體各處ニ紫色蒼色ノ傷痕ノ
 如キ斑ヲ發スルヲアリ是レハ細血球洋解腐蝕メ鹹渣
 ヲ輸送スル細動脈及ヒ蒸氣管等ニ滲透シ其部ニ固着
 ノ此斑ヲ發スル者ナリ ○予嘗テ歷試スルニ腐敗惡性
 熱ニ夥シク小疹ヲ發スル者ハ佳徵ナリ殊ニ黃疸ノ類
 ニ此小疹ヲ發スル者ハ死徵ニ非ズ其故ハ既ニ腐蝕セ

ル血球今其本質ニ復シ因テ其圓活ノ状ヲ表現スルカ
 故ナリ○惡性腐敗熱ノ類ニハ汗出テ其狀煤ノ如ク或
 ハ小便黯赭色或ハ黑色ニメ黑塗アル者ハ是レ皆血球
 ノ毀敗腐蝕ヨリ來ル者ナリ又小便白色ニメ塗甚々多
 ク其色殆ント骨斷飲成德案スルニ帶斷ハ樹子ノ名ナ
 邦ノ人ノ茶ヲ飲ニ異ナラス其形狀主治ノ稠厚ナルカ
 詳カニ予カ選スル處ノ蘭藥鏡原ニ載ス如キ者アリ○又其顔面手腕等強メテ清潔ヲ要スルモ
 スベテ污垢アルカ如ク煤ヲ帶ルカ如ク見ユル者アリ
 ○以上ノ諸候ヲ研究スルニ皆血液ノ順路ヲ失ヒ非常
 ノ道路ニ泛濫妄行スル者ナリ初メノ症ハ血液毀頽ス

ルニ因テ自家ノ赤色ヲ見ハシ次ノ症ハ血中ノ水性毀
 穢腐敗スルニ因テ其徵ヲ見ハス一ハ是レヲ尿渣ニ見
 ハシ一ハ是レヲ蒸氣ニ因テ皮表ニ見ハス能ク辨識ノ
 區別スベシ

○又血球毀敗損頽シ其中ニ含畜スル處ノ鹹渣球ノ分
 利滲出愈進ンテ洩出スル者アリ或ハ月桂皮露ヲ過服
 シ血液諸脈ニ包充スルヲ少ク脈絡弛緩衰弱シ鹹渣赤
 色ニ變メ博兒博兒即亞蒲桃酒ノ如クニ為ルアリ亞格
 兒秘及ビ蘭孤利秘ノ試タル説ニ云ク蛇咬傷ノ患者此
 ノ如キ血ノ渙崩腐敗ヲ幾スト是レ皆身體諸部ノ汗孔

ヨリ血ヲ漏泄シ死スルカ故ナリ○又夥ク漏汗シ大イ
 二下利ヲ糞シ尿管成德云尿管ハ小便過利シテ止マハ
 者ニメ別チ消渴ナリ其因症ハ内
 科撰要其他諸
 書ニ詳ナリヲ生シ又涎唾流泄メ止マサル者ハ皆是
 レ鹹渣球ノ烱解腐敗スル候ナリ○又多ク水銀劑ヲ服
 スレバ血質稀解メ水ノ如クニ為ルナリ○前説ノ如ク
 血球毀敗スル者ハ大抵酷厲毒ノ處為タリ猶是ヲ徵ス
 ルニハ先ツ刺絡ヲ施シ其瀉スル處ノ血ニ排闥露劑ノ
 名
 ヲ注クバ一睫時ニ血球忽チ毀敗シテ烱解渙崩ス○又
 鹿角精ヲ過服スレバ失血ヲ糞ス蓋會ノ製劑ヲ過服ス
 ルモ亦然リ屢歴驗スル處ナリ

○總テ烱解腐敗ノ血質ハ大凡酷厲ノ諸飲食藥劑等ニ
 因テ糞スルナリ此故ニ長途航海ノ人鹽藏ノ品腐敗毀
 鐘ノ物等ヲ食シ諸液漸漸腐敗シ酷厲ニ變シ生活資給
 ノ常度ヲ失ヒ大イニ衰弱虚敗シ遂ニ遊走痛攣絞痛氣
 息惡臭齒齩腐爛メ海棉ノ如ク或ハ青黑色ノ斑點ヲ生
 シ或ハ潰瘍ヲ糞シ虚鬆ニメ青黑色膿穢淋漓或ハ死肉
 等ヲ生スルヲ有リ又代兒的兒ト云フ者安摠地
 名ヘ航海
 シテ徵スルヲアリ敗血病前ニ
 注スノ者ハ毎ニ糞斑熱赤痢
 下血其他諸失血等ヲ糞ス行人中敗血病ヲ患ヘテ胸間
 ニ瘡ヲ生シ得テ熱病ニ嬰ル者ハ其瘡口常ニ漏血シテ

止マズ後千三十年ヲ經テ始メテ愈エタリト予又歷試
 スルニ健康壯實ノ人航海メ二三月間ニ盡ク敗血病ニ
 罹リ歸國ノ後千其人三分ノ一ハ身體腐敗メ使用ニ堪
 弗ルヲアリ又航海四週或ハ五週間ニ此病ニ嬰リ初メ
 一二人ヨリ漸ク傳染シ終ニ十數人ニ至リ皆業ヲ廢ス
 ルヲアリキ又往歲船司官麻兒丁ノ部下ニ二百人一齊
 ニ此病ニ罹レリ然レモ其人悉ク稟受強實ナルニ因テ
 凡ソ八十日或ハ百日ニメ皆快復セリ

○敗血病ハ多ク船師ノ患フル處ナリ軍艦ノ甲必丹及
 ビ外科ノ説モ亦然リ又千七百四十七年本邦ノ延享四年ニ當ル某

艦ノ將軍及ヒ其後千建外禮滿私麻尾支人ヨリモ其
 事ヲ聞ケリ予此兩説ニ因テ大イニ發明スル處アリ猶
 覆索メ此症ノ失血スル處由ト處療ノ方法トヲ考定セ
 リ

○又按スルニ凡ソ揮發走竈ノ固結灰汁鹽及ヒ此ノ如
 キ散劑或ハ蘆薈ノ製劑ヲ過服スルトキハ必ス此疾ニ
 罹ル又灰汁鹽様及石鹼性ノ藥劑即チ秘賢秘等
 其他石鹼性ノ劑ヲ久シク服スレバ枯瘦熱敗血病其他
 失血下利等ヲ發ス予又近歲某ノ久シク灰汁鹽ヲ服シ
 テ膀胱中ニ結石ヲ生スルヲ療セリ又虛弱ノ人ハ灰汁

鹽ヲ久服スレバ齒齲腐爛シテ水棉狀ヲ為シ焮熱シ色紫黒ニ變シ漸ク潰爛スル時ハ肉中ニ間竅ヲ生シテ分斷ス少シク指頭ヲ以テ押壓スルニ大イニ出血シ或ハ水ノ如キ稀淡ノ血ヲ流シ淋漓トシテ休マズ又全身手足ニ斑點ヲ發ス其色淺油綠色或ハ淺青蓮色ナリ其部位ハ尤モ脚股間ニ夥シトス其色ハ赤蒲桃酒ノ如ク或ハ黯黒色ト為ル黯黒ト為ルニ至テハ遂ニ死肉トナルヲ恐ル、ナリ○又此血液焮解ノ事ハ予嘗テ賓孤私東ノ説ニ因テ詳明スルヲアリ前ニ説ク處ノ如キ藥劑ニ因テ血質然ク變スル者ト熱病ニ因テ灰汁鹽槎ノ腐敗

液ヲ釀シ因テ血液焮解潰崩スル諸症ト皆同一般ノ理ニメ最モ恐ル可キ者タリ是以テ治方ハ必ス機那煎マ夕或ハ機那^ナ淮加石膽^ニ渥^{成徳云クニ方ト}ヲ用ヒ且ツ酸收ノ飲食等ヲ兼用ス此劑ハ焮熱及ヒ齒齲腐爛シテ失血スルヲ止ム且ツ紫黒斑腿股ニ發スルヲ防制ス預メ此劑ヲ服スレハ此斑發スルモ亦速ニ消除ス是ヲ用フルヲ二週或ハ三週ヲ經テ後チ全身騷ク小疹ヲ發シ焮熱赤色アルハ善徵トス又二週三週ノ後チ甚タ疲弱シ内陷腐鐘シ遷延勞瘦熱ヲ發シ全ク消耗羸瘦スル者ハ必ス死ス○又一人此症ニテ死スル者死後膀胱ヨリ大

イナル石ヲ出ス_一アリ形千梨ノ如シ其重廿六十六錢
 其端末ノ細薄ナル處ハ尖リテ膀胱口ニ當居ス○私_ス參_シ
 賢_ノ私_ノ邏_孤般_面弗_魯烏_其其方去兒多慈略物及ニ莫蘭度
其他諸書ニ載ス併セ見ルヘシ
 ○成德云即チ_灰汁鹽劑ナリ_ヲ過服スレバ小便灰汁鹽樣ニ變シ血中
 ノ鹹渣共ニ分利泄出ス此劑結石ヲ破碎消融スル剝勢
 アルヲ以テ膀胱中ニ生スル結石ヲ灰汁樣ト為シ速ニ
 驅泄スル功アリ故ニ此等ノ劑ヲ久服スレハ諸般ノ危
 險惡症ヲ羨スル_一實ニ恐ルヘシ此ノ如キ藥劑ヲ過服
 ノ血液洋解渙崩スルヲ予毎ニ見ル_一アリ殊ニ稟受虛
 弱ノ人ハ最モ此剝劑ヲ禁スヘキナリ○刺絡ヲ施スニ

常人ノ血液ト雖モ揮_羨走竄ノ灰汁鹽ヲ和スレバ凝固
 セズ又血液ト鹹渣ト分利セズ是以テ考フルニ彼ノ敗
 血病ノ人其血液既ニ腐敗シ灰汁鹽樣ノ液多ク血中ニ
 滋生スル故ニ全身ニ斑ヲ羨シ且ツ失血ス故ニ腐敗羨
 斑熱ト敗血病トハ血液同質ナル_一明徴スベキナリ
 ○諸液トモニ腐敗スルトキハ總テ慄悍ノ揮_羨鹽性ト
 為ル又其腐敗ノ血液ヲ瀉スルニ瀉後須臾間ニ變ノ膿
 血ノ如ク其色微シク黯黄ナリ又腐敗羨斑熱ノ最極ニ
 至ル者ヨリ瀉スル處ノ血ハ其色ハ上ニ言フガ如シト
 雖モ一増ノ惡臭アリ小便ノ臭氣モ亦然リ此症諸液ノ

腐敗已ニ經久ナレバナリ然レトモ患者猶死ニ至ル
 ナシ○死屍ノ最モ速ニ腐敗シ易キ者ハ疫斑熱ヲ患ヘ
 シ病者ナリ六時或ハ八時中ニ成德案スルニ彼ノ邦晝
 夜ヲ二十四時ニ分ツ六
時ハ本邦ノ三時
 八時ハ四時ナリ 惡臭ヲ發スルヲ殊ニ甚シ宛モ尋常
 ノ死者ノ七八日ヲ經タルガ如ク且ツ汚臭ノ膿血諸竅
 ヲリ流泄ス此流泄スル穢物ハ沸熱ニ因テ諸脈管ニ充
 填シ漸ク腐敗ヲ成セシ者ナリ是等ノ屍ハ速ニ瘞莖ス
 ルヲ要トス○中毒ニ因テ血液腐敗スルヲ明了スベキ
 者ハ蝮蛇咬傷或ハ烈毒ノ蟲獸傷ナリ血液頓ニ腐敗シ
 焯解渙崩シ黄色ノ膿血ト為ル○疫毒ノ厲氣モ速ニ血

質ヲ毀敗シ諸液ヲ腐敗シ且ツ熱燦痘前ニ生セシム
 注ス
 是以テ其症劇シク失血ヲ發シ或ハ甚惡臭ノ漏汗嘔吐
 下利ヲ發ス此等ノ症候アル者ハ皆生氣穢シテ熱燦痘
前ニト為ル徵ナリ忽度傑私能ク其事ヲ詳明ニセリ○
 注ス
 又疫斑熱ノ甚惡頑強ニメ治シ難キ症ニ動モスレハ大
 イニ失血ノ休マホル者アリ其血ヲ見ルニ平全ノ血ノ
 如ク凝固スルヲナシ是レ血液焯解腐敗スル徵ナリ
 ○痘瘡ニ傳染セラル、者ハ其體質ノ稟受ニ因テ發斑
 腐敗或ハ諸部ヨリ多ク失血スルヲアリ其狀ハ痘熱傳
 染四五日間ニ全身ニ紫斑ヲ發シ諸道ヨリ夥ク失血ス

殊ニ尿道鼻孔婦人ニ在テハ多ク子宮ヨリ漏泄ス斑斑
全ク黒色ニ變シ痘粒ヨリハ多ク水ノ如キ血ヲ流泄ス
然レハ劇烈ノ候ナシ

○一兒女五歲許前説ノ如キ痘ヲ發ス壯熱疼痛其他劇
症ヲ備ヘ紫黒色ノ大斑ヲ發シ全身痘粒少ク特リ唇頰
ノ内蔵及ヒ舌最モ黒色ニ變シ多ク流血ス且ツ連リニ
輕キ昏眩ヲ發シ玩物ヲ棄擲ス終末ニ多ク鮮紅血ヲ嘔
吐シ又大便ヨリ黒色ノ凝血ヲ下シ知覺迷乱シ九日ニ
ノ死スルヲ見ル

○又一處女温熱ノ日ニ當テ痘瘡ニ傳染セラレ偶遊歩

騎馬戲踊等ヲ為シ大イニ疲憊ス爾後稠痘ヲ發シ全身
ニ夥多ノ青黒斑ヲ發ス三日ヲ經テ其痘皆内陷シ足腿
全ク紫色ニ變シ齒齦鼻孔ヨリ夥シク流血ス又經水適
洪漏ス平常ノ經期ニ先ツテ六日許ナリ病ムテ六日ニ
ノ死ス此患者始メヨリ胸中烈シク壓迫シ大イニ煩悶
シ頻ニ昏眩ヲ發セリ脈殊ニ急疾小弱ニメ齊一ナラズ
是レ痘瘡中ノ最モ惡症ニメ恐ルベキ者ナリ

○以上論擧スル症ハ皆死症ナリ凡ソ痘ノ發見ノ時ニ
當テ發斑及ヒ流血ヲ發スル者ハ其死大抵九日ヲ出ル
稀ナリ是レ血液非常ニ烊解渙崩シテ腐敗スルカ故

ナリ○予嘗テ歷試スルニ此ノ如キ危症ヲ疾スル者ハ
千百人中ニ一モ治シ難シ殊ニ斑紫黑色ニノ稠密ナ
ル者ハ愈活路ヲ得難シトス此ノ如キ重症ニハ適宜ノ
酸收劑機那機那劑收瀋ノ消疫劑ヲ用フベシ此等ノ劑
ハ斑熱氣失血ノ症ニ大効アリ墨亞獨此斑熱兼失
血ノ方論ヲ詳説ス其書ニ就テ見ルベキナリ

○前論ノ如キ焮解液崩シ易キ血質ノ者ハ動モスレハ
惡性腐敗熱ニ感ノ發ス又單ニ血液及ヒ諸液ノ酷厲ヲ
為スヨリ來ル者多シ此症ハ殊ニ敗血病ノ者ニ多キナ
リ案スルニ腐敗熱ノ毒ハ蝮蛇咬毒成德云其症ハ予カ
選スル處ノ蘭藥鏡

原ノ蝮蛇ノ血中ニ襲入シ血液焮解スル處為ト全ク
條ニ詳ナリ

同一ナリ血液ノ酷厲ヨリ來ル者ハ血中固有ノ慄悍鹽
ノ鋭尖ナル勢ニテ刺動攻衝スルニ因テ血液熱蒸沸騰
スルノ劇シキヨリ疾スル處タリ凡ソ人身健全強壯
ノ稟受ニシテ儻シ此ノ如キ患害ヲ受ルトキハ自然ニ
一箇ノ腫ヲ發シ焮熱膿潰シテ病毒ヲ排出ス然レ疔血

及ヒ諸液共ニ酷厲ニ變スル者ハ或ハ寒燦疽成德案ス
ルニ縲尹
疔疔私云寒燦疽原比
比原比比比原比比比原比比比
寒燦疽ハ熱燦疽ニ比スレバ熱燦疽其因症異ナルヲシ
絶テ寒熱痛痒ヲ知ラズ甚シキハ刺傷ストイハ疔痛楚
ヲ知ルナシ又是レニ觸ルニ屍肉ノ如キ惡臭アリ又
指ヲ以テ其處ヲ壓セバ忽然ト陥テ再ビ起ルナシ
是レ靈液神氣等ノ透注絶テ無ガ故ナリ此病寒熱ニ種

本草綱目卷之二十一

二分ツ其標準ハ患處ヲ刺傷シ或ハ烙クモ嘗テ傷少ノ
知覺無キ者ヲ寒燥疽ト名付ケテ稍知覺アル者ヲ熱燥疽
ト名付クト因テ其概別ヲ知ルベシ熱燥疽ハ前ニ注ス
併セ見ルベシ又案スルニ漢人ノ脱疽ト云フ者ハ此屬
症ニ在リ從來ノ譯書ニ寒火ノ如キ膿血ニ變シ或ハ癰
或ハ寒脫疽ト譯スル者ナリノ如キ膿血ニ變シ或ハ癰
ノ如キ惡臭アル汁液ニ變ス

○凡ソ熱ヲ養スル機ハ人身ヲ保護スル處ノ元運生氣
ノ運動ニ因ル即チ血中ノ慄悍鹽ノ處為ニ係ル譬へハ
餓死スル人ノ如キ無病壯健ノ人ト雖モ一切ニ飲食ヲ
禁絶スレバ血中ノ鹽氣漸次ニ酷厲ニナリ頓ニ一箇ノ
熱ヲ養シ或ハ譫語ヲ發ス爾後鹽氣大イニ衝動シ彌煎
熬ノ勢ヲ逞フシ因テ直チニ腐敗ヲ醸シ遂ニ死ニ至ル

ナリ○血液腐敗ニ登進スル徵ヲ見ントスルニハ乳婦
ニ若クナシルソ無病健全ノ乳婦ハ飲食後三四時既ニ
注ハ其乳白色稀淡味モ亦甘美ナリ若シ十六七時既ニ
許飲食ヲ禁絶スル時ハ其乳稠厚黄色其味鹹ニノ甘美
ナラス尚一二時モ全ク絶ツトキハ濃黄色ニ變シ氣味
甚タ惡シク殊ニ惡臭有テ嘔噦スベシ尚絶ツテ經久十
レバ發熱シ且ツ乳ヲ出スヲ見ズ却テ血ノ如キ液ヲ出
スナリ○此ノ如キ者ハ體中ノ緩和ヲ司トル稀潤液ヲ
多ク酸收ニ傾カシメ又膽液中ニ水ノ如キ稀淡ノ液ヲ
生ズルナリ

○血液沸熱シ及ヒ其運行過度劇烈ナル時ハ忽チニ腐敗ヲ成ス其急速ナルヲ怪ムベキカ如シ其證ハ普兒輩黒カ狗ヲ以テ試タルカ如シ其法狗ヲ捕ヘ大イニ熱スル碎計兒刺非那豆兒成德云砂糖ヲノ中ニ入レ封閉製スル器ナリシ蒸スニ全身ノ血液須臾間ニ盡ク腐敗變鱧シ惡臭ヲ炭メ耐ヘ忍フベカラズ血質全ク烱解シ涎唾血ノ如シ其沸騰ノ蒸氣尤モ惡臭ヲ為シ強實ノ人ト雖モ此氣ニ觸レバ忽チ昏冒スルニ至ル

○日常ノ飲食ニ酸收ノ物品ヲ用ヒホレバ血液自然ニ烱解渙崩シテ腐敗ニ傾クナリ是以テ獨リ肉類魚類香

竄ノ草菜類ヲ恣食スレバ速ニ腐敗熱ヲ生ス○故ニ蒸

餅ハ特リ身體ヲ養フノミナラス酸收味有ルヲ以テ能

ク腐敗液ヲ回復ス成德紫スルニ蒸餅ハ穀類ノ粉末ヲ以テ製ス必ス蒸餅母ヲ入レテ膨脹

セシム蒸餅母ハ酸收ノ品ナリ製法主治詳ニ予カ選スル處ノ蘭藥鏡原ニ載ス

○伊思把居亞及ヒ拂郎察ノ軍中ニテ肉類ヲ過食シテ

夥シク熱病ヲ發セシテアリ時人皆肉ヲ過食ノ死セリ

ト云フ然ニハ非ズ皆肉食ニ因テ血液腐敗變鱧シテ然

ルナリ

○案スルニ血中ニ仄汁鹽様ノ酷厲液ヲ生スレバ總テ

諸患ヲ發スルヲ前説ノ如シ猶詳考スルニ人身固有ノ

鹽氣ハ本來生活ノ用ニ供スベキニ此時ニ當テ共ニ灰
 汁鹽様ノ性ヲ為シ腐蝕穿蝕ノ質ヲ逞^{タカ}フシ血球及ヒ細
 纖ノ尿管等ヲ毀敗メ休マホルナリ又固有ノ生活ニ必
 用ナル油脂モ今亦腐敗シテ酪屬ヲ成シ鹽氣ト混淆ス
 レハ最モ烈シキ腐爛酪屬ノ膽液性ト為リ駁^{タカ}トノ元
 運精氣ヲ穿壞スルナリ

○又身體ノ一邊ハ血質酪屬ニメ纖維強硬ヲ為シ血液
 粘稠ニメ焮衝ヲ兼子一邊ハ其血稀淡焮崩シ纖維軟弱
 ナル者アリ

○又傳染ニ因テ血液酪屬ニ至ル者ハ痘瘡ナリ其中子

或ハ血液甚々粘稠其熱甚シク焮衝劇痛肺痛腦焮衝ノ
 類ヲ兼ヌル者アリ又血液匱乏焮解換崩シ尿管遲緩軟弱
 或ハ急數或ハ遷延神經熱ノ諸症アリテ小便稀淡各處
 ヲリ駁^{タカ}シク失血シ疼痛少ク或ハ全ク疼痛無ク漫腫等
 ヲ為ス等ナリ上件ニ云フ處其初症ハ熱最モ盛ニシテ
 焮クカ如ク故ニ痘ヲ發スルヲ能ハス次症ハ其熱痘ヲ
 充托メ發出熟成スルニ足ラズ痘狀平塌ニメ膿ヲ熟成
 スルヲ無キナリ是レ血及ヒ諸液共ニ腐敗變壞シ侵蝕
 スベキ稀淡ノ血液ト變シ或ハ腐敗斂^{タカ}鐘惡臭ノ液トナ
 レハナリ

○稀淡酷厲ノ血質ノ人ハ肺傷熱及ヒ脇痛兼肺傷熱ヲ
發ス尚焮衝熱ノ最極ノ症ヲ兼ヌル者アリ此症ハ舟人
ノ敗血病アル者ニ護ス

○千七百四十年四十五年 本邦元文五年 延享二年 疫熱流行ノ致人

一般ニ其患ニ罹ル其症先ツ惡寒振慄後チ大熱ヲ發シ
呼吸促進乾咳嗽ヲ發シ甚シフメ連綿トシテ休マズ胸
脇背脊疼痛メ刺スカ如ク 刺ルカ如ク動モスレバ頭痛
シ顛顛疼痛ス脈多クハ急數弦緊ニメ沉小ナリ呼吸甚
熱シ促進メ利セズ始メハ稀淡ノ清水白沫ヲ吐シ後ニ
ハ黃水ヲ吐ス或ハ其色洎夫藍ノ濃煎ノ如キ者アリ然

レ厄多クハ稀薄ニメ其狀膿ノ如ク且ツ惡臭アリ或ハ
氣管喉頭大イニ唸痛シ或ハ嘶嘎シ或ハ咽喉ノ薄皮脫
傷ス其刺絡スル處ノ血ハ黯紫色ニメ薄膜ヲ被フ或ハ
綠色或ハ ナシトナリ 淺油綠色ナリ或ハ ニシテ 纒ニ鮮明ノ色アルモ冷ル
ニ隨テ亦大イニ烱解湮崩シ較緩ノ質ト為ル○此ノ如
キ症ヲ刺絡スルニ其血ニハ厚シテ稠固ナル皮膚ヲ圍
被ス其圍被スル處ノ皮膚ノ色ハ尋常ノ肺焮衝熱脇焮
衝熱ヨリ瀉スル處ノ血ト異ニシテ黃色ナラスメ殆ン
ト山茱萸子ノ如ク又赤覆盆子煎ノ如シ此色ノ皮膚ア
ル者ハ惡徵ナリ是レ大イニ粘稠液ヲ生シ酷厲ノ鹽氣

夥ク血中ニ増進シ遂ニ細血球ヲ毀敗シ腐敗斂縮スル
 ニ因テ血液焔解シ其碎破セル細血球ヲ焔衝スル處ノ
 粘膠液ノ然ク圍繞スルナリ○又脇焔衝熱ノ劇症アル
 患者ヲ刺絡シ試ニ揮篋ノ灰汁鹽ヲ以テ其血中ニ交フ
 レバ血ノ上面ハ上件ノ説ノ如シ因テ考フルニ是等ノ
 症ノ血中ノ鹹渣ハ必ズ薄皮膜有テ赤色ニノ血ノ如ク
 又博烏兒卧泥亞蒲挑酒ノ如シ又其血質ニ因テ持リ其
 鹹渣ノミ暗黄色ヲ見ハス_トアリ○大抵小便濃赤色或
 ハ黯赤色其塗ハ淺油綠色ナリ且ツ微々涓滴シテ快利
 セズ患者昏眩シ又其他許多ノ諸症ヲ兼子且ツ諸部ヨ

リ漏汗メ休マズ殊ニ頭面ニ甚シ此漏汗多クハ垂死ノ
 際ニ臨ンテ夥シク漏泄崩解ス或ハ失血ヲ篋ス又黯紫
 黒斑ハ毎ニ此症ノ極登ニ見ハス_トアリ故ニ此等ノ症
 アル者ハ必ズ鬼籙ヲ免ル_ト能ハズ○黒色或ハ赭色
 ノ鵝口瘡ヲ篋スル者ハ毎ニ此症ノ終末ニ至テ篋ス必
 善徵ニ非ス○然レ_レ尋常ノ焔衝熱ノ終末ニ至テ鵝口
 瘡ヲ生シ痒ヲ篋シ或ハ遂ニ進ンテ肩頸腕臂ニ甚大ノ
 腫疱ヲ篋シテ癢ヲ為シ殊ニ鼻唇ニ多キ者ハ良トス
 ○熱病兼脇痛ノ諸症ハ予既ニ各處ニ説與ス今又特ニ
 考究スルニ其中チ惡性ノ者アリ布略莫烏多ト名付ク

其疼痛スル處ヲ移サシムル者ナリ又彼此ニ遊走ノ定
 處無ク其痛劇シキ者ハ脇肺痛熱ト名ク又概シテ是レ
 ヲ惡症肺脇焮衝熱ト稱ス此症ハ大抵險惡ナル焮衝熱
 ノ類ナリ寒燥セル東北風ノ經久ニ吹ク時ニ多シ大抵
 此類ノ患者血液稠厚粘膠ニメ且ツ厚キ皮膜ヲ圍繞ス
 其皮色或ハ白ク或ハ淡黄色ナリ若シ其患者刺絡ヲ施
 ヲ其症減スル者ハ一度ニ百餘錢ヲ瀉スルヲ良トス○
 又惡性ノ肺脇焮衝熱ニ前説ト相反スル血質アリ前説
 ノ如ク覆被スル處ノ膜甚タ厚シト雖モ前證ニ異ナル
 一ハ一二度刺絡シテ後チ患者甚タ精力脱落シ脈強緊

胸中大イニ苦迫シ脇肋刺痛シ咳嗽甚シフシテ止マズ
 終末ニ稀淡不熟ノ液或ハ膿ノ如ク血ノ如キ痰唾ヲ吐
 出ス然レ凡病勢少シモ減スルヲ無キヲアリ又此レニ
 反ノ最初ニ夥シク痰唾ヲ快吐スル者ハ將愈ノ徵ナリ
 ○又兩症ヲ併發スルヲアリ此レハ腐敗疫斑熱大イニ
 流行シ訟門闔境是レヲ患ル時ニ在リ殊ニ船師或ハ軍
 卒ニ多シ其症先ツ腐敗疫斑熱ニ嬰リ後チ惡性肺脇焮
 衝熱ヲ兼ヌル者アリ又肺脇焮衝熱ニ嬰リ後チ腐敗疫斑
 熱ニ感ヌル者アリ是レハ傳染ノ酷厲毒血中ニ襲入シ
 酷厲鹽ト為リ血液ヲ焔崩ス此ノ如キ惡性肺脇焮衝熱

ハ血液酷厲ナル質ニアリ

○上件ノ症ノ熱病ハ血液粘稠ニメ激衝熱ヲ兼ル者アリ又酷厲ノ至極ヲ雜ル者アリ或ハ中毒ニ因テ血液ノ腐敗渙崩スルカ如キ症ヲ兼ル者アリ

○又一症アリ諸液最モ酷厲ニメ且ツ脈管ノ質甚夕軟弱血球運行ノ勢力弛緩衰頹ナル者アリ此人必ス腐敗疫斑熱ヲ發ス又好ンテ失血ヲ兼ヌルノ常症ナリ

○今此ニ熱病中最モ險惡ナル症ノ治驗一二ヲ擧ケテ其治方ヲ教示ス唯コノ症ノミナラズ猶自餘其理同シキ險惡ノ諸症ハ差等異同アリト雖モ是レニ因テ治法

ヲ求ノハ其要領ヲ得ルヲ思ヒ半ニ過クベシ

○高名ノ瘍醫アリ其人體質薄瘦ニメ稍脆弱ナリ然レ

凡居常能ク動作營為シテ止マズ然ルニ毎ニ熱病ヲ患

ヘ寒氣ニ感メ敗血病性ノ聖就^シ健^クヲ患フ後^ニ千七百四

十一年^{本邦寛保元年}ノ十月遷延神經熱ノ類ヲ患ヒ少シク

支節拘強シ頭大イニ焮熱シ脈急數ニメカナク飲食進

マズ胸中大イニ壓迫シ呼吸不利ス然レ凡業ヲ怠ル

ナク騎馬メ近隣ニ往來ス四五日間ニメ俄ニ疲倦勞敝

ヲ覺ノ予偶某處ニシテ此人ニ逢ヘリ時既ニ呼吸惡臭

アリ予預メ能ク保護スヘキヲ懇諭ス後予二日ヲ經

テ急ニ昏眩ヲ發シ椅子ヨリ暈倒セリ時亦猶某家ニ在
 リ衆驚テ扶起スルニ已ニ腕臂及ヒ頸肩ニ顆多ノ斑ヲ
 發ス其色紫黑或ハ濃紫色人皆擁護シテ其居ニ歸ラシ
 ム行程四里許途中連リニ昏眩ヲ發シ病勢速ニ兇惡ニ
 變シ大イニ疲倦衰弱シ且ツ疼痛シ又胸中甚夕壓迫シ
 呻吟痛楚シテ休マズ氣息惡臭有テ近クベカラス齒齦
 ヲ汚汁血ヲ交ル者ヲ流メ休マズ又全身四肢ニ數千
 ノ紫斑等ヲ發ス此人自ラ腕ヨリ成德案スルニ腕ヨリ
 刺絡ストハ肘中横紋
 ナリヲ云フ刺絡シ九十六錢ノ血ヲ瀉ス然レ厄少シモ愈ル
 一ナク胸中轉壓迫シ呻吟昏眩煩燥愈増劇シ又兩鼻孔

ヨリ烈シク衄血ヲ發シテ止マズ初時ノ刺絡ヨリ十二
 時本邦ノ六ヲ經テ復八十錢ノ血ヲ瀉ス然レ厄猶愈ル
 一ナク却テ疲敝衰憊シ煩燥苦迫不寐曾迫スル一前ノ
 如ク晝夜少シモ睡ル一ナシ且ツ齧鼻ノ失血ノミナラ
 ス咳ノ且ツ唾血ス或ハ衄血少シク止ントスレハ齧血
 甚夕多フノ休ム一ナシ又眼ノ羅紋膜ヨリモ徐々ニ失
 血ス及ヒ舌上唇裡且ツ胃間ニ紫色ノ潰瘍ヲ發シ血ヲ
 交ヘタル稀液ヲ夥シク漏泄ス諸失血少シク減スレバ
 又血痢ヲ發シテ烈シク重墜怒責シ強ク昏眩ヲ發シ須
 臾モ睡ル一ナシ且ツ壯熱ヲ發シ其脈急疾ニ變シ六七

至ニノ間歇ス肌肉調動シ手足振惕慄慄トノ諸部ノ健
 成徳云腿ハ筋ノ首尾ニアル處ノ骨ニ連リテ起ル處ヲ筋
 云フ凡ソ骨ニ連リテ終ル處ヲ筋尾トス手足ノ筋ニ就テ
 首トシ骨ニ連リテ終ル處ヲ筋尾トス手足ノ筋ニ就テ
 云ハハ骨及ヒ脛骨ノ上端ニ連ル處ヲ筋首トシ指骨
 二連テ屈伸セシムル者ヲ筋尾トス是レ即チ腿十リ然
 凡其首尾トモニ或ハ一條或ハ二條或ハ三條トナル
 者アリ其質ハ神經ノ纖維ヲ以テ成ル故ニ白色ニノ知
 覺モ銳敏ナリ此物ノ首尾ニ在リト雖モ筋ノ狀一
 様ナラサルカ故ニ其狀モ亦各異ナリ其腿唯首尾トモ
 二筋ノ外田ニ展被スルアリ是レ單腿ト云フ又筋尾
 二入リ其端ニ織綴ニ循ヒ一條長クシテ筋ノ裏面ノ中央
 二在テ岐シテ二條トナリ二端ニ小ニシテ又合接スル
 者アリ此ニ條ノ筋ヲ復筋ト云フ故ニ腿ハ筋ノ首尾表
 田或ハ其裏面ニ在テ筋ノ纖維ヲ統括持シ筋ノ纖維
 八皆腿ニ輻輳ニ結ス是レ其大略ナリ筋ノ纖維
 體諸書ニ見ヘタリ今此條慄毒ヲ受ルト者ハ神經多
 知覺尤モ敏ナル故ニ微毒ヲ受ルト者ハ神經多

スルナリ是レ精密ニ其原由ノ機ヲ論スル者ナリ掣癢
 粗説スレバ振々トノ動搖シ筋惕スル等ノナリ掣癢
 シテ休マズ總テ諸部ノ失血スル一處休止スレバ又
 速ニ一處ヨリ迸出シ或ハ尿血ヲ糞シ利スル毎ニ眩暈
 シ尿中黯黒色ノ物アル等ナリ刺絡ニ回ノ後ニ至テ予
 ヲ招ク速ニ行テ診スルニ諸症既ニ記載スルカ如シ猶
 煩躁苦悶名狀スベカラス然レ凡全ク譫語ヲ發セス唯
 數日間晝夜嘗テ眠ル一無シ舌甚夕黒色氣息惡臭有テ
 近クベカラス遠ク隔ツト雖モ耐フベカラス大便モ亦
 腐臭アツテ人ヲ襲フ是レニ觸ルレバ嘔噦スベク故ニ
 利スル毎ニ自ラ其氣ヲ嗅テ昏暈スルニ至ル初時刺絡
 天百九十九命 天

スル處ノ血ハ時ヲ經ルト雖凡血ト鹹渣ト分利セズ且
 ツ半ハ凝結シ上面青紫色ナリ少シク觸撼スレバ焯解
 渙崩シ易シ又速ニ膿血トナル其血ヲ受ル器底ニ煤ノ
 如キ粉ヲ溜フ然レ凡猶失血止マズ殊ニ舌上齒齦ヨリ
 漏泄シ又鼻孔ヨリ稀淡ノ血水ヲ流シテ休マズ身體極
 ノテ衰弱シ又臆慄惕ノ休マス動モスレハ昏眩ヲ叢ス
 用フル處ノ藥ヲ問ヘハ亞禮機支巴兒麻加熱性強心劑
 揮散ノ強心劑莖苑膏等ナリ衰弱疲脱昏眩胃中苦悶憊
 動等ヲ標的トシ用フト見ユ然レ凡是ノ如キ劑ハ大イ
 ニ錯誤ニ屬ス成德案スルニ亞禮機支巴兒麻加ハ其方
意漢醫ノ附子劑ニ似タリ然レ凡甚緩ニ

ノ毒ナシ是レヲタニ西醫ハ猶害アリトス但神經熱水
 昌痘等ニハ此劑ヲ用フルヲアリ其用法ハ本篇ニ就テ
 見ルベシ此症ト神經熱トハ其候相似テ其因大イニ異
 ナルトハハ此書ニ論スルヲ見テ知ルベシ西洋人スラ傷
 醫ノ徒ハ此症ノ血液焯崩ヨリノ誤スレバ漢醫ヲ學ブ
 亞禮機支巴兒麻加ヲ誤リ用フルアバ漢醫ヲ學ブ
 者此症ニ附子ヲ用ヒ比々人ヲ斃スハ猶初メハ是非ヲ
 ムベキハ西洋醫ヲ學ブ者此症ニ遇ヘバ始メハ是非ヲ
 言テ主方漢法ニ異ナルヲアレ氏其危ニ臨ンテハ忽亦
 舊習ヲ出シ附子ニ依托シテ性命ヲ保護センテハ糞ヲ
 何ソ居常ニ漢醫ヲ排シテ其究リ却テ其道ニ倣フヤ予
 ヨリノ是レヲ見レバ腐儒ノ常ニ俳ヲ排シテ死ニ臨ン
 テ俳名ヲ唱フルカ如シ余和蘭ノ醫術ヲ學ビ其理既ニ
 融解シテヨリ以テ來絶テ附子ヲ用フル無シ然ルニ其
 功ヲ取ルテハ却テ他日ニ倍スルヲ奏スルノ附子ノ甚毒
 有テ血液ヲ凝溢スルト或ハ一時功ヲ奏スルノ附子ノ
 雖モ後來害ヲ遺シテ救治スベカラホルトノ詳説ハ此
 劑ヲ用フレバ酷厲液ノ刺動攻衝ヲ増盛シ壯熱ヲ叢シ

長百九十九命

有見

血ノ和合充維ノ機ヲ毀損シ焯解淡崩シテ腐敗凝瘀ノ
 血ヲ釀シ死期ヲ促スルヨリ他ナケレバナリ予乃チ是
 ニ投スルニ機那機那ヲ以テス此物能ク諸物ノ腐敗ニ
 進ムヲ防制伏禦スル大効アリ予毎ニ惡性疫斑熱ニ用
 ヒテ屢良驗ヲ得タル處ナリ微微ニ是レヲ與ヘ且ツ少
 シク石膽渥ニ附録ニ 大黃ヲ加ヘ數度飲服セシム○又
 別ニ玫瑰灌ニ肉桂露ニ方共ニ附ヲ加ヘ酸收味ト為
 シ用フ或ハ回青橙皮製昨利設ノ 玫瑰花肉桂ニ少シク
 百藥煎ヲ加ヘ間ニ乘ジテ之レヲ與フ○又赤蒲桃酒或
 ハ波兒杜瓦兒赤蒲桃酒成德云クニ酒ノ造ニ水各半ヲ

加ヘ患者ノ嗜好ニ應シ與フ○後チ機那機那ノ量ヲ增
 シ少シク竜蘓太蜜糕子附録ニヲ加ヘ用ヒテ血痢ヲ減
 ス○又間少許ノ大黃ヲ與ヘ是レニ因テ内藏留滯ノ血
 ノ如ク膽液ノ如ク膿汁ノ如キ敗液ヲ導泄ス○又時時
 或ハ粳米或ハ蒸餅水或ハ沙孤米又ハ鹿角膏等ノ強壯
 ニスル食物ニ酸收ノ物品ヲ和シ與ヘ或ハ炒蒸餅ニ赤
 蒲桃酒波兒杜瓦兒赤蒲桃酒ヲ加ヘ用フ○又芳香收瀋
 ノ藥劑ヲ赤蒲桃酒ヲ以テ煮テ蒸湯劑ト為シ頻々ニ下
 腹ヲ熨蒸ス香竈蒸湯劑ハ
 附録ニ載ス
 ○上件ノ方法連綿トシテ用フルニ自ラ神効ヲ得ル

アリテ腐敗ノ勢增長セス漸々ニ故ニ復メ熱亦全ク消
 解ス然レ凡患者甚タ疲倦衰憊シ動モスレバ鼻衄ヲ糞
 シ又齒齦ハ少シク觸ル、ト雖モ失血シ易ク氣息猶經
 久ニ汚穢惡臭アリ因テ機^キ那^ナ灌加石膽^ニ渥^ニ附^録等ヲ久服
 セシメ諸症遂ニ全愈セリ猶足脚ノ腫起久シク退カス
 全身ノ肌肉軟弱ニ^ハ撫^ス觸^スレバ痛甚フメ耐ヘ忍ヒガ
 タシ○因テ又微々ニ大黃ヲ用ヒテ下利ヲ取リ且ツ輕
 キ健胃ノ剛^録錢劑^ニ附^録ニ石膽^ニ渥^ニ附^録泉^ニ同^ニ和^シ且
 對症ノ利尿劑^上同^ニヲ加ヘ用ヒ又身體相應ノ運動ヲ為サ
 シム此ノ如クスル^ト二三月遂ニ諸症全愈ヲ得タリ

○千七百四十五年^二本邦^ニ延享^ニ夏秋ノ間疫斑熱兼失血ノ
 症大イニ流行ス一處女此患ニ嬰ル諸症大抵前説ノ患
 者ト同シ然レ凡前説ノ如ク最極ノ者ニ非ス其婦定期
 ニ非スノ子宮ヨリ大イニ崩血シ後チ劇シク衄血シ又
 齒齦ヨリ失血シ且ツ謔語シ遂ニ血痢ヲ糞ス又全身ニ
 多ク黯紫斑ヲ糞ス大廿錢ノ如シ予又前説ノ法方ヲ用
 ヒテ全愈ヲ得タリ後チ足猶大イニ腫脹シ日ヲ經テ疲
 勞衰憊ス此患者最初ニ在テ刺絡スル^ト二回ナリ初時
 ノ血ハ予見ル^トヲ缺ク傍人記スル^トアリ云ク色鮮紅
 ニメ多ク出テス然レ凡甚タ軟脆ニメ微シク帶赤色ノ

鹹渣アリキト第二回ノ刺絡ハ予自ラ是ヲ行フ色黯黒
且ツ帶綠色ノ薄皮ヲ被フ小便其色終始白蒲桃酒或ハ
菓醬ノ如シ久シク風處ニ晒セバ黑色ニ變ス其塗ハ黯
黑色ニノ粉ノ如シ

○熱病兼寒燦疽前ニ注スノ類ハ血質腐敗烊解渙崩スル者
ナリ其腐敗スル處ノ膿ノ如キ敗血全身ノ血中ニ泛濫
シ又次テ諸液中ニ其毒ヲ滋生シ平全ノ血球ヲ烊解腐
敗ス因テ發斑失血黒苔謔語妄言等ヲ發ス設兒修私曰
熾盛熱ニ謔語大渴氣息惡臭有ル證ハ寒燦疽前ニ注スヲ兼
スル者ニノ血液腐敗シ最モ酷厲ノ極ニ至ル徵ナリ此

症ノ患者ハ血液運行ノ定度ヲ失スルヲ殊ニ甚シトス

○一處女二十五歳稟賦虛弱體質惡性嘗テ月經順利七
年本邦寬保ノ五月下旬ニ右足ノ大指

ニ近キ處ニ痛ヲ發シ全足頑痺ス漸々ニ增長ノ全夕運

動ヲ廢ス題謁兒名ニ治ヲ請フ題謁兒其婦ヲノ瘍科魯

胡ノ處ニ至ラシム魯胡患處ニ火酒加樟腦ヲ塗リ強神

經劑又強心劑ヲ用フ然レ氏敢テ寸効ナシ又芳香竄透

ノ煎ヲ以テ其患部ヲ溫蒸シ且ツ烈精氣ノ液汁又ハ的

里亞加等ヲ加ヘテ足ニ布貼ス患處俄ニ色變シ足脚寒

冷ニシテ全ク知覺ヲ失フ因テ予ヲ召テ診ヒシム予鉞

泰西熱病論 卷二 廣慶堂

鍼ヲ以テ深ク患處ヲ刺スニ絶テ血意ヲ見ス繞ニ黑血
 一二滴ヲ流ノ豆粒ノ如シ後チ一二日ヲ經テ午前ニ至
 テ皮肉ヲ切り其骨ヲ鋸切ス爾後皮表ニ疱ヲ叢スル
 ナク又少シモ惡臭ナク膿血出ルヲナシ予即機那灌ニ
 石膽渥附録ニ扶羸糕子同上ヲ加ヘテ酸味ノ清涼飲ト為
 シ多ク温服セシム是レ患者甚タ昏眩衰弱スルカ故ナ
 リ然テ午後ニ至テ右股鼠鼯劇痛ヲ叢シ忽チ叢熱シ内
 臟強ク牽掣絞痛シ血ノ如キ物ヲ瀉下シ大イニ疲脱シ
 連リニ昏眩ヲ叢シ煩悶シテ殆ト死セントス其翌夜大
 イニ譫語ヲ叢シ舌全ク黑色言語分明ナラズ脈尤モ急

數軟弱又健前ニ牽掣憫動ノ休マス予案スルニ用フル
 處ノ機那機那ノ胃中及ヒ内藏ニ在テ化セズ善良ノ營
 為ヲ為スル能ハズ因テ瀉下スル者ナリ故ニ機那灌附録
 出ニ強烈ナルヲ製シテ龍蕪糕子附録ニ石膽渥同上等ヲ
 加ヘ用ヒテ大イニ良効ヲ得タリ此ノ如キ慘酷ナル病
 症ハ三四日間モ止マサレバ唯死ヲ頃刻ニ俟ツノミナ
 リ然レヲ此婦幸ニ寒燂疽前ニ増長セズ故ニ全股劇痛
 アリ殊ニ其毒骨膜ニ着ト雖モ未夕膝上ニ上ラズ終末
 ニ至テ膝關ノ周圍及ヒ膝下ニ遍ク黯紫色ノ條ヲ叢シ
 自ラ死肌ト生肉トノ分界ヲ現シ其厓限遂日ニ明ナリ

因テ瘍醫生肌ノ膏ヲ用ヒテ是レヲ扶ク爾後漸々ニ生
肉ノ端邊ヨリ死肌ノ部分ハ逐日ニ腐レ去リ遂ニ七月
十四日ニ至ル頃ニ膝下ノ死骨ヲ關節ヨリ切斷ス其術
ヲ施スニ患人痛ヲ覺エズ爾後殊ニ愈ルニ近ク日ニ良
食ヲ撰用シ且ツ對症ノ藥劑ヲ用ヒテ不日ニシテ全愈
セリ

泰西熱病論卷二

