

泰西熱病論

四

特別
19
1187
4



79
1187
4



泰西熱病論卷四

泰西 玉函夫古撒謨 著

加賀醫官 吉田成德直心 譯

笹山侍醫 足立世茂松父

門人 沼津侍醫 程田國道玄悅 校

長府侍醫 松岡士藏道遠

惡性腐敗熱篇第八 成德案云此陰下利ト云七或ハ陰陽疑似ノ症ト云

ト或ハ類皆此内ニ屬ス

惡性腐敗熱一名疫斑熱又疫熱又腐敗疫斑熱ト名付

泰西熱病論卷四

蘭醫堂藏

99-1319

今其鑒察治療ノ法ヲ教示ス

○惡性腐敗熱ヲ患フル人ハ其血液從來酷厲ニ變敗スル者一時適天行ノ厲氣ニ感シ因テ内外ノ毒搏擊衝動ノ發ス其衝動ノ狀ハ即チ壯熱ヲ發ノ劇烈ナリ

○疫斑熱ハ總テ天行厲氣ニ感シテ發ス故ニ其病源ハ傳染ナリ是以テ稟受ノ各異ヲ擇ハズ一般ニ此患ニ嬰ル其毒體中ニ觸害スル時ハ血液酷厲ニ變スル者ト一般ナリ其症異同百般アル者ハ其人或ハ體質強實血液優多稠厚或ハ體質軟弱血液淡薄匱乏且ツ血球敗壞烱崩ノ流利ノ健勢弛緩澁滯スル者トナリ此兩異ニ因テ其始

末ノ諸症甚ク懸隔ス然レモ其發見スル所爲ハ皆酷厲液ノ狀態ニ同シ

○凡ソ腐敗熱ハ神經熱ニ比スレバ其症極メテ劇烈ニシ然レモ初發ハ猶寒熱往來シ後チ速ニ増進ス其脈ハ強實弦緊ナリ然レモ十二七八ハ急數ニ小ナリ或ハ時時遲緩或ハ一少時ハ分明ニ整整トノ應ズト雖モ動モスレバ又急數ニ齊一ナラス○初症ハ頭痛頭暈惡心嘔逆最モ甚シク或ハ兩額劇痛シ或ハ顛睛眉骨ノ兩邊眼底等或ハ左右劇痛シ或ハ一邊劇疼ノ暫クモ休ム

ナク其痛滯著ノ曾テ轉移スル一無シ眼目極メテ怒
 脹ノ重ク其色淡黄ニノ多クハ少シク焮熱ヲ覺フ又面
 部多クハ腫ル、ガ如ク色澤甚惡ニノ屍色ノ如シ總テ
 顛瞞ノ動脈劇シク鼓動シ耳騷鳴ノ甚ク困難ナルヲ覺
 フ又頸動脈成德云即チ漢醫所謂人迎ナリ劇シク鼓動ス假令腕ノ動
 脈成德云即チ漢醫所謂三部ナリ小遲ナル一有ト雖モ熱ノ増進スル
 ニ當テハ必ス頸動脈ノ鼓動ハ劇甚ナリ是レ謔妄ヲ發
 スル前兆ニノ腦中大イニ壅塞スル顯徴トス

○非常ノ脱泄等モ無ク脈未ダ虚候ヲ見ハサ、ルニ怪
 シムヘキガ如ク精神頓ニ沉垂シ且ツ呼吸不利ニ或ハ

大息スル一甚シク其狀吃スルカ如ク缺躓シ又氣息熱
 ノ惡臭アリ

○又此症ハ必ス腰脊疼痛ヲ兼ヌ又無キ者モアリ又常
 ニ強ク懈惰勞倦シ且ツ多クハ支節疼痛ス或ハ心下胃
 口ノ部位甚ク煩熱シ且ツ重悶ヲ覺エ或ハ痛アル者ア
 リ或ハ綠色黑色ノ膽液ヲ嘔吐シテ休マス或ハ吃逆ヲ
 發シテ甚ク困迫ス其吐ク所ノ敗液ハ甚ク惡臭有テ嘔
 噦スベシ

○舌ハ始ハ白色ナリト雖モ漸漸ニ黯黑色ニ進ミ且ツ
 乾燥シ或ハ黯紫色ニ變シ舌頭ニ黯黑疱ヲ發ス或ハ純

黒ニ變シテ數日退カス幸ニ自然ノ妙機ニ因テ病毒ノ
排出等有ト雖モ此苦ノ如キハ數日間退クナシ若シ
病勢重篤ノ極ニ至レバ甚ク乾燥強硬黒色ニ變ス或ハ
微黒黧敗ノ橙皮狀ノ如シ此時ニ當テ言語甚ク蹇澁ノ
分明ナラス

○渴ハ熱ノ登進スル其間ハ勢ヒ甚シフメ撲滅スベカ
ラス又諸飲ヲ好マザル者アリ是レハ諸味皆苦ク甚惡
ニメ嘔噦スヘキカ如クナル故ナリ此ノ如キ者ハ其苦
厚フメ甚シク乾燥スト雖モ渴ヲ苦ムナシ此症ハ每
ニ危懼スヘキ候ニメ或ハ精神錯亂或ハ昏睡病ニ歸ス

ル者多シ又病ノ最極ニ至テハ唇及ヒ齒牙ニ甚ク粘膠
ナル白色ノ汚液ヲ布被ス

○小便最初ハ多クハ不熟膠淡トノ利スルニ勢無シ成徳云尿

ノ熟不熟ハ神經熱篇ニ註ス併セ見ルベシ熱勢増進スル間ハ色濃厚ニ變シ

其狀強烈ノ灰汁ノ如ク或ハ佛手柑色ノ如ク且ツ微シ

ク血色アリ然レテ絶テ尿塗ノ沉着尿雲ノ浮遊ナシ成徳

云尿塗ハ尿管底ニ沉着ノ粉ノ如キモノナリ尿雲ハ或ハ尿ノ上面ニ浮ヒ或ハ尿中ニ混雜メ雲ノ如クニ見フ
ル者ナリ其善惡可否ハ予力詳ニ或ハ微微トメ見フル者

アリ斯ノ如ク數日稽留シ漸漸ニ暗黒色ニ變シ恰モ醇
厚ニメ膠厚ナル麥酒ノ如ク且ツ斂穢ノ臭氣アルナリ

又疫斑熱ヲ患ヘテ小便殆ト黑色甚タ惡臭アルヲ歴見セリ予嘗テ一病者ノ小便黑色並モ亦黑色ニノ煤ノ如ク全身ニ夥多ノ黑斑ヲ發シ其狀ハ筭痕ノ如ク又尿血赤痢ヲ發シ昏睡病ノ如ニメ醒メズ後チ變シテ精神錯亂ヲ發シ十三日ニメ死スルヲ見ル

○大便ハ熱ノ最極ノ時或ハ退ク時ニ當テ多ク通利シ惡臭有テ耐忍スベカラズ或ハ綠色或ハ暗紫色或ハ黑色ナリ動モスレバ切痛窘迫シ或ハ血ヲ交フルアリ若シ大便黃色又栗殼色ニ變ズルハ隨テ危篤ヲ減スルナリ又大便大イニ通泄シ其色異狀ナク覺エズ自利スル

トアリ亦善徵ナリ然レモ大便大イニ通ノ後チ腹ノ膨脹堅滿從テ減セザル者ハ甚タ惡候ト爲ス其故ハ是レ

ヨリノ多ク内藏激衝熱或ハ寒燥疽或ハ熱燥疽

成徳云二症共

二第ニ卷ニ註ス併セ見ルベシノ類ヲ繼發スレバナリ又緩和ノ下利

ハ甚タ善候ナリ是レ自然良知能ノ指揮ニ因テ道路ヲ開通シ病毒ヲ泄除排擯スル徵ナレバナリ

○黑色或ハ黯赭色或ハ暗紫色或ハ微綠色等ノ斑ヲ發スル者ハ是レ必ス惡徵ナリ然レモ其色鮮明ナル者ハ危カラズ假令黑斑紫斑ヲ發スルモ色鮮明ナル者ハ良徵ト爲ス又黑色紫色ノ大斑ハ多クハ強キ失血ヲ兼ヌ

又黯赭色ノ小斑ヲ發シ恰モ疝^ハ沸瘡ノ如キ者ハ暗紫
 及黒斑ヨリハ尤モ危カラズ又失血ヲ兼ヌル^ハモ稀レ
 ナリ又強ク冷粘汗ヲ兼發スレバ其斑ハ消散スト雖モ
 必ス患者ニ利アラズ凡ソ斑ヲ發スル^ハ定マレル期ナ
 シ或ハ四五日或ハ十一日前後ニ發ス又筈痕斑紫斑暗
 綠色ノ大斑ハ稀レニ死期ニ近^クノ發スル^ハ有リ又惡
 性腐敗熱ニ小疹ヲ發ノ麻疹ノ如キ者アリ其色鮮明ナ
 ラズノ暗枯ナリ殊ニ胸部ノ表被ハ畫彩スルカ如ク炎
 焮ノ斑點ヲ作ルカ如キハ大抵惡徵ニノ是レヨリ多ク
 ハ惡症ヲ繼發スルナリ

○又或ハ十一日或ハ十四日比ニ至テ強ク發汗スル時
 ハ發斑消散シ却テ白粟疱ヲ發スル^ハアリ善徵ニ非ス
 利有ル^ハ稀ナリ然レ^ハ其疱或ハ痒ク或ハ痛有テ赤色
 ナル者ハ將愈ノ兆ナリ又胸背間ニ水疱ヲ發シ大ニノ
 侵淫スルモ亦良兆ト爲ス又鼻唇ニ疥癬ノ如キ疹疱ヲ
 發スル者ハ必ス善候ナリ其瘡焮赤沸熱スル者ハ愈良
 徵ナリ○又驚口瘡成德案スルニ驚口瘡ハ世人唯小兒
 入ニ發スレバ凡テ苦トノ稱ノ大人ニ稱スル^ハ無シ大
 顧念スル^ハ無シ然レ^ハ驚口瘡ハ熱病ニ最モ多ク且ツ
 大人小兒ニ拘ラズ共狀ハ白苔ノ極ノテ厚キ者ナリ其
 始メ舌上及ヒ上下脰或ハ口吻等ニ微シク白點ヲ生シ
 漸ク蔓延シテ遍覆ス一二日ヲ經テ舌ノ中心或ハ端邊
 或ハ端傍等俄ニ剝落シテ其狀缺然トノ墻垣ノ泊^ル蟻^ノヲ

表西藥病論 卷四

廣慶堂

爪割スルガ如シ其割痕ハ滑赤色ナリ其處ヨリ鏡ニ見
 レバ若ノ厚サ一分許ニ及フ者アリ是レ即チ驚口瘡ナ
 リ世ハ此瘡有テ總テ虚候不治ノ症トセザルナリ設
 テ治術ヲ施スヨ以テ不治ノ症トセザルナリ設
 云驚口瘡ハ特リ小兒ノミナラス又能ク大人ニ發ス
 斐辨云驚口瘡ハ熾盛熱赤痢脇痛等ニ傍發スルアリ
 古或ハ上脘ニ發ス或ハ白色或ハ帶黄色或ハ粟殼色或
 ハ黑色或ハ塗抹スルカ如キ者アリ又甚シキ者ハ胃管
 者アリ此瘡口程ノミ患フル者アリ又甚シキ者ハ胃管
 ヲリ胃中ニ侵注スト敬以私兒云惡性腐敗熱ニ驚口
 瘡ヲ發スルハ危篤ノ徵ナリ含漱劑ヲ以テ漱滌スベシ
 其方ハ琥珀酸或ハ沒藥酸或ハ地榆根酸ヲ車前葉露或
 ハ苦薏露ニ和シ玫瑰蜜或ハ桑椹汁或ハ其他何ニテモ
 酸味ノ藥精ヲ加入シテ用フ又野麩或ハ石長生ヲ沸湯
 二浸シ蒲桃酒玫瑰蜜等ヲ加ハシ或ハ石膽ヲ發ノ其色黯
 精數滴ヲ和シ酸味ト成シ漱滌スヘシト
 赭ナル者ハ危險トス其瘡白色稠密ヲ成シ白堊ヲ重覆
 スルカ如キ者ハ愈危症ナリ然ル時ハ頓ニ飲漿ヲ送下

シ難ク其瘡漸ク咽喉胃管
 瘡ヲ生シ吃逆ヲ發メ休マス終ニ其毒腸胃ニ連及シ膿
 血痢ヲ發シ尋テ内景ノ寒燥疽第二卷註スト爲ル此時ニ至
 テ其瀉下スル所ノ物ハ黑色ニノ腐敗斂鱗シ膿ノ如ク
 血ノ如ク大イニ惡臭有リ
 ○又此症ノ終末ニ至テ動モスレバ斑ヲ發ノ大ナル
 管痕狀ノ如ク青黑色ナルヲ恰モ打撲傷ノ如ニメ四肢
 紫色ニ變シ微冷スル者ハ殆ト死ニ近キ候ナリ又黒斑
 腕ヨリ臂ニ連リテ餘地無ク手冷テ死肌ノ如キ者ハ是
 レ臨死前一二日ノ候ナリ今徵識スベキ一案アリ左ニ

成徳云即チ
 食道ナリ
 等ニ及フ或ハ膿

長百熱病論 卷四
 蘭齋堂藏

記ス

○往年一貴婦熱病ヲ患ヘ七日ニメ予ヲ招ク予往テ診
 スルニ精神錯亂呻吟煩悶須臾モ席ヲ安スルヲ能ハス
 劇痛有ルカ如シ又心胸ノ苦悶壓迫殊ニ甚シク脈極メ
 テ數小且ツ變動ノ齊一ナラス呼吸短息不利ノ缺躓ス
 始メヨリ晝夜少シモ眠ルヲ無ク肌ニ觸テ痛痒ヲ知ラ
 ス壯熱無シト雖モ煩渴引飲ノ耐忍スベカラス舌上ハ
 甚ク乾燥セス却テ潤滑ニシテ黑色ヲ帶ヒ咽喉腫痛メ飲
 漿ヲ嚥下スルヲ尤モ難ナリ眼目直視シ且ツ赤スハ
 日ニ至テ強ク發汗シ舌モ亦純黑帶紫色ニ變シ最モ乾

燥セリ其夜適經水夥シク通泄ス

其婦產後ニメ未夕經水通スル時ニ非ス

汗愈漏泄ノ甚ク惡臭アリ九日ニ至テ全身諸部ニ筍痕
 ノ如キ大斑ヲ發ス殊ニ鼻尖鼻上邊ニ甚シク其色純黑
 ナリ兩頰ニ大斑五十八ヲ發ス十日ニ至テ經水止ミ烈
 シク下利ヲ發シ腹肚脹滿スルヲ尤モ甚シク爪甲手腕甚
 タ黑色ニシテ冷ナルヲ氷ノ如ク大小便自利シ十一日ニ
 至テ全ク知覺ヲ失ヒ終ニ死ス此患婦勉メテ其身ヲ潔
 淨スト雖モ死ニ至ル前一日實ニ耐忍スベカラザル惡
 臭ヲ發シ遠ク其四圍ニ滿テリ

○案スルニ惡性ノ名ヲ此症ニ冠セシムル者ハ世間不

學無術ノ醫常ニ此症ヲ誤治スルヲ多シ因テ其過ヲ病
 ニ負ハセ已レカ過ヲ隱サンカ為ニ名ヲ惡性ニ寄セテ
 不治ヲ分トシ又人ヲメ預シメ治シ難キ熱病タルヲ
 知ラシメンカ為メナリ又熱病兼喉衝熱兼脇喉衝熱及
 ヒ其他ノ熱病ト分タンカ為メナリ然ラバ此名茫洋ト
 メ妄ニ命スル者ニ非サルニ似タリ又案スルニ此症ヲ
 腐敗熱惡性腐敗熱疫斑熱疫熱ト稱スルハ皆他ノ熱病
 ト分チ其本源天行正病ノ傳染ニ出ルヲ知ラシメンカ
 為メナリ其名ノ允當ナルヲ以テ古今ノ立論設辨スル
 者モ未タ曾テ改メサルナリ

○予嘗テ際田法謨ハ人カ論說ヲ尊奉スト雖モ其方論又
 適從シ難キヲアリ其故ハ彼人諸熱病疫疾共ニ皆概ノ
 兼喉衝熱ノ治術ニ從フ是レ取ルベカラス唯血液烙熱
 メ燒クカ如ク且ツ粘稠ナルヨリ發スル者ハ清解ノ劑
 其宜シキニ居ル痘瘡ノ如キモ此因症アル者ハ此人ノ
 論理方劑共ニ其妙ニ至レリ然レモ遷延神經熱ニ刺絡
 下劑淡麥酒等ノ清涼劑ヲ用フル是レ一ノ不可ナリ痘
 瘡發斑熱粟疹熱等ニ清解ノ劑ヲ與フ是レ二ノ不可ナ
 リ故ニ此症ニ至テハ方論共ニ際田法謨ニ從ヒ難シ因
 テ近世諸名家ノ說ト予カ親シク辨識驗試セル所トナ

以テ治術ノ法則ヲ定ム但嫩衝熱ノ類ニ清涼劑及ヒ清
解ノ調攝法ヲ用フル等ノ方論ハ特ニ此人ノ卓見ニノ
庸醫ノ及フ所ニ非ス實ニ其法ニ從フベシ○故ニ凡ソ
治術ヲ施ス者ハ慎マスハアルベカラス謾リニ清涼劑
ヲ偏用スレバ人ヲノ元運ノ赫輝ヲ撲滅シ遂ニ起ツベ
カラザルニ至リ又熱劑ヲ誤投スレバ火中ニ死没セシ
ムルニ至ル是等皆救治ノ意アリト雖モ病毒ハ依然ト
ノ毫モ減スル一無ク却テ此大害ヲ招クニ至ル

○總テ熱病ハ自然良知能ノ營爲ヲ以テ其害傷ノ病毒
ヲ排擯斥出スル者ナリ故ニ自然良知能ノ嗜好スル所

ニ因リ其指揮ニ隨テ是ヲ救扶スルニ在リ○故ニ間日
熱ノ壯熱有ル者ハ諸液ヲ稀解シ粘稠液ヲ驅除ノ動脈
末梢ノ閉塞ヲ開通スルヲ要トス故ニ熱病ニ不時ニ刺
絡ヲ施シ下劑ヲ用フル時ハ其熱荏苒稽留ノ解セス遂
ニ發作ノ順序ヲ失フテ危篤ノ症ニ變スルナリ○又痘
毒血中ニ侵襲スル時ハ熱ヲ發ス然レモ其痘善ナル者
ハ痘發ノ熱速ニ退ク熱ハ自然良知能ノ營爲ニノ痘毒
ヲ排出斥除セントモ發ス然レモ諸般ノ脫泄過度ナル
カ或ハ元運靈液大イニ枯衰スルカ或ハ治療ノ方法ヲ
誤ル時ハ順正ニ痘毒ヲ排擯スルヲ能ハス其痘淡白ニ

ノ色澤ヲ失シ枯澁平塌シ膿ヲ釀シ成ス可能ハス終始
熟セザルニ至ル是レ亦疫斑熱ト其理一般ナリ

○惡性腐敗熱ニ刺絡ヲ用フル可禁ス然レ其熱勢ノ
最極ニ至ルヲ防制シ且ツ腦肺等及ヒ其他生理ニ最モ
貴要ナル部位成德案スルニ生理ニ最モ貴要ナル部位トハ心胃大小腸等ヲ云フニ焮衝
熱ヲ生セントスル時ハ已ム可得ス施ス可アリ總テ
刺絡ノ用ハ血液稠厚ニノ脈管中ニ盈滿充填スルト運
行急疾過度大壯熱ヲ發スルト可療スルニ最モ良ナレ
バナリ

○傳染病ニ刺絡スル可無キニ非ス然レ其特リ傳染毒

ノミニノ血液充填ノ患ナキ者ハ刺絡スル可勿レ其故
ハ傳染ノ毒ハ遍ク血中ニ混淆ス僅僅ノ瀉血ヲ以テ其
毒減スベキニ非ス其理ヲ明徵センニ今小兒ノ種痘ヲ
施スニ種ル所ノ毒至微ナリト雖モ忽チ血中ニ侵入シ
全身ニ彌滿シ各部直ニ痘ヲ發見ス成德案スルニ此種痘ノ血中ニ混淆スルノ理明明タリ痘瘡ノ一論ニテ疫毒ノ血中ニモ亦此論アリ併セ見ルベシ又蝮蛇咬傷風犬
咬毒ノ如キモ其毒毒纔ニ小創口ヨリ侵入シ速ニ全身ニ
彌滿シ諸液ヲ腐敗シ諸部ヲ破傷シ遂ニ脈管ヲ穿テ其
毒外表ニ發出ス皆其徵ヲ取ルニ足ルナリ○又血液ヲ
熱鬱弗蒸スル毒血中ニ侵入スル可アルモ多血ノ人ニ

非サレバ刺絡ニ因テ是レヲ減スルヲ勿レ其毒周身各部ノ血液及ヒ諸液ヲ侵襲シ至ラザル所無キヲ其所為殆ト傳染毒ト一般ナレバ少シク瀉血スト雖モ其毒毫モ減セスノ却テ毒勢ヲ増シ病長スルヲ見ル

○清涼兼酸收劑ノ功ハ血液沸鬱ノ熱勢過度因テ脈管ニ充漲滿溢シ強ク牽張スル者ヲ制止ス且ツ血液運行ノ順利ヲ賦與シ脈管ノ破綻ヲ防制ス故ニ多血ノ人ハ刺絡ノ血液ノ沸鬱脈管ノ破綻セントシ且ツ焮衝熱ヲ生スルヲ防止ス是レ刺絡ニ因テ壯熱甘解シ傳染毒ノ力大イニ減衰シ血液ノ粘膠漸ク融化シ石灰性ニ變ス

ルナシ成徳案スルニ禮墨藥云凡ノ石灰ヲ製スルニク壅塞スト雖モ裡面ハ許多ノ氣眼ヲ生シ盡ク火氣ヲ含蓄シテ絶テ水氣無シ是ヲ孕火室ト名付ク其火氣ハ最モ物ヲ侵蝕スル功アリ是以テ石灰ノ性ハ極熱ナル者ナリ又云試ニ石灰ヲ取テ水ニ投スレバ其水軟軟トノ沸煮ス是レ水氣直ニ孕火室ヲ侵ノ火氣ヲ揉屈セシトスルヲ火氣ハ水氣ヲ攪除セントノ抵抗擊搏ノ此沸涌ノ勢ヲ成シ水忽チ温湯ト爲ル數次ノ後チ火氣漸ク漏泄スルヲ多ケレバ沸煮ノ勢モ亦隨テ衰フルナリ今此ニ石灰性ニ變セシムルヲ焮衝熱ノ類ハ其熱スルヲ殆ト石灰セザルヲ云フ凡ノ焮衝熱ノ類ハ其熱スルヲ殆ト石灰ノ火氣ヲ含蓄ノ其火熱ヲ逞フス然レ氏漫ニ血液ノ沸騰ヲ止メントノ其劑殊ニ清涼ニ過キ或ハ其期ニ非スノ刺絡ヲ用ヒ抑制スル時ハ血液全ク脫衰粘結シ遂ニ病毒ヲ排出スル機力ヲ失シ又鹹渣様ノ良液ヲ生スル

ナシ ○若シ傳染病ニ刺絡等ヲ誤リ自然ノ精氣ヲ衰
憊セシムル時ハ病毒ヲ排出スル機力ヲ障碍シ其毒體
中ニ滯著ノ全身ノ血液腐敗シテ或ハ膿血ニ變シ或ハ
惡臭ノ液ニ變ス ○凡ソ刺絡ハ傳染病ノ炎症ヲ撲滅ス
ルニ足ラスト雖モ多血ノ者ハ又能ク炎炆ノ一邊ヲ減
スベシ

○痘瘡傳染病共ニ刺絡ヲ施シ刺後輕快ヲ覺フルヲ見
ス疫熱ノ如キモ常ニ刺絡スルヲ稀ナリ已ムヲ得ス
施ス時ハ少シク施スヲ良トス

○然レモ若シ血液優多ニノ脈管ニ充填シ將ニ破綻セ

ントスル者ハ大イニ刺絡ノ甚タ功アリ ○醫ノ能ク心
ヲ用ヒテ精詳ニ考察スベキ者ハ總テ惡性腐敗熱ノ最
初發熱一回ノ後ヲ患者精神沉垂スルヲ怪ムベキカ如
ク頃ニ疲衰スルヲ驚クベキカ如シト雖モ猶少シク刺
絡ノ可ナル者アリ殊ニ強實多血ノ者ハ最モ要タリ是
レニ因テ血液ノ運行過度急疾ヲ減シ脈管ノ急縮振蕩
成德業スルニ脈管急縮振蕩スレハ其脈
ハ弦緊數小ニノ絶ヘントスルノ狀アリヲ快暢シ
ルニ快暢スレハ其
脈ハ緩大トナル 且ツ預メ諸部ノ閉塞ヲ開達シ脈衝
ヲ制伏ス又病ヲ受ル初メ戰慄鼓頷壯熱更作スルヲ靜
止ス此候初メニ在テ甚シキ者ハ血中ノ鹽氣油氣漸次

二兇惡ニ變シ酷厲毒増盛シ血液腐敗ノ勢進登ノ大イ
 二病毒ノ勢ヲ助ク故ニ斯ノ如キ症ニ會ハ速ニ刺絡ヲ
 爲スヲ要トス○其人脈數疾ニシテ弦緊其熱盛烈呼吸大
 イニ促迫シ心悸動シ頭痛劇シク背脊疼痛等アル者ハ
 必ス刺絡スヘシ○此症患者速ニ疲倦勞憊シ精神太イ
 ニ沉垂シ兩手振搖シ小便黦淡不熟ニシテ其振寒壯熱ノ
 間ナル時ニ當テ胸中甚々壓迫スル者ハ刺絡ス但肺癆
 衝熱ヨリハ血ヲ瀉スルハ僅少ニスベシ世醫此理ヲ解
 セス謾然トシ多瀉スル者アリ錯誤ニ屬ス是レ其症時
 時咳嗽ヲ發シ胸中熱スルハ肺癆衝熱ニ似タルハ

ナリ慎ニテ比較精診シ誤ルハ勿レ然レハ肺癆衝熱ノ似
 症ヲ兼ルハ尋常ノハニ非ス偶然トシテ稀ニ有ルハナ
 リ又一時疫氣ノ性ニ因テ一般ニ斯ノ如キ症ヲ發スル
 ハアリ能ク考察スベシ○以上兩種ノ熱其刺ス所ノ血
 質ヲ鑑察審認スベシ惡性腐敗熱ノ血ハ其色黯赭ニシ
 刺ニ臨ンテ速ニ流利セス徐徐綿綿懸滯ノ絶ルハナク
 血質モ亦軟脆ナリ偶鮮明紅活ニシテ凝結スルカ如クナ
 レ凡其實ハ軟脆ニシテ分離涣散シ易シ總テ此血ハ瀉ス
 ルニ當テ盈潮セサルカ故ニ針口ノ血自テ凝冷ノ塊ヲ
 爲ス又強硬ノ白膜ヲ覆フハナシ肺癆衝熱ノ血ハ是レ

ニ返ス故ニ此考ノ此術ヲ施スヘシ慎ンテ謾然タルヲ勿レ

○強實健全ノ人ハ傳染病ノ初二刺絡スルヲ要タリト雖モ亦精審ニ意ヲ用ヒテ輕忽ニ施スベカラス其故ハ熱病ノ性凡ソ傳染ヨリ來ル者ハ其毒唯血中ニ傳染スルノミナラス專ラ元運靈液ニ侵入ス故ニ患者頃ニ昏冒ノ虚候ヲ發シ精神大ニ沉重スル等ノ候ヲ發ス是レ其徵ナリ或ハ疫ニ因テ卒倒スルヲ恰モ雷霆ニ擊殺モラル、カ如キ者アリ其人始メヨリ熱ナク又他ノ疾患無クノ然リ是以テ考究スルニ其理宛モ覺的兒私蘭

毒蛇ノ名ニ咬傷セラレ、者多クハ一瞬間ニ死スルト同

一般ナリ是レ其毒靈液ニ受透ミレ、モ烈シキ力故ナリ又強烈ナル香臭ノ氣ニ中ル者モ其氣ノ發動急烈ナルガ為メニ生活ノ運動ヲ頓ニ擾亂攪動シ忽チ搖擗抽掣ヲ發ス又案スルニ前件ノ疫毒人身ニ侵入スルハ今試ニ謁禮機的兒成德案スルニ本邦ノ俗モ亦謁禮機的兒ト稱ス今世人皆知ル處ナリ故ニ詳ニ觸ルニ倏忽トメ諸部一齊ニ閃掣電撞ヲニ注セス覺フルト同一理ナリ毒氣ノ忽然トメ迸入侵犯スルヲ眼目ヲ以テ見ルヲ能ハズト雖モ尤モ恐ルベシ猶詳ナルヲハ墨亞獨名ノ諸毒論ヲ見ルベシ其書ハ中毒ノ一

事ヲ悉ク辨明セリ

○神經及ヒ靈液ニ傳染毒侵襲スル時ハ皮肉筋脈等共ニ順正常度ノ勢ヲ逞タカシフスルヲ能ハス因テ大イニ疲弱ヲ為シ動脈鼓動ノ機タカシ苦衰ルヲ以テ血液彼ハ凝滯諸滯シ此ニハ焔解渙崩ス嘗テ疫ヲ病テ死スル者ヲ解剖スルニ心臟及ヒ心耳共ニ膠厚ノ血液充填ノ甚タ膨脹セリ是レ心臟ヨリ輸出スル血液ノ勇勢弛緩スルガ故ニ諸部ニ注クベキ血液分賦セズ遂ニ心室へ逆流シ又末梢細絡ノ血液ハ盡ク腐敗ノ既ニ稀薄焔解シ速ニ脱泄セシ者ナリ地莫尼云ク此症ノ如キニ刺絡角法等ヲ施

ス時ハ鍼口ヨリ血液流溢ノ止リ難シト予亦疫斑熱ニ於テ毎ニ經驗スル處ナリ

○神經及ヒ靈液ノ性質人々各異アリ故ニ病ニ嬰ルモ亦各異アリ是レヲ驗スルニ草木ノ芬芳ナル麝香ノ濃香ナル是レヲ嗅デ誰カ精神爽快ヲ覺エサル者アラン然レ凡其快爽ノ狀モ人々ニ微甚アリ甚シキ者ハ香氣ニ因テ忽チ昏眩スル者アリ是レ恰モ謁禮エ機キ的テ兒ルノ機器器ニ觸レテ閃掣電撞スルヲモ其人ノ稟受ノ各異ニ從テ感應モ亦微甚有ルガ如シ特ニ靈液ノ稟受異同有ルノミナラス體質ノ強弱緩急神經線等ノ各異アルヲ彼ノ

繆支以機樂器名ノ絃ノ長短緩急有テ聲音モ同シカラハ
 ルガ如シ是レヲ徵セントナラバ疫疾痘疹等流行ノ時
 見ヨ衆庶一般ニ病ムニ輒ク感受スル者アリ又傳染ス
 ルヲ無キ者有リ是以テ知ルベキナリ

○總テ傳染病ハ固形質ノ勢力ヲ衰弱シ從テ血液ヲ焔
 崩スルナリ故ニ初ノ諸症最極ノ狀ヲ見ハシ當ニ瀉血
 ヲ行フベキカ如ク思ハル、モ予殊ニ精密ニ考究シ猥
 リニ刺絡スルヲナシ

○惡性肺焔衝熱及ヒ脇焔衝熱ニ晏リニ刺絡ヲ施シ每
 ニ誤ルヲ有リ千七百四十一年本邦寬保元年及ヒ四十九年本邦

寬延ニ流行セシ熱病是レナリ又刺絡スルニ最初一回
 ハ得タリ再刺スレハ甚タ誤ルヲアリ最初ノ血ハ鮮紅
 ナリ二十四時本邦ノ十時ヲ經テ再瀉スルニ其血青黑色
 ニメ且ツ稀淡又三分ノ一ハ焔解渙崩ノ膿ノ如シ是ハ
 血質ノ損破頽廢シ且ツ腐敗スルニ因テ然リ是レヲ器
 ニタユ湛ルニ下底ハ黑粉有テ恰モ煤ノ如キ狀ヲ成メ留緒
 シ上面ハ凝結ノ黯紫色或ハ暗綠色ニメ軟ナルヲ脂膏
 ノ如シ又此症或ハ一回或ハ二回刺絡スル後チ其脈大
 イニ脱衰スル者アリ故ニ能ク其脈ヲ診スルヲ要トス
 是以テ彼熱ニハ某脈ヲ現シ此熱ニハ某脈ヲ現スト云

フヲ預ノ諳記メ可ナリ

○傳染熱病ニ嬰ル者ハ必ス胃ニ患害有テ多クハ嘔吐
ス是レ其疫毒最初涎唾ニ混ノ熱下スルカ故ニ良知能
ノカヲ以テ外泄セントメ然ルナリ又疫氣涎唾ヨリ入
ラスト雖モ胃中ニ汚物等ヲ畜フル時ハ亦良知能ノ妙
機ヲ以テ外泄セントメ嘔吐ヲ催發シ胃中ノ腐敗膽液
及ヒ其他餒穢變臭濁液等ノ畜積スルヲ涌出ス若シ吐
セザレバ此物漸クニ滯積ノ腐敗ヲ逞クシ諸般ノ惡症
ヲ生シ病勢大イニ増劇スレバナリ

○自然良知能ノ營為ニ因テ嘔吐ヲ催發スト雖モ其力

足ラザル者ハ對症ノ吐劑ヲ用テ催助スベシ又潤灌ノ
飲漿ヲ多ク與ヘ嘔氣ヲ催進シ吐シ易カラシメヨ其衝
動スル處ノ病毒ヲ吐キ盡ス時ハ吐自ラ止ム此等ノ症
ニ用フル緩和ノ吐劑ハ即チ以バカ古ク亞ア那ナ灌ク代用ノ說
ス或ハ煎或ハ解粘泥ニ少シク荷蒿灌成德云ニ方共ノ
類ヲ加用スベシ○此症ノ如キニ單ニ溫湯ノミヲ與ヘ
テ涌吐ヲ促スル時ハ其湯動モスレバ胃中ニ滯積ノ大
イニ腹脹シ胃ノ機轉ヲ失ヒ健運ノ勢力ヲ衰憊シ却テ
吐出スルヲ能ハサルナリ○凡ソ諸病ハ吐ヲ取ルニ一
二百錢ノ水漿ヲ與ヘテ猶吐セザレバ世人或ハ指端或

ハ鳥領ヲ入テ涌泄ヲ促スルヲアリ是レ甚タ不可ナリ
 此ノ如クスレバ胃中殊ニ緊満シ水飲重積スルニ因テ
 愈運轉ノ機ヲ失シ吐出スルヲ能ハス是レヲ譬フルニ
 膀胱中ニ小便大イニ充填シテ強ク緊満スル時ハ小便
 通泄スルヲ能ハザルカ如ク凡ソ吐ノ機筈ハ特ニ横膈
 腹筋成德云横膈ハ其質筋肉ニメ厚シ胸ト腹トノ間ニ
 在テ上中二腔ヲ阻隔ス全形圓ク周圍ハ胸肋骨ニ
 着ク然レ其着クトコロ前ハ高ク後ハ低シ故ニ胸腔ノ
 内チ前ハ短ク後ハ長シ此物ノ後端ハ岐ノニ條ノ長キ
 腱ト為リ下テ脊椎骨ノ終リトノ營力ノミニ非ス自餘
 腰椎骨ノ始ノトニ着クナリ
 各部ノ扶助ヲ假ルナリ支刺古云胃或ハ膀胱緊満ノ健
 運通導ノ力缺ル時ハ其裡面ニ在ル物ヲ移泄スルヲ能

ハズ故ニ此ノ如キ症ニハ測胞子ヲ用テ救フナリト

○患者十分ニ嘔吐シ胃中清滌スル後ハ少シク的里亞

加安獨魯麻支私附録ニニ白蒿鹽附録ニ佛手柑汁薄荷

水等ノ適宜ノ健胃劑ヲ加用シ然テ胃ノ部位ニ香竈蒸

溺方或ハ私百西私亞魯麻地加カニ方共ニ附ニ的里亞加

ヲ加ヘ貼スベシ

○此熱病ノ最初ニ當テハ特ニ胃ノミナラズ猶諸腸ヲ

モ清滌スベシ然レ氏其通泄スベキ標準ヲ得テ施スヲ

可トス水銃劑ニハ牛乳砂糖食鹽等附録ニ下劑ニハ刺

蜜酒石鹽宣腸鹽沛乾膏四藥ノ製法附録ニ焔硝大黃等ヲ用フ

泰西熱病論 卷四 廿八 廣慶堂藏

ベシ諸般ノ酷烈ノ下劑ハ害アリ又忽弗トク滿トク名云蛇滅門
 艸葉或ハ前件ノ緩和ノ吐下劑ヲ用ヒテ良効アリ猶其
 人ノ腸胃中ニ鬱積スル腐敗膽液及ヒ其他ノ汚物ノ多
 少ニ隨テ驅除ヲ制スベシ○上件ノ劑ヲ用ヒテ或ハ輕
 ク吐シ或ハ下利シ或ハ吐下齊シク催起シテ嘗テ恐ル
 ヲ無キ症ハ患者口苦ク胃中苦悶惡心嘔噫ヲ發シ口
 中粘膠ニメ腐蝕惡臭アル者或ハ大便秘閉スルヲ甚シ
 ク腹肚脹滿痞鞭或ハ切痛スル者或ハ風氣圍住滯塞ス
 ル等ナリ

○依ト下カ刺ラ的テ私云惡性腐敗熱ノ初症ニ清稀ノ水液ヲ

瀉利スルヲアリ是レ素ヨリ體中ニ在ル處ノ病毒ニメ
 今自然良知能ヲ以テ體外へ排出スル處ナリ若シ窘迫
 スル者ハ藥力ヲ以テ扶ケ通セシメヨ否ラザレバ大イ
 ニ酷厲ノ膽液ヲ吐下シテ止マズ遂ニ死ニ至ルナリト
 ○又秋時ニ當テ惡性腐敗熱ヲ患フル者ハ腐敗ノ灼熱
 ヲ催發スル膽液ノ肝胃等ノ周圍ニ多ク鬱畜スルヨリ
 炭ス是レ炎暑甚シキ夏月ノ後チ膽液及ヒ體中ノ鹽氣
 大イニ沸騰スルヨリ来ルナリ其初ノニ於テ必ス前說
 ノ如キ緩和ノ吐下劑ヲ用フベシ

○諸般ノ惡性腐敗熱及ヒ發斑熱共ニ其病源膽液腐敗

ニ因ルヲ疑ナシ猶是レヲ徵スルニ疫熱ニ嬰リテ死ス
 ル者ヲ解剖スルニ膽及ヒ膽管必ス黒膽液若クハ緑膽
 液満テリ又胃及ヒ十二指腸成德案スルニ腸ハ六腸ニ
 分ツ十二指腸ハ其最モ初
 メニメ胃ノ下口ヨリ屈メ左ニ行ク十二指腸ノ間
 ヲ云フ胃ヨリノ下ルヲ四五指指横徑許ニ隆起セル處
 アリ膽管其内ニ口ヲ開テ膽液ヲ等ニモ亦是ノ如キ腐
 腸ニ参出ス猶解體諸書ニ詳ナリ
 敗膽液アリ是以テ治療ヲ施スニ必ス此液ヲ滌除セザ
 レバ其液漸ク酷厲ニ進ミ大イニ苦悶ヲ催シ惡心胃痛
 等ヲ發ス尚血中ニ濫流スル時ハ百般ノ險惡ナル症ヲ
 生シ全身ノ神經質ヲ刺衝シ血質ヲ毀敗シ諸液頓ニ變
 替シテ惡臭アリ且ツ侵蝕ノ液ト為ル此ノ如ク病毒夥

多ナル者ハ其自然ノ良知能ノ欲スル處ヲ觀察シ吐下
 機ニ應メ清滌スベシ此症吐ヲ用ヒ下ヲ用ヒ或ハ吐下
 齊シク行フテ毎ニ大効ヲ得タリ若シ苦悶甚シク展轉
 ノ席ヲ安ンセス胸中壓迫シ惡心噫氣吃逆等ヲ發シ舌
 苔甚シク胃中困重苦悶其口毎ニ苦ク飲食亦皆苦味ヲ
 覺フルヲ甚シク呼吸噫氣大イニ惡臭アル者ハ是レ胃
 中ニ汚物有ル候ナリ吐劑ヲ用フベシ又大便秘甚惡臭ア
 リ其色青黒ニメ黒膽液ノ如キ物アルハ必ス下劑ヲ用
 ヒテ大効アリ總テ胃及ヒ内景ニ病毒汚物等繫着スル
 ヲ診シ得ハ速ニ是ヲ驅除スベシ殊ニ腐敗膽液ハ有

毒ノ物品ヲ食フト殆ト一般ナリ○大抵前件ノ症七日ヨリ十四日ニ至ル間自然良知能ノ妙用ニ因テ腐敗膽液ノ如キ汚物ヲ或ハ吐シ或ハ瀉下ス醫人此妙用ヲ考究シ自然營為ノ活機ニ從テ方法ヲ處シ良知能ノ運動ヲ助ケ止瀉ノ藥ヲ用フルトナク八九日ヨリ十四日ニ至ル間微利劑ヲ用フベシ下劑ヲ用フル間ニ微々トメ汗出ル者ハ病毒排出ノ尤モ佳兆ナリ凡ソ以上ノ諸症中ニ在リ腐敗毀穢等ノ物ノ腸中ニ鬱積スルヨリ發スルハ稀ナリ此症ハ初メ刺蜜酒石鹽ノ類ヲ用ヒ後チ三四日毎ニ緩和ノ水鉞法ヲ施スベシ是レヲ的當ノ治トス

○諸症ノ緩急多少ニ隨テ下劑ヲ用ヒ其間ハ慎テ良知能ノ衰弱ヲ扶クル飲食藥劑等ヲ撰ミ因ヲ考ヘ症ニ從ヒ斟酌ノ用フベシ○上件ノ吐下ノ劑ハ特リ腐敗膽液ノ如キ汚物ノ腸胃ニ留積増盛スルヲ防止スルノミナラズ其液血中ニ泛流スルヲ制止シ且ツ汚物ヲ血中ヨリ腸へ翕引泄シテ通利セシム緩和ノ下劑ハ斯ノ如キ熱病ニ用ヒテ多年大効有ルヲ登驗セリ蘆薈スカムモ紐護ニウゴ脂ニ格魯屈印グロクイン多ト艸實スウジツノ名成德案スルニ以上二種以テ代用ノ品有リト雖モ是レヲ載セズ其等ノ劇劑ハ形狀ハ予カ選スル處ノ蘭藥鏡原ニ出ス

血質ノ腐敗炸崩酷厲ナル症ニハ大イニ害アリ殆ト毒

泰西熱病論 卷四

廣濟堂

物ヲ與フルニ異ナラズ腦ヲ損シ精神ヲ破リ人命ヲ促スルヲ有リ○自然ノ營為ニ因テ烈シキ下利ナキ者ニ世醫動モスレバ烈劑ヲ用ヒ強テ下利ヲ促シ赤痢ニ變シ遂ニ止ムベカラズ死ニ至ル者少カラズ然レ凡腐敗膽液ノ如キ汚物久シク内景ニ留着ノ酷厲ニ變セントスル者ハ症ヲ考ヘ商量シ其時ヲ失フヲナク時々驅泄スルヲ良トス○又下利過度ナル者ハ的里亞加安獨魯麻支秘以上皆附錄ニ載ス或ハ龍蕪糕子玫瑰灌又ハ肉桂灌適宜ノ收瀋治疫劑ヲ撰用スベシ猶烈シキ者ハ收瀋ノ水銃法ヲ施スベシ其劑ハ龍蕪糕子或ハ的里亞加安獨魯

魯麻支秘ヲ取テ登休煎汁或ハ玫瑰煎汁或ハ加私由煎汁ニ加ヘテ用フベシ然レ凡此等ノ劑ヲ用フルニ臨テ誤テ病毒排出ノ下利ヲ閉止スルヲ勿レ若シ閉澁スレバ大イニ害アリ是レヲ慎メ是レヲ慎メ故ニ其症ニハ大黃少許ヲ兼用スルヲ良トス○按スルニ其熱ノ半ヲ過キ或ハ退ク頃ニ至テ下利ヲ幾スルハ病毒排泄ノ善作用ト為ス初メニ幾スル者ハ害アリ殊ニ稀淡ノ鹹渣様ノ物ヲ瀉スルヲ甚シキハ大イニ害アリ又下利有テ徐緩ノ潤汗ヲ兼子或ハ皮膚温ニ潤澤有ル者ハ甚タ善徵ナリ

○此腐敗熱ハ自然ノ營為ニ因テ吐下ヨリ病毒ヲ泄除
 スト雖モ又良知能ノ妙靈ナルハ此時ニ當テ大勉力ヲ
 催發スルカ故ニ汗孔ヨリモ猶其毒ヲ漏泄ス○凡ソ此
 症暴大汗セシムルヲ勿レ徐々緩々温暖ニノ遍身平等
 ニ發スルヲ良トス是レニ衆ノ病毒蒸氣ト為リ去レバ
 ナリ爾後脈漸々ニ緩和穩靜ヲ見ハシ相續テ微汗出ル
 ハ必ス善候トス其汗大ニ漏レ冷テ且ツ粘リ或ハ頭胸
 或ハ一處ニ限リテ發シ餘部無キ者ハ惡徵トス又最初
 ヨリ烈シキ汗ヲ發シ來ルハ多クハ惡徵トス是レニ振
 慄ヲ兼ヌルハ最モ惡徵ナリ

○凡ソ藥カヲ假テ發汗センヨリハ自然營為ノ發汗ハ
 毎ニ利益アリ故ニ諸般ノ熱烈ノ藥食ヲ投メ遽ニ發汗
 スルヲ勿レ唯酸收ノ潤灌劑前ノ嫩衝熱篇ニ數方アリ併セ見ルヘシ又附録ノ強
心清涼飲等ヲ撰用セヨ及ヒ和緩ニ強心シ蒸氣ヲ發發スル劑後ノ
飲是レナリ又附録ニ數方ヲ載スヲ用ヒテ扶祐ノ是レヲ發スベシ因テ
 血中ノ鹽氣ヲ焯解シ且ツ潤灌滌除シ酷厲液ヲ抑制シ
 血液ノ腐敗焯崩ニ進ムヲ防止シ兼テ固形質ヲ養護強
 健ニス

○凡ソ患者ノ稟受各々同シカラサレバ其固形流動ノ
 二質モ亦各異アリ故ニ傳染スルノ毒ハ同ト雖モ其人

ニ從テ治法モ亦甚々區別アリ纖維強硬血液優多ノ者ハ稟受虛弱血液淡薄乏少ノ者ヲ救回スルカ如ク温煖劑ヲ必用トスルヲナシ○又疫斑熱ニ因テ血液焔解渙崩シ各處ニ留滯スル者ハ其治法ハ脈管及ヒ固形諸部ノ牽張強硬ノ勢カヲ左右挽回メ腐敗ニ進ムヲ防制スルニ在リ其劑ハ艸木ノ酸收液成德案ズルニ佛手柑拘椽回青橙等ヲ和スル劑ナリ或ハ金石類ノ製煉ノ酸收劑等ナリ成德案ズルニ石膽精硫黃精等ヲ和シタル劑皆此症ニ殊効アリ又少シク收斂スル治疫劑ハ稟受虛弱ニノ血液淡薄ノ人ノ傳染熱ニ大効アリ○斯ノ如キ症ニ揮蕪走竄ノ灰汁鹽及ヒ右等ノ性アル

藥劑ヲ用フレハ甚々害アリ其故ハ却テ其血液ノ腐敗ヲ増盛シ強ク刺動攻衝シ致敗缺損スレバナリ平全ノ人ト雖モ此等ノ劑ヲ過用スレバ腐敗熱ノ如キ症ヲ發ス況ヤ已ニ腐敗熱ヲ患フル者ニ用フレバ其害アルヲ知ルベキナリ

○蓋シ傳染毒ハ其性甚々揮蕪走竄其質ハ精微活動ノ鹽氣ナリ故ニ疫熱ハ戰場死屍ノ毒壞ノ蒸氣ヲ受テ發スルヲ甚々多シ○是以テ揮蕪走竄ノ灰汁鹽ハ猥ニ用フベカラズ又此症ニ幾癒膏ヲ施スモ一時ノ危急ヲ救フ權法ナリ若シ卒爾トノ期ニ先チ或ハ時ヲ失テ是レ

ヲ貼シ或ハ其熱ヲ抑制スベキ期ニ當テ貼スレハ却テ其膏ノ銳勢ヲ以テ刺戟攻衝シ血液愈急疾ヲ為シ大ニ熱ヲ發ス故ニ此ニ物ハ共ニ害アリトス總テ芫菁ノ毒ハ皮膚ニ通徹スルノミナラス神經及ヒ諸脈ノ全質ニ侵入ス然ルヲ衝動沸熱ノ甚シキ者ノ初症ニ在テ是レヲ用フルハ甚タ錯誤ニ屬ス芫菁ノ鹽氣ハ其性揮發走竄ノ灰汁鹽等ト一同ナルカ故ニ血液ヲ焔崩シ愈腐敗ヲ増進ス此症ニ臨ンデハ敢テ撰ニ貼スベカラズ○若シ自然良知能ノ勢力振ハハルヲ頓ニ蕪活變動シ病毒排出ノ道路ヲ開クニハ發疱膏必用タリ然レ凡是レ

ハ上ノ症ト相反スル者ヲ云フ殊ニ病ノ減セントスルニ臨テ施スヲ可トス良知能ノ勢力振ハハル候ハ固形質衰頽シ血液匱乏シ運行モ亦遲滯シ靈液缺乏ノ其狀昏睡病ノ如ク盡ク遲延弛弱ノ諸症ヲ見ハス者是レナリ○上件ニ説クカ如ク或ハ期ニ先チ或ハ時ヲ失テ發疱膏ヲ貼スル時ハ不寐譫妄或ハ尿閉或ハ振惕攣急掣癢等ヲ生ス是レ皆誤治ニ因テ發スル處タリ少年ノ醫生ハ是レヲ知ラズ動モスレバ拔孤利肝烏私カ誤治ノ法ヲ取テ人ヲ誤ルノ毎ニ多シ是レヲ辨正スル者ハ別兒利尼ナリ又諸般ノ酷厲病ニ發疱膏ヲ貼セント欲セ

バ必ス牛酪精或ハ巴且杏乳ニ方共ニ附録ニ載ス或ハ其他酸收
ニノ甘和ナル飲漿ヲ與ヘ服セシメヨ

○予案スルニ羌菁ノ酷厲毒ヲ能ク緩解スルヲハ龍腦
ニ過キタルハナシ予常ニ是レヲ用フ蓋シ酷厲鹽ノ銳
尖ヲ鈍挫スルニハ草木ノ精微ナル油類最モ良ナリ且
ツ水銀劑ノ毒ヲ緩解ス○又按スルニ龍腦劑ハ此ノ如
キ腐敗ノ疫熱ニ用フルヲ必要タリ此劑蒸氣ヲ増發シ
又能ク汗ヲ催ス故ニ此症ニ大効アリ龍腦ノ性自餘ノ
揮發走竄ノ灰汁鹽及ヒ蒸餾セシ藥精等ノ如ク熱烈ニ
非ハレバナリ且ツ疼痛ヲ鎮止シ又撫安和順ノ性効有

リテ煩躁悶擾ヲ鎮止シ靈液及ヒ精神ヲ安靜ニシ快ク
熟睡ヲ起サシム上件ノ症ニ他ノ催眠藥ヲ用フレバ却
テ煩躁悶擾ヲ増劇ノ害アリ○是故ニ龍腦ニ阿片ヲ加

フル劑成德云附録ノ阿片ハ良知能ノ嗜好ニ適スル發汗

劑ナリ又龍藍渥及ヒ的里亞加精ニ方共ニ附録ニ載スモ亦同効

ニノ此他ノ諸症ニモ甚夕稱用ス但シ此病ニ阿片ヲ用
フルニハ其量ヲ僅少ニメ與フヘシ猶諸症ノ微甚ニ從

テ増損ヲ為セ又的里亞加安獨魯麻支私又彌的利達亞

多又ハ催眠糕或ハ的里亞加精等最モ良効アリ又患者
甚夕龍腦ヲ嫌惡ノ胃ニ堪ヘ難キ者アリ然ル時ハ熱醋

ニテ焯解シ用フベシ胃ニ受ケ易シ此劑總テ惡性腐敗
 熱ニ甚タ良ニメ能ク疫毒ヲ制伏ス蓋シ龍腦ト醋トハ
 古今諸家疫疾ニ稱譽スル一救舉スベカラス拂郎察ノ
 一醫黑以尼首私ト云フ者麻兒際兒禮拂郎察ノノ地ニ
 在テ龍腦醋劑ヲ用ヒ大イニ疫疾ニ名ヲ得タリ因テ生
 ナカラ避疫神ト稱シ像ヲ立テ祭ラル、一ヲ得タリ其
 記ニ云ク黑魯那拂郎察ノノ地ナリノ地方疫疾大イニ流行セシ
 時一奇方アリ普ク患者ヲ救活セリ其方ハ龍腦ヲ以テ
 主ト為セリト

○今酸收ニメ澁瀉スル劑ヲ以テ專ラ惡性腐敗熱疫斑

熱ニ施シ血液ヲ和靜シ脈管ヲ保固シ諸液ノ腐敗ニ進
 ムヲ防止シ又蒸氣ヲ發達スル劑中ニハ龍腦ヲ第一ト
 ス是レ蒸氣及ヒ微汗ヲ快發スレバナリ其意酸收ノ劑
 ノミニテ其効弱キカ故ニ是レヲ添加ノ功ヲ奏スルナ
 リ右方ニ澁瀉劑ニ治疫劑ヲ交テ解毒劑ト為ルト其意
 全ク同シ即子的里亞加安獨魯麻支私又彌的里達亞多
二方共ニ附
 録ニ載ス等モ亦同シ此劑皆久シク歷試經驗スル處
 ナリ又礬石肉豆蔻ヲ調勻スル劑ハ間歇熱其他諸熱病
 ニ良効アリ少シク龍腦泊夫藍ヲ加テ最モ大効アリ
 ○次ニ出ス處ノ機那斂ハ多年經驗スル者ナリ此劑ハ

間歇熱遷延神經熱ニ用フルノミナラズ又腐敗熱疫斑熱ニ甚タ良ナリ殊ニ稍寒熱往來アル者ニ宜シ若シ患
者大便秘閉シ或ハ腹中拘攣脹滿スル者ハ大黃刺蜜
二載等ノ類ヲ加フベシ
附錄

機那欽

機那欽キナキナ十六品附錄ニ載ス代用ノ
住ナリニ十四成德案スルニ彼邦本邦ノ
橘皮柑皮ヲ用フル處皆多ク回青橙皮ヲ用フ是
レ其土寒酒ニノ橘柑ヲ産セズ特リ回青橙ヲ産
スルヲ以テナリ本邦中モ唯紀州三洲遠州ノ
土地ノミ多ク橘柑ヲ産シ他邦或ハ出ス
ニ回青橙皮ヲ用フルニ勝レハ皆柑皮ヲ代用スル
ニ其効却テ回青橙ニ勝レハ皆柑皮ヲ代用スル
土地ノミ多ク橘柑ヲ産シ他邦或ハ出ス
ニ回青橙皮ヲ用フルニ勝レハ皆柑皮ヲ代用スル

本邦藥肆ニ販ク回青橙皮ハ黑色堅硬氣味臭惡
効亦甚タ劣レリ是レ其製麩惡ニノ裡面ノ白皮
ヲ刮シ去ラズ早卒ニ曝乾スルヲ以テ皆腐敗ニ
屬ス試ニ自製ノ精細ヲ用フルハ曝乾後絶テ黒
色ヲ為スナシ故ニ今代用スル處ノ柑皮モ陳
久ノ品ヲ用ヒス新鮮潤滑其色帶黄ニノ愛スベ
キ者ヲ洎夫藍語一菱三亞佳ナ
撰用ス
尼亞安設私蘭瓦屋兒的兒品附錄ニ載ス格
古支涅兒六分六厘ニ載ス火酒拵郎察產佳
右侵シ封固シ泡出スルヲ三四日ニメ取り用フ用
フル時ニ臨ンテ石膽渥附錄ニ載ス十滴或ハ十五滴或
ハ二十滴ヲ加ヘ和メ劑ト為シ適宜ノ飲漿又ハ蒲

桃酒及ヒ水ヲ加ヘ二三時或ハ四時本邦ノニ飲服ス每服一錢ヨリ四錢ニ至ル時ナリ

○此劑予嘗テ經驗ノ奇効ヲ得ル處ナリ又間歇熱ニ用ヒテ殊効アリ又或ハ散或ハ煎ト為スモ又良シ唯患者ノ嗜好ニ任セ調勻メ口腹ニ適スベシ○此劑又能ク固形質ヲ強壯ニシ血液ノ焔解腐敗ヲ防制シ且ツ蒸氣孔ヲ閉ルナシ凡ノ此症及ヒ諸熱病共ニ劇シク發汗スルハ害アリ徐汗ヲ催發スルハ每ニ良トス尤モ病ノ最極ノ時且ツ退夕時ニ施スヲ良トス既ニ説ク處ノ潤灌劑及ヒ飲食等ハ熱病漸ク愈テ猶稍誓留スル時ニ用ヒ

テ最モ良ナリ又強壯ニスル飲食モ甚夕肝要ナリ是レ患者ノ衰弱沉垂ヲ防ケハナリ○又此等ノ症ニ醇厚ノ赤蒲桃酒良効アリ此物微シク收斂シ且ツ強心ノ功アレハナリ又惡性腐敗熱ノ退期ニ用ヒテ大効アリ殊ニ回青橙汁或ハ佛手柑汁ヲ加ヘ酸味ヲ添テ最モ良ナリ又兼症ニ從テ肉桂回青橙皮玫瑰花及ヒ其他ノ芳香劑ヲ加用シ或ハ石膽渥一二滴ヲ加ヘテ最モ可ナリ此類ノ方論亞私古禮壁亞垓私人名ノ説ナリ猶其書ニ就テ見ルヘシ上件ノ品物ハ特リ飲食ニスルノミニ非ズ又藥劑ト為シ用フ又禮應設蒲桃酒或ハ拂郎察蒲桃酒ニ清

水ヲ調和シ用ヒテ諸般ノ熱病ニ良効アリ又菓醬梨醬
二醬ノ製法ヲ用フ然レ凡上ノ二酒ニ及ハス又古キ赤
附録ニ載ス
蒲桃酒モ上説ノ如キ効アリ且ツ固形質ヲ強健ニシ又
強心清涼飲ノ効アリ

○凡ソ亞細亞洲其他諸洲ニハ和蘭ヨリハ疫疾甚夕多
シ皆佛手柑汁ヲ用ヒテ治疫劑トスルヲ大イニ稱譽セ
リ○今此ニ論スル處ハ予數十年間苦志研精シ治ニ試
ル處ナリ論辨既ニ餘蘊ナシ又案スルニ此症ニハ治疫
滌治疫煎強心清涼飲 三方共ニ附
録ニ載ス 等皆有効ノ藥劑ニノ
是レニ過キタル者ナシ

○予此書ヲ著シテ熱病ノ因証治方ヲ總括ス復又遺憾
有ル下無シ然レ凡猶缺乏ヲ覺フル者アラハ予カ撰述
ノ意ヲ推明シ擴テ治術ノ規則ヲ為シシトテ庶幾ス

成德案スルニ腸胃熱ハ腐敗熱中ノ一症ナリ此
篇能ク其候ヲ論スト雖モ別掲ノ篇無シ彼土ノ
諸書共ニ別提スルヲナシ獨リ歎以秘的兒是レ
ヲ論辨セリ故ニ今其語ヲ取リ藥ヲ芟リ雜ヲ去
要領ヲ採披ノ此ニ載ス是レ世人ノ所謂疫利或
ハ協熱下利或ハ陽明ト少陽トノ合病必下利ス
ト云フ者
是ナリ

腸胃熱總論第一
腸胃熱ハ尋常ノ熱病ト混スヘカラス然レテ諸家は
レヲ辨スルヲナク偶論及スルモ別ニ門ヲ立ルヲ無
シ故ニ今此篇ヲ表掲シ詳審ニ論辨ス○此病ハ症治

共ニ熾盛熱ニ異ナリ大抵皆下利ヲ魚然レ凡此下
 利ハ必ス害ナク却テ益アリ慎ンデ閉澁スルヲ勿レ
 若シ閉澁スレバ病險惡ニ進ミ病毒體中ニ留滯シ諸
 部ヘ泛濫シテ危症ヲ發ス勉テ是レヲ驅世シ腸胃中
 ノ伏毒ヲ消除スルヲ要トス故ニ最極危熱ノ症ニ非
 ホレバ閉澁ノ方ヲ用フルナシ又熾盛熱ノ如ク發
 汗劑ヲ以テ功ヲ取ルナシ是レヲ犯セバ腸胃ニ鬱
 留スル病毒沸涌激長ノ血中ニ滂行シ施テ諸臟ニ傳
 注ス然ル時ハ發斑驚口瘡狂躁譫妄咽喉腫及ヒ
 衝熱ヲ發シ其體燔炭ノ如ク或ハ内部ノ寒瘰瘰癧
 疔等ヲ加刺的ニ遂ニ救フベカラハルニ至ルアリ故ニ
 依トモスレバ強テ幾汗スル者アリ然ル時ハ一
 動モスレバ強テ幾汗スル者アリ然ル時ハ一
 ナシ患者ノ一大厄ヲ招クト是レ以テ強キ發汗劑ハ
 宜シキ處ニアラス必ス病ヲノ險惡ニ進マシメ其統
 リ遂ニ救フベカラハルニ至ル和緩ノ吐下劑ハ施ス
 ベシ諸般ノ熱病皆發汗劑ヲ用テ治スルカ故ニ此治
 二至テハ學者多ク惑フアリ故ニ今辨論ス
 病因第一

此病因ハ胃及ヒ大小腸ニ腐敗穢酷厲悍烈ノ病毒
 留滯シ刺動攻衝ヲ逞フシ熾熱ヲ發シ尋テ痙攣拘
 急疼痛ヲ生シ其部ノ神經ヲ非剥工獨利亞ニ成德
 ルナリ胸脇ニ侵滲スレハ衝逆ノ粘穢惡臭ノ汚液ヲ下
 及ヒ和涼ノ在ナク下劑ヲ用フレハ粘穢惡臭ノ汚液ヲ下
 諸症從テ消除スルナリ依トモ加刺的ニ云此熱病ニ腸
 腹痞鞭散衝熱痛シ水ノ如ク又膽液ノ如キ物ヲ下ス
 ハ病痊ル微ナリト是レ他ノ熱病ノ其毒血中ニ伏留
 スル者ト同シカラス故ニ發汗劑絡等ハ禁スヘシ世
 醫知ラズ謾ニ種々ノ名ヲ立ツ皆原據ヲ辨セサル過
 ナリ予腸胃熱ノ名ヲ標スルハ名ニ因テ病ノ處在ヲ
 知リ又治術ヲ誤ルヲ無ランヲ庶幾セントナリ
 症候第一
 第一惡寒戰慄交互交發ス且ツ糞スルヲ定期ナシ○
 第二齒牙舌上咽喉共ニ粘稠臭穢ノ汚液覆着シ黃色
 或ハ黑色ナリ且ツ惡臭有テ傍人ヲ薰襲ス又患者ノ
 口味甚惡ニノ穢物ヲ喫スルカ如キヲ覺フ○第三其
 下利スル物ハ甚夕惡臭有テ向ヒ近クベカラス○第
 四季脇下痞鞭學急張拘シ絞痛ヲ覺フ是レハ風氣

有ルニ因リ一ハ邪液ノ腸胃ヲ攻衝スルニ因ル○第
 五睡中安カラス動モスレバ騷擾シテ起立スルニ至
 ル性虚弱ノ人ハ興寤ノ間モ席ヲ安ンセス又少シク
 身體ヲ舉動スルモ忽チ驚惕シ或ハ全身顫動振搖ス
 ルトス○第六常ニ頭痛甚シク又項痛ヲ為ス是レハ腸
 胃ニ循行スル頭部ノ神經ノ痙攣急縮スルカ故ナリ
 ○第七小便最初多クハ平常ノ如シ是レ病毒未ダ血
 中ニ侵淫セザルカ故ナリ後チ濃濁ニ變シ稠厚ノ塗
 滓アリ是レ病ノ最極ナリ又將愈ノ期トスルナリ
 惡症見徵第四
 危惡ノ症有リ是レヲ腸胃熾盛熱ト名付ク尋常ノ腸
 胃熱ト分ツ宜シク明カニ辨察スベシ○第一心中大
 イニ煩悶苦楚ス○第二胃中刺痛アリ其狀脇痛ノ如
 シ○第三勢力脱落シ昏眩ヲ發ス○第四手足諸部筋
 肉○第四精神昏瞶シ或ハ摸床撮空踈優悶亂ス或ハ
 冷汗ヲ發スルナリ此候ハ最モ危惡ノ徵ニノ死ヲ
 免ル者少シ
 異常諸症第五
 此熱病正當ノ症ヲ發セス異常ノ諸症ヲ現スル者ア

リ皆治療ヲ怠リ或ハ誤治シ或ハ調護度ニ冲ラス或
 ハ傍人瞻待ヲ失シ或ハ温覆ヲ過スニ因リ毒邪腸中
 ヲリ泛流ノ血中或ハ諸臟中ニ侵入シ鬱留凝滯ヲ逞
 フシ外表漏泄ノ便冗ヲ缺ク力故ニ此變狀ヲ發スル
 ナリ或ハ赤斑青斑紫斑ヲ發スルアリ又聽道ニ流傳
 スレハ耳聾ヲ為シ耳後膠骨ニ泛流スレハ耳後口膠
 二嫩腫及ヒ惡瘡ヲ發シ後頭腦ニ流滯スレハ精神錯亂
 譫妄ヲ發ス其邪液ノ泛流スル處ノ多少部分ニ從テ
 或ハ脇嫩熱肺嫩熱肝脾胃嫩熱等ヲ見ハス猶
 許多百般ノ危症ヲ釀成スルニ至ル然レハ皆一種ノ
 病原ヨリ來ル者ニノ更ニ他病ニ非サルナリ
 治方第六
 汗唾ニ便等ヨリ毒液發泄ノ候無ク明カニ其症ヲ定
 メ難キ者アリ是レ其毒漏泄ノ道無キニ似タリト雖
 モ蒸氣ノ發泄ニ從テ微微漸漸ニ其毒ヲ驅泄スル
 アリ然レハ快泄ノ道ヲ缺ク力故ニ剩餘ノ毒液各部
 ニ泛濫シ若クハ腸胃若クハ胃若クハ腸胃共ニ其毒液
 ヲ鬱蓄伏留スルナリ此時ニ當テ漫然トノ尋常平
 易ノ藥劑ニ任セ其毒ヲ他部ヘ泛流變移セシムル
 勿レ速ニ吐下ノ劑ヲ以テ驅除スルヲ要トス是レヲ

泰西藥方論 卷四

三十一

例スルニ腸中ニ蛔蟲アル者ノ熱病ハ種々ノ症ヲ發シテ其診察ヲ懸ルト一般ナリ又此症自然良能ノ勢力強壯ナル者ハ自然ノ驅泄其宜シキヲ得ヘキニ良知能ノ勢力足ラサルニ因テ患者虛乏ノ遂ニ排出ノ道ヲ缺ク是以テ惡寒發熱更作等異症百出ニ至ル是以テ良知能ノ活稅靈妙ナリト雖凡良醫ノ術ヲ借ルニ非サレハ亦治スルコト能ハス故ニ醫タル者此ノ如キ症ニ遇ハ猶豫スルコトナク和緩ノ劑ヲ用テ病毒ヲ泄利スヘシ○凡ソ疫熱斑熱ハ精細ニ意ヲ用ヒテ良能ノ運用ニ隨テ藥劑ヲ施スベシ其術ハ病毒ヲ驅泄スルニ吐下稅ニ應シ頃路ニ向ハシテ後チ忽然トノ大イニ暴泄脱虛シ救フベカラサルニ至ル然レ氏類ニ順路ニ向ハス病勢抵抗シテ痛快ニ排出セ非ル者ハ暫ク其勢ニ隨從シ強テ發泄ヲ促セス依違因循稅苦ノ期ヲ待ツベシ必シモ烈シク驅泄スルコト勿レ此活稅ノ妙用毎ニ此症ニ少ナカラス此術ニ由テ利ヲ得ルコト往々ニ多シ○又下劑ヲ用フベカラザル期アリ病ノ最初ニ當テ毎日寒熱更發シ下利ノ候頭箸ニ見レ作ル者ナリ然レ氏病毒邪液李脇下及ヒ腸中ニ

伏留スルコトヲ診シ得ハ猶豫スルコトナク吐下ノ劑ヲ用ヒヨ

驅泄良劑第七
 受豐都秘製ハ沉藍散沉藍膠珠方共ニ附ヲ用フ又技
 散利肝鳥秘製モ亦此劑ヲ用フ又此他ノ蘆薈ヲ和シ
 タル緩和ノ下劑或ハ大黃二錢ニ蜂窠少許ヲ和シ或
 ハ大黃單味ヲ煎ノ湯ト為シ或ハ大黃醱與蒲兒加
 准等ノ用フ毎服一匙小兒ハ二三滴ヲ與フ蒲兒加
 兒多飲ハ此症ニ遇ヘハ苴稍ヲ多ク用フ產婦ト雖モ
 一頓ニ八錢ヲ與フ凡ソ下利スルコト十五六度ニ至テ
 熱大イニ減シ其病痊ユト又刺蜜ニ酒石鹽或ハ焰硝
 ヲ加用シテ良効アリト又予カ施用スル處ノ煎劑ハ
 沛乾膏蛇賊門艸葉等ナリ毎ニ良効アリ或ハ大黃末
 五分ニ焰硝一分六厘ヲ加ヘ用フ又婦人經期ニ在テ
 ハ別設兒丸ヲ用フ凡ソ此等ノ藥劑ニ因テ胃痛及ヒ
 季脇下痛及ヒ煩悶苦腦等ノ諸症消除スルナリ猶其
 他緩和ノ驅泄劑ヲ撰用スヘシ
 潤滑劑第八
 緩和ノ驅泄劑ヲ用フル間又更ニ粘潤滑利ノ劑ヲ時
 々兼用セヨ其劑ハ牛乳精或ハ鹿角屑佛手柑各等分

泰西藥考論 卷四 三十三 廣慶堂藏

又取湯トス者誠德潔然
 又ハ大麥佛手柑砂糖或ハ燕麥粗末及ヒ乾蒲桃ノ飲
 湯或ハ諸般ノ甘養ナレ
 ル者或ハ巴且杏乳附録ニ菓實ノ自然汁ニ砂糖ノ加フ
 ノ性冷ノ湯液等尤モ良ナリ是レ新生病ニ益アリルノミ
 ニ非ス尚患者ノ精神ヲ快爽保持スル功アリ患者若
 シ巴且杏油ヲ忌マサル者ハ用フヘシ此物最モ能ク
 腸中ニ在ル悍烈酷厲ノ液ヲ緩和シ且ツ滑利ナラシ
 メ又能ク其惡液ヲ導泄シテ甚タ良効アリ又茶及ヒ
 骨節ノ泡劑ヲ與ヘヨ又及大麥煎ヲ用フヘシ是レ使
 シ加^骨劑^の既ニ稱用スル者ナリ香味効力骨^節喜ニ同
 シ又血夜ヲ稀薄ニスル清涼ノ露ニ少シク酸^收ノ品
 ヲ加ヘ酸味ヲ添ヘ或ハ甘養ナル舍利別ヲ加ヘ用フ
 是レ能ク酷厲悍烈腐敗液慄悍鹽等ヲ汁和緩解シ再
 ヒ故ニ復スル功アレハナリ又散ヲ忌マサル者ハ蝮
 蝮石ニ^蝮蝮^石硝銀朱ヲ加ヘタル如キ土質ノ劑ヲ與フベ
 シ此劑^蝮蝮^石硝銀朱ヲ加ヘタル如キ土質ノ劑ヲ與フベ
 痛ヲ緩解スル功アリ
 驅泄劑潤滑劑ヲ用ヒテ應ヒス猶惡液ヲ世利スベキ

諸症有テ患者大イニ心中苦悶シ胃中疼痛脇下切痛
 スル者ハ滑利緩解ノ水錠方ヲ行フベシ此術甚タ簡
 便ニメ即功アリ他ノ藥劑ニ勝レリ毎日施メ可ナリ
 其劑ハ膽^花油^{或ハ}煮^燕麥^汁或ハ^亞麻^仁油^{或ハ}牛^乳
 二荷^蒿花^ヲ加ヘ^煮タル者^{或ハ}其他^油類^蜂蜜^砂糖^等
 皆單味ニテ注射ス此等ノ品最モ能ク疼痛ヲ消シ悍
 烈ナル汚物ヲ緩和シ導泄ノ功ヲ奏ス故ニ腸胃ノ絞
 攣^掣痛ヲ治シ大イニ諸症ヲ減除ス若シ水錠方ヲ惡
 ム者ニ遇バ^苳硝^四菱^若クハ^八菱^ヲ除ス與フ亦功アリ此
 方諸藥寸功無キ者モ速ニ大熱ヲ除キ且ツ汚物ヲ清
 除シ功ヲ得ル^少カ^ラズ然レ^凡自然^ニ下^利ヲ^叢ノ
 異症無キ者ハ驅泄劑及ヒ水錠方ヲ用フルニ及ハス
 唯滑利ノ劑ヲ與ヘ且ツ稀淡ノ飲料ヲ加ヘ用フヘシ是
 蝮^蝮石^鹿角^末等ノ土質劑ニ^蝮硝^方料^ヲ加ヘ用フヘシ是
 レ酷厲悍烈ノ惡液ヲ挫キ^熾熱^ヲ防^止スレバナリ
 又大黃酸一匙許ヲ與フベシ又心中苦悶煩惱シ胃及
 ヒ腸下^疾痛^スル者モ亦大黃劑及ヒ緩和ノ水錠方ヲ
 用ヒテ^穢濁^ヲ下^スベシ
 若シ下利劇^叢芽^十是レカ為ノニ諸液ヲ以脱シ消耗衰

泰西熱病論

三十五 胃腸炎

脫四肢逆冷シ其他諸惡症ヲ敷スル者アラハ催睡糕
 附録ニ一匙ヲ取テ肉桂露（或ハ酒者ヲ以テ製）或ハ何青
 露一盞中ニ投シ服スベシ此劑強壯補ヲ主トシ
 兼テ下利疼痛ヲ止メ又能ク精神ヲ調和シ安睡セシ
 ム此ノ如クニ下利猶止マラハ強テ閉澁ス
 ル勿レ自ラ止ム
 惡液 頭痛第十一
 語スルア逆流スル時ハ頭痛ヲ敷シ面色赤盈シ譚
 身ハ厚被スルナリ宜シク足脚ヲ温メ頭胸ヲ清涼ニシ全
 農痘膏ヲ足腓ニ貼シ或ハ蒸餅母食鹽ニ味碾研調和
 シ苾子醋等ニテ捏搜シ或ハ蒸餅ニ貼シ漸次ニ農痘セシ
 メテ其毒ヲ降下スベシ又水銃方ヲ行ハ其劑ハ蛇戒
 門州葉梅子焰硝等ナリ是レ頭腦ノ惡液ヲ下降シ兼
 テ危篤ノ諸惡症ヲ救フ
 呃逆第十
 呃逆ヲ幾ノ止マサル者ハ世硝四莖ヲ與フ或ハ受禮
 都私及ヒ技孤利豚鳥私ノ法ニ從テ沉藍散或ハ沉藍
 終録ニ方載ス○又胃中炊衝熱ヲ服スルベシ又膏煎飲
 最モ良ナリ○又胃中炊衝熱ヲ服スルベシ又膏煎飲

二莖龍腦三厘三毛許ヲ和シ與フ又綿布ニ龍腦精銅
 二載ヲ温ノ浸シ胃ノ部位ニ布貼スヘシ最モ良ナリ
 此熱元來刺絡ヲ禁ス然レ凡其人血液優多ニ胸脇
 炊衝疼痛甚シフノ堪ヘ難キ者ハ已ムテ得ヌ症ニ
 從テ刺絡後煩躁苦悶炊衝等消除セハ速ニ刺絡ヲ止
 ム猶諸症再發セハ又水銃方ヲ施スヘシ猶諸症退カ
 サルハ又刺絡ヲ用フ然レ凡初ノ三四日間ハ慎ンテ
 瀉血スル勿レ
 飲食攝生第十四
 病者ヲ保養瞻侍スルニ温熱鬱蒸ニ過ルテ勿レ飲食
 モ甚タ淡薄ニ過ルニ無ク食料モ亦乏少ニ過ルテ勿
 レ唯保祐ノ食物ヲ進メヨ其故ハ此症ニ三週或ハ四
 五週ノ間次續ノ止マサレハ漸々ニ消瘦衰耗ノ憂ナク
 ス豫メ飲食ノ力ヲ假ル時ハ病者消瘦衰耗ノ憂ナク
 諸症モ故ニ復シ易シ然レ其消化シ易キ食物ヲ撰用
 スヘシ成徳ノ管ニ飲食ニ甚ク少クシ病者初ニ當テ多食セシム
 ノ變日勿レ徐々漸々保祐シテ勸ルヲ得タリトス停滯
 天百九十九命

二	意ヲ用ヒ消化シ易キニ注意セヨ又患者ノ嗜好ト
嫌	惡トニ意ヲ用フヘシ食ヲ進ムルヲ善スト雖モ絶
テ	食氣無キ者ニ強テ進ルヲ勿レ時宜ヲ料リテ口ニ
可	ナル者ヲ進ノヨ患者若シ日常ノ食物ヲ欲シ或ハ
稍	堅硬ノ物等ヲ嗜好スル症ニ遇ハ食時一盃ノ酒
ヲ	與ヘ消化ノ枕ヲ健運スヘシ

泰西熱病論卷四

