

泰西熱病論

六五

特別

79

1187

5



79
1127
5



泰西熱病論卷五

泰西

玉函夫古撒謨

著

加賀醫官

吉田成徳直心

譯

笹山侍醫

足立世茂松父

門人

沼津侍醫

程田國道玄悦

校

長府侍醫

松岡士藏道遠

痘瘡篇第九

夫痘瘡ノ善惡險易虛實寒熱等ノ各尚ジカラハル者
ハ皆其患者ノ流動質固形質成徳云ニ質共ニ第人人異ナ
ニ卷中ニ詳カナリ

泰西熱病論卷五

蘭學堂藏

ルヲ以テノ故ナリ此二質ノ天稟ニ因テ病ヲ受ルノ各
異ナリ其微ヲ明白ニ知ベキ者ハ天行病中ニテハ痘瘡
ノ一病最モ赫著ナリ

○第一患者稟受健強其纖維注前ニ牽張強硬血液優多稠
厚ノ者ハ痘瘡ヲ患レバ其熱皆熾烈ニシテ且必ス焮衝
熱ヲ兼ス其焮熱亦定處有テ無ク或ハ肺焮衝或ハ腦焮衝
或ハ咽喉焮衝及ヒ其他各部ノ大焮衝ヲ為ス痘瘡ニ腦
焮衝或ハ肺焮衝熱ヲ兼テ呼吸促迫スル者ハ刺絡ス
其刺ス所ノ血ヲ驗スルニ甚々稠厚粘膠且熱スルヲ烙ガ
如シ其症ハ脈數實弦緊呼吸短促シテ熱シ其熱甚フシ

テ烙ガ如ク小便濃赤色煩渴引飲口舌乾燥ノ苔ヲ生シ
頭痛背疼關節四肢大劇痛ヲ發ス凡ソ症是ノ如キヲ得
レバ天行正病其他諸熱ヲ論セズ皆刺絡セヨ大イニ奇
効ヲ奏ス然レバ其虛實寒熱ヲ辨セズ猥リニ刺絡ヲ行
フコトハ予敢テ為サザル所ナリ

○第二或ハ遷延神經熱成徳云第三卷ノ症ヲ夾ム者ア
リ是痘前已ニ虛憊ノ症ヲ患フル者ナリ其症ハ微熱遷
延ノ解セス精神困倦身體懈惰脈微弱ニシテ數又乍浮
乍沈乍乍大乍乍小定準有テ無シ面色青白萎衰小便
不熟成徳云尿ノ熱不熟ハ遷延神經ニシテ淡薄ナルヲ水ノ

素問卷五

痘瘡論

如ク煩渴壯熱ナク頭重ク且ツ旋運ノ休マズ又寒慄シ
肌肉潤動シ或ハ惡心或嘔逆シテ止ズ或ハ煩躁苦悶席
ヲ安ズルヲ能ハズ其他虛憊ノ症ヲ兼ヌ其症七八日替
留シテ未タ愈エズ痘隨テ誤スル者間亦多シ凡ソ此熱
ヲ夾ム痘ハ必ス良順ナルヲナク顆粒灰白色其漿清淡
ニノ水ノ如ク陷頂平塌曾テ起脹セズ又膿ヲ釀熟スル
ヲナク時日ヲ經ルト雖モ猶尚然リ遂ニ攢聚粘連シ片
又一片ト為テ地界ヲ分タズ或ハ大水疱ヲ為シ裡面ニ
ハ惡臭アル稀液ヲ滿タシメ起脹スルヲナク皮色萎枯
ノ死者ノ如ク終ニ黑色ニ變ジ膠固メ絶テ落ルヲナシ

此症偶死期ヲ過キ或ハ時日ヲ經ルト雖モ決シテ活路
ナク必死ス

○第三或ハ惡性腐敗熱成德云第四卷及ヒ血液焔解渙

崩成德云第二卷ノ証ヲ夾ミ各處ニ黯青黑斑ヲ發シ各

部ヨリ失血シ痘粒忽チ黑色ヲ成シ寒燥痘前ニノ如ク

ノ動モスレバ又痘粒ヨリモ血ヲ出ス此症間有リ世醫

多ク惑フアリ今考フルニ傳染ノ痘毒一ナルヲハ既

論ス其病ニ至テハ痘モ亦三種ト為ル故ニ其因証ニ從

テ各各治方ヲ異ニスベシ成德案スルニ痘瘡ノ三因ヲ

揚手言フベカラズト同意ナリ妙擧ク前ノ焔衝熱篇ノ三因ヲ

本草綱目論

○予怪ム當今鑿ヲ業トスル者其治ヲ施スニ至テ或ハ
 温熱ニ僻シ或ハ寒涼ニ偏メ嘗テ病ノ寒熱ヲ辨セズ是
 一ハ際田法名ハ一ハ麻兒名ハノ論ニ眩惑スル者ニシ
 テ蒙昧ノ甚キニ非スマ醫タル者ハ唯病者ニ臨テ能ク
 其虛實寒熱ヲ辨明シ各々治方ヲ異ニスベシ一偏ニ著
 シテ苟モ誤ルコト勿レ

○夫レ痘ハ或ハ已レ家ニ在テ感シ或ハ村落等ニ逍遙シテ
 感シ或ハ宗族朋友ヨリ傳染ス其病ムニ至テハ甲ハ甚
 タ順良ニシテ治シ易ク乙ハ甚險惡ニシテ又危篤ナルコトア
 リ又初ハ甚々順良ニ似テ漸ク稠密ニ漸ク攢聚粘接シ

地界分明ナラス遂ニ死ニ瀕スル者アリ此症徃々アリ
 是其狀態ハ順ニ似テ其因ハ實ニ險惡ニ近キナリ故ニ
 此痘ハ善惡兩間ニ懸在スル症トス是他無シ皆其患者ノ
 稟受各々不同ナルカ故ニ痘ノ險易モ亦從テ各異アリ是
 特リ痘ノミニ非ス諸病皆然リ此ニ人アリ甲ハ瑣瑣タル
 損傷抓破モ忽チ甚シク潰爛腐蝕シテ遂ニ惡性瘡瘍ト
 為リ乙ハ大イニ創夷ヲ負フト雖凡變メ瘡瘍ト為ルコト
 無ク又潰爛セズシテ愈ユ又人アリ一ハ焮腫ヲ患ヘ潰
 破メ膿穢去リ易ク一ハ寒燥痘前ニ注ス或ハ硬結腫或ハ癰
 腫ト為ル者アリ是皆稟受ニ從テ各同シカラザル證ナリ

○又痘瘡ニ感シテ發熱及ヒ其他ノ諸症モ極メテ微ニ
 ノ知ベカラザルカ如キ者アリ凡ソ大人小兒共ニ其痘
 極メテ順良ナル者ハ自然良知能ノカヲ以テ其毒ヲ擯
 出シ終始曾テ壯熱及ヒ其他ノ諸症ヲ發セズ坦然トシ
 全癒スルニ至ル又或ハ稟受薄劣皮膚嬌嫩ナル者ハ嘗
 テ痘ヲ患フト雖凡又他ノ痘膿其皮膚ニ觸レテ忽チ小
 疹ヲ發シ痘瘡ノ如ク又能ク膿ヲ釀熟スルヲアリ然レヒ
 發熱スルヲ無シ是其人先ニ痘ヲ患ヒ血質既ニ變スル
 カ故ニ其毒僅ニ皮下ノ腺ニ傳染スルノミニノ血中ニ
 侵入スルヲ無ケレバナリ○蓋シ痘瘡ハ生涯中ニ必ス

一患ヲ免ル、ヲ能ハザルナリ然レ凡稟受ニ因テ終身
 患ヘザル者アリ其人ハ患者ト共ニ起臥スト雖凡嘗テ
 感ズルヲナシ幼院ノ媪及ヒ藥局司ノ如キハ數年間多
 ク痘容ヲ瞻待スト雖凡遂ニ感スルヲ無ク偶數年數月
 シ隔テ後其患ニ嬰ルヲアリ是亦一種ノ異質ト云フヘ
 シ○種痘ハ一患者ノ膿ヲ以テ行フト雖凡其發スルニ至
 テハ各不同アリ或ハ稠痘或ハ稀痘是ヲ療スルモ亦難
 易アリ因テ考フルニ傳染ノ毒ハ一ニシテ其痘ノ善惡
 アルヲハ總テ血液ノ稠淡ト固形ノ弛張トニ係ルヲ明
 ナリニ質ノ原委ハ既ニ前論ニ詳ニス

○痘ノ流行スルヲ或ハ一般ニ順善ナルヲアリ或ハ一般ニ險惡ナルヲアリ或ハ始メ順善ナルヲアリ或ハ始メ險惡ナルヲアリ或ハ始メ險惡ニメ後順善ナルヲアリ皆是天地間
發升彌綸ノ蒸氣ノ性ノ變易ニ係ル其變遷ニ因テ人身
固形流動ノ二質ニ感ジ乃チ熱病ヲ生ス故ニ其熱モ亦
一樣ナラス或ハ熱病兼焮衝熱ニ嬰リ或ハ遷延神經熱
ヲ患ヘ或ハ稽留熱或ハ腐敗惡性斑熱或ハ痘疹等ヲ
病ムニ至ル皆蒸氣ノ發作變替ニ隨テ曾テ一般ナルヲ
能ハズ○又疫熱ニ感シ其病未タ愈ザル間ニ又痘瘡ニ
傳染セラレ、者アリ又頑惡ノ熱病中ニ痘ヲ兼ヌル者

アリ其痘ハ稀少ニノ粒々分峙スト雖最モ危篤ニ屬ス
此等ノ兼證分明ニ辨シ易キアリ又併病ト為テ分別シ
難キアリ○千七百四十年四十一年本邦元文五年及ヒ
千七百四十五年本邦延享二年ニ當テ天行正病大イニ流
行ス其症最モ凶猛ニノ傳染シ易ク浴門闔戸感ゼザル
ヲナシ殊ニ舟子軍卒罪囚等ニ多シ其中ニモ千七百四
十五年ニ流行スル所ハ尤凶惡ナリ其症皆惡性腐敗熱
兼痘ニノ多クハ皆死ニ至レリ然レモ或ハ近府ニ在リ
或ハ其人稟受善良ナル者ハ惡性腐敗ノ症ナク甚タ治
シ易カリキ曰テ考フルニ惡性腐敗熱兼痘ヲ患フル者

ハ其人或ハ飲食不良攝生不備或ハ獄中ニ在ルヲ以テ
 血質既ニ敗壞ヲ成スカ故ニ猖狂暴厲ノ極ニ至ルナリ○
 此千七百四十年ニ行ハル、所ハ上件ニ云フ症ノミニニ
 非ス猶許多ノ變症有シトハ其年ノ記ノ七月ノ條ニ見
 ヲ○予其説ヲ讀ニ曰當今流行ノ症其因ヲ尋ルニ皆人
 身ノ血液及ヒ諸液ノ異ナル所有ルヨリ發ス故ニ其傳
 染ノ發スル所ノ諸症尋常ノ熱病ト異ナリト是レ至當
 ノ論ニ非ス當時此言ヲ質正スル者無キカ故ニ其妄論ヲ
 傳フルト此ノ如シ○又當時一醫ノ醫案ヲ見ルニ一種
 ノ機那々々劑水銀劑ヲ作り解毒劑ト為シ奇功有ト云ヒ

概々此劑ヲ用フト云フ此方亦取ニ足ス凡ノ藥劑ハ甲
 ニ効アル者ハ乙ニ効無却テ害アルトアリ豈既メ此レ
 ノ用フル理アラシヤ妄亦甚シ機那々々水銀ノ二物モ
 症ニ從テ用フル時ハ皆大イニ奇功アリ○又案スルニ蓋
 シ人々天稟ノ性各々殊異ナリ故ニ其病ム所モ亦各不同
 アリ然ルヲ當時ノ醫此理ヲ辨知セズ纖維強硬牽張シ
 血液稠厚粘膠ノ患者ニ遇フト雖モ槩シテ皆機那々々
 劑及ヒ強心劑ヲ用ヒテ人ヲ斃ス者少ナカラズ歎スベ
 シ此等ノ劑ハ元來纖維弛緩衰弱シ血液稀淡乏少ノ者
 ニ用フ何シカ分辨ヲ用ヒザルヤ○問云水銀劑ハ血液

焯解渙崩セントスル症ニ用フルヲ的當トスルヤ答云此劑別ニ必用スベキ証アリ然ルヲ世醫動スレバ輕忽ニ此レヲ投シテ大イニ害ヲ遺_レアリ殊ニ痘瘡蕪_レ班失血瀉利等ノ者ニハ甚害アリ誤リ用フレバ命期ヲ促スルニ至ル○凡ソ醫タル者ハ常ニ内景諸器ノ官能機關ヲ辨明シテ心ニ記シ病ニ臨デ其因証ヲ諦明シ其常機ニ及スル者ハ是レヲノ常度ニ歸セシメ其置虚スル者ハ是ヲ充托シ有餘ハ乃チ減損ス夫病ハ非常ヲ以テ其物ノ自性トス故ニ順正ナラシメントシテ藥劑ヲ投スレバ必ス病ト抗争ス然レ後チ遂ニ戰ヒ勝テ常機ニ復

ス○今予カ此書ニ論スル所僅ニ數語ニ過キズ其說必ス奇ヲ談シ怪ヲ唱フルニ非ス苦心焦思シテ實驗ヲ集テ後學ヲ啓迪スル者ナリ凡ソ世人種痘ヲ行ハント欲セバ吾論定スル所ヲ熟讀シ其人ノ稟受ヲ考究シ能ク調理ノ後チ行フベシ

○既ニ調理ヲ經者ハ種痘ヲ行フベシ其毒傳染スルニ及テハ甚々順善ノ痘ヲ發ス故ニ自然ノ良知能ヲ以テ其毒ヲ排擯斥出ノ大イニ良功アリ若シ調理ヲ經ズ血液優多諸液酷厲ニノ腸胃中ニハ燥屎又ハ腐敗糞穢ヲ畜積シ或ハ攝生ヲ缺キ或ハ不良ノ飲食ヲ喫シ或ハ動

作ヲ廢スル等ノ人ニ謾リニ種痘ヲ施ス時ハ其症最モ
險惡ヲ成シ遂ニ死ニ至ルナリ凡テ種痘ノ法ハ預メ險
痘ヲ防ギ又患人ヲ調理ノ順痘ヲ致ス基本ト云フヲ標
的トシテ行フベシ○種痘ノ法ハ最モ順善ノ痘膿少許
ヲ取テ行フ其氣全身ニ彌滿スル時ハ頓ニ痘ヲ發ス其
痘必ス善良ニシテ治シ易シ世人種痘ハ痘ヲ促スルニ益
無シト云ヒ或ハ此術ニ因テ稀痘ヲ廢幾スルヲ無シト
云フ者ハ皆非ナリ○凡ソ種痘ヲ行フニハ能其人ノ稟
受ヲ實審シ施セ其標準ハ小兒無病壯健ナル者ニ尤モ
善ナリ大人ニハ種痘ヲ行フヲ勿レ古人種痘ノ善功ヲ

云フヲ枚擧スベカラズ予亦良法トス今考フルニ種痘
ヲ施ス者ハ其痘必順善ニシテ自然ノ痘ハ却テ危キヲ十
倍セリ

○凡ソ痘ハ稟受ノ強弱諸液ノ性質及ヒ時令ノ寒温燥
濕ヲ考ヘテ治療ヲ施セ此事持リ痘瘡ノミナラズ天行
正病及ヒ諸病等皆然リ治ヲ施スニ此意ヲ寓セバ功ヲ
取ルヲ難キニ非ス今其徵ヲ左ニ列ス

○患者元來無病強實ナル者ハ纖維ハ牽張強硬血液ハ
稠厚粘膠ニシテ諸脈管ニ充填ス諸液ノ盈虛亦是レニ準
ズ然ル如キ者ハ常ニ熱病兼嗽衝熱ヲ患テ尤酷烈猖獗

ナリ此等ノ質ハ纖維軟弱血液稀乏ノ者ニ較フレバ瀉劑刺絡等良効アリ

○故ニ多血強實ノ人ハ痘初ニ當テ早ク刺絡シ其病勢ヲ減挫スベシ若シ刺後愈烈シキ者ハ再ヒ刺絡セヨ又其人肌膚肥充脈實大強緊壯熱解セズ呼吸熱ノ促迫シ顔面赤メ盈潮シ眼目帶赤色譫妄等ヲ為シ又大イニ頭痛シ眼目焮痛シ且ツ頸及ヒ顛顛ノ動脈築動搏激スル一甚シキ者ハ是腦及ヒ腦膜焮衝熱ノ候ナリ速ニ治シ難シ此ノ如キ症ハ腕前ニ注スヲ刺ス後子又足部成德案スルニ膝後橫紋ヲ刺シテ大イニ良効アリ○此症ニ刺絡ヲ忌レバ

痘發見スル一無ク或ハ發スルモ期ニ後ル、ナリ○若シ血液靈液共ニ運動急疾過度ニノ腦ニ上逆攻衝スル時ハ自然良知能ノ運營ヲ障碍スルカ故ニ其毒ヲ釀熟シ包攝圍繞シテ排擯斥出スル機ヲ失ハシム○又熾盛熱及ヒ熱病兼焮衝熱ハ微汗ヲ發スル前一回或ハ二三回刺絡スルヲ要トス○又病毒漸々ニ釀熟スルニ至テハ顆粒ハ鋪排磊落ナルヲ善トス此時ニ當テ諸部排出ノ道ヲ成德案スルニ即ニ便汗唾等ノ道ナリ開達スルヲ要トス其道ハ便宜ニ從フベシ若シ開達ノ術ヲ待タズ自然ニ尿中ニ多ク白塗ヲ下ス者ハ遂ニ熱減シ病除ク兆トス○又諸部ノ

運行急疾劇烈猖獗ニノ粒顆一齊ニ湧出シ三十時成徳
邦晝夜ヲ二十四時ニ分ツ故ニ三十時ハ一日半ナリ經テ其熱猶解セザル者ハ
 多クハ死ス○大凡刺絡ヲ施ス一遲速其時ニ適スレバ
 良知能ヲ虚衰セシメズ靈液ノ運行急疾ヲ鎮メ神氣流
 轉ノ勢力牟戾セズ因テ各部ヨリ病毒ヲ分利スルノ雄
 カヲ厲シ靈液神氣共ニ憤發充溢シ諸器ヲ衛護シ病毒
 ヲ排出ス

○病毒頭胸間ニ畜積スル者ハ足部ニ刺絡ヲ行フベシ
 病ヲ去一迅速ナリ其症從テ盛ナレバ從テ是ヲ行フ○
 若シ患者刺絡ヲ恐ル、者ハ見點前或ハ見點ノ時ニ臨

テ温湯或ハ温乳加湯ヲ以テ頃刻ノ間足脚ヲ浸浴スル
 一日ニ二三度浴シ終テ牛乳ニ蒸餅シラクヲ和シ糊劑トナシ
 或ハ蔓菁ヲ煮熟ノ糊ノ如クシ或ハ其他此ノ如キ類ヲ
 足ニ貼スベシ此等ノ方屢用ヒテ屢効ヲ得タリ又逆痘
 ニ施シテ最モ善ナリ千七百二十四年五年本邦延享
元年二年當ノ痘ノ如キ皆此術ヲ用ヒテ良効ヲ得タリ是レ近キ
 一証ナリ此方ハ大イニ血液ヲ下部ニ下降シ頭胸ヲ寬
 暢開緩ス其血液ノ下降ニ從テ痘毒ヲ足部ニ轉輸シ且
 ツ餘痘モ亦發出シ易ク殊ニ粒數ヲ減少セシムルニ至
 ル○温浴法ノ血液ノ運行急疾ヲ減スルハ殆ント潤灌

劑ヲ内用スルト其理一ナリ是以テ此法ヲ施ストキハ
痘故ニ足脚間ニ發ス又其糊劑ヲ貼スル部分ハ痘發出
セント欲メ大イニ痛ヲ起ス○凡ソ痘瘡ハ頭頸胸ニ夥
多ナルヲ忌ム羅思注前ニノ如キ頭面ニ多發スルハ下部ニ
發スルヨリハ甚タ危篤ナルト其理一ナリ故ニ痘瘡ハ
總テ頭面ヲ被覆ノ熱薰セシムルヲ勿レ或ハ痘出齊前
ニ髮ヲ剃ルベシ多髮ノ者ハ尤此法ヲ行ヘ然ルトキハ
頭顱薰蒸ノ患無クシテ痘粒増數ノ勢ヲ減シ又殊ニ危
証ヲ免ルナリ○若シ發熱甚シク暫留ノ解セス痘ノ
發見遅ク且ツ逆候アル者ハ温浴法ヲ用フルト瘡ニ足

脚ノミナラス手臂全軀ニ至ルマテ皆施スヘシ○予一
小兒ノ尙儂ヲ療ス冷水ニ浴スルヲ毎日一度嘗テ再浴
セシムルヲ無シ愈後此兒久シキヲ經テ痘ヲ患フ其冷
水浴法ニ因テ表被厚硬シ痘ノ發見常期ヨリ遅カリキ
○又一男兒尙儂ヲ病ム亦前法ヲ用ヒテ愈フ壯年ニ及
ンテ尤モ無病勇悍ナリキ然ルニ痘瘡ニ傳染セラレ其
序熱甚シク渾身壯熱シテ烙カ如ク六日ニ至テ未タ放
點ヲ見ス予乳水相合シ浴湯ヲ作り足部ヨリ胸部ニ至
ル迄ヲ浴浸ス因テ痘始テ放点セリ其痘殊ニ稠密ナリ
ト雖モ亦甚タ善ニノ遂ニ愈タリ前件ニ學ル兒モ亦此

法ヲ用ヒテ愈タリキ○此浴法ハ膏ニ頭胸ヲ通暢シ病
毒ヲ下部ニ輸ルノミナラス殊ニ内景諸部ノ病毒ヲ速
ニ體表へ發達シテ放點シ易カラシム是レニ因テ内景
諸器ノ勢力大イニ健運充盈シ靈液通暢シ神氣揚發シ
テ生命ヲ保全シテ癆厲招攝ノ禍ヲ被ルナシ若シ然
ラスノ肺及ヒ下腹ノ諸臟ニ痘瘡ヲ鬱發スレハ必ス死
ス○此法予カ新説ニ非ス嘗テ刺^ラ設^セ修^シ私ト云フ者薰蒸
ノ法ヲ作テ痘ノ起脹放點シ難キ者ヲ發見セシ一アリ
○又平常強實多血ノ者ニ痘ニ嬰テ頓ニ精神沉衰シ
憂愁鬱悶ノ安靜ナラス且ツ多ク虚候ヲ見ハシ脈沉微

ニ變スル者アリ不學無術ノ醫此症ニ會フ時ハ皆刺絡
ノ可否ヲ辨セス疑テ謂ヘラク刺絡ヲ施サハ虚衰ヲ助
ケン若シ為サレハ血液粘厚ニ變ノ危篤ニ至ラレト
恐懼ヲ懷テ心決セス術盡テ手ヲ下ス處ヲ知ラス然レ
凡是レ他故ナシ此症ハ患者豫メ痘ノ可否ヲ慮リテ恐
怖ヲ懷キ神志安ラスノ然ルナリ是以テ多クハ壯年ノ
人ニ在テ小兒ニ在ル一稀ナリ刺絡ヲ施メ害ナシ但老
人ハ刺スヘカラス此症痘毒初メヨリ靈液ニ浸入スル
ノミナラス且ツ其心志不安ナルヲ以テ自然ノ良知能
ク乖戾錯亂シ心臟及ヒ諸脈ノ張弛且ツ管内ニ容裏ス

ル處ノ血液ト皆運動衰微シテ常度ノ如キ一能ハス是
 レニ因テ血中ヨリ分利泌別スル諸液ノ道路ヲ失シ殊
 ニ靈液流瀉セス蒸氣ノ閑達少フメ舊癢老朽ノ諸液皆
 血中ニ鬱蓄ノ血液ノ量度大イニ增多シ尿管中ニ充填
 シ其運行遏住癢類シテ脈沉微ヲ見ハスナリ此時ニ當
 テ刺絡ヲ施セハ其脈却テ實ス是レ其增多ノ勢減スル
 カ故ニ血液處ヲ得テ稀渙流瀉シ易ク勢力憤發メ尿管
 ノ弛張モ亦常度ニ復シ靈液能ク流瀉シ諸分利ノ道路
 悉ク閑達ス故ニ此症ハ必ス刺絡ヲ要トス然レ凡一頓
 ニ瀉血スル一勿レ屢指端ヲ以テ鍼孔ヲ掩ヒ一放一閉

徐々ニ瀉スヘシ最モ症ニ從テ適ヲ取レ然ラサレハ患
 者ヲメ昏冒失氣セシム又刺ス時ハ患者ヲシテ倚ニ靠
 ラシメ或ハ仰卧セシムヘシ成德案スルニ瀉血ニ因テ失氣スル者ハ既ニ血液充
填シ尿管牽張ニ過ルヲ頓ニ其勢ヲ挫カ故ナリ此ノ前
 編各處ニ詳説ス併セ考フヘシ凡テ瀉血ハ皆人ヲ虚セ
 シメテ失氣セシムル者ニハ非ス然ルニ支那ノ醫學ニ
 從事スル者其刺度ノ宜キヲ失スルヲ論セス總テ治療
 ニ益ナシト云者有ラン故ニ今此贅言
 ヲ述ヘテ聊カ世ノ蒙者ニ諭スナリ
 ○前法ノ如クスト雖モ患者彌恐懼ヲ懷キ神志樂マス
 憂愁鬱悶スル者ハ主トメ良知能ヲ健強シ活潑憤起セ
 シムヘシ其法ハ強心劑良ナリ附録ニ數方ヲ載ス○又瀉血後患
 者大イニ恐懼ヲ為シ神志沉重シ痘粒皮下ニ隱々トシ

テ快透セサル一三四日ナル者ハ強心劑ヲ用フル一尤モ良ナリ是レヲ捨テ用フヘキ方ナシ

○凡ソ痘瘡ヲ療スルニハ熱性ノ飲食及ヒ過温ニスル事件ハ皆宜キ處ニ非ス殊ニ初時ニ在テハ尤モ惡ム處ナリ故ニ予世人ノ熱食ヲ用ヒ温蒸セント欲スル症ニ遇ヘハ能ク其症ヲ實審シ必ス蕪疱膏ヲ施ス此法諸脈管ノ搏動弛張ノ癢類スル者ヲ能ク刺衝攻動シテ其勢カヲシテ憤叢セシメ且ツ病毒ノ内陷淪没セント欲スルヲ垂死間ニ救フナリ然レ凡擐リニ期ニ先チテ卒爾ニ施ス一勿レ唯其痘粒喉舌鼻孔等ニ遍敷スル者ハ用

フヘシ餘ハ是レヲ用フル一勿レ○痘ニ嬰ル初ノ咽喉

口舌險痛刺戟シ大熱且ツ聖京健レニキニ健ニ前ニヲ挾テ鼻塞テ

通セス噴嚏止マス咳嗽綿々タル者ニハ早卒ニ蕪疱ヲ

施ス一勿レ能ク其時ヲ察シ症ヲ考ヘテ此ヲ施セ然ル

時ハ大ニ奇効アリ其着法症候左ニ列ス○第一患者噴

嚏ヲ發メ止マス口臭ヨリ酷厲ノ涕唾流泄スル者アリ

凡ソ平常ニ在テハ其鼻内ノ膜ニハ小腺ヨリ涕ヲ分利

シ鼻内ノ諸部ニ布抹シ從テ流泄スルナリ然ルニ今其

處ニ痘毒侵襲ス故ニ自ラ是レヲ除カントシテ噴シテ

涕ヲ流スナリ若シ痘瘡咽喉鼻内ニ二三顆ヲ發スルハ

外表ノ諸部ニ數顆ヲ發スルヨリハ其險惡ナルヲ百倍
セリ發スルトキハ大イニ疼痛シ呼吸促迫飲食嚥下シ
難シ此症ニ遇ハバ或ハ含漱劑ヲ以テ口裡ヲ潤灌シ或
ハ水銃ヲ用テ口内ヲ清滌セサレハ動モスレハ絶テ飲
食ヲ嚥下スルヲ能ハサルニ至ル是レ尤モ險惡ノ症ナ
リ又聖京健ノ酷厲毒其部分ニ侵襲シ始メハ大イニ涎
ヲ流シテ止マス晝夜不眠シテ唇舌咽喉ノ皮剥脱シテ
大イニ痛ヲ為シ眼目閉クテ少ク僅ノ飲食ト雖モ嚥下
シ難キニ至ル者アリ此症ハ速ニ項及ヒ耳後ニ發疱膏
ヲ貼ス時ヲ失フヲ勿レ

○第二患者元來纖維軟薄虛脆血液匱乏淡薄且ツ頃日
大イニ刺絡ヲ行ヒ或ハ下利ヲ患ヘ尋テ痘瘡ニ傳染セ
ラル、者ハ刺絡ヲ行フヲ勿レ其患者皮膚滑澤ナラス
痘色淡白其脈虛數ニメ定マラス精神沉衰不舉小水淡
白不熟鹹渣多ク或ハ清利シ寒熱往來アリテ間發熱ノ
狀ノ如ク身體疼痛セス胃中拘急且ツ眩暈等アル者ハ
急ニ設古酒泊夫藍相和シ少シク強心劑及ヒ強神經劑
ヲ兼用セヨ乃チ解稠飲或ハ蒲桃酒清水ニ味各等分
相合シ微温ニシ用フ措其他此ノ如キ類ヲ撰用セヨ然
テ揮發ノ灰汁鹽及ヒ精又ハ蛇皮木火酒或ハ醱烈ノ蒲

桃酒等ヲハ用フルヲ勿レ多服スレハ大イニ害アリ其
 中チニモ患者大イニ精神沉衰虚憊スル者ハ蒲桃酒ヲ
 多ク用ヒテ大効アリ且ツ糞痲膏糊劑等ヲ足部ニ貼シ
 是レヲ以テ刺衝攻動シ良知能ノ勢カヲ憤發充張セシ
 ノヨ又此症ニ温浴法ハ良計ニ非ス用フルヲ勿レ○又
 患者精神沉衰シ且ツ逆候多ク期ニ至テ放點セス僅ニ
 皮下ニ隱然シ或ハ全ク糞見セス或ハ三四粒ヲ糞スト
 雖モ其色紅潤ナラサル者ハ輕キ吐劑ヲ用ヒヨ○又此
 症ニ良知能ノ健カヲ以テ病毒ヲ排斥セントシテ自ラ
 吐ヲ糞スル者アリ其勢僅ニ胃中ノ瑣々タル穢物ヲ滌

除スルノミニシテ胃及ヒ肝膽等ニ腐敗糞壞及ヒ腐敗
 膽液等ノ鬱聚ノ嘔吐止マサル者ヲ強除スルニ足ラス
 故ニ此時ニ當テ吐藥ヲ與ヘ其勢ヲ快達シ其舉動ヲ扶
 助シテ痛滌セシムヘシ○凡ソ嘔吐ヲ促シ蒸氣ヲ催シ
 微汗ヲ取ルヲハ皆能ク痘ヲ皮表ニ達セシムルナリ又
 考フルニ嘔吐ハ血液ヲ腦中ニ逆上セシム故ニ痘ノ初
 發ニ在テ強テ吐劑ヲ與ルハ善ナル處ニ非ス又患者多
 血ニメ刺絡ヲ為スヘキ症ニ或ハ吐劑ヲ用フルヲアレ
 ハ大イニ異症變候ヲ糞ス又良知能ニ因テ病毒ヲ排擯
 セントシテ嘔吐止マサル者アリ是レヲ治スルハ益ナ

シ務テ其吐ヲ促シ胃中ニ在ル處ノ病毒ヲ驅除シ盡セ
ハ嘔自ラ止ム又考フルニ良知能ニ因テ病毒ヲ排擯セ
ント欲ノ發スル嘔吐ハ潤灌劑ヲ用ヒ其勢ヲ助ケ起發
セシムレハ嘔吐止テ且ツ先時ニ比スルニ精神開暢メ
痘モ亦發出シ易ク且ツ痘發シ盡ルニ至テ吐亦全ク止
ム故ニ嘔吐アル者ハ遏止スルヲ無ク却テ發起セシム
ヘシ又吐後ハ足心ニ大イニ糊劑ヲ貼ス是レ痘ヲメ發
シ易カラシメ且ツ善症ニ至ラシムルナリ

○凡ソ吐劑ハ吐ヲ取ルノミナラス通利ノ功アルヲ以
テ兼テ腸中鬱積ノ燥屎及ヒ腐敗膽液變澁餒穢ノ物ヲ

下サントナリ故ニ吐後ニ大便通利無キ者ハ和柔清涼
ノ水銃法ヲ用ヒヨ其諸病ニ良効有ル者ハ刺蜜酒石鹽
宣腸鹽皆附録ニ載ス大黃等ナリ吐藥ヲ用ヒテ後チ下利甚シ
キ者ト雖モ猶大黃少許ヲ取り煮テ湯ト為シ水銃法ニ
用フヘシ

○天地間ノ蒸氣ニ善惡アリ故ニ其氣ノ人ヲ侵スル各
異アリ惡厲ノ者ハ人ヲ惱マシ人ヲ傷リ遂ニ病ヲ生ス
○此蒸氣ノ作用舉動ニ因テ天行正病ノ流行スルハ
既ニ前篇各處ニ説ケリ其中チニモ痘瘡ノ流行ハ勢最
モ盛ニノ其遍廣スルヲ比スヘキ者無シ天行正病ハ此

ノ如ク盛ナラス假令ハ痘瘡ハ一府中ニ流行センニ僅
ニ一隅ニ起レハ頓ニ諸道ニ及ヒ公門闔戸遍布シ殘サ
ゞルニ至ル天行正病ハ是レニ異ナリ且ツ溽暑ヨリ寒
燥ニ趣ク時ハ即チ止ム○又一般ノ天行正病ト雖モ厲
氣勃張ノ時ト衰減ノ時ニ從テ其傳染ノ狀一ナラス且
ツ人ノ血管同シカラサルニ因テ亦異同百般アリ故ニ
其厲氣ノ衰旺ニ從テ治療ノ法モ亦斟酌スヘシ

○大凡時氣寒燥スレハ人身ノ纖維牽張強硬シ充張勢
力強ク血液稠厚粘膠ナリ然レトモ其血ハ腐敗スル
ナシ是以テ寒燥ノ氣ニ感スル患者ハ其症候モ時氣ニ

從ヒ皆寒燥ノ候ヲ見ハス故ニ血管腐敗ノ患無ク粘凝
稠厚ヲ成スナリ此症ハ斷シテ刺絡ニ宜シ溽暑鬱蒸ノ
時ニ當テ纖維弛緩シ血液渙散スル者ハ高量シテ瀉血
ヲ用フルカ如キニ非ス又藥ハ潤灌劑和柔清涼ノ藥食
ニ宜シ濕蒸ノ時ハ強心劑收斂劑復敗劑等ニ宜シ

○又考フルニ時氣ノ人身ニ感スル極寒燥ノ時ト極
熱燥ノ時ト其處為一ナリ試ニ見ヨ大人小兒此等ノ時
候ニ痘瘡ヲ患フル者ハ共ニ流唾スル少シ其故ハ此
等ノ時候ハ共ニ能ク津唾ヲ凝結ス是以テ極寒ノ時ニ
用フル藥劑ハ極燥ノ時ニ用フル劑ヲ宜トス其劑ハ潤

灌劑ナリ此劑ハ濁唾ヲ吐出セシムルカ故ナリ時氣ノ
 人ヲ感スルヲ恃リ此二氣ノミニ非ス殊ニ寒濕少晴ノ
 時氣等ハ能ク聖シ京ヤシ健カシ注前一ヲ誘シ發シテ衰ヒ憊ノ狀ヲ為シ
 兩病併合シテ其症甚タ烈キヲアリ○又初ノハ痰唾能
 ク流泄シ後チ絶テ出サレ者アリ終末ニ口舌咽喉ノ薄
 皮剥脱ノ大イニ疼痛ヲ為シ眠睡嚙下共ニ障碍セラレ
 嘗テ安靜ヒス是以テ此症ハ其初ノニ當テ痰唾ヲ吐ス
 ルトハ佳候ナリト雖モ多ク流泄スル者ハ又甚タ惡ム
 處ナリ殊ニ酷厲ノ液ヲ吐スル者ハ其禍淺キニアラス
 ○又流唾ヒス後チ一頓ニ酷厲ノ痰唾ヲ吐キ口舌咽喉

ノ皮剥脱スル者アリ此痰唾ノ性ハ別ニ一種ノ毒アル
 者ナリ今感冒ノ涕唾ニ就テ云ハンニ尋常感冒ノ涕唾
 ハ稀淡無味ニシテ流着ノ痕モ皮膚ニ害ナシ然ルニ一
 種ノ涕唾アリ其狀ハ稀淡ニノ酷厲ノ氣アリ且ツ惡臭
 アリテ其觸ル處ハ鼻内咽喉口舌皆其薄皮ヲ傷脱ス是
 レ上件ニ所謂ル痰唾ト同シキナリ○又厲氣ノ性ニ因
 テ患者大イニ痰唾ヲ流泄シ痘粒水漿ノミニノ熟ヒス
 其狀透亮ニノ恰モ水精ノ如キ者アリ是レヲ水精痘ト
 名付ク其因ハ凡ソ濕霧寒冷ノ時ニ在テハ人身中ノ勢
 カ虚衰ス是レ唯脈管ノ維持牽張ノ力衰へ血中ニ硫氣

侵襲シテ寒ヲ為スノミナラス成徳案スルニ世人硫黄
ナリ凡フ百物皆製煉シテ精ヲ取リ其精ニ就テ寒熱温
涼ノ性ヲ定ム今試ニ硫黄精ヲ嘗ルニ極ノ酸烈ニ用
石膽焰硝等ノ精ト一般ナリ故ニ西醫ハ三品相通シ用
フ禮墨燧云硫黄ハ石膽ノ酸多ク其性清涼ナリ夏月
成ル者ナリト又云硫黄ハ酸多ク其性清涼ナリ夏月
モ酒ヲ冷カニスヘシト其性ノ涼ナルヲ知ルヘシ總テ
天地間ノ酸氣ハ皆硫黄ノ性ニ因テ寒ナルヲ知ルヘシ
リ故ニ此ニ血中ニ硫黄ノ性ニ因テ寒ナルヲ知ルヘシ
ノ硫黄ノ性ニ因テ寒ナルヲ知ルヘシ今ニ一ニ予カ選スル
蘭藥鏡原總テ寒氣ノ為ニ人身ノ蒸氣大イニ壅塞スル
ニ載ス
カ故ニ諸液皆酷厲ヲ成シ鹹渣モ亦外泄スルヲ無ク却
テ内部ニ鬱畜ス此時ニ當テ虚衰ノ患ヘ無キヲ能ハス
是レ水晶痘ニ至ル所以ナリ又時氣ニ因テ痘皆小疱細

疣状ヲ成シテ黒色ト為リ或ハ少シク涎唾ヲ流シ或ハ
絶テ流泄セサル者アリ此症ハ東北風又シク吹テ止マ
ス乍チ甚熱乍チ甚寒ナル時氣ニ多シ○又異常ノ飲食
動作ニ由テ治スルヲアリ皆其時氣ノ寒温燥濕ヲ考ヘ
テ施スヘシ大効ヲ得ルヲ有リ

○水精痘ハ嘗テ能ク熟スル者アラス此痘ハ期ヲ過レ
ハ稀水變シテ惡臭ヲ生シ皮破レテ攢聚粘連シ片又一
片ト為リ一大疱ヲ成シ終末ニハ其縁邊潰爛糜蝕シ殆
ント潰瘍ノ如ク或ハ獸皮ヲ剥クカ如シ此ノ如ニメニ
三十日間ニ漸々ニ侵淫シ上下連蝕シテ一大潰瘍ト為

ル者アリ成德案スルニ是レ世又潰瘍ヲ成サス直ニ勞
 瘵ニ變スル者アリ然ル時ハ從前ノ酷厲腐敗ノ飲液稀
 淡不熟ノ惡液等外泄スルニ路ナク却テ血中ニ還流ス
 因テ再ヒ皮表ニ小疱ヲ發スルヲアリ然レ凡皆空痘ニ
 ノ活勢ナシ此時ニ當テハ癩瘰擅掉肺焮衝熱譫妄赤痢
 昏暈其他諸症ノ錯亂奇狀互ニ發メ止マズ遂ニ死ニ瀕
 スルニ至ル然レ凡患者幸ニ自然良知能ノ扶助ヲ得テ
 病毒ヲ大便ヨリ下泄スルヲ度ニ適シ且ツ小水大イニ
 快利シ其色濃赤ニメ滓塗有ルハ是レ將ニ愈ントスル
 兆ナリ若シ大便黑色ニメ血ヲ交ヘ或ハ膿血ヲ夾ミ小

膿緊滿絞痛スル者ハ是レ腸寒燥痘前ニ注スノ徵ニシテ必

ス死ス○又發疱膏ヲモ貼セサルニ小便淋瀝シ數尿セ

ントシテ快通セサル者ハ是レ大イニ惡候ナリ成德案

發疱膏ヲ貼スルニハ必ス龍腦或ハ牛乳或ハ核乳劑ヲ

服セシム然ラサレハ淋瀝ヲ發スルカ故ナリ今發疱膏

ヲ貼セス淋瀝スルナリ○凡テ痘瘡ハ自然ニ微汗アル

ハ善徵ナリ水晶痘ト雖モ微汗アル者ハ甚タ善徵トス

○又痘粒不熟且ツ破壊シテ惡臭アル汚汁蒼液ヲ流シ

皆膿ヲ釀スヲ無ク皮膚痘粒共ニ灰白色或ハ天藍色ヲ

為シ其脈弱ニシテ力無ク口ニ涎唾ヲ流シテ止マズ小

便清利メ不熟ナル者ハ南五味子根末沒藥麝香泊夫藍

龍腦的里亞加或ハ彌的利達亞多達莫古刺地私附録ニ
 強心糕子成徳云附録ニ載ル強心糕子瑪腦糕子ノニ方
方ナリ等ノ温暖健強ニスル劑ヲ撰用セヨ此等ノ劑ハ
 能ク痘ヲメ起脹セシメ又能ク極メテ灌膿セシム又兼
 テ潤灌劑ヲ用ヒヨ即チ解稠飲附録ニ畧未君獨畧護
 煎其方ハ詳カニ等ナリ又適宜ノ潤灌劑ハ骨喜ニ附録ニ
附録ニ載スス牛乳少許ヲ加ヘ日ニ一盃ヲ飲下セシム終始是レヲ
 用ヒテ大イニ奇効ヲ奏ス此劑又稀淡液中ニ酷厲氣ヲ
 夾ミ遂ニ變メ汚汁糞液ヲ成シ咽喉鼻間ヲ刺戟シ刺戟
 ニ因テ咳嗽ヲ生スルヲ治ス尤モ咳嗽ノ微甚ニ從テ其

劑量ヲ増損ス

○又催眠藥ハ尤モ的中トス即チ的里亞加或ハ的里亞加
精附録ニ等ナリ皆催眠糕附録ニヲ和シ用フ蓋シ催眠
 藥ノ服量ハ幾錢ト云フヲ限ラス唯患者ノ安睡スルヲ
 以テ準トシ止ム誤テ安リニ多服セシメテ昏睡不醒精
 神不爽ノ症ニ陷ラシムルヲ勿レ是レ催眠藥ヲ用フル
 戒法ナリ又催眠藥ヲ用ヒテ眠ラサル者ハ必ス譚妄シ
 精神錯亂等ヲ發ス○又見點出齊出齊ノ時ニ當テ世醫先ツ
 養神劑ヲ與ヘ又多時ナラズシテ熱性ノ強心劑ヲ與フ
 ル者アリ是レ大イニ錯誤ニ屬ス凡ソ養神劑ハ精神ヲ

安鎮センガ為メナリ然ルニ次テ強心劑ヲ與ルハ殆ト
 烈毒ノ品ヲ與ルニ異ナラズ已ニ養息スルノ劑ヲ與ヘ
 又從テ此レヲ攪動ス安モ亦甚シ催睡藥ヲ用フル後テ
 熱性ノ強心劑ヲ投スレバ須臾ニ顛狂譫妄等ヲ發シ其
 狀一二虛弱ノ患者惡寒戰慄精神沉重シ將ニ死ニ向ハ
 ントスル態ノ如シ是レ全ク誤治ノ然ラシムル所ナリ
 ○又世間阿芙蓉ヲ用フル分量ヲ領解スル者ナシ予按
 スルニ阿芙蓉ヲ用フルハ人ノ稟受ニ從テ其効各異
 ナリ甲ノ虛弱ナル者ハ少許ヲ用ヒテ大イニ野睡ス乙
 ノ強實ナル者ハ甲ニ用フル四倍ノ分量ヲ一頓ニ服セ

シムルモ甲ノ睡ヲ催サズ是レ稟受ノ異同ニ因ル又按
 スルニ催睡糕ハ養神劑ナリト雖モ其力阿芙蓉ニ劣レ
 リ故ニ先哲モ亦阿片ヲ代ヘ用フ但シ其量初メハ少々
 ニ與ヘ漸ク以テ是ヲ増ス

○其因症ヲ察シ藥劑ヲ用フト雖モ其藥ノ力ヲ以テ稀

淡酷厲液

成德案スルニ痘粒中ノ清稀ノヲ熟シ稠厚ヲ

成シ因テ膿ト為ス一能ハズ將ニ内陷セント欲スル者

ハ必ス養神劑ヲ用テ其痘ヲ充托シ熟セシメ且ツ膿ヲ

釀サシムベシ是レ缺クベカラザル術ナリ又稠痘ハ阿

芙蓉ノ力ヲ借ル一甚タ多シ殊ニ病ノ最極ニ至テ痘粒

疼痛ヲ為ス者ハ必ス是レヲ用ヒヨ若シ其症涎唾甚タ
膠厚ニメ吐シ難ク呼吸促迫スル者モ亦前方ヲ用ヒ兼
テ一齊ニ麩モ謨ム銜ム莫モ泥ニ亞ア加カ脂ジ名ナ或ハ解粘泥附録ニ等ヲ
撰用セヨ

○又水晶痘ニハ發疮膏緊要ナリ此レヲ貼スレバ諸部
ノ毒液ヲ驅リ引テ貼處ニ喲集ス故ニ其貼處大イニ水
疱ヲ起ス其時ニ及ンテハ諸部ノ痘粒皆起脹ノ灌膿ス
疱ハ鉸針ヲ以テ破リ其水ヲ去リ又隨テ膏ヲ貼ス又其
痘モ灌膿セバ破テ膿ヲ去テ速ニ收靨セシムルヲ一大
緊要ト為ス此レヲ破ルニ金鍼ヲ用フ其法一ニ亞貯チ梅

那人ノ説ニ從フ其書ニ就テ考フベシ大凡痘自然ニ收

靨落痂スルニ任スル時ハ一ニハ愈後必ス瘡痕ヲ殘シ

又一ニハ其毒氣ニ因テ寒燥痘前ニヲ生シ又一ニハ其

壞汁養液ヲ再ヒ血中ニ歸入セシメ大イニ禍ヲ生ズル

トアリ故ニ自然ニ先チテ膿ヲ去テ良トス成徳案スル

或ハ待トキハ其害アルト知リ易キ理ナリ然トモ世人

或ハ和蘭ノ醫術ヲ見テ諸事慘酷ニ過ルト云フ者多シ

故ニ今其理ヲ述ニ凡ソ自然ノ落痂ヲ待トキハ未タ

結痂セザルニ倒靨ヲ生シ瘡人命ヲ損スルト少カラズ

幸ニメ鬼籙ヲ免ルモ斑痕ヲ殘メ人ノ顔色ヲ破ル然

ルヲ俗習ノ甚シキ灌膿ノ時ニ當テハ窄袖ヲ作テ其

膿ヲ覆護スルニ至ル其狀恰モ至寶ヲ藏スルガ如シ是

レ盜ヲ庫中ニ養ヒ仇ニ兵ヲ假ス類ニシテ愚ト云ベシ

是皆人命ハ何ノ機關有テ存スルト云フヲ知ラザル

明シ其活用ヲ暗記
セシ肝要ナリ

○又滲利劑最モ要タリ強心劑附録ニ治疫劑ニ此レヲ加
 用セヨ其品ハ琥珀揮發鹽焰硝又焰硝緩精附録ニ及ビ
 此ノ如キ類ナリ凡ソ勉テ滲利ヲ行フハ痘毒ノ出去ル
 ベキ道路ノ壅塞スルニ當テ用フルヲ要タリ若流涎閉
 止スレバ患者必ス眼光無勢粒頭平塌シ腫脹消シテ顔
 色沉衰ス此時ニ當テ滲利劑ヲ施ス時ハ其症頓ニ善候
 ニ復ス然レモ猶繼續シテ是レヲ與ヘ且ツ患者ヲシテ
 數小便セントスル勢ヲ為サシメヨ然スル時ハ便勢ヲ
 扶ケテ大イニ快利セシム

○又或ハ稀瀉歸屬前ニ内服ハ胎ル者アリ其症最モ

兇險ナリ此症アル者ハ人身ノ良知能ヲ以テ其毒ヲ驅
 除センカ為メニ小兒ハ瀉利ヲ畏シ大人ハ多ク涎唾ヲ
 流ス故ニ其瀉利ヲ急ニ閉遊スルヲ勿レ微々ニ大黃ヲ
 與ヘ兼テ收斂催眠藥ヲ投セヨ即チ畧未君獨煎成徳云
ハ詳カニ附又或ハ龍蘓煎附録ニ或ハ玫瑰灌附録ニ等
録ニ載スナリ最モ的中トス若シ誤テ他藥ヲ以テ大イニ下ス者
 ハ催眠糕附録ニ或ハ的里亞加ノ水鉦法ヲ行テ是レヲ
 止ムヘシ然レモ水鉦法ヲ用ヒテ猶止マス愈下利數十
 行ニ至ル者ハ兼テ強壯收斂ノ藥劑ヲ以テ救フヘシ最

至緊要タリ

○予世醫ノ水晶痘ヲ療スルヲ見ルニ草木金石類ノ酸
 收液ヲ用フ然レモ未タ効アルヲ見ス凡ソ酸收液ヲ用
 フル者ハ其痘粒小ニシテ稠多且ツ攢聚粘連シ裡面ニ
 腐敗惡液ヲ畜フルヲ多ク是レヲ水晶痘ニ比スレハ惡
 臭有テ且ツ腐敗ノ膿ヲ畜ヘ其汚氣人ヲ薰シ膿中ニハ
 又別ニ稀水ヲ含ミ其水稍臭氣アル者有リ又全ク無キ
 者アリ此ノ如キ症ニ遇ヘハ必ス大イニ此液ヲ用フ○
 予酸收液ヲ用フルニ四訣アリ曰其痘極メテ細小ナル
 者曰黑色ナル者曰合湊シテ片ヲ為ス者以上三症中ニ

黒斑或ハ尿血或ハ其他ノ失血ヲ兼ヌル者アリ此症甚
 多シ是レヲ標準トシ用フ又其痘小密ニシテ黑色攢聚
 粘連シ片又一片ヲ成シ疫斑熱ヲ夾ミ且ツ失血ヲ兼ヌ
 ル者ハ金石類ノ酸收液消疫劑及機那機那ノ製劑最モ
 要タリ此レニ非レハ治スルヲ能ハス此症ノ尿血ハ儘
 誤テ期ニ非スメ養痘膏ヲ貼スルニ因テ養スルヲアリ○
 還元落痂ノ期ヲ過テ猶收靨セス荏苒タルハ死生未タ
 定ラス速ニ上件ノ酸收劑ヲ用ヒヨ又此レニ加フルニ
 精神ヲ扶救充托スル策ヲ行フヘシ且ツ將ニ收靨セン
 ト欲スル勢ノ初時ニ當テ急ニ精神ヲ養起通暢スル藥

食ヲ與フヘシ然スレハ痘愈ユルニ及テ結成シテ其色
 赤黒ト為リ舊敗ノ皮脱落シ新皮ヲ生シ新ニ生活ノ神
 氣ヲ發シ生命ヲ保全ス是レ殆ント春時蛇ノ舊殼ヲ脱
 ヲ新皮ヲ生シ正ニ活潑地タルト同一般ノ理ナリ○
 又症ニ從テ機那機那ヲ用フルヲ有リ其用法ヲ誤ラサ
 ル者ハ黑亞獨名孟魯名及ヒ伐兒刺名ノ諸子ナリ其書
 ニ就テ其說ヲ得ヘシ予カ經驗スル所ハ機那機那ナ和
 シタル強心酸附録ノ機那機那ニ石膽涅ヲ載ス加
 ヘ酸味ヲ添ヘ煮テ飲ト為シ用フ然レ凡患者温覆薰蒸
 ニ過キ小腹脹硬呼吸促迫スルハ機那機那劑ノ能ク活

スル所ニ非ス此症ハ解毒酸附録ニヲ加ヘ用フ殊ニ水
 晶痘ニ施スト最モ妙ナリ其用フル期ハ痘十分ニ起脹
 シ將ニ膿ヲ灌カント欲スル時ヲ宜トス機那機那ハ能
 ク稀淡ノ汁液ヲ變メ膿ト為サシムレハナリ○又麻兒
 東名及ヒ近時ノ諸名家皆機那機那ヲハ痘ノ終末ノミ
 ナラス行漿灌膿ヲ進メント欲スルニモ皆用フ其用法
 四時或ハ三時成德云此レ亦晝夜ニヲ隔テ、一錢ヲ服
 セシム是レ最モ良法ナリ

○凡ソ痘瘡ハ諸症熾々トメ進ミ最極ニ至ルヘキ時ニ
 却テ期ニ先チテ其候頓ニ減衰スル者ハ甚々險惡危篤

ナリ又諸症盈漲シ勢勃々タル者ハ毒ヲ外表へ驅除セ
 シカ為ニシテ是レヲ善候トス異慮ヲ煩ハスニ及ハス
 然ルニ今日今日トハ見點ヨリ九日十日ニ當ルヲ云フ顔面ノ腫脹忽爾トメ
 散シ流涎速ニ止ミ痘粒勢ナクメ皺故ヲ生シ粒間淺圓
 眼色或ハ天藍色或ハ灰白色ニ變シ從テ寒戰咬牙ヲ幾
 シ次テ壯熱ヲ生シ呼吸短迫精神昏沉惡心ヲ生シ或ハ
 直ニ煩燥悶亂寒戰咬牙搐搦痙瘲精神錯亂等ヲ生シ暫
 留メ解セサル者ハ極メテ惡候ナリ○痘ノ變症ヲ生ス
 ルト稠痘ニ在テハ最モ辨知シ易シ其徵ハ序熱一日二
 日或ハ三日ニメ見點シ其痘粒ハ次第ニ行漿灌膿ノ圓

シト雖モ痘頂尖ラス勢ナク且ツ緊張セス或ハ破レテ
 水ヲ出シ或ハ空痘トナリ或ハ其頂ニ黑點ヲ生シ紅暈
 散漫シ粒色淡白又暗灰白色トナル者ハ皆危症ナリ○
 此時ニ當テ小便清利シテ熟セス驟淡トノ尿色ヲ現ス
 ルトナク又頸及ヒ顛顛ノ動脈鼓動スルト甚シキ者ハ
 慎護シテ輕忽ニスルト勿レ將ニ危ニ至ラントスル候
 ナリ○凡ソ症此ノ如キニ至ラハ醫タル者苦心焦思ノ
 處療ノ方法ヲ考索按排スヘシ今生死須更ニ在リ若シ
 毫厘ヲ謬ラハ死ニ就クト踵ヲ旋ラスヘカラス○此レ
 等ノ症ハ尋常平易ノ治術ノ能ク治スル處ニ非ス故ニ

今予若志シテ其的當ノ處療ノ方法ヲ定メテ尤ニ列ス
 ○第一顔面手足ノ起脹少フメ常症ノ如クナラサル者
 ハ惡候ナリ其理ハ諸部各處ニ膿ヲ輸シ病毒ヲ分利鬆
 解セハ何ソ腫脹ヲ為ス₇常症ノ如クナラサラン然ル
 ヲ今起脹微ク流涎漸ク減スルニ至テハ必ス起脹消散
 シ痘粒紅活ナラス眼開テ顔色沉衰ス○其沉衰ヲ見ハ
 ス時ニ及ンテハ發疱膏ヲ腕前即チ三及ヒ肘中横紋ノ
 動脈ニ貼スヘシ然テ貼後ハ速ニ疱ヲ發セン₇期ス
 其故ハ速ニ毒液ヲ貼處ニ吸引スルトキハ引クニ從テ
 頰ニ疱ヲ發ス疱ノ發スル₇速ナル者ハ發疱ノ應スル

ヲ見ルノミナラス痘毒ニ發路ヲ與フルヲ以テ故ニ汲
 汲トメ其應ヲ希フナリ發疱ヲ施ス一二時前ニ軟和ニ
 フル蒸溺劑ヲ其部ニ行ヒ滲潤ノ道ヲ開キ痘粒ヲ起
 脹セシメ貫膿ヲ為シムル₇最モ妙ナリ拔孤利肝私
 人云軟和ニスル蒸溺劑ハ水棉ニ蘸メ熨スヘシ甚タ良
 ナリト○蒸溺劑ヲ用ヒス₇頰ニ發疱膏ヲ行フトキハ
 人身固有ノ良知能ノ運動大イニ煽動セラレ發起スル
₇甚シク驅出ノ勇勢劇烈ニシテ焮熱腫脹シ劇痛ヲ發
 ス此ノ如ク鼓動甚シキモ驅泄ノ功ハ却テ少シ是以テ
 蒸溺劑ニ因テ其牽張ノ部分ヲ和緩鬆緩シ汗孔ヲ開達

シテ後子施ス然ル時ハ劇烈ノ勢ナク其功モ亦多シ
 ○其用フル處ノ良方等ハ二十年前壁魯促布私人名既ニ
 説アリ善義ヲ盡セリ其書ニ就テ見ルヘシ方論數条大
 イニ此症ニ益アリ予モ亦其説ニ從テ此篇ヲ撰ス○既
 ニ灌膿セル痘ノ急疾ニ陷リ退クハ必ス次テ危篤險惡
 ノ諸症ヲ發スル徵ナリ其理ハ伊イ屈ク多ト成成德德云云痛痛風風類類ノ
 外症貽然トメ愈ヘテ内陷スルトキハ直ニ諸般ノ惡症
 ヲ發スルカ如シ故ニ此症ハ烈シク刺動攻衝スル糊劑
 ニ因テ外表ヘ發達シ因テ生命ヲ保全ス又發疱膏ヲ施
 スニ速ニ疱ヲ發セサル者アリ其疱發セスト雖モ猶毒

ヲ鬆解スル功アリ○又發疱膏ヲ糊劑ニ副メ用フル
 アリ今時ノ大家危篤ノ症ニ遇フ毎ニ皆其法ニ從テ發
 疱膏ヲ足蹠ニ貼ス是レ良方ナリ從フヘシ
 ○第二若シ發熱頭痛メ痘毒胃中ニ内陷スルトキ、胃
 是レカ為ニ挾迫拘促セラレ精神寧カラス煩燥苦悶ス
 此症多クハ見點後七八日間ニアリ是レ他故ナシ保護
 厚キニ過キ患者ノ身體及ヒ其室中ヲ過度ニ温蒸スル
 ニ因テナリ然ル者ハ速ニ牛乳砂糖食鹽等ノ單味ノ水
 錠法ヲ用フヘシ甚タ功アリ然レ凡患者燥屎無キニ攪
 リニ此法ヲ用フルハ誤ナリ其故ハ燥屎縮腸直腸中ニ

在テ大イニ鞭結スルトキハ大幹動脈膀胱管ノ根及ヒ
 小腹ニ位スル諸尿管及ヒ膀胱頸ニ當テ下部ニ分輸ス
 ル處ノ血ヲ障碍ス故ニ血液逆流メ頭胸ノ部ニ鬱滯ス
 又水道及ヒ尿管ノ通利ヲ害シテ風氣前ニ注スヲ生ス此時
 ニ當テ必ス水鉸法ヲ以テ藥液ヲ注射シ鞭燥ヲ融釋シ
 腸中ヲ滑脱シ刺動攻衝ノ腸ノ運動ヲ發達シ大便ヲ通
 スヘキナリ○然レ凡水鉸法ハ平常ノ痘瘡ニ施ステ甚
 々稀ナリ但小兒ハ常ニ便秘ス故ニ二日或ハ三四日大
 便不通ヲ見ハ軟和ニスル水鉸法ヲ用ヒ輕キ下劑ニ代
 フ先ツ患者ヲ清冷ノ處ニ移居シ養神劑附録ニ載スヲ用フ

ヘシ是レ十全ノ良方ニメ甚々効アリ若シ誤テ早ク下
 劑ヲ用フレハ昏睡病ノ如キニ變ス

○第三凡ソ養神劑ハ痘家必用ノ劑ナリ是レヲ與フル
 下必ス其跡ヲ失フ下勿レ此劑ハ起脹見點ノ時ニ當テ
 痘粒皮膚共ニ焮熱疼痛スルヲ治スレハナリ因テ考フ
 ルニ痘ノ焮痛ヲ治スル下養神劑ヲ捨テ、他ノ劑ナシ
 諸藥是レニ匹スル者ナシ總テ起脹見點ノ時ニ至テ焮
 熱疼痛ノ甚シキハ善候ト為スト雖凡其痛又堪ヘカラ
 マ且ツ其他ノ諸症ヲ發シ痘粒皮下ニ隱見シ嘗テ皮上
 ニ見レス焮熱疼痛スル者ハ惡症ナリ是レ神氣虛弱憊

敗ノ攝養充托ノ力足ラス其毒ヲメ汗孔ヨリ送輸シ皮
表ニ散スルヲ能ハサル微ナリ○又稠痘ニハ早朝毎ニ
熱ノ發作セサルニ先ツテ必ス養神劑ヲ與フヘシ甚々
緊要ナリ○又催睡糕附録ニハ小兒必効ノ劑ナリ○養
神劑ノ量ハ漸々ニ増スヲ佳トス起脹見點ノ時ニ當テ
每且是レヲ與レハ其毒ヲ分利シ皮表ヘ發達シ又夜ニ
至テ煩悶ヲ發スル等ヲ治ス依ホト加刺的私云起脹見點
ノ間ニ當テ夜間煩悶スル者ハ痘ノ善惡ニ拘ラス養神
劑ヲ用ヒテ其毒ヲ解スヘシ最モ妙ナリト○又其時患
者發熱熾盛ナル者ハ養神劑ニ一二ノ酸收味ノ物品ヲ

加ヘ或ハ鹽少許ヲ飲漿ニ和シ用ヒヨ然レ凡病者虚衰
枯槁スル者ハ的リ亞ア加カ或ハ其他ノ消痰劑ヲ用フヘシ

○第四第二熱成德案スルニ居家纂要ニ云凡ノ痘家ノ

ト云フ是レ其毒ヲ發越センカ為ナリ成膿ノ時ニ常テ
發スル者ヲ第二熱ト云フ是レ膿ヲ熱成センカ為ナリ
初熱既ニ和シ第二熱ニ至ル間ハ患者頗ル安ク平生
ノ狀ニ似タリ然レ凡平生ニ比スレハ稍小異ヲ覺フト
ノ來ル時其脈甚數ニノ緊弦強實且ツ頸動脈即チ人大イ

ニ禁動シ渾身壯熱ノ烙カ如ク呼吸窘迫且ツ頭重フノ舉
ケ難ク或ハ頭眩暈ヲ發スル者アリ此ノ如キ症ハ大
イニ刺絡ヲ行フヘシ諸証速ニ快復ス○又一診法アリ
上件ノ如ク瀉血スルニ血ノ上面ニ粘膠ノ皮膜アル

劇症ノ脇焮衝熱ノ患者ヲ刺シタルカ如キ者アリ然ル者ハ是レ焮衝熱ノ候ナリ若シ瀉セサレハ從テ眼焮衝咽候焮衝肺焮衝聖京健兼焮衝等ノ證ヲ設ク或ハ四肢等ニモ焮衝熱ヲ設スルコトアリ

○第五前症ト相反シ脈弱ニノ昏眩失氣シ痘間ノ根脚皴紋ヲ生シ其色暗澹トノ腫脹消シ或ハ淺油綠色トナリ四肢厥冷自汗等ノ症アル者ハ精診考究ノ温藥温飲ヲ與ヘ又發疱膏ヲ貼セヨ又此症ニハ蒲桃酒ヲ多ク温服セシムヘシ其良効アルコト實ニ驚クヘキカ如シ

○第六灌膿ノ時ニ及ンテ流涎減スル者ハ必ス病勢増

劇セントスル兆ナリ然ルトキハ其毒稠厚膠固ノ鬆解セス呼吸頻ニ窒塞シ又乍チ緩乍チ窒シ殆ント絶セント欲スルカ如キ者アリ此症ハ頻々ニ含漱劑ヲ與ヘヨ若シ含漱ニ妨アル者ハ水銃ヲ以テ口内ヘ注射スヘシ又内ニハ菓醬附録ニ載ス加蜂蜜或ハ醱酢清水蜂蜜三味各等分相和シ微温ニシ用フ若シ猶應セサル者ハ解粘附録ニ載スニ燂硝少許ヲ加ヘ或ハ硝砂菟子ヲ加ヘ合煎シテ飲服セシム○草木ノ酸收味ノ自然汁ハ石鹼氣多キカ故ニ能ク凝結膠固ヲ解融スルコト石膽ニ勝レリ是以テ予ハ多ク是レヲ用フ又上件ノ諸症上件ノ方法ニ

テ効ナキ者アリ然ルトキハ吐劑ニ優レル者ナシ其吐劑ハ際田法護人ハ吐粘水附録ニヲ用フ每服八錢知ラサル者ハ加ヘテ十錢ニ至ル○然レ凡予案スルニ此症ニ的當ノ吐劑ハ解粘泥附録ニニ若ク者ナシ予每二用ヒテ効ヲ得タリ此劑ハ和柔ニ衝動シ且ツ粘液ヲ解釋スル雄カアルニ因テ呼吸ノ窘迫ヲモ緩解スレハナリ然ノミナラス能ク小水ヲ利シ大便ヲ通スル効アリ上件ノ症多クハ二便不利ス故ニ愈良ナリ若シ下利ヲ狹ム者ハ南五味子根ノ灌劑又ハ煎劑ヲ與ヘヨ○以上ニ論スル處ハ多クハ設兒修思ノ説ニ從フ然レ凡以下ノ

症ニ至テハ取ルニ堪タル者無シ故ニ今是レヲ取ラス世醫ノ如キモ此症ハ誤ルヲ多シ今苟モ予カ術ニ從ハバ庶幾ハ前車ノ覆轍ヲ踐シ假令他ノ諸症アリトモ是レニ因テ考究セハ處療ノ方法ニ於テ何ノ難ヲカ有ン○患者非常ニ舌本咽喉ニ甚厚ノ膜ヲ生シ其意ニ物ノ懸垂スルカ如ク覺ヘ吞メ凡下ラス吐ケ凡出テス安ンセサルヲアリ其膜或ハ白色或ハ栗殻色ナリ其狀半ハ焦ルカ如キ者ハ胃管氣管中ニ施及スル候ナリ此ノ如キ者ハ幾痘膏又ハ含漱劑或ハ其他ノ方法ヲ以テ除キ去ルヘシ然レ凡殊ニ甚惡ノ者ハ此等ノ藥劑ニ因テ

治セサル者アリ是レ其部ノ腺破レテ膜ノ如クニ變ス
 ル者ナレハナリ○又口内咽喉等ノ滑液大イニ粘膠ニ
 變シ膜ヲ生セスト雖モ其液口内咽喉ニ膠着スル者ア
 リ是レ初ニ當テ含漱劑ヲ用ヒサル失ナリ急ニ含漱劑
 ヲ用フヘシ○凡ソ痘瘡ノ治法ハ血液ヲ清稀ニスルニ
 在リ流涎ヲ催進スルニ在リ痘粒ハ勃脹ヲ期シ平塌ヲ
 忌ミ劇甚ノ諸症ヲ抑制スルニ在リ故ニ諸尿管ニ良善
 ノ水液ヲ灌溉添益センカ為ニ潤灌劑ヲ用フルノ肝要
 ナリ是以テ含漱劑ニ宜シ又食料ハ液汁多ク流動ノ性
 ヲ含蓄スル者良ナリ堅硬ノ物ハ宜シカラス患者モ亦

堅硬ノ物ハ自然ニ厭フ意アリ且ツ吞下シ難ヲ覺ユル
 ナリ○上ノ症ニメ其痘黑色ニメ攢聚粘連シ地畏ヲ分
 タサル者ハ内陷メ死セントスル兆ナリ此症ニ遇ヘハ
 酸味多キ牛乳精附録ニ載ス或ハ畧支丹煎其方詳カニ附録ニ載ス又ハ
 列應設蒲桃酒清水二味相和シ或ハ淡拂郎察白蒲桃酒
 清水二味等分相和シ用フ又菓醬清水各等分相和シ用
 フ此等ノ方最モ的當セリ又或ハ幾斑或ハ失血ヲ兼ヌ
 ル者ハ前方ニ玫瑰酸ヲ加ヘ或ハ赤蒲桃酒清水二味各
 等分相和シ何ニテモ酸味ノ物品ヲ加ヘ微温シ用フ
 ○第七灌膿終リ將ニ結痂セントスルニ當テ流涎減ス

ル者ハ速ニ排出ノ道ヲ與ヘ病毒ヲ導キ去ル計ヲ為ス
 ヘシ其故ハ今病毒未タ體外ニ漏レサルニ全身瘡痂ア
 ルトキハ殆ト鱗甲ヲ覆被スルカ如クナレハ蒸氣ノ開
 達ヲ妨碍ス縱ヒ僅ニ發達スルモ病毒ヲ排去スルニ足
 ラス是レ痂ノ人身ニ在ルヲ宛モ革衣ヲ被襲スルカ
 如シ是以テ此症ヲ管セス其自然ニ任スルトキハ諸部
 ノ蒸氣ヲ閉塞スルノミナラス又膿及ヒ膿血ヲ發達熟
 成スルニ道ナク却テ身體中ニ蓄畜シ敗瘀内陷シテ血
 中ニ襲入シ遂ニ再ヒ大熱ヲ發ス○此時ニ至テハ又涎
 唾ヲ促シ小水ヲ熟化ノ利セシムル策最モ緊要ナリ誤

テ此計ヲ為サレハ大イニ危變ヲ生ス○病毒退去ノ
 道路塞壅スルヲ見ハ急ニ排擯斥出スル諸路ヲ開達ス
 ルヲ肝要タリ其術ハ幾疱膏ヲ貼メ疱ヲ起サシメ又和
 緩ニスル水鏡法ヲ行ヒ又兼テ解粘泥附録ニ載ス或ハ亞謨
 莫泥亞モニ趙謨湯等ノ湯液ヲ用ヒテ胸膈ノ促迫ヲ開緩通
 暢スルニ在リ○又患者ノ衣服ヲ代ヘ新ニスヘシ怠テ
 然セサレハ衣服腠臭穢濁浸潤シ且ツ強硬ニシテ惡臭
 アリ是レ最モ毒有テ害ヲ生シ變ヲ發スル基トナルナ
 リ○又其居處ヲ移スヘシ初メヨリ一室ニ居テ其處ヲ
 移サス或ハ其居處ノ戸ヲ塞キ牖ヲ閉レハ室中ニ滿ル

處ノ鬱蒸氣遂ニ消除セズ其室ニ入レハ傍人ト雖モ呼
 吸シ難キニ至ル是レ呼吸ヲ障碍スルノミナラス又傳
 染スヘキ惡厲氣ヲ成シ遂ニ肺及ヒ他ノ翁收管第一篇
嫩衝熱
篇ニ注ス併
ヒ見ルヘシニ侵入シ漸ク血中ニ傳テ襲迫ニ暇ナク殆
 ント血液ヲ腐敗贅壞スルニ至レハナリ○是以テ大イ
 ニ戸ヲ開キ牖ヲ放テ馨敗ノ穢氣ヲ出シ去リ新鮮ノ良
 氣ヲ納レ舊汚ノ衣服ヲ去テ新衣ニ改ムヘシ然ルトキ
 ハ諸症ノ減スルヲ實ニ奇ナルカ如シ○新良氣ヲ翁納
 スルトキハ新氣血中ニ入り血液皆新良氣ヲ含ミ全身
 ニ渙流ス是レヲ譬フルニ別ニ一種ノ活路ヲ得テ再ヒ

蕪生スルカ如シ其良計ナルヲ思察スヘシ○小室ノ戸
 牖ヲ塞キ舊敗腐壞ノ氣ヲ内ニ盈タシメ病者ヲメ其毒
 中ニ染没シ日ニ其毒ヲ體中ニ滲滑セシム其不可ナル
 ヲハ言ヲ待タスメ明ナリ然ルヲ世人察セス實ニ悲ム
 ヘシ○又患者ヲ居ク屋室ノ構造及ヒ壁障ノ界限其他
 ノ形状トモニ病院ノ製ノ如キハ大イニ宜キ處ニ非ス
 又一室中ニ兩三人若クハ數十人一處ニ起卧スルハ最
 モ忌ム處ナリ然スレハ多クハ死ヲ招クニ至ル○假令
 ハ劇症ノ病ム者アリテ大イニ呻吟悶亂シ痛ク聲ス
 ル者アレハ傍邊ノ患者モ是レカ為メニ懊惱シ或ハ擲

足舞手ノ席ヲ安ンセサルニ至ル偶此連及ヲ免ル、モ
 多クハ一齊ニ睡眠シ一齊ニ起寤ス是レ生命ヲ養フニ
 不善ナル所以ナリ畢竟自他共ニ宜ヲ得ル道ニ非サ
 ルナリ○患者ノ身體ハ必ス潔淨ニスヘシ此事最要ニ
 ノ惡症ヲ防ク良策トス疑ヲ容レス是レヲ行ヘ其法ハ
 日ニ一度夜ニ一度或ハ一晝夜ニ一度新衣ヲ取テ能ク
 乾温ニシ舊汚ノ衣ニ更フ其更フルニ當テ過度ニ熱セ
 シメ患者ノ蒸氣ヲ大イニ漏泄スルヲ勿レ又温氣ニ因
 テ大イニ汗ヲ發スルヲ勿レ又輕忽ニ過テ室中ニ寒風
 ヲ引キ其氣ニ感セシムルヲ勿レ唯ハ暍勉トメ適宜ヲ取

リ其要ハ舊敗ノ穢氣ヲ除キ新良氣ヲ納ル、コヲ期ス
 ヘシ○又考フルニ第二熱前ニノ時ニ至テ下劑及ヒ其
 他ノ藥ヲ用ヒテ排出通利ノ道路ヲ導達スヘシ○又第
 二熱前ニニ至テ能ク涎唾ヲ流ス者ハ痘粒高起シテ能
 ク熟シ膿ヲ保チ又顔面手足モ腫脹シ且ツ快寢シ呼吸
 快利シ其他諸惡症ナキハ是レ自然良知能ヲ以テ痘毒
 ヲ服從シテ事ナキナリ此時ニ當テ自然良知能ノ運營
 ヲ扶助スル藥ヲ用フルノミニメ毒ヲ攻治スルニ及ハ
 ス然レ氏補充ニ過ルヲ勿レ然ルトキハ變症ヲ生ス是
 レ藥ニ因テ病ヲ生スルナリ是レヲ慎メ是レヲ慎メ○

此症ノ如キハ大便セサルヲ數日ナリト雖凡水錠ヲ用
 ヒテ通利ヲ取ルニ及ハス還元落痂ノ期ニ至テ猶大便
 セサル者ハ水錠ヲ用ヒヨ是レ最モ緊要タリ其効亦多
 シ○又第二熱ノ日期ニハ聊先後アリトイヘ凡多少必
 ス發熱ス其時ニ當テ痘粒數顆粘連シテ地畧ヲ分タス
 諸症ノ状態極ムヘカラサル者アリ是レ其弊一ハ其始
 ニ毒ヲ發達センカ為メ又翳收センカ為メニ内服外傳
 ノ劑ヲ一齊ニ強ク用ルニ因リ一ハ厚被シテ蒸氣ヲ抑
 遏スルニ因リ一ハ腸中ニ腐敗糞壞ノ物ヲ滯畜スルニ
 因ル此腸中ノ毒ハ外ヨリ見ルヘカラサレ凡其理甚

夕辨シ易シ是レ常ニ口裡咽喉ノ腺前ニ注スヨリ分利スル
 毒ヲ時々刻々ニ吞下スルニ因テ腸中ニ滯積鬱畜シ腸
 及ヒ膽液管ノ腺ニ浸滲スルナリ又一ニハ其毒皮表へ
 發越スルヲ少キカ故ニ却テ腸中ニ下泄スルナリ元來
 病毒排出ノ道ハ一處缺レハ一處ヲ求ム自然ノ勢ナリ
 其道ハ皮表ニ發越スルト腸胃ニ下泄スルトナリ今皮
 表ノ發越ヲ缺ク故ニ腸胃ニ下泄スルナリ○此ノ如キ
 腐敗ノ毒腸胃中ニ鬱畜スレハ毒氣漸々ニ滋盈シ愈久
 シケレハ愈惡性ヲ成ス畢竟去路ニ由ナク再ヒ腸中ノ
 翳收管ニ翳納シ尋テ間斷ナク血中ニ混淆ス其毒液ノ

烈ナルトハ殆ント炎火ニ比スヘシ今此液全身ニ彌滿
シ各處ノ血中禍ヲ被ラサル處ナシ恰モ血管中ニ烈火
ヲ投スルニ異ナラス故ニ壯熱ヲ發シ熇々トノ烙力如
シ此時ニ當テ良知能ノ運管大イニ頽廢ス從來病毒ヲ
排除セントシテ既ニ許多ノ費耗ヲ苦ミタルニ今又此
酷烈ノ禍ヲ受ルニ因テ然ク衰弊ヲ極メテ毒勢ヲ制ス
ルニ足ラス病ヲシテ漲洪シカヲ極メシム○問云若シ病此
ノ如クノ窮ニ至リ猶排出ノ道有リヤ答云自然良知能
ノ排出ヲ見テ是ヲ救フニ在リ其良知能ノ排出トハ小
兒壯年ノ人ハ自然ニ下利ヲ發シ老成人ハ大イニ流涎

スル是ナリ○又問フ此症ハ何レノ時ニ治ヲ誤レルヤ
答曰此症ハ將ニ結痂セント欲スル期ニ及ンテ腸中ニ
腐敗變壞ノ物ヲ畜積スルニ因テ自然ニ下利ヲ發シ惡
臭有テ人ヲ薰ス此ニ至テハ必ス水鉞法ヲ行フヘシ然
ルニ世醫皆止澁ノ劑ヲ用テ此禍ヲ致ス處ナリ○又一
ニハ右ノ如キ汚毒久ク腸中ニ畜積シ腐敗スレハ侵蝕
ノ性ヲ成シ各處ヲ蠶蠹シ大イニ衝動刺戟スルニ因テ
下利下血等ヲ發スルトアリ是レ元來結痂ニ至ラサル
前ニ在テ其症ヲ察シ微利劑ヲ用フヘキニ其時宜ヲ失
ヒ此變ヲ招クナリ○又問フ今高論ヲ聞テ惑ヲ解ケリ

思フニ其因症ヲ辨明シ其藥劑ヲ處シ良知能ヲ扶ケテ
病毒ヲ驅除シ又一邊ニハ藥劑ヲ以テ排擯セハ庶幾ハ
其生命ヲ全フセン然ルヲ為サズ頓ニ危變ヲ生シ顔面
手臂ノ腫脹皆減シ流涎時ニ至ラスシテ止ミ口舌乾燥
シ自餘排出ノ道路遏絶ス此ノ如クナル時ハ要シテ通
洩ノ道ヲ開カン乎又問フ然ル如キハ皮膚汗孔ヲ開テ
蒸氣ヲ發達シ尿道ヲ通シテ小便ヲ利セシメ又唾管ヲ
開テ涎唾ヲ流サシメン乎答云善哉問フ一實ニ子ノ言
ノ如シ若シ流唾遏絶シ口舌乾燥セハ急ニ開達ノ道ヲ
與ヘ其病毒ヲ去ルヘシ水銃法微利劑等時宜ニ從テ用

フヘシ若シ大イニ下利ノ止マサルトキハ阿芙蓉劑ヲ
以テ是ヲ閉セヨ○謹テ教ヲ受ク然ラハ惡液ノ良知能
ニ害アルヲ見ハ是非ヲ論セス急ニ驅テ體外ヘ追逐シ
生命ヲ保護スヘキヤ答云然レ凡時宜ヲ要トス結痂收
靨ノ際ニ臨ンテハ下劑ヲ用ヒテ腸胃中ノ毒液ヲ驅除
スヘシ殊ニ結痂ノ際ニ當テハ必ス用ヒヨ水漿ノ際及
ヒ未タ結痂セサル時ニハ必ス下劑ヲ用フルト勿レ然
レ凡灌膿結痂ノ際ニ在テ通洩スヘキ道路皆遏絶シ毒
氣内陷スル者ハ此例ニ非ス速ニ腸胃ヲ疏滌シ毒ノ出
テ去ル道ヲ開キ救フヘシ其術ハ良知能ノ排擯スル勢

ヲ扶ケテ快ク通泄ヲ行フナリ是レ他ノ故ナシ第二熱
 ニ因テ腸中ニ腐敗斂穢ノ物ヲ畜積ス故ニ斷シテ下劑
 ヲ用フ若シ用ヒサレハ毒物腸中ニ畜積シ遂ニ蟲疰熱
 閉室熱膽液熱等ヲ發ス此等ハ吐下ニ因テ治スヘシ予
 痘ノ終期ニ及テ下劑ヲ用フルヲ稱メ止マス一大緊
 要トスルハ是レカ為メナリ是レ屢經驗メ屢効ヲ得テ
 疑ヒナキ處ナリ若シ此術ヲ行ハサレハ痘癘腺癌惡性
 瘍附骨疽肺癰或ハ勞瘵ト為テ愈ルヲ能ハス

○第二熱ノ時ニ當テ予カ稱用スル處ノ下劑ハ皆和柔
 清凉ノ劑ナリ私甘護紐護脂蘆薈等ノ烈シク下利スル

者ハ宜キ處ニ非ス然レ凡若シ熱甚盛ナル者ハ烈シキ

下劑ヲ用ヒテ是レヲ救フ多クハ加魯墨兒附錄ニ載ス

ニ數以私的兒云纒汞丹ヲ小兒ノ痘疹ニ用フルハ和

每日三厘三毛或ハ四厘九毛嬰兒ハ猶其量ヲ減スヲ和

シ用フ總テ痘初ハ極熱性ノ下劑ヲ與フルヲ勿レ又下

劑ヲ用フル際ニ當テ攝養充托ヲ闕トキハ大イニ損敗

害傷ヲ致ス宜シク時ニ趣テ救々トメ保護スヘシ養神

劑ヲ兼用セヨ必ス忽ニスルヲ勿レ是レヲ慎メ是レヲ

慎メ又第二熱ノ後ニ至テハ既ニ説ク處ニ從ハ、無害

ニシテ大効アラン亦忽ニスルヲ勿レ此術屢用ヒテ實

審スル處ナリ必ス微利劑ヲ用フルヲ宜トス

泰西熱病論卷五

泰西熱病論卷六

泰西 玉函夫古撒謨 著

加賀醫官 吉田成徳直心 譯

笹山侍醫 足立世茂松父

門人 沼津侍醫 程田國道玄悦 校

長府侍醫 松岡士藏道遠

海上保護篇第十 成徳案スルニ和蘭ノ俗ハ交易ヲ
以テ其國ノ不足ヲ補フ故ニ常ニ
四方ニ航海シ水上ニ居在スル
書ニハ海上保護ノ治術ヲ説ク
血病ヲ患フル最モ多シ此篇ノ如キ亦其備用ナ
リ此等ノ術ハ本邦ノ人ニ在テハ用ナキニ似タリ

泰西熱病論卷六 一 廣濟堂

然レ此世^上今敗血病ノ人多ケレハ此篇ノ如キ能ク首尾ヲ推究セハ其病ニ遇テ其症自ラ明カニ示大イニ治療ニ益有^ニ故ヲ以テ今此ニ贅言ヲ厭ハス

凡ソ航海ヲ職トスル者ハ海行一二年間ニ舟中ノ人多クハ敗血病ヲ患ヘテ斃ルハ者幾多ナルヲ知ラス百度一般實ニ怪ムヘキカ如シ是レ他無シ其因ハ不良ノ飲食汚濁ノ水漿腐敗ノ麥酒等ヲ喫シ歲月ヲ渡ルカ故ナリ凡ソ海上ニ在ル^ト數月ニノ其間ノ飲食ハ常ニ不良ノ性ト為リ牛羊猪鴨ノ肉ハ皆腐蝕シ水漿麥酒ノ類ハ餿濁トナリ殊ニ麥酒ハ長途舟中常用ノ物ニシテ最モ腐敗シ易キ故ニ其腐敗變穢ノ惡液漸ク人身ノ諸液

中ニ浸潤シ血中ニ酷厲液ヲ生シ漸ク以テ餿蝕ノ質ヲ成ス是レ皆上件ノ飲食ヲ用ヒ或ハ烟霧或ハ海中ヨリ糞昇スル鹽蒸氣ヲ吸納シ或ハ此氣衣服ニ浸透スルカ故ニ此患ヲ貽スナリ此^トヲ徵スルニ曩日數十人共ニ航海スル者アリ僅ニ三月間ニノ航中皆敗血病ヲ患ヘ死スル者數人は是ニ於テ速ニ小舟ヲ命シ港ニ入り岸上ニ就テ治術ヲ行フ皆不日ニ愈ユ是レ他故ナシ新清ノ良氣ヲ吸納シ新清ノ水漿ヲ用ヒ食物亦新清ノ品ヲ食ヒ且ツ菓蔬ヲ喫シテ血中ノ酷厲蝕ニ純精ニ復シ勢カ全ク旺シテ病愈タルナリ和蘭諸厄利亞ノ人應帝亞

ノ地方ニ航海スル時ハ皆聖突セント衣力拿イカ島成德云東應帝亞ノ島ナリ

ニ就テ新氣ヲ吸納シ新食及ヒ鮮菓生蔬ノ類ヲ喫ス故

ニ航海中一人ノ敗血病ヲ患フル者ナシト云ヘリ是レ

其新鮮ノ品ヲ喫スル法ノ大効アルヲ知ルヘキナリ

○先哲皆云凡ソ血中ニ灰汁鹽様ノ酷厲液侵入淪滯ノ

腐敗ニ進マントスルヲ制スルニハ草木金石類ノ酸味

有ル物ニ如クナシ其用法ハ毎日湯液ニ和シ用フ病

將ニ愈ントスルニ至リテハ湯ニ和スルニ及ハス唯ニ

三滴ヲ服スルヲ數日ニシテ可ナリ

○航中敗血病ニ嬰リ血質既ニ變敗スル者ハ其徵ハ呼

吸惡臭有テ齒齲腐爛シ小便濃赤色皮上ニ潰瘍ヲ發シ

惡臭ヲ為シ或ハ青黑粟殼色等ノ斑紋又ハ小疹ヲ發シ

口舌ニハ粘膠液撲着メ苔ト為リ又潰爛シ或ハ下利或

ハ赤利膽液利等ヲ發メ止マズ是レ病大イニ増進スル

者ナリ生蔬菓實新飲鮮食酸味ノ汁液等ハ所謂ル潤灌

劑ニメ敗血病未タ全ク就ラサル者ヲ治スル聖藥ナリ

酸味ノ品トハ林檎回青橙佛手柑等ノ自然汁ヲ云フ皆

單服スヘシ此方法ハ長途航海中腐食ヲ食ヒ濁水ヲ飲

ミ因テ此病ヲ發スル者ニ最モ妙ナリ

○若シ岸上ニ就テ治術ヲ施スヲ能ハサル者ハ航中日

常ノ飲食ニ心ヲ用ヒ務テ毒ヲ増加スル物品ヲ退ケ其毒ヲ減衰セシムヘシ其用フヘキ者ハ蒲桃酒菓醬佛手柑汁其他新清ノ食物ナリ此ノ如ニシテ能ク保護スレハ治セスト云フナシ貧賤ノ者ハ此等ノ物品ヲ備フル能ハサレハ多クハ死ヲ免レサルニ至ル悲ムヘシ

○今航海ヲ職トスル者予カ言ニ從テ預備ヲ為サハ必ス敗血病ノ患無ラン其法ハ菓醬ノ新清ナル者ヲ備ヘヨ新ニメ發味アル者ハ最モ良ナリ林檎ハ殊ニ敗血病ニ良ナリ故ニ備ヘヨ林檎汁ヲ絞ル者ハ即チ菓醬ナリ其氣味蒲桃酒ニ似テ酸味アリ是レヲ日常ノ水醬ニ代

用セヨ酸收ノ故ヲ以テ血中ノ灰汁鹽氣ヲ制伏シ且ツ飲食中ノ腐敗ノ毒氣ヲ消解ス凡ソ菓醬ハ絞リテ後チ三月ヲ經ル時ハ甚タ澄清ニノ用フルニ宜シ其期早キ時ハ渣滓沉着セス是レヲ飲メハ腹中絞痛ヲ發ス是以テ菓醬ハ澄清ニノ滓膠ナク清純中ヲ得ル者ヲ佳トス若シ滓ヲ去ラス酸收味ヲ生シ其味醋ノ如キ者ハ用フルニ充ラサルナリ

○凡ソ舟子ハ毎日菓醬百二十八錢許ヲ服シ又朝暮ノ際ニ必ス醋ニテ調シタル物ヲ食フヘシ長途ノ航海ニ飲食腐敗スル時ニ當テハ最モ缺クヘカラス又海氛薰

蒸シ是レニ觸ル、ニ汚濁不潔ノ氣アルニ逢ハ、速ニ醋ヲ取テ灌身スヘシ

○秋時航海スル者ハ林檎ノ新良ナル者ヲ撰テ多ク預備スヘシ其藏法ハ厚板ノ櫃ニ入レ氣ヲ泄ス、勿レ然スレハ二三月間ハ敗損ノ患ナシ佛手柑回青橙ノ如キハ弗刺溼兒布名或ハ其他總テ物ニ包裏シ或ハ桶ニ入レテ封固シ氣ヲノ泄ス、ナク冷處ニ安スレハ又シク保ツヘシ若シ此等ノ物品ノ備ヘ少キ時ハ佛手柑汁或ハ酸模汁ヲ用ヒヨ是レ又服ノ害ナキ者ナリ此事已ム事ヲ得サル計ニ出ツト雖モ乾燥火烈ノ食物強烈ノ飲醬

ヲ用フルニハ勝レリ其中チ効力最モ優レル者ハ佛手柑汁ヲ單服スルニ如クハナシ

○又敗血病ハ汚濁ノ水醬ヲ飲ムヨリモ亦幾ス故ニ汚水ヲ飲ム者ハ佛手柑汁石膽渥附録ニ載スヲ和シ用フ或ハ

醋ヲ以テ代フルモ可ナリ邏媽ノ軍卒毎日醋水各半ニ用フ故ニ此病ニ嬰ル者少シ最モ良法ナリ

○凡ソ航中ニハ石膽渥及ヒ酸味ノ品ヲ多ク預備シ前言ノ如ク服用セヨ軍艦ノ如キモ菓醬ヲ備ヘ人々必日用セヨ皆大イニ益アルナリ若シ梨醬菓醬ヲ缺クニ逢ハ次ノ方ヲ用フヘシ此方ハ容易ニ得ヘク價亦賤シケ

レハナリ

○其方邏媽蒲桃酒清水各半ニ相和シ用フ此方最モ丁壯ノ軍卒ニ與フルニ宜シ其價賤フメ其効上件ノ法ニ同シ彼國ノ人ハ航海軍行中ニ在テハ日ニ是レヲ用ヒテ皆此病ヲ免ル、神藥ト稱ス是レヲ尊フテ寶貨ノ如シ貨ヲ損シテ多藏シ往々人ニ向テ誇ルニ至ル邏媽ノ舟子航中ニ此物ヲ多載スルニ逢ヘハ稱スルニ天年ヲ保ツ神藥ト云フヲ以テシ衆人皆倚托シテ勇氣ヲ生スルニ至ルト云フ

○予航海スル者ヲ見ルニ此病ヲ免ル、者殆ント稀ナリ

終年萬里ノ波濤ヲ凌キ險海狂路至ラサル處無ク千辛萬苦嘗メ盡シテ遍シ期スル處ハ志ス處ニ達セント欲スルニ在リ然ルニ病ニ障隔セラレ半途ニシテ歸リ來ル者往々少カラス其功ノ卒ラサルヲ慨ミテ歸リ來ル舟子ノ中ニ幸ニノ病マサル者ハ又再ヒ發航シ猶此病ニ嬰リ又半途ニシテ歸リ來ル此ノ如ニシテ死スル者幾許ノ實ニ悲惨ニ堪タリ是レ畢竟預備ノ設ケ無キカ故ニ其功ヲ終ラサル而已ナラス遂ニ身命ヲ亡スルニ至ル愚ト云フヘシ故ニ予此一篇ヲ著シテ其處由ヲ衆庶ニ告ク庶幾クハ予カ説ニ從テ性命ヲ保全セヨ航海

ヲ職ト為ル人ト雖モ天ノ按排豈別ニ一種ノ薄命ヲ與
ンヤ思フヘシ察スヘシ

泰西熱病論卷六

