

病
因
精
義

二

特 別
1188
2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JAPAN

RP9
1188
2



病因精義目次

卷之二 初篇下

原病第六

自然良能

卒中第七

豫防法

癥病第八

言語蹇澀

癰瘍第九

頭痛第十



99-1323

病因精義卷之二

桃鳩小森先生講述 男 桃郭義真筆記

原病第六

凡病以二生焉。由一見焉生之謂機。見之謂證。機者所以成病也。證者所以徵機也。觀證而後察機。察機而後治法出。治法出而後療術定焉。處方立焉。是故辨二知一醫之先務。而觀察詳明。治療之大本也。二者何。因與體之謂也。一者何。自然良能是也。○因有二等。曰遠因。曰近因。是也。遠因者。病之所由來。而近因之所以生也。此有四種之別。

曰、内傷。外傷。稟質。時運。是也。近因者遠因之所聚成^テ而機之所起原^元也。機發^ヒ而證出^ヒ焉。治療之所標的^{トキ}在于此。不可不詳矣。

因ハ猶^シノゴトシ。病ノ藉^{コツ}テ生ズル所ナリ。然ドモ因異ニシテ而テ證同キ者アリ。證異ニシテ而テ因同キ者アリ。誤見^ハベカラズ。蓋シ此二ノ者ハ則稟賦ノ厚薄^{考スベシ}受生篇^ヲ參及血液ノ性質^{見ハス}。人人均キ^ト能ザルヨリ變化シ来ルナリ。○遠因ハ病ノ由テ来ル所ナレドモ。現ニ茲ニ在テ而テ認得ベキ者ニハ非ズ。但コレヲ問ヒ或ハ推テ而テ考知^ルベキナ

リ○内傷トハ。攝養不節。若クハ苦神勞情等ヨリ來ルヲ謂ナリ。○外傷トハ。打撲撞傷。若クハ毒蟲咬傷等ヨリ來ルヲ謂ナリ。瘡毒^ヲ傳染^{スル}ガ如キ亦類ナリ。○稟質ニ凝固ト流動トノ二ヲ別ツ。凝固トハ藏府筋脈骨膜等ノ造成不良ナルカ。若クハ強弱ノ過不及アルヨリ來ルヲ謂ナリ。流動トハ。血液ノ性質及虛實ニ由^ル謂ナリ。先天ノ遺疾^モ亦類^トリ。○時運ニ。時候非節。流行。感應ノ四等アリ。時候トハ尋常ノ風寒暑濕ノ氣ニ犯サルヲ謂ナリ。非節トハ。不時ノ冷暖。或ハ淫雨暴風等ヲ謂ナリ。流行トハ。疫厲痘疹ナドヲ發スベキノ時

氣ヲ謂ナリ。感應トハ飲食起居勞情過房等ニ因テ。元氣ノ運行失常スル所アルニ當テ。偶又時候ヲ犯シ。其時氣が其人固有ノ氣液ノ質ト。内外相感シテ而響應シ。相結ニテ病因トナルヲ謂ナリ。○近因ハ前ニ云所ノ諸因ノ為ニ。我體中ノ凝固質。或ハ流動質ヲ損害セラレテ。而テ某ノ病證ヲ著見スル。其機ノ在ル所ヲ指テ言直ニ其患者ニ就テ認得ズンバアルベカラザル者ナリ。譬バ感冒ノ如キ。其遠因ハ則時運ナリ。然トモ其以テ頭痛。發熱。惡風寒。鼻鳴テ清涕ヲ流シ。聲濁テ粘痰ヲ吐シ。或ハ嚏シ。或ハ歎ス。

ル等ノ諸證ヲ發スル所ノ者ハ。則皆是其表發ノ蒸氣ガ閉塞セラレテ。モハヤ體外へ驅泄スベキ所ノ老敗無用ノ剩液ガ中ニ鬱滯スルトイフ。近因ノ致ス所ナリ。而メ治療ノ的候トスル所ハ。則其閉塞セル蒸氣ヲ開達スルニ在テ。香竈疏解ノ劑ヲ與ヘ。或シ。更ニ温覆シテ微汗ヲ取レハ。則愈ユ。而テ其遠因ノ如キハ。則敢テ拘ルベキニ非ズ。然トモ亦喻者喘家ノ如キ。其近因ヲ論スレバ。則肺及氣管ニ酷厲物ガ鬱滯留著シテ所在ノ白脈ヲ刺戟スルニ出ルナリ。故ニコレヲ治スルノ要ハ。則其酷厲ヲ緩和シ。其鬱滯ヲ疏解スルニ

在ナリ。而テ其遠因ヲ推セバ。則風喘。寒喘。水喘。火喘。腸實喘。肺燥喘。瘡毒喘ノ別アリ。テ風喘ハ疏解ヲ主トシ。寒喘ハ溫散ヲ意トシ。水喘ハ利尿ヲ兼子。火喘ハ清涼ヲ專トシ。腸實喘ハ滌除シ。肺燥喘ハ潤滑シ。瘡毒喘ハ驅逐スル等ノ少異ナクンバ非ズ。後ノ諸條ヲ見テ其精微ニ入ルベシ。

體即固有之血液而病之所依託以作害也。蓋諸液皆自由中分利者。故總言之。則以血為病之全體。然有血質全體多少損敗者。或其所含蓄液質損敗而血之本質則未被害者。或此液不良而彼液未損者。或既化為毒物與血

質相離而混在者。或釀一二剩液而客居彼此者。或虧一二要液而殘血致變者。或閉塞通路而良液反為害者等之差別也。

血質全損スル者ハ壞血病。或ハ腐敗熱病。疫ノ一種見ノ類。此液損害シテ彼液未損セザル者ハ膽液敗黒病。或ハ酸液留飲ノ類。化シテ毒物ト為テ而テ混在スル者ハ諸瘡毒。或ハ老廢液ノ反流スル者ノ類。剩液客居スル者ハ胸水病。或ハ經閉ノ類。要液ヲ虧テ而テ殘血變ヲ致ス者ハ靈液虛耗及膽液乏弱ノ類。良液反テ害ヲナス者ハ多血聚攻乳汁凝滯ノ類

ナリ茲ニ一二ヲ舉テ精義ヲ盡サズト雖ドモ百病

コレニ由テ類推セバ則各屬スル所アラン。而テ治
術ノ要ハ則コレヲ驅泄スルト復良スルト主意各
異ナル所ナクンバ非ズ。コレヲ驅ルニ直ニ汗吐下
或ハ膿。或ハ涎唾等ヨリ導泄スベキ者アリ。尿。或ハ蒸氣。
亦制伏甘和變易等ノ異アリ。精義神ニ入テ治ヲ處
スルニ非ンバ。安ンゾ妙境ニ至ラ得ンヤ

自然良能者天道自然所賦於人物生乎二氣妙合之間。
而成乎二質相因之動以致神之妙用平素則主保生避
害之事病時則發排邪逐毒之機所以暗使有此命者也。
蓋病因生于中而邪勢漸滋長害機苟作焉則良能與此

相搏或發熱或吐下或咳嗽或腫起便化導其害物以為
汗或為尿或為痰涎或為膿汁或嘔物糞穢之中包攝之
而除去焉此機之見而可認者名之為證故曰由一見焉
也若夫頭痛發熱身體疼痛等則出乎良能之與害物相
搏之勢又發渴利便或嗜異物則良能之欲賴此以和其
銳鋒也自餘諸證之發壹是皆良能之所為也醫則觀其
所為而察其機隨宜左右之以使終其功已故曰醫者自
然良能之臣僕也蓋可承順而不可反逆之義也然而良
能之所為或時乘勢致過若力不足敗績於是乎始有用
意而輔佐之此猶臣之於君規諫強暴扶助幼弱一般其

為事不可不敬也。後學勉焉。

自然良能ノ物タル。天ニ在テハ則元亨利貞ノ妙機。
萬物ヲ生育スルノ根元タリ。儒家ハ此ヲ指テ。或ハ
就テコレヲ稱スト雖モ。亦是コハニ稱スル者ト同
ハ又直ニ指テ。良知良能ト稱スル者。彼ハ其才徳ニ
出ナルノミ。又老莊家ノ所謂本覺法身。或ハ其流
行ヲ論シ。或ハ其變化ヲ説ク者。畢竟異物ニハ非ル
テ或ハ其所出ヲ指シ。或ハ其本體ヲ認メ。或ハ其流
行ヲ論シ。或ハ其變化ヲ説ク者。畢竟異物ニハ非ル
鱗介ヲ造テ以テ其寒溫ニ適セレメ。此ガ爪牙嘴角
ヲ作テ以テ其寇害ニ備ヘシメ。其手ヲ以テ食ノ能
ザルヤ。則其口吻ヲ長ク尖ラシテ以テコレヲ取ベ

カラシメ。唯其生ヲ遂ルノ能ザランヲ是恐ル。凡
萬物皆然リ。况ヤ人ニ於ルヲヤ必ズ其生ヲ遂ルノ
備アルトキハ。則又必ズ其害ヲ避ルノ機ナクンバ
非ズ。凡ノ人ノ呼吸以テ生氣ヲ引キ。化食以テ體質ヲ
養ヒ。動作以テ事業ヲ為シメ。靜睡以テ精力ヲ復ス
ル等ヨリ。以テ血液ノ運行シ。諸器ノ官能ヲ為ニ至
テ。全身一切ノ動靜云為。皆是天機自然ノ良能ニ
成リテ毫モ人為ノ假ルニ非ズ。其既ニ胎ヲ受ルノ
始ヨリシテ。以テ數盡キ命終ルニ及ノマデ。久年晝
夜常然不休ニシテ。妄ニ其度ヲ更ヘ易ルノ無キ者

ナリ。然ト雖モ若其體中ニ於テ或ハ内因。或ハ外因
ヲ論セズ。苟^シモ其生機ヲ損害スベキ者ヲ生ズルト
有レバ。則良能常度ニ違テコヽニ奮起シ。或ハ熱ヲ
發シ。或ハ汗ヲ出シ。或ハ吐下シ。或ハ腫起シ。或ハ膿
ヲ釀シ。或ハ痰唾トナシ。其他種種奇巧ヲ盡シテ以
テ害物ヲ泄除ス。此其病證ノ以テ發スル所ナリ。故
ニ人ノ輕疾アルヤコレヲ療ズルニ非ト雖モ。大抵
自然良能ノ力ニ賴テ復故ヲ得。古人ノ藥セザルハ
中醫ヲ得トイヘルハ蓋シコレガ為ナリ。然ドモ若
其稍重キ者ニ至テハ。則良能或ハ勢ニ乘テ其度ヲ

過^チ。過^チ下熱。過^チ汗。暴^チ或ハカタラズシテ敗績ス。或ハ發^セ
ザルノ類。皆是危險ニ^{シテ}タルノ基本タリ。是ニ於テ醫
其機ヲ候ヒ。乃チ藥ヲ與ヘ術ヲ施シ。宜ニ隨テ其良
能ヲ扶助シ。以テ毒物ヲ驅出スルカリ。故ニ其功ヲ
成ニ及ンデ。醫ノ勲勞固ニ大ナリト雖モ。然ドモ其
歸ヲ論ズレバ。則良能ヲ本トシ醫藥ヲ末トス。故ニ
先哲此義ヲ諭シテ而テ醫ハ自然良能ノ臣僕ナリ
ト云ヘリ。必ス我意ヲ立テコレニ逆^ト勿ルベシ。盖^シ
良能既ニ衰ル者ニ至テハ。則醫千思萬慮シテ良術
ヲ施シ良藥ヲ用ユト雖モ。終ニ些ノ功績ヲ奏スル
ノナシ。コレラ屋宅ヲ修理スルニ譬^シ。良能ハ猶^シ
大匠ノ如ク。醫藥ハ猶^シ傭作ノ如シ。匠若在茲
猶^シ

バ。傭多シト雖モ易傳ニ所謂ル地ノ道ハ成フ無シ
當ニ何ヲカ為ニ。テ代テ而テ終ルト有トハ則臣道ヲ説者ニシテ大
ニ醫ノ意ヲ用ル所ニ合ヘリ。請フ斯語ヲ事トセん。

卒中第七

以下至第二十病屬頭部者

卒中之近因。毒著于腦髓而壅塞其細管及諸脈也。蓋腦
者元神之藏。意識之府。知覺運動之所由出也。故其為害
也大。而其為證也重。生活之機殆廢絶。以發昏倒不遂。不
省人事等也。

夫腦ヲ以テ精神意識ノ府トスル者ハ受生以下皆

篇及解剖諸書ノ說顯然。茲ニ贅スルヲ須ズ。蓋シ
腦髓ノ質タルヤ。細白軟脆ノ薄膜管ヲ以テ造成シ
タル脈狀物ヲ叢束シ疊回シ。其間ニ微細ノ泌胞ヲ
著ケ泌胞原名幾里爾。諸液別スルノ器。ナリ動脈ノ血ヲ承テ脳或說輸
スルト云リ。多血卒中ノ因由察スベシ。其中ノ精液
ヲ泌別シ取り吸氣ニ由テ天氣ヲ引キ。以テ靈液ヲ
釀シ。蓋シ彼カ所謂ル元氣ナル者ノ未だ説カザル者。
當シ。難キ所アリ。故ニ然ク譯セズ。詳説宇氏ノ醫範
提綱ニコレヲ白脈ノ中ニ傳テ神經トナス者是ナテ
リ。而テ一身諸部ニ灌注シ。知覺運動ノ機ヲ發スル

ヲ以テ官トスル者ナリ。故ニ若シ物アリテコヽニ
充塞シテ。以テ夫細薄軟脆ノ管ヲ壓迫スレバ。則神
氣發動ノ機ヲ障導シテ。以テ本文論ズル所ノ諸證
ヲ發スルナリ。此時ニ當テ脳内ノ血脈水脈モ亦蓋
皆閉塞ス。故ニ及ヒ諸脈ト云ナリ。蓋
其呼吸ニ鼾聲ヲ發スル者ハ。即循鼻白脈ニ鬱塞ア
レバ。十リ。平生強健ノ者ナリ。蓋シ人熟睡スレバ。亦善ク鼾
ハフ。其自然天機ニク鼾聲ヲ發スル所ニシテ。此病ノ鬱塞モ
同カラズ。故ニ其聲モス。脳管ヲ閉ガシレテ。以テ鼾
起。大差ニムベキカ如ク。且其無病平安ノ時。破輪ヲ軋
ルニハ非屢欠スル者ハ。頸筋及舌筋等ヲ循行スル白

脈ノ抽牽スルニ由テ自ラ其口ヲ放開スルナリ。四肢舉ラザル者ハ延髓ヲ壅閉シテ脊髓白脈_全部_ラ循行者スノ根原ヲ支障スルコアレバナリ。自餘諸證ノ如キモ亦皆コレニ準ジテ知ルベシ。然ドモ其閉塞スル未ダ極ラズ。唯其前腦ニノミ在テ。而テ後腦ハ猶開通スルコアリ。血ノ脳ニ輸スル。先_リ前腦_ニ先_リ其到_ル所_ニ閉塞_{ヨリ}。是胸_ニ而迫_ル後漸_リ後故ニ心肺等ヲ循行スル白脈_第八對循_リ。脈流通スルコ得テ呼吸脈動仍存スルナリ。若ソレ此等ノ白脈が次第ニ閉塞スレバ則漸_ク死

其證有寒熱之別。其毒有多血黏液之異。其因則種種不宜講究考索矣。

熱證卒中ハ多血上攻ヨリ來ル。故ニ其證顏色赤盈シ。浮絡緊脹シ。脈動強實ニシテ而テ鼾聲甚シク。又其將ニ發セントスルヤ必先頭重強痛。頭旋掉眩。耳鳴目赤。舌硬言難。四肢冷テ感觸ヲ減損シ。常ニ睡ラ嗜テ而テ安眠シ難キ等ノ徵ヲ見シ。且其平素肥満壯實ニシテ而テ酒漿ヲ好ミ。逸居シテ而テ膏粱ヲ貪ボル様ノ人ニ於テコレヲ得ルナリ。○黏液卒中ハ熱ヲ發スルヲ鮮シ。故ニ此ヲ寒證ト謂フ。其候顏

色黯淡。鼾聲甚カラズ。脈緩弱。若コレニ瀉血法ヲ施セバ。汚濁ニシテ帶粘。或ハ鉛色ヲ夾メル血ヲ出シ。其血凝結セズシテ而テ上面ニ皮膜ヲ結ブナリ。其前徵モ亦頭重眩暈耳鳴嗜眠等相似タルヲ有ト雖モ。強痛目赤及其他多血聚攻ノ徵ナク。眠レバ則鼾シテ而テ熟睡シ。精神乏缺シテ記憶ヲ失ヒ。頭面及ビ諸部ノ彼此麻木シ。暫ク其處ニ在テ亦移リナドスルヲ有リ。此證ハ老人及ヒ虛家。平素攝生良ナラズ。腸胃ノ運化損敗シテ而テ粘液留飲ヲ釀シソレガ血中ニ滯シテ傳テ腦ニ到リ。腦ノ血絡ニ留滯シ。

或ハ空間ニ滲漏シ漸次コヽニ充塞セルガ。或ハ房
勞。或ハ苦學。若ハ他ノ神氣ヲ勞スル事件ニ由テ良
能涸衰スルヲ有ルガ為ニ。其粘液ヲシテ化ニ順ハ
シメテ以テ便路ニ導泄スルヲ能ハズ。一箇ノコレ
ヲ引動スベキ事件アレバ。則一時ニ跋扈シテ而テ
脳内ニ満溢壅塞スルナリ。又多血家ハ其血必濃稠
ニシテ其行動スレバ輒千遲滯シ易シ。肥滿家ニテ
血薄クシテ粘液多キ人アリ。多血濃稠ノ人ト疑ヒ
惑フベカラズ。又疲瘦ニ見ユル人ニモ筋肉緊滿。血
質稠厚。其脈管ノ度ニ過テ多血然ルニ一旦怒氣奮
タルアリ。意ヲ用テ診別スベシ。然ルニ一旦怒氣奮
激シ。或ハ苦神勞力等ニ因テ急卒ニ血ヲ上逆セシ

メ。或ハ精烈ナル諸飲ヲ用テ血勢ヲ激行セシガ其
氣ノ醒ルニ臨テ俄ニ靜止畱滯スル者アリ。酒ハ其
テハ。則其慄悍揮發ノ氣ガ血中ニ入テ。血ヲ騷擾激
行セシムト雖モ。其醒ルニ當テハ。則揮發ノ氣既
散越シテ。而テ其酸收粘滯ノ質ノミ殘留シ。血行
前散ニ反シテ。而テ其酸收粘滯スルナリ。宿醉ノ頭重シ。身々ハ
諸物ヲ用ルヨリ來ル者ハ。唯其血ノ衝逆スルニ因
キ者。此因ト同シテ而テ輕キナリ。他ノ香竈辛辣ノ
外物ノ罪ニハ非ルナリ。故ニ其害ヲ十スモ亦甚
シ鮮又二證トモニ或ハ浴湯ノ蒸氣ニ中リ。或ハ炭火
ノ酸收氣ヲ吸シ。或ハ寒冷濕蒸氣ヲ觸冒シ。粘液卒ニ
動ス。或引ス。或ハ炎暑ニ中リ。日下ニ睡卧シ。卒中ニ引動血
中ス。或ハ驚怯恐懼シ。驚恐甚キトキハ。則卒中ノ因
キ者ト雖モ亦絶氣昏倒スル。因十

眩暈條下参考スベシ。或ハ打撲損傷ニテ腦中ノ脈絡ヲ破裂スル。或ハ多血上攻其血質醜厲ニシテ刺蓋シ舊他病アリテ血液腐敗シ。因テ脈管ヲ浸蝕シテ而テ脳内ニ崩漏溢滿スル者アリ。コレ必死ノ證等ヨリモ皆克コレヲ起發スルナリ。又其稟賦頭ノ異常ニ大。或ハ小。頸項ノ甚短ク。甚長キ者。以上因中頭ノ大キク頸ノ短キモ。或ハ胸部ノ甚狹窄ナル者。ノ殊ニ此病ヲ發シ易シ。或ハ膽液敗黑家。或ハ壞血。病毒感染。或ハ沈實家ニシテ手足毛多キ人。按ニ以上六因。多血起原ヲナスナリ。或ハ膽液敗黑家。或ハ壞血。病毒感染。或ハ曾テ痛風ヲ患タル人。或ハ腦水腫ノ人。水腫篇参考シス或ハ諸般ノ中毒ヨリ發シ來ルトアリ。右五因ベ

以前テニ其證アル。又嗜眠。或ハ不寐。或ハ劇頭痛。腦焮腫等ヨリ此病ニ陷入スル者比比コレアリ。先哲ノ說ニ卒中ニテ死タル人ノ屍ヲ解觀セシニ前腦室ニ血及ビ鹹渣粘液等充滿シ。尚腦ノ積襞様ノ間隙及膜間ニ布滿シテ脳ヲ圍包スルガ如ク。又脳ノ空間ニ白色。或ハ黃色。鹹渣及粘液等充滿シ。偶然脰モ鹹渣充滿シ。又鳥胃脈解藏圖賦ニ見タリ。及心藏ノ複間動脈大幹甚延長遲緩シテ。而テ血充滿シ。又粘液塊瘤及腫瘍ヲ脳ニ生シ。或ハ脳膜ニ生ズル者アリト謂

リ参考シテ其因ヲ知ルベシ。○卒中ニ兩手固握シ牙關緊急シ。或ハ風氣ヲ兼テ腹中雷鳴膨脹スルハ此レ癇ヲ挾ムノ證ナリ。敗惡ノ液脳白脈ニ滲入シ。諸筋ヲ抽掣攣引スルニ由ル粘液塊瘤ヨリ来ルハ。大率以前ニ心悸劇動シ。呼吸短促頭旋振掉鳥胃外靜脈腫脹ス蓋シ此證及瘧肉中毒脈管破裂ヨリ来ルハ。特ニ不起ノ證ナリ。凡呼吸平易ナルハ良トス。然ドモ多血證ニ刺絡後反テ呼吸重難ニ變ゼバ死證トス。其脈微細急ニ虛大ヲ見ハス者。口中泡沫ヲ出ス者。呼吸重難ニシテ冷汗スル者。溉導法ヲ施シテ藥汁ノミ下ル者等ハ總

テ死證ナリ。

○治療ノ標的トスル所ハ專ラ多血ト粘液トヲ辨别スルニ在リ。然トモニ二證共ニ先ツ刺絡術ヲ施シ。澤委申。頸靜脈又發疮膏ヲ項窩兩肩ノ或ハ兩脚ノ腨ニ貼シ。若ハ引降方ヲ足蹠ニ施シ。唯力メテ神識ヲ醒覺シ。閉塞ヲ開達セシムベシ。諸方劑スベテ泰西コレニ準ズ。○熱證卒中ハ油鹽溉導方ヲ作テ一時半ゴトニコレヲ施シ。且再三刺絡シ。又繃布ヲ取テ兩足ノ膝上ヲ強ク卷クベシ。此ヲ以テ脚ヨリ上還ヘ轉輸スル血勢湯藥口ニ入ルヲ得バ。則清涼下ラ減損セシム。

劑ヲ與フ。或ハ^{答未林度湯}消石飲。○寒證卒中ハ。石鹼溉導方ヲ施シ。刺絡ハ。唯一次シテ少ク其結滯ヲ疏スルノミ。固ク再刺ヲ禁ス。內服劑ハ。解粘疎通方ニ宣シ。コレヲ主ル。○諸病毒内攻ノ證ハ。各其宜所ニ隨テコレヲ導泄驅除スハ。ノ術ヲ兼施スベシ。○癘ヲ挾ムノ證アル者ハ。琥珀醇或鹿角精或鹿角鹽奇效アリ。○又總テ病者ノ頭ヲ高シテ卧シ。徐徐ニ手摩導引シテ。がテ其上迫ノ勢ヲ折キ。順下スルノ策ヲ施スベシ。○卒中ハ。一回治ヲ得ルヲアリト雖モ。再發シ易キモノナリ。且其再發スルヤ必ズ次第ニ危険ニ。

進ム。慎テコレヲ防。ズンバアルベカラズ。コレヲ防ノ法先。食量ヲ減ジ。殊ニ晩食ヲ食ハザルヲ佳トス。酒肉及一切辛熱ノ品ハ。固クコレヲ禁シテ食ハシムル。勿レ。蔬菜果實及ヒ酸味ノ品ヲ撰ミ用ユベシ。○熱證卒中ヲ患シ人ハ。殊ニ右件ノ攝養ヲ慎ミ。毎七日早天ニ酒石散一服ヲ用ユ。冷水ニテ送下スベシ。又一年ニ二三回。酸石湯ヲ用テ。腸胃ヲ清潔ス調シ。熱室及ヒ暑氣ヲ避ケ。早ノノ寐子早ク起キ。臥床ニ在ル。四時ニ過ル。勿レ。若シ血多ク脳ヘ逆衝

スルノ徵ヲ見バ速ニ刺絡シテコレヲ瀉スベシ。慎
テ浴湯ニ入ルベカラズ。○粘液卒中後モ亦大率前
ニ同ク調護スベシ。但服藥ヲ殊ニシ。刺絡ヲ用ヒズ。
毎七日早晨ニ紫茉莉散一服ヲ與フ。服法前ニ同シ。
○凡卒中ノ前兆アル者。豫防法右ニ準シテ知ベシ。
○昏睡嗜眠等ノ病モ亦皆脳ノ閉塞スルナリ。故ニ其
因モ亦相近シ。但其毒ノ輕重微甚。其毒性ノ厚薄酷
和其中傷ノ頓漸緩急。其病勢ノ劇烈寬舒。一一同ジ
カラザルカ為ニ。種種其證ヲ異ニスルノミ。治術モ
亦類推シテ知ヌベシ。但治ヲ誤テ以テ卒中ニ陥セ

シノザルヲ要スルノミ。

癥病第八

癥之近因。白脈閉塞。且痿弛也。白脈之為物脈狀而如實。
起乎腦及脊髓。而經綸全身。通靈液。達神氣。以供知覺運動之用者。故靈液若黏凝。則不易流行焉。或於此。或於彼。留滯壅塞。而遏閉神氣。乃頑麻不遂也。蓋此病自卒中變來者固多。因及證共易知也。自餘輕重不均。由是推之。條理自分明矣。

癥ハ卒中ト同因ニシテ。但微甚ノ異アルノミ。蓋シ

卒中ノ因トスル所ノ多血家及粘液家ハ則靈液ノ質自ラ稠粘氣ヲ含ミ動スレバ輒チ留滯ノ患ヲ將來スルヲアリ。蓋白脈ハ微細ノ空管ヲ聚メテ造液苟モ精微ナラサレバ。則留滯ノ患ヲ致ス故ニ。脾之靈液ノ病也。故ニ靈液苟モ無ガ如シ。故ニ靈液苟モ精微ナラサレバ。則留滯ノ患ヲ致ス故ニ。脾ヲナスノ病毒増益スレバ。則直ニ腦髓ヲ閉塞セシメテ以テ卒中ヲ發シ。又卒中ノ病勢減退スレバ。則其毒ヲ白脈中ニ驅逐シテ而テ癥不遂ヲナスナリ。チ良能ノ為ル所ナリ。其他癰瘍擣搗リ。後條ヲ参考スベシ。ナ或ハ燥熱ノ地氣。按ニ脚氣麻痺。若ハ寒濕ノ時氣ヲ受ケ。此粘液ノ因シト。或ハ過酒。或ハ閑逸以テ身體ノ運動ヲ缺乏シ。

或ハ常ニ泄除スベキモノ、閉塞シ。或ハ驚怖シ。或ハ茶ヲ過飲シ。茶ハ白脈ヲ損害。或ハ平常毒物ヲ持アツカフヲ業トスル者。水銀。鉛。砒石等ヲ云フ。リ毛孔ヨリ傳テ血中ニジ。因テ此患ヲ將出シ来る。ナリ。其本質粘稠ナルニ混ハ非レドモ。其酷厲ナル氣ガ白脈ヲ衝動攣急セム。ルヨリ起發スル者ニシテ。若其性ヲ論スレバ。則痛ト甚相近シ。等ニモ亦此患ヲ發スルヲアリ。若夫卒中ヨリ来ル者大概半身不遂ヲ見ハスハ。是脊髓ニ中膈アリテ左右ヲ分別スルガ故ニ。其毒ノ驅逐セラル、ニ當テ。或ハ左或ハ右。便ニ就テ一方へ遂射シ。乃キコヽニ壅塞スルヲ以テナリ。脊髓ヨリ出ル白脈

ハ表部ヲ循行スル。又脳髓或脊髓ノ金創若ハ隔皮
傷及諸部白脈ヲ切斷シ折傷シ。或ハ久ク緊縛桎梏
ヲ受テ押壓シ。或ハ腫起後ニ硬結シ。或ハ脱臼轉筋
繆戾スル等ニ由。テ其一部今及ビソレヨリ傳次シ。
同カラズト雖モ。其白脈閉塞スルニ於テハ一ナリ。
アリ。此ハ其毒ガ其部ニ固著スルナリ。審辨處置スル者
アリ。ヨリ來ル者ニモ。亦唯一部分ノミ痺スル者
シベ。凡痺ノ所在。刺痛ヲ覺ハ。アルハ。是其閉塞イ。
ダ極ラズ。靈液間ヲ窺テ突衝激行スルノ致ス所。譬
バ手ヲ枕ニシ。若ハ久坐シテ。各部ノ白脈ヲ壅閉麻

木セシメタルが起テコレヲ緩舒スレバ。則靈液俄
然トシテ突衝激行シテ以テ酸痛ヲ發ス。允ト同機
ナリ。又此病手足身體外表ノ知リ易キ部ニ於テス
ルノミナラズ。眼耳鼻口舌及内部心肺諸藏陰莖ノ
直筋膀胱ノ括約筋等ノ麻痺スルヲアリ。然トキハ
則各其部ノ官能ヲ廢ス。察ヒズンバアルベカラズ。
又此病ノ一所各部ニ於テスル者。諸疼痛。或ハ他諸
病ニ冒寒ヲ挾タル後ニ於テ發スルト多シ。是冒寒
妻ハ喜ンテ頭腦ニ滛シ白脈ニ流注スル者ナレバ

○凡面部諸筋ノ痺及身體全部頑痺シテ些ノ觸覺モナキ者ハ難治ナリ。金創打撲ヨリ来ルハ不治ナリ。緊縛抑壓轉筋繆戾ヨリ來テ其部ノ養化緩氣等脱却シ或ハ甚熱シ緊張スル者及劇烈ナル搐搦ヨリ來ル者卒中後ノ痺及惡液質ノ人壞血質ノ人衰老ノ人等ニ發スルハ皆險證ナリ。

○治法多液質ノ壯年輩ニ於テハ多血ヨリ發スル卒中ト同ク調攝シ刺絡術發疮膏及洗導方或ハ下劑ヲ用テコレヲ療ズベシ。長老輩及痿弱弛廢或ハ精力衰弱ヨリ起ル者ハ前法ニ相反シテ溫性芳烈ニ

シテ稀釋透竈スル食品及藥劑ヲ撰用スベシ。白芥子山薑菜コレニ宜シ。○凡患部ヲ温手ニテ摩擦スベシ大ニ良ナリ。又發疮膏ヲ貼シテ甚效アレドモ若其處ニヨリテ貼シ難キ者ハ揮發油ヲ擦シ或ハ篤耨香油或ハ蛤雅布的油ヲ塗ベシ又毎日其部ニ越列紀的爾ヲ施シテ良ナリ。○癰瘡搗拗ヨリ来ルヨリ來ル者ハ先其本因ヲ避ケ且其毒ヲ和スルノ藥ヲ兼用スベシ。

舌痺言語蹇滯ノ證泥菖散ヲ含シ或ハ丁香油ヲ塗ルモ亦

良ナリ。諸方剤總テ泰西方鑑
ニ集載ス。撰用スベレ

癇瘍第九

癇瘍之近因。毒攻腦髓而白脈攣急抽掣也。故其方發也。知覺運動共廢。顛倒而不省人事。見支體強硬。固握搐搦。眼目旋回。吐沫放溺等證也。蓋其證有虛實類似傍發等症。騃昏沈神鬱愁等證也。蓋其證有虛實類似傍發等之區別。其遠因有遺毒自發連及等之殊異。苟不用意察之。臨治安得適中。

脳髓ハ精神ノ府。白脈ハ靈液ノ路ナリ。如今毒コヽ

ニ在テユレヲ攻ム。其發スル所ノ證。豈リレ輕易ナルヲ得シヤ。蓋シ其發作休止スル所以ハ。是其病毒漸ク滋長シテ。腦中ニ鬱積シ。時アツテ脳管ヲ刺戟スレバ。則カノ良能ナルモノ。コレヲ觸覺シテ。排斥驅逐セシコヲ欲シ。元運ヲ壯盛ニシテ。以テ其毒ヲ彈射スレバ。其毒直徑ニ白脈中ニ注射シ來リ。白脈モ亦其刺戟衝動ニ勝ズシテ。筋肉皮膚ノ枝末細纖ニ至ル。ハデモ。一時ニ攣急短縮スル。譬バ片肉ニ巖醋ヲ注ケバ。則忽キニ緊縮スルガ如シ。此時ニ當テ脳管戸ヲ閉テ。五官職ヲ廢スル。猶ヲ熟睡ス

ルガ如ク。稍其時ヲ經ルノ間ニ。脳髓モ亦其勞ヲ休復シ。且ツ再ビ新鮮ノ靈液ヲ釀シテコレヲ白脈中灌注シ。病毒ハ則多少ニ口ヨリ尿ヨリ表發ノ蒸氣ヨリ。汗トナリテ流ル。則體外ニ驅出セラレテ。其銳鋒ヲ挫折シ。殘餘ノモノハ已コト得ズ。元氣ノ運行ニ隨順シ去テ。始テコヽニ醒覺スル。ナリ。然ト或ハ一日ノ間ハ多少頭痛ノ一證ヲ殘留ス。爾後時日ヲ經過シテ。其毒復滋長スレバ。則發作スル。前ニ同シ。或ハ毎年春秋至テハ。毎月望ヲ期トシ。テ發スル者アリ。甚キ者ニ至テハ。毎七日。若ハ三四日。若ハ日發スルモノ有ナリ。此正面癇病ノ情狀ヲ説クノミ。若夫類似傍發ノ俗所。

ツ謂ケルヒキノ證ハ其機相同ケレドモ。其毒性等シカラズ。故ニ其狀ヲ異ニスル所ナクンバ非ズ。又只擣搣瘡攀スルハ未タ顛倒不省人事ノ證ニ至ラザレドモ。其毒却テ本病ト同シテ。稍輕微ナル者ナリ。○此病ノ遠因ヲ原ルニ。第一先天ノ遺毒。是レ其父母ノ攝生不良ニシテ。以テ酸敗酷厲ノ毒液ヲ生ジ。精液若ハ血中ニ含畜シテコレヲ二世或ハ數世ニ流傳スルナリ。次ニハ妊娠ノ中其母大ニ驚核スル。アレバ胎兒コレガ為ニ連累セラレテ。此病ノ因由ヲ生ズル。アリ。自發ノ證ハ。此其兒ノ既ニ食スル

頃ヨリ愛養節度ナク。或ハ甘味厚烹ノ物ヲ過食セシメ腸内ニ酸敗鬱積シテ以テ血液ノ原化ヲ損シ。乃チ血液ヲ變壞セシムテ遺傳ト同ク根結セル病因トナルアリ。長シテ後ト雖モ其攝養非度。或ハ過酒等ヨリ來ルハ皆是同軌一轍ナリ。又頭蓋骨ノ常ニ反シテ内へ突起シ。或ハ脳ノ造成異常ナル者。或ハ塊瘤様ノ物ヲ生ジ。或ハ骨状ノ物若ハ小石ヲ結成シ。参考スベシ。石淋ノ因物ヲ生ジ。或ハ蟲ヲ生ズルヨリ發スル者アリ。蓋此皆不治ノ證ニシテ下ニ所謂誘發ノ諸因アレバ。則チ脳神ニレガ為ニ抵觸感動シテ立地ニ此患ヨリ將出ス。又其稟賦血質酷厲ナル者尋常鼻衄痔血經

血等ノ通泄ニ由テ其有餘ヲ損セシガ。一旦閉塞シテ^{其閉塞スルハ。蓋シ}血質而テ満溢上衝スレバ。則類瘤ヲ發スルアリ。又憤怒失意凶禍憂愁等ニテ神思ヲ勞憊シ。或ハ房勞過極長病衰弱等ニテ脳髓虛損シ。諸部ノ運化健ナラズ。乃チ惡液ヲ釀成シ來アリ。又潰瘍若ハ頭瘡。若ハ疥癬。若ハ他ノ皮膚病ヲ急ニ不當ノ治ヲ施シテ以テ其毒ヲ内陷セシメ。或ハ癰瘍痛風等ノ酷厲毒頭腦ヲ上攻スルヨリ來アリ。故ニ又コレニ反シテ。本瘤疾アリシガ愈ルモアリ。又脫血過多。或ハ吐下過甚等ニテ脳内血ニ乏シ。或ハ養液ヲ

缺キ。脳管白脈共ニ畏縮シテ以テ發癇スルヲアリ。又外傷金創破傷風。或ハ大ニ驚核スルニ因テ發スルヲアリ。故ニ小兒ノ本此病因アル者ハ勿論ナリ。若否ル者モ屢驚核スルトキハ便誘シテ發癇シ或ハ遂ニ真因ヲ釀成スルナリ。所謂驚風ノ名義ハ蓋シ茲ニ由ルナリ。蓋シ小兒ハ元來腦質及白脈等モ統テ軟脆薄弱ニシテ感觸尤速ナル故但然意識ハ他ノ諸病殊ニ胎糞不下。或ハ熱病痘疹等ニ嬰リ。或ハ歯牙將ニ生セントシテ齦痛呻吟スル者。及食滯腹痛。蛔蟲咬痛等ノ病アル者ハ則チ誘シテ癇症擣搦ノ證ヲ第發シ来ル。

ナリ。脈中熱病ハ直ニ脳刺衝シ。遂ニ頭脳ヲ攻メ。其他ハ則各部ノ白大人モ亦壞血病毒アル人。及肝脾ノ病アル人。婦人ノ子宮衝逆等ニ於テ連及傍發スル。鮮カラズ。○凡此病ヲ發スル時。必ズ頭旋。眩暈耳鳴。或ハ踵或ハ脅ヨリ寒氣昇騰スルト覺テ。遂ニ意識ヲ失フテ而テ顛倒スルモノナリ。毎發宜ク病人ヲシテ頭及身又適宜ノ大サニシテ綿布ヲ固ク卷キタルモノヲアオク。要ス故ニ高ニ登リ。若シ已ヲ得ス高ニ登シテ膝上ヲ卷縛スベシ。能ク深ニ臨ミ。或ハ日氣烈ヲ此病ノ發作ヲ防止ス。

望ミ。苦ハ久ク其氣ヲ受ケ。或ハ動搖スル物ヲ久視シ。或ハ劇ク動作シ。或ハ烟草ノ氣ニ中リ。或ハ精烈ノ諸飲ヲ服シ。或ハ苦學勞情等ノ頭腦ヲ虛耗スル事件等。皆ヨクコレヲ誘發スルニ足ル。宜ク慎テ。レヲ避ノベシ。○凡此病小兒ノ時ニ發シ。且深重ナラザル者ハ大抵男子ハ精液ノ通シ。女子ハ月事ノ至ル頃ニ於テ治ヲ須ズシテ自ラ愈ル者多シ。其年頃ニハ。血液大ニ成熟シテ。血中ニ揮發鹽ヲ生ズル多ク。良能コレニ因テ。又テ酸敗ノ害母ヲ制伏シル故ナリ。若夫先天ノ遺毒等ニテ其根深ク。尚且神識既ニ精爽ヲ奪レテ痴騃昏迷ニ至ルガ如キモノハ及

既ニ二十五歳ヲ過テ癆ザル者ハ治シ難シ。四十歳以後コレヲ發スル者ハ生涯復故ヲ期望スベカラズ。凡腦中ニ物ヲ生ズルノ類ハ。假令劇證ニ非ト雖モ不治ナリ。腦中虛損ヨリ來ルモ亦治シ難シ。瘡状ノ熱後ニ發スルハ先兆ナリ。瘡後ニ瘡狀ノ熱ヲ發スルハ善兆ナリ。此ハ良能此熱ヲ發シテ以○治法發作ノ時ハ先ツ其急ヲ救フベシ。宜ク速ニ病人ヲ通氣新鮮ニシテ鬱滯ナキ處ニ移シ。冷水ヲ取テ顔面ニ喫キ。次ニ虛證ニ屬スル者ハ鹿角精。或ハ硇砂精等ノ揮發透竊ノ品ヲ用テ鼻ニ嗅セ。或ハ顎

顆ニ擦シ。若ハ一二滴ヲ取テ水少許ニ和シ服セシ
ノ。ガテ醒覺セシムルヲ要ス。實證ニ屬スル者ハ。
鎮痉散良ナリ。琥珀醇モ亦奇效アリ。固ク他ノ精烈
藥ヲ用テ熱ヲ發セシムル勿レ。閉治ノ方ハ大率
吐劑下劑及強腦壯心劑ノ類ヲ撰用スベシ。又類瘤
ノ病毒腦中ニ在ル者ハ譬バ多血家ハ刺絡打膿貫
線法等ヲ施シ。衰弱ヨリ来ル者ハ吉那健補ノ劑。諸
病毒内攻ヨリ来ル者ハ發庖膏。或ハ各其宜ニ随テ
コレヲ驅除ス。齒牙出ガタク。寒熱シテ發癟スル者。
鹿角精ニ宜シ。服法前准^ズ又他ノ本病アル者。譬バ蛔蟲。

痘疹食滯。脾病。子宮病ノ類モ亦皆宜ニ就テ其根原
ヲ治スベシ。若夫レ治ヲ施シテ各其當ヲ得ルハ。
唯診察ノ精別ニ在ノミ。諸方劑總^テ泰西方鑑
ニ集載ス。撰用スベシ

頭痛第十

頭痛之近因於前腦後腦厚薄腦膜。或頭蓋膜及筋肉等
諸部惡液穿蝕刺衝。或白脈攣急。或血脈壅閉^ス之所致也。
腦髓ハ本連屬シテ一物ナリト雖ドモ。分裂區別ス
ル所アリテ。自ラ前後ヲ分ツナリ。薄腦膜ハ下ニ在
テ脳質ニ附著シ。腦ノ積襞様ノ形ニ隨テコレヲ區

包ス。厚脳膜ハ上面ニ在テ頭蓋骨内ニ布滿ス。ヲ内
入部ト頭蓋膜ハ頭蓋骨ノ外面ヲ被布シテ筋肉ノ下
ニ在リ。筋ハ即チ皮下ノ赤肉是ナリ。從來以テ筋肉ト
則赤肉ノ首尾骨ニ附著スル所ニシテ其全體ニア
ラズ。詳說解剖諸書ニ見タリ。以上ヲ外部トス
凡ソ疼痛ハ何ノ部ニモセヨ。茲ニ一物アリテ其處
ニ留滞シ以テ靈液ノ運行ヲ障尓スレバ。則自然ノ
良能コレト相抗抵シテ而テ突衝戰鬪スルヲ。白脈
ニ觸レ意識ニ覺ヘテ。而テ疼痛ヲ發スルナリ。

其證有專發。兼發。疾作休止。持久不止之異。及滿頭痛。偏
頭痛。眉棱骨痛。耳上痛。卵點痛。如刺痛。牽張痛。抑捺痛。鼓

動痛熱痛寒痛等之別

上

專發ハ主トシテ頭痛ヲ發シ來ルナリ。兼發ハ他部
ニ病アリテ連及スルナリ。發作休止。或乍發乍止ハ。
其毒聚散シテ往來スルナリ。持久不止ハ。其毒固著
シテ移ラザルナリ。滿頭痛。毒彌滿スルナリ。其他
ハ各部ニ著クナリ。如刺痛ハ。酷厲液白脈ヲ刺衝ス
ルニ因リ。牽張痛ハ。攣急セシムル性ノ毒アルヨリ
シ。抑捺痛ハ。收斂性ノ毒ヨリ來ル。鼓動痛ハ。動脈ノ
血ノ上衝過多ナルヨリ來リ。熱痛寒痛ハ。各其毒ノ
性ト其稟賦ノ殊異トニ從フナリ。又劇痛シテ處ヲ

移サズ持久シテ堪ベカラザル者ハ身體及精神トモニ衰弱シ不寐不食視力昏暗耳中騒鳴拘急搐搦或ハ發癇嘔吐シテ大便祕結シ四肢微冷スル等ノ證ヲ兼發ス。

其遠因有遺毒熱毒多血聚攻勞神勞役過飲過食或感冒時氣暑濕燥氣香臭汚氣南風薰蒸或外部創傷隔皮傷内外焮腫膿瘍硬結腫及諸部瘡毒丹毒痘疹癰毒疥癬痛風毒等內陷者或脈外溢餘血水液腐敗液暗液敗黑壞血病毒黏液痰飲鹹渣石灰性毒等種種不同矣又兼發之因第一胃中疾病及肝脾腎病若子宮病等也因

證多端如是豈可徒認其標而施治哉

遺毒ハ父母ヨリ傳テ血液ノ性質不良ナルナリ。下

云フ癰毒或壞血家或暗液敗黑質等ニテ其父母毎時頭痛セシ者ニシテ其子モ亦然ルナリ熱毒ハ必ス其熱ノ發作スルトキニ當テコレヲ得ルナリ其甚キ者ハ必是ヨリ譖妄發狂シ或ハ昏睡病ニ陷入ス。詳ニ熱病篇ニ載多血聚攻ハ多ハ稟質ニ由ルナリ又甚肥滿セル人ニ非ルモ其血稠厚ナルカ。或ハ平素鼻衄痔血經血等ノ有シガ一旦閉塞シテ泄セザレバ則満溢上衝シテ而テ焮痛シ一處ニ留滯スレバ偏頭痛卵點痛等ヲ發シ久キトキハ敗瘀

シ。酷厲ニ變ズレハ刺痛シ。粘液ヲ兼レバ寒痛シ。鹹渣ヲ夾スレバ膿潰シ。腐敗スレバ蟲ヲ生シ。乾固スレバ硬結腫ヲ生ズ。凡ソ是ノ如ク變壞スルトキハ則難治ノ頭痛ヲ發シ。或ハ遂ニ卒中若ハ癇瘻等ニ陷入スルヲアリ。勞神スレバ腦髓虛損シテ其部ノ運行健ナルヲ能ズ。血液留滯シテ頭重ヲ發シ。遂ニ疼痛ヲ發スルナリ。且ツ其精神ヲ過用スルガ為ニ腦管漫爾トシテ哆開シ密閉セザルヲ以テ無用ノ諸液濫入シテ共ニ頭痛ノ因トナルナリ。不寐ヲ兼ルモ亦同機ニ出ヅ。勞力度ニ過テ疲極セルヨリ来るモ亦同シ。但コレニ加ルニ血液上衝ノ勢甚キアルノミ。過飲ハ則血行ヲ激進上衝シ。其悍烈精微ノ氣ハ遂散シ。酸收黏稠ノ氣ノミ殘留スルニ當テ。血液忽然ト凝泣滯著シ。又其悍烈ノ氣ノ在シ時ニ腦管ヲ衝開シテ。而テ諸液濫入ノ患ヲ致セシ者ト併。テ頭痛ノ因ヲ引クナリ。過食ハ胃ヲ病シメテ。弟發頭痛ヲ致シ。又其胃ヲ病シムルノ常常ニシテ休ス。以テ酸敗液。腐敗液。粘稠液等ヲ釀成スルニ至テハ。則皿中ニ入り靈液ニ混シ。刺痛寒痛牽張痛等ヲ發シ木ルヲアリ。感胃スレバ。表發ノ蒸氣ヲ閉チ粘

ルモ亦同シ。但コレニ加ルニ血液上衝ノ勢甚キアルノミ。過飲ハ則血行ヲ激進上衝シ。其悍烈精微ノ氣ハ遂散シ。酸收黏稠ノ氣ノミ殘留スルニ當テ。血液忽然ト凝泣滯著シ。又其悍烈ノ氣ノ在シ時ニ腦管ヲ衝開シテ。而テ諸液濫入ノ患ヲ致セシ者ト併。テ頭痛ノ因ヲ引クナリ。過食ハ胃ヲ病シメテ。弟發頭痛ヲ致シ。又其胃ヲ病シムルノ常常ニシテ休ス。以テ酸敗液。腐敗液。粘稠液等ヲ釀成スルニ至テハ。則皿中ニ入り靈液ニ混シ。刺痛寒痛牽張痛等ヲ發シ木ルヲアリ。感胃スレバ。表發ノ蒸氣ヲ閉チ粘

稠酷厲ノ液ヲ生ジテ上攻シ。且ツ流注シテ定ラザ
ル。乞發シ乍止ム等ノ痛ヲ發ス。時行ノ氣ハ熱毒ヲ
釀シ。或ハ種種ノ腐敗ヲ致スヨリ來ル。暑濕燥氣ハ
血ヲ沸騰上衝シ。或ハ表發ノ蒸氣ヲ閉ギ。或ハ酷厲
液粘稠液等ヲ釀シテ上攻頭痛シ。中ニ就テ炎天日
輪ノ氣ニ中レバ。腦癰腫ヲ發シテ劇烈ナル頭痛ヲ
發シ。遂ニ不起ニ至ル。アリ。香臭汚氣ハ直徑ニ鼻
ヨリ入テ。頭腦ヲ突衝閉塞セシムルナリ。南風薰蒸
ハ血液ヲ上衝シテ。且ツ緩行鈍滯セシムルヨリ來
ルナリ。外ヨリ創傷シ打撲セルハ。或ハ白脈ヲ損傷

シ。或ハ兎血滯著シ。腫痛スル等ナリ。又焮腫膿瘍硬
結腫等モ外部ニ在ルハ知易シ。若シ内部ニ在ルモ
同機ナリ。而レドモ診別シ難シ。但其痛尤モ劇ク且
ツ少時モ休フナキノ患ヲ致スモノナリ。此證連綿
巴多クハ旨目。卒中耳聾諸瘡毒内陷上攻スル者ハ。レ
譖妄癩瘍ノ類ニ陥入ス。諸瘡毒内陷上攻スル者ハ。
各其前證アリテ察知シ易シ。脈外溢餘ノ血液ハ其
始ハ良性ノ物ト雖モ。其道路ヲ離レテ留滯スルモ
ナル故ニ復ビ元運ノ化ニ隨去ル。難ク乃脳ノ
空間ニ泛濫シテ以テ脳髓ヲ壓迫シ。持久不止ノ頭
痛ヲ發スルトアリ。若シ既ニ久ヲ經ルトキハ。則鬱

敗シテ酷厲質ニ變シ。刺痛。劇痛。熱痛等ヲ發シ。若シ粘凝質ナル者ハ重痛。抑痛。寒痛等ヲ發ナリ。凡血液行路ノ脈管アリ。平素ハ毫滴モ其外へ出ル。八十シ。故ニ凡ソ身體中空間ノ處ハ則居恒空氣ノ外ハ復物ノ茲ニ在ルナシ。若其血液或ハ脈外ニ漏泄シテ其行路ニ順ヒ去ル。能ハザレバ。遂ニ其處ニ漏瀦腐敗スルニ至ルナリ。其機ノ例シテ察スベシ。易以下キハ水腫病是ナリ。餘ニ亦准ジテ察スベシ。以下舉ル所ノ諸液モ皆是血中ニ含蓄ンテ腦中ニ齋シ來リ以テ禍ラナス。前註ニ謂フ所ト同機ナリ。但其毒ノ性質ニ隨テ差異ヲ致スノミ。水液トハ水状若溢溜夥多ナルトキハ則腦水腫ヲ患フ。蓋シ此ハ小兒於テコレアル病ナリ。腐敗液ハ液性ノ損敗質ノ液ヲ奪ル人齋シ來ルアリ。又前註ニアリ。又一論ズル如ク溜溢スル。

ニルニ由テ腐敗スルアリ。膽液敗黒家ハ下ニ見ハス。粘液留飲ハ胃ヨリ來リ或ハ感胃ニ由テ生ス。鹹渣ハ老敗無用ノ鹽質ヲ含メル液。尿トナリ汗トナル者是ナリ。石灰性毒ハ是ノ如キ性又兼發頭痛ハ皆其ノ一種ノ惡液ニ生スルナリ。中ニ就テ胃ハ後天資生白脈ヨリ連及シ來ルナリ。中ニ就テ胃ハ後天資生ノ本ニシテ白脈ヲ賦スル。尤多ク脳ト親交スル。他藏ノ比ニ非ス。故ニ胃ニ病アレバ。則頭痛シ。腦ニ患アレバ。則恶心嘔吐シ。或ハ化熟ノ機ヲ妨ケ。範提綱ニ詳説アリ。就テ見シ。又病肺ト肝ト交通ス。漢醫ノ所謂。肺藏府表裏ノ説ト大ニ異詳ニ察セザレバ。其根何レニ在フヲ辨ジ難シ。又婦人ハ多ク子宮病ヲ患ルニ由テ頭痛ヲ發ス。

ルモノナリ知スンバアルベカラズ。

○凡ソ頭痛尋常ハ大抵腦外ニ在リ。若其薄脳膜ニ在ル者ハ深ク裏ニ在テ且ツ眼病ヲ兼ヌ。眼膜ト聯ル厚脳膜ニ在ル者ハ腦ノ表面頭蓋骨下ニ抵觸ス。偏頭痛ハ胃中ノ汚物ヨリ發スルト多ク。癪毒ヨリ來ルモ亦少カラズ。而テコレヲ辨ズルニ。癪毒ハ喜テ骨ニ就キ以テ脳蓋ヲ潰亂侵蝕スルナリ。徵スベシ痘疹後ニ時ラ定テ頭痛ヲ發スルハ必ズ壞血病毒アルナリ。凡壞血家ノ頭痛ハ殊ニ愈ガタキ者ナリ。鼻涕閉塞ヨリ來ル者ハ額内麻スルガ如クニシテ以ナル。

○全頭重シ。胃病ヨリ來ル者ハ前頭ニ響キ。子宮病ヨリ來ル者ハ後頭ニ應シ。且ツ惡寒ヲ兼ヌ。其部ノ白以スルヲ

○遺毒ハ根治シガタシ。然ドモ其毒性ヲ察シテ適宜ノ方ヲ處スベシ。多血聚攻及内外焮腫ノ候アリ。痛ミ鼓動シテ顏色赤盈スル者等ハ刺絡角法ヲ施シ。或ハ蟻鍼法ヲ願。若ハ耳後ニ施シテ血ヲ瀉スベシ。次ニ發疮膏ヲ領。或ハ耳後。或ハ痛處。或ハ舉頭ニ傳テ可ナリ。諸毒内攻スル者ハ各其宜ニ隨テコレテ導泄スベシ。壞血病毒。膽液敗黒。粘液留滯等ヨリ

發スル者ハ大率下導スルニ宜シ。停食及胃中ノ腐
壞物ヨリ來ルハ尤モ強ク下スベシ。或ハ先ツ吐
ニ大黃剣ヲ與ヘテ克クコ一ヲ清滌シ。終虛弱家ハ
健胃醇ヲ與テ其再發ヲ防禦スベシ。終虛弱家ハ
則脚湯法及引降剣ニテ安静スベシ。重證危篤ナル
ハ既導方若ハ緩下剣ヲ與テ而テ后催眠藥ヲ用テ
コレニ鎮スベシ。若シ劇證ニ非ル其他熱毒感冒シ
鼻涕閉塞シテ頭痛ヲ發スル者ハ砂時氣暑濕及
精或ハ刺戰性ノ嘔藥ヲ施シテ可ナリ諸方
諸兼發ノ證ハ宜ク其本病ニ就テ處置スベシ。剣總

病因精義卷之二

ア泰西方鑑ニ集
載ス。撰用スベシ

