

病因精義

七

特別
79
1188
7



79
1188
7



病因精義目次

卷之七 四篇上

吐血第三十二

心悸動第三十三

不食第三十四

飲食難化第三十五
痿黃病

饑嗜第三十六

發渴第三十七

嘈襍第三十八



病因精義
卷之七目次

99-1328

病因精義卷之七

桃塢小森先生講述 男 桃郭義真筆記

吐血第三十二

吐血者。血出自口之總稱。而其所由來不一。有自肺溢者。或自胃逆者。或自咽喉及口內諸部漏滴者。或鼻衄經喘。門而出於口者。數證之中。唯肺血為重。故今主論肺血。而括餘證。胃血則屬於之下腔。而別論焉。凡血證之近曰動。靜二脈之膜管破裂。若其末梢鬆疎弛緩而透漏也。而肺脈致此患之因。則劇烈咳嗽。猛怒叫喚。號泣高歌。及強動。

擧重墜墜隨撞衝登高吸氣冒寒北風中暑炎熱久浴熱湯
貪飲烈酒或熱病血躁血質酷厲通血閉澀多血滿餘或
稟賦胸腔褊狹若肺脈脆弱若其父母先嬰此患者等也
夫肺血者假令輕微亦有漸難治况其重者必死不起之
木患也宜用意救療之且使慎攝養不則千百皆入鬼簿
不可不恐懼矣又自喉頭脈絡破裂來者亦是咳嗽烈聲
及登高吸氣冒寒北風等之所致他壞血病齒齦腐爛而
出血者之外口內刺傷出血等亦不足論也耳

凡血ノ口ヨリ泄スル皆コレヲ吐血トス然ドモ其
由テ来ル所同カラザレバ則其證モ亦殊ナル所ア

リテ輕重差等ナキコト能ハズ詳ニコレヲ辨別スベ
シ。第一肺血ノ證ハ其輕重ヲ論ゼズ必先咳嗽ヲ發
シテ而シテ血コレニ從ヒ或ハ咳ト共ニ出デ其血
必鮮紅ニシテ泡沫アリ。若夫打撲撞傷ヨリ来ル者
故血ニ必黑色ノ若其稍重且多血ナル人ハ多少呼吸
不利シ。胸内苦悶シテ而シテ或ハ左或ハ右ニ隱隱
ト痛ヲ覺エ或ハ牽掣刺痛シ甚トキハ胸背ニ徹シ
或ハ季肋ニ牽掣シテ痛ニ顔色赤盈シ或ハ胸中壯
熱シ且摩痒スルガ如キヲ覺ルナリ。喉頭ノ動靜脈
ヨリ来ル者モ亦咳呵シテ而シテ痰唾ニ交出ツト

雖モ。泡沫アルコト無ク。且胸内ニ些ノ異證アルコト無シ。又鼻衄ノ嚙門ヲ經テ口内ニ来ル者ハ。或ハ咳シ。且粘液ヲ交出スコトアリト雖モ。固ヨリ胸内ニ異證ナク。且其人モ亦嚙門ヨリ滴下シ来ルコトヲ覺ル者ナリ。又口内咽門。若ハ齒齦等ヨリ出ル者ハ。咳ナク痰ナク。口内直ニ甘味ヲ覺テ唾ト共ニ出ルナリ。若夫胃血ハ。則本篇ニ於テコレヲ詳説ス。宜ク就テ参考スベシ。○肺血ノ必咳スル所以ノ者ハ。其脈絡破裂ヨリ漏滴スル所ノ血ガ。肺ノ細膜囊及氣管ノ枝末ニ留滞シテ。其氣ノ入ルベキ道路。及容

受スベキ處ヲ障礙シ。且其質變汚酷厲ニナリテ所在ノ白脈ヲ刺傷シ。已ムコトヲ得ズ拘攣掣急シテ咳ヲ發スルコト。猶痰飲ノ肺ニ留滞シテ咳ヲ發スルガ如ク一般ナリ。又其泡沫アリテ鮮紅ナル所以ノ者ハ。則呼吸ニ由テ新氣ヲ含ムノ致ス所ナリ。試管ヲ取テ他ノ粘液中ニ氣ヲ吹入レ見ルベシ。必泡沫ヲ起シ。且色アル者ハ更ニ淡泊ニナルナリ。理コレニ然ドモ若其細膜囊ヲ纏絡スル所ノ脈管ノ末梢。弛緩鬆疎ナルヨリ透漏淋漓シテ出ル者ハ。則數條ノ血縷ヲ痰唾ノ中ニ咯出スルノミ。泡沫ヲ見ルニ至ルコトナシ。○肺脈ヲシテ破裂シ。若ハ弛緩セ

シムルノ因。劇烈ナル咳嗽。及猛ク怒リ。叫ビ喚ハリ。號泣シ。高歌スル等ヨリ来ルハ。皆是肺ヲ牽張攪揉シ。加ルニ血行ヲ急疾ナラシメテ。コレヲ突衝スルノ致ス所ナリ。譬バ紙囊ヲ揉テコレヲ牽張り急ニ緩ルハ。破裂シ。若ハ強動シ重ヲ舉ルモ。亦是肺脈ヲ牽張シ。血行ヲ急疾ナラシムルノ致ス所。但此ヲ攪揉スルコト無キヲ異トスルノミ。墜墮撞衝ハ知リ易シ。論ヲ須タズ。高ニ登テ氣ヲ吸シ。或ハ寒氣ヲ胃シ。北風ニ中ルヨリ来ルハ。其精微嚴酷ナル氣ガ直徑ニ肺脈ヲ刺傷破裂スルナリ。皮上ヲ侵襲レハ

況ヤ裂セシ脆ノテ肺部ヲ侵マス。暑ニ中リ。炎熱ヲ侵シ。或居恒スル傍人ニ或ハ久シク熱湯ニ浴シ。或ハ烈酒ヲ貪飲スル此因ハ下文ニ所謂血ヨリ来ルハ。皆其血ヲ沸騰セシメテ。烈シク肺ヲ突衝シ。内ヨリ脈管ヲ張破ルナリ。熱病血躁。血質酷厲。壞血家。癩毒家。癰疽ヲ患ル人。及腐敗熱。痘疹ハニ并發スル者。若クヨリ来ルハ。最惡證ニシテ。此其毒氣ガ刺傷侵蝕スルノミナラス。加ルニ熱ヲ以テスレバ。則其血行ヲ急疾ナラシメテ。而シテ諸部ヲ突衝シ。唯肺血ヲ發スルノミニ非ズ。通血閉澀。多血滿餘モ亦トモニ諸血證ヲ致スノ因ニシテ。是其有餘

ヲ損スル自然良能ニ出ル者ナレバ。若其他部ニ於
テスルトキハ。則以テ天幸トスレドモ。稟賦肺脈脆
弱ニシテ茲ニ決出スルコトアルハ。實ニ其人ノ一
大不幸ナリ。稟賦頸長ク胸狹ク。及偃僂龜胸。若ハ喉
頭ノ通孔窄小ナル人ハ。其血ヲ容受スル本部ガ狹
隘ニシテ。居恒脈管ニ滿盈緊張スルガ故ニ。動モス
レバ輒チ肺血ヲ發スルモノナリ。慎テ前件ノ諸因
ヲ避ケシムベシ。頰色鮮紅ニシテ白色ヲ帶ル處女。
嫁スベキ年ノ頃ニ至テ經閉スレ
バ。乃肺血アリ發又其父母ニ此患アリテ。而シテ子モ
亦コレニ嬰ルコトアルハ。是其血質不良ナルノ致

ス所ナリ。故ニ此般ノ種子ハ既ニ長シテ血氣充盈
スルノ後ハ。亦前件ノ諸因ヲ犯サヌ様ニナサシメ。
且其父母コレニ嬰シ年頃ニハ。殊ニ慎ヲ加ヘシム
ベシ。不レバ則同病ニ陷ルコトアルナリ。蓋同氣テノ
同年ニ至レバ。則疑流ニ質ノ○凡肺血ハ輕證ト雖
變化モ亦相近キガ故ナリ○凡肺血ハ輕證ト雖
モ。難治ニ漸スルコトアリト云フハ。動モスレバ輒
チ其吐シ殘シタル血ガ腐敗シテ。而シテ肺蔵ヲ侵
蝕潰亂シ。遂ニ勞瘵ニ陷スルコトアルガ故ナリ。又
其重證ノ必死タル所以ハ。肺ハ心ニ接シテ血ヲ承
ケ以テ新氣ヲ受ケシムルノ器。一身ノ血盡ク茲ニ

輻湊スル所ナル故ニ。若大脈枝破裂スレバ。則流出窮リナク。コレヲ遏止スルコトヲ得ザルガ故ナリ。又輕證ハ。其初血ヲ吐スルノ變ハアリト雖モ。些少ニシテ恐ルベクモ見エズ。身體別ニ患モナキガ故ニ。敢テ攝養ニ意ヲ用ヒズ。其稍重キ者ト雖モ一回治シ来レバ。ハヤ意ニ芥セズ。再發數回遂ニ不治ニ陷スル者多シ。宜ク丁寧告戒シ。慎テ攝養ニ怠ラシムルコト勿レ。

○治法。凡肺血。先身體ヲ安靜ニシテ血行ヲ鎮シ。且思慮情動ヲ去テ。精神モ亦安靜ナラシムベシ。不レバ

則血モ亦共ニ動テ妄行シ。定止スルコト能ザルナリ。又其飲食ヲ淡泊清涼ニシ。慎テ辛烈香竄催熱ノ品ヲ用ルコト勿レ。此諸失血ノ通例ナリ。然ドモ此證ハ特ニコレヲ慎密ニスベシ。又多言躁妄ヲ禁ズベキ○凡肺血。通血閉止。多血滿餘ヨリ来ル者。并ニ酒客。及脈弦數。或ハ緊實ナル者ハ。速ニ刺絡シテ夥ク瀉血シ。以テ脈寬解シテ其人殆ド疲困ヲ覺ルニ至ルベシ。但先五六十錢ヲ取リ。少間時ニシテ報刺シ。脈證ヲ参考シテ再三其疼アル方ノ手刺スベシ。若其人胸中ニ痛ヲ覺ル者ハ。先ル者ハ。先足ノ靜其餘モ虛證ナキハ。尚刺絡一過シテ以テ血ノ肺ニ衝逆スル勢ヲ挫折スベシ。凡刺脈絡

寛解シ来ルセズハ血惡疾ナホ逆泄更ニ脚湯法ヲ兼施シテ血行
 ヲ引降シ。劇キ者ハ手足ノ關節ヲ固縛スベシ。○肺
 血劇シガラザル者ハ。蜀葵煉糖ニ宜シ。或ハ扁桃乳
 九十ニ。罌粟煉糖ハヲ和シ。咳劇ニ宜シ。殊ニ每半時一
 六錢ヲ與ヘ。或ハ清和飲熱劇ニ宜シ。殊ニ二ヒヅ、ヲ
 茶盞ヲ與ヘ。或ハ清和飲熱劇ニ宜シ。殊ニ二ヒヅ、ヲ
 與ヘ。或ハ蝮蛇消石散蝮蛇製スル者ヲ取リ。大麥飲若ハ
 冷水ニテ送下スベシ。○外傷ニ由テ吐血スル者ハ。
 茜草湯コレヲ主ル。○大便快通セザル者ハ。煨林檎。
 蒸梅子。煮李實。煮櫻子等ヲ與テコレヲ順利シ。或ハ
 輕清下劑。緩和溉導方ヲ施スモ亦可ナリ。○前方ヲ

用テ尚止マザル者ハ。稍收斂スベシ。三味石脂煉。四
 味石脂煉。礬石煉。兩阿礬糖散等ヲ撰用シ。或ハ枸椽
 汁ニ綠礬精二三滴ヲ和シ。常用飲料ニ調シ用テ。消
 石末五分ヲ服スルコト日ニ二三次。或ハ阿片醇十
 滴。大麥湯ニ和シ服スルコト日ニ兩次。或ハ玫瑰花ノ
 糕子。煉糖。醋劑等ヲ與フベシ。皆良效アリ。凡初發コ
 ハ與シル○咽喉麻痺シテ咳止ズ。肺コレガ為ニ攪亂
 セラレテ吐血モ亦休ザル者ハ。扁桃油四錢一雞子黃一
 罌粟煉糖十二錢白罌粟煉糖アルタア無キトキハ。蜀葵ヲ合製
 用スヲ調和シ。紙劑トナシテ間用スベシ。○吐血劇

シテ止ズ。強ク收斂スベキ者ハ。收血丸コレヲ主ル。
 或ハ綠礬湛十五六滴ヲ冷水ニ調下スベシ。凡吐血暴怒ヨ
騰来ル者。及大熱アル者。及血ノ沸騰妄行スル者ニハ。冷水良效アリ。○吐血休止セバ。
 收斂劑ヲ止テ。雙龍湯ニ薔薇煉糖ヲ加ヘ與フベシ。
 或ハ大麥飲ニ。柘榴子汁。及核乳汁。扁桃。亞麻仁。罌粟仁。西瓜仁。胡瓜仁。
甜瓜仁。瓢仁等ヲ加ヘテコレヲ與ヘ。血止。咳止テ水研シ。製スル者ヲ加ヘテコレヲ與ヘ。血止。咳止テ
 衰弱復セザル者ハ。幾那糖桂飲ヲ與ヘ。麥飯。人乳汁
 等ヲ食セシメテ以テ終功スベシ。○凡吐血止。ト止
 ガルトヲ論ゼズ。若。睡眠安カラザル者ハ。扁桃乳合
 罌粟煉糖。或ハ芙蓉蝟蛄散等ヲ與フベシ。○壞血質

ノ人。及癩毒家ハ。必コレヲ兼治ルノ策ヲナスベシ。
 法。各門ニ於テ参考スルニ在リ。熱病。痘疹等ニ兼發スル者コレニ準ズ
 但水銀劑。及辛熱劑ヲ用ルコト勿レ。○肺血後久ク
 稠血ト痰ト交リ出ル證アリ。妄止スベカラズ。蜜醋
 煉ニ罌亞煉糖。或ハ麗春花露ヲ加ル者ニ宜シ。○肺
 血後咳久ク止ズ。胸中隱隱トシテ痛ミ。或ハ胸中熱
 シ。脈熱狀アリ。日晡潮熱狀ヲ見ス者ハ。肺脈破裂ノ
 處。將ニ膿潰セントスルノ疾ナリ。愈創湯コレヲ主
ル。方蘭方樞機勞瘵門ニ出ス。以下諸潰瘍既ニ成
シ證治。肺癆篇。勞瘵篇ト通考ス。ミシ瀉瘍既ニ成
 リ。血質酷厲。胸中重ク。側卧シ難ク。麻痺乾咳シテ熱

劇ク脈實弦ナル者ハ。刺絡ヲ施シ。大麥飲ニ消石錢一
蜜十六ヲ和シ與フベシ。コレニ由テ寒熱減シ膿咯
出セバ。蘭苔甘草湯。或ハ連錢糕。紫莖糕。罌亞煉糖ヲ
等合セル者。或ハ三香甘草丸。或ハ幾那糖桂飲等ヲ
撰用シ。兼ルニ毎夕扁桃乳合罌粟煉糖。或ハ芙蓉蠟
蛄散ヲ用テシ。且攝養法ヲ慎ムコト。都テ勞瘵篇ニ
舉ルガ如ク從事スベシ。前方功ナク惡證次第ニ増
長スルハ治シ難シ。清和飲扁桃乳合罌粟煉糖等ヲ
與ヘテ病勢ヲ寛メ。聊堪ヘ易カラシムミキノミ。大
汗出テ體虛シ。且下利スル者ハ危シ。幾那糖桂飲コ

レヲ主ル。效ナキ者ハ四味石脂煉コレヲ主ル。腹滿
シ足腫ル者ハ六味利水方ニ宜シ。兼ルニ胃中粘液
アリテ食進マザルノ證ヲ以テスル者ハ。將王散ヲ
與テ緩下スルモ亦可ナリ。痰酷悍ニシテ咽喉ヲ侵
蝕シ。飲食スル毎ニ痛ミ熱スルコトアリ。四味接骨
露。或ハ含漱大麥煎ヲ用テ含漱セシメ。或ハ薔薇蜜
ニ椀持汁ヲ合シテ塗藥ト為モ亦可ナリ。諸方劑總
鑑ニ集載シス
棋用スベシ

心悸動第三十三

心悸動之近因。血行於心藏若其近傍見障礙不得已而
激搏奔流之所致也。其遠因。驚駭恐怖。暴動急怒。白脈寧
急。過飲食房。失血太下。津液亡脫。稠血屯聚。或心藏或大
脈幹生脈腫。疣瘤。息肉。凝石。蟲類。或心藏或心耳狹窄。若
廣張非常者。或左胸腔間。或縱膈叢間。水若血若膿液聚
滿者。或胸肺胃腸肝脾子宮等有事。以妨心藏縮張之機
者等也。

心ハ火ヲ蓄ヘ。血ヲ藏ルノ器ニシテ。而シテ動靜脈
幹此藏ヨリ出テ。居恒縮張シ。血ヲ出入シテ。而シテ
止ズ。以テ温氣ヲ一身ニ布キ。且以テ諸運動ノ根原

ト為ル者ナリ。平常其部心ノ尖尾ハ左ニ偏ニシニ
即チ左ノ乳下ニ當ルニ於テ微動ヲ覺ユルハ。則チ口扶陽等ノ脈動ノ由テ
來ル所ニシテ。固ヨリ天然ノ常機ナリ。然ルニ此ガ
時アリテ劇ク震動シ。甚者ハ皮上ニ見ハレ。頭腦ニ
響キ。自他ノ耳ニ聞ユルコトアリ。此ヲ心悸動ト謂
フ。是其血ノ出入ヲ障碍スル者アリテ。以テ激搏セ
シムルコト。猶水ノ石ニ激スルガ如ク一般ナリ。其
障碍ヲナスノ因ハ。第一ニ驚駭恐怖スルコトアレ
バ。則チ一身ノ白脈コレガ為ニ畏縮シ。脈管忽地ニ狹
窄スルガ故ニ。凡其驚怖セシムベキ事が情ニ感ス

ルト齊シク。一抵激動シテ。而シテ静脈ノ血ハ一時
ヒトアタリガシク
 ニ多ク還入シ。又動脈エ往ベキ血ハ其門口ヲ收縮
 セラレテ迸出シ難ク。心ノ兩室俄頃ニ盈滿充塞シ。
 虚弱ノ人ハ一身ノ運動即時ニ過絶シテ卒倒スル
 ナリ。此ヲ心厥ト謂フ。此時ニ當テ神氣尚奮發スル
 ノカアル者。及其驚怖スル事ノ甚大ナラザル者ハ。
 則心蔵ノ白脈其迫入スル所ノ血勢ニ激抵シテ。強
 テコレヲ排出推行セシムルコトヲナス。是以テ動
 氣ヲ發セシムル所ノ機ナリ。然ドモ此證ハ時ヲ經
 テ神氣安舒スレバ。乃血行復常シテ。而シテ動悸モ

亦静定ス。身體暴動。急行急怒等ヨリ來ル者ハ。是其
 身體ヲ震盪シ。血行ヲ急疾ナラシムルノ致ス所。但急
怒ヨリ來ルハ。神氣震盪シテ白脈牽張シ。此亦上ノ
由テ以テ血行ヲ急疾ナラシムルナリ。此亦上ノ
 證ト同ク。其事ヲ輟テ安舒スレバ。乃暫時ニシテ静
 定ス。此等ハ皆以テ病トスルニ足ザルナリ。然ドモ
 若瀰瘕即白脈急證等ノ病アル者ハ。上件ノ諸因ニ觸テ
 動悸ヲ發シ。尋テ持久シテ瘥ザルコトアリ。或ハ復
 否ザルモ尋テ大熱ヲ發シ來テ。轉ダ劇シク動悸ス
 ル者アリ。下文ニ謂フ所ノ諸治療ヲ加ヘズンバア
因ト参考スベシルベカラズ。過飲ハ血質ヲシテ酷厲ナラシメ。因テ

以テ血行ヲ急激ニシ。心肺ヲ衝突シテ。血ノ心ニ聚
 滞スルノ多キ故ニ。前ニ所謂ル身體暴動ノ證ト同
 趣ニシテ動悸ヲ發スルナリ。此亦既ニ醒テ癒來ル
 者ハ論ナシ。若既ニ醒ノ來テモ。心悸ナホ稽留シテ
 動築スル者ハ。則後ニ所謂ル稠血聚攻ノ證ト一致
 ナリ。宜ク治療ヲ加フベシ。貪房ヨリ來ル者ハ。是其
 精液ヲ費耗スルヨリ。血中揮發透竄ノ液ニ乏ク。運
 行自ラ怠慢スルガ故ニ。循胸白脈已ムコトヲ得ズ
 勉強努力シテ。心ノ縮張機ヲ劇クシ。以テ推行セシ
 ムルノ致ス所ナリ。又神氣ヲ勞使スルコト多ク。腦

髓虛衰セルヨリ來ル者ハ。則白脈ノ運行健ナラズ。
 因テ以テ血行ヲ遲澀鈍滯セシムルノ致ス所。大失
 血。暴瀉。津液ハ脱乳糜缺乏等ヨリ來ルモ亦此類ナ
 リ。稠血屯聚多血家及通血閉澀ノ證モ亦其行ノ遲
 滯スルヨリ來ル。此ヲ前ノ諸證ニ比スレバ。其血質
 ハ大ニ相反スレドモ。其脈動ハ甚異ナラザルコト
 アリ。稟賦ト餘證トヲ参考シテコレヲ辨ズベシ。脈
 腫以下ノ諸因アル者ハ。皆常久不歇ノ動悸ヲ發シ。
 且治スルコト稀ナリ。脈腫ヲ生ズルノ因ハ。強咳噴
 嚏。其他強キ身體ノ勞動ヨリシテ。脈管ヲ非常ニ縮

張セシノ。弛緩膨脹シテ血ヲ溜渚セシメ。漸ク盈テ
漸ク腫レ。遂ニ瘡ノ如クナルナリ。其疾動脈腫ハ。心
悸動尤劇ク。胸内重墜壓迫スルガ如ク。脈不齊虛弱。
或ハ緊實ニシテ間歇ヲ兼ヌ。靜脈腫ハ悸動輕微ニ
シテ。而シテ胸内重墜壓迫スルガ如キモノ。必背後
ニ連及シテ。脈動常ノ如シ。又心瘤。大脈幹瘤ハ。共ニ
諸瘤ヲ生ズルノ因ニ同ク。血中粘液多キ人。一二ノ
回アリテコレヲ凝固セシメ。更ニ土質ノ物。及鹹液。
油膩等ノ物が茲ニ留著シテ。コレヲ作スナリ。其疾
ハ殆ト脈腫ト相類似シ。或ハ時時胸痛ヲ發シ。又上

行動脈強ク鼓動シ。勞動過飽。辛熱精烈ノ食飲ヲ十
ス後ハ。諸證殊ニ劇キモノナリ。息肉。凝血。或ハ蟲ヲ
生ズル者等ハ。死後解剖シテコレヲ知ルベキノミ。
而シテ皆不治ノ證ナリ。又心藏。心耳等ノ廣狹。非常
ニ過不及アル者ハ。血ノ出入モ亦常度ヲ失ヒ。乃其
動機ヲ激クシテ。以テ強行セシメザルコトヲ得ズ。
且此證多ハ脈腫アル人ノ兼證ナリ。水或ハ血。或膿
等ノ胸腔ニ在ル者ハ。兼テ肺ノ運動ヲ妨害スルガ
故ニ。儘察シ得ベキナリ。然ドモ若其縱隔膜ノ間ニ
在ルモノハ。唯心ノ外面ノミヲ壓迫シテ。其縮張ノ

機ヲ妨ゲ。肺ニ連累セザルガ故ニ。甚コレヲ診シ難シ。其原ハ或ハ噎收管ノ衰弱。或ハ尿管ノ弛緩シテ鬆疎ニナレル者。或ハ打撲。或ハ焮腫後等ノ患ニシテ皆難治ノ證ナリ。且凡運行ヲ離レテ溜滯セル血液ハ。必腐敗スルガ故ニ。後ニハ種種ノ惡證ヲ變出スルナリ。若夫胸肺ニ事アリテ。心悸動ヲ誘發スルハ。必心ノ縮張。或ハ動脈大幹ノ運行ヲ妨害スルコトアルヨリコレヲ致スナリ。前諸篇ヲ参考シテ辨知スベシ。腹部諸蔵ハ隔處シテ關係スル所ナキニ似タリ。然ドモ胃ニ蓄水アリテ膨脹シ。肝脾ニ閉塞

シ。或ハ結腫ヲ生ズルコトアルカ。若ハ子宮衝逆スル等ニテ横膈膜ヲ突衝シ。胸内コレガ為ニ狭窄ニナリ。且心尖ヲ支柱シテ其運動ヲ障身スレバ。已ムコトヲ得ズ。激抵築動スルコトアリ。凡心悸動ハ急ニ死スルノ病ニ非レドモ。或ハ以テ死ニ瀕スルノ徵トスルコトアリ。詳ニ病目ヲ考テ治ヲ施シ。若不治ノ因トスル者ハ。宜ク凝流ニ質ヲ参考シテ劇證ニ至ラザルノ策ヲナスベシ。

○治法。癰瘰様ノ持病アル人。情動ノ為ニ心悸動ヲ發シ持久シテ止ザル者ハ。龍腦雙乳飲。或ハ清和飲。或

ハ麝香醇。及諸ノ鎮痙劑ニ宜シ。數回發作シテ白脈
 及腦髓甚衰弱スル者ハ。幾那飲。若ハ鐵粉劑ニ宜シ。
 ○稠血屯聚ノ證。及酒客。若ハ熱實ノ證ヲ兼ル者ハ。
 刺絡術ヲ施シ。清涼稀血輕下ノ劑ヲ與フベシ。梅麥
 二石飲。或ハ乳酪清。蜥蜴消石散。二根湯ノ類ニ宜シ。
 上件ノ諸劑ヲ與テ功ナク。不寐煩躁等ヲ兼ル者ハ。
 扁桃乳合罌粟煉糖。或ハ清和飲。或ハ麗春花露。六十錢
 罌亞煉糖。十二錢 綠礬精。十五滴 三味合勻シ。每半時一盃
 ヲ與フベシ。大抵愈ルコトヲ得ルナリ。若尚愈ズ。脈
 不齊結代。動作スレバ殊ニ增劇シ。氣急促迫スル者

ハ。必心藏ニ息肉ヲ生ズルカ。若ハ動脈大幹ノ延張
 スルカ。或ハ脈腫ヲ生ズル等ナリ。速ニ其治ヲ施サ
 ザレバ。終ニ難證トナル。宜ク極テ身體ヲ鎮靜シ。數
 數放血シ。石梅接骨飴ヲ取り。接花錦葉浸ヲ用テ一
 ヒヲ服スルコト。日ニ十次。更ニ乳酪清。或ハ消接罌
 亞煉飲ヲ間用スベシ。或ハ土茯苓。粘魚須。瘰瘡木等
 ノ煎劑モ亦效アリ。若不寐ヲ兼ル者ハ。芙蓉蜥蜴散
 ヲ兼用シテ佳ナリ。前方效ナキ者ハ。清和飲。或ハ緩
 睡和調劑等モ亦試用スベシ。勞動。或ハ打撲傷等ヨ
 リ來ル者モ。亦上件ノ治法ニ從テ斟酌シテ用テ可

ナリ。○精虚。失血。ハ津液等ヨリ来ル者ハ。先、輕肉羹。乳麥飲等ヲ以テ滋養シ。稍補充セバ更ニ好酒少許。ヅ、ヲ與ヘ。適宜ニ動作シ。清爽氣ヲ吸セシムベシ。大率コレニテ愈ルコトヲ得ルナリ。尚愈ザル者ハ。幾那糖桂飲。鐵幾沒菴煉等ヲ兼與フベシ。コレヲ主ル。他傍發連及ノ證ハ。各其本病ニ就テコレヲ治スベシ。諸方總撰用スニシ

不食第三十四

以下至六十一病屬於腹部者

不食之近因。胃弱不能健運。或化食諸液有變故。或諸病

毒入胃以妨害欲食之機等也。其遠因。饑飽無節。勞逸不度。或七情内亂。二氣外淫。或稟賦多病。老衰自然。或黏液留滯。膽液自敗。及他病兼發者是也。

飲食口ヨリ入バ。胃先コレヲ承テ烹釀糜爛シ。乃コレヲ腸ニ傳テ熟成終功スルモノナリ。故ニ食ヲ欲スルト欲ザルト共ニ胃ノ與知ル所ナリ。然ドモ胃ヲシテ其官能ヲナサシムル所ノ者ハ。則循胸白脈即腦髓ヨリ出ル第八對白脈ニシテ。專ラ胸部ノ諸藏諸器ヲ循行シ。横膈膜ヲ穿透シ。胃ニ蔓延シテ。並ニ終止スノ運行ニ由リ。又津唾。及食道液。胃液。腸液。以上ノ諸液ハ。胃内ニ精微揮發ノ氣液ヲ含ミ。諸飲食物ノ質中ニ穿透シ。以テ沸騰蒸熟ノ基原ヲナス

者ナ并ニ肝膽ノ苦液叢胞ノ酸液等ノカヲ合テ以テ釀化ノ機ヲ起サシムルニ由ルナリ。故ニ以上諸件ニ於テ變故アレバ。必不食ノ患ヲ將出シ来ルナリ。其遠回トスル所。飢飽節ナケレバ。每常化熟ノ宜ヲ失ヒ。遂ニ以テ循胸白脈ヲ勞憊セシメテ。其健運ノカヲ劫奪シ。勞逸度アラザレバ。或以テ全身ノ白脈ヲ勞憊セシメ。或以テ諸液ノ運行ヲ遲滯セシメ。併テ腸胃ノ運化ヲ損ス。七情内ニ亂レバ。神氣耗損シテ。靈液揮發ノカヲ失ヒ。白脈畏縮シテ。胃口痞塞シ。食道狹窄シテ。先ッ食下ルコトヲ得難キノ證ヲ發シ。

シ情動持續シテ休ザレバ。遂ニ食不化不食等ノ證ヲ將出シ来ルナリ。水雨濕火暑熱ノ氣外ニ滯スレバ。全身ノ織絡或ハ軟弱或ハ慢緩シ。諸液ノ運行鈍怠シテ。其精力ヲ失ヒ。遂ニ食不化不食等ノ患ヲ將出シ来ルコトアリ。又麻澀藥ヲ誤用シ。或ハ軟緩劑ヲ過服スルモ亦皆以テ胃ノ白脈ヲ緩慢ナラシメテ。而シテ其健運ノ機ヲ損シ。遂ニ食不化不食ノ證ヲ致ス。老衰自然稟賦多病等ハ都テ一身ノ元運損耗スルガ故ニ。腸胃ノ運化モ亦耗損スト云ニ論ナシ。凡不食ノ證ハ其始ノ必先其食フ所ノ物が難化重滯

シテ。而シテ食氣漸減シ。後ニハ其稟賦ト其食物トノ各各殊性ニ因テ。種種不良ノ液ヲ造成シテ。以テ胃中ニ蓄積シ。或ハ虚氣痞滯スル等ニテ。遂ニ食ヲ欲サルノ患ヲ致スナリ。然ドモ大抵粘液溜滯ノ證多シ。故ニ本文殊ニコレヲ掲テ其標的ヲ示ス。此證他ノ證諸因ナク。唯好テ粘質蓋粘液茲ニ生ズルコトアレバ。則乳糜飲ノ食化スルニ混ジテ血中ニ入り。血質モ亦粘濁ニナリ。曰テ其流出スル所ノ津唾以下ノ諸液モ。亦皆非常ニ稠厚ヲ致シ。愈益其粘液ヲ培養蓄積スルナリ。又粘液ガ胃ニ蓄積スルト。乃其裏面ノ

膜ニ布滿シ。膽液及叢胞液ニ液。十二指腸ヨリ來ルノ烈苦液膽液。列酸液叢胞液ノ氣ヲ包テ。其功用ヲ失シノ。胃ノ白脈ニ滲透シテ。コレヲ衝動スルコトヲ得ズ。遂ニ食ヲ思フノ情ヲ起。來ラザラシムルナリ。又此二液ノ銳氣ヲ鈍ラスガ故ニ。其儘ニ食ヲ所ノ物モ十分ニ化シ難ク。愈益食ヲ厭フノ心ヲ發セシムルナリ。又其粘液ガ腸胃ノ周圍ニ附着シテ。其氣孔ヲ壅閉スルガ故ニ。食ノ烹釀スルニ當テ。升騰スル風氣酒醬ノ熱セシムル者ト同機ナリ。沸ヲシテ散越スルコト能ハザラシメ。許多ノ小球泡狀ヲナシ。其ニ鬱積

痞脹シ。或ハ時ニソノ氣泡圍ヲ破テ上出スレバ。則
噫氣トナリ。下泄スレバ則放屁トナリ。或ハ直ニ粘
液ヲ吐スルコトアレバ。則其痞滿ヤ、減ジテ忽地
ニ少快ヲ覺ユル者ナリ。又粘液ノ害アルコト無レ
ドモ。膽液ノ性質損敗シ。其石鹼質ノ功力ヲ失フコ
トアレバ。則チ胃中天賦ノ滑液ヲ散渙解釋シテ。以
テ白脈ヲ衝動スルコト能ズ。又食物ヲ全化スルコ
ト能ズシテ。遂ニ不食ノ證ヲ將出シ来ルナリ。此證
ハ必胃ノ部ニ當テ燒カ如キヲ覺ヘ。辛烈苦熱ノ氣
臭ヲ噉出シ。或ハ臭惡液ヲ吐スルヲ以テ徵トスベ

シ。諸病毒胃ニ入ルトハ。則熱病。喘息。水腫。勞瘵。脾病。
鬱證。痛風。脚氣。嘔吐。痢疾等ニ於テ。或ハ諸液腐敗ノ
災ヲ轉移シテ。以テ化食ノ諸液ヲ損シ。或ハ元氣流
行ノ機ヲ妨害シテ。以テ腸胃ノ健運ヲ失シ。乃不食
ノ證ヲ兼發スル者是ナリ。凡不食持久スレバ。勞瘵
様ノ病ニ轉ジ。又勞瘵。及諸經久ノ病ニ全不食ノ證
ヲ見セバ。則死期近ノ候トス。又此病過酒ヨリ来ル
者ハ。殊ニ水腫ニ變ズルコト多シ。解剖家ノ説ニ。此
病ノ死尸ヲ解觀セシニ。或ハ胃甚大ニ且緩慢シ。或
ハ甚小ニ且收縮シ。脾小ニ肝大ニ。或ハ叢胞常ナラ

ズ。或ハ胃中ニ夥ク脂膏様ノモノアルモコレアリト謂ヘリ。

○治法。胃腸ニ鬱滯物滯食。粘液。腐敗。脂膏。酸敗。アノ液。敗。膽液。及諸惡液等。

徴アル者ハ先輕キ吐下劑ヲ用テコレヲ淨除シ夫

テ強烈ノ品ヲ用ル而シテ後衰弱家ハ幾那橙桂醇コト勿レノ大害アリ

或ハ健胃丸散類。或ハ剛鐵丸散酒劑等適宜ニコレ

ヲ用ベシ。粘液家ハ芳香健胃酒。或ハ解結健胃酒ニ

宜シ。酸液家ハ麻樞マキ温ヲ失シ亞ア。蝟ウ蝟ウ石。石鹼等ヲ合製セ

ル健胃劑ニ宜シ。膽液ノ變敗ヨリ来ルハ酸味清涼

ノ劑ニ宜シ。稍甚者ハ乳酪清加酒石等ニ宜シ。尤甚

者ハ吐下シ已テ後。清膽飲ヲ與ベシ。又綠礬湛殊ニ

健胃進食ノ功アリ。少ヅ、冷水ニ和シテ與ベシ。凡

不食ノ證ハ。適宜ニ身體ヲ運動セシメ。静坐勞神ノ

事件ヲ避リ。且良性易化ノ食品ヲ撰ミ與ベシ。若夫

兼發ノ證ハ。治各本病ノ上ニアリ。然ドモ亦其宜ヲ

量テ應證健胃ノ藥品ヲ兼用スルモム得。是醫ノ權

ニ在ルノミ。諸藥劑總テ泰西方盤集載ス。撰用スベシ

飲食難化第三十五

飲食難化之近因。胃。及腸。若肝。膽。脾。叢胞等。有變故之所

致也。其遠因大率與不食同。而不食之證多自此病轉也。又此病暗成他病之因甚多。而不能豫定其發何病。其故何也。蓋飲食者血液之原醅。而諸病者必出於血液之變敗也。是故百病除外感傳染之外。推究其遠因。則不多少關係於此者鮮矣。不可不察矣。

不食病ハ。食ヲ欲セザルト。食スルコト能ハザルヲ以テ主トシ論ス。此病ハ。少食ナルアリ。平食ナルアリ。過食スルアリ。其食量ノ多寡好惡ニ拘ラズ。但其化熟十分ナルコト能ハザル者ヲ主トシ論スルナリ。然ドモ本是同胃家ノ病ニシテ。其因ヲ論スレバ。

則大概不食ノ證ト一般。宜ク前篇ニ就テコレヲ考求スベシ。中ニ就ク此證ハ老人小兒。及虛弱家。又ハ逸居安逸。若ハ苦學靜坐スル人ノ患ナリ。其證ハ則面色黯淡。總身疲瘦シ。胃或ハ腸部ニ於テ鬱滯痞懣スルヲ覺エ。腸間膜。或ハ乳糜脈等壅閉ス或ハ嘔吐シ。或ハ泄瀉シ。或ハ胃痛シ。或ハ腸痛シ。或ハ噯氣吞酸シ。或ハ嘈雜放屁等ノ證ヲ患ヘ。或ハ時ニ口内腐敗液汁ヲ噯出シ。或ハ蛔蟲ヲ生ジ。小便白色稠厚ニシテ。乳汁ノ如キ滓渣多キモノナリ。蓋飲食ノ化熟ヲ得ルヤ。其化熟ヲ得ル由ハ。乃不食篇ニ詳ナリ。則良性ナル乳糜液ト

ナリ。乃諸血液ノ原酪トナリテ。以テ一身ヲ養榮活
 育スト雖モ。若化スルコト全カラズシテ。而シテ腹
 内温熱ノ處ニ鬱積スレバ。則酸敗シ。或ハ腐壞シ。以
 テ不良ナル乳糜ヲ釀シテ。血中ニ入り。其腐敗ノ微
 甚。及變質ノ殊異アルニ因テ。變質ノ殊異ハ。其人天稟ノ等シカラザルニ
 出以テ體中諸液ノ質ヲ種種變惡ナラシメ。從テ種
 種ノ荏苒タル長病。或ハ皮膚ノ病。疥癬ノ侵淫癩瘡ノ
 謂ナ中ニ就ク水腫。勞瘵。痿黃病。惡液腫。飧泄等ニ陷
 入スルモノ多シ。又彼外感傳染ノ病ハ。則内因諸病
 ニ同カラズト雖モ。然トモ内腸胃ノ運化良全ニシ

テ體中ニ惡液ナキ者ハ。則其外来ノ惡氣ニ響應ス
 ル者アルコトナキガ故ニ。コレヲ感受スルコト稀
 ナリ。或ハコレヲ感受スルコトアルモ。亦甚險證ヲ
 發スルコトナク。且雜證傍發スルコトナクシテ。自
 ラ治シ易シ。故ニ人苟モ飲食化シ難キノ證ヲ見ス
 コトアラバ。速ニコレヲ救療シ。且攝養ヲ慎ミ。放置
 スルコトアルベカラズ。解剖家ノ說ニ。此病ノ屍ヲ
 解觀セシニ。胃ニ稠凝ナル痂屑ヲ附著シ。或ハ甚細
 瘦弛緩シ。腸網。腸間膜。肝。脾。叢胞等ノ造成惡シク。腸
 ニ風氣ヲ蓄ヘ。或ハ蛔蟲ヲ生ジ。或ハ帶黑色ノ物ア

リテ附着シ。或ハ胃膜甚厚ク。裏膜ノ皺襞ナシ。或ハ胃ノ上口ニ結腫アリテ。十二指腸甚狹窄牽縮スル者アリト。

○治法。腸胃ニ鬱滯物アル者ハ。緩性吐下ノ劑ヲ用テコレヲ除キ。而後因ニ随テ適宜ノ健胃劑ヲ撰與スベシ。又攝養法ヲ慎ムコト。總テ不食篇ニ舉ルガ如ク從事スベシ。腸間膜閉塞。乳糜痢。飧泄。蛔蟲等ヲ兼ル者ハ。各門ヲ照シテ應證ノ藥品ヲ兼用スベシ。凡胃病諸篇ヲ通考スベシ。諸藥劑泰西方鑑ニ集載ス。採用スベシ。

○痿黃病ハ。面色及全身ノ皮膚黯灰帶黃ニシテ。而シテ少氣乏力。四肢懈惰シ。神思不豫。飲食旨カラズ。微熱ヲ帶ビ。或ハ熱ナシ。此亦化食諸官ノ衰弱。若ハ攝生非節ヨリ飲食化熟ヲ錯テ。半生半熟ノ液ヲ生ジ。延テ血中ニ入ルノ致ス所ナリ。治畧前ニ同ク。先胃ノ汚滯ヲ驅逐シ。次ニ攝養ヲ慎ミ。健胃丸散。及酒劑等ヲ與フベシ。黃胖病モ亦此類ナリ。此證ハ特ニ綠糞湛ニ宜シ。或ハ剛鐵丸モ亦良ナリ。又痿黃病ニ異嗜ヲ兼ル者アリ。下條ト参考スベシ。

饑嗜病第三十六

善饑異嗜之近因。各有一種惡液。與胃及食道之津液混出。而觸感其部白脈。以使神識妄動之所致也。其遠目雖不無差異。總不外乎食養非節。以錯胃化。而生酸敗液。鹹烈液等也。然而其證種種不一者。則人人稟賦素不均。固。有物之與惡液相合。亦各不能均之所致也耳。凡病因同。而證異者。皆與此理一般。學者可默識矣。

饑病 = 吐下ヲ兼ルヲ犬饑ト謂ヒ。昏暈ヲ兼ルヲ牛饑ト謂フ。異嗜 = 壁壘ヲ食ヒ。土器ヲ食ヒ。炭及灰ヲ食ヒ。茶葉ヲ食ヒ。生米ヲ食フ等ノ差アリ。又妊婦ニ種種ノ嗜癖アリ。顔色蒼黯ナル處女ニ異嗜ヲナス

アリ。而ドモ妊婦ヲ除クノ外ハ。其吐シ若クハ利スルコトアレバ。大率酸臭ヲナサバ。ル者鮮シ。以テ其因ノ在ル所ヲ知ルニ足ル。蓋饑病ハ酸敗液ニ。多少鹹烈液ヲ雜テ胃ニ根居シ。血中ニ轉輸シテ。口内及食道胃腸等ノ裏膜即必胞樣膜ヨリ漉出スル所ノ津液ニ雜リ出デ。其酷厲ナル氣質ヲ以テ。所在ノ白脈ヲ衝動スレバ。乃靈液ニ傳テ神識ヲ感發セシメ。斷ヘス飲食ヲ欲シテ休マザルナリ。蓋何ニテモ食スルトキハ。則其惡液ノ酷厲ナル者。少クコレガ為ニ緩解シテ。神識稍快ヲ覺エ。然クコレヲ欲シテ休ムコト

能ザルナリ。而ルニ若コレヲ得ザルトハ。則神識
 其惡液ノ衝動スルニ堪ズ。上頭腦ニ徹シテ昏眩ヲ
 發シ來ルナリ。夫饑病ハ惡液ノ腸胃ニ在ルコト夥
 多ナリト雖モ。然ドモ其血中ニ入り。靈液ニ滯スル
 コト未ダ太甚シカラズ。腸胃ノ白脈ナホ強實敏捷
 ナルコトヲ得。故ニ饑レドモナホ未ダ昏眩スルニ
 至ラズ。食ヘドモナホ其化シ難キヲ承ケズ。以テ吐
 下ヲ發スルコトヲ作スナリ。牛饑病ハ。惡液血中ニ
 入り。靈液ニ滯スルコト夥シク。元氣乏弱シ。白脈痿
 弛ス。故ニ食ヲ得ザレバ昏眩シ。食シテ化シ難キモ

亦承テ吐セズ。胃ノ下口漫爾トシテ哆開シ。洞泄シ
 テ收セザルナリ。適ニハ胃腸ノ白脈異常ニ強健。平
 素過食シテ以テ酷厲惡液ヲ生ジ。更ニコレガ為ニ
 衝動セラレテ。轉益健運シテ暴食シ。殆ド牛饑ト相
 類スル者アリ。此亦其終白脈衰弱ノ證ニ陷セザル
 コトヲ得ズト雖モ。因テ來ル所大ニ逕庭アルトキ
 ハ。則治術モ亦等キコト能ズ。知ラスンバアルベカ
 ラズ。○異嗜ノ證ハ。酸敗液ニ多少腐敗液ヲ雜テ胃
 中ニ蓄積シ。同ク血中ニ傳テ諸部ニ浸滯シ。以テ此
 病ヲ發スルコト。猶饑病ヲ發スルガ如シ。而シテ其

嗜ム所ハ多少異ナリト雖モ。大率土物シテ。皆酸敗ヲ制伏スルノ品ノミ。是其自然良能。病毒ヲ抑制セント欲スルノ致ス所ニシテ。コレヲ食ヘバ。則神識モ亦少快ヲ覺ルガ故ニ。飽マデコレヲ嗜テ止マザルナリ。又此證多少腐敗液ヲ雜ルガ故ニ。其人口氣必汚臭アリ。且自然良能コレヲ惡ムノ機アルガ故ニ。必潔癖ヲ無ル者ナリ。又異嗜ニ。幼ヨリシテ然ル者アリ。長シテ情慾ノ兆ス頃ヨリ發スル者アリ。是其血液滿盈シ。精氣壯盛ニシテ。體中ニ慄悍揮發鹽多クナリ。固有ノ酸敗液ト合シテ。血液ヲ沸騰セ

シノ。因テ以テ食味ヲ司ル諸白脈ヲ衝動スルヨリ來ル。凡揮發鹽ニ酸味液ヲ注グ又其幼ヨリ然ル者ハ。反テ此年頃ニ至テ自愈スルコトアリ。是其血氣満足シテ。腸胃ノ運化モ亦自ラ強健ニナリ。漸ク化熟ノ功ヲ全シ。加ルニ揮發鹽ノ氣勝テ。以テ酸敗液ヲ制伏消化シ得ルガ故ナリ。二ノ者相反スルハ。則稟賦ノ殊異ニシテ。蓋凝固質ノ強弱均シカラザルノ致ス所ナリ。○妊婦ノ異嗜ハ。經水閉塞シテ。腹部ニ血ノ聚ルコト多ク。且熱沸スルノ致ス所ナリ。故ニ其好ム所。多クハ酸收清涼ノ品ノミ。或ハ饑病ヲ

將出シ来ル者アレドモ。此亦其聚血熱沸スルヨリ
 化食ノ機常度ニ逾ルノ致ス所。他ノ饑病ト混同ス
 ルコトヲ得ザレ。凡血ノ熱沸スルヤ。必鹽氣酷厲ヲ
 生シ。以テ諸白脈ヲ衝動スレバ。則
 運行太過ヲ致スコト。猶皮表軟脆ノ部ニ鹽汁ヲ摩
 スレバ。忽然痒起シコト。熱スルガ如ク一般ナリ。今
 ヤ腹部ニ於テ聚血熱沸スルガ故ニ。腸胃コレガ為
 ニ衝動セラレテ。或ハ異嗜ヲ發シ。或ハ饑病ヲ發シ。
 或ハ大渴ヲ顏色蒼黯ナル處女ノ多クハ異嗜ヲナ
 ス。ハ。即痿黃病兼發ノ證ナリ。前篇ニ附ス。参考スベ
 シ。○凡饑病ハ。必小水不熟ニシテ稀淡ナル者ナリ。
 蓋此病ハ。本来化熟ヲ錯ルヨリ致ス所ナルガ故ニ。
 諸液ノ質モ亦都テ熟セズ。其始ハ身體瘦削シ。終ニ

ハ固形質モ亦衰弱シテ。遂ニ水腫。或ハ勞瘵様ノ病。
 或ハ惡液腫ヲ發シテ死スルニ至ル。又異嗜及饑病
 トモニ。多ハ蛔ヲ生ズルナリ。世人ノ異嗜ヲサシテ
 蟲ガ好ク所ナリト謂
 キモ一理ナ解剖家ノ說ニ。饑病人屍ヲ解觀セシニ。
 總テ胃ノ形。異常ニ大。或ハ小ニシテ。而シテ下口ハ
 緩解哆開シ。中ニ黑色ノ物。或ハ膽液。或酸敗液。或ハ
 蛔蟲アリ。又或ハ脾ノ造成惡ク。或ハ腸短ク且屈曲
 少シト謂ヘリ。

○治法。犬饑病ハ。先輕キ吐下劑ヲ用テ腸胃ヲ掃除シ。
 次ニ制伏酸敗藥蠟壳。蜘蛛。鮮。真。等ニ緩和酷厲劑

蜀葵根。扁桃仁。罌粟子。亞麻油。ヲ合シ。下劑大黃。旗那
 精大麥。乳汁。亞粉。亞護。護等。ヲ合シ。下劑大黃。旗那
 等ヲ適宜ニ加ヘ與ヘシ。或ハ蝟鐵散。或ハ阿芙蓉。或
 ハ酒石液ヲ與テ效アリ。又多血家ハ刺絡ヲ兼施スモ
 亦良ナリ。牛饑病ハ一等強キ吐下劑ヲ用ヒ。次ニ制
 酸ニ強補ヲ兼タル藥品五菖。良薑。桂皮。香橙皮。杜松
 酸ニ強補ヲ兼タル藥品子。藿香。益智。茴香。乳香。沒藥。
 草等。細ヲ調シ與ヘ。或ハ犬饑ヲ治スル方法ヲ斟酌
 シテコレヲ與テ可ナリ。又烈酒ヲ與ヘ。煙草ヲ吸レ
 ノテ良ナリ。小兒ノオトツミ病。及腹大肢瘦。食ヲ貪
 ベテ治ス。若膽液酸烈ニ運動強盛ナルヨリ來ル饑病
 ハ。粘厚難化ノ食品ヲ用ヒ。緩和清涼ノ藥劑酸模。葉

度。杏子。櫻子。柑汁。桑椹汁。ヲ與ヘ。底野邊ヲ用テ終功
 乳汁。酪。清。消石。酒石鹽等。ヲ與ヘ。底野邊ヲ用テ終功
 スベシ。○異嗜病モ亦先吐下劑ヲ用テ。腸胃ヲ淨除
 シ。次ニ制酸。健胃防腐ノ劑ヲ與ベシ。健胃丸散コレ
 ナ主ル。處女饑モ亦コレニ宜シ。○凡饑嗜病蛔蟲ア
 ル者多シ。コレヲ察シ得バ。宜ク先コレヲ驅除スベ
 シ。諸方劑總テ泰西方鑑
 ニ集載ス揆用スベシ

發渴第三十七

發渴之近因。胃腸。胃管。及口内。咽喉等之津液之缺。若酷
 厲熱燥所在。白脈不耐之。之所致也。其遠因。鹽氣鬱積。或

腐敗脂油或酷厲膽液或過汗多尿水瀉等以_ハ津液若水腫無_ス發等也。

夫人身ノ溫暖ヲ保有スル所以ノ者ハ主トシテ鹽油二行ニ由ル。故ニ熱ヲ患ル者此二物ノ變ニ關係セザルハナシ。而シテ渴ヲ發スルノ因ハ血中火氣壯盛ニシテ甘美酸淡ノ滋潤液ヲ消耗シ更ニ鹽氣ヲ熬結シテ酷厲ナル氣液ヲ生スルニ由ル。若コレニ尚ルニ油膩多_クヲ以スレバ則益甚シ。平日多ク鹽物來_ル性ヲ以テ諸液ヲ煎熬過食スレバ更ニ堪ヘ難キシ渴ヲ發スル等ノ足理レ_テ以蓋鹽氣鬱積スレバ則必發

熱シ發熱スレバ則津液ヲ乾燥スルニ論ナシ。熱ニ_ハ鬱コレガ為ニ蒸升セラレテ發越セント欲ス。故ニ水_ノ裏部ハ則コレガ為ニ乾燥セラ_ル加ニ鹽氣ノ酷厲ヲ以テ咽喉胃管等ノ諸部ノ白脈ヲ刺戟スルカ故ニ所在ノ白脈コレニ脹ヘズ良能自然ニ發渴引飲シ來_ルナリ。渴ノ甚_キ者ハ唯口内ノ乾燥スルニ至マデモ皆乾乏_シ失潤又敢テ鹽氣ノ鬱スト謂ニハ非レドモ其血ノ沸騰湧熱スルニ由テ滋潤液ヲ耗散スルコト。譬バ平人ノ強動奔走シ若ハ暑中若ハ火傍ニ作業スル等ニテ發汗スレバ乃發渴引飲スルガ如ク若

ハ尿ヲ利シ。若クハ水泄溏瀉ヲナスノ後モ亦善發渴
ノ證ヲ將出シ来ル者ナリ。○津液不足スルニハ非レ
ドモ。酷厲ナル膽液。若クハ腐敗セル脂膏等ガ胃中ニ
鬱滯スルコトアレバ。則沸騰蒸熱シテ。而シテ胸膈
燒ガ如ク。嘈襍ヲ發シ。或ハ惡心嘔吐シ。或ハ發渴引
飲シ来ナリ。蓋是所謂自然良能ナル者コレニ因テ
其酷厲氣ヲ和シ。或ハ腐壞氣ヲ溲雪セシム欲スル
ノ致ス所ナリ。故ニ又壞血病毒アル人。若クハ腐敗熱
病。或ハ經久疲勞ノ諸病等ニテ。體中諸液ノ腐敗ス
ルニ當テ。加ルニ鹽氣多クヲ以スレバ。則彼此相釅テ堪

忍ベカラザルノ大渴ヲ患テアリ。故ニ又平人大渴
シテ止ザル者ハ。必三年ヲ須ズシテ癰疽發背ヲ患
ルモノナリ。是他ナシ血中鹽氣多ク居恒熱沸シテ
脂肪ヲ焔解シ。相釅テ渴ヲ發シ来ルガコトニ至テ
遂ニ熬結腐壞スルノ致ス所ナリ。凡血中ノ鹽氣養
則鹹渣トナリテ表發ノ蒸氣ト尿トヨリ體外エ驅
出スルモノナリ。若クハ常機ヲ愆テ外出スルコ
ト酷厲ハザレバ。則熱蒸シテ涼液ヲ耗損シ。凝滯シテ
酷厲液ヲ釅成シ。全軀壯熱シ。諸部腐乾ス。若クハコレガ
痛及諸膜ヲ刺衝スレバ。則筋骨膜等ニ○水腫
ノ一證其水將ニ腐壞セントスルニ當テ。胸膈燒ガ
如ク。惡心嘔逆煩悶等ヲ發シテ。而シテ渴シ頻ニ水

漿ヲ引者アリ。或ハ既ニ腫滿シテ後。白脈衰弱シテ
 水脈泌胞職掌ヲ怠リ。水氣常路ニ從ズ。血中ノ潤液
 ハ却テ乏缺シ。口内食道等ノ津液ヲ滲泌灌注スル
 コト能ハザルガ故ニ。乃渴ヲ發スル者ナリ。以上諸證
 其渴ヲ發シ飲ヲ引ハ則一ナリト雖モ。其因同カラ
 ザルトキハ。則其治モ亦等カラズ。仔細ニ意ヲ用テ
 而シテコ、ニ從事スベシ。

○治法。鹽氣酷厲大熱熾盛ヨリ来ル渴ハ。大麥消石飲
 ニ宜シ。或ハ酸味ノ果汁ニ砂糖少ヲ加ヘ。甘美口ニ
 適セシノテ益佳ナリ。或ハ醋糖飲モ亦良。甚者ハ綠

礬精。硫黃精等ヲ加用ユベシ。神驗アリ。發汗後。利尿
 後。泄瀉後等ノ津液頓ハシテ渴スル者ハ。微微水飲
 セシノ稀液ヲ禪テ是可ナリ。但微温ニシテコレヲ
 與フベシ。頻頻ニ服シ。且冷飲セシムルヲ勿レ。多服ス
レバ留ス
滯ノ患アリ。冷飲スレバ血液
ヲ凝泣セシムルノ恐アリ ○膽液酷厲腐敗脂膏。
 等ノ鬱滯スルヨリ来ル證ハ。清涼下劑ニ宜シ。枳實
木
芒消。酒石鹽 若夫腐敗熱。勞瘵。及諸久病等諸液腐壞
 ヨリ来ル者ハ。酸醜清涼飲。或ハ扁桃乳。或ハ蒼末林
 度。或ハ他ノ清酸果汁ニ宜シ。平人大渴止ザル者ハ。
 粘魚須。瘡瘡木。大黃。消石等ヲ用テ鹽氣ヲ和シ。腐敗

ヲ防シコトヲ要ス。怠慢シテ後患ヲ致ス。勿レ。氣
 酷厲ヨリ發スル疼痛病モ亦此等藥劑ニ宜シ。凡
 血中ノ穢渣ヲ除クニハ。卷蒸法。發汗劑。及二便ヲ利
 スルノ藥品ヲ用テ務テ其稠結ヲ疏通ス。稀○水腫
 薄ナラシメ。漸解徐滌スルヲ以テ佳トス。
 發渴スル者ハ。佳酒少許ヲ用テ潤灌シ。或ハ清酸果
 實梅子。櫻子。桑椹。覆盆子。橙。柑。等。ノ砂糖漬ヲ含セシメテ良ナリ。決
 シテ水ヲ與テ以テ害根ヲ長ズベカラズ。白脈衰弱
 シテ津液ヲ滲泌シ出ス。能ザルヨリ渴ヲ發スル
 者ハ。桂露。良薑。山薺菜等以テコレヲ衝動健運スル
 ノ劑ニ宜シ。尚本病門ト參考スベシ。諸藥劑總集載
スス撰用

嘈襍第三十八

嘈襍之近因。惡液浮聚于胃口。其氣上衝于胃管之所致
 也。其遠因。多食膏粱美味。以損膽液之功力。水油不和。將
 致腐敗。或膽液質變壞。或酸敗液聚攻。或風氣痞滯者之
 所患也。

夫水ト油トハ。其性相反シテ合和セザルモノナリ。
 然ドモコレニ和スルニ石鹼ヲ以スレバ。則能混合
 融和スルコトヲ得ルナリ。石鹼ヲ水ニ和シテ澱濯
アル除ク。以テ蓋此能凡異生ノ膽液ニモ亦皆此質ヲ具

シテ。以テ飲食内ニ含ム所ノ水油ヲ融和シ。コ、ニ
 化熟ノ功用ヲ遂ルコトヲ得セシム。膽液ノ腸内ニ
 飲食ノ消化ヲ主ルノ説。前然ルニ夫、富貴安逸。居恒
 諸篇ニ著ハス。参考スニシテ。然ルニ夫、富貴安逸。居恒
 膏粱ニ飽ク人ハ。以テ膽液ノ性功ヲ損シ。發透竅ハ揮
 烈ノ質ヲ以テ。其克化ノ功ヲ成スモノナリ。然ルニ
 膏油ノ質ハ。滑脱緩和ノ者ニシテ。コレト相反シテ
 其功用ヲ妨ルコト。猶如ニ油ヲ遂ニ水油ノ合和ヲ
 妨ゲ。ソレヲシテ各各分離セシムルトキハ。則油氣
 ノ輕浮ナル。胃ノ上口ニ聚滯シ。温氣ニ煎熬セラレ
 テ。熱沸上騰シ。胃口ヨリ以テ胃管ニ逆シ。燒クガ如
 ク焦ル、ガ如キヲ覺ユ。此ヲ名テ嘈襍ト曰フナリ。

又飲食ノ温處ニ鬱滯スルヤ。必ズ酸敗腐壞スル者
 ハ常事ナリ。今ヤ水油鬱滯シテ。而シテ化スルコト
 能サレバ。必ズ酸敗。或ハ腐壞ノ變ヲ將出シ来ラザ
 ルヲ得ズ。故ニ此病必ズ吞酸。及ビ腐臭ヲ嘔出ス
 ルノ證ヲ兼ル者ナリ。又其嘔氣ヲ發スルハ。凡物ノ
 腐敗スルヤ。必ズ蒸熱沸騰シテ。而シテ風氣ヲ生ズ
 ルノ致ス所ナリ。又其嘔氣ヲ發スルニ當テ。或ハ口
 内苦味ヲ覺エテ。而シテ甚惡臭ヲナストアハ。是
 其膽液壅ニ其功力ヲ失スルノミニ非ズ。既ニ其質
 ヲ壞亂セララル、ノ候ナリ。蓋膏粱家ノ此病ニ嬰ル

ハ。固ヨリ其所ニシテ異ムニ足サレドモ。若然ラザルモ亦ヨク此病ヲ患ル人アリ。其故何ゾヤ。他ナシ諸般ノ食品。味口ニ適スル者ハ。皆其質内ニ脂油ヲ含ムト少カラザルガ故ニ。偶其人膽液ノ性質虧損シテ。石鹼様ノ功力ヲ脱失スルニ遇フキハ。則水油分離シテ以テ此病ヲ發シ来ルナリ。又其素質胃弱ニシテ食化全カラザル者。及數數難化ノ食品ヲ用ル者。共ニ此病ニ嬰ルト多シ。又豆類ニ醋及鹽ヲ合セテ食ヒ。或ハ酸液家ニ鹽藏ノ肉類ヲ食ハシムルモ。亦能此病ヲ發スル者ナリ。豆ハ油氣多ク凝滯シ易キ者ナリ。コレ

ニ加ルニ醋ヲ以シテ。乃其質融和シ難ク。更ニ鹽ノ催熱ノ品ヲ以シテ。乃其質融和シ難ク。更ニ鹽ナリ。他品此病ヲ將來スル者類推スベシ。若夫妊婦ノ嘈雜。及諸通血閉塞シテ。門脈鬱滯スルヨリ胃化錯誤シテ。類症ヲ發スル者ハ。亦此例ニ非ルナリ。

○治法。胃中滯食アル者ハ。先コレヲ吐セシムヘシ。○脂膏ヲ食フヨリ發スル者ハ。燒酒一盞ヲ飲シメテ良ナリ。或ハ枸櫞汁ニ砂糖少ヲ和シ服セシムルモ亦效アリ。○酸敗液過多ナル者ハ。牡蠣末。雞卵壳。麻瘋濕失亞等ヲ取リ。挂露。或ハ葶苈露ヲ用テ送下スベシ。○膽液酷厲腐臭甚者ハ。酒石没藥散。或ハ甘消

石精。或ハ枸櫞汁モ亦良ナリ。○暖氣多ク。風氣鬱滯ノ候アル者ハ。黄縮飲。或ハ小茴香。杜松子。生姜。桂。益智。等コレヲ主ル。○素質胃弱。屢コレヲ發スル者ハ。健胃諸劑ヲ揆用スベシ。凡此病重證ニ非スト雖モ。屢コレヲ發スルハ。皆是胃化全カラザルノ致ス所ナリ。宜ク攝養ヲ慎デ其虛ニ至ラザラシムベシ。○妊婦ノ嘈襟ハ。上好ノ緑茶ヲ嚼マシムベシ。通血閉塞。胃熱上逆スル者ハ。刺絡術ヲ施スベシ。諸方泰西方總

鑑
用
ス
集
載
ス

病回精義卷之七終

