

病因精義

九

特別

79

1188

9







病因精義目次

卷之九 五篇上

下利第四十五 殮泄 乳糜利

痢病第四十六 肝崩

下血第四十七

便秘第四十八

吐糞病第四十九

蛔蟲第五十



病因精義

卷之九目次



病因精義卷之九

桃塢小森先生講述 男 桃郭義真筆記

下利第四十五 乳瀉利

下利別三等曰泄瀉曰飧泄曰乳糜利是也

泄瀉之近因水液輻湊于腸內或惡液衝動腸裏膜或腸  
間膜泌胞若水脈若乳糜脈等衰弱或壅閉之所致也其  
遠因攝生不良滯食腐敗殊食生冷果瓜若貪飲液汁若  
過用惡水若久服石鹼質物或冒寒傷冷若冒濕等以閉  
表發之蒸氣或好久浴溫湯若久居煖地以緩弱纖維絡或



當通泄物閉塞。或當發皮表。病毒內陷。或痛風毒入腸。或感流行時氣。或熱毒浸淫。或諸酷厲液下流。或情意急動。或定期泄瀉。或蛔蟲。若諸急病。若長病兼發等也。

下利ハ大便常度ニ違テ過泄スルノ病ナリ。此ヲ三等ニ別ツ。所謂泄瀉。飧泄。乳糜利。是ナリ。泄瀉ニ溇泄水瀉ノ異アリト雖モ。但是稀稠ノ差ノミ。故ニ今コレヲ混説ス。蓋腸ハ尋常飲食スル所ノ物ヲ胃ヨリ受傳テ。其流凝精粗ヲ分別シ。流精ハコレヲ乳糜脈ニ輸シ。凝粗ハコレヲ下送シ。適宜ノ軟塊屎トナシテ而シテ外泄スルヲ事トスル者ナリ。然ニ水液常

ニ違テ夥ク茲ニ輻湊スレバ。則乳糜脈コレヲ吸收シ得ズシテ。是但其吸收レバ則腐壞氣ヲ將來シ。養榮ニ不利ナルコト無バアラズ。苟モ養榮ニ不利コト得ズ。遂ニコレヲ下送泄利スルナリ。或水液溜滯スルニハ非レドモ。若一二ノ惡液アリテ茲ニ流瀉シ来バ。則以テ腸ノ裏膜ヲ衝動觸感シ。蠕動機自ラ急疾ニナリテ。以テコレヲ驅泄スルノ證アリ。又前ノ二因アルニ非レドモ。腸間膜ノ泌胞。若ハ水脈等衰弱シテ。常度ノ如ク吸收轉運スルコト能ハサルカ。若ハ壅閉シテ快通流行スルコトヲ得ザレバ。則水穀分利



セズシテ直ニ下流シ来<sub>ル</sub>アリ。凡泄瀉ノ近因大抵此  
 三ノ者ヲ出<sub>テ</sub>ザルナリ。其遠因ハ第一ニ攝生不良。滯  
 食腐敗シ。殊ニ生冷果瓜ヲ食<sub>ス</sub>。或<sub>ハ</sub>每時過食<sub>シ</sub>。或<sub>ハ</sub>油膩  
酩酒。醴。末茶等ヲ常用過度スル者酸敗酷厲質ノ物トナレバ。則腸ノ  
 裏膜ヲ衝動スルノ因ヲナシ。或<sub>ハ</sub>腸開膜ノ泌胞水脈。  
 乳糜脈等衰弱シ。若<sub>ハ</sub>壅塞スルノ因ヲナスナリ。次  
 ニ居恒液汁ヲ貪飲スレバ。則血ヲシテ稀薄ナラシ  
 ノ。腸ニ蔓延セル脈絡ノ末梢ヨリ鹹液ヲ流滴シテ  
 腸内ニ溜<sub>リ</sub>蓄シ。或<sub>ハ</sub>其用ル所ノ液汁ガ直ニ溢滿下流  
 シ来<sub>ル</sub>コトアリ。又惡水ヲ飲。或<sub>ハ</sub>コレヲ用テ烹<sub>キ</sub>餼セ

ル物ヲ飲食シ。若<sub>シ</sub>否<sub>ル</sub>モ或<sub>ハ</sub>他郷ニ行テ習慣セザル所  
 ノ水土ニ衣食スル者モ。亦皆腸白脈ヲ衝動シテ。泄  
 瀉ヲ發スルコトアリ。又久ク石鹼質ノ物諸般ノ果實。諸豆。赤  
豆ノ類。多ク石鹼質ヲ含<sub>ル</sub>食<sub>ハ</sub>バ。則纖維緩弱。且<sub>ハ</sub>水液溢流シテ  
 下利スルナリ。又寒冷濕氣ヲ觸胃シ。表發ノ蒸氣ヲ  
 閉塞スレバ。則其表ニ漏<sub>レ</sub>ベキ水氣此ニ鹽氣。及<sub>ハ</sub>硫黃  
 蓄ガ腸内ニ反流輻湊シテ。而シテ下利ヲ發スルコ  
 トアリ。此證久雨後。及<sub>ハ</sub>初秋俄ニ冷<sub>カ</sub>ナル時ニ多シ。若<sub>シ</sub>夫寒氣ニ因<sub>ル</sub>者ハ。必腹痛ス。然<sub>レ</sub>トモ是寒氣カ  
直ニ腸中ニ侵入スルハ非ズ。其表氣或<sub>ハ</sub>久ク温湯  
ヲ閉<sub>ラ</sub>レテ筋脈攣急スルガ為ナリ  
 ニ浴スルコトヲ好<sub>ム</sub>。或<sub>ハ</sub>久ク温煖ノ地ニ住シテ。纖維



緩慢スレバ。則表發ノ蒸氣適度ヲ失シ。且腸ノ分利ノ機ヲ損シテ。遂ニ下利ヲ發スルコトアリ。又尿汗。及他ノ尋常通泄セシ物ガ。一旦閉塞スレバ。或水液輻湊ノ回ヲ致シ。或酷厲物ヲ生ジテ。ソレガ腸ニ滯シ。乃腸膜ヲ衝動スルノ因トナルコトアリ。當ニ皮表ニ發スベキ毒トハ。疥癬痘疹ノ類ヲ謂ナリ。ソレガ内陷シテ腸ニ滯シ。或痛風毒ガ内陷シ。或一時流行ノ惡氣ニ傳染シ。或熱毒ガ浸滯シ。替留熱。瘡熱ナドニ泄瀉ヲ得ルハ多ク。或酷厲ナル食物。及諸飲ヲ用ヒ。或諸毒ニ中リ。或膽液ノ酷厲ナル者。霍亂類。或悍烈ナル鹽

氣ガ腸ニ滯スレバ。皆ヨク衝動シテ下利スルコトアリ。又情意ノ急動トハ。暴怒悲哀等ヲ言フ。コレニ因テ泄瀉ヲ發スルハ。白脈攣急シテ膽液ヲ過泄シ。或吸收管ヲ閉塞スル等ヨリ来。一時ノ變機ナリ。定期泄瀉トハ。人ニ因テ若ハ春若ハ秋。毎年時ヲ定メテ泄瀉ヲ患ル者是ナリ。此ハ其人稟賦ノ自然ニテ。イツモ其頃ニ當テ排泄スベキ惡液ヲ生ズルコトアルヲ。所謂良能ナル者ガ便ニ就テコレヲ驅出スルノ致ス所ナリ。小兒齒牙ヲ生ズルノ時ニ當テ。泄瀉ヲ發スルモ亦此類ナリ。蛔蟲ニ蒸發スルハ。多ク酸



敗液ノ致ス所ナリ。諸急病ニ兼發スルハ。何ニモヤ  
 ヲ酷厲毒浸淫ノ泄瀉ナリ。諸長病ニ兼發スルハ。多  
 ク腸胃ノ衰弱ヨリシ。或各病自敗ノ壞液ナドガ腸  
 ニ滯スルノ致ス所ナリ。凡久泄ノ證ハ。大率虛弱家  
 ノ患ニシテ。乳糜利飧泄等ト大同小異ナリ。或諸液  
 ノ質甚稀薄衰耗セルヨリ來ル者アリ。此等ハ畢竟  
 勞瘵ト同趣ニシテ。其人必羸極スルモノナリ。諸般  
 利物。真色形狀ノ監察  
 法ハ。病診要訣ニ出ス

飧泄之近因。腸胃衰弱不能化熟而下利也。其遠因攝生  
 不良。屢錯化熟之度者。或久受濕蒸氣。若過浴溫湯者。或

飢病。若赤痢後。若衰弱諸病末兼發者等也。

飧泄ハ飲食消化セズシテ完穀下利ス。泄瀉ノ既化  
 セシ物ヲ下ニ別ツ所以ナリ。蓋泄瀉ニモ亦腸胃衰  
 弱シテ水穀ヲ分離シ  
 得ザルヨリ來ル者ナキニハ非ズ。然ドモ此證ノ完  
 穀ソノマニテ下ルガ如ク甚キニハ至ラザルナリ  
 リ蓋人攝生ヲ慎ズ。每時不化ノ品ヲ食ヒ。或過食シ。  
 或運化ヲ衰弱ナラシムルノ諸件。靜坐工夫。勞苦諸  
 不如意等ナリ諸  
 液ヲ稀弱ナラシムルノ諸飲。末茶。可。新  
 湯ノ類ヲ過度セシ  
 ムル等ニテ。屢釀化ノ度ヲ愆リ。遂ニ以テ腸内ノ白  
 脈ヲ勞憊セシメ。且膽液。叢胞液。及津液等ノ食化ヲ  
 左右スル諸液ノ性質ヲ損シテ。稀淡無力ナラシメ。



加<sub>ル</sub>ニ其化熟ヲ錯<sub>ル</sub>ガ為ニ。酷厲粘汚ノ惡液ヲ生ジテ腸ノ裏膜ニ附着シ。斷ズコレヲ衝動スレバ。乃其傳送ノ機ヲ速<sub>カ</sub>ナラシメ。食物未ダ化セザル者ヲ押下シテ脱泄セシム。久ク濕蒸氣ヲ受テ。若ハ浴湯ヲ過用スルモ。亦皆運化ヲ衰弱ニシ。諸液ヲ鈍質ナラシムルノ事件ナリ。若夫饑病ハ衰弱ノ腸胃ヲ以テ承ルコトノ過多ナルガ故ニ。必完穀下利スル者亦恠ニ足<sub>ラ</sub>ザルノミ。赤痢後コレヲ發スル者多キハ。則其腸胃前疾ノ為ニ衰弱スルノ致ス所ナリ。衰弱諸病末殊ニ勞瘵ノ如キニ至テハ。則其運化ノ振<sub>ル</sub>ザル其

諸液ノ損壞セル。僅ニ食<sub>所</sub>ノ者モホコレヲ化スルコト能<sub>ハ</sub>ザルノ致ス所。必竟醫治ノ及ブ所ニ非ルナリ。

乳糜利之近因。乳糜諸道閉塞。或腸虛不能<sub>ハ</sub>升輸<sub>ル</sub>乳糜也。其遠因。黏液布滿。或久利。若久斷食後。或水液稠凝。或膽液之缺等也。

乳糜ハ飲食ノ精液。既<sub>ニ</sub>化シテ乳糜狀ニ成<sub>ル</sub>者。乃腸ノ吸收管ヨリ乳糜脈ニ入り。及<sub>レ</sub>乳糜管ヨリ血中ニ上輸シテ。以テ全身血液ノ原醅トナル者ナリ。今ヤソレガ上輸スルコト無<sub>シ</sub>テ。而シテ下利スルトキ



ハ。則一身養榮ノ資ヲ失ヒ。日日虚衰枯瘦シテ。遂ニ  
 死ニ就クノ外ナシ。輕侮スベカラザル所以ナリ。其ノ  
ノ者純白色ナル時アリ。或ハ灰色ナルコトアリ。是  
腸内ニ於テ他ノ汚液ヲ雜ルト雜ザルトニ因ルノミ  
 其近因ハ。則乳糜脈壅閉シテ。コレヲ上引スルコト  
 ナキニ外ナラズ。或腸ノ虚衰ニ出ル者其徵。臍圍重  
冷アリト雖モ。亦必乳糜脈畏縮シテ開ザルノ因ヲ  
兼ズンバアラザルナリ。蓋腸虚ノミヲ主トスル者  
其遠因腸胃粘液ヲ蓄スルコト多ク。其裏膜ニ布滿  
スレバ。則直ニ吸收管ノ口ヲ蓋シテ。其既熟スルノ  
 乳糜ヲシテ。其行道エ入ルコト能ハザラシムルナリ。此

證ハ腹滿シテ重鬱シ。而シテ口内ニモ亦粘液ノ附  
 着スルヲ以テ徵スベシ。是小兒ニ多クアル證ナリ。  
 水液稠凝シテ腸間膜ノ泌胞壅塞シ。水液ヲ以テ乳  
 糜諸道エ灌注スルコト能ハザレバ。則乳糜膠滯シテ  
 行コト能ズ。遂ニ壅閉スルコトアリ。此證多クハ難治  
 トス。宜ク津唾泌胞。及涎泌胞等ノ分利如何ト云テ  
 察シ。若稠凝スルノ徵アラバ。則コレヲ稀解通達ス  
 ルノ策ヲナスベシ。久痢後。斷食後等ニ此病ヲ患ル  
 ハ。是其久ク乳糜ノ通行ヲ虧コトアルガ為ニ。乳糜  
 脈萎蔽膠合スルノ致所ナリ。若夫膽液之缺スレバ。



則真色全<sup>レ</sup>灰白ヲナス。加<sup>レ</sup>ニ飲食消化<sup>レ</sup>難<sup>レ</sup>シテ。而<sup>レ</sup>シテ不良粘膠ノ乳糜ヲ生ジ。乳糜脈ニ通行<sup>レ</sup>シ易<sup>レ</sup>カラズ。異趣同題ノ病ヲナスコトアリ。

○治法泄瀉ノ證タル。大抵鬱滯滿餘ノ液。或<sup>レ</sup>酷厲有言ノ物ヲ。自然良能ノ驅逐スル所ナリ。故ニ甚劇ナラス。持久セズ。其人疲勞セズシテ。早ク快然タルハ。放置シテ療ゼザル。モ亦佳ナリ。若<sup>レ</sup>強テ治ヲ請<sup>レ</sup>トモ。漫ニ止<sup>レ</sup>ベカラズ。苦味ノ健胃劑ヲ與<sup>レ</sup>ベシ。若<sup>レ</sup>夫劇證。及<sup>レ</sup>持久證ハ。便<sup>テ</sup>各其宜ニ随テコレヲ左右セズンバアラズ。○食滯腐敗ヨリ来<sup>ル</sup>モノハ。吐スルニ宜シ。吐根

散コレヲ主ル。吐王散モ亦佳ナリ。證ニ随テ大黃滯ヲ加テ益良物既<sup>ニ</sup>盡テ後。芙蓉扁桃油ヲ與<sup>テ</sup>コレヲ和スベシ。次日若餘滯アラバ。朝ニ大黃浸。將王散等ヲ與<sup>ヘ</sup>。夕ニ芙蓉扁桃油ヲ與<sup>レ</sup>ベシ。否<sup>レ</sup>バ則野菊煎ヲ與<sup>ヘ</sup>。芙蓉蝟蛄散ヲ兼用スベシ。若<sup>レ</sup>下利持續シテ止<sup>ミ</sup>ガタキハ。三味石脂煉。皎白湯。甚キハ四味石脂煉。收斂和調劑等ヲ採用スベシ。○水液溢滿ノ證ハ。先大黃肉豆湯ヲ與<sup>テ</sup>コレヲ驅逐シ。次ニ幾那橙桂散ヲ與<sup>ヘ</sup>。兼テ和ニ發汗シ。且利尿スベシ。○惡水ヨリ發スル者ハ。其用ル所ノ水ニ多少礬石。石灰等ヲ投シ。清澄シ用テ



可ナリ。羈旅水ニ慣ザルヨリ来ル者ハ。健胃利水ノ劑ニ宜シ。○蒸發氣閉塞ヨリ来ル者ハ。發汗利尿ノ劑ヲ與ヘ。温保スレバ則愈。若シ寒氣。或シ冷飲ニ傷ラレ。下利切痛スル者ハ。更ニ止痛劑ヲ兼子。底野宜シ。且腹、部ヲ温蒸シ。或シ温石ヲ懷シムベシ。若シ心下苦悶。腹中緊張シ。腸胃汚滯ノ候アル者ハ。緩和瀉導方ヲ施シ。將王散ヲ與ベシ。疏滌シテ而シテ後ハ底野迦ヲ與テ良ナリ。○纖絡緩慢ヨリ来ル者ハ。幾那橙桂散。或シ剛鐵酒等ニ宜シ。○通泄物閉塞ヨリ来リ。或シ皮表ニ發スベキ毒ノ内陷シ。若シハ痛風毒ノ浸淫スルヨリ

来ル者ハ。各其舊ニ挽回スベシ。若夫多血家ナラハ。刺絡術ヲ兼施スベシ。然ドモ若シ其毒下利ヨリ去テ。快方ニ趣ノ徵アラバ。自然ニ任シテ逆コト勿レ。流行傳染毒。及諸酷厲毒ノ腸ニ滯スルヨリ来ル者。皆然リ。若シ其毒ノ下コト少ク。延纏鬱滯スルノ候アラバ。宜ク急ニコレヲ下スベシ。第其毒ノ性質及多少。並ニ其寒熱虛實ヲ察テ。藥劑ヲ揆用スベシ。凡酷厲毒来ル泄瀉ハ。大率腹痛ヲ兼發スル者。○熱病ニ於テナリ。胃痛。腸痛。脇痛ヲ参考スベシ。○熱病ニ於テ熱勢漸減退セントスル項。變移日カ。此ハ諸病善カルベカラリ。殊ニ熱病ニ於テハ。醫人其期ヲ知ラズ。出ス



ニ當テ下利ヲ發スルハ良徵ナリ。前劑ヲ轉ズベカラズ。然ドモ或劇烈ニ過テ虚損ヲ致シテコトヲ恐レバ。三味石脂煉ヲ與テコレヲ節スベシ。コレニ由テ其證稍減退シ。病者疲ガル者ハ速ニ此藥ヲ止ムベシ。若惡性熱ニテ。病人衰憊シ。強補スベキ者ニハ。帝緩和調劑ヲ與ベシ。若下利節減セザル者ニハ。四味石脂煉。礬石煉等ヲ與ベシ。但意ヲ用テ澀瀉ニ過ルコト勿レ。若下利十分ナラズ。其人腹脹シテ重滯努責ヲ苦ム者ハ。緩和澀導方ヲ施シ。梅麥二石飲。石梅接骨飴。將王散。蒼亞煎。蜀葵加蜜鹽湯ノ類ヲ採用シ

テコレヲ促スベシ。膽液熱。腸胃熱等ノ下利證○情意ノ急動ヨリ来ル者ハ。先緩下劑ヲ與ヘ。次ニ芙蓉刺姑散。或阿片醇少許ヲ纈草飲。或薄荷浸ニテ送下スベシ。○凡胃弱ノ人ハ。食後久カラズシテ強動スレバ。則泄瀉ヲ發スルコトアリ。健胃酒ニ宜シ。○定期泄瀉ハ。大率放置スルニ宜シ。若其利十分ナラザルヲ覺ル者ハ。少クコレヲ促スベシ。若過度ナル者ハ。少クコレヲ節スベシ。小兒齒牙ヲ生ズル時ノ泄瀉ハ。麻偏溼矢亞加大黃散ニ宜シ。適宜ノ飲食ニ和シ與ヘシ。○蛔蟲ニ煎發スル者ハ。殺蟲丸ニ宜シ。下



後痢姑大黃散ヲ與テ復生スルヲ防ベシ。○諸急病ニ兼發スル者ハ其人稟賦ノ強弱及病ノ寒熱虛實ニ随テ藥劑ヲ撰用シ。或促シ或止ム。是醫ノ權ニ在リ。○諸久病。殊ニ水腫。勞瘵。壞血病。癌瘡アル者等ニ下利ヲ發スルハ。多ク死徵ナリ。然ドモ本證治方ノ外。三味石脂煉ヲ兼用シテ。コレヲ節ニシ。以テ虛脱ヲ防ベキノミ。○都テ久瀉衰弱ノ證ハ。乳糜利ノ治法ト。勞瘵門ノ治法トヲ參考シテ。コレヲ療ズベシ。○諸般ノ劇キ泄瀉。直腸熱痛シテ粘液ヲ下ス者ハ。芙蓉扁桃油。或三味石脂煉等ヲ與ヘ。乳卵帝列面澀

導方ヲ兼施スベシ。○凡泄瀉止ガタキ者ハ。健胃ノ拔兒撒謨劑。及諸般香竄ノ蒸滴油。或燒酒浸等ヲ腹部ニ塗擦スベシ。甚效アリ。○飧泄ノ治法ハ。先大黃浸ノ與テ。腸胃ヲ淨除シ。惡腸裏ニ附著スル者ハ。コレニ宜シ。然ドモ此病都テ腸胃ノ衰弱ニ由ル。妄ニ下劑ヲ與カクシ。宜ク意ヲテ用テコレヲ次ニ桂露。橙皮露。或諸般芳香温補ノ燒酎酌スベシ。酒浸ヲ用ベシ。或九味茵陳酒コレヲ主ル。○飧泄ニ因テ全軀養榮ヲ失ヒ。羸極スル者ハ。蘭苔甘草湯コレヲ主ル。○饑病兼發ノ證ハ。治本病ニ在リ。○小兒ノ飧泄ハ。麻偃涅刺亞。或痢姑散ヲ用ヒ。後適宜ノ健



胃劑ヲ與フベシ。○衰弱諸病末ノ殮泄ハ。本病治術ノ外。桂醇十二滴ヨリヲ蒲萄酒ニ加。コレヲ與ルコト日ニ兩三次。或適宜ノ健胃劑ヲ採用シテ。萬一ヲ希望スベシ。

○乳糜利。粘液布滿ニ因者ハ。加味沒蘆醇コレヲ主ル。○腸間膜ノ泌胞壅塞ニ因者ハ。皎白湯ヲ與ヘ。兼テ解凝油ヲ用テ。腹部ニ塗擦スベシ。○腸胃衰弱ニ因者ハ。桂醇。若ハ健胃酒。及丸散等ニ宜シ。尚殮泄ノ治法ヲ參考スベシ。○膽液乏缺ヨリ來ル者ハ。苦味健胃散コレヲ主ル。

痢病第四十六 肝崩

痢病之近因。有酷厲侵蝕性之惡液。不斷滲出於腸之裏膜。而腐壞潰爛所在也。其遠因。鬱滯濕蒸氣。一切污穢氣。時行傳染惡氣。或穿濕衣中夜氣。以閉表發蒸氣。或食敗肉。若瘡物。若飲腐水。以損血液性質。或生敗黑膽液。若腐敗膽液。或有壞血病毒者。或自持久下利轉變。或先嬰他病。而血質損敗者等之所致也。別有一種稱肝崩者。其證混稀血。鹹渣樣液。間雜凝血。與大便共下也。或有其所下物黯赭而濃厚者。共無疼痛。若有之。亦甚微。其曰肝臟衰



弱生血之機不全浸浸乎敗壞爛崩之所致也

泄瀉ハ其下利スル所飲食ニ係ル。痢疾ハ其下利スル所血液ニ由ル。是其以テ區別スル所ナリ。蓋痢疾ノ毒唯腸胃ノミニ在ルニ非ズ。全身血液ノ中ニ此惡液ヲ生ズルコトアリ。其質重濁ニシテ自ラ下部ニ滯著シ。凡尿ヲ監察スルニ。病頭ニ在ルモノハ其微尿管シ。腹ニ在ルモノハ器底ニ沈著ス。以テ毒質ノ輕重ヲ知ベシ。居恒腸ニ蔓延スル所ノ脈絡ノ末端ヲ侵蝕シテ。コレヲ疼痛破裂セシメ。腸内ニ淋漓漏滴シ。復其觸ル所ヲ侵蝕シテ。先、脂及泡沫様ノ物ヲ下シ。遂ニ腸ノ裏膜ヲ潰膿腐爛セ

シメテ。以テ純血。膿血。膜。纖維。絡。片肉様ノ物ヲ下スニ至ル。腸間膜。及肝。脾。叢胞等ニ至ルマテ潰瘍ヲ生コレニ夾雜スルニ。膽液。酷屬膽液。敗黑膽液。粘液。此多クハ膜ニ布リ。所来ル者ナリ。滑液。鹹渣。表ニ在テ汗トナリ。裏ヲ刮削シ来ル者ナリ。食滓。即糞矢ナリ。然ドモ其食品ニ因テ色等ヲ以テシテ。而後ニ種種色。種種状ヲ異ニスルコトアルナリ。其遠因。鬱滯セル濕蒸氣トハ。暑濕ノ頃。軍船。陣屋。隘巷。牢獄。病院。荒屋。深窖等ニ於テ。空氣ノ鬱滯シテ腐壞セル者ナリ。一切汚穢氣トハ。腐屍。汚漬。塵垢等ノ已ニ腐壞セル物ヨリ蒸出スル所ノ臭氣ナリ。時行



傳染ノ惡氣トハ。或地震。山火。海湧等ヨリ。天地間別  
 ニ一種ノ酷厲侵蝕スベキ惡氣ヲ生シ。或金坑。信石。  
 毒泉等ヨリ蒸出ル所ノ酷厲氣。或前ニ曰。二氣ニ  
 起テ。先。一二人コレニ觸テ病ヲナシ。或浮漾シテ一  
 村一郡。若ハ闔國海内ニ行テ。普ク衆人ニ感シ。尋デ  
 其病人ノ蒸氣ニ觸感シ。相傳染スル者はナリ。濕衣  
 ヲ穿テ。夜氣ニ中テ。以テ表發ノ蒸氣ヲ閉ルハ。則直  
 徑ニ身裏ニ就テ鬱滯濕蒸氣ヲ釀成スルナリ。敗肉。  
 若ハ<sup>培</sup>タル物ヲ食ヒ。若ハ腐水ヲ飲テ以テ血液ノ  
 性質ヲ損スルハ。則直徑ニ身裏ニ就テ腐壞侵蝕毒

ヲ釀成スルナリ。敗黑膽液ハ。膽液ノ一種黑色ニ變  
 敗セル者。鬱憂病篇ニ詳説アリ。腐敗膽液ハ。霍亂篇  
 ニ論ゼル者。此等ガ門脈中ニ鬱滯シテ。腸ニ蔓延ス  
 ル所ノ脈端ヲ侵蝕シ。腸中ニ滴瀝スレバ。則此病ヲ  
 發ス。凡此病ハ惡性腐壞熱ト同因異證ヲ發スル者。  
 蓋其毒ノ輕浮ナルハ。疫熱<sup>即腐敗熱</sup>トナリ。重濁ナルハ  
 此病トナルナリ。故ニ或先疫ヲ發シテ。終ニ痢疾ヲ  
 兼子。或先痢ヲ發シテ乃疫熱ヲ兼ルアリ。世人ノ所  
 謂疫痢是ナリ。若其熱微ナル者ハ。又壞血病ト同種  
 ナリ。故ニ壞血病毒アル者ハ。固ヨリ此病ニ嬰リ易



シ。蓋彼二病腐敗熱ハ。其血液腐壞ノ極。必必發斑スルヲ徵トス。故ニ此病モ亦斑ヲ發スルコトナリ。然ドモ其氣下陷スルガ故ニ。他他ガ如ク多カラザルナリ。若夫持久セル下利ヨリ轉ジ。或先他病アリテ而後此病ヲ將出シ来ル者ハ。蓋皆其本病ノ為ニ血液損敗シ。遂ニ自性ノ壞液ヲ生ジ。ソレガ腸脈ニ鬱滯侵蝕スルヨリ發スルナリ。殊ニ内蔵ノ腐壞。或癰腫ノ腫瘍アル者。コレヲ發スナリ。

云 ○肝崩ノ一證ハ。其名ヲ設ルコト。肝ノ血ヲ製造スルノ機血ハ化ヲ肝ニ始テ。而シテ衰弱シ。血質ノ心ニ熟成スルモノナリ。稀薄崩壞スルヨリ来ト謂リ。蓋此證唯其血ノ漫壞

シテ。腸ニ蔓延スル諸脈端ヲ透漏スル者ニシテ。侵蝕潰爛ノ質ナシ。故ニ疼痛セズ。又膿ヲ下スコトナク。但洗肉汁ノ如キ者ヲ下スナリ。或間凝血ヲ雜ヘ下ス者ハ。蓋遂ニ其脈端ノ哆開スルヨリシ。或肝管ヨリ總管ニ傳テ流泄スル者ナルノミ。此病ト痢疾ト。其因大ニ逕庭アリト雖モ。其證卻テ相似タルコトアリ。故ニ茲ニ附說シテ。聊其異ヲ辨ズルナリ。

○痢ノ初發。膽液ヲ吐スルハ惡兆ナリ。○嘔吐呃逆ヲ發スルハ。胃嫩腫ヲ兼ルノ徵ニシテ。惡候ナリ。痢ノ黑膽液ヨリ来ハ危證ナリ。壞血病。或癰瘡毒ヨ



リ發シ。或ハ他ノ惡性ナル毒液ヨリ發シ。或ハ腸。其他内  
藏ノ腐壞ヨリ來ルハ。皆惡證ナリ。○溉導方ヲ施テ。直  
ニ轉却スルハ惡シ。若腸閉塞シテ。溉導劑ヲ容受セ  
ザルハ。殊ニ惡徵ナリ。○鵞口瘡ヲ發スル者モ。危險  
ナリ。○疼痛一陣。而シテ下利シ來ルノ間アルハ。病薄  
腸ニ在リ。重證トス。或ハ心肝ノ部ニ當テ疼痛ヲ覺ル  
ハ。危證ナリ。

○重墜努責裏急後重ハ。此病ノ通證ナリ。此其酷厲ナル  
惡液。斷ズ直腸ニ下流シ。直腸裏膜ノ滑液ヲ刮削剥  
脱シ。直ニ其膜ニ觸テ。其部ノ白脈ヲ刺戟衝動スル

ヨリ發ス。凡下利激ク直腸ノ滑液ヲ奪去スルトキ  
ハ。必此證ヲ兼ヌ。況此病ニ於ルヲヤ。其已コトヲ得  
ザルノ勢。以テ察スベキノミ。

○治法。先、居室ノ氣ヲ爽快ニシ。屢新鮮ノ氣ヲ引キ。且  
醋。或、酸味香竄ノ果汁ヲ壁上ニ灌ギ。カテ腐壞氣ヲ  
掃除スベシ。又心神ヲ慰悅シ。元氣ヲ活揚シテ。以テ  
血液ノ運行ヲ順調セシムベシ。否ザレバ則轉益腐  
敗ニ進ム。又木綿ノ繻絆ヲ著シ。カニ衣服ヲ厚シ。以  
テ蒸氣ヲ催進スベシ。但温暖ニ過テ以テ腐敗ヲ增  
益セシメザルヲ要ス。飲ハ大麥煎ニ酸味ノ果汁柑橙



類。葡萄。覆盆。子。蛇。莓。等。ヲ滴入シ。或ハ更ニ乳汁ヲ加用スベシ。食ハ  
 麥米蔬菜。化シ易キ品ニ宜シ。肉ハ新鮮輕味ノ重滯  
 セザル者ニ宜シ。或ハ絶テ用ガ又糞器ヲ備ヘ。卧床ニ  
 在テ便通セシムベシ。風寒冷氣ヲ冒シムベカラズ。  
 又木炭末ヲ貯置キ。每便直ニコレヲ糞上ニ摻シテ  
 臭氣ヲ蓋伏シ。患者及傍人ヲシテ其氣ニ觸シムベ  
 カラズ。且每次必コレヲ取棄テ。土ヲ穿テ埋ムベシ。廁  
 ニ撒シテ以テ他人ニ傳染セシムベカラズ。  
 ○熱勢強カラズ。元氣甚虚セザル者ハ。先吐王散。或  
 吐下散ヲ與ヘ。夕ニ底野辺少ヲ用ヒ。翌日大黃浸ヲ

與ヘ。毎夕底野辺ヲ用ルコト前ノ如シ。以テ愈ルニ  
 至ル。然ドモ次日速ニ疲困スル者ハ。三味石脂煉ヲ  
 與フベシ。コレニ由テカヲ復シ。頭痛腹痛臭利スル者ハ。  
 三日メニ復吐王散。吐下散ノ類ヲ與ヘ。夕ニ底野辺  
 或ハ阿片醇二十五滴ヨリ至ヲ與ルコト前ノ如シ。斯ノ如  
 ニシテ病毒減スルヲ察セバ。三味石脂煉。仙屈散。酸  
 瑰地黃湯ノ類ヲ與ベシ。若腹痛。膨脹。噯氣。惡心等ノ  
 證持續スル者ハ。此等ノ劑イマダ其毒ヲ和スルニ  
 足ラガルナリ。又三日メニ朝ニ大黃劑ヲ投シ。夕ニ芙蓉  
 刺蛄散。或底野辺ヲ與ヘ。餘日ハ尚前方ヲ用ユベシ。



腸胃ノ毒既盡テ病勢減退セザルハ。四味石脂煉。收  
 斂和調劑等ヲ用テ輕收スベシ。若毒イテ盡ザル  
 證ハ。必此等ノ藥ヲ間用シテ元氣○初發熱勢劇キ  
 稍復スレバ。又前劑ヲ與テ可ナリ。○初發熱勢劇キ  
 者ハ。大黃。旃那。蒼末。林度等ニ消石少ヲ加與フベシ。若  
 脈緊弦。焮腫ノ候アル者ハ。先刺絡術ヲ施シ。次ニ前  
 方ヲ與ヘ。或蜀葵甘草湯。若ハ酸瑰清涼飲ニ消石ヲ  
 加ヘ。或亞刺未亞護謨。蜩蛄石。消石等ヲ適宜ノ露水  
 ニテ送下スベシ。胃部重滯シテ惡心噯氣ヲ發シ。腹  
 緊滿劇痛シテ便臭甚キ者ハ。梅麥二石飲。蜀葵加蜜  
 鹽湯等ヲ與テ清滌スベシ。若脈管破裂シテ既血ヲ

下スニ至ル者ハ。清收溉導方ヲ兼施スベシ。若腐敗膽  
 液ヨリ來ル者ハ。酸麥蒼石飲コレヲ主ル。膽液除盡  
 シテ下痢尚止ザル者ハ。苛椽罌酒飲コレヲ主ル。○  
 初發脈緩弱ニシテ細。或遲ニシテ不齊。衰弱ノ候ア  
 ル者ハ。惡候ナリ。然トモ其力尚任ベクハ。先吐王散  
 ヲ與テ一掃シ。次ニ三味石脂煉。沙列布根湯。仙屈湯  
 ノ類ヲ與ヘ。夕ニ野菊煎一茶盃ヲ用ルコト數次。兼  
 テ三味帝列面溉導方。凡重滯努責ノ證。或乳沒赤石  
 溉導方ヲ施スベシ。翌日ヨリ朝其人力漸復シ。毒イテ  
 盡ザルノ候アラバ。四味霸王散ヲ間用スルコト



一兩次スベシ。若コレニ反シテ力漸衰へ。伏毒甚カ  
 ラザル者ハ。四味石脂煉。收斂和調劑。礬石煉等ニテ  
 收保スベシ。若初發ト雖モ毒微ニシテ衰弱ノ方ヲ與フニシ○毒  
 勢猛惡。元氣コレガ為ニ抑製セラレテ。速ニ衰弱ス  
 ル者ハ。纈草飲加橙皮煉糖。或龍姑散。龍腦雙乳飲。及  
 醋糖飲。或酒麥煎。帝幾和調劑等ヲ揆用シ。兼テ項窩  
 兩脇等ニ發疱膏ヲ貼スベシ。前方功ナリ諸液腐敗  
 ノ候漸進者ハ。防腐清涼飲。三味礬精煉。接亞礬精飲  
 等ヲ揆用スベシ。若不寐。腹痛。下利劇烈ナラバ。兼テ  
 阿片醇十五滴ヲ服セシムルコト日ニ三次。此等ノ方

法ニテ愈ズ。發斑。粟疹。譫妄。掣急撮空摸床等ノ證ヲ  
 見ス者ハ。死ニ瀕スルノ候ナリ。○凡腸痛劇キ者ハ。  
 扁桃油。亞麻油。罌粟仁油等ニ沙糖ヲ加テ。コレヲ服  
 シ。服度ニ四錢ヨリ更ニ亞麻仁煎ニ乳汁。及底野辺ヲ  
 加テ溉導劑トナシ。コレヲ施スコト日ニ數回。○鷺口  
 瘡ヲ發スル者ハ。蕃薑礬激劑ニ宜シ。  
 ○肝崩尋常ノ證ハ。玫瑰糕ニ大黃ヲ加テコレヲ與  
 へ。三香兩脂丸ヲ兼用スベシ。コレヲ用テ發熱スル  
 者ハ良徵ナリ。治膿壞液方コレヲ主ル。○一種黧瘡  
 濃厚ナル者ハ。先適宜ノ下劑ヲ與へ次ニ酸瑰清涼



飲ヲ以テコレヲ主ル。他ノ攝養法等ハ。本篇論スル  
所ニ随テ將息スベシ。

○凡痢疾。及肝崩トモニ。下劑ヲ用ルノ度ニ適スル  
コトヲ貴ブ。治術ノ要。專コ、ニ在リ。輕忽ニ從事ス  
ルコト勿レ。

下血第四十七

下血之近因。厚腸。若薄腸裏面脈絡破裂。或痔脈開通者  
是也。其遠因。多血滿餘。酷烈諸飲。及諸致血質酷厲之事  
件。他血證所舉者皆是也。

下血便ニ先タツテ来モノハ痔血ナリ。便ニ後テ下  
ル者ハ腸脈破裂スルナリ。然ドモ痔血モ亦便後ニ  
出アリ。コレヲ要スルニ腸脈破裂ヨリ来モノハ。多  
少便中ニ混ゼザルコトヲ得ズ。痔血ハ唯其外圍ヲ  
包ムニ。以テ其出所ヲ辨ズベキナリ。又其多出ルニ及  
テ。痔血ハ則患者直ニ其肛裏ヨリ逆流スルヲ覺ヘ  
腸ノ脈絡ヨリ出ハ。多少其腸中ニ滯溜スルノ間  
ルガ故ニ。必凝結狀ヲナサバ。ルコトヲ得ズ。蓋痔血  
尋常通泄スル者ハ。則自然良能ノ以テ盈餘ヲ減節  
スル所ニシテ。是其病ヲ免シムルノ事件。病トスベ



キ者ニハ非ルナリ。然ドモ或過泄シテ而シテ止ス。  
 漸々虚衰ヲ致スモノハ亦コレヲ治セズンバアラザル  
 ナリ。蓋斯ノ如キ者ハ其血質必酷厲ニシテ以テ破  
 裂セル脈絡ヲ衝動シ其創口ヲ愈合スルコト  
 能ガラシム若夫諸腸ノ動脈若ハ門脈ノ末梢破裂  
 ルガ故ナリ。則猶胃血ニ於ルガゴトク一般。但其破傷  
 スル部ノ異ナルガ為ニ或嘔シ。或下ノ別ヲナスノ  
 ミ。故ニ病因攝養及治法共ニ嘔血篇ヲ参考通用ス  
 ベシ。又夫發熱疼痛シテ下血スル者ハ則痢病篇ヲ  
 参考通用スベシ。又腐敗熱。或ハ壞血病ニ下血ヲ發  
 スル者ハ各病本篇及痢疾篇ヲ併考テ可ナリ。

○治法。本文ニ説ク所ノ如シ。但カテ腸ノ運動静息ス  
 ルヲ要ス。故ニ一切瀉藥ヲ禁シ。過食ヲ戒メ。又酷厲  
 性ノ諸飲食及諸消化シ難キ物ヲ禁シ。歩行動作ヲ  
 慎ミ。且腸ノ部位ヲ按シテ其築動スル所ヲ考ヘ。又  
 其血痔脈ヨリ来ルニ非シテ而シテ尿中ニ血ノ混セ  
 ザル等ノ候アラバ。是其脈ノ破裂スルコト。縮腸以  
 下ニ在ナリ。宜ク亞刺未亞護謨ヲ既導方トシテ。創  
 口ヲ愈合セシムベシ。○下血若脈絡弛緩衰弱セル  
 ヲリ来ル者ハ。拳參根。或ハ玫瑰花。或ハ野菊等ヲ用  
 テ收瀉強壯ニスベシ。若漏泄甚シク。漸々虚脱スル者



ハ。阿芙蓉劑ヲ用ヒ。或ハ對症藥劑ニ幾那ヲ加ヘ与テコレヲ鎮止保護スベシ。又腐敗熱赤痢壞血病惡性ノ痘瘡等ヨリ来者モ幾那甚良ナリ。且葡萄酒ニ水ヲ和シテ稀薄ニシ。香櫞汁。或醋。或綠礬精ヲ加コレヲ兼用スベシ。

便秘第四十八

大便秘結之近因。厚腸傳送之機遲滯也。其遠因。騎馬奔走及他身體強動之事件。若厚被久卧等。居怕過泄表發之蒸氣以乾燥腸液者。或苦心靜坐。若元氣衰弱。以使腸

之運動怠慢者。或腸白脈麻痺不遂。自失傳送之職者。或嗜乾燥食物。若收瀋諸飲者。或食量甚少者。或直腸結石。及他硬物。或熱病。或肝熱。或膽液之弱。或黃疸。或酸液病。其他諸病兼發。或老人厚腸枯燥等也。

大便ハ飲食ノ滓。日日外泄シテ新陳代謝シ。鬱滯スル所ナキヲ常トシ。其質濡軟。稍形ヲ成。ヲ中適トス。食物消化和糅シテ。其原質ヲ見ザルヲ良トス。若其質色稍可ナリト雖モ。中ニ難化ノ品形見スルハ。全熟良成ノ屎ニ飲食薄腸ニ醱熟シテ其精液ヲ乳糜ハ非ルナリ。其粗滓ハ漸凝固シ。縮腸ニ至テ始テ屎形ヲ成シ。腸ノ蠕動機ニ因テコレヲ順下シ。橫膈昂低



ノ機。腹筋縮張ノ勢コレヲ扶助シ。腸液裏面ノ泌胞様膜ヨリ漉過シ出<sup>ス</sup>以テコレヲ滑利シテ徐徐ニ外泄セシムルナリ。故ニ此等ノ機関ニ於テ支障アルカ。若ハ他ノ病因アリテコレヲ妨害スル所アレバ。則秘硬閉結ノ患ヲ作ス。尋常ハ重病ニ非レドモ。若コレヲ放置スレバ則以テ他病ヲ誘發スルノ因トナルナリ。騎馬奔走以下ノ事件。若適<sup>タ</sup>然<sup>ラ</sup>ガ如<sup>キ</sup>ハ敢テ害ヲ作ベキニ非レドモ。居恒爾シテ止ザルトキハ。則火氣斷ズ扇動シテ表發ノ蒸氣ヲ過泄シ。内部自ラ潤液ニ乏ク。腸液乾燥シテ滑利シ難ク。加ルニ尿モ亦乾燥硬

結シテ乃秘閉ノ患ヲ將出來ナリ。苦心静坐スル人ハ。靈液腦内ニ於テ耗損スルコト多ク。下部ニ灌注スルコト寡ク。其行歩スルノ稀<sup>ヒ</sup>ナルカ為ニ。腹部ノ運動自ラ衰弱シテ。帝ニ腸ノ順下ノ機ヲ怠慢セシムルノミナラス。併テ飲食減少シ。尿常ニ腸ニ充實スルニ足<sup>ラ</sup>ズ。日ヲ併テ而後重積推盪スルヨリ。尿モ亦其間ニ漸<sup>シ</sup>凝結シテ秘硬スルナリ。元氣衰弱スル者ハ。火氣之弱ナルヨリ運動怠慢シテ前證ト同轍ノ患ヲ將來シ。動モスレハ輒麻痺不遂ヲ致<sup>ス</sup>ナリ。腸白脈ノ麻痺不遂ハ即元氣衰弱ヨリシ。或ハ痲病ヲ



發スベキ凝寒質ノ粘液ガ茲ニ流滯スルヨリ来ルナ  
 リ。若其傳送ノ機ヲ自失スルハ論ゼズシテ知ヌベ  
 シ。又乾燥セル食品ヲ嗜バ、則尿質自ラ乾燥シ。且腸  
 液ノ滋潤モ亦缺乏ス。收瀋性ノ諸飲赤葡萄酒。濃茶。  
 ヲ用レバ。腸ノ全質ヲ收縮セシメ。且腸液ノ泌別ヲ  
 妨害スルヨリ来ル。食量少キ者ノ秘硬ヲ致スハ。則既  
 コレヲ論セリ。直腸ノ結石ハ。常ニ牡蠣ヲ多服シ。或  
 ハ龍骨。白堊。阿仙藥ノ如キ土質ノ物ニ塩氣ヲ帶テ凝  
 集シ。火氣ノ為ニ水氣ヲ蒸散セラレテ而シテ結成  
 スルナリ。蓋上件云所ノ物品ヲ服セスト雖モ。諸ノ

飲食盡ク土質ヲ含有セザルコト無ガ故ニ。或時ニ  
 コレヲ得テ而シテ結石ヲ生スルコト。猶獸ノ酢苔  
 ヲ生スルガ如ク一般。以テ怪ムニ足ザルナリ。他ノ  
 硬物トハ。譬バ小果實ノ如キ物ノ仁ヲツラ子テ食  
 ヒ。ソレガ集結シテ硬塊シ。直腸内ニ懸テ便通ヲ障  
 碍スルノ類ヲ謂ナリ。又兼發ノ證。熱病ニ於テコレ  
 ヲ得ルハ。猶身體ノ運動大過ナルヨリ来ルガゴトク。而  
 シテ一等劇烈ナル者ナリ。肝熱ヨリ来ルハ。則膽液ノ  
 性ヲ損シテ。腸ヲ衝動スルコト能ズ。以テ蠕動機ヲ  
 怠慢セシムルノ致所ナリ。膽液之弱ナルモ亦然リ。



此證。食化全カラズ。胸下痞。食ヲ欲セザル等ノ證  
 ヲ兼ル者ナリ。大黃。龍膽等ノ苦味劑。及諸獸ノ膽ヲ  
 用テコレヲ補テ宜シ。黃疸ハ。膽液腸ニ灌注セザルノ病。膏ニ  
 蠕動機ヲ怠慢セシムルノミナラス。腸ノ粘汚ヲ燥  
 雪スルコト能ザルト。屎質全成セザルトヨリ。膠泥  
 ノ滞著スルガ如ナルノ因ヲ併テ秘結スルナリ。酸  
 液病ハ。其酸收氣ヲ以テ膽液ヲ克制シ。擅ニ收斂ス  
 ルノ致ス所ナリ。此證ハ其時ニ通スル所ノ然ドモ此  
 證ハ其極酷厲質ニナレバ。卻テ泄瀉。飧泄等ヲ發ス  
 ルナリ。其餘諸病ニ兼發スル者類ヲ推テコレヲ求  
 バ。則各其所因ヲ知シ。若夫老人ノ大便燥結ハ。則津

液全體之缺ノ致ス所。復論說ヲ須ルニ足ザルナリ。  
 ○治法。蒸發氣過多ヨリ来ル者ハ。清涼滋潤ノ下劑。荅  
 末林度。芒硝。酒石等ヲ用ル方。梅麥二石飲ノ如キ者  
 ニ宜シ。既ニ通シテ後。其動靜ヲ節ニシ。且煮タル梅。杏。  
 李。或ハ乾蒲萄ノ如キ果實。蜜。砂糖ノ如キ潤滑ノ物。麥飯  
 蕎麥ノ如キ都テ大便ヲ順調スル者ヲ交互常用シテ  
 可ナリ。○苦學家。及衰弱家ノ便秘ハ。苦味ノ健胃劑。  
 大黃醇。將王散ノ類ヲ用テコレヲ通シ。爾後適宜ニ  
 運動セシメ。諸健胃散丸。及時ニ一盞ノ酒ヲ用ベシ。  
 ○腸白脈麻痺ヨリ来ル者ハ。山蒼菜精コレヲ主ト



ル○飲食ノ品質ヨリ来ル者ハ。先其因ヲ去リ。大黃劑ヲ用テコレヲ利スベシ。○食料少キ者ハ。不食篇ヲ参考スベシ。○結石硬物ハ手術ヲ以テコレヲ拔ベシ。○瘍科摘要 ○熱病以下ノ兼證ハ。各其病門ニ就テ参考スベシ。○老人枯燥ノ證ハ。先軟和瀉導劑ヲ施シ。尋テ滋養ノ食料ヲ採用スベシ。○凡便秘經久重積スル者ハ先瀉導劑ヲ施シ。而後適宜ノ藥劑ヲ与ベシ。諸藥劑總テ泰西方鑑ニ集載ス

### 吐糞病第四十九

吐糞病之近因。諸腸順下之機反戾。或有所妨之所致也。其遠因。經久嘔吐。逆機習為常者。腸痛進極。劇變急動亂者。或變急後。腸轉戾而錯置者。或生焮腫。潰瘍。壞疽。癌瘡。硬腫等。於腸若腸間膜若近傍諸藏者。或潰瘍後腸彼此愈合閉著者。或生腸破腫者。或硬尿塞路。或蛔蟲巢結。或淋疾兼發等也。

夫薄腸ト厚腸トノ交際ニハ。圍辦アリテ以テニ腸ヲ界シ。尿ヲシテ上逆スルコト無ラシムル者ナリ。然ニ今口内ニ吐逆シ来ル者ハ。則胃腸順下傳送ノ機常ニ反シ。或ハ其機ヲ妨害スル所ノ事件アルヨ



リスト云ニ論ナシ。其機ノ常ニ及スル。諸般ノ嘔吐  
 ヲ發スベキ因アリテ治セズ。コレヲ患ルコト久ク  
 遂ニ其逆機ガ常習トナリテ。常ニ毫モ肛ヘ泄出セ  
 ザルノミナラス。旣導法ヲ用テ順降セント欲スレ  
 ハ。則其藥汁ニ至マデモ盡ク嘔逆吐泄スル者アリ。  
 此證殊ニ下文ニ所謂腸痛ニ嘔吐ヲ兼發スル者。其  
 證進極リ。諸腸劇ク攣急動亂スル者ニ於テコレヲ  
 得ナリ。若其腸痛畧治スルト雖モ。其初攣急牽引セ  
 シニ因テ。腸ノ常形轉戾シ。位置錯亂スレバ。則糞矢  
 常機ノ如順下スルコト能ス。久ク吐糞病ヲ患ルモ

ノナリ。コレヲ真證トス。焮腫潰瘍。壞疽。癰瘡。硬腫等  
 ヲ腸若ハ腸間膜ニ生スル者ハ。其部疼痛シテ物ノ  
 觸動スルニ勝ズ。糞矢下テ茲ニ至バ。則其部ノ白脈  
 忽チ拘攣急縮シ。腸ヲ狹窄閉塞シテ通セザラシメ。且  
 逆戾ノ運行ヲナシテ上泄スルナリ。或ハ近傍諸藏  
 ニ此等ノ腫瘍ヲ生スル者モ。亦吐糞ヲ兼ルコトアリ。  
 蓋此等ノ證。タトヘ腸ニ生スル者ト雖モ。屎通行  
 ノ緊要觸動スル所ニ中ザレバ。則吐糞ヲ患ルコ  
 トナシ。又腸ニ在ル者ニ非ト雖モ。屎通行ノ緊要觸  
 動スル所ニ密通交スレバ。則此患ニ嬰ナリ。若  
 夫腸ノ潰瘍後。彼此愈合閉著スル者ハ不治ノ證ナ  
 シ。腸破腫ハ。腸ノ一部分常居ヲ離テ突出シ。絞括セ



シガ如ナリテ垂下ガ故ニ。順下ノ機逃不得此處ニ  
 於テ障導セラレ。尿乃及逆ス。是ヲ以テ吐糞ハ即破  
 腫ノ定微トスル所ノ一證ナリ。硬尿路ヲ塞ハ便秘  
 ノ尤甚者ニ於テス。蛔蟲巢結モ亦甚夥ク集居スル  
 者ヲ言ナリ。淋疾ニ兼發スルハ。則近傍焮腫ニ於テ  
 スル者ト同軌ナリ。此證尤危險。大抵七日ヲ出スシ  
 テ死スト謂リ。

○治法。嘔吐ヨリ起原スル者ハ。則嘔吐門ニ就キ。各種  
 ノ病因ヲ察シテコレニ從事スベシ。腸痛ヨリ来モ  
 ノハ。更ニ腸痛ノ治法ヲ用ベシ。攣急ニ因テ腸ノ位

置繆戾スル者ハ。臍部ニ麝香ヲ塗リ。緩急壯經方ヲ  
 内服セシメ。又時時腹部ヲ温蒸シ。兼テ摩擦スベシ  
 ○腸及近傍ノ焮腫潰瘍以下ノ治法ハ。各病門ニ就  
 テ其治ヲ考求スベシ。但焮腫。及寒熱壞疽ヨリ来者  
 ハ。本病治術ノ外酸麥洗導方ヲ兼施シテ良ナリ  
 劑 泰 西 方  
 鑑 = 出 ス

蛔蟲第五十

蛔蟲有三種。所謂圓蟲。組蟲。蟻蟲。是也。其近因。腸胃薄弱。  
 膽液稀淡。不能以全熟飲食。而釀酸敗腐壞粘汚液。其中



所含之生氣自變化而生焉也。其遠因。圓蟲自土質變化。組蟲自水氣傳來。蛇蟲專自腐液生也。

凡人ノ體中ニ生スル所ノ蟲。種種ニシテ一ナラズト雖モ。其最較著ナル者ハ。即本文舉ル所ノ三種是ナリ。其他頭腦肺心及諸藏。竝ニ動靜脈中。歳ノ肝藏ニハ蟲アリルヲ見ルコト最多シ。又犬ノ脉中婦人陰内。及經血ニ蟲アルヲ見ルコト少カラズ。等ニモ亦皆蟲ヲ生スルコト有ト雖モ。其徵明白ヲ得ガタキ者ナリ。又腸胃内生スル所ノ蟲ニモ。偶爾ニハ三種ノ外ニ異状ノ者アルコト無ニハアラズ。或蟲ヲ下ニ其頭蝮蛇ニ似テ尾圓ク尖ナシ。色黯赤。長廿四梅指横径。幅梅指ノ四分一。數多連属ス。此蟲

甘扁桃油ニ白葡萄酒ヲ交用テ外泄スト云リ。又一小兒區平赤頭ノ蟲ヲ下者アリト。其他和漢トモ間異状ノ記セリ。然ドモ此亦其明徴ヲ得ルコト能ハズ。故ニ皆舍テ論セザルナリ。○蟲ヲ生スルノ由。古人種種ノ説アリト雖モ。コレヲ要スルニイマダ腸胃壯實。飲食善熟スル者ニ於テコレヲ得ルコトハアラズ。故ニ先ッ腸胃薄弱ヲ掲ルナリ。蛔蟲ハ小兒殊ニ乳養ヲ此テ新ニラヌ。故ニ先ッ腸胃薄弱ヲ掲ルナリ。蛔蟲ハ小兒殊ニ乳養ヲ此テ新ニ食養ニ就トキニコレヲ得ルモノナリ。是他ナシ脆弱ノ腸胃俄ニ飲食ヲ消化シ得ズ。尚ルニ多甘味ノ品ヲ与テ。重滯鬱敗ノ又膽液ハ固ヨリ飲食ヲ釀化ス患ヲ將來ガ故ノミ。ル第一品ニシテ。未ダ膽液醇厚ナル者ノ食化ヲ善セザルハアラズ。且膽液醇厚ナレバ。則必苦味峻烈



ニシテ以テ蟲ヲ殺ノ能アリ  
或曰凡蟲ヲ生スルハ  
 浮瀝スルヲ吸氣考ハ飲食ニ引テ體中ニ入リ其  
 卵質ノ合スル所ニ隨テコニ化生スト此腦及肺  
 心血中ノハコレヲ克殺シテ化生スルコトヲ得  
 醇良ノ人ハコレヲ克殺シテ化生スルコトヲ得  
 ラシムルト云フ。按ニコレヲ克殺スルハ蓋空氣中  
 ノ諸液ニ化シテ此身ノ生豈夫蟲ヲ生スルノ  
 氣ヲ裨補スルノ資トスルナリ  
 患アラシヤ故ニ次ニ膽液稀淡以テ飲食ヲ釀熟ス  
 ルコト能ズト云フ。凡蟲アル人酸敗腐壞粘汚ノ液  
 ナキ者ハアラズ。故ニ又コレヲ枚擧ス。而シテ物ノ  
 腐壞スルヤ必蟲ヲ生スル者ハ蓋其物ノ元行ガ各  
 各離散スルニ當テ。其中含ム所ノ生氣ガ其物ノ本

ノ體ニ隨テ。一箇箇殊異ノ運動ヲ作テ。別ニ區域ヲ  
 營造シテ以テ新ニ一活物ヲ化出スルナリ。人身腸  
 胃内ノ蟲ヲ生スルモ亦復此ノ如ク。其飲食スル所  
 ノ物が全良ナル化熟ヲ得スシテ腐壞スルニ至バ。  
 則其中含ム所ノ生氣ガ。人身ノ運化ヲ離テ別ニ一  
 箇ノ運動ヲ作シ。粘様液中ニ潜居シテ區域ヲナシ。  
 遂ニ其體ヲ結テ而シテコニ化生スルナリ。故ニ  
 又次ニ其理ヲ説ク。又其蟲ヲ生スルノ一様ナラザル  
 者ハ。則遠因ノ以テ然ラシムル所。蓋圓蟲即尋常ハ。  
 諸飲食腐壞殊ニ新鮮ノ穀菜ヲ食シテ化熟ヲ得ザ



レバ。則コレヲ生シ易シト謂リ。按ニ舊穀菜ト雖モ。則亦此蟲ヲ生セザルニハ非ス。但其新鮮ナル者ノ生氣ヲ食ノ最多キハ如ナルナリ。故ニ此病ハ都下ノ陳米麥菜ヲ食スル者ニ寡ク。而シテ故ニ圓蟲ハ田舎ノ新穀生菜ヲ食スル者ニ多シ。故ニ圓蟲ハ土質ヨリ變化スト曰ナリ。圓蟲ハ土質ヲ食コト多リ。異ナ組蟲即寸ハ。敗セル水ヲ用ヒ。及水草魚肉ヲ食スル者ニ多ト謂リ。或曰。一婦人組蟲ヲ患フ。藥ヲ投バ随テ生ス。故ニ其用水ヲ更シムレハ。則復コレヲ生セズ。蓋此蟲固ヨリ腐水中ニ生スル者アリテコレト同種ナリト雖モ。然ドモ水中ニ在モノハ。土氣ヲ含テ其色黯赤。人身ニ在モノハ。乳糜ヲ吸シテ其色白ク殆ント相似ガ如シ。故ニ認テ以テ異物トスルノミ。又此蟲時ニ魚腸ノ中ニ於テコレヲ得ルコトアリ。且平生水草魚類ヲ食スル者ニ於テコレヲ得ルコト多トキハ。或ハ其卵ヲ吞テコレヲ生

シ。或ハ此等ノ物ノ腐敗セリ。故ニ組蟲ハ水氣ヨリヨリモ亦コレヲ生スルナリ。故ニ組蟲ハ水氣ヨリ傳來スト曰ナリ。蟻蟲即穀道蟲ハ直腸内ニ生スル者ニシテ。直腸ハ飲食既屎トナリタル者ノ溜滞シ且通泄スル所ナリ。故ニ此蟲ハ喜デ甘ヲ食ヒ酸敗セル屎ガコ、ニ留滞スルノ間ニ。此部ニ出ル所ノ腸液ヲ誘テ共ニ酸敗シ。因テ以テコレヲ化生スルナリ。故ニ蟻蟲ハ專ラ腐液ヨリ生スト曰ナリ。○蟲ノ病タル隱伏シテ見ヘズ。其外發スル所ノ證種種ニシテ一ナルコト能ハズ。意ヲ用テコレヲ診セザレハ。誤テ他病トスル者アリ。故ニ今其一ニ確的ナル徵候ヲ舉



テコレヲ示ス。以テ餘證ヲ参考シテ。而シテ其實ヲ  
 認待ベキナリ。凡蛔アル者ハ。腹脹硬滿シテ。粘液雷  
 集結ノ支體羸瘦シ。飲食ノ精液多。蟲ノ為ニ吸奪セ  
 致ス所ニ足。時ニ腹痛シ。其微ナルハ。蟲動テ裏  
 ヲ養榮スル所ニ。時ニ腹痛シ。膜ヲ觸感スルナリ。甚  
 ザルハ。咬傷コレガ空腹ノ時ニ甚シク。物ノ間難マ  
 シキハ。咬傷コレガ空腹ノ時ニ甚シク。物ノ間難マ  
 スルナリ。コレガ空腹ノ時ニ甚シク。物ノ間難マ  
 ガ故ニ食スレバ稍易ク。蟲食ヲ得テコレヲ喰ヒ。咬傷  
 ナリ。食スレバ稍易ク。蟲食ヲ得テコレヲ喰ヒ。咬傷  
 包裏間隔セラレテ。觸。或ハ時ニ鬱悶シテ絶テ食ヲ欲セ  
 動スル胃白脈ヲ觸。或ハ時ニ鬱悶シテ絶テ食ヲ欲セ  
 酸液ノ白脈ヲ觸。或ハ時ニ鬱悶シテ絶テ食ヲ欲セ  
 動スル胃白脈ヲ觸。或ハ時ニ鬱悶シテ絶テ食ヲ欲セ  
 粘液ノ上。胃ニ在テ而シテ。其動靜起伏スルノ一  
 分。則活物内ニ在テ而シテ。其動靜起伏スルノ一  
 分。則活物内ニ在テ而シテ。其動靜起伏スルノ一  
 ナラザル。或ハ食ニ嫌忌多ク。酸性敗液。或ハ粘液ノ一  
 ガラザル。或ハ食ニ嫌忌多ク。酸性敗液。或ハ粘液ノ一  
 ナラザル。或ハ食ニ嫌忌多ク。酸性敗液。或ハ粘液ノ一

リ。或ハ食ニ向ヘバ悪心嘔吐シ。食機動テ腐液大便  
 下利シ。或ハ粘凝液。及水ノ如粘汁ヲ下シ。或ハ酸液  
 ニ衝動セラレテ。腸蠕動機ヲ急疾ナラシムルヨリ  
 シ。或ハ蟲ノ運動ニ因テ腸ノ吸尿管ヲ閉塞セシム  
 ルコトアル。或ハ時ニ便秘シ。消化所ノ流動液ハ善  
 ノ致ス所アル。或ハ時ニ便秘シ。消化所ノ流動液ハ善  
 ノ致ス所アル。或ハ時ニ便秘シ。消化所ノ流動液ハ善  
 ヲ消化シ得サルニ。酸氣ヲ以テ。消化所ノ流動液ハ善  
 ヲ消化シ得サルニ。酸氣ヲ以テ。消化所ノ流動液ハ善  
 ヲ消化シ得サルニ。酸氣ヲ以テ。消化所ノ流動液ハ善  
 レヲ聚結セシムルコトアル。或ハ腹内時ニ蠕  
 動スルヲ覺ヘ。或ハ時ニ蟲ヲ吐下スルコトアリ。此  
 是。最一。顔色多クハ青白。或ハ時ニ赤ク。或ハ乍變シ  
 明徴。ハ。酸敗液多ク血中ニ混シ。皮下ノ細絡。血  
 白ナルハ。酸敗液多ク血中ニ混シ。皮下ノ細絡。血  
 ヲ凝泣セシムルノ致ス所。其赤ハ則時ニ融解流行  
 スルノ致ス所。其赤ハ則時ニ融解流行  
 スルノ致ス所。其赤ハ則時ニ融解流行  
 則凝融進退ノ速ナルハ。白眼青ヲ帶ビ。眼胞モ亦  
 青ヲ帶ルコトアリ。前ト瞳子散大。瞳孔ノ直線終  
 青ヲ帶ルコトアリ。前ト瞳子散大。瞳孔ノ直線終  
 青ヲ帶ルコトアリ。前ト瞳子散大。瞳孔ノ直線終

痲因精義 卷之九 三十二



ハ斜視眼トナリ。六筋ノ一ガ急スルナリ。然ル所  
 行キ。轉機白脈ニ交。テ球ヲ絡ガ故ナリ鼻中時時麻痺シ。酸敗酷厲液ノ  
 上唇腫脹シ。或ハ青或ハ赤。血ノ凝滯シ。或ハ乾咳  
 シ。或音聲嘶啞シ。酷厲液衝動シ。喉頭ヲ麻痺シ。或ハ  
 強靱ナラシムル所以ハ。則是亦胃白脈ノ支別ガ此等ノ部  
 ヲ循環ル白脈ト交。口氣惡臭。或ハ流涎シ。腐壞稀薄ノ  
 ヨリ唾管エ流。睡中時ニ驚悸シ。酸液腦ヲ刺戟シ。或  
 溢スル故ナリ。或ハ頭眩暈。又酸液腦ヲ刺戟シ。或  
 或ハ咬牙シ。同因ト或ハ頭眩暈。シ。或ハ胃中ノ蓄  
 液。并ニ蟲ノ為ニ胃白脈ノ致ス所。拘急搐搦。角弓反張等  
 行ヲ障導セラニ胃白脈ノ致ス所。拘急搐搦。角弓反張等

ヲ發シ。酷厲液腦ヲ刺戟シ。或ハ蛇或ハ頭痛シ。胃ハ  
 相親キ。或ハ發熱シ。腐液血中ニ入テ血小便白濁リ  
 腐敗乳糜力且熟セス。飲食不化久ケレハ全身脈亂  
 混シ。下ナリ。且軟弱無力ナリ。血液養榮ニ乏ク  
 テ結代狀ヲナシ。且軟弱無力ナリ。無カニナリ加ル  
 ル者アルノイタストコロナリ。其他種種奇異ノ證  
 ヲ發シテ變化實ニ究ベカラサルナリ。尋常蛇蟲ノ  
 證大率右ノ如ク而シテ組蟲ハ殊ニ甚シ。若夫糞中  
 ニ甜瓜子或ハ胡椒仁狀ノ小ナル者ヲ混シ下ハ定  
 ヲ組蟲ノ徵トスベシ。又夫蟻蟲ハ時時糞中ニ混シ  
 下リ。且時時肛内痒ク忍ビ難キコトアリ。甚重證ヲ發



スルニ至コトナシ。凡蟲咬傷甚キ者ハ腸ヲ穿蝕シ  
テ腹腔内ニ出ル者アリト云リ

○治法先殺蟲劑ヲ投シテコレヲ除キ。後健胃諸劑ヲ  
與ヘ且、丹緩ノ品難化ノ物腐質ノ水等ヲ避テ其病  
原ヲ去リ以テ復生ヲ防ヘシ。○殺蟲劑ハ茵陳。龍膽。  
攻蟲草。石花菜。阿魏。蘆薈。沒藥。幾那。亞鉛華。水銀。甘汞。  
鐵礬。錫等ナリ。或ハ單用シ或ハ合劑トシ或ハ製劑  
トシ用ユ。殺蟲莉汞丹。盧礬散。硫黃煉。紫黃散。掃腹殺  
蟲散。外敷。殺蟲方蟲病ハ小兒ニ多モノナリ藥ヲ服  
レ得ザルモノ殊ニコレニ互シ  
療組蟲方以上七方蘭  
方樞機ニ出 薊菜。纈葱。煉。魏。纈。蘆。薈。九。藿。汞

餅。沒。盧。醇。等皆良ナリ撰用スベシ。小兒藥ヲ服シ難  
キ者水銀適宜乳汁ヲ用テ煮ルコト小半時ニシテ  
水銀ヲ去リ其乳汁ニ大黃煉少ヲ加ヘ與ベシ。凡剛  
鐵劑。甘汞劑ハ殊ニ三種ノ蟲ヲ撰スシテ用ベシ。又  
組蟲ハ單ニ帝列面油或ハ扁挑油。膽ハ油等ヲ服シ  
テ下ナリ。蟻蟲ハ殺蟲瀝導方ヲ施テ良ナリ。蟲盡テ  
而後防蟲散。健胃酒。幾那橙桂散等コレヲ至ドル諸  
劑總テ恭西方  
鑑ニ集載ス

病因精義卷之九 終

病因精義 卷之九 終



