

病回精義

十

別
特
64
1188
10



79
1188
10



病目精義目次

卷之十五篇下

肝癰腫第五十一 肝硬結腫 肝閉塞

黃疸第五十二

脾病第五十三 脾硬結腫

腎痛第五十四 石淋 腎癰腫及潰瘍
膀胱癰腫及潰瘍

尿血第五十五

尿崩第五十六 白濁 遺尿

病目精義

卷之十五



99-1331

病因精義卷之十

桃塢小森先生講述 男 桃郭義真筆記

肝燉腫第五十一

肝硬結腫
肝閉塞

肝燉腫之因。大率與內部諸燉腫同。更有自肝膽生結石。以支障血行。或勞動苦神。若炎暑肝藏殊熱時。俄頃引冷。若飲水。或膽液黏凝壅塞于諸管。或先生硬結腫者。用劇吐劑。而衝動之。等發者。及脾病兼發者。他都是過食肥膩脂膏。貪飲精烈諸飲。誤用辛熱香竄之藥品者。等之患也。

肝燉腫ノ候ハ。右脇下肝ノ部ニ當テ急脹刺痛シ。

全問

腹緊脹ス。延テ胃上ニ及ヒ。左側ニ卧トキハ其痛増ル者アリ。童シ。發熱稽留シテ煩渴シ。白眼必黃色ヲ帶ビ。甚キトキハ全身發黃シテ而シテ大便白ク脈實弦ナリ。更ニ呼吸不利。殊ニ息ヲ深ク引ク嘔吐。呃逆。食後重煩。小便赤少等ノ證ヲ兼ヌ。焮腫ノ生スル所ハ。則定處ナシト雖モ。必門脈枝ニ於テスルコト多ク。或ハ動脈枝ニ在ルモ亦ニレアリ。内部諸焮腫ノ因ハ各門ニ散見ス。宜ク参考スベシ。肝中。或ハ輸膽管。或ハ肝管膽管等ニ結石ヲ生スルコトアレバ。則以テ血行ヲ支ヘ。遂ニ凝滯焮腫ノ患ヲ將來スルコトアリ。劇キ

勞動及苦神。若ハ炎熱ノ時候ニハ。一身ノ血盡ク熱沸スト雖モ。殊ニ肝藏ハ門脈ノ血ノ迫入スルガ故ニ。其沸熱スルコト最甚シ。然ルニ俄ニ冷ヲ取り。或ハ水ヲ飲テ他ノ血ヲ凝泣セシムレバ。則肝血ノ沸熱唯リ殘留テ。而シテ焮腫ヲ發スルノ因ヲナスナリ。蓋他部俄ニ冷テ。而シテ此部獨煖ナレバ。則其煖ナル所ヘ血ガ多ク輻湊シテ腫脹スルナリ膽液粘凝シテ諸管肝管。膽管。輸膽管。總管等ニ壅塞スルヨリ來ル者ハ。猶結石ノゴトク血行ヲ支障スルノ致ス所ナリ。肝藏先硬結腫ヲ生シ。血行順通シ難キコトアルニ。若劇吐劑ヲ用テ其部ヲ拘攣シ。加ルニ血行急疾

其處ニ激抵スルヲ以スレバ。則其腫ノ近傍^ノ周ク^ク焮熱腫起スルナリ。脾ノ血ハ門脈ニ傳テ肝ニ入ル者ナリ。故ニ脾血稠凝ニシテ壅滯閉塞スルノ病アレバ。則肝モ亦必其災ヲ受ク。故ニ脾病アル人ハ。動スレバ輒此病ヲ將來スルコトアリ。其他肥膩脂膏ヲ過食シ。精烈諸飲ヲ貪飲シ。辛熱香竈ノ品ヲ過用スル等ハ。諸焮腫ノ通因。殊ニ其尤^ナル者ヲ舉ルノミ。

○肝焮腫ニ鼻衄。殊ニ右鼻ヨリ或ハ痔脈腫レ。或ハ痔血ヲ泄シ。婦人ハ殊ニ或ハ黃汗。臭汗。瘡疥等ヲ發シ。或、膽液様ノ物或ハ少クヲ下利シ。若ハ嘔シ。或ハ

尿中ニ白塗ヲ見ハシ。或ハ咳痰ヲ吐スルヨリシテ輕快ニ趣クアリ。故ニ此等ノ證ヲ見サバ。宜クコレヲ開通セシムベシ。妄ニコレヲ止ルコト勿レ。○諸證劇烈ニシテ良徵ナキ者ハ。三四月ニシテ死スル者アリ。若コレヲ過^レレバ則潰瘍トナリ。或ハ壞疽。硬結腫ニ變ス。○熱痛増劇。煩躁大渴スル者ハ。是將ニ膿ヲ釀セントスルノ候ナリ。既ニ熟膿スレバ。則其部腫脹シテ時時刺痛シ。上胸膈ヨリ肩胛マデモ連及シ。下右脚ノ腓腸酸痛シテ忍ガタク。且先潮熱狀ヲナシ。漸ク漫然持久消耗熱ヲ發シ。羸極シテ死ス

ルナリ。然ドモ其膿瘍。肝ノ外面脇下ノ筋肉ニ接シ。
按撫シテコレヲ知り。創口ヲ作テ以テ潰破スベキ
ハ。則治ヲ望ムベシ。又適ニハ其膿内部ヨリ潰へ。肝管。
若ハ膽管ヨリ總管ニ傳テ腸ニ入り。大便ト俱ニ泄
出シテ愈へ。或ハ上逆嘔膿シテ愈ル者アリ。唯夫肝
ノ左方ノ外面ニ潰破シテ。其膿腹腔ニ陥入シ。或ハ
上面ヨリ横膈ニ連テ口ヲ開キテ。胸腔へ泄出スル
者ハ。腹腔ニ泄スル者ハ。屢風水腫トナリ。終ニ勞瘵
胸腔ニ溢スル者ハ。則胸膿病トナル。ニ變シテ不治ノ證トナル。○瘰癧ニ變スル者ハ。病
毒泄除ノ候ナクシテ疼痛頓ニ減シ。或ハ全ク痛マズ

苦痛稍寛キカ如ナレドモ。不意ニ煩悶シ。漸ク謔言
シ。終ニ面部ニ冷汗ヲ發シテ而シテ死ス。○肝藏太
甚壯熱ヲ發シ。其腫瘍中ノ汚物流動液ヲ蒸散セラ
レテ疑固スレバ。則硬結腫トナルナリ。此證ハ急ニ
死セスト雖モ。甚以テ難治トス。○間肝焮腫後。肝ニ
小疱數多ヲ生シ。外面無事ニシテ多年ヲ経ル者ア
リ。○凡敗黑膽液家。壞血家。癩毒家。ニシテ此病ニ嬰
レバ。多ハ壞疽トナリ。全肝腐敗シテ速ニ死ス。○凡
内部焮腫。尿質善熟シテ微赤色。暫時沈定スレバ。白
色輕質膿様ノ底塗アルハ。即病毒分利ノ候ナリ。

○治法。初發脈緊ナルト或ハ稍緩ナルトノ差別アリ
 ト雖モコレニ拘泥スルコトナク。必先刺絡術ヲ施
 ヲ良トス。爾後證ニ随テ報施スル 尋テ將王酒石散。
 或ハ荅蜜飲ヲ與テ大便ヲ順調シ。潔淨消石。每服五分 或
 甘消石精半茶 ヲ兼用シテ小水ヲ快通セシメ。或ハ
梅麥ニ石飲ヲ與ルモ亦能此ニ功ヲ兼奏ス 又數々軟化漑導方ヲ施シ。更
 ニ温湯或ハ野菊煎ニ乳汁ヲ加テ肝部ヲ温蒸シ。其
 間ニハ龍腦精ヲ綿布ニ浸シテ温貼シ。病勢尚減セ
 ガル者ハ。則發疱膏ヲ貼スベシ。又飲食攝養法等總
 テ前ノ内部諸焮腫篇ヲ参考シ。適宜ニコレヲ調理

スレバ。則不日ニシテ愈。○既ニ膿瘍ニ變スル者ハ
 刺絡ヲ禁ズ。下劑モ亦甚要ナラズ。蘆柑湯ヲ主トシ。
 多ク乳汁ヲ加テ精力ヲ補充シ。或ハ幾那劑ヲ用テ
熱勢強キ者ハ 腐敗ヲ豫防シ。以テ自然良能ノ所作
綠礬瀝ヲカヘ ヲ觀ル。若前ニ所謂諸兆ニテ其膿ヲ排泄スルコト
 ヲ得レバ則治ス。若良兆ヲ得ズ。漸ク勞瘵狀ヲ呈ス
 ル者ハ。則勞瘵篇ニ從事シテコレヲ救療スベシ。若
 其外部へ徵見シテ。手術ヲ施ベキ者ハ則速ニ外科
 術ニ從事スベシ。法。瘍科摘 ○肝焮腫發疹シテ愈。其
要ニ出ス 疹持久スル者ハ。乳酪清。或ハ牛香湯。或ハ牛甘湯ヲ

主劑トシ。萊石煉ヲ兼用シテ微利ヲ取ベシ。則愈。
 ○壞疽ニ變ズル者ハ。腐敗熱ノ治法ニ從事シ。強壯
 防腐ノ劑ヲ用テ。萬一ヲ希望スベシ。○焮腫治後肝
 ニ鬱結ヲ餘ス者ハ。將ニ硬結腫ヲ作ントスルナリ。
 牛香湯ヲ主劑トシ。石鹼丸ヲ兼用シ。樟腦膏ヲ外傳
 スベシ。則消解ス。若消解セズ。既ニ硬結腫ヲ作ス者
 ハ。柔汞散。或ハ甘汞丸及解凝諸劑ヲ撰用シ。且蒸溺
 劑ヲ施ベシ。然ドモ經久ノ者ハ治シ難シ。但宜ク麥
 米。蔬菜。清果。輕肉少量ニ時ニ用ベシヲ喰ヒ。乳酪清。大麥煎。輕
 麥酒等ヲ飲ミ。一切厚膩。醇酒。鹽藏物。辛熱香烈ノ品

ヲ禁シ。動作ヲ適宜ニシテ以テ氣血ヲ平順シ。務テ
 攝生ヲ善シテ以テ其壽ヲ保シムベシ。否則諸險證
 ヲ發シテ而シテ死ス。深ク教戒ヲ加ベキナリ
 ○凡肝藏ニ稠血壅滯シテ積聚閉塞ヲナス者。大率
 前方ヲ取用ヒ。且時時下劑ヲ與テ大便ヲ順調シ。消
 石劑ヲ用テ小水ヲ利スベシ。則愈。若愈ザル者ハ。則
 沒盧解凝散ヲ與ヘ。石鹼膏ヲ外傳シテ良ナリ。尚脾
 病篇ヲ參考通用スベシ。

黃疸第五十二

黄疸之近因。膽液失通路而反流于血中也。其遠因。血液粘稠。或結石。以壅塞膽管。或嘔吐。若瘕急。以繆戾肝膽諸管者。或肝焮腫。若壅塞。若硬結腫。或熱病。若誤治瘧疾。或蝮蛇咬。狂犬傷。或妊婦。或小兒黑便不盡者。兼發等也。

膽液ハ血中ニ含ム所ノ苦黄液。居恒コレヲ肝藏ニ於テ分泌シ取リ。輸膽管ヨリ膽中ニ輸テ茲ニ蓄ヘ。膽管ヨリ出テ總管ニ傳ヘ。乃薄腸ノ初際ニ灌入シテ以テ飲食釀熟ノ原ヲ作スモノナリ。又別ニ肝管ト稱スル者アリ。此ハ肝ヨリ出テ總管ニ入ル蓋既ニ膽ニ蓄ル者ハ。茲ニ再釀熟煉シテ最稠厚烈性トナル。肝ヨリ直ニ出ル者ハ。猶稀薄緩弱ナリ。二ツノ者總管ニ合シテ適宜ノ質ヲナシ。乃腸中ニ灌入ス。然ニ此道路ニ於テ壅塞障導ノ患アレバ。則既ニ血中ヨリ分離シ取テ肝膽ニ釀熟セル所ノ膽液ガ再靜脈ヨリ血中ヘ又流シ。遂ニ全身ニ汎濫シテ而シテ黄色ヲ發スルナリ。或曰一種粘黄ナル敗液ガ皮下ナス者アリト蓋黄疸ヲ發スルノ前ニハ。必心下苦悶肝部重鬱。或ハ微痛シ。呼吸安カラズ。飲食化シ難久惡心嘔吐シ。或ハ吞酸腐變シ。四肢倦怠スル等ノ證アリ。而シテ白睛先黄色ヲ發シ。尋テ全身盡ク黄色ニ

病因精義

ナリ。甚者ハ則黒色ヲ帶ルニ至リ。小便深黄。大便灰
 白。粘土ノ如ニシテ結シ。脈熱狀ヲ帶ビ。或ハ帶ズ。或
 ハ一身搔痒シテ忍ガタキコトアリ。其遠因。血液粘
 稠ニシテ其色青白。筋肉膨脹スル様ノ人。或ハ脱血
 後。血液揮發鹽ヲヒシテ滯凝粘稠ヲ致ス人。或ハ難
 化ノ食品ヲ喰テ而シテ動作少キ人。或ハ通泄物閉
 塞スル人等ハ。動スレバ輒粘稠液肝膽ノ諸管ヲ壅
 塞シテ發黄スルモノナリ。其徵ハ必胃中冷重シテ
 而シテ屢粘液ヲ吐シ且右肋起脹スルナリ。膽中ニ
 結石或ハ石灰ヲ生シ此膽液ノ甚粘稠ニ此ガ膽管
 狀ノ物為テ凝固スルナリ

或ハ總管ニ來リ懸レバ。則膽液ヲ障遏シテ腸中へ
 灌入スルコトヲ得ザラシム。此證ハ其石ガ總管ヨ
 リ出脱シテ腸中ニ墜レバ。則大便ニ雜出シ。或ハ此
 時膽液夥ク流出シ。以テ嘔ヲ誘シテ吐出スルコト
 アリ。凡肝膽ニ生スル結石ハ。コレヲ火中ニ既ニ其
 石ヲ脱出スレバ。則黄色次第ニ減シ愈レドモ。再ビ
 他ノ石ガ轉シ來テ膽管ニ懸レバ。復發黄スルコト
 前ノ如シ。解剖家ノ說ニ。一婦人ノ膽中ニ大斯ノ如
 ク數發シ數愈ルト。又其肝部重シテ緊脹シ。劍狀柔
 骨内方へ牽引シ。速ニ心煩ヲ發シ。數々發嘔スル等

痼疾類聚 卷之十

ヲ以テ徵トスベシ屢劇キ嘔吐ヲ發シ。或ハ心勞。若
 ハ憤怒悲哀等ニテ腹部ノ白脈ヲ攣急セシメ。或ハ
 子宮衝逆病等ニ嬰リテ肝膽ノ諸管ヲ繆戾緊扎スレ
 バ則發黃スルコトアリ。此證ハ必白脈脆弱ノ人ニ於テシ且又數發シ數愈ル
コトナル肝焮腫。肝ノ壅塞。肝ノ硬結腫等ニ兼發ス
 ル者ハ固ヨリ其所ナリ。然ドモ其腫壅スル處。膽液
 通行ノ道ニ中ラザレハ則發黃セザル者アリ。故ニ又
 既ニ發黃スル者ハ。則頑固ニシテ愈ガタシ。熱病ノ
 變移日ニ當テ。善カ悪カ何レ一種ノ異動ヲ作テソ
 レヨリ發黃スル者アリ。或ハ其血ノ肝ニ於テ熱沸

スルコト殆ト肝焮腫ノ如ナルヨリ發黃スル者ア
 リ。瘡熱ヲ早ク截絶シ。血液粘濁ヲ致シテ發黃スル
 者アリ。蝮蛇咬。狂犬傷ハ毒ノ為ニ血液粘稠ヲ致シ
 テ發黃スルナリ。妊婦ハ其胎兒ノ為ニ膽管ヲ壓迫
 セラレテ發黃スルコトアリ。小兒黑便盡ザル者ハ。
 則總管口コレガ為ニ膠閉セラレテ發黃スルコト
 アリ。蓋尋常黃疸ハ甚難證ニ非ズ。但肝ノ硬結腫ヨ
 リ來ル者ハ難治ナリ。其終水腫ニユキ。或ハ惡性熱
 病ヲ發ス。按ニ此癰樣腫ノ潰爛腐壞スルナリ老人。或ハ脾病質ノ人
 ハ大率死ヲ致シ。小便稀水ノ如キ者ハ尋テ水腫ニ

陷スルノ候ナリ熱病發黃スルハ良徴少ク黃疸發熱スルハ良徴多シ

○治法。粘稠液膽管ヲ壅塞スル者ハ。紫葶大黃飲。或ハ將王散。或ハ茉莉酒石散ヲ與ヘ。若胃中苦悶。粘液ヲ吐スル者ハ。吐王散。或ハ吐根散ヲ野菊煎ニテ送下シ。以テ胃腸ヲ淨除スベシ。若肝部疼痛。多血家ニシテ焮腫ヲ作スノ恐アル者ハ兼テ刺絡術ヲ施スベシ。此證ハ吐劑ニ否者ハコレヲ禁ズ。翌日ヨリ蜀葵甘草湯宜カラズ。或ハ牛香湯。或ハ茅苴開壅湯ヲ與ヘ石鹼丸樞機茵陳酒。硫黃華。或ハ硫黃水等ヲ兼用シ。大便快通セザル

者ハ。毎三四日前ニ舉ル下劑ヲ與テ可ナリ。證ニ因テハ毎日ニ三行モ通セ頑固愈ガタキ者ハ開壅和調劑コレヲ主ドル。○結石ヨリ來ル者ハ牛香湯。或ハ茅苴開壅湯ヲ主トシ。銷石丸ヲ兼用スベシ。牡蠣水モ亦佳ナリ。若夫粘綠物ヲ吐下シ來テ而シテ結石ヲ出脱セント欲スル者ハ。蜀葵湯。或ハ杏卵嬰亞煉等ヲ服セシメ。此ノ如キ藥劑ヲ漑導方トナシテコレヲ左右スベシ。若吐下劇ク。痛苦ニ勝ザル者ハ止痛劑ヲ權用シ。亞麻油ヲ漑導方トナシテコレヲ和スベシ。若照實強。焮腫ノ恐アル者ハ刺絡ヲ施シ。清和飲ヲ

與べシ。諸證鎮靜スルトキハ復本方ヲ用ユ。解凝劑
 シ胃中冷。或ハ胃痛スル者ハ石鹼鈎吻丸ヲ四味疏
 解飲ヲ用テ送下スベシ。粘液ヲ下シテ愈。○久ク解
 凝劑ヲ用テ衰弱スル者ハ鐵幾煉コレヲ主ドル。コ
 レヲ用ルノ間。若便秘スル者ハ。適宜下劑ヲ以テ快
 通セシ。○嘔吐ヨリ来ル者ハカテ其嘔ヲ治スルニ
 在リ。擲急ヨリ来ル者ハ。先將王散ヲ用テコレヲ下
 シ。且緩和漑導方ヲ施シ。次ニ扁桃乳合嬰粟煉糖ヲ
 與へ。或ハ纈草芍藥湯ヲ用テ鎮痙散ヲ服スベシ。若
 愈ガタキ者ハ尚將王散ヲ間用スベシ。若肝ニ閉結
 緊張アリテ速ニ減シ得ズンバ。牛香湯ニ石鹼丸ヲ
 兼用スベシ。若其拘攣ニ因テ疼痛眩暈煩悶嘔吐水

瀉等ヲ發セバ。定痛和調劑ヲ權用シ。諸證鎮靜シテ
 後ハ復前方ヲ與べシ。○肝ノ焮腫壅塞硬結腫等ヨ
 リ發スル者ハ治本篇ニ具ス。熱病變移日ニ發黃ス
 ル者ハ治本篇ニ在リ。肝焮腫ヲ兼テ發黃スル者ハ
 刺絡清涼下劑等。都テ肝焮腫ノ治ニ從べシ。瘧疾ヲ
 誤治スルヨリ来ル者ハ。二糕霸王鹽合劑コレヲ主
 ドル。○虫獸咬傷ヨリ来ル者。小兒胎糞盡サル者。治
 皆本病上ニ在リ。姪娠發黃ハ分娩スルニ非レバ愈
 ズ。但時ニ石鹼丸ヲ用テ大便ヲ結セザラシムベキ
 ノシ。○黃疸持久シテ而シテ甚コレヲ病トセザル

者アリ。乳酪清或ハ麻仁湯ヲ常用セシムベシ。然トモ病
 人大ニ飢ヘ或ハ其脈熱モ病○黃疸。黯綠或ハ帶黑色ニ
 至ル者ハ。龍腦雙乳飲。清精罌亞飲コレヲ主ドル。或
 ハ幾那劑ヲ兼用シテ可ナリ○凡黃疸。淡薄易化ノ
 食ヲ用ヒ。油膩脂膏。難化ノ品。及熱物。竝ニ收斂ノ品
 ヲ禁シ。適宜ニ運動シ。且心意ヲ慰悦スベシ。又時時
 肝部ヲ按摩シ。酢ニ麻油ヲ和シ。綿布ニ蘸シテコレ
 ヲ貼シ。或ハ浴湯ニ入テ良ナリ。

脾病第五十三

脾硬結腫

脾病之近因。血液稠凝。壅滯于脾也。其證橫膈下。左肋内。
 痞懣積聚。時拘急而牽引左腎。呼吸重難。飲食難化。食後
 苦悶。或攻衝焉。居怕鬱愁。神氣不暢。或心悸動。或怔忡。或
 噯氣吞酸。或惡心嘔吐。或頭痛。或腹痛。或滿腹膨脹。若硬
 結。若雷鳴。其他發種種變證。無極也。其遠因。怠惰安逸。食
 養不節。過房媾縱。憂苦悲哀。情意不了。或瘡疹内陷。或通
 血閉澀等也。若夫脾藏生硬結腫者。前證加一。等少勞動。
 則轉劇甚。且脾部常多少疼痛。又顏色滲淡。唇色青。其因。

自前證轉進。若他發諸硬腫之毒鬱留于此也。

脾ハ親ク肝ト交通ス。故ニ脾ニ壅閉アレバ。則肝モ

亦多少壅閉セザルコトヲ得ズ。肝焮腫篇參考スベシ又親ク

胃ニ接シ。肝ト左右ヨリコレヲ擁ス。故ニ胃モ亦拘

攣セザルコトヲ得ズ。又脾ノ血ハ必門脈ニ入門脈

ハ腸間膜内ニ蔓延ス。故ニ腸モ亦上方へ牽引セラ

レ都テ上腹一面ニ膨滿不快ヲ覺ル者ナリ。是故ニ

一ニ上腹病ノ名アリ。又此病必鬱愁不快ヲ兼。而シ

テ鬱愁病即敗黑膽液病ハ必上腹痞悶ヲ兼。故ニ善其區別

ヲ知ザレバ。則迷惑シテ治ヲ過コトアリ。又胃弱留

飲アル者。必心下痞悶。鬱愁不快。殆ト此病ト相類ス

ルコトアリ。又一種白脈病ト稱スル者アリ。是亦此

病ト相類ス。故ニ今此篇殊ニ其證狀ヲ詳ニシテコ

レヲ示ス。宜ク各門ヲ參考シテ其主證ヲ辨知シ。彼

此認謬コト勿レ。此第一義ナリ。若夫肝ノ壅塞硬結

等モ亦甚相似タリト雖モ。其治モ亦甚相近カ故ニ。

敢テ辨論ヲ費サズ。證治共ニ宜ク互考通用スベシ。按

鬱憂病俗コレヲ稱シテ肝證ト謂ヒ。脾病ニレヲ稱

シテ肝積ト謂フ。此肝ヲ左腹ニ在トスルヨリ謬來

ナリ。此ヨリ又轉シテ怒氣念起スルヲ肝積ト謂フ。

此其肝ヲ木ニ屬シ。木ヲ震ノ屬トシ。震ヲ怒トスル

ル者ト見タリ。夫名ハ實ノ賓ナリ。故ニ名正カラザ

レバ。言順ナラズ。言順ナラズシテ治ヲ致モノハ。未
 コレ有ザルナリ。今ノ華ル所。事些細ニ似タリト雖
 モ。凡俗間稱謂スル所ノ病名。實事ト相違モノ多ク。
 是ガ為ニ治ヲ誤者モ亦少カラザルナリ。故ニ一二
 例ヲ舉テコレヲ示 卻テ説脾ハ横膈ノ下。胃ノ左
 ス。餘ハ類推スベシ 傍ヨリ後部ニ退キ。肋骨ノ内側ニ位スル者ナリ。故
 ニ脾病ハ必此部ニ當テ痞懣シ積塊アリ。或ハ甚膨
 脹シ。或ハ時ニ築動スルガ如ニ覺ル者ナリ。此ヲ第
 一的證トス。時ニ拘急スル者ハ。白脈其鬱滯ニ勝ス
 シテ攣縮スルナリ。左腎ニ牽引スルハ。白脈連交ス
 レバナリ。呼吸重難ナルハ。横膈昂低ノ機コレガ為
 ニ支障セラレテ。肺藏常ノ如ク縮張スルコト能サ

ルガ故ナリ。飲食化シ難ハ。胃モ亦コレガ為ニ災セ
 ラレテ磨盪消克スルノ全カラザルナリ。食後苦悶
 スルハ。胃滿テ脾ヲ壓バナリ。或ハ攻衝急迫スルハ。
 新来ノ乳糜血行ヲ進テ突衝スルナリ。熱物ヲ用ル
 ノ後殊ニ甚
 不レバ則滯食ト相搏ノ致ス所ナリ。鬱愁不快ハ。腦
 中ノ血モ亦滯凝シテ快行セズ。以テ腦ヲ壓迫シ且
 腹部ノ靈液快行スルコト能サルノ致ス所ナリ。心
 悸動ハ稠血心藏ヲ出入シ易カラザルナリ。怔忡ハ
 胸部ノ靈液快行セザルナリ。噎氣。吞酸。惡心。嘔吐ハ
 飲食化シ難ノ致ス所。頭痛ハ胃ニ留滯アルノ致ス

所。腹痛ハ飲食腐敗。或ハ門脈拘急スルナリ。腹滿硬
結ハ血ノ壅滯ガ蔓延シ。又飲食不化風氣ヲ生スル
ト相持シテ来ナリ。其他種種變證モ。亦皆稠血壅滯
ト飲食不化トヨリ轉シ来ナリ。其遠因。怠惰安逸ハ。
以テ血行ヲ遲滯セシムルヨリ其ヲシテ稠凝ナラ
シムルナリ。食養不節殊ニ豆ノ類。或ハ不熟麤惡
ノ麥餅。酥滓。酸烈ノ諸飲等ハ。
粗惡ノ乳糜ヲ生シテ以テ血液ヲ稠凝ナラシムル
ナリ。過房娼縱ハ。血中揮發ノ精氣ヲ亾シテ稠凝ス
ルナリ。憂苦悲哀情意不了ハ。靈液ヲ損乏シテ血行
遲滯シ稠凝スルナリ。瘡疹内陷ハ。血質汚濁ニナリ

テ稠凝スルナリ。通血閉澀ハ。血液增益シテ稠凝ス
ルナリ。其他血液稠凝ヲ致スノ事件尚推スベシ。若夫硬
結腫ヲ生スルハ。猶肺肝及他ノ硬結腫ヲ生スルガ
ゴトク一般。若其諸證劇キ加ル者ハ壅塞ハ。血液留
滯スト雖モ。猶イマダ結著セズ。故ニ適宜ニ勞動ス
レバ。則卻テ稍融解ンテ安ヲ覺ヘ但輕症ハ然リ。若
重證ハ尚苦悶ヲ
増硬結腫ハ猶石ノゴトク。苟モ勞動シテ血行ヲ進
レバ。則コ、ニ激抵シテ劇痛拘攣ヲ發スルヲ以ナ
リ。此病進バ則勞瘵様ニナリ。或ハ惡性癌腫ニ變シ
テ而シテ死ス。其顔色滲淡唇色青キ等皆其漸ナリ。

肺癰腫以下勞瘵門等ヲ參考シテ其始末ヲ知ベシ。

○凡脾病様ノ人赤利下血ヲ發スルハ良ナリ然ドモ若度ニ過テ止ズ。水腫様ニナレル者ハ死ニ近トスルナリ

○治法。此病ハ荏苒持久シテ急功ヲ得ガタシ。剛鐵丸散及酒劑等コレヲ主ドル。幾那。杜松子。蘆根。茴香。龍牙草。石葦。旃那。大黃。朱厘芝等ヲ撰用シ。適宜ノ煎湯ニ作テコレヲ送下ス。大便秘結スル者ハ三物和腸丸。石鹼丸。樞機 蝟蛄大黃散等ニ宜シ。外カ煙草膏。或ハ樟腦膏。及蒸溺法等ヲ施コト都テ肝病ト同ク將息ス

ベシ。又潛心克意。及一切化シ難キ食品。乾酥。塩藏物。粉麵ノ類。酸收物ヲ禁シ。輕肉。雞。鳩肉。雞卵。麥。米。菠薐菜。芹。苡子。葛苴等ヲ用ヒ。時時一盃ノ好酒ヲ飲。適宜運動シ。又情意ヲ慰悅スベシ。○硬結腫ノ治法、肝ノ硬結腫ト同シ。諸方劑總テ悉西方鑑ニ出ス。撰用スベシ。

腎痛第五十四 石淋。腎癰腫。及潰瘍。屬焉。附膀胱癰腫。及潰瘍。

腎痛有三種。一曰結石。二曰癰腫。三曰雜證是也。結石。先生細砂于腎。漸結成小石。或下來于輸尿道。若膀胱所在必作痛焉。其因鹽氣土質酸澀液粘膠液等相合。

而成焉。蓋此等之物。其原得之於飲食。殊多用塩物。及乾
腊。炙肉。含土氣。若含石質。屬子水。收斂性酒。若食品也。且
此病。老輩殊曾嬰痛風。若流注痛者。及諸般坐業人。又起
卧過温。覆或久住熱土。居恒過泄。身表之蒸氣。以使尿質
稠厚。人發之多。或先天遺傳。因血液稟性發者。亦有之。

腎ハ兩箇アリテ。腹底肝脾ノ下。腰椎骨ノ第一第二
ノ裏傍左右ニ對居ス。故ニ腎痛ハ必ズ此部ニ當テ
其痛ヲ覺ユルナリ。然ドモ腎ハ是小水ヲ血中ヨリ
分離シ取テ。コレヲ膀胱ニ流シ送ルノ器。輸尿管十
ル者アリテ。兩腎ヨリ出テ。腸間ヲ通り行テ膀胱ニ

達シ。且其白脈ノ交通スルトヲ以テ。其痛必腸中ニ
牽引シ陰處ニ連及シテ。所謂疝痛此腸痛ノ腰泌ト
混同シテ。殆ンド辨シ難キモノナリ。加之腎痛ニモ亦
三種ノ因ヲ殊ニスルアリテ。治療一ナルコト能ハ
ルトキハ。學者先腎痛ト疝痛トノ區別ヲ知り。次ニ
三種ノ因證ヲ辨明セズンバ非ズ。是治術ノ急務ナ
リ。○腎痛ト疝痛トノ區別ハ。第一ニ腎痛ハ。其痛疝
痛ヨリモ甚シク。且間歇アルコトナシ。疝痛ニハ必
發作休止アリ。此結石腎痛ヲ主トシ 第二ニ腎痛ハ。
食後其痛稍減シ。疝痛ハ增益ス。第三ニ疝痛ハ。吐下

スレハ痛減ズルコトアリ。腎痛ニハコレ無シ。第四
 ニ腎痛ハ。痛ノ或ハ左或ハ右一方ニアル者。其患ア
 ル方ヲ上ニシテ卧ガタシ。疝痛ハ然ラズ。又其痛ア
 ル方ノ舉丸時アリテ牽引ス。疝痛ニハコレナシ。又
 其患アル方股脚強硬シ。或ナキ方麻痺スルコトア
 リ。按ニ此證ハ。結石既ニ輸尿道ニ疝痛ハコレナシ。
 第五ニ腎痛ハ。小水其始透明光澤アリ。或帶血色ニ
 シテ粘様或砂様ノ底渣アリ。疝痛ハ尿稠厚ニシテ。
 沈靜スレドモ底渣ナク且尚稠厚ナリ。此等ノ看法
 ヲ以テ。定テ其腎痛ナルヲ知り。而後三種ノ區別ヲ

参考スベシ。○結石腎痛ノ候ハ。其初正ニ細砂ヲ腎
 中ニ結ブマ。先腰痛ヲ發シテ動作懶ク。其石結成ス
 ルニ随テ。腎部壓痛漸甚ク。上ハ胃ニ連及シ下ハ輸
 尿管ニ達ス。或ハ腰及足麻痺シ。患部多在左方拳状塊ヲ
 生ジテ上逆シ。或惡心嘔吐ヲ誘シ。或ハ小便努責シ。
 或水様或渾濁。或血尿。或尿管潰瘍ヲ發スルコトア
 リ。而シテ小水ノ罔中ニ在ル。必ズ石灰様ノ膜衣ヲ
 生ジテ。撲著被蔽スルコト甚速ナリ。漸クニシテ其痛
 斜ニ下ノ方。膀胱ニ下行スルヲ覺ヘ。是其結砂輸尿
 管へ下ルノ時
 ナリ。コハニ於テ。其石稍大ナル者ハ。輸尿管ヲ塞キ。
 既ニ分泌セシ尿ヲ障遏シテ。通ゼシメス。腎ニ逆流

シテ膨脹シ。諸症夫ヨリ痛膀胱ノ部位ニ在ルニ至
 増劇スルナリ。レバ。少ノ運動ニモ痛増劇シ。車馬ノ如キハ絶テ乘
 リガタシ。小便通シガタク。即淋瀝尿トナリ。尿中ニ
 白膿様ニシテ且悪臭ナル滓渣夥クアリテ。陰頭痒
 ク。尿通ズル毎ニ大便努責シ。終末ノ一滴ニハ。痛ミ
 骨髓ニ徹シテ耐ガタシ。或閉ルコトアリ。若其小石
 尿中ニ下レバ痛自愈ユ。若下ラザルバ。則其石頗ル
 大ナルナリ。導水管ヲ用テコレヲ探知スベシ。○蓋
 體中ノ結石前諸篇ハ。総テ本文ニ舉ル所ノ塩氣土
 ニ見ユ質。酸澀。粘膠油ノ物ヲ。各各其質ニ含有セル所ノ飲

食中ヨリ得テ。而シテ其始實ニ微細ノ砂ヲ生シ。尋
 テ同質ノ品ガイツトナク相求メ集リテ。遂ニコレ
 ノ結成スルコト。猶齒間ニ結石ヲ生ズルガゴドク
 相同シ。結石ノ形ナ種。圓アリ。扁平アリ。隨圓アリ。
 長アリ。短アリ。稜角アリ。細カニシテ夥
 キアリ。大ニシテ必キアリ。質色モ亦種種ナリ。黧茶
 褐色。或ハ黄色。或ハ白色。重キアリ。輕キアリ。又煖ス
 ルカ如キ者アリ。是其始附着スル所ノ形勢ト。况ヤ
 其毒液ノ質トニヨリテ。一概ナラザルナリ。腎ハ尿ヲ分利スルノ器ニシテ。鹹渣ノ會同スル所。
鹹渣ノ義。前諸篇ニ鹹渣ハ自然ニ凝固スルノ質ア
毎毎コレヲ説ケリ。ル者ナリ。塩汁ノ中。自然ニ凝水石故ニ腎ノ結石ヲ
 生ズル。他部ヨリモ速ニシテ且多シ。結石ノ腎ニ生
 ズル由ヲ知シ

ト欲セバ。此病因アル人ノ尿ヲ多ク取テ。澄静シコ
 レヲ傾去バ。則其尿管ノ周圍ニ。石灰様ノ膜ヲ結ブ。
 此其本質ヲナス所以ノ者ナリ。若此尿管ヲ數日管内
 ニ置ケバ。直ニ石状ノ芒ヲ結ブコト。猶消石ヲ製ス
 ルガ如ク。相似是故ニ此病ハ。殊ニ下文ニ謂フ所ノ
 タル者アリ。如ク。喜テ多ク塩物ヲ喰ヒ。此其本質ヲ作
 如ク。喜テ多ク塩物ヲ喰ヒ。此其本質ヲ作若クハ乾
 腊炙肉ヲ好ミ。此粘凝ナル若クハ土氣若クハ石質
 屬子屬子ノ義。受生ヲ含メル水ヲ用ヒ。或ハ收斂性
 酒赤葡萄類若クハ食品ヲ用ル者ニ於テ。コレヲ得
 ルコト多シト謂ヘリ。又人少壯ノ時ハ。血液稀薄一
 シテ。自ラ凝滯ノ患鮮シ。故ニ此病ニ嬰ルコト希ナ
 リ。老人ハ血液稠厚ニシテ。動スレハ輒凝滯ノ患ヲ

生ズ。殊ニ曾テ痛風。流注痛等ニ嬰シ人ハ。加ルニ其
 塩氣ノ酷稠ナルカ。諸液ノ粘凝スルカノ災ヲ以テ
 スルガ故ニ。殊ニ復此患ニ嬰リ易シ。又諸般坐業ノ
 人ハ。常ニ血液ノ運行ヲ遲滯セシメ。加ルニ毎時尿
 ヲ忍デ。久ク溜瀝セシメ。曰テ鹹渣ヲ定著セシムル
 ヲリ。此患ヲ發スルコトアリ。又居恒蒸發氣ヲ過泄
 シテ。尿管ヲ稠厚ナラシムレバ。則塩氣モ亦稠凝シ
 テ。遂ニ此病ヲ發スル者アリ。若夫先天遺傳ハ。必其
 年頃ニ當テ。血液自然ニコレヲ發シ来ルガ故ニ。一次
 コレヲ驅去コトヲ得ト雖トモ。随テ復コレヲ生シ

終ニ全治スルコト難シ。凡結石腎痛。治ヲ怠レバ則石漸ク長大シ。其終焮腫潰瘍。血尿。其他種種惡證ヲ發シテ而シテ死ス。怠慢スベカラザルナリ。

焮腫熱痛。與諸焮腫同趣。其因亦畧同焉。然腎尿管也。故又熱烈利尿劑及馳驅急走等。以強動腰部。而泌出稠厚熱尿之事件。皆能發之。又溫覆久仰臥。以壓迫腎部。或強打撲腰部。或自輸尿管攣急轉災。或自結石腎痛啓發等也。若夫膀胱焮腫及潰瘍之目。大率不異乎是。無所復辨別耳。蓋此等痛。若不愈而經日。則變潰瘍陷。勞瘵亦與內部諸焮腫同。

焮腫腎痛ノ候ハ。疼痛殊ニ甚シク。灼ガ如ク刺ガ如ク季助ノ下ニ當テ鼓動スルヲ覺ヘ。若シ患部ヲ誤リ觸レ。或ハ動搖シ。或ハ衾褥内甚溫暖ニ過レハ。其痛尤劇シ。而シテ其痛アル方ノ鼠蹊股。及脇壑脹酸痛シ。膀胱ニ連痛ス。甚シキトキハ則内股重墜麻痺シ。陰部疼痛シ。辜丸攣引シ。誓留壯熱其部殊ニ甚シク。且惡心。嘔吐。噯氣。呃逆。煩渴。便秘等ヲ兼テ小便艱澀。初ハ澄清。次ニ帶赤。甚トキハ大抵微黄ニシテ短少ナリ。若病一尋ヲ進ムレバ。尿閉。謔語。卒厥等ヲ發ス。○焮腫ノ通因ハ。諸篇ニ散見スルガ故ニ舍テコレ

ヲ論ゼス。熱烈利尿劑トハ。帝列面油。芫菁醇等ヲ謂
 フ。此等ノ藥ハ動スレバ輒腎中ヲ熱沸セシメ。遂ニ
 以テ此患ヲ將來ス。馬ヲ馳セ疾ク走リ。以テ腰部ヲ
 強動シ。且稠厚熱烈ナル小水ヲ分泌シ出ス。或ハ前
 件ノ因
 ナキモ。亦是ノ如キ尿等。総テ暴卒ニ血ヲ腎ニ輻湊
 質ヲ致スコトアリ。セシメ且熱沸セシムレバ。則此患ヲ將來ス。久ク仰
 卧シテ腰部ノ血ヲ壓迫滯滞セシメ。加ルニ温覆シ
 テ血ヲ沸熱セシムレハ。則此患ヲ將來ス。強ク腰部
 ヲ打撲スレバ則皮ヲ隔テ腎ヲ傷リ。以テ此患ヲ將
 來スルコトアリ。劇ク輸尿管ヲ攣急スルノ病アレ

バ。則腎ヲ強牽シテ此患ヲ將來スルコトアリ。腎石
 大ニシテ稜角アリ。或ハ枝岐ヲナシ。或然ザルモ所
 在ヲ觸傷スレバ。則此患ヲ將來スルコトアリ。膀胱
 焮腫ノ因モ亦略コレニ同ク。唯其一膀胱ニ關係
 スル所ナキ者ヲ除クノミ。又導水管ヲ妄意ニ挿入
 シ。或ハ結石ヲ剔出スルニ由リ。或ハ消息子ヲ用ヒ。
 或ハ淋疾ヲ誤治シ。婦人ハ婉身ノ術ニ由ル等ナリ。
 若其證ハ。則小腹劇痛。小便隆閉。肛門努責シ。熱太甚
 ナラザルナリ。腎膀胱焮腫トモニ。三四日頃若クハ
 七八日頃ニ。病毒分利ノ徵小水濃濁。或黑色或黯色
 ナル血交リ。或膿ニ似ス

ル莖芽アルナクシテ。而シテ疼痛減少シ。腎膀胱ノ
ヲ謂ナリ。官能多ク缺脱シテ。尿中惡臭ナル膿ヲ下シ。或ハ血
ヲ雜ヘテ下ス等ノ證ヲ見ス者ハ。是潰瘍ニ變ゼル
ノ候ナリ。

雜證。謂無有結石及焮腫之候。而發腎痛者也。其曰腎中
及輸尿管膀胱内等。所布與之滑液。變酷厲質者。或他酷
厲寒液來著者。或流注毒。若痛風毒入腎者。或婦人子宮
病兼發等也。

粘液腎痛ハ。疼痛劇カラズ。尿中ニ未熟ノ白莖多ク。
結石ノ候ナク。或ハ粘液ヲ下スコトアリ。諸證總テ

緩ニシテ振戦甚シ。諸尿罷天賦ノ滑液ハ。以テ
尿ノ鹹烈氣ヲ悶グ所ナリ。コレガ時アツテ酷厲ヲ
致シ。或他ノ酷厲ナル粘液或曰粘稠膠凝質ノ尿。或ハ胆汁様ニシテ粘着スル尿ヨリスガ来リ著テ。以テ腎痛ヲ發スルハ。猶氣
道天賦ノ滑液酷厲ヲ致シ。或ハ他ノ酷厲ナル粘液
ガ来リ著テ。以テ咳嗽ヲ發スルガ如シ。若夫痛風毒
或傷冷毒即流注毒ノ侵入スルヨリ来ル者。及子宮病兼
發ハ。則皆爾前ニ其病アリテ。而シテ轉シ来ルガ故
ニ。別ニ徵候ヲ舉ルコトヲ須ズ

○治法。結石腎痛ハ。先其疼痛ヲ緩和シ。次ニ其石ヲ碎

テコレヲ驅泄シ。且瀉出シ易カラシムベシ。内服甘
 消石精服度十滴日ニ兩三次。此即碎石驅出劑ナリ。ニ宜シ。大麦煎。亞麻仁
 浸。蜀葵甘草湯。乳酪清。緩痛乳劑。護謨消厲飲。和痛飲。
 桃葉湯等ニ滴服シ。外野菊。苗香。錦葵等ヲ乳汁煎ト
 ナシテ。疼部ヲ蒸濕シ。扁桃油。煨葱等ヲ塗リ貼シ。緩
 和溉導方ヲ施スベシ。若劇痛。嘔吐。不寐等ノ證アル
 者ハ。阿片醇ヲ兼用スベシ。若壯熱。喉腫ノ標アル者
 ハ。刺絡術ヲ兼用スベシ。尚下條ヲ参考セヨ。○痛ミ粗和シ。結
 石猶未碎出シ得ザル者ハ。勿耨茶石鹼。煨牡蠣水。或
 ハ石鹼性灰汁。或脫石飲。珀蝸散。三味拔爾撒謨多ク和

劑ヲ用テ。胃化衰弱ス蓋コレヲ用
 ル者ハ。殊ニ此方ニ宜シ。ユルノ間モ
 尚前ニ舉ル所ノ甘和諸湯ヲ多服スベシ。○結石輸尿管ニ在リ。膀胱ニ
 來ル者モ。内服外用トモニ猶前方ニ從フベシ。然ド
 モ其石大ニシテ。輸尿管ニ在者ハ。更ニ胆八油ヲ外
 部ニ塗り。杜松子湯ニ蜀葵煉糖ヲ加ヘテ與ルモ亦
 良ナリ。或膀胱頭ニ掛リ。或尿道ニ掛リテ泄出シ得
 ザル者ハ。開出法。取出法等ヲ用テ速ニコレヲ去ベ
 シ。癩科摘要ニ出ス。○結石既ニ泄除シ。再發ヲ豫防スル者
 ハ。都テ前ニ舉ル所ノ病因ヲ避ケ。適宜ニ動作歩行
 シ。多ク大麦煎。茶湯。蜜水等ヲ用テ。化原丸ヲ服スベ

○焮腫腎痛ハ。利水劑甚害アリ。緩和清涼スルニ宜シ。先^ッ熱ノ強弱ニ随テ適宜ニ刺絡シ。蜀葵甘草湯。或大麥苓麻林度湯ヲ與ヘ。外^カ緩和蒸滯方ヲ施シ。或樟腦膏ヲ貼シ。或ハ發疱膏ヲ貼シ。緩和溉導方若大便快通セズンバ。塩及蜜ヲ施シ。他諸焮腫門ヲ通考シテコレ少ヲ加ベシ。ヲ調攝スベシ。但消石劑ヲ用ベカラズ膀胱焮腫治法畧コレニ同シ。但利水劑ヲ忌マズ若夫既ニ潰膿スル者ハ危證ナリ。尚蜀葵甘草湯。乳酪清亞麻仁湯。牛香湯等ノ如キ緩和劑ニ。或ハ發那ヲ加テコレヲ與フ。尿中膿ヲ下スコ

ト漸減シ来ル者ハ。防腐丸。三香甘草丸等ヲ兼用スベシ。若外部へ腫起スル者ハ。外科術ニ從テコレヲ治ズベシ。瘍科摘要ニ出若膀胱潰瘍。膿略減ズレドモ尚愈ガタキ者ハ。愈創啣筒方ヲ用テ尿道ヨリ射注スベシ。則瘡ユ。若勞瘵ニ轉ゼント欲スル者ハ。肺瘍門及勞瘵門ノ治術ニ從ベシ。
○雜證。滑液酷厲腎痛ハ。乳琥散コレヲ主ドル。若他ヨリ浸淫シ来者ニシテ。腸胃ニ粘液酷厲液アルヲ徵セバ。先^ッ輕キ吐下劑ヲ用テコレヲ疏滌シ。尋テ苗香。香橙皮。龍膽。白芷。酒石塩。霸王塩。蓬砂。消石等ヲ撰

用シテ。適宜ニコレヲ導泄スベシ。若痛尚解セザル者ハ。發疱膏ヲ貼スベシ良效アリ。痛風毒。傷冷毒等ノ浸淫スル者。及子宮病兼發ハ各其本病ノ治ニ從ベシ。諸藥劑總テ泰西方鑑ニ集載ス撰用スベシ

尿血第五十五

尿血之近因。自腎。輸尿管。膀胱。尿道等來也。其遠因。結石。觸傷。膿瘍潰爛。劇烈利尿劑。及下劑。通血閉澀。血行大過。身體強動。打撲傷。或尿管弛縱。或血質溶解。諸病兼發等也。

尿血腎ヨリ來ルハ。尿ト混和シテ分離セズ。輸尿管ヨリ來ルハ。細線狀ヲナス。膀胱ヨリ出ルハ。濃稠黯赭ニシテ一度ニ少ツ、利シ。且小便ノ通利ヲ妨ルノ證ヲ兼ルモノナリ。尿道ヨリ來ルハ。居恒淋漓ス。又各其因テ來ル所ノ部ニ。多少痛ヲ覺ユルモノナリ。相照シテ其原ヲ知ベシ。結石稜角枝岐アル者ハ。動スレバ輒腎或ハ輸尿管等ヲ觸損シテ。尿血ヲ發スルコトアリ。膀胱及尿道ニ於ルモ亦然リ。諸尿器膿潰ヨリ來ルハ。必ズ膿ト混出ス。劇烈利尿劑。殊ニ芫菁醇等ヲ過用シ。或ハ劇烈下劑。殊ニ猛汞。盧會

等ヲ過用スル者ハ。藥氣ノ為ニ腎ノ細脈ヲ侵蝕破
烈セラレテ来ナリ。通血閉澀ハ多血溢餘ノ因。諸血
證ノ原タリ。血行大過。殊ニ腎ニ突衝スル者ハ。必ズ
腰部大熱鼓動シ。脈洪大ニシテ全身壯熱ス。身體強
動。殊ニ騎馳奔走。重任負擔等。腰部ヲ勞カスルハ。則
血ヲ腎ニ輻湊セシメテ。或ハ尿血。或ハ腎癰腫ヲ發
スルノ因ナリ。中ニ就テ。夏月ニ於テコレヲ作スラ
甚トス。其故何ゾヤ。其血ノ熱沸太甚キト。尿質熱烈
稠酷ナルトヲ以ナリ。腰部若ハ尿道外面等ヲ打撲
スルノ甚シケレバ。則内腎或ハ尿道ノ脈絡ヲ破損

スルコトアリ。纖絡緩弱ノ人。或ハ多ク利尿劑ヲ用
ル等ニテ。腎中ノ脈絡及利水管。衰憊弛縱スレバ。則
尿血ヲ分離スルコト能ズシテ。慢ニ血ヲ下シ来ル
ナリ。此證ハ腰部冷滯シテ疼痛セズ。以テ此曰タル
ヲ知ベシ。血質溶解諸病トハ。腐敗熱。或ハ壞血病等
ヲ謂ナリ。痘疹其他諸病。此兩證ヲ夾ム者。皆推スベシ。此ハ其血ノ崩壊ス
ルガ為ニ。尿血分離スルコト能ズ。便チ慢ニ尿道へ
下_リ来ナリ。

○治法。結石ヨリ来ハ。腎痛篇ノ治ニ從ヒ。特ニ溫柔ナ
ル藥劑ヲ撰用シ。動作ヲ慎シメテ可ナリ。○潰瘍ヨ

リ来ルモ亦其本證治法ニ従ベシ。或ハ蜀葵加甘草湯ヲ用ルモ亦可ナリ。若シ其潰瘍膀胱若ハ尿道ニ在モノハ。愈創啣筒方ヲ射注シテ良ナリ。○劇劑ヲ用ユルヨリ来者ハ。嬰亞煉糖。亞刺未亞。護漿。嬰麦乳劑等ニ宜シ。中ニ就テ。酷厲利尿劑ヲ過服スルニ由ル者ハ。緩和油様ノ品ニ宜シ。若羌菁ノ刺戟ニ由テ来ル者ハ。植物乳劑ニ龍腦ヲ和シ用ヲ佳ナリトス。○通血閉澀ヨリ来ル者ハ。コレヲ其舊へ反シ。或ハ刺絡シ。血行大過ヨリ来者ハ。先瀉血シ。清涼收斂ノ劑ヲ與ベシ。醋糖飲。蝟蛄消石散ノ類ニ宜シ。大便

秘結スル者ハ。清涼澆導方ヲ施シテ可ナリ。○身體強動。打撲傷ヨリ来ル者ハ。緩性收斂ノ劑ニ宜シ。○腎脈衰弱ヨリ来者ハ。幾那玫瑰阿仙藥等ニ宜シ。幾那糖桂飲。玫瑰地黄湯。收斂和調劑等コレヲ主ル。更ニ膏部ニ帝列面油ヲ塗擦シテ良ナリ。○血質熔解ノ證ハ。各其本病ノ治ニ従フベシ。諸方劑總テ泰西用スベシ。

尿管第五十六

白濁屬焉 附遺尿

尿管之近因。腎藏衰弱。過小水分利之機。或血液稀薄融

鮮漫泄之所致也。其遠曰多飲而閉蒸氣。或過用劇利尿劑。或腰部勞力。或病後衰弱。或血液自敗等也。白濁即尿管一種。乳糜液混注也。小便失禁膀胱括約筋虛弱或麻痺也。

泄瀉ニ溘泄。飧泄。乳糜利ノ別アルガ如ク。此病ニモ亦三種ヲ別ツ。曰多尿。曰尿管。曰白濁ト是ナリ。多尿ハ輕淺ノ病ナリ。是ハ腎藏衰弱スト云ニハ至ラザレトモ。遠曰ニ所謂。多ク水様稀薄ノ液汁ヲ飲テ。而シテ衣服ヲ薄クスルカ。寒冷ヲ凌グカ。或ハ靜坐シテ運化ヲ怠漫セシムルカニテ。身表ノ蒸氣ヲ微ナ

ラシムレバ。則多尿ヲ致スモノナリ。此證ハ乃其飲液ヲ搏節シテ。而シテ適宜ニ身體ヲ運動スレバ。則愈ユ。以テ病トスルニハ足ザルナリ。然ドモコレヲ調養スルコトヲ知ズ。日日多飲多尿ニシテ。而シテ止ザレバ。則遂ニ腎機ヲ衰憊セシメ。且全身血液ノ性ヲ損シテ。以テ真證ニ轉ズルナリ。劇キ利尿劑ヲ過用スル者ハ。管ニ多尿ナルノミナラズ。甚シキトキハ。則血ヲ雜テ泄スルニ至ル。腰部勞力モ亦然リ。宜ク前篇ト互考スベシ。病後衰弱。或ハ小兒婦人等ノ纖維虛脆ノ者ハ。動スレバ。輒尿管殊ニ白濁ノ證ヲ

患ルコトアル者ナリ。此證ハ全體諸官衰弱シテ。乳
 糜ヲ成造スルコト全良ナラザルニ。腎藏モ亦衰弱
 シテ。以テ分離ノ機ヲ過ツトノ兩因ヲ併セ来ルナ
 リ。○腎ハ血中ノ水液ノ剩餘セル者ノ中へ。他ノ血
 液ノ老敗セル者ヲ合シテ。分離シ出スノ罣ナリ。盖
 人身血液ノ質ニハ。皆其體ヲ粘合保攝スルノ力ア
 リテ。漫ニ分折セザル者ナリ。然ルニ其性ヲ失スル
 コト。壞液篇ニ説ガ如クナレバ。則其質皆老敗液ノ
 如クナリテ。粘合保攝ノ力ヲ失ヒ。剩水ト共ニ混和
 シテ。泄出シ来ナリ。此ヲ真ノ尿管トス。或ハ血液ノ

質甚敗壞スルニハ非レドモ。若クハ飲食若クハ藥
 劑ノ性ニ因テ。所謂粘合保攝ノ力ヲ解緩セラレ、
 コトアレバ。則亦此患ヲ發スルコトアリ。今此等ノ
 病因ヲ按ズルニ。譬ハ糊ノ如ク然リ。其新ニ煮テ而
 シテ性ノ損ゼザル者ハ。則粘合ノ力強ク。コレヲ水
 ニ投ズレドモ容易ク融解セズ。日ヲ經テ其性敗壞
 スレバ。則直ニ溶解シテ濁水トナルガ如シ。又其性
 損ゼザル者モ。コレニ投ズルニ解粘ノ品ヲ以スレ
 ハ。則直ニ溶解ス。是ニ由テコレヲ觀レバ。則以テ其
 理ヲ辨識スルニ足ル。多尿多飲ヨリ来ル者ハ。猶糊
 ヲ久シク水中ニ浸置テ。止コ

トヲ得ズ溶解スルガ如シ。又曰。邦言ニ血ト糊ト同
ク訓シテ。ノリト謂フ。以テ理致ノ合スル所ヲ見ル
ベシ。凡此病ハ難治ナリ。殊ニ酒容
及老人ハ。絶テ治ヲ望ムベカラズ。○小水ハ腎ニ
分利シ。輸尿管ニ傳ヘ。膀胱ニ溜瀦ス。膀胱下口ヨリ
尿道ニ驅出スル者ナリ。膀胱下口ニ枯約筋ナル者
アリ。意識運化ノ白脈トモニ此筋ニ循行シ。宜ニ適
シ意ニ随テ。コレヲ開闔溜泄スルノ機ヲナス。然ル
ニ其機廢弛シテ。開闔溜泄ノ度ヲ失ヒ。或ハ不意ニ
泄出シ。或ハ漏滴シテ休ズ。コレヲ小便失禁ト謂フ。
其遠因ハ。或ハ打撲撞衝。或淋石ヲ截出シ。或ハ婦人
難産。或重ヲ持シテ常ニ下部ヘ努力シ。或卒中後。或

他病ニテ衰弱シ。或老人。或衰弱家等ニテ。所謂枯約
筋ナル者ニ循行スル所ノ白脈虚衰シ。或麻痺不仁
スレバ。則此病ヲ將出シ来ナリ。若夫長病。或重病。或
急病。或狂疾等ニテ。全身ノ知覺虚脱シ。或昏迷スル
ヨリ小便自利スル者ハ。則此病門ニ筭入スルコト
ヲナサザルナリ。

○治法。多尿ノ證。蒸痰氣閉塞ヲ薫ル者ハ。感冒篇ニ舉
ル所ノ方法ヲ用テ微汗スベシ。則愈ユ。○劇烈ナル
利尿劑ヲ用ルヨリ来ル者ハ。尿血篇ノ治ニ從事ス
ベシ。腰部勞力血尿ヲ致ス者モ。亦前篇ノ治ニ從事

スベシ。若尿管ヲ致ス者ハ。則次ノ衰弱證ノ治ニ從
 事スベシ。○凝固質衰弱シテ尿管シ。或ハ白濁ヲ致
 ス者ハ。幾那醇ニ綠礬湛ヲ滴シ服スルヲ良トス。然
 ドモ患者甚虚弱ナラザル者ハ。先黃智酒ヲ與テ腸
 胃ノ汚滯ヲ淨除シテ而後コレヲ與フ。礬竭散。礬乳
 清。或阿片醇モ亦切アリ。若其尿管酸敗ノ臭氣アル
 者ハ。灰乳。榲皮湯。鹿角灰飲等ニ宜シ。白濁ノ證ハ。多
 ク此方ニ宜シ。
 又都テ此等ノ湯ヲ常用飲料トシテ良ナリ。又外腰部ニ塗擦ス
 ルニ龍腦醇。帝列面油等ヲ以テスベシ。○流動質敗
 壞スルヨリ來ル者ハ。勞瘵門ノ治ニ從フベシ。飲食

藥劑ヨリ來ル者ハ。先其因ヲ去リ。芳香健胃劑ヲ與
 レバ身愈。○凡此病。其稀潤液ヲ凶脱スルガ故ニ。必
 煩渴スル者ナリ。是以テ又消渴ノ名アリ。然ドモ漫
 ニ液汁ヲ飲シムベカラズ。宜ク橘柑等ノ如キ果實
 ノ酸汁ヲ用テ制化スベシ。又此病必漸次ニ羸瘦虚
 憊シテ内伏熱ヲ發シ。殆ト勞瘵ト趣ヲ同ス。故ニ其
 食養食ハ。麥米乳汁等。肉ハ。甲。蚶。蝦。蟹等ニ宜シ。調攝。都テ勞瘵門ニ
 隨テ將息スベシ。又凡テ腰部ニ廣草帶ヲ施シテ温
 ナラシムベシ。又凡尿管病ハ。卧具軟カナルニ宜シカ
 ラズト去ヘリ。

○小便失禁ハ。專ラ白脈ヲ強壯健運スルニ在リ。其
 麻痺ニ屬スル者ハ。桂露。丁子醇。山蒼菜精。硃砂精。鹿
 角精。龍腦精等ヲ適宜ニ内服セシメ。且會陰ニ塗擦
 スベシ。衰弱弛縱ニ屬スル者ハ。幾那醇。阿片醇。阿仙
 藥等ヲ撰用シ。而シテ同シク香竈精ヲ外塗スベシ。
諸藥劑總テ泰西方鑑
 ニ出ス。撰用スベシ

病因精義卷之十終

貽安齋藏



文政十年丁亥五月

發兌書肆

京都二條通柳馬場西入
吉田屋治兵衛

書林

江戸日本橋通壹丁目

須原屋茂兵衛

同 日本橋通二丁目

山城屋佐兵衛

同 芝神明前

岡田屋嘉七

同 淺草茅町

須原屋伊八

同 中橋廣小路

西宮彌兵衛

大阪心齋橋通南久寶寺町

堺屋新兵衛

