


古方丸散方

三次改刻

ヤ 9

1194



文政八年第三卷次刺

東洞吉益先生著
信菴田口先生輯

古方
兼用
丸散方
附
分量考

尚古堂藏板

<2017-33>

丸散方序
豈豈意哉亦有方而已矣豎之為意也
蓋不得已也其所所以不得已者方猶及
闕文矣夫方也者一定不易之謂而不
得人取諸臆也方常一韻古言轉用意
豈可盡哉蓋不得已也方之古術之神
吾誰適從莫尚於張長沙長沙何人史
籍不載今古諸老聚訟不止以余觀之

丸散方
三
序
萬應堂

其人存與不存是何傷乎不特長沙盲
傳腐史歷代所識贈灸乎口實者有名
而無實有實而無名亦不可枚舉也竊
以鑿藥卜筮一免秦火則宜不為烏有
焉然而方之古術之神長沙獨王長其
間者是何也余故有說焉已矣彼鑿意
之言非東漢鑿之語耶加之中鑿之謬
亦西漢史之記也是在其世猶尚然况

百世之下係風捕影乎長沙三經中有
金匱玉函將其自秘帳乎抑亦後進什
襲乎遺弓之公其謂之何人情不遠古
今一也以今測古無隱乎爾知諸魯聖
長沙其然豈其然乎長桑既有禁方道
不虛行長沙待其人亦不可知今而難
折衷不亦宜乎然存羊之福單及百世
不翅觀於古宋元以降可取擴充斯經

之所繇生也。鑿聖之稱亦可以弗畔矣。夫夫然故學鑿者不可不知本末也。方本也意末也。譬諸猶禮之有權也。禮之不知而權豈可為焉乎。本立道生非古而何。近世唱古方者取舍不壹各講張管蠡以幻惑群小耳。食者不識服膺不移日誤橫目蓋不鮮矣。其間目不知一可者猶龍斷于一方為疢疾之淵藪也。

亡賴者往焉無產者往焉習而不熟自有肺腸以擬韓康伯也。孔艱秉心視人如豕含珠之報諛言之期易簣之際適辭之務是以世俗之士側目歸視動輒曰斃而已者今之所謂古方氏也。其敝使長沙含冤是誰之愆。其飭宋元之餘唾者與古方氏為仇視也。因飾孤陋企踵縉紳華言巧語聒于俗耳為術賤技。

九散方 三刻
摘疵長沙則大益懼之或妓黠之子阿其所好陰好陽惡傳不習乎勞而無功人見矛盾又是愈懼是識者之所以長大息也余之於刀圭也箕裘之任已為三世九折之方不為不多矣無誓不錄家訓所然足以待萬病矣猶不自是莫不質諸長沙久之熟之古方不必攻擊不必毒藥人以彼似而非者疑長沙乃

吹_キ整廢食之倫耳方猶及_ハ闕文矣其以_テ意為副方丸散數十皆唐宋以下及俗間之方也要不得其道生害於暗投余將以三餘一匡之職事坤益尚未果矣田口信菴篤於鑿者也余初見於浮海菴後屢就謀也益知其心矣今茲著此書來以請序日子不為曹丘於吾則為皇甫於菴首余閱之正規則審證候願

庸劣之無_二紕繆_一故文不_二雅馴_一全貴通曉
好生之心可謂勤矣比之畫墁之技徒
疲精於彫蟲遺_二覆瓿_一於梨棗則固霄壤
也覽者不_レ咎俾言盡心耽思則杏橘於
痼癘亦不出斯與版成書此以贈_二東都
開享和三年癸亥九月書于穆清樓
意_二東都_一大_二崇_一巖名_二展親伯庸題
大_二崇_一巖名_二展親伯庸題

其_二凡_一例
一古昔周室之有_二天下_一也周公立_二百官_一
置_二醫師_一職掌_二疾病_一是為_二疾病醫_一爾來
醫_二緩醫_一和_二長桑扁鵲_一之徒皆_二脩_一疾醫
之術以_二名_一下當世然非有_二成書_一可以
刑於後人者也則其傳_二泯_一焉余竊_二惜_一
焉及_二漢興_一獨_二仲景_一氏哉其所_二著_一書雖
以_二傷寒_一名家其實_二百病_一治方皆備於

斯矣余嘗以為自軒岐而下方至仲
景可謂妙絕古今矣降自魏晉執刀
圭立于世者無慮十數家其能為仲
景者僅々可指數夫仲景之為方也
調和氣血發滌水滯非若後世醫方
假名溫補而攻劇也故試諸其毒劇
甚者雖方證相對往往有或不治者
其證四焉一曰毒迫于胸腹而急痛

或卒暴欲死者二曰惡毒根于胸膈
而其瘀血聚少腹走發出頭而四支
前後之陰作腫痛腐爛筋骨疼痛者
三曰毒結于胸腹而陳久難治者四
曰水毒留滯于胸腹而及背脚足醫
之雖利續有之者是也此四證者其
尤難治者而長沙之方或存或亡乃
用其方亦不奏其效者居多焉若然

不取後醫之方不_レ失規則於長沙者
 以備此四證則恐亦誤天下蒼生於
 是乎今集撰乎自長沙而下歷代諸
 家及民間傳方且余所自試者分_レ之
 為四類一曰巴豆劑二曰輕粉劑三
 曰大黃劑四曰甘遂劑以此四劑備
 彼四證庶幾世醫兼用諸長沙本方
 急者救之於緩劇者治之於易然後

以證者可_レ不至危篤矣且詳其治藥
 品分量服度以備考證欲無_レ妄施之
 誤意近世醫流不達_レ于此以_レ誤生
 靈者多矣乃至屬續之夕巧言歸諸
 命不亦冤乎本_レ麻_レ山_レ天_レ樂_レ間
 一近世之俗畏怖_レ山_レ方_レ醫猶苛令_レ酷吏
 至於令人言古_レ方_レ酖_レ毒也_レ不可懷也
 此非言者之罪也為醫者之罪也蓋

北齋
狼疾之徒，謗稱古方，亦不知用丸散之法，妄用謬投，以賊夫人之子，世俗之怖職，是之由也。姑舉其一，若彼大便閉，則紫圓承氣之類是也。夫紫圓承氣，豈下便之方乎？自有其證耳。夫方證一違，病者遂不起。世俗之怖有由也。夫雖然，古醫之能用丸散者，大率秘而不出，間或闕其秘用，以獲奇

効，則亦益什襲之。且所謂秘方者，口受耳傳，不得無。且吾是余之所以有此著也。主治藥品，分量服度，不必取於本書及傳書也。取之。近世諸家及予所自試，而有効者，唯要其經驗効實為眼的者。傍有二三不通者，則於各方下從而訂之，從而注之。

字可禁亦須折齒灌門云不可備急

巴豆 宋王碩曰 多在于油也云而用

乾姜 大黃 兩各一

右三味先搗大黃乾姜為末研巴豆

合散 蜜丸或煉丹 酒服之 法以暖水若

與或二三丸更

紫圓 治胸腹結毒或腹滿不大便或

巴豆 有水氣者 今藥肆市赤不虛久所

而無滑膩 真偽不審也 凡石脂者 此

膩滑 澤如脂味之 澀也 唇者 真也 此

邦唯佐州產之 其州方言血止石或

俗云石綿者 真也 雖難得之 故今

作赤石脂 其法曰 鐵砂百錢 目食鹽

以腐者為度 取出燒之 失鐵色則佳也

代赭石 各兩 杏仁 兩 乎可考及水



右四味先搗代赭石赤石脂為末研

巴豆杏仁合散糊丸大服之法如麻子

大人者一二分至一錢為度白湯送下

小兒者一二分至五分或十丸為度

今人多至日中當下大人小兒未差則

巴豆鷓鴣菜丸治有虺蟲而時々心

腹急痛大便閉者

巴豆五大黃八鷓鴣菜十變霜

右三味各別末糊丸服之法如輕

或里二三九至五九

疥癬搗藥疥癬不問新久必打之奇不

亦可打也

巴豆分大黃分單麻子分黑胡麻各

右四味細剉麻布包之漬熱酒打之

數一時半時之間如麻疹發肌表也

發而以湯水禁洗如此六七日許而
浴湯則疹白盡愈

輕粉劑
今用此丸散
之毒曰難解
曰痛曰陳

後胸膈而走發膿汁者皆難解曰毒結
不痛之患者也或審其證候撰此
等丸散兼用仲景方則可治

此例已治惡毒
乃今伍于茲也
治瘡毒骨節疼痛陳疔之

前七寶丸
治瘡毒骨節疼痛陳疔之

輕粉也勢可州焚而射識和製之偽者雜矣雲
母在火
牛膝兩各一
土茯苓兩五

雞舌香
雞雞
雞舌末即入白米七八子

粒研即得
大黃兩四
三萬

九龍丸 三刻

右五味各別末糊丸

後七寶丸

巴豆 鷄舌香 兩各五 大黃 兩八

右三味各別末糊丸

凡用七寶丸之法朝服四分晚服四分

前分服之六日至第七日乃服後方丸

如前法今立略法其毒輕者七寶

丸朝服四分晚服四分凡服之三日

至第四日服後方丸如前法

也瘡之毒也 凡用之則亦能治他病

方之則亦能治他病 凡用之則亦能治他病

者此劑要計大輕者愈日以鹽湯洗滌

輕重者 凡用之則亦能治他病

生魚則消菜生豆紫色辛凡五旬云酒餅

續七寶丸治用前七寶丸無功者

水銀 三兩 礬石 消石 兩各六

三萬後堂

食鹽

兩二

右四味先碎礬石消石乃合四味內

瓦盆中以茗盃覆之以沙築茗盃側

不出其氣案架火上而自下燒之半

日許既而取其所屬著茗盃之霜以

棗肉為丸服之法如七寶九至第七

法之

生乳治肺痿肺癰瘰癧諸瘡毒結

物腸者

水銀

錢八

礬石

錢三

見文年中間絕無之

故今換用礬石殺者即見銀也

硝石

錢六

礬石

錢一

綠礬

錢一

雲母

錢十五

食鹽

錢十五

青鹽

錢五分

右八味各別搗篩為末以次調合之

內甕中密封之畜積凡十旬以上而

取出燒焉但一燒石藥末二十錢許

古萬靈堂

九龍膏

燒法丸法如續七寶丸服之之法如胡

辰砂為衣糖湯送下或

梅肉散 治惡毒難解者見惡瘡結毒

及下疳瘡者云云

輕粉 巴豆 乾梅肉 或

攪皆非也 山梔子 各霜各 此則能解

惡肉惡血也

右四味各別末合為散若不能散服

者糊丸亦佳也服之法其毒重者服二三

送熱湯

伯州散 治惡毒難發出者治一切打

身癰疾瘡毒疼或諸瘡內攻者又見一方曰治毒腫又有膿

反鼻 中津蟹津蟹者昆河蟹也

角石各等分 同角石者即

右三味各別搗篩合為散服之法酒

五萬後堂

九散方

三

三

重者

與鼎丸其効同七寶丸而緩又無口

中腐爛或眩暈之患也是用輕

粉最上之法也西方友醫所以

與鼎之傳方也故自名與鼎丸

也

輕粉一錢半輕粉置瓦失祿魚以口去腸十

心上九自下覆魚上下時許既而取其所

燒之霜一辰砂三黃藥

大黃各五

右四味辰砂黃藥大黃各別為末所

得之輕粉霜一錢合散糊凡服之法

朝服錢晚服一錢白湯送下十日

可以一劑盡不愈則又服之如前法

又曰凡用之二三劑而有七寶丸一

劑之功矣

六

龍葵散

者

治一身發瘡而痒痛或疼痛

輕粉

巴豆各三兩

龍葵為霜十兩

修治梅肉散之例

礬黃加輕粉丸

治礬黃散證而胸中

有舊毒惡水不動者

輕粉

巴豆各五

大黃

礬石

各四

右四味先大黃礬石各別為末研巴

豆入輕粉糊丸服之法如梧子大

牡蠣角石散

治諸瘡出膿汁者

輕粉

牡蠣

角石

各霜各兩

右三味合為散以鷄子白煉粘瘡上

臍臍藥

輕粉

煨甘石

礬石

各

或名無射

右三味先礬石爐甘石為末乃合輕粉擦腋下

大黃劑

今可用此丸散圓方之曰
不可治此丸散
或起不難安者微利曰痞
曰大有毒曰不通或起不難安者微利曰痞
其毒結胸腹而陳久難治者皆是其胸
治之則可也
方則可也
選此等丸散兼用於本

或名應鋪

窮黃散

治轉變不可治者
證轉變者而病

大黃

兩一曰治及頭上見之毒
其漢產肥實濕潤者不可
用之其乾枯輕塵者不可

用之

芎藭

兩六之芎藭以之豐後

右二味各別末合為散

服之六七分酒服

之不隨病證每夕可服之

承氣丸

治腹中堅塊大便不通者
是

黃研石丸也又見一方曰
治下腹滿或燥尿不通者

大黃

兩四消石兩六

凡散方

大黃散

右二味各別末糊丸

右二味各別末糊丸子服之每法服如梧九

今以枳實六湯而厚分一大黃芒煎湯服

使病者易飲也又唯非為易解也服

或唯此則陳久服之則病亦能易解也又服

浮石九治腹中當作小腹痛堅塊膿血

或名夷則

大黃 赤石脂 浮石兩各四者

中浮石也其味鹹者真也

消石兩四 右四味各別末糊丸每服八梧九

今以半丹皮三湯服之

湯而用之則如承氣丸也

三物浮石丸黃治腹不滿其人言我滿

者

大黃 浮石 桃仁各等

右三味各別末糊丸子服之每法服如梧十

九萬後堂

或名
黃鐘

九
散
方
三
刻

湯送下丸白

三黃丸 治心煩坐起不安大便微利

者

大黃 兩十 黃芩 兩各五 黃連 兩各五

右三味各別末糊丸服之法每服一匙

急欲下之酒服之

硝石大圓治腹中結毒心下痞鞭者

大黃 二十 消石 十五 甘州

或名
夾鐘

或名
林鐘

人浸 各五

右四味各別為末以苦酒六合先煮

大黃減一合內甘州人浸更煮如餘

狀下火乃內消石攪之為丹服之法

大合飲服又日苦酒

甘連大黃丸 治胸間有毒心煩不安

者

大黃 兩六 甘州 黃連 兩各三

下萬安堂

或名
大族

加
背
三
刻

右三味各別末糊丸服之法每服如梧十
湯送下

人溲大黃丸治心下痞鞭大便難者

大黃兩一 黃芩兩一 人溲兩各五

右三味各別末糊丸服之法每服如梧十

湯送下

鐵砂大黃丸治發黃短氣者

剛鐵砂兩各三 蕎麥兩各三 大黃兩六

右三味各別末合為散水煉酒服服

法如梧十 以酒服之

礬黃散治無名惡腫癰風癬瘡者

大黃各等 礬石各等

右二味各別末合為散每服送下以

薏苡仁圓治小兒頭瘡及胎毒諸瘡

大人亦得發瘡毒揚梅頭

粉四又小兒頭瘡胎毒者

九
皮
方

三
川

三
萬
錢

大黃

五錢

土茯苓

二錢

薏苡仁

十錢

右三味各別末

煉蜜為丸

彈丸

每

服一九白湯送下

日

服

送下

日

服

送下

甘遂劑

今用此丸散丹

利日効之

痰喘

背胸中苦煩曰水毒留胸腹而及
背痛者皆是利水積有之者散也
難治之醫雖利也撰此等丸散丹

或名

平水丸

治小水腫

小便不利

胸中煩

而

喘及下疾者

見腫滿

方曰治脚氣

甘遂

作

兩方

漢勝今用之

芒硝

荒花

兩各三

商陸

兩四

吳茱萸

兩五

右五味各別末

糊丸

服之法

如梧

桐

丸

或五

六九

方

丸

服

法

如梧

桐

或名
南呂

滾痰丸

治胸中苦煩痰喘者

甘遂 二兩

大黃 八兩

黃芩

青礞石

各五兩

燒礞石之法

消石礞石以見黃金等

星為度

火氣當熾否則功為

是萬病

今藥

尾痰端

石門云金

者尤良也是萬病

右四味

各別末

糊丸

服之法

如梧

子大每

服二十

加丸

六朝

七夕

服之

下

送下

又

或名
控涎丹

治痰喘胸中不了了或背痛

此者

甘遂

大戟

白芥子

各等

分

生薑

而

右三味

各別末

煉蜜和

為丹

以

生薑

而

汁湯送下

服之法

如梧

子大

每

服

佳

或名
仲呂

如神丸

治腹脹水腫小便不利者

大黃 六兩

牽牛子

甘遂

各三

兩

方

有消石

三兩

方

三

萬

夜

堂

九龍丸
三姑

右三味各別末糊丸服之法每服十梧桐
湯丸白送下

右四劑總計三十方者誠經驗正
實之良方也雖然各方皆峻烈之
劑初學之士誤施之則不可謂其
害也必審證候藥品分量服度而
投之則無病不愈矣庶幾初學之

士卒爾莫投焉切審之切慎之不
然則腹滿結毒不可救藥矣

雜方
前四劑外九二方湯八方
取諸名家及自施之病者
當能合仙景之知規可

滑石礬甘散
治淋瀝小便不利或渴

者廿

滑石肆用上飛過者下此症而無効者

五物大黃湯

是以此方擇細膩白澤無土氣者而用之此方數試數驗不可不知也

礬石兩各六 甘草兩三

右三味各別末合為散服之法每湯下

蛭皮丸 治諸痔漏脫肛腫痛癢痛或

膿血及下血者

蛭皮各八 白鷄冠花各十 礬石

綠礬各六 附子各三 生乳各一

右六味各別末有瀉心湯症者以

黃丸之散末十錢合之糊丸又有

牡丹皮湯症者以浮石丸之散末十

二錢合之糊丸每服之法如梧子或大

白湯送下必自腰至下愈穴者按

或八穴自三日或至七日愈穴者按

小腹之毒而取之腰以下為愈穴也

五物大黃湯 治世俗所謂癰疽者

大黃 芎藭 桂枝 乾地黄

甘草各六

九效方 三川 七五萬

五散

右五味以水二合，煮取一合半，服之。

半浸指去甘草膏能治口舌腐爛或牙

去齒疼痛者甚奇功矣或云

桃花大黃湯 治有水氣而停滯小便

不利身腫脹者

桃花今年之花不用之

大黃 右二味以水二合，先煮桃花取

八勺，去滓，內大黃，再煎取六勺。

甘連大黃湯 治胸間有毒，心煩而急

迫者

甘艸五分 黃連各 大黃各

右三味以水一合二勺，先煮甘艸取

八勺，漬二味，須臾絞去滓，溫服。

黃連解毒湯 治心胸之間有毒而停滯，或心下按之濡而煩悶。

辨別
三
知

或心志不定者

黃連

分九

黃芩

大黃 枳實

各六

右四味

以麻沸湯八勺漬之

須臾絞

去滓溫服

水一合

千金甘艸湯

治服湯藥而嘔逆不入

腹無奈何者噦逆第五出吐

甘艸

甘艸

甘艸大黃

和右一味以水盪合五勺煮取八勺服

之得吐但服之不吐益佳消息定然

後服餘湯即流利便不吐也

鷓鴣菜湯

治有蟲而吐即見諸證者

見吐一力日治吐下就者

鷓鴣菜

不製

大黃

甘艸

各等

右三味

以水二合五勺先煮二味取

一合去滓內大黃再煎取

六勺候之

好

三

七

診腹又其塊有時而聚時而散其塊青
白唇色丹紅目沫又臉赤或時煩不
煩吐清水或唾沫又吐下或煩二不
條得食而嘔或不飲食惡聞食臭
心痛必發作有時者是候之大藥
也

石膏黃連甘艸湯治心煩而大渴者

石膏五黃連一甘艸八

右三味以水一合五勺煮取六勺

解毒劑大小微瘡家切必用之

茯苓大木通大忍冬大川芎

中 和大黃中甘艸小土茯苓

右水二合煮取一合分溫二服加

土茯苓五錢則水四合煮取二合又

加土茯苓十錢則水八合煮取四合

惡湯稠者水煮隨其宜若大劑則水

煮準其方

七 萬靈堂

今壹合五勺餘皆○粳米壹升者今壹
合餘而今四十貳錢目○小麥一升者
今壹合餘而今三十貳錢目○薏苡仁
半升者六兩今十二錢目○半夏半升
五味子半升杏仁半升者並同上○膠
飴壹升者十六兩今三十二錢目○香
豉壹升者同上○雞白半升者八兩今
十六錢目○瓜子半升者五兩今十錢

自○酸棗仁壹升者代二兩今代四
錢目○消石壹升者二兩今四錢
梟○蜀椒三合者壹兩半今三錢目○
石膏雞子大者代兩今半錢目○戎
鹽彈丸大者壹兩分代錢目○代赭石
彈丸大者同上○葶藶彈丸大者半兩
今二錢目○大棗十四枚者三兩今六
錢目○皂莢代枚者壹兩今二錢目○

○ 梔子十四枚者二兩今四錢目 ○ 大
 附子壹枚者二兩今四錢目 ○ 栝蒌實
 一枚者同上 ○ 附子壹枚者壹兩半今
 三錢目 ○ 枳實五枚者五兩今十錢目
 ○ 桃仁五十個者二兩今四錢目 ○ 竹
 葉二把者三兩今六錢目 ○ 葱白四莖
 者二兩今四錢目 ○ 厚朴兩尺者八兩
 今十六錢目 ○ 蜜壹升者今一合強也

○ 右所舉三十餘品侗當做此其詳細
 者固不可知則專令立方之制而已

本草綱目卷之...
 三...
 考...
 三...
 考...

芙蓉谷山下
高野之藏
匠生